

MEDICI ANTIQVI

424

OMNES, QVI LATINIS LI

TERIS DIVERSORVM MORBORVM

genera & remedia persecuti sunt, undique con-

quisiti, & uno uolumine comprehensi,

ut eorum, qui se medicinæ studio des-

diderunt, commodo consulatur.

Ab infinitis mendacum aspergimibus, quibus scatebant, vix paucis acutioribus vitiis perceptibiles,
in pristinum propè nitorem, sublati errorum plus demis millibus, restituti; ita ut à quouis me-
dico literis Græcis & Latinis instructo, & rei medicæ perito, intelligi queant. Opera & Herculeo

Index in omnes plenissimus.

Admonitio

*Sed nouus huius compilatus, con-
summata noua & ampliore impressione.*


penè labore, vigilijsq;

*Hic. Nancelij Trachyeni,
Noviodunensis, apud Turones
medici.*

Accessit eiusdem Nancelij
commentarius amplissimus
in Straboni Gallum, poetam
& medicum insignem, catalogus
medicorum comprehensum.

*Ex prima Nancelij
re cognitione.*

*Autorum nomina sequens
pagina aperiet.*



*Ab omni fide transscripta et aucto-
ritate ab Al. Nancelij. 1600.*

De Gao. Tum Vic. Nancelij.



VENETIIS, M. D. XLVII.

IV. OFFICIALS: 1911-1912

ВЕРХНЕ-УФАЛЬСКИЙ РАЙОН

NO. 2 SUPPLEMENT, 1931, 1932

Ardeobornes Salmagor 17

... ..

INTERNATIONAL CHRONICLE

MEDICINAE STUDIOSIS,

Typographus S.

^{ita} **SI EST**, ut medicina corporibus prosit: non dubito, quin à uobis magnam inie-
rim gratiam, cum omnes, qui olim de re medica latine scripserunt, studiosè conquisitos,
quosdam etiam tanquam ex tenebris eductos, uno uolumine edendos curavi. omnium mor-
borum mentionem, & uniuscuiusque remedia reperietis. nam ut eorum aliquis aliquid omi-
serit, omnes tamen simul omnia præstabunt. ita ex multis scriptoribus, quasi membris in
unum corpus conformata medicina, malè affectos curabit, bene ualentes tuebitur. recen-
tiorum scripta non attigimus, quia fuisset & infinitum, & superuacaneum, quippe cum
à ueteribus, quos impressimus, nihil uideatur esse prætermisum. **Valete.**

Alia Nancelij epistola aliunde
tibi petenda.

Medicorum latinorum nomina, qui in hoc uolumine continentur.

^{postpone}	^{prepone}	Aurelius Cornelius Celsus, pag. 1.	L. Apuleius Madaurensis, p. 211. <i>uulsa.</i>
		Q. Serenus, p. 65. <i>uulsa.</i>	Antonius Musa, <i>sed falso inscriptus</i> , p. 222. <i>uulsa.</i>
		Trotula, p. 71.	Aemilius Macer, cum commento Atraciani, Nancelij reformato ac restituito, p. 223. <i>uulsa.</i>
		Marcellus, p. 81.	Strabus Gallus, <i>commentarius nouis Nancelij illustratus</i> , p. 247.
		Scribonius Largus, p. 142.	Cælius Aurelianus, <i>hic Aurelianus dimidia sui parte</i> p. 244.
		Soranus Ephesius, <i>sed falso inscriptus</i> , p. 159.	Theodorus Priscianus, <i>298. nuncius, è minore nostro uolumine</i> A. amonitio.
		C. Plinius Secundus, <i>idem & forsan falso inscriptus</i> , p. 164.	<i>correctus, suo loco inferendus est.</i>

For omnes summa diligentia & attentione perlectos, per
Apuleio Madaurensi, Atraciano, Antonio Musa, Aemilio Macero, Scribonio Largo, Cælio Aureliano, Theodoro Prisciano.
Nic. Nancelius. Nouodunus corrector.
& in statum longe meliorem, oreo Deo, vindicauit.
Perlege, & iudica.

Sequere potius hunc in exaudendo, ordinem.

Au. Cornelius Celsus.

Cælius Aurelianus (dimidia sui parte uictor)

Scribonius Largus.

Marcellus.

C. Plinius Secundus. *sed falso inscriptus.*

Qu. Serenus.

Aemilius Macer. *cum commento Atraciani.*

Strabus Gallus. *commentarius nouis Nancelij illustratus.*

L. Apuleius.

Ant. Musa. *falso inscriptus.*

Theodorus Priscianus.

Soranus Ephesius. *idem & falso inscriptus.*

Trotula.

A. amonitio ad Typographum.

Reliquos auctores post Celsum
proximos, videat Corrector typ-
graphicus, ut sedulo corrigat, qui

* ii minus curiose interpretari
remotiores non paulo assiden-
tius Celsum diligenter not

Volo autem auctores omnes ita excu-
quomodo hic codex, & libri vulgo in
habent; de qua corrector, addi in margi-
& nota aliqua, sed semper varia ac mult
distingui, quæ communis sit textui, & corr
om: aut quod facilius sit, distinguere
alphabeti Græci aut Latini, & p. a b

Porro comodi videretur,
lectiones, quæ sunt in textu
corrigende, unam seu plures
alio & diuerso charactere pingi,
à toto: vel lineam ditioni cor-
rigenda, ut vel plures sub scribi-

HERBARVM ET REMEDIORVM, DE QVI-

BVS IN HISCE LIBRIS MEDICIS TRA-

CTATUR, PLENTISSIMVS INDEX.

Corrigendus, & nouis
alter accommodandus

In quo animaduertendum est, a primam, b alteram folij faciem denotare.

A Bdominis interiore parte rupta,
quo modo per manum curanda

53.b
 abortiui contraria 77.a
 abortiuorum consideratio 309.b
 abortiuo pellendo 223.b 231.a 234.a
 et b 235.a et b 237.b 240.b 241.a
 242.a et b 243.a et b 309.b
 abrotonum 224.b
 abrotoni vires 224.a 247.a
 absinthij genera 215.a
 absinthium 115.a
 absinthij nomina 220.a
 absinthij uirtutes 220.a 224.b
 absinthium rusticum 213.b
 abstinentia corporis uitio medetur 161.a
 abstinentia nimia mutilis 3.a
 abstinentia quis modus 9.a
 acalephe 225.b
 acetabulum 83.b 158.a 164.a
 acetii vires 167.b
 achamenis 217.a
 acharistum antidotum 115.b
 acharistu theodotii collyrium 93.b 98.a
 ἀχαιοῦ δ' ἑς 50.b
 achilleon 218.b
 acidis ructationibus 114.a
 acidule nomina et vires 232.b
 acolymbos 219.b
 aconiti sumpti remedia 153.a 23.b
 acopa 31.b acopon 215.b
 acororum et cerionum differentia 292.a
 acorum 115.b
 acorum syluaticum 218.b
 acori nomina et uirtutes 212.b
 acora quo curentur 238.b 244.a
 acria quæ 10.b
 acrochordonis medela 38.b
 adamantis 212.a adaminos 212.a
 adeps ursinus 122.a
 adianton 216.a et b 220.a
 adolescentia acutis morbis obnoxia 5.b
 adrachne 233.a
 adriani antidotum 116.a
 ægiloparum curatio 50.a 97.b 169.b
 231.a 244.a
 ager, si defecerit, quo resocillandus 232.a
 agri vires medico semper considerande
 12.b 85.b
 agris omnibus non eadem remedia prodes
 se 11.b
 ægrotantium signa q̄ bona, itemq; mala 6.b
 aleomalache 215.b
 amos 218.b
 equiseia 215.b

asculapius medicinam diffudit 158.b
 asculapius ob medicinā exultam in deo
 rum numerum relatus 1.9.a
 æstatis ardores quo modo releuadi 202.b
 æstatis diæta 4.a 159.b
 æstatis morbi 5.b
 ætates quæ quib; morbis obnoxie 5.a
 ætatum habenda ratio 3.b
 athotron 212.a
 agathos demon 2.9.b aglaophotis 217.b
 agni lingua herba 227.a
 agria acle 219.a agrifolium 218.a
 agrimonie nomina 214.b
 agrimonie uirtutes 97.a 214.b 248.b
 agriophyllon 219.b
 agrios staphtylinos 218.a
 aiithales 222.a
 aizoum herba 131.b 222.a 232.b 233.a
 alarum uitia 241.a
 alis foetentibus quid profit 111.a
 albucum 215.a
 alexandrinum emplastrum 30.a
 algæ marine uirtus 101.b
 algæ palustris 218.a
 alimenti boni consideratio 9.b
 alipos 220.b
 allium gallicum 110.b 114.b 217.a
 allij vires 203.a 226.a
 allij nomina 22.a
 allij succus 89.b
 allij tunnicula uirtus 101.b
 aloë gallica 213.b
 aloes species et uirtutes 246.b
 aloetis 213.b
 alopecia, id est humani capitis, barbaq;
 morbi medicina 40.a 91.a 166.a 202.
 b 203.a 204.a 237.b
 alphas uiriliginis species 39.b
 aluerum si potum 153.a
 althea 215.b
 altheæ vires 229.a
 alius cur ducenda 12.a
 alio laborantium nota 7.b
 alio tumentis foeminarum soluēda 204.b
 alium firmantia, sistentiaq; 4.a et b
 24.b 67.b 125.a 126.a et b 127.a et b
 128.a 149.a 157.a 177.b 202.a et b
 203.a et b 204.a et b 205.b 206.a
 et b 207.a et b 211.b 216.b 217.a 227.
 a 230.b 232.b 233.b 234.b 236.a et
 b 236.a 237.b 241.b 244.a 245.b
 alium mollientia, purgantiaq; 4.a 11.a
 107.b 110.a 131.a et b 150.a 201.b
 202.a et b 203.a et b 204.a et b 213.b
 214.b 217.b 218.b 222.b 224.b 229.b

233.a et b 235.a et b 236.b 237.a 240.
 b 242.a 243.a
 aluta 218.a
 amalocia 214.a amalusta 214.a
 amaranthos 220.b amaratum 215.a
 ambrosia 218.b 233.a 248.b
 ambrosiæ usus 248.b
 ambustorum remedia 36.b 69.b 155.a
 185.b 196.a 198.b 202.b 212.a 215.a
 220.a 227.a 229.b 232.b 233.b 244.a
 amerimnon 233.a amethyston 218.b
 amianthon 216.a
 amphora 158.a 163.b
 amygdaloides 220.b
 amygdalini olei uis 89.a
 amygdalorum uirtutes 207.a
 amyloblepharus, oculorum uitium 50.a
 anachallis 222.a anastorion 213.a
 anadendromalache 215.b
 analentidium 214.a
 anaspargos 218.b
 ἀνασπαργος 21.b
 anazethesis 217.a
 anchomanes 213.a
 andrachne 220.b 233.a
 andremas 220.b androgamos 218.a
 anemone 97.a 102.b 216.b
 anese 213.a anethum 115.b
 anethi medicina 89.a 204.a 221.a
 229.b
 angina laborantium uictus ratio sue die
 ta 268.b
 angine remedia 105.a et b 146.a 154.
 b 172.b 173.a 214.b 225.a 239.a
 anguiū italorū iclibus succurrendis 36.a
 anhelitus 269.b
 anhydros 216.b
 ani exasperatio 132.a
 ani condylomata ibid.
 ad Ani fissa utilis pastillus 30.b
 ani exitus 77.a
 ani fissura quo modo curade 102.a 132.
 a 155.b 239.a
 ani fistularum animaduersio 48.b 132.b
 ani porrigines 132.b
 ani tumor 132.a 155.b
 ani uittorum curatio 47.a 57.b 132.a
 et b 155.a 229.a 257.a
 ani ulcera 246.a ani uulnera 132.a
 animalia noxia quo fugentur 238.b
 animo labenti accommoda 203.b
 anni tempora obseruanda 3.b 4.a
 anni temporum consideratio 5.b
 anni totius diæta 84.b 159.b 211.a
 ἀνὰ δ' ὕμνα catapotia 32.a
 anodynon

anodynon medicamentum	121.b	arete epithema	116.a	aspideion	214.b	
anthemium	231.a	argenti spuma si pota	153.a	aspidis morsuum remedia	36.a 131.b	
anthera medicamentum	145.b	arguminos	218.a	201.b 213.a		
antheræ compositiones	45.a	argyros 218.a	aristeros	212.a	asplenon 216.a 220.a	
antheræ confectio	10.b 172.a	aristoli emplastrum	154.b	aster	217.a	
anthrax	227.a 230.a	aristolochiæ nomina & virtutes	213.b	asteries basiliscus	222.b	
anthraci utile emplastrum	92.b	aristolochiæ species	239.b	asterij nomina & medicinae	217.a	
anthracum curatio	235.b	aristonis malagma	28.b	asteriscon	217.a	
antiama	215.a	arithmetica non sit expers medicus	159.a	asteriope	216.a	
antidotorum consideratio	31.b	æqua collyrium	144.a	ædµa	21.a 224.b	
antiphysion lapis	89.a	armola	219.a	asthmaticorum remedia	231.b 269.b	
antirion	218.b	armoratie vires	204.b	304.b		
antueorimbefor	215.b	arion	211.b	astrorū ratio nō negligēda medico	159.b	
aperiendi vim habens malagma	28.b	arnoglossi nomina & virtutes	211.b	asula nomina & medicinae	216.b	
aperiendis ijs quæ secanda sunt	215.a	ævos	211.b	asuth	211.b	
aperiton	214.a	arquatū morbi curatio	18.b 113.b 148.b	asyntrophon	218.b	
aper ne examinent, & diffugiant	212.b	149.b 150.a 224.a 272.b		atra bilis remedium	148.a	
241.b		arsella	214.b	atriplicis medicinae	202.a 235.a	
aper qua herba delectentur	241.b	arsenachanthon	219.a	atrophiæ consideratio	268.a 273.b	
apum puncturæ quo curent	244.a	arthaphaxis 235.a	artemidion 217.b	304.a		
aphedros 216.a	apherefis 212.b	ægreus	213.a 224.a	attalum emplastrum	29.b	
aphlopho 218.a	aphrodes 216.b	artemisia	123.b	attonitorum curatio	18.b	
aphrodisias 212.b	aphroditeloter 214.a	artemisia à quo inuenta	223.b	aturion	217.a	
aphryssan 213.a	æpδau ulcera 45.a	artemisia herbarū mater cur dicta	224.a	auditus	161.b	
apiana 214.a	apiastellum	artemisia nomina	213.a	auellandarum vires	136.b 207.a	
apisi	218.a	artemisia virtutes	213.a 223.b	auginon	212.a	
apium rusticum	212.b	artemonia	214.b	augusti dieta	162.b	
apium sylvaticum	222.a	arteria aspera, dura	19.b	aulitica	214.a	
apij nomina	221.b 228.b	arteriarum morbi remedia	104.a 105.a	auris, si intrinsecus cancerauerit, medica-		
apij vires	201.b 221.b 228.b 248.a	203.a		men	98.b	
apogorisapo	215.a	arteria eruptio	110.b	aurem animalia ingredientia quo extra-		
apollinaris virtutes	212.a 214.a	arteriæ fluor	146.b	hantur	44.b 100.a 166.b	
apollo medicine inuentor	158.b	arterie tumor	104.a 146.b	aurem si aqua introierit	99.b 100.a	
apoplexie cura	19.a	arteriaces compositio	32.b	166.b 167.a 218.b		
apoplexie consideratio	300.a	artes omnes à Grecis aut inuenta, aut ex-		in Aure si caro increuerit	100.a	
apostemata habetium signa letalia	162.b	culte	81.a	aurium compressis foraminibus, quo mo-		
apostemata interiora	196.b exteriora	athenippum collyrium	144.a	do succurrendum	44.a	
19.a		arthezostis	217.b	aurium male affectarum medele	30.b	
apostematū purgatio	117.a 133.b 197.b	arthriti utilia emplastra	28.b 92.b	43.b 66.a 98.a 143.a 144.b 166.b		
222.a 229.a		articuli luxati	137.a	167.a 201.b 202.a 203.a & b 204.a		
apostematis utile emplastrum	92.b	articulorum condylomata	135.b	212.b 213.b 218.b 219.a 220.a 222.b		
apotelesmatis consideratio	265.a	articulorum fractura	135.b	226.a 227.a & b 229.b 230.b 236.b		
apprehensionis consideratio	262.b	articulorum incisorum curatio	195.b	238.b 239.a 240.a 241.a 242.b 243.b		
apri stercus	121.a	articulorū suppuratio quo sedanda	111.b	244.a & b 246.a 261.b 292.b		
apri urine virtus	98.b	articulorum vitia in iuuenibus quo modo		aurium doloris consideratio	261.b	
aprilis dieta	162.b apruco	curentur	8.b	aurium doloribus laborantium dieta		
apuleij Celsi antidotus	152.a	articulorum morbi remedia	25.b 34.b	208.a		
aquæ frigide usus	4.b	111.a 113.a 121.b 122.a 133.a 135.b		aurium exulceratio	100.a 144.b	
aquæ marina	164.a	137.a 139.b 148.a 157.a 188.b 195.b		aurium foetoris medele	167.a	
aqualiculi aciditates	115.b	204.b 205.a 214.a 218.a 219.b		aurium fractarum curatio	61.a 166.b	
aqualiculi confirmatio	115.a	225.b 227.b 241.b 243.a 307.a & b		aurium morbi, qui manu & scalpello		
aquilonis incommoda & morbi	5.b	artiecon	211.b	curantur	51.b	
arabes medici ex omnibus scholis explo-		arundines corpori infixæ	135.a	aurium punctiones	167.a	
dendi	81.a	as	158.a	aurium sonitū intra seipsas sedantia	44.a	
aracanthillidam	218.b	asari nomina & virtutes	240.b	166.b 225.a 239.a 246.b		
arana	105.b	æstictus, hydropis species	17.a 192.b	aurium surdarum medicinae	28.a 44.a	
aranei ictus curatio	36.a 69.a 205.a	asclepias herba	213.a	99.b 102.a 116.b 166.b 167.b 201.b		
212.a 241.b		asclepion	222.a	219.b 220.a 225.a 232.b 243.a		
arareza 213.b	arathy	asclepiu diadema	220.b	auriū tumores	102.a 144.b 166.b 203.a	
ex Arbore delapsis	113.a 148.a	asine stercoris efficacia	101.a	aurium vermiculos necantia	44.a 100.a	
arborria	220.a	asparagi vires	204.b	167.a 203.b 232.b		
archagathi emplastrum	30.b	asparagi agrestis nomina et virt.	218.b	auriū vitia repentina & inueterata	167.a	
arctophyllon	220.b	asphaltion 213.b	asphæt	213.b	aurium vulnere intrinseca	98.a 167.a
arearum genera, & curationes	40.a	asphodeli nomina & medicinae	215.a	205.b		

in Auribus curia quo modo facienda	51.b	botrocy nomina & vires	212.b	calefacientia que	4.a 10.b 11.a
51.b		brachiorum doloribus	62.b 173.b	calefacientia que sunt in stomacho grania	110.a
auris purulenta sanantia	99.b 102.a	branchus	165.b	calliblepharon collyrium	96.b 98.a
105.a 144.b 167.a 203.b 225.a		brassica succus	89.b	calliomarcus herba	109.b
auriginis consideratio	272.b	brassica vires	104.b 204.a 237.b	callipetalos	212.a
auriginis morbi remedia	113.b 118.a	brassica canina rustica	222.a	callirichi nomina & vires	216.a
125.b 148.b 202.a 212.a 215.a 224.a		brassica erratica	101.a	callus si quando in articulis increuit, utile	29.a
a. vide ictericorum remedia		brassica syluatica nomina & medicina	222.a	malagma	29.a
austeralis	220.b			callorum corporis remedia	135.b 199.b
austri incommoda & morbi	4.b	brathis	218.b	calor	85.a
autogenes	216.b	bratheos	230.a	caloris incommoda	5.b
autumni dieta	4.b 159.b	bricumum herba	123.b	calorum feruorumq; remedia	235.b
autumni morbi	5.b	britannia, britannica	214.b	calox cordiatis	214.a
axungia quid	227.b	britannica herba usus	112.a 131.b 222.b	caluarie descriptio	18.b
azirgozol	217.b	brucanon	218.b	caluarie lese curatio	60.a
Bacchion	215.a	brumatia	212.b	camelicos	212.a
bacina	214.a	bryonia nomina & vires	217.b	cameli fel	95.a
βακχίων	205.b	bryos agria	214.b	camimela	231.a
ballis	221.a	bubalion	221.a	camomille nomina & vires	231.a
balneorum usus	9.b	bubonion	217.a	cancer in mammillis	176.b
balsamum	110.a	buglosse nomina	215.b 237.a	cancris consideratio	34.a
barbam nutriencia	91.b	buglosse vires	215.b 237.a	cancris curatio	31.b 36.b 77.b 90.b
barba Iouis	232.b	bulbi scillatici nomina & vires	215.b	102.a 146.a 148.a 196.a & b 205.a	
barbara emplastrum	29.a 154.b	bulbus uomitorius	216.b	212.a 214.a & b 215.a 225.b 242.b	
barbaricum medicamen	96.a	bunion	217.b	244.b 245.a	
baryton	218.b	buphagos antidotus	130.a	cancris in cole orti remedium	46.b
basilice nomina & medicina	222.a	buphthalmos	222.a 233.a	cancris oculi in medicina usus	94.a
basilice	216.b	buprestim si quis sumpserit	153.b	cancro excisa vesica orto quo modo suc-	
basilicon emplastrum	29.a 154.b	bustasteoscardia	213.a	currendum	57.a
basiliscorum genera	222.a	butzrutis	222.a	canis cerebrum herba	218.b
bathypicron	220.a	Caballation	219.b	canini raptus consideratio	261.b
batos, batosdea	218.b	caballini dentis usus	134.b	canis rabidi morsus remedia	25.b 92.b
batrachion	212.b	caballini stercoris vires	101.a	155.a 157.b 300.b 203.a & b 204.a	
bechion	220.a	cacabon	218.a	207.a 211.b 212.a 215.a 216.a 219.	
belion	217.a	caualia	212.b	4223.a 225.b 227.a 232.a 236.a	
bellicocandium	218.b	cachexias consideratio	273.a	341.a & b	
bellinuntia	212.a	καχεξία, tabis species	17.b	capillus Veneris	216.a
beloiacos	217.b	κακονήες	36.b	cannabi seminis succus	98.b
belotocos	ibid.	caducis que accommoda	239.b	cannabis nomina & vires	221.b
beneolens	214.a	caduco morbo laborantium remedia	18.a	cantharides pote ne noceat	36.a 153.b
bes	158.a	110.a 112.b 115.b 143.a 148.a 190.a		capillum flauum quid faciat	79.b
besta	219.a	207.a 217.a 224.a 227.a 239.a & b		capilli ne canescant	91.b
beta vires	202.b	241.b 245.a		capilli quo uario colore inficiuntur	65.b
beta plantaginis	214.b	cadus	163.b	166.a 216.a	
beta nigre usus	89.a 90.a	caparie curatio	134.a	capillorum crispatio	79.b 91.b
betilole	215.a	καπαρία	203.b	in Capillorum fluoribus que uictus ratio	207.b
betonica nomina	222.b 229.b	calaminthe	219.a 231.a	obseruanda	207.b
betonica vires	222.b 229.b 248.b	calculus in vesica comminuentia, & per		capillorum fluētium utilia remedia	39.b
bibendi cupiditatem pronocantia	203.a	urinā expellētia	67.b 77.a 115.b 122.b	65.b 91.a & b 202.b 207.a 225.b	
bibo	214.b	123.a 124.a et b 151.a 160.b 187.a et		235.b 237.b 246.b 291.b 292.a	
bilis atra quo modo à Cicerone dicatur	258.a	b 203.a & b 204.b 206.a 207.a 212.		capillorum post agnitudinem instauratio	201.b 204.a & b 291.b
258.a		a 219.a & b 220.a 223.a & b 229.		capillos denigrantia	91.b 225.a 234.b
bilis morborum mater	85.a	b 231.a 235.a 237.a 241.a 243.b		291.a	
bilem detrahentia	131.a & b 182.a	244.b		capillos nutriencia	79.b 236.b
201.b		calculo emulso que curatio adhibenda		capillos quid aureos reddat	79.b
bilium quatuor genera	163.a	56.b		capnos herba	97.b
blechon	219.a	calculo cum urina expellendo utilis pastil-		caprifici arboris cortex	120.b
bliti vires	202.b	lus	31.a	caprinum stercus	94.b
bluthagio herba	100.b	calculi foeminarum qua ratione tollendi		caprini casei uirtus	94.a
bolbos	216.b	56.b		caprini fellis vires	167.b
bolus ferron	220.a	calculorum uel arenosorum, uel mollium		cappara	220.b
boopes	220.b	signa	56.a	caput	19.b
boragi nomina & medicina	241.b	è Calculo laborantibus que adhibenda			
bostrychites lapis	95.a	55.b 243.b			

I N D E X.

caput quibus vitis obnoxium	160.a	carisfelotiar	213.a	chameactle herba	92.a
caput si a sole doleat	164.b	caryites	210.b	chamedaphne	217.a
capitis dolore laborantium animaduersio	7.b 249.b	casei ne putrescant	241.a	chamedaphnes nomina & vires	214.a
capitis male affecti indicia	84.b.85.	casij medici collice	32.b	chamedrys	110.a
capitis male affecti signum letale	162.a	catacaustice	212.b	chamedryos nomina & medicina	214.a
capitis doloris remedia	4.b 20.a 65.b	cataplepeos consideratio	262.b	camelea nomina & vires	214.a
112.b 116.b 143.a 147.b 148.a 154.b		cataplastaton xeron	196.b	chameleon	221.a
160.a 164.b 167.b 201.b 202.b 203.a		catapotia	32.a	chameleontis fel	94.b
& b 204.a 205.a 206.a 207.a 211.b		catarrhi consideratio	263.a	chamelepodium	216.a
212.a 213.b 216.b 218.b 219.a 220.a		catarrhi restrictio	91.a 164.b 207.a	chamemili nomina & vires	214.a
221.b 226.a 227.b 229.b 236.b 237.b		242.b 245.b 303.a		chamemilon	213.b
238.b 239.a 343.b		catarrho laborantium diata	208.a	chamepitryos nomina	214.b
caput ex frigore infirmum	164.b	catarrho laborantibus q̄ accommoda	240.b	chamepitryos herba usus	131.b 214.b
capitis doloribus subitis sanandis conducēs		κατασχυμοι	20.b	chamarops	214.a
remedium	87.b	Catonis antidotum	204.b	chamaface	219.a
capitis ardores refrigerantia	233.b	cathotis	217.a	characias	120.b
capitis de percussione dolentis uictus ratio	207.b	cauliculi vires	204.a	charta ne a muribus corrodat̄ur	225.a
capitis ex epate infirmū quæ diata	207.b	caulis purpureus	117.b	1.a	
capitis fractura	29.b 216.a 222.b 229.b	caulis nomina & medicina	237.b	chelidonia	94.a
cap. ex frigore male affecti medela	89.a	causarum tempora siue latitudines	161.b	chelidomion	217.b
capitis humores purgatiā	84.b 89.a 92.a	causon	233.a	chelidoniæ vires	242.a
143.a 165.b 169.b 204.a 235.a 338.a		caustice	212.b	χάμν	84.4
capitis in febris dolor	14.b	cecabon	214.a	cheme	83.b
capitis luxati curatio	63.b	cedrus	111.b	chersydri ictus cura	36.a
capitis macula	65.b	centaurea	113.b 115.a 219.b	chiliophyllon	213.b 218.b
cap. perfrictioes quo pacto resoluēda	92.a	centaureæ species	242.a	chironias	215.a
capitis fissura	58.b	cētaurea maioris nomina et vires	215.a	chironion	213.b
capitis uertiginis remedia	89.b	centaureæ minoris nomina & uirtutes		chironium ulcus	37.a
capiti conueniens emplastrum	29.b	215.a		chironia vulnera	214.a
capiti ne æstus obsit	219.b 220.a	centaurea minoris succus	95.a	chiragra animaduersio	7.b
caput deplentia	214.a	centaurea unde nomen adeptæ	215.a	chiragra remedia	139.b 218.a
capitis ulcera manātia	90.a 165.b 202.b	ceparum vires	204.a	chirysion	211.b
203.a 221.b 225.a 227.b 235.b 239.a		cephalea	249.b	chirurgi ætas, & officium	47.b
caragogos	214.b	cephalargie remedia	165.b	chirurgica a quibus exulta	47.b
carbunculi in cole medicamentum	46.b	cephalicum emplastrum	29.b	chirurgica medicina pars	ibid.
carbunculus lapis	97.b	cepos aphrodites	215.b	choacon emplastrum	29.a
carbunculi consideratio, eiusdemq; cura=		κεράειον	84.a	χοιρίκιον	59.b
tio 36.b 68.b 92.b 154.b 193.a 202.b		ceras	218.a	χοϊνίς	84.a
218.b 223.a		cerasorum consideratio & vires	206.b	choenix	83.b
carcinethron	213.b	κεράτιον	84.a	cholera fulua	163.a
carcinodis leniendis malagma	28.b	cerastis ictus curatio	36.a	cholera nigra	161.b 163.a 232.a
carcinomatis curatio . uide supra cancri		cerebri constrictiones quo modo resoluē=		cholera nigra autumnali tempore crescit	
curatio		da	92.a	159.b	
cardaminaca	214.a	cerebri malè affecti remedium	89.a	cholera pleumatica	163.a
cardamon	214.a	cerebri membrana detecta quo modo suc=		cholera rubea	161.a & b 163.a
cardiacorum remedia	16.b 192.a 218.b	currendum	154.b	cholera rubea æstiuo tempore nutritur	
219.a 237.a 301.a		cerebri purgatio	65.b	159.b	
cardiacis quæ uictus ratio tenenda	209.a	cerebri percussi signa	33.a	cholera rubea curatio	237.a 239.a
carduus cur a foeminis ambitur	203.a	κερατοειδές	50.b	cholera rubea dominium in dextro latere	
carduus uaria, lactea, nigra	221.a	cerefolij nomina	220.b	cholera rubea in sinistro	ibid.
cardui vires	203.a	cerefolij in medicinis usus	205.a 220.b	cholera è plenitudine si nimius uomitus	
cardui syluatici nomina et vires.	221.a	235.a 248.a		existat quæ diata	209.a
carnis superflue consideratio	290.a	καίσα ulcera	202.b	cholera laborantibus quæ offerēda	202.b
carni supererescenti coercenda & amoue		cerionum et acovarum differentia	292.a	cholericorum malè affectorum signa leta	
de utilia medicamenta	30.a 31.a 156.a 196.b	κεκιδ& descriptio	59.a	lia	162.b
carni putri arcenda, & exedenda, ne la=		ceroti chalaistici confectio, & usus	121.b	cholericorum remedia	23.b 66.b 107.b
tius serpat, compositiones	31.a	ceruix in posteriorem partē reflexa	156.b	128.b 131.b 147.b 157.a 182.a 238.b	
caroteten xeron	196.b	ceruicis uitiolorum per manū curatio	52.b	240.a 243.a 301.a	
carpago	220.b	ceruicis remedia	20.b 111.a 173.a	chora	212.b
carpophyllon	217.a	ceruicis rigor	66.b 111.a	χόρδα& morbus	23.b
carroga	215.b	ceruicis tumor	111.a	χοροειδές	50.b
		cerussa sumpta ne obsit	36.a 153.a	chorys	212.b
		cestron	222.b 229.b	χόρς	84.a
		chalazia palpebrarum quō curētur	49.b	chrysanthemom	213.a

chryseos basiliscus	222.b	collyria coposita lenia	143.b acria	144.a	corpus exedentia	26.b
chrysippi malagma	28.b	collyriorū confectiones	40.a 97.b	164.a	corpus extenuantia	3.b
chrysiceptron	221.a	collyris	215.b		corpus humectantia	4.a
chrysitis	218.a & b	colocynthidos usus	131.a		corpus quæ adurant	26.b
chrysocalis	214.a	colorem uultui gratum præstantia	116.b		corpus quæ repleant	3.b
chrysocanthos	221.b	204.a 236.b 240.b 245.b			corporis salubritatem præstantia	190.a
chrysocephalus basiliscus	222.b	colubri morsui	219.a		corporis ratio	161.a
chrysothales	233.a	colubrina nomina & uires	242.b		corpus siccantia	4.a
cibi conditi cur obfint	3.a	columbina	212.a 217.b		corporum diuersitas obseruanda	3.b
cibi reiectioni abstinenda	67.a	columbrum	213.a		corui finis	103.b
ciborum materia	9.b	combustis sanandis. uide Ambust. remed.			corruda	218.b
cicatrix quo pacto uulnere inducenda, purgandaq;	31.b 35.a 154.b 156.a 213.a & b 233.b	comites	220.b		corui marini fel	97.a
cicatrices ne appareant	112.a	comitalis herba	213.b		coryza	165.b
cicatricibus qui color reddendus	200.a 231.b	comitali morbo correptorum remedia			κορυζα	20.b
cicer rusticum	214.a 220.a	18.a 110.a 112.b 115.b 116.b 143.a			cosmiana antidotus	129.a
cicer columbinum	220.b	148.a 190.a 207.a 217.a 224.a 227.a 239.a & b 241.b 242.b 245.a			costarum descriptio	59.a
ciconie pullus elixatus	94.a	complexius introducendi modus	158.b		costarum male affectarū remedia	239.a
cicoratum	221.a	conceptionis consideratio	162.a 309.a		costarum fracturis sanandis	186.b 61.b
cicuta ne obfit hausta	152.b 225.a	conceptionis impedimenta & remedia			costi species & uirtutes	246.a
ciminalis	213.b 216.b	73.a 68.a			coronea mala	224.b
cinnami species & uirtutes	245.b	conceptioni contraria	205.b 241.a		coryla	83.b 163.b
circinus	198.b	concoctionem iuuantia. uide digestionem			coryledi nomina & uires	215.b
cissarion	220.a	concupitus habenda ratio	3.a		κορυλλα	84.a
cission	220.a	concupitum naturalibus foeminarum nō admittentibus, qui subueniendum	57.a		corylus	83.b
cissionecion	220.a	conditi cibi cur inutiles	3.a		coxarum scabies quo pacto curanda	77.b
cissos	221.b	condituras suasuere reddentia	202.b		coxendicum morbi remedia	25.b 115.a
cissos melas	220.a	condylomatum remedia	47.a 58.a 155.b 185.b 205.b 216.a 218.b 229.b		121.b 122.a 183.b 189.a 204.a 213.a 219.b 224.b 227.b 231.a 235.b 237.a 238.a & b 240.a & b 242.a 246.a 307.b	
clauus Veneris	218.a	congius	158.a 163.b		crambe	222.a
clauorū medela	38.b 135.b 199.b 235.a	conila	222.a 217.a		crapulam inhibentia, tollentiaq;	239.a
clibadion	218.a	conuulsiōum membrorum remedia	121.b		creobula	219.a
clefypontis malagma	28.b	138.b 154.b 157.b 205.a			creta cimolia	101.b
clorozphin	212.b	conuulsiōum medela	109.b 111.a 113.b		cretice	215.b 217.b
clyster	228.a	114.a 217.a 229.a			crinon	220.b
cneoron	214.a	conserua	222.a		crinopodionton	213.b
cnopodion	213.b	consolida maioris nomina & medicina			crisij uirtus	218.a
cobios	220.b	217.a			crisja gallinacea	212.a 217.b
coccus gnidios	221.a	corco saluberrimum remedium	117.b		cribe palpebrarum tuberculum	49.b
cochlearium	83.b 163.b 164.a	corcodrillion	213.a 214.a		crocodilus terrenus	122.a
coeliacorum consideratio	277.a	cordis descriptio	19.b		cruditatis causa	7.a
coeliacorum remedia	23.b 125.a & b 126.b 129.a 147.b 149.a 154.b 182.a 205.b 206.a 207.a	cordis male affecti remedia	116.a 117.b 178.a 219.b 222.b 242.a		cruditati discutienda	114.a 115.b 116.b 117.a 205.a 214.a
colica passionis consideratio	280.a	cordis percussi signa	33.a		cruris descriptio	59.b
in Coli passione quæ uictus ratio tenenda	210.a & b	cordis pulsus	117.b 178.a		crurum ulceribus accommoda	135.a
colicorum querelis qua ratione succurrendū	4.b 67.b 116.a 129.a 184.a 204.b 207.a 216.b 222.b 225.b 234.b 245.b 300.b	coriandrum si datum	153.a		cruribus fractis sanandis utilia	62.b 63.a
coli inflationibus	129.a 133.a 148.b 149.a 157.a 201.b	coriandri nomina	220.b		crustis	105.a
κολλων medicamentum	24.a	coriandri medicine	202.a 220.b 235.b		crystas uirtutes	216.b
κολλων morbus	23.b	corion	220.b		crystanthemion	231.a
colis morbi quo modo curandi	46.a	corneliana cataportia	204.b		crystometas	220.a
colis glandi tegenda, si nuda est	55.a	cornelij Celsi laus	81.b		κρυσαλλοειδης	50.b
collectiones ne suppurent	207.b	cornicis cerebri uis	89.a		cubiti descriptio	59.a
collectionū remedia	197.a 200.a 202.a 215.b 249.a	corpus ex quatuor constat humoribus			cubiti luxati curatio	64.a
colletis	212.a	159.b			cubiti uitijs & doloribus utilia	111.b
collice Casij medici	32.b	corpus habillissimum	5.b		173.b	
collyria diuersa ad oculorū dolores	92.b	corporis humani quadripartita diuisio	84.a		cucumis anguinus, syluaticus	221.a
		corporis humani positus & figura	19.b 58.b		cucumeris anguini radix	131.a
		corporis integritas ex urina deprehendenda	3.a		cucumeris nomina	221.a
		corpus erodentia quæ	11.a		cucumeris uirtutes	94.b 203.a 221.a
		corporis noxarum quinque genera	32.b		cucurbitæ usus	202.a 247.b
					cucurbitæ syluatica in medicinis usus	131.a
					culices qui sugentur	225.a

cultura initium	246.b	denterobon	220.b	dicomeneon	217.b
cunila	234.a	dentificij compositiones	145.b	dictamni emplastri confectio	92.a eius-
curationis tempus quod opportunissimum	33.a	dentificia diuersa	103.b 171.a 239.b	demq; usus	92.b
cunila Gallica	222.a	dens si cauus sit	103.a 171.a et b	dictamni nomina et vires	217.b
cupressi radix	89.b	dentes extrahentia	204.b	didaxagria	214.b
curitis	212.a	dentium consideratio	162.a	dielectru trociscus	109.b
cussimezata	221.a	dentium descriptio	58.b	dielia	212.a
curriculo excussis, et tractis, presentanea remedia	113.a 148.a	dentium cruciatus remedia	44.b 66.a	dierum consideratio	12.b
cutis uitij propellendis que conferat	66.a	78.a 102.a 117.a 143.a 145.b 147.b		digerendis is que coeunt, malagma	27.b
cutem purgantia, nitidamq; prastantia	27.a 202.b 230.a	70.b 175.b 202.a et b 204.a et b 206.b 212.b 214.b 218.b 219.a et b 222.b 227.a 233.b 235.b 236.b 237.b 238.a et b 241.b 242.a 243.a 244.a 262.a		digestioni utile catapotium	32.a
cutem urentia	237.a	dentium candor quo modo fiat	79.a 103.b	digestionem iuuantia	115.a et b 130.a 177.b 202.b 203.b 204.a et b 206.a 223.a 227.b 229.b 230.a 234.b 236.a 237.b 244.b 245.b
cyathus	83.b 84.a 158.a 163.b 164.a	171.a et b		digitus Veneris	218.a
cydon	213.b	dentium confirmatio	78.a 102.b 145.b	digito fracto sanado quid conferat	63.a
cydonia mala	224.b	171.a		digitorum coherentium diductio	58.a
cydoniorum consideratio	206.a vires ibid.	dentium humor	171.a	digitorum rhagadia	297.b
cydonitis confectio	127.b	dentium molarium dolor	171.b	digitorum luxatorum curatio	64.b
cyline	213.b	dentium rheuma	171.a	digitorum suppurationi sedanda	111.b
cymbalitis herba	105.b	dentium stupor	233.a	digitorum ulceribus curandis	47.a
cymini vires	245.b	dentium tumor	103.a	diglosson	217.a
cynanchon	222.a	dentium usus	162.a	dimoron	219.a
cynici spasmi curatio	20.a 113.a 148.a	dentium uitij manu aut ferro succurren	52.a	dimipula	218.a
156.b 261.b		dis	214.b	diocydon medicamentum	203.a
cynocardamon	214.a	dentibus laxatis accomoda	170.b 171.a	diodela	218.b
cynocephali nomina et vires	218.b	dentibus, uel strigis inquietatis infantibus	69.b	dionysi emplastrum	155.a
cynogale	213.b	dentitioni infantium que conferant	171.b	dionysianum collyrium	96.a
cynoglossa	216.b	dentricis tithymalis	220.b	diosatis	212.a
cynoglossae nomina et vires	219.b	destillationis remedia	4.b 20.b 113.b	dioscyamos	212.a
cynoglosson	211.b	203.a 207.a		dioxus collyrium	98.a
cynomazon, cynozolon	221.a	deunx	158.a	diphyes	216.a
cynobatos	218.b	denoti resolutio	212.b 218.b	dipsacos	217.b
cynosorchis	213.b	dexij malagma	29.a	dipse ictus quo modo curetur	36.a
cyparissias	220.b	dextans	158.a	dipsasa	214.a
cyparissos	212.a	diachasma	21.b	diuersitas corporum probe considerata	3.b
cypressus nigra	214.b	diacadmias emplastrum	156.a	discipline omnes a Grecis aut inueta, aut exculta	81.a
cyradarum curatio	197.b	diacalaminthes antidotus	203.b	discutiendis is que in aliqua corporis parte coierunt	26.b
cyssophyllon	213.b	diacissu acopi descriptio	140.b	diuisibilis introducendi ratio	158.b
cytrei vires	206.a	diadaphnidon emplastrum	29.b	dochela	214.b
cytisi descriptio, eiusdemq; vires	121.b	dieta uniuersalis	211.a	dochlea	218.a
Demonia quo fugentur	213.b 239.b	diaglaucium collyrium	93.a 143.b	dodecatheon medicamentum	125.b
damasinos	214.b	diarthron	1.a	dodrans	158.a
danae	217.a	dialibanos collyrium	97.b	dolori subitaneo curando	69.a
daphne	214.b	dialepidos collyrium	97.b	doloribus leuandis utile catapotium	32.a
daphne Alexandrina	217.a	dialibanum collyrium	98.a	dorcadion	213.a
daphne minthyos	ibid.	dialion	216.a	dorcidion	217.b
daphne Samothracia	ibid.	dialoes collyrium	98.a	dorigenion	214.a
daphnites	214.b 217.a	dialon emplastrum	155.a	dorycnio lasi	153.b
daphnoides	217.a	diamygdalon medicamentum	207.a	drachma	83.b 163.b 164.a
dardana	215.a	diameron confectio	172.b	dracontea nomina et vires	213.a
dardanon	213.b	diamisfos collyrium	97.b	deoxontrion	242.b
decembris dieta	163.a	diapaganon	201.b	dracontium	101.a
deiectionis subita nota	7.b	diaphoreticorum cura	301.a	drocida	212.a
deiectioni utilia	147.b	diaphyselaen compositio	138.b	drycolaphon	214.a
definitiuus introducendi modus	158.b	diaporicum collyrium	93.a	dryis	214.a
denarius	27.a 83.b	diasmyrnes collyrium	98.a 144.a	drysites	214.a
dendroides	220.b	diastaton medicamentum	111.a	ducone	119.a
dendrys	221.a	diatessaron xeron	196.b	duella	158.a
dentaria	212.a 218.a	diaula	219.b	durities si qua in corpore fuerit	202.a
		dicea	214.a	203.b 211.b 215.a 216.a 226.a 230.b 235.a 236.b 243.a	

dyseretia 24. a
dyseretia consideratio 227. a 230. a
dysereticorum diata 209. b
dysereticorum remedia 67. b 77. a 115. b 116. a 126. a 127. a 182. b 184. a 202. a 204. b 205. a 206. a 207. a 211. b 213. b 216. b 218. a 227. a 229. a 241. b 244. b 306. b
dysereticorum signa letalia 162. b
dysereticis quæ accommoda 203. a
dyseretia 21. a 22. a
Eboice 219. a
ebrietas ne uinum comitetur 223. b
ebrietas quo modo non sentiat 238. a
ebrietate discutientia 203. b 207. a 230. b
ebulum 219. a
ebulus herba 92. a
eccausi 113. a
echidnos 212. b
ectropium 50. b
εχχάρτις tuberculum 49. b
εχχάρτις 32. a
edumna 206. a
effectionibus utilia 126. b
ελειφάντις morbus 23. b
ελειφάντις morbi 158. b
ελειφάντις pus 33. b
elardia 213. b
elaterion 221. a
elaterij usus 131. a
elbunian 217. b
eldia 217. b
elebati 218. a
elementa quatuor corporis, eorundemque
uirtutes 161. b
elelephacos 220. a 234. b
elephantiasis consideratio 276. a
elephantia morbi curatio 18. b 66. a 131. b 190. a 204. b 215. a 219. a 231. a 232. a 298. a
elephanticum emplastrum 30. a
elisione 218. a
elinium 240. b
elitis 218. a
elleborites 215. a
ελεβορίτης 84. a
elna 240. b
embryo quo modo singulis mensibus sese
gerat, et absoluat 162. a
emenypse 217. b
emericos 215. a
emeticos 216. b
eminion 213. a
emionon 219. b
emmanes 212. a
emollientia corpus quæ 4. b
εμπακοῦ medici 1. a
emplastra 27. a 154. a
εμψιον emplastrum 30. a
εμψιονότορον 20. b
empton 216. b
empyricus conducens emplastrum 92. b
empyricorum, id est puruleta excreatum,
remedia 109. b 304. a

encathismatibus quid conferat 215. b
εναγμα emplastra 29. a
εναγμα emplastrum 29. b
entaticon 213. b
enula rustica 217. a
επαικτος morbus 23. a
epheledi tollenda quid conferat 45. a
ephemerum si sumptum 153. b
ephesia 213. a
ephestion 213. b
ephialtes 252. a
ephimeros 217. b
epilepsia in quo differat a scotomatica pas
sione 251. b
epilepsie consideratio 252. a
epilepticorum curatio 112. b 117. a 143. a 147. a 192. a 217. a 227. a 251. b 302. a
epilepticorum diata 208. a
epispasticum emplastrum 155. a
equi ungula herba 109. b
eradium 205. a
erigarus herba 101. a
erigeron 241. b
erinacei carnis usus 124. a
eriphion 219. a
erisiceptron 112. a
erithales 233. a
erithon 213. b
erodentia corpus quæ 11. a
εργασίον emplastrum 37. a
eruca cur 152. a dicta 202. b 236. a
eruca usus 134. a 202. b 236. a
erusei nomina et vires 218. b
eryphij uirtus 222. a
erythrodanus herba 117. b
ερυθροδανός 34. b 35. a 227. a
escharis utile emplastrum 92. b
esculentorum proprietates et materia 9. b
ethui 216. b
eugubis 214. b
euisum 219. a
ευσμύς collyrium 144. a
eupatorion 216. b
eupelios 217. a
eupetalon 217. a
eupolis 221. a
euthylei malagma 28. b
εὐθυλεῖα pustula 39. a
exanthematum curatio 112. a 231. a
excretionibus cruentis emendandis 108. b 109. a 205. a
exedens corpus emplastrum 30. a
exercitia quæ prosunt 3. a
extenuantia corpus quæ 3. b
extractorium emplastrum 29. b 30. a
extrahende materie aptum malagma 27. b
eximendis iis quæ corpori infixæ sunt 135. a 100. b
extrahendis iis quæ ex partu aut aborsu
noctua intrinsecus substerunt 114. a
exupera 217. b
Faba Aegyptiaca 163. b
faba Græca ibid.

faba Latina ibid.
faba lupina 212. a
faba uirtus 96. b
facies quomodo ulceribus purganda 166. b
faciei albicande remedium 78. b
faciei inflatio 79. b
faciei liuoribus abolendis quæ conueniant 112. a
faciei uitijs propellendis 66. a
faciei quo modo rubor inducendus 78. b
fagi folia 101. b
faredines ulcera 196. a
fastidium si fiat de calore nimio quæ uictus
ratio obseruanda 208. a si de glutinosi
et pinguibibus ibid. si de calida di
stemperantia 209. a
fastidium pellentia 206. b
fastidio laborantibus foeminis pregnantibus
quid adhibendum 206. a
fastidio cibi agris amouendo 223. a 245. a
faucium asperitatem ex uomitu contra
etiam quid emendet 4. a
faucium sanguine repletarum nota 7. b
faucium morbi, eorundemque curatio 21. a
92. b 105. b 106. b 116. b 131. a 172. a
204. a 218. a
faucium duritiam quæ auferunt 104. b
faucium suppuratio 146. a
faucium tumentium medela 104. a 138. a
171. b 172. b 146. a 203. a 206. a
236. a 238. b
faucium iustura 172. a
faucium uulnera 17. a
faucibus male affectis quæ obseruanda
diata 208. b
faucibus limpidandis quæ conferant 172. a
210. b
faucibus utilia 237. a
faucibus si quid inhaerit, quo modo ex
trahendum 107. b
febricitantium diata 12. a
febricitantibus quando cibis, potusque dan
das 13. a
febricula instantis signum 7. b
febricentium acute signa letalia 162. b
febris periodica 191. a 237. b
februm genera 12. a
febris liberatus quando tuto lauet 9. b
februm ardorem restrictio 191. a 202. a
204. b 207. b
februm pestilentium curatio 14. a
februm remedia 12. a 13. a 69. a 115. b
131. b 191. a 203. b 213. a 215. a
210. b 221. a 223. a 224. a 227. a 228. a
230. a 231. a 233. a 237. b 239. b
245. a 246. a 298. b
febris acutis quæ accommoda 131. a
213. b
febrisfugia 215. a
febricarij diata 163. a
fel terra 215. a
fellis descriptio 19. b
fellis uisum utilitas 110. a
felenon agrion 212. b
felicina

I N D E X.

felicina	218.b	gangraene praefatio	58.a	Hama Ammones	219.b
femoris descriptio	59.b	gargiada	218.a	hama areos	220.b 221.b
femoris fracti curatio	62.b 63.a 64.b	gargarizationes quibus fieri debeant	31.b	hama Athenas	214.b
feria	217.b	gariophylli uirtutes	245.b	hamacronu	213.a
feruorum, calorumq; remedia	233.b	geniculorum doloribus	189.a	hamagates	217.a & b
ficorum uirtutes	206.b	genis scabris remedium	112.a	hamaheracleos	215.a
ficorum in locis uerecundioribus curatio	132.b	genitalium uitijs curandis	204.b	hama hermu	212.b
		genitalium morbi remedia	232.b	hama ibeos	218.b
finus columbinus	122.b	geniture abundantia laborantibus	202.b	hamanthropu	213.a
fistularum consideratio	38.a 217.a	gentiane nomina & uires	213.b	hama tauru	216.a
fistularum morbi medela	48.a 78.a 132.b 140.a 154.b 196.a & b 204.b 211.b 213.b 216.a 221.a 223.a 227.a 240.a 242.b 243.a 297.a	genu luxato curando	65.a	hama Titanu	218.b
flammula Veneris	212.b	genium dolor quo modo tollendus	25.b	hematites basiliscus	222.b
foecunditatem praestantia	230.b	135.a		hematites herba	216.a
foeniculum	123.b	gerbaste	214.a	hemorrhoidis ictus quo modo curetur	36.a 58.a
foeniculi nomina	222.a 232.b	gesomphalos	215.b	hemorrhoidum curatio	47.a 70.a 78.a
foeniculi in medicina usus	203.b 222.a 232.b 247.b	gestatio quibus conferat	9.b	115.b 132.a & b 155.b 218.b 229.b	
foeniculi radices decocte aqua	95.a	tionum genera	ibid.	236.b 245.b	
foetus situs in utero matris	73.b	gestatio lethargo laborantibus prodest	16.b	hastula regia	215.a
formica militaris	227.a	gilarum herba	101.b	hemorrhoidibus laborantium signa leuia	162.b
formicationum remedium	77.b	ginga	212.a	hecateum emplastrum	30.a
fracturis alligandis	203.b	gingiuarum confirmatio	79.a	hedera nigra nomina & uires	220.a
fracturis sanandis	69.b	gingiuarum morbi remedia	101.b 102.a 170.a 218.b 232.a	hedrice medicamentum	205.b
fragi herbae uirtutes	215.a	gingiuarum fluor	101.b 145.b	hedyosmos	219.a 221.a
fraxini folia	18.b	gingiuarum tumor	102.a 170.b 171.b	helenia	219.b
frictio quando recte adhibeatur	9.a	227.a		helenium	218.a
frigida aqua quibus conducatur	4.b	gingiuarum ulcera	45.b	helestitis	213.b
frigida aqua usus	4.b	gladiolus herba	112.a	helioscopos	220.b
frigida portio quibus utilis, & contra	3.b	gladiole uirtutes	248.a	helioscopion	217.b
frigoris incommoda	5.b	glans penis contestata quo modo aperienda	55.b 78.a	heliostrophon	215.b 216.a 217.b
frigori contraria	245.a	glandularum curatio	107.a 197.b	heliotropion	112.b 217.b
frigori in febribus qua ratione succurrendum	14.b	glechon	219.a	heliotropij nomina & medicina	216.a
frigore adustorum curatio	199.a 213.b 221.b 240.a	glechon agrion	219.a	heliuron	216.a
frigorum remedia	66.a 205.a 235.a 249.b	gliconis chirurgi emplastrum	154.b	hellebori albi uires	242.b
frontis laborantis curatio	7.b	glorophis	212.b	hellebori nigri uires	243.a
fungi inutiles assumpti ne obsint	36.a	γλωρῶν	211.b	helxine	218.a
fungorum uenenatorum remedia	153.b 203. 204.a 225.a 230.b 233.b 237.a	gludis	217.b	hemestriasis	217.a
furiosus quae conferant	112.b 148.a	glutiosa excrementibus	147.b	hemicranee quibus succurrendum	65.b 165.a 216.b
furfures faciei tollentia	233.b	glycea antidotus	118.b	hemicranii subitis doloribus medendis	89.b
furfures meientium curatio	160.b	glycyrrhiza	116.a 123.b	hemina	158.a 163.b 164.a
furfurum capitis medela	165.b 202.b 214.a 239.a 244.a	glycyfide	217.b	hēminon	84.a
furunculorum morbi remedia	37.b 68.b 140.a 198.a 200.a 202.a 212.b 214.a 235.b	gnidius coccus	221.a	hemitriteus febris	14.a
furunculis conducens emplastrum	92.b	gonoreros	213.b	hemitriteo depellendo quid conferat	69.a 191.a 222.a
furunculos rumpentia	202.b 206.b	gonorrhoeae consideratio	310.a	hemiton	219.a
Γάγγυλον	34.b	gonos Ammonos	219.b	hephesia	213.b
Gaisdonis uires	242.b	gonos aluru	215.b	heptaneuron	211.b
galange uires	245.b	gonos Apollonos	219.a	heptapleuron	211.b
galenus artis medicae optimus auctor	81.a	gonos areos	220.b	heptaphylli nomina & uirtutes	221.b
		gonos chronu	216.a	heracleos	218.a
		gonos Herois	213.b	heraclea	216.a 218.a
		gonos hori	216.a	heracleoticon	222.a
		gonosephestu	213.a	heraclion	216.b
		γρᾱμμᾱ	84.a	herasdacryon	212.a 217.b
		grammatica peritus esto medicus	159.a	herba capillaris	216.a
		grauedinis uocis utilia	105.a	herculana	217.b
		grauedines ex cruditate sustinentibus	125.b	hermionion	216.b
		grauedinem capitis pellentia	147.b 239.a	hermu basilion	218.a
				hermubotane	212.a
				hermudactylos	212.a
				herniosorum curatio	297.a

herpetia 227.b 229.b 232.b
herpyllos 220.a
herpyllon mega 220.b
herpyzos 212.b
heterocranij subitis & diutinis doloribus sanandis 89.b
hibernis 214.a
hiemis dieta 4.a 159.b
hiemis morbi 5.b
hiera antidotus 121.a 147.b 151.a
hiere maioris uirtutes 89.b
hieranthemis 214.a
hierobotane 101.a 122.b
hierobotanes nomina et facultates 212.a
hieracios 214.b
hierathiorine 222.b
hieribulbi uires 214.a
hilaritatem afferentia 243.b
hippocrates medicinam absoluit 158.b
hippocratis Colicis 1.a 81.a 158.b
hippocratis epistola ad Antiochum regem 84.a ad Mecenatem 85.a
hippocratis iuramenti medicus sit memor 159.a
hippomanes 216.a
hippomayathrum 232.b
hipposelinon 220.b
hirci foetori tollendo 111.a
hircinus sanguis 117.b
hircinus splen 120.a
hirundinum pulli 95.a
hirundinis sanguinis uirtus 97.a
hirundinum stercoreis usus 130.a
hoedimus lien 120.a
holochrysus basiliscus 222.a
holocyron 214.b
holofatri uires 203.b
homo trina ratione continetur 161.b
hominis uenefici morsus curatio 69.a 92.b 154.a 201.a 214.a 218.b
hopteris 216.b
horrori in febribus succurrendo 14.b
hugadesii 218.a
humorum descriptio 59.a
humero fracto sanando ualida 62.b 63.a
humeri luxati curatio 64.a
humidum corpus quae reddant 4.a
humorum doloribus quae accommoda 3.b 111.a 173.b
humori capitis auertendo 204.a
humorum corporis humani consideratio 85.a 159.b
humorum aetates 160.a
humorum emunctoria 160.a
humorum noxiorum medicina 116.a 204.b 205.b 225.b 230.a 237.a 241.a
humoru in uisceribus contractorym cura 131.a
hydōs 215.a
hydragodos 218.a hydragogos 214.b
hydrastina 211.b
hydris morsui 211.a
hydropis consideratio 274.a

hydropicorum dieta 210.a
hydropis nota 7.b
hydropis species 17.a 192.b
hydropicorum remedia 17.a 53.a 67.a 113.a 116.a 118.a 122.b 125.b 129.b 148.b 149.b 150.a 151.a 180.b 192.b 203.a 204.a 206.b 210.a 214.a 215.b 219.a 221.b 223.a 226.a 227.a 228.b 229.b 230.a 238.b 240.b 241.a 243.a 245.b 274.a 300.a 307.a 309.a
hygrē medicaminis confectio 98.a 139.b 144.b
hyophthalmos 217.a
hyoscyamum sumptum ne obsit 36.a
hyoscyami facultates 30.a 212.a 241.a
hyoscyami nomina 212.a
hypnoticos 212.a
hypochondria 231.a
hypogēfos 233.a
hypoglosson 217.a hypolysion 219.a
hypofarca 192.b
hyssopi uires 240.b
hystera quid 224.a
hysterica duritie 224.a
hysterica pungi sananda 125.b
lanuarij dieta 163.a
ibeos onyx 212.a
ibica 214.b
ibisci nomina & uires 215.b
ixos 33.b
ictericorum remedia 113.b 118.a 125.b 148.b 202.a 212.a 215.a 224.a 225.a 226.a 230.a 231.a 235.a 238.b 240.a 241.a 242.a 243.a 244.b 246.b 272.b 305.a
icterus auis 225.b
iecoris male affecti consideratio 271.b
iecoris morbi remedia 23.a 67.a 113.a 115.b 116.a 117.b 118.a 125.b 131.a 147.a 148.b 154.b 157.a 177.a 178.b 179.a 180.b 201.b 202.b 203.a 204.b 205.b 206.a 207.a 212.a 215.a 221.b 222.b 225.a 230.a 231.a 232.a 235.a 238.a 239.b 241.a 242.a 243.b 246.b 304.b
iecinoris descriptio 19.b
iecoris duritie 121.a 125.b 148.b 149.b 178.b 179.a
iecoris situs 161.a
iecoris structura 118.b
iecoris tumor 122.b 149.b 237.a
iecoris uulnerati signa 33.a
iecoris signa letalia 162.b
iecori accommoda 202.b 203.b 214.a
iecori corroborantia 245.b
iecori dolenti praesentaneum malagma 27.b catapotium 32.a
iecore laborantium dieta 209.a
ignis sacri morbi remedia 31.b 37.a 68.b 90.b 102.a 113.a 148.b 156.b 198.b 201.b 202.a 221.b 227.a 232.b 233.b 235.a 236.a 242.b 244.a 246.a

illecebra 220.b
ileos uitium 127.a 129.a 149.a 186.a
iliacorum molestus quo pacto succurrendum 77.a 139.b 300.b
imbrum incommoda 52.b
imeleta 214.a
impetiginis species & curationes 139.a
impetiginis morbi remedia 111.b 156.b 179.b 206.a 216.a 244.b 245.b
impregnationis signa 74.a
incubonis consideratio 252.a
ab Incubone illius praesentanea medela 112.b 243.b 252.a
indiciorum in singulis morbis consideratio 7.a
in diem facile mediae aetates sustinent 4.a
infans antequam edat dentes uagitur 162.a
infans cur uagitur recenter editus 162.a
infans figuram hominis induit quadragesimo die 162.a
infanti mortuo expellendo quid conferat 30.b 213.b
infantis primum in lucem editi quae ratio habenda 72.b
insubulandi ratio 55.b
inflammationis corporum remedia 230.a
inflatione inducentia et leuata quae 10.b
inflationem noxiam discutientia 219.a 241.b
ingrinalis 217.a
inguinis morbi remedia 54.a 182.a 212.b 220.a 225.a
inguinum tumor 133.a
inguinibus a paniculis tentatis conducunt emplastrum 92.b
insana herba 212.a
insanie consideratio 256.a
insanie genera 15.b
insania quo modo tollitur 164.b 192.a 242.b 243.a
insomnis compescendis 204.b
intellectualis introducendi ratio 257.b
interaneorum cura 125.b 128.a 129.a 181.a 201.b 202.a 214.b 234.b 241.b 221.a
interaneorum animalium remedia 202.a
interdigitis medendis 135.a
interiores sedes humani corporis 19.b
interiorum tumor 240.b
intertrigo id est membrorum inter se frictio quo modo tollitur 132.a 133.a 155.b 185.a 210.a 241.a
intestinum caecum 19.b
intestinum rectum ibid.
intestinum quibus prominet 132.b 133.a
intestini descendens curatio 54.b
intestini extremi prolapsio 256.b
intestini plenioris morbus 224.b
intestini uulnera 209.a
intestini remedia 53.a 68.b 148.b 185.a 203.b 204.a 213.a 215.a 219.b 229.b
intestini inflatio 125.b 128.b 219.b

intestinorum infantium dolor 219.b
 intestinorum leuitas 221.a
 intestinorum uentris contractio 221.a
 intestinorum tenuioris morbus 223.b
 intestinorum tumor 227.b
 intestinorum parti alicui rupte aut conuulſe
 quid conferat 227.b 227.b 227.a 228.a
 intestinorum prolapsus 154.b 157.a
 intestinorum ſalutis 157.a
 introducendi modi quatuor 158.b
 inuolubus ſyluaticus 228.a
 inuolubus uires 228.a
 inula 118.a 212.b 240.b
 inula ſacculata 112.a 240.b
 inula Campana nomina et uires 219.b
 inula ruſtica 110.b 147.a 222.a
 iobonſos 214.b
 iouagrimon 219.a
 iouutus 213.b
 iouutus nomina et uires 213.b
 iouutus quibus alicui ſomniandi uolunt 223.b
 iouutus uires 131.a 240.a
 iris ſylueſtris efficacia 121.a
 iris ſylueſtris ſumpta 121.a
 iris ſylueſtris 121.a
 iſatis nomina et uires 213.a
 iſchias herba 222.b
 iſchidiaci qui 222.b
 iſchidiacorum curatio 222.b 222.a 222.b
 122.a 188.b 189.a 204.a 213.a 219.
 224.b 225.b 231.a 235.b 237.a
 238.a et b 240.a et b 242.a 246.a
 iſoetes 223.a
 iſtineri faciendo quid conferat 213.a
 iudei emplastrum 229.b
 iuguli deſcriptio 39.a
 iuguli fraſſi curatio 61.b
 iulij diſeta 162.b
 iuxta ſi pota 153.b
 Labiorum fiſſura 79.b 101.b
 labiorum uitijſis 170.a
 labraſion medicamentum 206.a
 labrum Veneris 214.a 217.b
 labrorum apoſtemata qui curatur 246.b
 labrorum uitijſis 218.b
 labrorum per manus curatio 52.b
 labris curia quo modo ſarcienda 51.b
 lac ſi potum 153.b
 lacis ubertatem puerperis praſtantia 23.
 a 201.b 204.b 229.b 232.b 233.a
 237.b
 lacis bubuli uires 105.a 116.a
 lacerta uiridis 94.a 120.a
 lacephon 212.b
 lachanon baſilicon 213.a
 lachanon 212.b
 lactilago 214.b
 lactuca marina 220.b
 lactuca uires 233.a
 lactuca leporina uires 221.a
 lactuca ſylueſtris nomina et uires 214.b
 laganon quid 231.a
 lagophthalmi remedium 50.b

lagopu nomina et uires 217.a
 lampago 220.a
 lanciolata 217.a
 languoris remedia 216.a
 lapathum acutum 215.a
 lapathi nomina 213.a
 lapathi uires 202.a 213.a
 laſeris granum 89.b
 laſſitudinem ne quis ſentiat 137.b 157.b
 215.a 223.a
 laterculus 212.a
 laterum contuſio 121.a 157.a
 laterum dolorem patientiu remedia 22.
 b 27.b 32.a 67.a 92.b 108.a 110.a
 113.a 114.a 115.b 116.a 117.a 118.
 a 121.a 131.b 139.a 147.b 154.b
 158.a 186.a 201.b 203.b 204.b 205.
 a 206.b 213.b 215.b 222.a 225.b
 227.b 231.b 232.b 234.b 235.a 237.
 b 239.b 240.a 243.a 246.a
 lathyridis nomina et uires 221.a
 lauatio calida quibus conueniat 4.a
 laurus alexandrina 217.a
 lax 220.b
 lendibus capitis tollendis 50.a
 lenia emplastra 30.b
 lentiginibus e facie abolendis 40.a 112.a
 et b 202.b 214.a 228.b 236.a 245.b
 246.a
 leonchoſtemon 212.b
 leontocharon 217.a
 leontopetalon 212.b
 leontopodij nomina et uires 212.b
 leporinus teſticulus 122.a
 leporini ſtercoris uſus 129.a
 leporini tali uſus 127.b 128.b 130.b
 lepra morbi cura 111.b 112.a 204.b
 221.a 235.a 237.b 238.a 243.a
 244.b
 leptophyllon 213.a
 lepus marinus, et qui eius ueneno ſuccur
 ratur 153.a 201.a
 leporis talus 181.a
 lethargicorum remedia 69.b 191.b 203.
 a 204.a 207.a 208.a 219.a 234.a
 237.b 299.b
 lethargia curande que neceſſaria 16.b
 litha 216.b
 lithuſa ibid.
 litha emplastra 30.a
 leucacanthia 242.b
 leucanthemion 131.a
 leuce uiriliginis ſpecies 39.b
 leuceoros 212.b
 leucophlegmatia 192.b
 leucophlegmatia in hydropis ſpecies 17.a
 leucophylla 213.a
 leuonion 219.b
 leuia qua 10.b
 leucopyretos compoſitio 108.a
 lia 213.a
 libanotis 113.b
 libra 163.b
 lichenis morbi, id eſt mentagra, curatio

111.b 190.a 202.b 233.b 235.b
 licinia 212.a
 licopius 212.b
 licys agrimon 219.b 221.a
 liget 212.a
 ligula 158.a 178.b
 liguſſici uires 234.b
 liliorum in medicinis uſus 220.b 233.b
 248.a
 liliorum nomina 220.b
 lingua bonis herba 237.a
 lingua bubula herba 215.b
 lingua bubula herba uires 106.a
 lingua canina 219.b
 lingua Macedonica 219.b
 lingua deſcriptio 19.b
 lingua apoſtemata 235.b
 lingua aſperitas quo emendatur 241.a
 lingua ſcabrities et ariditas quo modo in
 febris curanda 13.b
 lingua cura 212.a
 lingua per manus curatio 52.b
 lingua reſolute curatio 20.a
 lingua tumoribus 235.a
 lingua uitijſis per manus medendis 52.b
 lingua ulcera 101.b 170.a
 ſub Lingua abſceſſus quo modo curetur
 per manus 52.b
 linzoſtis arren 218.a
 lippitudinis nota 7.b
 lippitudinis remedia 4.b 93.b 168.a
 203.a 213.b
 lippitudini oculorum tollenda collyria 92.b
 lirion 220.b
 litex 84.a
 liuori faciei abolenda que conferat 112.
 a 156.b 160.a 225.a
 liuori faciei contuſe tollenda praſentantur
 malagma 28.b
 lonchitis 216.b
 lothionetra 218.a
 lotij humani uires 98.b 104.b
 lotios 211.b
 lumbago 224.b
 lumborum morbi remedia 67.a 121.a
 123.b 131.b 133.a 139.a 151.a 154.
 b 157.a 186.b 203.b 204.a et b
 222.b 224.a et b 230.b 237.a 238.a
 lumbricos perimentia excludentiaq;
 24.b 67.b 128.a 150.b 181.a 201.b
 204.b 205.a 211.b 215.a 216.a 217.
 b 219.b 220.a et b 221.a 224.a et
 b 227.a 231.b 232.b 234.a 235.b
 238.b 239.a 240.b 241.a 245.b 246.
 a 306.a
 luxatis, id eſt membra a ſuo loco amota
 habentibus, uilia 47.b 69.b 157.b
 200.a 205.a 298.a
 lunae obſeruatione 85.b
 lunaticis quid conferat 213.a 217.a et b
 lupi ſtercus 129.a
 lupinae pellis efficacia 121.b
 lupini nomina et ſacculata 211.a
 luridus quibus eſt color 118.b

lustrimachion	218.a	marrij dieta	161.b	medicus memor sit iuramenti Hippocratis	159.a
lustrago	212.a	martis manus	212.a	medicus, quæ in domibus aguntur, celestis	159.a
luteum emplastrum	155.a	masculi quæ ratione concipi possunt	203.a	medicus unus non multos curabit	12.b
lybistici vires	248.a	239.b		medici officium	112.a 142.a 158.a
lychnites lapis	97.b	matricialis	217.b	medico quæ in primis cognoscenda	1.a
lycium indicum collyrium	143.b	mater Herculania	218.a	159.a	
lymnestis	ibid.	mariani mali vires	205.b	medico quæ disciplina necessaria	159.a
lymnetes	215.a	matricis apothegmata	72.b	medico nulla par gratia repeditur	159.a
lymphaticorum remedia	243.a	matricis carni exorta quo modo subueniendum	76.a	in Medico humanitas requiritur	86.a
Macula corporis quò modo tollantur	112.a 155.b 199.b 202.b 229.a 236.a 238.b 242.a 243.a	matricis complexio mala	75.b	medici fama multi, sed opere pauci	159.a
maculas è facie tollentia	112.a 233.b	matricis descensus	72.b	medicos præterita cognoscere, præsentia sci- re, & futura prædicere oportet	159.a
menomenorum cura	302.b	matricis dolorum remedia	75.b 166.a 201.b 206.b 216.a 223.b 229.b 233.b 237.b 239.b 245.b 246.a	medulla, quæ in spina est, percussæ signa	133.a
magnetis lapidis virtus	89.a	matricis duritiem emollientia	240.a	megetis chirurgi emplastrum	154.a
mai dieta	162.b	matricis exitus	76.b	mel quod optimum	164.a
malache	215.b	matricis calori reuocando	225.b	melancholia	161.b
malache agria	ibid.	matricis ex suo loco motus	72.b	melancholicus humor si uomicæ exegerit, quæ uicijus ratio tenenda	1209.a
malagmata	27.a 156.b	matricis fluxus	76.a 233.b 244.a	melancholici tristes	258.a
malandrie quid conducat	136.a	matricis hæmorrhœia	310.a	melancholicorum dieta	228.a
malum terre	213.b	matricis inflatio uel tensio	309.a	melancholicorum cura	113.a 148.a 302.b
mali punici consideratio	205.b	matricis rigori	185.b	melancholicis accommoda	243.a
malogranati vires	205.b	matricis suffocatio	72.a 308.b	melanthium	168.a
malorum natura & vires	205.b	matricis tumor	205.a 227.b 229.a 239.a	melanthium xeron	196.b
malarum descriptio	58.b	matricis ulcera	73.a	melas utiliginis species	39.b
maluæ facultates	202.a 229.a 244.a	matricis vulnera	310.a	melecapron	213.b
maluæ nomina	229.a	matrici accommoda	203.a	melicera	38.b
maluæ rustica	215.b	matricem coartandi modus	76.b	melicerides tubercula	49.a
maluæ erratica nomina & vires	215.b	maurella vires	243.b	melinum oleum	206.a
mammalle	214.b	maxilla descriptio	58.b	melissophyllon	221.b 241.b
mamma ne crescant	176.b	maxilla fractæ curatio	61.a	mellitina	216.a
mammarum dolor seu cancer	165.b	maxilla luxatæ curanda	63.b	melocarpon	213.b
176.b		measpho	213.b	melophyllon	218.b
mammarum tumor	118.a 176.b 228.b 246.a	mecon, meconion	220.b	melosmon	217.a
mammarum muliebrum duritiæ quæ con- ferant	113.a 139.a 146.b 148.a 155.a 176.b	mecon agria	216.b	melothron	217.b
mammarum mulierum remedia	66.b 202.a 221.b 244.a	mecon Ceratitidis	216.b	membri uirilul ulcera qui sanantur	229.b
mammarum muliebrum suppurationib. quæ ratione occurrendum	154.b	meconicon medicamentum	203.a	membrorum contusionibus utilia	112.b
mammillarum ex abundantia lactis post parum dolor	176.b 307.b 213.b	meconis	233.b	membrorum omnibus in genere doloribus succurrendis	112.b
mammillarum nucleoli	176.b	meconitis	220.b	memoriam confirmantia	237.a 245.b
mania	256.a	medi malagma	27.a	menem	113.b
mania herba	212.a	media ne doleant	109.b	menem	113.b
manifestolium	215.a	medice artis tyro	159.a	menem	113.b
mantia	218.b	medicamenti mali suspitioni quo modo succurrendum	154.a	menem	113.b
manus descriptio	55.a	medicamenta arida	231.a	menem	113.b
manus quacunque etiã causa lese cu- ratio	195.b	medicamenta, deorum manus	86.b	mensium singulorum dieta	152.b 163.a
manus quæ ratione dealbande	79.a	medicamenta munus diuinum	142.a	menstrua inibentia	68.a 71.b 72.a 115.b 201.b 202.a 204.b 204.d 225.a 232.b 235.b 236.a
manui luxata curande	64.b	medicamentorum usus necessarius	86.a	menstrua prouocantia purgantia	71.b 148.b 203.b 204.a 205.a 217.a 218.b 219.a 220.b 222.a 223.b 224.a 225.a 227.a 230.a 231.a 232.b 233.b 234.a 235.a 237.a 238.a 239.a 240.a 241.b 242.a 243.a 245.b 246.a
manuum morbi remedia	139.a 173.b	medicina ars coniecturalis	17.a	menstrua mulierum mouentis antidotus	213.a
manui uermis quo pacto arcendus	78.a	medicina à quibus primū exulta	17.a	menstruorum muliebrum usus	233.b
mararia	214.a	medicina inutilis fortuna repugnante	11.b	menstruorum in foemina defectus anti- maduersio	117.b
marathron	222.a	medicina partes	12.a	mensuraru consideratio	59.a 163.b 164.a
marcellus sub Gratiano & Theodosio im- peratoribus uixit	81.b	medicina partes quæ uetustissima	14.a	mensura	
marcellus unde sua desumpserit	83.b	medicina primi auctores	158.b		
maronion	215.a	medicina scientia qualis	86.a		
marrubij nomina	216.a 240.a	medicina scientia, sapientia pars habita	11.a 22.a		
res	ibidem	medicinarum rationalis professoribus, quæ sci- tu necessaria	1.a		
		medicus alienos casus suos esse ducit	159.a		
		medicus disciplinarum & uirtutum mi- nime expertus	159.a		

- mensurari ac ponderu nota 83. a 84. a
 menta agria 219. b
 menta Veneria 220. b
 menta nomina 221. a
 menta vires 203. b 221. a 248. a
 mentagra arcende 111. b
 mentastrum 111. b 112. a
 mentastri nomina & facultates 219. a
 mentis abalienate remedium 90. a 117. b
 a 178. a
 menthamorinon 219. b
 menti descriptio 58. b
 mercurialis herba 131. b
 mercurialis nomina & vires 218. b
 meron rhoeas 216. b
 meronopus 220. a
 messili vires 206. b
 messica 216. a
 menete 163. b
 per po 163. b
 militaria 212. a
 militaris 218. b
 millefolium a quo inuentum 218. b
 millefolij nomina & vires ibid.
 mina 83. b 164. a
 miser diuinum 113. b
 mistron 163. b
 mna 83. b 84. a
 modiolij descriptio 59. b
 modius 158. a 126. b
 moecosa Phrodites 219. a
 moier 219. a
 mollicines 219. a
 mollicientia qua 202. a 204. a
 molliendis duris malagma 27. b
 moloche agria 215. b
 moly virtus 216. a
 monemerum collyrium 95. b 97. b
 mora sylvatica 218. b
 morbi regij consideratio 272. b
 morborum genera 11. b
 morborum latentium indagatio 127. b
 morborum notitia 11. b
 morborum omnium presentissima reme-
 dia duo 85. b
 morbis acutis adolescentia obnoxia 5. b
 in Morbis acutis signa fallacia 7. a
 mori radix 103. b
 mortis indicia qua 6. b
 mortuo infanti e uulua eiciendo condu-
 cens pessus 31. a
 morum culpa artem corrumpit 159. a
 moribus ferarum medendis utile empla-
 strum 92. b
 moschi malagma 27. b
 mothmutis 220. b
 mulcetra 216. a
 mulier certo tempore concipit 162. a
 mulier concipit utri semine & suo san-
 guine 162. a
 mulier ne cum alio coeat 134. b
 mulieri uitio locorum concidentiu qua cu-
 ratione succurrendum 31. a
 muliere mortuum pecus in utero habente 217. b
 mulierum coloratio qui fiat 79. a
 mulierum in lecto mingentiu cura 76. b
 mulierum locis dolentibus 221. b
 mulierum morbis 227. b
 multiradix 215. a
 muralis 218. a
 muris aranei morsibus curandis 201. a
 muris ceci iclibus curandis 69. a
 mutes necantia 242. b
 muscas necantia 242. b
 musculi lassi curatio 33. b
 mistellago 214. b
 mistellago terrestis 217. a
 mutationes repentine periculose 3. b
 mutilago capraria 220. b
 myacantha 218. b
 myriophyllon 218. b
 myrmecides quo modo abstergende 137. a
 myrmecij medela 38. b
 myrsinites 220. b
 myrti bacca 95. a
 myrtites 220. b
 myrtopetalon 213. b
 myxorum vires 207. b
 Napi vires 204. b
 narce 213. b
 narcissi nomina & vires 216. b
 nardostachys 246. a
 nardus Celtica 246. a
 narium affectarum medela 44. b 100. b
 102. a 205. b
 narium aut fauctum ulceris indicium 7. b
 narium ex humore stillatio 170. a
 narium fracturarum curatio 61. a
 narium graueolentia 100. b 145. a 169. b
 220. a
 narium inflammationi succurrende utilis
 pastillus 30. b
 narium sanguinis erumpentis restrictio
 100. b 101. a 169. b
 narium ulcera 100. b 145. a 169. b 227. b
 in Naribus curta quo modo scienda
 51. b
 nasci cancer quo pacto curandus 77. b
 nasturtij nomina 241. a vires 202. b
 214. a 235. b
 in Navi ne nausees 219. b
 nauseam reprimentia 117. a 203. b 229. b
 232. b 234. a 236. b
 nausea marina ne offendaris 226. a
 nathon 212. b
 neiasar 213. a
 nemaictinos 221. a
 nemostasis 222. a
 nemeneffa 214. b
 nemeron 212. b
 nepeta 219. a
 nepeta nomina 219. b 231. a vires 203. b
 219. b 231. a 243. b
 nephelion 215. a
 nephreticis qua prescribenda uictus ratio
 210. a
 neptunia 217. a
 nerion 218. b
 neruus instrumentum 224. b
 neruorum condylomata 135. b
 neruorum confirmatio 138. a
 neruorum distinctionis animaduersio 7. b
 neruorum doloribus quo pacto subuenien-
 dum 5. a 69. b 111. a 112. a 121. b
 137. a 139. a 188. b 195. a 211. b 213. a
 215. b 221. a 222. a 224. a 242. a
 neruorum incisionibus utile emplastrum
 92. b
 neruorum musculorum punctus quo mo-
 do sanandi 154. b
 neruorum origo 114. b
 neruorum resolutio 19. a
 neruorum tensionibus & contractionib.
 utilia 69. b 113. a 137. b 138. a 148. a
 157. b 204. a 229. b 233. b 239. b
 neruorum tumor 137. b 213. a
 neruis malagma presentaneum 28. b
 neruis utile acopum 31. b
 neruis qua conducant 173. b 204. b 237. b
 neruos praefos conglutinantia 194. b
 233. b
 nession 215. a
 niconis malagma 28. b
 nigredini 112. a
 nigrum collyrium 93. a
 nileos 212. b
 nisine 216. a
 nodorum doloribus succurrendis 195. b
 nomarum morbi id est ulcerum corpora
 depascentium remedia 19. a & b 214. b
 217. b
 nosprason 216. a
 nota que in quoquo morbi genere uel spe-
 uel pericula ostendunt 8. a
 notarum in singulis morbis consideratio 7. a
 notion 221. a
 nouembris dieta 162. b
 noxarum corporis quinque genera 32. b
 nucum vires 207. a
 numenij malagma 129. a
 numenij pessus 31. a
 numerus septies multiplicatur in confir-
 matione partus 162. a
 nutrientia qua 204. a
 nutriticis descriptio 75. a
 nutriticis cessationis consideratio 273. b
 nux 163. b
 nyctalopis abolendis 97. b
 nympheae nomina & vires 214. a
 nympheon 214. a
 Obolus 83. b 84. a 163. b 164. a
 obscenarum partium uitia et curationes 45. a
 obscenis partib. conducens pastillus 30. b
 octinoides 221. a
 ocheon 220. b
 octobris dieta 162. b
 oculi sanguine suffusi 168. a
 oculorum diuersis doloribus sanandis col-
 lyria 40. a 92. b
 oculorum diuersa medicamina 94. a
 oculorum natura & suffusio 50. b

oculorum quocunque ictu laesorum remedia	97. a	ὀμολάται	59. a	ostriaginis uirtutes	214. b
oculorum uitia, quae scalpello & manu curantur	49. b	onicante	213. a	ostriatij uires	235. a
oculorum albuginem tollentia	95. b 95. b 168. b 169. a	onite	205. a	ostriaca	215. b
oculorum caligines discutientia	76. a	onitis	222. a	otiosa uita cur inutilis	3. b
oculorum caro excrefcens	95. b	onocardion	214. a	oualidia	214. a
oculorum cicatrices emendantia	42. b	onyx Myos	213. b	ouicula lana	89. a
oculorum claritati conferentia	116. b 169. a	operatio, medici peritiam aut inertiā	159. a	ouyria	84. a
oculorum claritati contraria	233. a 234. b	opodit	213. b	ouyrtages	19. b
oculorum elasti	50. b	opetis	40. a	ouyrtages	84. a
oculorum crustis, utile	95. b	opisacis	20. b 156. b	oxylapathi nomina & uires	215. a
oculorum destillationem nimiam sedantia	96. b 168. a 222. b 229. b 245. b	opisotomus	115. a 204. b	oxymelon	216. b
oculorum epiphoras inhibentia	93. a et b	opisotonicorum, id est cervicis rigore laborantium, remedia	151. b 223. b	oxymel qui fiat	164. a
oculorum feruoribus qui succurrendum	204. a 229. b	opium si potum	205. b	ozea curatio	44. b 52. a 100. b
oculorum glaucomatis	95. b	opone compositio	262. b	Pederos	220. b
oculorum humoribus	237. a	oppressionis consideratio	262. b	paonia nomina	217. b
oculorum inflammationi	239. a	ophthalmontiphonos	215. b	paonion	217. b
oculorum morbi remedia	40. a 45. b 66. a 76. a 94. b 105. b 208. a 213. b 214. a 215. a 222. b 224. a 229. b 231. b 242. b	orbicularis	231. b	palatia	213. b
oculorum papulas curantia	144. a 240. a	orbicularis herbae usus	131. b	palati uistura	172. a
oculorum pellicula	169. a	orchis	213. b	palati curatio	170. b
oculorum perunctiones	93. a	oriclana	218. a	palma luxata cura	64. b
oculorum pili aduiterini quo modo tolluntur	68. a 97. a 169. a 221. a	origanum	112. a	palpebrarum asperitudinem emendantia	102. a 144. a
oculorum pituita medende	51. a	origani nomina	222. a	palpebrarum chalazia quo modo curetur	49. b
oculorum pupulae	41. b 144. a	origani uires	205. a 222. a 238. b	palpebrarum compositio	95. b
oculorum rheuma	168. b	orobethron	212. b	palpebrarum diductio	233. a
oculorum sordida ulcera	95. a 102. a 144. a	orotiza	215. b	palpebrarum pili oculi irritantes	50. a
oculorum staphylomatibus curatio	50. b	orozeon	214. b	palpebrarum pediculis tollendis	41. b
oculorum suppurationibus utile	144. a	os donnoia	21. a 224. b	palpebris glabris qua ratione pili inducendi	97. b
oculorum tela	76. a	orthopnoicorum remedia	235. a 241. b	panaritium	215. b
oculorum tumores	95. b 167. b 168. a 227. a 228. b 232. b	245. b	212. a 217. b	panaces	222. a
oculorum uirgulis consideratio	49. b	orthos	212. a 217. b	panax Helenion	219. b
oculorum uisiones	95. b 144. a 168. b	os ne marcescat	110. b	panax Chronia	219. b
oculis accommoda	237. a	os saluofum	170. b	pandion	222. b
oculis aliquo casu imminutis conductes remedium	41. b	oris uitis omnibus in genere sanandis utile medicamentum	105. a	panchromon	212. a
oculis si quid inciderit	97. a	oris uitia, quae manu & ferro curantur	52. a	pancratios	215. b 221. a
ocymi uires	203. b 221. b	oris cancer	45. b 145. b	panoru morbi remedia	68. b 133. a 157. a
odocos herba	92. a	oris graueolentiam tollentia	66. a 78. a	197. b 202. a 206. b 213. a	
odor	161. b	oris putredo qua re arceatur	170. b 243. a	panion	213. b
oenanthes uirtutes	216. b	oris morbi remedia	101. b 102. a 170. a 212. a 214. b 233. b	panni rustici descriptio	115. b
olani	84. a	oris ulcera	45. a 204. a 205. b 211. b 236. b 241. a	panthagathos	219. a
olet ueteris si desit, confectio	164. a	uulnera	170. a 172. b	pantheceratos	217. b
olma	219. a	238. b 243. a		panthemis malagma	28. a
olusatri nomina & uires	220. b	os pectoris	59. a	papauer album, nigrum, agreste, syluaticum	216. b
olyscion	83. b	oscedinis curatio	101. b 214. b	papauer palustre	218. a
omentum descendens curatio	54. b	ossis uitiati signa & observationes	59. b	papauerculum	212. b
		osfireostaphe	218. b	papaueris consideratio	248. a
		ossi excidendo	59. b	papaueris uires	203. a 236. a
		ossa fracta quo extrahuntur	202. b	papaueris syluestris nomina & uires	216. b
		ossa per se ut remaneant	222. b	papularum genera	39. b
		ossium omnium observatio	61. a	papularum curatio	39. b 65. b 113. a
		ossium fractorum remedia	154. b 200. a 213. a 236. a	148. b 156. b 198. a 199. a 205. a	
		ossibus luxatis curandis	63. b	232. a	
		ossa resoluens emplastrum	30. a	papulae in ueredis partibus eminentes	205. b
		ossibus carnem reddentia	240. a	papulae quo pacto e facie tollenda	112. a
		ossibus malagma conueniens	28. b	papulis in capite efferuescentibus quid conferat	90. b
		osmites Bregii	219. a	paracollecticum emplastrum	29. a
		osta, anthropi	213. a	paralios	220. b
		ostanes	213. a 217. b	paralysis	137. b 138. a
		ostocopi curatio	69. a	paralysis	

pili detracti ne renascantur 204.b
 pilorum in ambustis et cicatricibus instauratio 112.a 133.b
 pinastellum 219.b
 pineae uires 207.a
 pingue corpus reddentia 207.a
 piperapium 212.b
 pirorum uirtutes 205.a
 pissistorum uires 207.a
 pituita nota 207.a
 pituitam purgatio pellentiaq; 85.b 91.a
 131.a 164.b 202.b 203.b 204.b 205.a
 235.a 245.b
 pituitam quae crassiores, tenuioresq; reddant 116.b
 plaga ne sentiantur 236.a
 plagarum corporis remedia 201.b 215.a
 217.b 219.b 232.b 233.b
 planete febres 161.b
 plante luxata curatio 165.a
 plante tumoribus 135.a
 plantago lata 211.b maior 212.b
 plantaginis nomina et uires 227.a
 platonis de furore opinio 206.a
 platyphyllos 220.b
 plectronias 215.a
 pleuritide quae seruanda dieta 208.a
 pleuriticorum remedia 22.b 27.b 23.a
 67.a 92.b 108.a 110.a 113.a 114.a
 115.b 116.a 117.a 118.a 119.a 131.b
 139.a 147.b 154.b 157.a 186.a 201.b
 203.b 204.b 205.a 206.b 213.b 215.b
 222.a 225.b 227.b 229.b 231.b 232.b
 234.b 235.a 237.b 239.b 240.a 243.b
 246.a
 pnegation quid 252.a
 pocastrum 228.b
 podagra indicium 207.b
 podagra astuanti quid conferat 202.a
 podagra calide malagma 207.a
 podagra morbi remedia 28.b 68.b 113.a
 133.a 137.b 138.b 139.a 148.a 151.a
 157.a 193.a 200.a 202.b 204.b 211.b
 214.a 215.b 218.a 221.a 222.a
 223.a 225.b 232.a 235.a 238.a
 239.a 243.a 307.b
 podagris frigidis quae adhibenda 205.a
 podagricorum uictus ratio 210.b
 podicis fistulosi curatio 132.b
 polenta confectio 164.a
 polion herba 113.b 220.a
 polij nomina et uires 217.a
 poludon 219.a
 polybi pastillus 230.b
 polycarpon 213.b
 polygonium 147.a
 polygoni nomina 213.b
 polygoni in medicinis usus 98.b 101.a
 213.b
 polygonaton 213.b 242.b
 polyneuron herba 143.a 211.b
 polyonymos 218.a
 πολυνομος 162.a

polypi morbi descriptio 144.b
 polypi curatio 51.b 169.b 100.b 101.b
 102.a 116.b 145.a 242.b
 πολυπογία 290.a
 polytrichon 216.a 27.b
 poma quibus obsint 212.b
 pompedulon 212.a
 ponderum consideratio 27.a 158.a 163.b
 ponderum ac mensurarum nota 83.a
 pondo 158.a
 ponem 213.a
 ponticum absinthium 225.a
 porcinus adeps 97.a
 porcinum stercus 133.a
 porrum sectinum 101.a
 porri uires 203.a 230.b
 porriginis depulsio 35.b 65.b 90.a 156.b
 202.b 214.a
 portulaca 103.a 114.b
 portulace nomina et facultates 220.b
 233.a
 potiones medicamentorum quado danda 12.a
 potiones quo pacto in singulos menses praeparari conueniat 163.a
 potionum materia 9.b
 praecordiorum duritia 121.a
 praecordiorum in febribus inflammatio 14.b
 praecordiorum inflatio 118.b
 praecordiorum male affectorum remedia 67.a 117.b 125.b 178.a 204.b 221.b
 224.a 240.a 27.b 242.a
 praecordiorum tensio 118.b 157.a
 praecordiorum tumores 114.a
 praecordij accommoda 203.b
 praefecationibus subitis utilia 112.b 148.a
 praegnantium dieta 74.a
 praegnantibus quae cauenda 232.a
 234.a
 praegnantibus nepeta contraria 231.b
 praegnantibus a pulegio abstinendum 219.b
 praescientia futurorum fidem tribuit 159.a
 prapapilon 212.b
 prapedion 212.b
 prasi nomina et uires 216.a
 priapiscos 213.b
 priores 222.b
 probatio 211.b
 prochos agrios 220.a
 propedula 212.a
 prophete 212.a
 proserpinaca 213.b
 proserpinalis herba 101.a
 prosopites, prosope 215.a
 prosopon 216.b
 proteus collyrium 98.a
 pruriginis remedia 65.b 90.a 165.b
 199.a 27.b
 pruritus interiorum quo arcendus 233.b
 pruritus corporis tollentia 232.a 238.b
 297.b
 psaron 196.a
 pseudoselinon 212.a

psilothrum 200.b
 psittacinum collyrium 93.a 144.a
 psoricum collyrium 144.a
 ψυχωγία 161.b
 psychotrophon 222.b 230.a
 pierniones 215.b
 πτεγύγιον 49.b
 pteron ibios 212.a
 pudendorum et podicis uulnerum uile emplastrum 92.b
 pugni quacunque etiam ex causa laesae media 195.b
 pulegium praegnantibus obest 219.b
 pulegi nomina 219.a
 pulegi in medicinis usus 89.a 219.a
 232.b 248.a
 pulmonis situs 161.a
 pulmonis extensio 216.a
 pulmonis frigiditas 215.b
 pulmonis humores pellentia 237.a
 pulmonis corrupti reparatio 109.b
 pulmonis male affecti remedia 22.b 107.b
 111.a 116.a 147.b 176.a 203.a et b
 205.b 206.a 27.b 207.a 212.b 225.b
 226.a 227.b 230.b 232.a 237.a 239.a
 240.b 243.b
 pulmonis uitiati nota 207.b
 purgandi uim habens malagma 28.b
 29.b
 purgatio mulierum paritum laborantium 218.a 219.b 220.b
 pus mouentia 26.a 33.a 155.a
 purgationes quando perniciose 42.a
 puri mouendo utile emplastrum 239.b
 purulenta excreantibus quae conueniant 109.a 211.b 222.b
 199.a
 pusilla uolatice 199.a
 pusillarum genera, curationesq; 39.a
 pusillarum corporis remedia 77.b 112.a
 137.b 235.a 239.a
 pusulas habentium signa letalia 162.b
 putagonon 216.a
 pure dini abstergenda 212.a
 πύλον 119.b
 pyrethri radix 89.b 102.b 171.a
 pyrine 222.b
 pyrgys 219.b
 pyxionice 213.b
 Quadrans 158.a
 quartana febris remedia 15.a 191.b
 211.b 215.b 219.b 222.b 227.a 243.b
 a 27.b
 quartana febre laborantium dieta 210.b
 quicunx 215.b
 quinquefolium 217.a
 quotidiana curatio 15.a 191.b 211.b
 Radij descriptio 191.a
 radioli nomina et uires 218.b
 radix Macedonica 212.b
 radix nautica 212.b
 ramis curatio 55.a 188.a
 rane uiae usus 127.b
 ranarum palustrium adeps 98.b
 rapa 214.b
 rape

- sape uirtutes* 205. a
saphani facultates 98. b 201. b 243. b
sapum porcinum 213. b
sapum terra 213. b
*ratio & experientia duo indicandi instru-
 menta homini a natura data* 81. a
rauce dini uocis presentanea medicamina
 104. a 105. a 173. a 203. a 226. a 230.
 b 240. a et. b
refrigerantia que 10. b 201. b
regia 222. a
regij morbi consideratio 19. b
regij morbi medicamina 69. b 113. b 148.
 b 190. a 203. a 212. a 215. a 218. b
 223. a
*remedia eadem non omnibus aegris condu-
 cere* 11. b
remeria 212. a
renum descriptio 19. b
renum doloris remedia 23. a 67. a 108. a
 115. b 118. a 121. b 122. b 123. a 124. b
 125. b 139. a 147. b 149. b 186. b 187. a
 201. b 203. b 204. b 207. a 221. b 222.
 b 226. a 227. a 230. a 232. b 240. b
 241. b 242. a 307. b
renum exulceratorum nate 7. b
renum exulceratio 122. b 150. b
renum grauedo 123. b
*renum inflammatione laborantium que
 dieta prescribenda* 210. a
renum morbo contraria 240. a
renum percussorum signa 33. a
renum tumor 122. b 150. b
renibus accommoda 245. b
renibus si lapis innatus fuerit 150. b
replentia corpus que 3. b
reprimentia corpus que 11. a
*resoluentis us, que astricta sunt, malagma
 ta* 27. b 28. b
*rhagadum, id est scissurarum que in sede
 proueniunt, remedia* 46. b 132. a 137. b
 155. b 185. b 239. a
rheda excussis que conferant 148. a
rhetorica cognitio medico necessaria
 159. a
rheumatis fluxus 310. a 105. b 107. b
 111. a
rhopalon 218. a
rhosolinos 212. b
riborasta 215. a
rosaceum collyrium 98. a
rosaceum oleum 233. b
rosa farinosa 217. b
rosa lunonis 220. b
rose uires 233. b 248. b
rosmarinus 96. b
rubee curatio 198. b
rubeta 224. a
rubi folia 104. b
rubi nomina & uires 218. b
ructationibus acidis quid conferat 114. a
ruffum emplastrum 29. a
rugas uetularum tollentia 78. a 233. b
rumex syluaticus 94. a
ruptorum remedia 114. a 214. a 217. a
 230. a 240. b
rusmarina 222. b
rute facultates 101. a 201. b 247. a
 227. a
rute hortensis nomina & uirtutes 219. a
rute montana efficacia 221. b
europaes emplastrum 29. b
sabina nomina 218. b 230. a
tes 218. b
sagittarum protractio 92. b
sal candidus 95. a
salamandra si sumpta 153. a
saluie nomina 220. a 234. b
*in. medici
 nis usus* 220. a 234. b 247. a
sancromaton 213. a
sanguinalis herbe succus 98. b
sanguinaria 213. b
sanguis 33. a 161. a
sanguis uerna tempore crescit 159. b
sanguis e naribus qui eliciatur 225. b
sanguinis consideratio 85. a
sanguinis fluoris consideratio 264. a
sanguinis fluoris differentie 264. b
sanguinis fluor a spu qd differat 264. a
sanguis narium quibus sistitur 100. b
 145. a 169. b 170. a 212. a 219. a 227.
 b 230. b 238. b
sanguinis sedes in corde 159. b
sanguinis profusui causa 7. a
*sanguinis cuiusque profusio sistendo quid
 conferat* 68. a
sanguinis effusio interiorum 303. b
*sanguinis eruptioni sue ex arteria, sue
 ex pulmone uel pectore que accommo-
 da* 110. b 147. a 175. b
*sanguinis ex praevisa uia. nimium defluen-
 tis restrictio* 172. a
*sanguini de ginguis defluenti quo pacto
 succurrendum* 117. a
sanguini euocando passus accommodus
 31. a
*sanguini ex uulneribus erumpenti sistens
 do efficacia remedia* 37. b 92. b 205. b
 234. b 239. a
sanguinem acquirentia 202. b
sanguinem extenuantia 110. a
sanguinem per intestina iactantes 127. b
sanguinem per urinam reddentes 107. b
 108. a 122. b 123. a 147. b 151. a
sanguinem reiciendum dieta 210. a
signa letalia 162. b
*sanguinem reiciendum excreantium ue
 remedia* 26. a 28. a 31. b 67. b 92. b
 102. a 107. b 109. b 110. b 111. a 113. b
 116. b 147. b 175. a et. b 202. b 203. a
 et. b 205. b 206. a et. b 207. a 213. b
 227. a 230. b 233. a 265. b
sanguisuga epota, ne noceat 39. a
sanguisugarum cinis 97. b
sanies 33. a
sanitatis tuende ratio 3. a
sanitati contraria 241. a
santonicum absinthium 225. a

- sapor* 161. b
saporem gratum praestantia 236. a
sapho 218. a
saphtho 212. a
sarcocolla uirtus 97. a
sasogora malagma 28. b
satanaria 219. b
satietas nimia inutilis 31. a
satureia nomina 216. b 234. a
satureia usus 95. b 203. a 216. b
satyrus curatio 300. b
satyrionis nomina & uires 213. b
saxifraga 122. b 216. a
saxifrage uires 220. a
scabiei consideratio 39. a
scabiei curatio 65. b 78. b 156. b 199. a
 216. a 243. a
scalis deuoluti quo pacto curentur 113. a
 148. a
scapularum curatio 173. b
scarabeus smaragdini coloris 95. a
scardia 213. b
scelerata nomina & uires 212. b
secon 213. a
sciate 214. a
sciaticorum remedia 187. a 188. a 202. b
 205. a 214. a 216. b 217. b 219. b 222. b
scies 68. a
scilla nomina & uires 215. b
scilla rubra mascula 215. b
sclearea uirtus 248. a
scitosis 235. a
scolibrocus 216. a
scolopendron 216. a et. b 220. a
scolopendros 122. b
scolymon 219. b 220. a
scolyprochus 220. a
scordium 113. b
scorodon 226. a
scorpiones quo fugentur 203. a
scorpionum morsus remedia 36. a 69. a
 202. b 203. a et. b 204. a et. b 205. a
 206. b 211. b 217. b 221. b 226. a 232. b
 238. a
scorpion herba 221. a
scorpiocton 216. a
scorpius piscis 96. b
*scotomatica passio in quo ab epilepsia dif-
 ferat* 251. b
scotomaticorum consideratio 251. b
scotomaticorum curatio 89. b 112. b 143.
 a 148. a 251. b 302. b
scribonium graece scripsisse 82. b
scrophas tollentia 202. a 227. a 229. a
 237. b
scroli curatio 54. a
scrupulus 163. b
*secunda mulierum, que ex partu, uel ab
 orsu remanserint, quo modo expellantur*
 32. b 77. a 117. a 166. a 211. b 219. b
 226. a 227. a 232. a 239. b 240. a
sedum herba 131. b
sedum magnum 233. a
selibra 158. a

selenogonon 217.b
 selinon 221.b
 selinon agrion 220.b
 seliniophyllon 216.a
 semen cur candidum 162.a
 seminis abundantia qua ratione praeparanda 134.a
 seminis coagulatio 162.a
 seminis concepti formatio 73.b
 seminis nimia profusio quid conferat 25.a 310.a
 semetib 214.a
 semis 158.a
 semineor 214.a
 semperfloridum 222.a
 semperviva 232.b
 semperviva nomina & facultates 222.a
 semiviva 158.a
 senacum febris dieta 210.b
 senecio herba 222.a
 senecionis in medicina usus 98.b 241.b
 senecta quo exiit 232.b
 senectus morbis longis obnoxia 5.b
 sensuum quinque claritas 161.b
 sensus acuentia 11.a 204.a 237.a
 sentice 218.b
 septefolium 221.b
 septembris dieta 162.b
 septeneruia 211.b
 septi transversa percussu signa 33.a
 septuinx 158.a
 serapion 213.b
 seriphium 220.a
 seropodion 222.b
 serpillum 101.b
 serpentis ieiuni ictus ieiuno perniciosus 36.a
 serpentes ne infestent 151.b 203.a 240.b 205.a 219.b 231.b 235.b 238.a & b 242.b
 serpentum morsus remedia 35.b 69.a 115.b 125.b 151.a 201.a 203.a 203.b 204.a 211.b 212.a 213.a 214.a & b 215.a 217.b 218.a 219.b 220.b 222.a 223.a & b 226.a & b 230.b 231.a & b 233.b 237.a 242.b
 serpilli nomina 220.a usus 89.a 205.a 220.a 238.b
 serpillum maius 213.a
 serrata 222.b
 serratula 230.a
 sesamon agrion 216.a
 sesuvium 158.a
 sesquiyathus 158.a
 sestertius 158.a
 sextans 158.a
 sextarius 163.b 164.a
 sextula 158.a
 seccantia corpus qua 4.a
 seccitatum incommoda 5.b
 sicilicus 158.a
 sideritis herba 212.a 214.b 218.a
 sideratione tensatis quid conferat 113.a 148.a

sideritis 216.a
 signa ualerudinis aduersa future 6.a
 signa male affectorum letalia 162.a
 signa agrotantium qua bona 6.a md= 6.b
 signorum in singulis morbis consideratio 7.a
 siliqua 163.b
 siliquarum vires 206.b
 simia morsus quo modo curandus 69.a
 simpeax 211.b
 sinapis vires 204.a 237.a
 singentiana 212.b
 singulenta emedantia 110.b 176.a 178.a 204.a 229.b 231.b
 smilion emplastrum 138.b
 strium 213.a
 strumum remedia 77.b
 stymphii nomina & vires 220.b
 stum sedantia, extinguentiaq; 110.b 178.a 203.b 207.a & b
 smaragdinum emplastrum 29.a
 smyrion 220.b 222.a
 solaginis maioris nomina & vires 217.b
 solaginis minoris nomina & vires 217.b
 sol ne noceat 219.b 220.a 233.a
 in sole exustus balnea petri 3.b
 solidantia carpi qua 11.a
 solidus 163.b
 soluentia qua 202.a
 somi 220.a
 somnia qua tollant 233.a
 somnum conciliantia 11.a 32.a 69.b 113.b 114.a 116.a 172.a 203.a 204.a 207.a 216.b 225.a 233.a 236.a 240.a
 sophosphr 213.b
 sordes purgantia 233.b
 sorpinaca 213.b
 sozusa 213.a
 sparagus rusticus 218.b
 spasmus 229.b
 spasmi morbi remedia 116.a 219.b 22.b 222.b 300.b
 spermatis effusio 310.a
 spayitides uena 19.b
 stalangionum morsus 220.a
 sthragis collyrium 96.a
 spice vires 246.a
 spicula 214.b
 spina ex quacunque etiam corporis parte quo modo extrahenda 137.a
 spina descriptio 58.b
 spina fracta curatio 62.a 64.a
 spleneticorum consideratio 271.b 305.b
 spleneticorum signa letalia 162.b
 spleneticorum remedia 23.a 27.b 67.a 92.b 113.a 116.a & b 118.a 119.a 125.b 129.a 131.a 147.a 148.b 149.b 151.a 154.b 157.a 177.a 179.a 180.a 184.a 201.b 204.b 205.a 206.a

a & b 209.b 213.b 215.a & b 217.a 218.a 219.a & b 231.a 232.a 235.a 238.a 240.a 241.a 271.b 305.a
 splenis descriptio 19.b
 splenis duritia 202.a 203.b 225.b 239.b
 splenis purgatio 231.a
 splenis tumorem emendantia 122.b 228.a 235.a 239.a 240.a 244.b
 splenis uulnerati signa 33.a
 splenem consumentia 241.b
 splenion 219.b
 splenii nomina & usus 216.b
 spodiakon collyrium 93.a 144.a
 spomelidum vires 207.b
 sponsia Africana 101.a
 spuri qua differentia a sanguinis fluore 264.a
 squamae e facie qui tollenda 231.a
 stactum collyrium 98.a 144.b
 statorius 214.a
 staltice 212.b
 staphyle quid 225.b
 stater 83.b
 statunaria 213.b
 steatomata tubercula 49.a
 stella qua te tueatur qua sit 219.a
 stemphis 213.b
 stephane Alexandru 217.a
 stephanos Aphrodites 220.b
 stergethron 215.b 222.a
 sternutamenta mouentia 31.b 203.b 235.a 237.a 242.b
 stigmata qua ratione deleantur 112.a 156.a
 sterfozila 215.a
 stoechis 215.b
 stomachus, os uentris 161.a
 stomachus ne perfrigescat unctio 116.a
 stomachi acrimonia 207.a
 stomachicorum consideratio, curatioq; 270.a
 stomachi descriptio 19.b
 stomachi infirmi indicia 5.a
 stomachi sedes 161.a
 stomachi uaria accidentia 305.b
 stomachi ardore 178.a 202.b 228.b 232.b 233.b
 stomachi carbunculum reprimentia 114.b 177.b
 stomachi collectionibus extenuandis quid conferat 113.b
 stomachi confirmatio 108.a 114.b 117.a 177.a 202.a 203.a 207.a et b 223.b 224.b 227.b 237.a 241.a 244.a 245.b
 stomachi deliquium & fastidium tollentia 114.b 115.a 177.a et b 201.b 202.b 203.a & b 205.b 206.a
 stomachi dolorum remedia 3.a 5.a 22.a 110.b 113.a 114.a & b 115.b 116.a 121.b 125.b 148.a & b 154.b 157.a 173.b 176.b 203.b 204.a & b 213.a 216.a 217.a 219.a 220.b 221.a 222.b 225.

b 225. a 229. b 231. b 241. b 245. b	201. b 203. a 204. a 215. b 222. b	testium pruritus	234. b
stomachi exulceratio	224. a 226. a 227. a 229. b 231. b	testium tumores sedantia	133. b 156. a
stomachi humores noxii quo pellantur	238. a 239. a & b 240. a & b 241. b	204. b 227. b 245. b 235. b 237. b 238. a 242. a	
245. b	suffragio fororum consideratio	testium ulcera	246. b
stomachi inflationes dissoluentia	59. b	testudinis fel	94. b
114. a 115. a 133. a 147. b 148. b	sycarcadana	tetanus	20. b
149. a 157. a 177. a 203. b 207. a	212. b	tetanicorum dieta	209. a
231. a	215. b	tetanicorum remedia	111. a 113. a
stomachi morfus lenientia	40. a 95. b	148. a 243. a 245. a	
232. a 238. b	sylichio	tetragagaplexon emplastrum	29. b 155. a
stomachi nauseas submonentia	65. b	tetrobolon	83. b
147. b 219. b 232. a 232. b	sympliciac herba	tetrasarin	83. b
stomachi percussu signa	96. b	teucron	214. a
stomachi rigor	110. b 217. a	thaboris	214. a
stomachi ructus quo modo curentur	222. a	thapsia radicum usus	131. a
115. a	symplyti nomina	thalamellis confectio	164. a
stomachi scyrosis curatio	101. a 132. b 222. a	thasaria	213. b
stomachi tensura siue defectus	21. a 116. b 172. b	themonestron	212. a
117. b 179. a	synanche	theoni malagma	29. a
stomacho accommoda	208. b	theonis	213. a
66. b 113. b 202. b	synanchicorum curatio	thephis	212. b
203. a & b 204. a 205. b 227. b 230. a 237. a 246. b	205. b 172. b	thereon	213. a
stomacho contraria	159. b	thepha	37. a
stomacho post vomitum infirmo quomodo succurrendum	268. a 275. a	theriomatis curatio	37. a
4. a	synthesi curande	theriophonon	213. a
stomachum calefacientia	175. a	thermos orinos	221. a
177. a	syngiones si quis in carne habuerit	thesmu ostianes	219. a
stomachum laxantia	132. b 211. a	thiophenges	217. b
202. a	Tabis consideratio eiusdemq; cura	thodona	218. a
stomachum solutum astringentia	17. b	thoracis morbi remedia, quere pectoris remedia	
113. b	tabis futura signum	thorybetrion	212. b
115. a 131. b 147. b 157. a 203. b 206. b	taclus	thuris vires	246. a
stomacho existente frigido que seruan- da uelut ratio	161. b	thyatiza	222. b
202. a	tagetes	thymbra	234. b
stomatica medicamentum	212. a	thymi virtutes	205. a
205. b	tali leporini efficacia	thymij remedium	38. b
stomatica malagnata	127. a 128. b	thymiamatis descriptio	167. a
stomaticorum curatio	65. a	thymiamatit	212. a
206. a	tali luxati curatio	thyphonon	213. a
stratiotice	18. a	teuxinon	213. b
stratioticum collyrium	135. a 137. a	teuxitemon	213. b
stricionon manicon	211. b	tibia descriptio	59. b
strophio	153. b	tibiarum uulneribus que adhibenda	206. b
strophos	217. a	tibiarum male affectarum curatio	189. a
struma quid	217. a	215. a	
224. a	tela quomodo e corpore extrahenda	tinearum ab arca repulsio	225. a
strumarum discussio & curatio	45. b	tineas perimentia expellentiaq;	76. b 91. b
28. a	repulsi dentes	128. a 150. b 166. a 181. a 203. a 205. a 215. a 221. a 226. a 235. a & b	
37. b 68. b 92. b 106. a 133. a 139. a	tempora quatuor, siue latitudines causa- rum	tithymali nomina & virtutes	220. b
146. b 157. a 167. b 177. b 200. a 202. a	216. b	tirothos	213. b
212. a & b 214. a 216. a 241. b	temporum variatione nostra respondent corpora	titumen	213. a
242. a	5. b	tonfillarum carbunculis quid conferat	101. b
struthij vires	128. a	tonfillarum uirtum quale	172. a
235. a	tenasmi descriptio	tonfillarum medela	4. b 45. a 106. a 205. b 214. a
subfragum medicamen	24. b 128. a 129. a	topos platyphyllos	212. b
116. a	150. b 182. a 203. a 226. a	torminalis	213. b
sublabium	59. b	toniscoselia	214. a
219. b	terra capillus		
succi boni que & contra	216. b		
10. a & b	terra uenenum herba		
sudorem elicentia	89. a		
9. b 225. b 238. b	terralis		
suggillationibus que prosint	220. b		
156. b 215. a 225. a	terminalis		
suillum lotium	221. b		
133. b	tertiana febris correptis que dieta seruan- da		
suillum stercus	210. b		
133. a	tertiane febris curatio		
superba	15. a 115. b 191. b		
214. a	102. a 211. b 215. b 219. b 223. a 227. a 235. b 243. b		
supercilium terre	213. b		
216. b	testiculus leporinus		
supercilium Veneris	213. b		
218. b	testiculorum natura, & morbi		
supprimendo eo quod abscedit malagma	53. b		
28. a	testiculorum curationes communes, eo- rundemq; incisio		
suppurationum corporis dissipatio	54. a		
133. a	testium siue genitalium male affectorum remedia		
147. b 157. a 216. a	46. b 134. a 188. a 202. a		
217. a	204. b 241. a		
suppiria emendantia	77. b		
21. a 108. a & b			
110. a & b 112. b 115. b 116. a 118. a			
129. a 146. b 147. a 176. a 178. a			

INDEX.

toxatis 213. a
 toxicum si potum ab aliquo 152. b 153. b
 toxitesia 213. a
 toxobolon 213. a
 trachomaticum collyrium 98. a
 trasea chirurgi emplastrum 154. a
 tremulorum diata et cura 136. b 148. a
 trepondo 158. a
 tripolion 163. b
 trichomanes 216. a et b
 trichophyes 216. a
 triens 158. a
 trifolij virtus 90. a
 trigonos 217. b 212. a
 trigoricum 205. a
 triphera medicamentum 155. b
 trissago 214. a 122. a
 trissagion 84. a
 triphonis emplastrum 154. a
 tuberculis que difficulter concoquuntur
 conducens malagma 28. a
 tudeis 163. b
 tumescencia ex se, quo modo excidenda et
 curanda 47. b
 tumorum cuiuscunque partis corporis cu-
 ra 212. b
 tumores corporis maturata dissoluentia q;
 112. b 197. a 200. a 202. a 203. a et b
 206. b 211. b 219. a 222. a 223. b 226.
 a 229. b 232. a et b 235. a et b 237. b
 tussilago 220. a
 tussis consideratio 264. a
 tussis puerorum quomodo depellenda 76.
 a 239. a
 tussim emendanda 21. b 66. b 104. a
 105. b 107. b 113. b 114. a 118. a 131. a
 147. a 173. b 201. b 202. b 203. a 206. b
 207. a 216. a et b 217. a 222. a et b
 224. a 225. b 226. a 227. b 229. b 230.
 a et b 232. a 234. b 235. b 236. a 238.
 b 240. a et b 242. b 243. a et b 245. b
 typhnitis hydropis species 17. a
 tympanites 192. b
 typicus qua ratione prius frigus patitur
 quam febrem 161. a
 typhnos 215. b
 typhonon 212. a
 Valentia 213. a
 valetudinis aduersae futura signa 6. a
 valetudinis longae signa 6. b
 varicum curatio 40. a 58. a 135. a 136.
 a 199. b
 vidonaulion 218. a
 uenarum incidendarum consideratio 163. a
 uenarum ora sanguinem fundentia 30. b
 uenarum purgatio 116. b
 uenas induratas habentibus que accom-
 da 212. a
 ueneni sumpti remedia 31. b 70. a 117. a
 100. b 206. b 207. a 214. a 216. a et b
 217. b 220. b 222. b 223. a 227. b 230.
 a 232. a et b 240. a 244. a 245. b
 uenenis contraria 69. a 70. a 116. a
 152. a 200. b 201. b 204. b 205. a 213.

b 217. b 219. a 230. a 242. b
 uenenis omnibus uel in cibo, uel in potio-
 ne generale remedium 36. a
 uenenato telo si quis percussus 152. b
 uenenis serpentum occurrendis 202. b
 uenenatis moribus accommoda 203. a
 215. a 216. a 218. b 219. a 230. b 232.
 a 234. b 236. a 238. b 239. b 243. a
 245. a et b
 ueneria 212. b
 uenter ut facilis sit 131. a
 uentris animalia excludentia 201. b 202.
 b 203. b 206. a 235. b 238. a
 uentris infirmi note 85. b 160. a
 uentris dolores mitigantia 67. a 85. a
 114. a 125. b 126. b 128. b 139. b 154. b
 160. a 181. a 204. a 211. b 212. a 214. b
 219. b 221. a 227. a 229. b 230. a 239.
 b 280. a
 uentris dolorum signa letalia 192. b
 uentris duritie 157. a 218. a 221. a 230.
 b 280. a
 uentris epiphora 127. a
 uentris grauedo 107. b
 uentris inflatio 280. a
 uentris prurigo 219. b
 uentris salus 280. a
 uentris scyrosi curatio 197. a
 uentris tormina quibus emendentur 24. a
 107. 113. b 117. a 125. a et b 126. a
 127. b 128. b 129. a 147. b 149. a 154.
 b 181. a et b 203. b 205. a 207. a 311.
 b 227. b 231. a 234. a 239. a 240. a
 242. a 245. a
 uentris tumor 225. b 280. a
 uentris consideratio 5. b
 uentriculus escarum receptor 161. a
 uentriculi situs 19. b 161. a
 uentriculorum consideratio 277. a
 uenus quando profic 4. b
 uenerem inhibentia 133. b 202. a et b
 244. b 245. b
 uenerem stimulantia 134. a et b 201. b
 202. a et b 203. a et b 204. b 205. a
 207. a et b 215. b 214. a 215. b 230. b
 232. a et b 234. a 235. a 236. a 238. a
 242. b 244. a 245. b 246. a
 uerbene nomina 243. a
 uerbene in medicinis usus 100. b 101. a
 106. b 114. b 243. a
 uerbenaca 122. b 212. a
 uerbera ne sentiantur 202. b 236. a
 uerendorum uicia 188. a
 ueretri curatio 134. a
 ueretri prurigo 220. a
 ueretri tumor 133. b 156. a
 ueretri ulcera abalienata 102. a
 ueretra que nigredinem duxerint 105. a
 ueris diata 4. a 159. b
 ueris morbi 5. b
 uermis manuum qua ratione curandus
 78. a 196. a
 uerna 163. b
 uernetus herba 100. b

uernilago 221. a
 uernum tempus saluberrimum 5. b
 uerrucaria herba 111. b
 uerruca corporum quo tollantur 70. a
 112. b 135. b 155. b 199. b 203. b
 uertigine capitis laborantium remedia
 87. b 117. a 164. b 178. a 230. a 235. a
 242. b
 uertipedium 212. a
 uesica uulnerata signa 33. a
 uesica dolorum signa letalia 162. b
 uesica contraria 240. a
 uesica difficultatem quid emendet 211. b
 uesica infirma indicia 84. b 85. a 160. b
 uesica exulceratio 122. b 150. b
 uesica morbi remedia 28. b 107. a 115. b
 121. b 122. b 124. b 147. b 150. b 154. b
 160. b 187. a et b 202. b 203. a 205. a
 213. a 215. b 218. b 219. b 220. b 222. a
 223. a 226. a 227. a 229. a 232. b 233.
 a 241. b 242. a 244. a 307. b
 uesica scabies 122. b
 uesica purgatio 67. b
 uesica tumores 122. b 150. b 230. a
 uesica icliui 241. b
 uesicertionis sanguinis usus 129. a
 ueterno laborantibus quid uile 103. b
 uetonica efficacia 95. a 109. b 116. b
 119. a 138. a
 uictoria nomina et uires 217. a
 uictoriatus 158. a
 uictoriatus denarius 85. b
 uictus ratio uniuersalis 211. a
 uigentia 218. b
 uigilanti morbo laborantes 203. a 204. b
 uincopernice herba officia 107. a
 uinum quod cui aetati conueniat 4. a
 uiolarum uirtutes 239. a
 uiperalis 219. a
 uiperarum morsus remedia 212. b 215. a
 uiperina nomina et uires 212. b
 uirga uirilis inflatio 77. b
 uiride emplastrum 29. b
 uisceru dolore conflitantium nota 7. b
 uiscerum ratio 161. a
 uiscerum curatio 115. b 118. a
 uisumari herba uirtus 90. a
 uisus 161. b
 uita ociosa cur inutilis 3. b
 uitalis 222. a
 uutiligo 39. b
 uitis alba 218. a
 uitis cana 220. a
 uiueria 118. a
 ulceratorum que bona mala ue signa 48. a
 ulcus cyromum 195. b
 ulcera que periculosissima 45. a
 ulcera cancerata 207. a
 ulcera Chironia 212. b
 ulcera crescentia qui cohibenda 156. a
 ulcera sordida qui purganda 196. a et b
 133. b 156. a 203. a 228. a 234. a 241.
 a et b
 ulceru capitis remedia 90. a et b 239. a
 ulcerum

ulcerum corporis remedia 28. a 196. a
 212. a 213. b 214. b 215. a 217. b 221.
 b 225. b 230. b
 ulcerum exasperatorum leuatio 27. a
 ulcerum manuum & pedum ex frigore
 ortorum medicine 37. a 155. a
 ulcerum serpentium curatio 90. b 196. b
 227. b 229. b 232. b 241. a
 ulcerum tibi siccande 102. a
 ulcerib. cicatricē inducentia 154. b 156. a
 ulceribus crustas inducentia & resolu-
 tia 26. b
 ulceribus implendis & molliendis que co-
 ferant 13. a 156. a
 ulceribus in tussientium faucibus sanandis
 utile catapotium 32. a
 ulceribus sordidis, etiam cancro laboran-
 tibus, pastilli accomodi 30. b
 in ulceribus carnem nutriencia 27. a
 ulciolaria 218. a
 ulophanos 221. a
 umbilicus Veneris 215. b
 umbilici prominentis remedium 46. a
 umbilici iactis per manum curandis 32. b
 uncia 83. b 158. a 163. b
 unguentiana 212. b
 ungues excussi ut cito resurgant 111. b
 unguium suppuratio 111. b
 unguiū scabrorū detractio 202. a 235. a
 ungula equi herba 109. b
 ungularum dolori curando 189. b
 uocis defectus consideratio 263. a
 uocis amisse reparatio 104. a 112. b 146.
 b 148. a 239. a
 uocis claritati accomoda 23. b 106. a
 203. b 238. a
 uocis purgatio 203. a
 uocem firmantia 237. b
 uomica interanea 147. b
 uomicarum curatio 68. b 110. b 121. a
 133. a 148. a 157. a 196. b
 uomitus ieiunius probatur 84. a
 uomitus cur ab Asclepiade reprobatus
 4. a
 uomitus consideratio 4. a
 uomitum prouocantia 4. a 66. b 84. b
 110. b 235. a sistencia 177. b 178. a
 & b 241. a
 uomitum que sequantur comoda 161. a
 upupa usus 130. a
 ura 213. b
 ura scorpii 216. a
 urine animaduersionio 7. b
 urine prognostica 85. a
 urine difficultate laborantium signa le-
 talia 162. b
 urine difficultati quibus succurrendum
 11. a 23. b 55. b 67. b 77. a 109. b 114.
 a 118. a 122. b 123. a & b 124. a 125.
 b 160. b 201. b 202. b 203. b 204. a &

b 205. a & b 206. b 207. a & b 213.
 a 216. b 219. a 220. b 221. a 222. a
 223. b 224. a 225. b 228. b 229. b 231.
 a 232. a 234. b 235. a 237. a 238. b
 239. a 240. b 241. a 242. b 245. b
 246. a
 urine sanguinolenta remedium 122. b
 123. a
 urinam non continentium medela 124. b
 182. a
 urinus adepi 122. a
 urtica unde dicta 225. b
 urtica nomina ibid.
 urtica uires 101. a 114. a 117. a 225. b
 ustilago 221. a
 ustilago rustica 217. b
 usube 214. b
 uteri tumori 238. a
 uua Taminā 217. b
 uua qua ratione manu curetur 52. a
 uua faucium medela 66. b 204. a & b
 238. a
 uua inflammata conducēs pastillus 30. b
 uua penitus minuenda quid conferat
 105. a
 uua stillantis remedia 105. a 117. a 171. b
 uua tumoris curatio 104. a 146. a 201.
 a 225. b 238. b
 uua laborantibus que signa letalia 162. b
 uua casus 78. a
 uulgago 240. b
 uulneratorum diæta 34. a
 uulneris ligatio 34. a
 uulneri quomodo cicatrix inducenda 35.
 a 206. b
 uulnera Chironia 214. a
 uulnera ex se nascentia 216. b
 uulnera oris 238. b
 uulnera que conglutinant 26. a 30. b
 33. b 129. a 195. b 203. b 206. a 212. a
 214. b 242. b
 uulnera humida que desiccant 227. a
 240. a
 uulnera insanabilia que 12. b
 uulnera interaneis innata 206. b
 uulnera que iuxta curationis, & contra
 32. b
 uulnerum animaduersiones & nota 32.
 b 34. a
 uulnerum corporis curatio 29. a & b
 34. a 68. b 70. a 154. a 162. b 169. b
 195. b 202. a 204. b 211. b 214. b 215.
 a & b 217. b 218. b 225. a 227. a
 229. b 230. a & b 234. b 237. b 242. a
 243. b 244. a 246. a & b
 uulnerum inflammationi quo modo suc-
 currendum 33. b
 uulnerum sordidorum purgatio 26. b
 34. b 202. a 203. a 204. b 212. a 225. b
 227. a 228. b 229. a & b 230. a 240. a

241. 242. b 246. a
 uulnerum, que morsu sunt, curationes
 35. b
 uulneribus aperiendis que conferant 26. a
 uulneribus carni excrescenti arceda que
 usurpanda 205. b 229. b
 uulneribus cauatīs carnē reddentia 34. b
 155. a 196. a 202. a 206. a 229. a
 233. b
 uulneribus in mento nascentibus curan-
 dis 102. a
 uulneribus canceratis que adhibenda
 204. b
 uulneribus capitis ad cicatricem perducen-
 dis 165. b
 uulneribus in capite natis liniendis 206. a
 uulneribus non grauib., & maxime se-
 nilibus accommoda emplastra 30. a
 uulneribus tibiariū que conferant 205. b
 uulpecula iecur 120. b
 uulue descriptio 19. b
 uulue malē affecta utile emplastrū 92. b
 uulue morbus eiusdemq; medela 25. a
 125. b 149. b 204. b 224. a 233. b 240. b
 uulue mulierum contractæ resolutio 102.
 a 203. a
 uulue inflatio 76. b
 uulue inflammationi tollende utilis pes-
 sus 31. a
 uulue molliende accommodus pessus 31. a
 uulue percussa signa 33. a
 uulue pruritus 73. a 234. b
 Xelection 212. a
 Xenon 40. a
 xerocollyrium 93. b 94. b
 xerocollyrii confectio 98. a
 xeron polyticon 196. a
 xerophthalmie curatio 42. b 94. b
 xesus 84. a
 xilolotos 212. a
 xiphij nomina & uires 216. a
 xylophyron 217. a 222. a
 ξυλοφυρον 206. a
 ξυλονεικταλον 20. a
 ξυλονεικτα 50. b
 Zaclia 213. b
 Zenis 219. b
 zedost 245. b
 zimicum 217. b
 zinziberis uires 245. a
 ziziphorum uires 206. a
 zona curatio 113. a 198. b 148. b 156. b
 zoophthalmos 222. a 233. a
 zopyre antidotus 118. a 152. a
 zoster 198. b
 ζωστηρ 161. b
 zygis 220. a
 zyred 213. a

X Hic index reformandus est, & de integro
 concinnandus, toti volumini certior &
 correctior / accommodandus.

Titulus in his libris p[re]figendus, tota facie occupans,
 sic est p[re]fixus.

Auli, sive Aurelij Cornelij Celsi
 De re medica libri octo,
 operis ab eo scripti de artibus,
 pars sexta.

(marcellus & stephanus)
 Intus excudendum, confut[urum]
 exemplaribus Hen. Stephani,
 Tornesij, & si qua sunt eme-
 datiora, & varias lectiones
 amota: mihi enim non parcat
 istis leuioribus curis intendere.
 Interim tamen Celsum in Stephanij codice
 diligenter.

Cornelius Celsus medicorum princeps, non solum de ip[s]o omnia d[ic]it, et
 artibus, sed amplius re militari, & rusticis, et de medicina precepta reliquit.
 Eius res, ut p[ro]posito, ut cum fere omnia ista credamus, ait fab. Celsi in
 lib. 1. cap. 1. quibus ob id plura in his medicorum Columella inter
 antiquos in rusticis absumitur.

+ Ego male passim correxi origina per librum,
 ut debet scribi, per j. sic esse finatur.

AURELIJ CORNELIJ CELSI
ARTIVM LIBER SEXTVS, IDEM MEDICINAE LIBER PRIMVS.

Praefatio.

TALIMENTA fanis corporibus agricultura, sic sanitatem agris medicina promittit. hanc quidem nusquam non est. siquidem etiam imperitissimae gentes, herbas, aliaque prompta in auxilium uulnerum, morborumque nouerunt. Verūtamen apud Græcos aliquantò magis, quàm in cæteris nationibus, exculta est. ac ne apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos sæculis: utpote cum uetustissimus auctor Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc rudem, & uulgarem hanc scientiam paulò subtilius excoluit, in deorum numerum receptus est. Huius deinde

duo filij, Podalirius, & Machaon, bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem cõ militonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij, sed uulncribus tantummodò ferro, & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has partes medicinæ solas ab his esse tentatas, easque esse uetustissimas. Eodemque auctore, disci potest, morbos tum ad iram deorum immortalium relatos esse, & ab iisdem opem posci solitam. uerique simile est, inter non nulla auxilia aduersæ ualitudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse, ob bonos mores, quos neque defidia, neque luxuria tentant. siquidem hæc duo, corpora prius in Græcia, deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim apud Græcos, neque apud alias gentes necessaria, uix aliquòs ex bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus retuli, non nulli clari uiri medicinam exercuerunt, donec maiore studio, literarum disciplina agitari coepit. quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia sapientiz pars habebatur: ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio, sub iisdem auctoribus nata sit; scilicet ijs hanc maxime requirentibus, qui corporum suorum robora, quæta cogitatione, nocturnaue uigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiz professoribus peritos eius fuisse accepimus; clarissimos uero ex his, Pythagoræ, & Empedoclem, & Democritum. Huius autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cõus, prius quidem ex omnibus memoria dignus, ab studio sapientie disciplinam hanc separauit: uir & arte, & facundia insignis. Post quem, Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus, & Erasistratus sic artem hæc exercuerunt, ut etiam in diuersas curandi vias processerint. Iisdemque temporibus, in tres partes medicina diducta est, ut una esset quæ uictu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primam dixerunt, secundam quæ uictu, tertiam quæ medicamentis, Græci nominauerunt. Eius autem, quæ uictu morbos curat, longè clarissimi auctores etiam alius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ sibi cognitionem uendicauerunt; tanquam sine ea, trunca, & debilis medicina esset. Post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu tantum, & experimentis eam posuit. quem Apollonius, & Glaucias, & aliquantò post, Heracides Tarentinus, & aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione, se ipsos appellauerunt. Sic in duas partes, ea quoque quæ uictu curat, medicina diuisa est, alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi uendicantibus; nullo uero quidquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades, medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoque quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros, salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus ut difficilissima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est, quod alijs sibi experimentorum tantummodò notitiam necessariam esse contendunt: alijs, nisi corporum, rerumque ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est, quæ maxime ex utraque parte dicantur, quo facilius nostra quoque opinio interponi possit. Igitur ij, qui rationalem medicinam profitentur, hæc necessaria esse proponunt, abditarum, & morbos continentium causarum notitiam, deinde euentiam, post hæc, etiam naturalium actionum, nouissime partium interiorum. Abditas causas uocant, in quibus requiritur, ex quibus principijs nostra corpora sint; quid secundam, quid aduersam ualitudinem faciat. Neque enim credunt posse eum scire, quomodo morbos curare conueniat, qui, unde hi sint, ignoret: neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs, uel superans aliquid, uel deficiens, aduersam ualitudinem creat (ut quidam ex sapientiz professoribus dixerunt). Alia si in humidis omne uitium est, ut Herophilo uisum est: alia si in spiritu, ut Hippocrati: alia si sanguis in eas uenas, quæ spiritui accommodata sunt, transfunditur, & inflammationem, quam Græci φλεγμονή nominant, excitat: eaque inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est, ut Erasistrato placuit. alia si manantia corpuscula, per inuisibilia foramina subsistendo, iter claudunt, ut Asclepiades contendit. Tum uero rectè curaturum, quem prima origo causæ non defellerit. Neque uero inficiantur experimenta quoque esse necessaria: sed ne ad hæc quidem aditum fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione, contendunt. Non enim quilibet antiquiores uiros ægris inculcasse: sed cogitasse, quid maxime conueniret: & id usu explorasse, quod antè coniectura aliqua duxisset, neque interesse, an initia pleraque explorata sint, si a consilio tamen coeperunt. & id quidem in multis ita se

Aurelij Corn. Celsi.

habere. Sæpe uero etiam noua incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc usus ostendit: & ideo necessarium sit, animaduertere, unde ea coeperint; sine quo, nemo mortalium reperire possit, cur hoc, quam illo potius utatur. & ob hæc quidem, in obscuro positas causas persequuntur. Euidentes uero has appellant, in quibus querunt, in ipsum morbi calor attulerit, an frigus, fames, an satietas, & quæ similia sunt. Occursum enim uisio dicunt, cum, qui originem non ignorant. Naturales uero corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus, & emittimus, cibum, potionemque, & assumimus, & concoquimus. Itemque per quas, eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur, quæ requirunt etiam, quare uenæ nostræ modo submittant sese, modo attollant: quæ ratio somni, quæ uigiliæ sit. sine quorum notitia neminem putant uel occurrere, uel mederi morbis, inter hæc nascētibz, posse. Ex quibus, quia quam maxime pertinere ad rem concoctio uidetur, huic potissimum insistant, & diuice alij Erasistrato, attenti cibum in uentre contentum: alij, Plistonico Praxagoræ discipulo, putrescere: Alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui omnia ista uana, & superuacua esse proponunt: Nihil enim concoqui, sed crudam materiam sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant: Illud uero conuenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc alium, si illud uerum est. Nam si teritur intus, cum quærendum esse, qui facillime teri possit. Si putrescit, eum, in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maxime calorem moueat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur: Ea uero sumenda, quæ maxime manent, quæ assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus grauis est, cum somnus aut uigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eueniant, perceperit. Præter hæc cum in interioribus partibus & dolores, & morborum uaria genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse, incidere corpora mortuorum, eorumque uiscera, atque intestina scrutari. Lōgēque optime fecisse Herophilum, & Erasistratū, qui nocentes homines a regibus ex carcere acceptos, uiuos inciderint, considerantque, etiam spiritu manente, ea quæ natura ante clausisset, eorumque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duri-ritiem, molliem, leuiorem, contactum, processum deinde singulorum, & recessus; & siue quid inseritur alteri, siue quid partem alterius in se recipit. Neque enim, cum dolor intus incidit, scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque uiscus intestinum ue sit, non cognouerit: Neque curari id quod ægrū est, posse ab eo, qui, quid sit, ignoret. Et cum per uulnus alicuius uiscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusque colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corruptis aptiusque extrinsecus imponi remedia, compertis interiorum & sedibus, & figuris, cognitaque eorū magnitudine, similesque omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neque esse crudele, sicut plerique proponunt, hominum nocentium, & horum quoque paucorum supplicij, remedia populis innocentibus & sculorum eorum omnium queri. Contra hi, qui se experientia ab experientia nominant, euidentes quidem causas, ut necessarias amplectuntur, obscurarum uero causarum, & naturalium actionum quæstionem ideo superuacua esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura sit, non posse uero comprehendere, patere ex eorum, qui de his disputant, discordia, cum de ista re, neque inter sapientiz professores, neque inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? Cur huic potius, quā Asclepiadi? Si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non improbabiles. Si curationes, ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatē. Ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquā fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiz studiosos, maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorū genera medicinz; & aliud opus esse Romæ, aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ facerēt ubique, remedia quoque ubique eadem esse debuissent. sæpe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, uulneris, neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiiciat euidentis causa, multo minus eam posse subijcere, quæ in dubio est. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilis sit, a certis potius, & exploratis petendum esse præsidium, id est his, quæ experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere. Eo quoque disci, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint, id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque a naturalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant, sed ab experimentis, pro ut cuique responderant, medendi uias traxerint, ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinā, sed ab experimentis. Aegrorū enim, qui sine medicis erant, alios, propter auiditatem, primis diebus protinus cibum assumpsisse, alios, propter fastidium, abstinuisse, leuatumque magis eorum morbum esse, qui abstinuerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem eius: optime deinde uiscesisse, qui post finem febris id fecerunt. Eademque ratione, alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiorēque eos factos, qui se impleverunt. Hæc similiaque cum cotidie inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerunque melius responderent; deinde ægotantibus ea præcipere coepisse. sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciofa discernentem a salutaribus. Repertis deinde medicinz remedijs, homines de rationibus eorum differere coepisse; nec post rationem medicinam esse inuentam; sed post inuentā medicinam, rationem esse quæsitā. Requiere etiā si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, superuacua esse, si aliud, etiam contraria. Primo tamen remedia exploranda summa cura fuisse. nunc uero iam explorata esse; neque ulla, aut noua genera morborum repenni, aut nouam desiderari medicinā. Quod si iam incidat mali genus aliquod ignotū, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscuris, sed

nullius causæ notitiā quidquā ad curationes pertinere; satisque esse, quædam communia morborum
 intueri. si quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo
 parum excernere ægros, modo nimium; modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morbo-
 rum modo acuta esse, modo longa; & modo incrementum, modo consistere, modo minui consueverunt. Co-
 gnito igitur eo, quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse; si profluvio laborat, continendū;
 si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. & aliter acutis morbis medendū, ali-
 ter vetustis, aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obser-
 natione medicinam esse; quam ita finiunt, ut quasi viam quandā (quam *πρόδος* Græci nominant) eorumque,
 quæ morbis communia sunt, contemplatricem esse contendunt; ac neque rationalibus se, neque experi-
 menta tantum spectantibus annumerari uolunt, cum ab illis eo homine dissentiant, quod in coniectura
 rerum latentium, nolunt esse medicinam; ab ijs, eo quod parum artis, esse in observatione experimentorū
 credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primū ipsa euidetia, eius opinioni repugnat; quia raro, nisi post
 horum aliquid morbus uenit. Deinde non sequitur, ut quod aliū non afficit, aut eundem aliās; id ne al-
 teri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, uel ex infirmitate
 eius, uel ex aliquo affectu, quæ uel in alio non sunt, uel in hoc aliās non fuerunt. eaque per se non tanta
 ui concitant morbum; tamen obnoxium magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si contemplationem
 rerum naturæ (quam temere medici sibi uendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino
 ob unam causam fieri; sed id pro causa apprehēdi, quod contulisse plurimum uidetur. Potest autem id, dū
 solum est, non mouere, quod iunctum alijs maximè mouet. Accedit ad hæc, quod ne ipse quidē Erasistra-
 tus, qui trāsuso in arterias sanguine febre fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere repperit; cur
 ex duobus æque repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo uacant (quod cotidie fieri appa-
 ret) non discreuerit. Ex quo disci potest, ut uera sit illa transfusio; tamē illam non per se, cum plenum cor-
 pus est, fieri, sed cum horum aliquid accesserit. Themisonis uerò æmuli, si perpetuæ quæ promittunt, ha-
 bent, magis etiam quā ulli, rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius pro-
 bat, protinus alio nouo nomine artis indiget: si modò, quod primum est, non memorizæ soli, sed rationi
 quoque insitit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta medicinalis ars recipit, iidem sunt,
 quod u, quos experimenta sola sustinent; eo magis, quoniam si compresserit aliquem morbus, an fude-
 rit, quilibet etiam imperitissimus uidet. Quid autem compressum corpus resoluat, quid solutum teneat, si
 a ratione tractum est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est, ab expe-
 rientia; empiricus est. Ita apud eum, morbi cognitio extra artē; medicinæ intra usum est. Neque adiectū
 quidquā empiricorum professioni, sed demptum est; quoniam illi multa circumspectant; ij tantum facili-
 ma, & non plus quā uulgaria. Nam & ij, qui pecoribus ac iumentis medentur, cum propria cuiusque ex-
 tem medicinæ rationem non nouerint, communia tantum uident. Et quæ ample ualitudinarios nutriunt,
 quia singulis summa cura consulere non sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque Hercules, istud
 & antiqui medici nescierunt, sed ijs contenti non fuerunt. Ergo etiam uetustissimus auctor Hippocrates
 dixit mederi oportere, & communia, & propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professio-
 nem consistere ullo modò possunt. si quidem & compressorum, & fluentium morborum genera diuersa
 sunt, faciliusque id in ijs, quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim, sanguinem, aliud bilem, aliud cibum
 uomere; aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare; aliud sudore digerere, aliud tabe consumi: Atque in
 partes quoque humor erumpit, ut in oculos, auresque. quo periculo nullum humanum membrū uacat:
 nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in ijs a cōmuni fluētis morbi cōtemplatione ad pro-
 priam medicinam descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est, quia
 non eadem omnibus etiam in similibus casibus opitulantur. si quidem certæ quædam res sunt, quæ in plu-
 ribus uentrem aut astringunt, aut resoluunt; inueniuntur tamen in quibus aliter, atque in ceteris, idē eue-
 niat. In his ergo communium inspectio contraria est, priorum tantum salutaris, & causæ quoque esti-
 mario sæpe morbum soluit. Ergo etiā ingeniosissimus sæculi nostri medicus, quē nuper uidimus, Cassius,
 febricitanti cuidā, & magna siti affecto, cū post ebrietatē eū premi corpisse cognosceret, aquā frigidā inges-
 sit; quæ ille epota, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrē somno & sudore discussit. Quod auxi-
 lium medicus opportunè prouidit, non ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat, sed ex causa, quæ
 ante præcellerat. Estque etiam proprium aliquid & loci, & temporis, istis quoque auctoribus; qui cum di-
 sputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit; præcipiunt, ut grauib; aut locis, aut temporibus,
 magis nitetur frigus, æstus, siccitas, labor, libido; magisque ut conquelescat iisdem aut locis, aut tempori-
 bus, si quis grauitatem corporis sentit; ac neque uomitu stomachum, neque purgatione aluum sollicitet.
 Quæ uera quidem sunt; a communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uo-
 lunt, sanis quidē considerandum esse, quod cōlum, quod tempus anni sit; ægris uerò nō esse, quibus tantò
 magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morbo-
 rum in iisdem hominibus aliæ, atque aliæ proprietates sunt; & qui secundis aliquando frustra curatus est,
 ero nam famem facilius fert adolescens, quā puer, facilius in densa ætate, ex quibus, contentus uno
 quā ætate, facilius unō cibo, quā prandio quoque assuetus, facilius in exercitatu, quā in tenni; facilius in hyeme
 sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam tolerat. Ob quæ com-
 petit

petit, eum qui propria nō nouit, communia tantum intueri debere; eumque qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed ijs quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utiliore tamen medicum esse amicū, quā extraneum. Igitur ut ad propositum meum redeam, rationalem quidē puto medicinam esse debere; instrui uero ab euentibus causis; obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, & crudele, & superuacuum est; mortuorum corpora discentibus necessarium. Nam positum, & ordinem nosse debent; quæ, cadauera melius, quā uiuus & uulneratus homo representant; sed & cætera, quæ modo in uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo rarius, sed aliquando miris, usus ipse monstrauit. His propositis, primum dicam quemadmodum sanos agere conueniat; tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

Quemadmodum sanos agere conueniat.

Cap. I.

Sanus homo, qui & bene ualet, & suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatroscripta egere. Hunc oportet uarium habere iuxta genus, modò ruri esse, modò in urbe, sepiusque in agro, nauigare, uenari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat, labor firmat. illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò id ipsum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utatur, interdum in conuiuio esse, interdum ab eo se retrahere, modò plus iusto, modò non amplius assumere, bis die potius, quā semel cibum capere, & semper quāplurimum, dummodò hūc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibi que necessarij sunt, sic athletici superuacui; hā & intermissus, propter ciuiles aliquas necessitates, pro exercitationis, corpus affligit; & ea corpora, quæ more eorū repleta sunt, celeritē & senescunt, & ægrotant. Concubitus uero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus, corpus excitat; frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis, scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idē interdum peior est, noctu tutior, ita tamen, si neque illum cibus, neque hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc firmis seruanda sunt; cauendumque ne in secunda uale tudine, aduersa præsidia consumantur.

Quæ stomacho imbecilli seruanda sint.

Cap. II.

At imbecillis stomacho (quo in numero magna pars urbanorum, omnesque pene cupidi literarū sunt) obseruatio maior necessaria est, ut quod uel corporis, uel loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex ijs igitur, qui bene concoxit, manē tuto surget, qui parum, quiescere debet, & si manē surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui crudum sine præcordiorum dolore ructat, is ex interuallo aquam frigidam bibere, & se nihilominus continere. Habitare uero ædificio lucido, perflatum æstiuum, hibernum solem habente; cauere meridianum solem, matutinum & uespertinum frigus; itemque auras fluminum, atque stagnorum, minimeque nubilo cælo, soli aperienti se committere, ne modò frigus, modò calor moueat, quæ res maxime grauedines, distillationesque concitat. Magis uero grauibis locis ista seruanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet integrum corpus esse, cū quotidie manē urina alba, dein ruffa est. Illud, concoquere, hoc, concoxisse significat. Vbi experrectus est aliquis, paulum intermittere; deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiani potius ante cibum; sin minus, post eum, per hycmem potissimum, totis noctibus conuiescere. Sin tucubrandum est, non post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdum uel domestica, uel ciuilia officia tenuerūt, huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio, exercitatio est; quæ semper antecedere cibum debet, in eo, qui minus laborauit, & bene concoxit, amplior, in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Commodè uero exercent clāra lectio, arma, pila, cursus, ambulatio; atque hæc non utique plana, commodior est, siquidem melius ascensus quoque & descensus cum quadam uarietate corpus moueat; nisi tamen id perquam imbecillum est, melior autem est sub diuō, quā in porticu. melior, si caput patitur, in sole, quā in umbra. melior in umbra, quā parietes, aut uiridaria efficiunt, quā quæ recto subest, melior recta, quā flexuosa. Exercitationis autem plerunque finis esse debet sudor; aut certe lassitudo, quæ citra fatigationem sit; idque ipsum modò minus, modò magis faciendum est. Ac ne ijs quidem athletarū exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor debet. Exercitationē recte sequitur modò unctio, uel in sole, uel ad ignem, modò balneum, sed conclauī quā maxime, & alto, & lucido, & spatiofo. Ex his uero neutrum sepe fieri oportet; sed sepius alterutrum, pro corporis natura. Post hæc paulum conuiescere opus est, ubi ad cibum uentum est, nunquam utilis est nimia satietas; sæpe etiam inutilis nimia abstinentia, sæpe, si qua intemperantia subest, tutior est in potione, quā in esca. Cibus a salsamentis, oleis, similibusque rebus melius incipit. Tum caro assumenda est; quæ assa optima, aut elixa est. Conditæ omnia duabus de causis inutilia sunt: quoniam & plus propter dulcedinem assumitur; & quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet; in imbecillo coacescit, si quis itaque hoc parum ualet, palmulas, pomaque, & similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones,

Aurelij Corn. Celsi.

quæ aliquantulum firim exceſſerunt, nihil edendum eſt. poſt ſatieta- tem, nihil agendum. Vbi expletus eſt aliquis, facilis concoquit, ſi quidquid aſſumpſit, porione aquæ frigidæ includit; tum pauliſper muſgilat, deinde bene dormit. Si quis interdum ſe implebit, poſt cibum, neque frigori, neque æſtui, neque labori ſe debet committere. neque enim tam facile hæc inani corpore, quam repleto, nocent. Si quibus de cauſis futura inedia eſt, labor omnis vitandus eſt.

Obſervationes quædam prout res nouæ accidunt, & prout corporum genera, & ſexus, & ætates, & tempora anni ſunt. Cap: III.

Atque hæc quidem penè perpetua ſunt. Quædam autem obſervationes deſiderant & nouæ res, & cor-
porum genera, & ſexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex ſalubri loco in grauem, neque ex graui
in ſalubrem tranſitus ſatis tutus eſt. Ex ſalubri in grauem, prima hyeme; ex graui in eum, qui ſalubris eſt,
prima æſtate tranſire melius eſt. Neque uerò ex multa fame nimia ſacietas, neque ex nimia ſacietate, fames
idonea eſt. Periclitaturque & qui ſemel, & qui bis die cibum incontinenter, contra conſuetudinem aſſu-
mit. Item neque ex nimio labore, ſubitum otium; neque ex nimio otio, ſubitus labor ſine graui noxâ eſt.
Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet aſſueſcere. Omnem etiam laborem facilius uel puer,
uel ſenex, quam inſuetus homo ſuſtinet. Atque ideo quoque nimis otioſa uita, utilis non eſt; quia poteſt
incidere laboris neceſſitas. Si quando tamen inſuetus aliquis laborauit; aut multo plus, quam ſolet, etiam
ſi qui aſſueuit, huic ieiunio dormiendum eſt; multo magis, ſi etiam os amari eſt, uel oculi caligant, aut uen-
ter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio eſt, ſed etiam in poſterum diem per-
manendum; niſi citò id quies ſuſtulit. Quod ſi factum eſt, ſurgere oportet, & lente paululum ambulare.
At ſi ſomni neceſſitas non fuit, quia modicè magis aliquis laborauit; tamen ingredi aliquid eodem modo
debet. Communia deinde omnibus ſunt poſt fatigationem cibum ſumpturis, ubi paulum ambulauerunt,
ſi balneum non eſt, calido loco, uel in ſole, uel ad ignem ungi, atque ſudare. ſi eſt, ante omnia in tepidario
reſidere. Deinde ubi paulum conquiuerunt, intrare, & deſcendere in ſolium, tum multo oleo ungi, leni-
terque perfricari iterum in ſolium deſcendere. Poſt hæc, os aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum uis
feruens idoneum non eſt. Ergo ſi nimium alicui fatigato penè febris eſt, huic abunde eſt loco tepido de-
mittere ſe in uinibus tenuis in aquam calidam, cui paulum olei adiectum; deinde totum quidem corpus,
maximè tamen eas partes, quæ in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, & paulum contriti-
ſalis ſit adiectum. Poſt hæc omnibus fatigatis, aptum eſt cibum ſumere, eoque humido uti, aqua, uel certe
diluta porione eſſe contentos, maximèque ea, quæ moueat urinam. Illud quoque noſſe oportet, quod ex
labore ſudanti frigida potio pernicioſiſſima eſt; atque etiam cum ſudor ſe remiſit, itinere fatigatis, inutilis.
A balneo quoque uementibus, Aſclepiades inutilem eam indicauit, quod in ijs uerum eſt, quibus alius
facile, nec tuto reſoluitur, quique facile inhorreſcunt, perpetuum in omnibus nō eſt, cum potius natura
le ſit, porione æſtuantem ſtomachum refrigerari, frigentem caleſcere, quod ita præcipio, ut tamen fatear ne
ex hac quidem cauſa ſudanti adhuc frigidum bibendum eſſe. Solet etiam prodeſſe poſt uarium cibum, fre-
quentesque dilutas poriones uomitus, & poſtero die longa quies, deinde modica exercitatio: Si aſſidua fa-
tigatio urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum eſt; raroque balneo utendum. Leuatque laſſi-
tudinem etiam laboris mutatio; eumque, quem nouum genus eiſdem laboris preſſit, id quod in conſue-
tudinē eſt, reſicit. Fatigato quotidianum cubile tutiſſimum eſt, in ſolium contra laſſat, quod enim contra
conſuetudinem eſt, nocet, ſeu molle, ſeu durum eſt. propriè quædam ad eum pertinent, qui ambulando fa-
tigatur. Hunc reſicit in ipſo quoque itinere, frequens inſitio, poſt iter, primum ſedile, deinde unctio; tum
calida aqua in balneo magis ſuperiores partes, quàm inferiores foueat. Si quis uerò exuſtus in ſole eſt; huic
in balneum protinus eundem eſt, perfundendumque oleo corpus, & caput, deinde in ſolium bene calidū
deſcendendum eſt, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrigit,
opus eſt in balneo primū inuolutū ſedere, donec infudet; tum ungi, deinde lauari, cibum modicum, deinde
poriones meracas aſſumere. Is uerò qui nauigauit, & nauſea preſſus eſt, ſi multam bilem euomuit, uel ab-
ſtinere cibo debet, uel paulum aliquid aſſumere. Si pituitam acidam effudit, utique ſumere cibū, ſed aſſue-
to leuiorem. Si ſine uomitu nauſea fuit, uel abſtinere, uel poſt cibū uomere. Qui uerò toto die, uel in uehi-
culo, uel in ſpectaculis ſedet, huic nihil currendum, ſed lente ambulandum eſt: Lenta quoque in balneo
mora, dein cœna exigua prodeſſe conſueuerunt. Si quis in balneo æſtuet, reſicit hunc ore exceptum, & in
eo retentum acetum, ſi id non eſt, eodem modo frigida aqua aſſumpta. Ante omnia autem, norit quilibet
naturam ſui corporis; quoniam alij graciles, alij obefi ſunt; alij calidi, alij frigidioreſ, alij humidi, alij ſicci.
Tenuis uerò homo implere ſe debet, plenus extenuare; calidus refrigerare, frigidus caleſcere; madens ſicca-
re, ſiccus madefacere, itemque aluum firmare, ſi cui ſuſa: ſoluere, ſi cui aſtriſta eſt. Succurrendumque ſem-
per parti maximè laboranti eſt. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, unctio: & ſi
poſt prandium eſt balneum, contraſta aluus, modicum frigus hyeme, ſomnus & plenus, & non nimis lon-
gus, molle cubile, animi ſecuritas, aſſumpta per cibos, & poriones maximè dulcia & pingua, cibus & fre-
quentior, & quantus pleniffimus poteſt concoqui. Extenuat corpus aqua calida, ſi quis in eam deſcendit,
magisque ſi laſſa eſt: in ieiunio balneum inurens ſol, & omnis calor, cura, uigilia, ſomnus nimium uel bre-
uis, uel longus; lectus per æſtatem terra; hyeme durū cubile: curſus, multa ambulation, omniſque uehementis
exercitatio,

exercitatio, uomitus, deiectio, acide res & austere, & semel die assumptæ epule, & uini non perfrigidi, ie iuno potio in consuetudinem adducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectione, de his quoque proprie quedam dicenda sunt. Eiectum esse ab Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate composuit, uideo. neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quod ridie cunctando uorandi facilitatem moliantur. paulo etiam longius processit; idem purgationes quoque eodem uolumine expulit. & sunt hæc perniciose, si nimis ualentibus medicamentis sunt. Sed hæc tamen submouenda esse, non est perpetuum: quia corporum, temporumque ratio potest ea facere necessaria, dum & modo, & non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid iam corruptum esset, expelli debere confessus est. Ita non ex toto res coudemnanda est: sed esse eius etiam plures causas possunt. estque in ea, quædam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam æstate: Nam tum & pituitæ plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. utilis est plenis, & biliosis omnibus, si uel nimium se repleverunt, uel parum concoxerunt. nam siue plus est, quam quod concoqui possit; periclitari, ne corruptatur, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua uia primum expelli potest, eijcere. Itaque ubi amari rictus cum dolore, & grauitate præcordiorum sunt; ad hunc protinus confugiendum est. Item prodest ei, cui pectus esthiat, & frequens salua, uel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterque ei, qui uel coelū, uel locū mutat; hisque, quibus, si per plures dies non uomierunt, dolor præcordia infestat. Neque ignoro, inter hæc præcipi quiete. quæ non semper contingere potest, agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor: interdum ualitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui ualere, & senescere uolet, hoc quotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam antè debet assumere; si difficilius, aquæ, uel salis, uel melis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, antè bibere mulsum, uel hyssopum, aut esse radiculam debet: deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed huius idonei, gustandum; & aquæ frigide cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit; qui uomit, si manè id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde coenare. si post coenam, postero die lauare, & in balneo sudare. hinc proximus cibus, mediocriter utilior est; isque esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, & carne assa, cibusque omnibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense uult, melius consulet, si biduo continuari, quam si post quintum decimum diem uomuerit; nisi hæc mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamento quoque petenda est, ubi uenter suppressus, parum reddit. ex eoque inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala crescunt. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies, & inedia, quæ per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum cibis, uinisque utitur his, quæ hoc præstant. dehinc si parum illa proficiunt, aloem sumat. Sed purgationes quoque ut interdum necessariae sunt; sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non aliud corpus; & ob hoc infirmum erit; cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem unctio, aqua salta, magisque si calida est: omnia salta, amara, carnosa: si post cibum est balneum, uinum austerrum. Refrigerat in ieiunio, & balneum, & somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida; aqua quam frigidissima, oleum si aquæ miscetur. Humidum autem corpus efficit labor maior, quam ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hac ambulatio, & uigilia. Per se quoque ambulatio multa, & uehemens, & maturina exercitatio, & non protinus cibus adiectus; ea genera esse, quæ ueniunt ex locis frigidis, & pluuijs, & irriguis. Contra siccit modica exercitatio, famæ, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subiectus, & is ipse ex siccis, & æstuosis locis ueniens. Aluum astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, & cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque esca post motus, qui post cibum est: subinde potiones cibo minuitæ. Illud quoque scire oportet, quod uentrè uomitus solum comprimit, compressum soluit. Itemque comprimit is uomitus, qui statim post cibum est; soluit is, qui tarde superuenit. Quod ad ætates uero pertinet, inediam facillime sustinent medix ætates, minus iuuenes, minime pueri, & senectute confecti. quod minus fert facile quisque, eo sæpius debet cibum assumere; maximeque eo eger, qui increfcit. Calida lauatio, & pueris, & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri ætati, quæ inflationes mouent. Iuuenem minus quæ assument, & quomodo curentur, interest. quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute contrahitur: Quibus in adolescentia fuit astricta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuuenē, fufior; in senē, altrior. Tempus quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit: minus, sed meracius bibere. multo pauca uti: carne potius elixa: modice oleribus. semel die cibum capere, nisi si nimis uenter astrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus. Venus tum non æque perniciofa est. At uere, paulum cibo demendum, adijciendumque potioni; sed dilutius tamen bibendum est. magis carne utendum: magis oleribus. transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate uero, & potione, & cibo corpus sæpius eget: ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro, & olus: potio quam dilu-

Quia si iustitiam & modum & temperantiam, minus

aut minus potius: ut cum corpore

q. uo. post. ale. q. uo. so. q. uo.

debet. in. a. m. r. u. q. uo. q. uo. q. uo.

quibusdam. ut. i. u. s. p. r. o. u. e. s. e. r. a. i. i. i. j.

u. e. r. e. q. u. o. f. a. h. a. u. t. i. t. u. t. i. t. u. t.

a. l. i. a. c. o. i. t. u. l. i. u. s. i. t. u. t. i. t. u. t.

q. u. o. d. q. u. o. d. i. n. i. u. e. n. i. t. u. r. i. t. u. t. i. t. u. t.

tissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: Frigida lauatio, caro assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. Vt saepius autem cibo utendum, sic exiguo est. Per autumnum, propter coeli uarietatem periculum maximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamenti prodire oportet, praecipueque diebus frigidioribus. neque sub diuino nocte dormire, aut certe bene operiri. Cibo uero iam paulo plenior uti licet: minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non haec, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus quam in his noxae est: Sed his uti non saepius quam alio cibo, conuenit. Denique aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neque aestate uero, neque autumno, utilis uenus est; tolerabilior tamen per autumnum; aestate uero, & toto (si fieri potest) abstinenti.

De his, qui aliqua parte corporis laborant; et primum de his, quibus caput infirmum est.

Proximum est, ut de his dicam, qui parte aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, si bene concoxerit, leniter perfricare id manibus suis debet. nunquam id, si fieri potest, uelste uelare, aut ad cutem tonderi. Vtileque lunam uitare, maximeque ante ipsum lunae solisque concursum. sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere; multum ambulare; sed si licet, neque sub recto, neque in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeque post cibum, & uinum. potius ungi, quam lauari. nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum uenit, sub ueste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi; tum transire in calidarium; ubi tuda bit, in solum non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere; tum tepida uti, deinde frigida; diutiusque ea caput, quam ceteras partes perfundere; deinde id aliquandiu perfricare, nouissimi me detergere, & ungere. Capiti nihil aequae prodest, atque aqua frigida: Itaque is, cui hoc infirmum est, per aestatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem, etiam si sine balneo nictus est, neque totum corpus refrigerare sustinet; caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum ceteras partes attingi nolit, demittere id ne ad cervices aqua descendat; eamque (ne quid oculis, alijsue partibus noceat) defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: isque si ieiunio caput laeditur, assumendus etiam medio die est. si non laeditur, semel potius. Bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quam aquam, magis expedit; ut cum caput grauius esse coeperit, sit, quo confugiat; eique ex toto neque uinum, neque aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumque est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uoce contendere, huic opus non est, utique post coenam; post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est; maxime tamen uomitus alienus est.

De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisq; laborant.

Cap. V.

Neque uero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquae frigidae prodest; sed his etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillaeque male habent. his autem non caput tantum quotidie perfundendum est, sed os quoque multa frigida aqua fouendum est. praecipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi grauius coelum Austri reddiderint. cumque omnibus inutilis sit post cibum, aut contentio, aut cogitatio animi; tum his praecipue, qui uel capitis, uel arteriarum dolores habere consueuerunt, uel quolibet alios oris affectus. Vitari etiam grauedines, destillationesque possunt, si quam minime eum, qui his opportunus est, aerem, uel loca, aquasque mutet: si caput in sole proregit, ne incendatur, neue subitum ex repentino nubilo frigus id moueat: si post coctionem ieiunio caput radit. Si post cibum neque legit, neque scribit.

Ad solutam aluum remedia.

Cap. VI.

Quem uero frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusque superiores partes exercere; dum ieiunus est, ambulare; uitare solis nimium ardorem, continua balneaeungi citra sudorem; non uti cibis uarijs, minimeque iuuulentis, aut leguminibus, oleribusue his, quae celeriter descendunt; omnia denique fugere, quae tarde concoquuntur. Venatio, durique pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maxime iuuant. Nunquam uinum falsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce, sed austerrum, & plenius, neque id ipsum peruetus. Si mulso uti uolet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae poriones uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensae in coena sensit, uomere debet, idque postero quoque die facere: tertio, modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uua, uel olea, uel ex defruto, similibusque alijs; deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conuiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione quamuis leui dimoueri.

Remedia ad coli dolorem.

Cap. VII.

At si laxius intestinum dolere consueuit, quod καλον nominant, cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, ut concoquat aliquis, ut lectione, & alijs generibus exerceatur; utatur balneo calido, cibis

do, cibus quoque, & potionibus calidis; denique omnimodo frigus euitet: item dulcia omnia, legumi-
naque, & quidquid inflare consuevit.

Que agenda sint stomacho laborantibus.

Cap. VIII.

Si quis uero stomacho laborat, legere clare debet; post lectionem ambulare; tum pila, uel armis, alioque quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum cibum bis die assumere, sic tamen ut facile concoquat. Vti uino tenui, & austero; & post cibum frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, maties, præcordiorum dolor, nausea, & notentium uomitus: in ieiunio, dolor capitis; quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est, qui cum in aduersa ualitudine, uinum, aut frigidam aquam concupierunt, delictiarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, & quorum ideo præcordia inflantur, quiue propter ardorem aliquem noctu sitire consue-
runt; antequam conquiescant, duos tres uel cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduer-
sus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum uel ungi, uel lauari assidue; uinum frigidum bibere, & post cibum magnam portionem, sed, ut supra dixi, per syphonem. deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui uero cibus acescit, is ante eum, bibere aquam egelidam debet, & uomere. At is, cui ex hoc frequens deiectionis incidit, quoties aluius ei consiterit, frigida portione potissimum utatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus.

Cap. IX.

Si cui uero dolere nerui solent (quod in podagra, chiragraue esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est quod affectum est, obijciendumque labori, & frigori; nisi cum dolor increuit. Sub diuo quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti in omnibus corporis affectibus, necessaria est: Cruditas enim id maxime lædit; & quoties offensum corpus est, uitiosa pars maxime sentit. Vt concoctio autem omnibus uitijis occurrit, sic rursus alijs frigus, alijs calor: Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, uulnèri, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, neruis, uulnèri, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. ex hoc horrores, tremoresque nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis: æreiorque mens est, & melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho prodest: Itæ articulis, doloribusque, qui sunt sine ulceribus. item rubicundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor autem adiuvat omnia, quæ frigus infestat. item lippientes, si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Neruos quoque, qui contrahuntur; præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt: Idem corporis colorem bonum facit, urinam mouet. si nimius est, corpus effecminat, neruos emollit, stomachum soluit. Minimè uero aut frigus, aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque uitia; frigida aqua, ltrumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

Observatio in pestilentia.

Cap. X.

Est etiam obseruatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, nauigare. Vbi id nō licet, gestari, ambulare sub diuo ante æstum leniter, eodemque modo ungi; & ut supra comprehensum est, uitare fatigationem, crudita-
tem, frigus, calorem, libidinem; multo que magis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tū neque manē surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est: minimeque post cibum aut balneum. neque ieiunio, neque coenato uomendum est. neque mouenda aluius; atque etiam si per semota est, compri-
menda est. Abstineendum potius si plenius corpus est. Itemque uitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit; qui tamen semel die tunc commodius assumitur; insuper etiam modicus, ne cruditatem moueat. Alternis diebus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus seruiatis, ex reliqua uictus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum uero hæc in omni pestilentia facienda sunt, tum in ea maxime, quam Austri excitant. Atque etiam peregrinanti-
bus eadem necessaria sunt, ubi graui tempore anni discesserint ex suis sedibus, uel ubi in graues regio-
nes uenerunt. Ac si cætera, res aliqua prohibebit, utique abstinere debet. Atque ita a uino ad aquam, ab hac ad uinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.

Itandum ea. calor, meridianus somnus, a cibo. si cibus semel die, modicus, ne cruditas moueat. Alternis diebus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum. Vt uictus consuetudine quam minimum mutare. obseruatio in pestilentia. Et multa. Locum; tempus. Transitus a uino ad aquam, ab hac ad uinum.

Itandum ea. calor, meridianus somnus, a cibo. si cibus semel die, modicus, ne cruditas moueat. Alternis diebus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum. Vt uictus consuetudine quam minimum mutare. obseruatio in pestilentia. Et multa. Locum; tempus. Transitus a uino ad aquam, ab hac ad uinum.



INSTANTIS autem aduersæ ualitudinis signa complura sunt; in quibus explicandis, non dubitabo auctoritate antiquorum uirorum uti, maximeque Hippocratis; cum recentiores quoque medici, quamuis quædam in curationibus mutarint, tamen hæc illum optime prælagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus morborum timor subit; non alienum uidetur, exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maxime tuta, uel periculis opportuna sint; quod genus aduersæ ualitudinis in quoque timeri maxime possit. Non quod non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum, per omnia genera morborum, & ægrotent, & moriantur; sed quod frequentius tamen quædam eueniant. Ideoque utile est scire unumquenque, quid, & quando maxime caueat.

Que anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora, uel tuta, uel morbis opportuna sunt, & quod ualitudinis genus in quoque timeri possit. Cap. 1.

Igitur saluberrimum uer est; proxima deinde ab hoc hyems; periculosior æstas; autumnus longè periculosissimus. Ex tempestatibus uerò, optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida; pessimæ, quæ uariant maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat: Nā fere meridianis temporibus calor, nocturnis atque matutinis, simulque etiam uespertinis, frigus est. Corpus ergo, & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit; sic quando cūque euenit, noxium est. Vbi æqualitas autem est, tamen saluberrimi sunt sereni dies; meliores pluuij, quàm tantum nebulosi, aut nubili; optimique hyeme, qui omni uento uacant; æstate, quibus Fauonii perflant. Si genus aliud uentorū est, salubriores septentrionales, quàm subsolani, uel austri sunt. sic tamen, ut hæc interdum regionum forte mutantur. Nam fere uentus ubique a' mediterraneis regionibus ueniens, salubris; a' mari, grauis est. Neque solum in bono tempestatum habitu, certior ualitudo est; sed priores morbi quoque, si qui inciderunt, leuiore sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ergo cœlum est, quod ægrū fecit; adeo ut in id quoque genus, quod natura peius est, in hoc statu, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est, quæ neque iuuentæ calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum, quadratum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa statura ut in iuuenta decora est; sic matura senectute conficitur. gracile corpus, infirmum; obesum, hebes est. Vere tamē maxime quæcunque humoris motu nouantur, in metu esse consueuerunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio sanguinis, abscessus corporis (quæ ἀποστήματα Græci nominant) bilis atra (quam μελαγχολίαν appellant) infania, morbus comitialis, angina, grauedines, destillationes oriri solent. hi quoque morbi, qui in articulis, nervisque modo urgent, modo quiescunt, tum maxime & inchoantur, & repetunt. At æstas non quidem uacat plerisque ab his morbis, sed adijcit febres, uel continuas, uel ardentis, uel tertianas, uomitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, & in cæteris quidem partibus, sed maxime obsecnis, & quidquid sudore hominem resoluunt. Vix quidquam ex his in autumnum nō incidit; sed oriuntur eo quoque tempore febres incertæ, lienis dolor, aqua intercutem, tabes (quam Græci φθίσην nominant) urinæ difficultas (quam σπένδυον appellant) tenuioris intestini morbus, quem ἰλεόν nominant: Fit item lenitas intesti-
norum (quæ λενιτεία uocatur) coxæ dolores, morbi comitiales. Idemque tempus, & diutinis malis fatigatos, & ab æstate tantum proxima pressos interimit, & alijs nouis morbis conficit, & quosdam longissimis implicat, maximeque quartanis, quæ per hyemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentia patet, cuiuscunque ea generis est, quamuis uarijs rationibus nocet. Hyems autem, capitis dolores, tussim, & quidquid in faucibus, in lateribus, in uisceribus mali cōtrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo rursim mouet, fauces exasperat, uentrem affringit, urinam supprimit, horrores excitat, item dolores lateris, & pectoris. Sanum tamen corpus spissat, & mobilius, atque expeditius reddit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum soluit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Cæteri uenti, quod uel huic, uel illi propiores sunt, eo magis uicinos his, illisue affectus faciunt. Denique omnis calor, & iecur, & lienem inflammat, mentem hebetat, ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo neruorum distentionem, modo rigorem infert (illud σπασμὸς, hoc τένανος, Græcè nominatur) nigritiem in uisceribus, horrorem in febribus excitat. In siccitatibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articularum dolores oriuntur. Per imbres, longa febres, alui deiectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio neruorum, quam παραλύσις Græci nominant. Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante præcesserint: Si hyems sicca, septentrionales uentos habuit, uer autem, austros, & pluuias exhibet, fere subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus; ideoque præcipue in mulieribus. Si uerò Austri, pluuiæque hyemē occuparunt, uer autē frigidū, & siccum est, grauidæ quidem foemine, quibus tū adest partus, abortu periclitantur. hæc uerò quæ gignunt, imbecillos, uixque uitaes edunt. ceteros lippitudo arida, & si seniores sunt, grauedines, atque destillationes male habet. At si a' prima hyeme Austri ad ultimū uer continuauerint, laterū dolores, & infania febricitantium (quæ φρενίτις appellant) quam cellerrime

terrimè rapiunt. Vbi primò calor à primo uere orsus, ætatem quòque similem exhibet, necesse est multū sudorem in febribus subsequi. At si sicca ætas, Aquilones habuit, autumnò uerò imbres, Austrique sunt; tota hyeme, quæ proxima est, rursus, destillatio, rauoras, in quibusdam etiam rabes oriuntur. Sin autem autumnus quoque æquè siccus, iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus (inter quæ muliebria esse proposui) secunda ualētudo contingit. durioribus uerò instare possunt & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & y morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod ad ætates uerò pertinet, pueri, proximique ijs, uere, optimè ualent, & ætate prima tutissimi sunt: Senes ætate, & autumnì prima parte iuuenes hyeme, quique inter iuuentam, senectutemque sunt. inimicior senibus hyems, ætas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut infantes, tenerosque adhuc pueros serpentina ulcera oris (quæ ætæ Græci nominant) uomitus, nocturnæ uigilæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant. Propria etiam dentientium, gingiuarumque exulcerationes, distinctiones neutorum, febricule interdum alui deiectiones, maxillæque caninis dentibus orientibus male habent. quæ pericula plenissimi cuiusque sunt, & cui maximè uenter astrictus est. At ubi ætas paulum processit, glandulæ, & neruebrarum, quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes, strumæ, uernicatum quædam genera dolentia, (æxotopodoras Græci appellant) & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente uerò iam pubertate ex iisdem multæ, & longæ febres, sanguinis ex naribus cursus, maximeque omnis pueritia primū circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderūt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, neque in foemina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt: Sæpius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maxime obiecta est; fereque iuuenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, lethargus, cholera, infania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uenarum (æmopoidas Græci appellant) profusio. In senectute, spiritus, & urinæ difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nemorum resolutiones, malus corporis habitus (xaxetias Græci appellant) nocturnæ uigilæ, uiria longiora aurium, oculorum, etiam narium; præcipueque soluta aliis, & quæ sequuntur hanc, tormina, uel leuitas intestinorum, cæteraque fusi uentris mala. Præter hæc, graciles rabes, deiectiones, destillationes, item uiscerum, & laterum dolores fatigant. Obesi plerumque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque sæpe moriuntur: quod in corpore tenuiore uix euenit.

De notis aduersæ ualētudinis futuræ. Cap. II.

Ante aduersam autem ualētudinem, ut suprà dixi, quædam notæ oriuntur; quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atque cōsueuit, neque in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet: quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt; fere retrò, quasi ruina quadam, reuoluuntur. Peius tamen signum est, ubi aliquis contra cōsuetudinem emacruit, & colorem, decoremque amisit. quoniā in ijs quæ superant, est quod morbus demat; in ijs quæ defunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc, proptinus tueri debet, si grauiora membra sunt, si crebra ulcera oriuntur, si corpus supra cōsuetudinem incaluit, si grauior somnus pressit, si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius expergiscitur aliquis quàm assueuit, deinde iterum soporatur: si corpus dormientis circa partes aliquas contra cōsuetudinem, insudat, maximeque circa pectus, aut cernices, aut crura, uel genua, uel coxas: Item si marcer animus, si loqui, & mori piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est, aut totius pectoris, aut qui in plurimis euenit capitis; si saluæ plenum est os, si oculi cum dolore uertuntur, si tempora astricta sunt, si membra inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa frontem intentæ uenz mouentur, si frequentes oscitationes, si genua quasi fatigata sunt, totum uē corpus lassitudinem sentit: Ex quibus sæpe plura, nunquàm non aliqua febrem antecedunt. In primis tamen illud cōsiderandum est, nunquid sæpius horum aliquid eueniat; ac ideo neque corporis ulla difficultas subsequatur: Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarum notitia, non facile quidquam in futurum prælagiri potest. Facile itaque securus est in ijs aliquis, quæ sæpe sine periculo euasit: Ille sollicitari debet, cui hæc noua sunt; aut qui ista nunquàm sine custodia sui, tuta habuit.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint. Cap. III.

Vbi uerò febris aliquem occupat, scire licet, non periclitari, si in laus, aut dextrum, aut sinistrum (ut ipsi uisum est) cubat, cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque iacentis habitus est; si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdiu uigilat, si ex facili spirat, si non conflictatur, si circa umbilicum, & pubem, cutis plana est, si præcordia eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraque parte sunt: quod si paulò tumidiora sunt, sed tamen digris cedunt, & non dolent; hæc ualētudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque quod æqualiter molle, & calidum est, quodque æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iā ad sanitatem uenit corpus: Sternutamentum etiā inter bona indicia est: Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta, neque terrere debet ea febris, quæ eodē die finita est; ac ne ea quidem,

¶ de sic diffinitio, ligo, pollicetur. quando iam ad sanitatem uenit corpus, sternu —

quæ quamuis longiore tempore etiam, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum (quod etiam Græci uocant) fieret. Si quis autem incidit uomitus mixtus esse & bile, & pituita debet; & in urina subfidere album, leue, equale; sic, ut etiã si quæ quasi nubecule innatarint in imum deferantur. At uenter ei, qui a periculo tutus est, reddit modo mollia figurata eodem fere tempore, quo secunda ualitudine assueuit; modo conuenientia ijs quæ assumuntur. Peior cita alius est; sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est; aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruffa est; neque foeditate odoris, similem aluii sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem, tumoremque fecit, bonum signum est; si uentris inde ad inferiores partes euolutus; magisque etiam si fine difficultate cum stercore excessit.

Mala signa ægrotantium. Cap. IIII.

Contra grauis morbi periculum est, ubi supinus æger iacet, porrectis manibus, & cruribus: ubi residere uult in ipso acuti morbi impetu, præcipueque pulmonibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur, etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam horam, & noctem, quam qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit: id enim fere sine continuo dolore esse non potest. Aequè uerò signum malum est, etiam somno ultra debitum urgeri; peiusque, quod magis se sopor interdiu, noctuque continuat. Mali etiam morbi testimonium est, uehementer, & crebro spirare; sexto die coepisse inhorrescere, plus expuere, uix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, iactare brachia, & crura, sine uoluntate lacrymare, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa umbilicum, & pubem macram; præcordia inflam-
mata, dolentia, dura, tumida, intenta; magisque si hæc dextra parte, quã sinistra sunt; periculosissimum tamen est, si uenæ quoque ibi uehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere: caput, & pedes, manusque calidas habere uentre, & lateribus frigentibus; aut frigidis extremas partes, acuto morbo urgente; aut post sudorem inhorrescere, aut post uomitum, singultu esse, uel rubere oculos; aut post cupiditatem cibi, post uel longas febres, hunc fastidire; aut multum sudare, maximeque frigido sudore; aut habere sudores non per totum corpus æquales, qui que febrem non finiant; & eas febres, quæ quotidie tempore eodẽ reuertantur, quæ uel semper pares accessiones habeant, neque tertio quoque die leuentur, quæ uel continent, ut per accessiones increſcant, per discessiones tantum molliantur, nec unquã integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne leuatur quidem febris, sed æquè concitata continuat. Periculofum est etiam, post arquatam morbum, febrem oriri; utique si præcordia, dextra parte dura manserunt, ac dolentibus ijs leua. Nulla acuta febris leuiter terrere nos debet, neque unquam in acuta febre, aut a somno non est terribilis neruorum distentio, timere etiam ex somno, mali morbi est. Itemque in prima febre protinus mentem esse turbatam, membrum uel aliquod esse resolutum, ex quo casu quamuis uita redditur, tamen id fere membrum debilitatur. Vomitus etiam periculofus est, si uenter pituitæ uel bilis; peiorque si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in qua subfidunt uel rubra, aut liuida: deterior, in qua quasi fila quædam tenuia, atque alba, pessima ex ijs, si tanquã ex fufuribus factas nubeculas representat, dilura quoque, atque alba uitiosa est, sed in phreneticis maxime. Alius autem mala est, ex toto superpressa: Periculofa etiam, quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur; utique si quod descendit, est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc, periculum ostendit, id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemque subpallidum; uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quã ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est.

De signis longæ ualitudinis. Cap. V.

Post hæc indicia, notum est longum morbum fieri, sic enim necesse est, nisi occidit. Neque ulla alia spes in malis magnis est, quã ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præſtet. Protinus tamen signa quædam sunt, ex quibus colligere possumus, morbum & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutas, circa caput tantum, & ceruices oritur; aut ubi febre non quiescente, corpus infudat; aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit; aut ubi quod inter febres, aliqua parte abscessit ad sanitatem non peruenit; aut ubi æger pro spatio parum emacrescit. Itẽ si urina modo liquida, & pura est, modo i habet quædam subſidentia; si leuia, atque alba, rubra uel sunt, quæ in ea subſidunt; aut si quædam quasi maculas representat; aut si bullulas excitat.

De indicijis mortis. Cap. VI.

Sed inter hæc quidem propositum menũ, spes tamẽ superest. Ad ultima uerò iam uentum esse, testantur nares acutæ, collapsa tempora, oculi concaui, frigida, languideque aures, & imis partibus leniter uersæ, cutis circa frontem dura, & intenta, color aut niger, aut perpallidus; multoque magis, si ita signa longe ualeant, aut tollant. Ubi autem spes in magis malis est, quã ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præſtet.

Sed cum proposuerim signa, quæ in omni aduersa ualetudine communia esse consueverunt; ea quoque transibo, ut, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit, notas indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres; quædam, quæ inter eas, quid aut intus sit, aut uenturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput graue est, aut ex somno oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt; circa caput aliquis pituitæ impetus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat; proximum est, ut aliqua parte profusum sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit; ne in malum habitum corpus eius recidat, metus est. Si præcordia dolent, aut inflammatio grauis est, aut non toto die concocta fertur urina, cruditas esse

manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio, malus est, hi uel capitis doloribus conflictantur, uel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam, & tumidam; aut capite, aut uisceribus, aut alio laborant. Si in continua febre, puero uenter nihil reddit, mutaturque ei color, nec somnus accedit, ploratusque is affluens; metuenda nervorum distentio est. Frequens autem defecatio in corpore tenui, longoque, tabem commendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit alius, docet aut subitam deiectionem, aut febri culam instare. Vbi pedes turgent, longa deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre, & in coxis est, aqua intercutis instat, sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est ijs, quibus uoluntas desidendi est, uenter nihil reddit, nisi & aegre, & durum, tumor in pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte uentris innicem oritur, atque finitur, sed a rectore id malum proficisci uidetur, eiusdem morbi nota est. Vbi circa umbilicum, intestina torquentur (ἡσπορὸν Graeci nominant) coxaeque dolores manent, eaque neque tempore, neque remedijs solvuntur. Dolor autem articulorum, pro ut in pedibus, manibusue, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum ex leui causa fatigatum, & quae frigido, calidoque offenditur; podagra, chiragra, uel eius articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, hi uel capitis doloribus conflictantur, necesse est; uel in articulis aliquas exulcerationes graues habeant; uel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus foeminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, uel quaelibet alia pars morbo infestetur. Eademque ijs pericula sunt, quibus articulorum uicia, dolores, tumoresque sine podagra, similibusque morbis oriuntur, & desinunt. Vtique si saepe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant, si frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier a partu uehementes dolores habet, neque alia praeterea signa mala sunt; circa uicesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicunque etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet; magisque, si iuuenis erit, per sanguinis profusionem; si senior, per suppurationem. Febris autem, quae subito sine ratione, sine bonis signis finita est, fere reuertitur. Cui fauces sanguine, & interdum, & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque praecordiorum, neque tussis, neque uomitus, neque febricula praecesserit; huius aut in naribus, aut in faucibus, ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, ulcus in uulua est. Urina autem crassa, ex qua quod desiderat, album est; significat circa articulos, aut circa uiscera, dolorem, metumque morbi esse. Eadem uiridis, aut uiscerum dolorem, tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est, uel uesica, uel renes exulcerati sunt. Si haec crassa, carunculas quasdam exiguas, quasi capillos habet; aut si bullat, aut si male olet, & interdum quasi haerenam, interdum quasi sanguinem trahit; dolent autem coxae, quaeque inter has, superque pubem sunt; & accedunt frequentes tussis, interdum uomitus biliosus, extremaeque partes frigescunt, urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquae simile, uel rufum, uel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aliud uero cum multo spiritu redditur, atque in renibus uitium est. Aut si paulatim destillat, uel si sanguis per hanc editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent; in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his indicijs cognoscuntur. Difficiliter urina redditur, paulatimque, interdum etiam sine uoluntate destillat. Eadem harenosa est; nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeque ij, qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem leuant. Grauitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea, cursu, omni que motu augentur. Quidam etiam, cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Foeminae uero, oras naturalium suorum manibus admodum scilicet crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admovent, ubi uesicae ceruicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uitium est. Mulieri grauidae, sine modo fusa alius, elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est, quod intus gerit, durae mammae, sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & praeter consuetudinem, continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, uel distentio nervorum, uel rigor timeri potest. At si a priore parte id euenit, uel lateris acutus dolor, uel infamia expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum (quae turissima inter haec est) profusio alui sequitur. Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua intercutis, aut tabes sequitur. Eadem tabes subdit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia, cum longo timore, & uigilia est, atre bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivae malae sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit, quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigrae cicatrices fiant. Quibus causa doloris neque sensus eius est, his mens tabat. Si in uentrem sanguis confluxit, ibi in pus uertitur. Si a coxis, & ab inferioribus partibus, dolor in pectus transit, neque ullum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre, aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Haec uero cum sine febre quoque, uel latentium, uel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus infamia timenda est, ubi expeditior aliquis, quam sani fuit,

Si uirina causa, carunculas quasdam capiat, quasi capillos habet, bullat, aut si male olet, & interius quasi arena, interdu quasi haerentia, uel aut exiti ore, iussu uero, si uisum, postea, aut, & accedunt frequentes tussis, interdum uomitus biliosus, extremaeque partes frigescunt, urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquae simile, uel rufum, uel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aliud uero cum multo spiritu redditur, atque in renibus uitium est.

Si uirina paulatim destillat, uel si sanguis per hanc editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, ubi uesicae ceruicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uitium est. Mulieri grauidae, sine modo fusa alius, elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est, quod intus gerit, durae mammae, sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & praeter consuetudinem, continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, uel distentio nervorum, uel rigor timeri potest. At si a priore parte id euenit, uel lateris acutus dolor, uel infamia expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum (quae turissima inter haec est) profusio alui sequitur. Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua intercutis, aut tabes sequitur. Eadem tabes subdit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia, cum longo timore, & uigilia est, atre bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivae malae sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit, quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigrae cicatrices fiant. Quibus causa doloris neque sensus eius est, his mens tabat. Si in uentrem sanguis confluxit, ibi in pus uertitur. Si a coxis, & ab inferioribus partibus, dolor in pectus transit, neque ullum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre, aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Haec uero cum sine febre quoque, uel latentium, uel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus infamia timenda est, ubi expeditior aliquis, quam sani fuit,

reli, quidam resupinati, maxime sermo meo, qui grandes calculos habent, quidam etiam uicibus replentur, coxaeque dolores manent, eaque neque tempore, neque remedijs solvuntur. Dolor autem articulorum, pro ut in pedibus, manibusue, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum ex leui causa fatigatum, & quae frigido, calidoque offenditur; podagra, chiragra, uel eius articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, hi uel capitis doloribus conflictantur, necesse est; uel in articulis aliquas exulcerationes graues habeant; uel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus foeminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, uel quaelibet alia pars morbo infestetur. Eademque ijs pericula sunt, quibus articulorum uicia, dolores, tumoresque sine podagra, similibusque morbis oriuntur, & desinunt. Vtique si saepe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant, si frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier a partu uehementes dolores habet, neque alia praeterea signa mala sunt; circa uicesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicunque etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet; magisque, si iuuenis erit, per sanguinis profusionem; si senior, per suppurationem. Febris autem, quae subito sine ratione, sine bonis signis finita est, fere reuertitur. Cui fauces sanguine, & interdum, & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque praecordiorum, neque tussis, neque uomitus, neque febricula praecesserit; huius aut in naribus, aut in faucibus, ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque causa apparet, ulcus in uulua est. Urina autem crassa, ex qua quod desiderat, album est; significat circa articulos, aut circa uiscera, dolorem, metumque morbi esse. Eadem uiridis, aut uiscerum dolorem, tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est, uel uesica, uel renes exulcerati sunt. Si haec crassa, carunculas quasdam exiguas, quasi capillos habet; aut si bullat, aut si male olet, & interdum quasi haerenam, interdum quasi sanguinem trahit; dolent autem coxae, quaeque inter has, superque pubem sunt; & accedunt frequentes tussis, interdum uomitus biliosus, extremaeque partes frigescunt, urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquae simile, uel rufum, uel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aliud uero cum multo spiritu redditur, atque in renibus uitium est. Aut si paulatim destillat, uel si sanguis per hanc editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent; in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his indicijs cognoscuntur. Difficiliter urina redditur, paulatimque, interdum etiam sine uoluntate destillat. Eadem harenosa est; nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeque ij, qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem leuant. Grauitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea, cursu, omni que motu augentur. Quidam etiam, cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Foeminae uero, oras naturalium suorum manibus admodum scilicet crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admovent, ubi uesicae ceruicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uitium est. Mulieri grauidae, sine modo fusa alius, elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est, quod intus gerit, durae mammae, sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & praeter consuetudinem, continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, uel distentio nervorum, uel rigor timeri potest. At si a priore parte id euenit, uel lateris acutus dolor, uel infamia expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum (quae turissima inter haec est) profusio alui sequitur. Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua intercutis, aut tabes sequitur. Eadem tabes subdit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia, cum longo timore, & uigilia est, atre bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivae malae sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit, quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigrae cicatrices fiant. Quibus causa doloris neque sensus eius est, his mens tabat. Si in uentrem sanguis confluxit, ibi in pus uertitur. Si a coxis, & ab inferioribus partibus, dolor in pectus transit, neque ullum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre, aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat. Haec uero cum sine febre quoque, uel latentium, uel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus infamia timenda est, ubi expeditior aliquis, quam sani fuit,

fermo est: subitæque loquacitas orta est: & hæc ipsa, solito audacior. aut ubi raro quis, & uehementer spirat: uenasque concitatas habet, præcordijs duris, & tumētibz: Oculorum quoque frequens motus; & in capitis dolore, offusæ oculis tenebrę: uel nullo dolore substante, somnus ereptus, continuatæque noctes; & dię uigilia: uel prostratum contra consuetudinem, corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit. Iste robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, infaniz signa sunt. Siquid etiã abscessit, & anteq̃ suppuraret, manere adhuc corpore, insolitã febre subleat; periculũ affert primũ furoris, deinde interitus; auris quoque dolor acutus, cũ febre cõtina, uehementiq̃ sæpementē turbat: & ex eo casu iuniores interdũ intra septimũ diē moriuntur, seniores tardius: quoniã neque æquẽ magnas febres experiuntur: neque æquẽ infaniunt. ita sustinent, dum his affectus intus uerlatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammar, furorem uenturum esse testantur. Quibus autem longę febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his neruorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idque sæpe intra septimum diē occidit: quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde, post alui longam resolutionem, tormina: Post hæc, intestinorũ leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes, post lateris dolores, uitia pulmonum: post hæc, infantiã. Post magnos feruores corporis, neruorum rigor, aut distentio. Vbi caput uulneratum est, delirium. ubi uigilia torset, neruorum distentio, ubi uehementer uenę super ulcēra mouentur, sanguinis profluuium erit. Suppuratio uerò pluribz morbis excitatur: Nã si longę febres, sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquam partem id malum incumbit: in iunioribus sæmen: nam in senioribus, ex eiusmodi morbo, quartana fere nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura, dolentia ante uigēsimũ diē, hominem non sustulerūt: neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus. Autique si inter principia, aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cũ in inferioribus partibus aliquid abscessit, aut si præcordia tumorem mollem habent: neque habere intra sexaginta dies desinunt: heretque per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera non fuit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor, ad suppurationē fere spectet: magis se tendit is, qui in præcordijs, quàm is qui est in uentre: & is qui supra umbilicũ, quàm is qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis, & cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint: Ex quò eo casu, plerũque infra trãuersum septum (quod dicitur *mesenterium* Græci uocant) fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis detractionem, neque per uictus rationē finitus est, uomicas aliquas intus excitat aut circa uigēsimũ diē, aut circa xxx, nonnunquam etiam circa sexagesimũ. Numerabimus autem ab eo diē, quò primũ febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatē eius partis sensit, sed hæc uomica modò a pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat, ab eã parte, quã afficit, dolorem inflammationēque cõcit, ipsum calidius est: & si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit: eaque interdũ leuior est, noctu increscit: multus sudor oritur: cupiditas tussendi est; & pene nihil in tussi excreatur: oculi caui sunt: malæ rubet: uenæ sub lingua in albescent; in manibus sunt adunci ungues; digiti, maximeque summi pallent: in pedibus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: cibi fastidium est: pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas: uomica uel ante, uel circa uigēsimũ diē erumpet. si serius ista coeperint, necesse est quidem incrementum: sed quò minus citò affecerint, eò tardius soluentur. Solent etiã in graui morbo, pedes cum digitis, unguibusque nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquũ corpus inualuit: pedes tamen decidunt.

Quæ notæ in quodque morbi genere uel spem, uel pericula ostendant. Cap. VII I.

Sequitur ut in quôque morbi genere proprias notas explicem, quæ uel spem, uel periculum ostendât. Ex uesica dolente, si purulenta urina processit, inque ea sene, & album subsedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipse leuatur dolor: quamuis id purulentum est: tamen æger facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ualerudo contingere. Neque inter iniuria terri conuenit, si protinus sputum mixtum est ruffo quodam, & sanguine; dummodò statim edatur. Laterum dolores, suppuratione facta, deinde intra quadragessimum diem purgata finiuntur. Si in iecinore tunicata est, & ex ea fertur pus purum, & album, salus ei facilis. id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus uero, hæc tolerabiles sunt, quæ in exteriorem partem feruntur, & acuiuntur: Et ex his, quæ intus procedunt, hæc leuiores, quæ contra se cutem non afficiunt: eamque & sine dolore esse, & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque, quacunque parte erumpit, si est leue, album, & unius coloris, sine ullo metu est: & quo effusq; febris protinus conquieuit: desideriumque urgere cibi fastidium, & potionis desiderium. si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque eiusdem factum pro ruffo, purulentum est: periculi minus est. At in tabe, eius, qui saluus futurus est, sputum esse debet album, æquale totum, eiusdemque coloris, sine pituita; eique etiã simile esse oportet, si quid in nares à capite destillat. Longè optimum est febrem omnino non esse. secundum est, tantulum esse, ut neque cibum impediat, neque crebra sitim faciat. Alius in hac uale tudine, ea tuta est, quæ cotidie coacta, eaque conuenientia ijs, quæ assumuntur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, maximeque

[illegible][illegible]

lati pectoris, atque fetosi est: cuiusque cartilago exigua, & carnosa est. Super tabe, si mulieri quoque suppressa menstrua fuerint: & circa pectus, atque scapulas dolor manet, subitoque sanguis erumpit, leuari morbus solet: Nam & ruffis minuitur, & frigus atque febriculae desinunt. Sed iisdem fere, nisi redit sanguis, uomica erumpit: quae quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribilis est, quae nullo antecedere morbo coepit. deinde quae longo morbo superuenit: Vtique si firma viscera sunt: si spiritus facilis: si nullus dolor: si sine calore corpus est: aequaliterque in extremis partibus macrum est: si uenter mollis: si nulla ruffis, nulla sitis: si lingua ne per somnum quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mouetur: si per se excernit mollia, & figurata: si extenuatur: si urina & uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. liquidem in quo omnia haec sunt, is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia, ut podagrae, chiragraeque, si iuuenes tentarint, neque callum induxerint, solui possunt: maximeque torminibus leniuntur: & ex quocumque modo uenter fluit. Item, morbus comitialis ante pubertatem ortus, non aegre finitur: & in quo ab una parte corporis, ueniens accessionis sensus incipit: optimum est a manibus, pedibusue initium fieri: deinde a lateribus: pessimum inter haec, a capite. Atque in his quoque ea maxime profunt, quae per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est, quae sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre, nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acia tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, ceteraeque accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reseruare: Prodestque in hoc morbo, si iam aetate aliquis processit. Contra intestinorum leuitas facilius a teneris aetatibus depellitur: utique si fieri urina, et ali cibo corpus incipit. Eadem aetas prodest, & in coxae dolore, & humerorum, & in omni resolutione neruorum. Ex quibus coxa si sine torpore est: si leuiter friget: quamuis magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumque membrum si nihilominus aliter fieri sanum potest, omnis resolutio, etiam aluo cito finitur: omnisque deiectio lippienti prodest. At uarix ortus, uel per ora uenarum, subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt, uomitu atque bilis soluiuntur. & quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones suppressit uomitus. Mulier sanguinem uomens, profusis menstruis liberatur. Quae menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus sudat, omni periculo uacat. Quae locis laborat, aut difficulter partum edit, sternutamento leuatur. Aestiva quartana fere breuis est, cui calor, & tremor est, saluti delirium est. Lienosis bono tormina sunt. Denique ipsa febris (quod maxime mirum uideri potest) saepe praesidio est. nam & praecordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris dolore succurrit: & neruorum distentionem, rigoremque, si postea coepit, ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor, cum quadam frontis pruriginis, accedunt: sanguinis profusione, uel fortuita, uel etiam petita, summoventur. Si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, & sternutamentis finiuntur. Febrem autem ardentem (quam Graeci *πυρεσσιν* uocant) subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusae sunt: si sanguis e naribus fluxit, aut uenter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quam biliosa aluus potest. Quibus in fistula urinae, uti minuti apices (quos *βυρρα* Graeci uocant) esse coeperunt: ijs, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum pleraque per se proueniant: scire licet, interea quoque, quae ars adhibet, naturam plurimum posse. Contra si caput febre continenti dolet, neque quidquam reddit: malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris a septimo anno ad quartum decimum. In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit: deinde a septimo die coepit, & ultra septimum manet: periculosum est. Quantoque magis mixtos, neque inter se deductos colores habet, tanto deterius. & tamen nihil peius est, quam sincerum id edi: siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans, mgrum tamen pessimum est. In eodem morbo, periculosa sunt ruffis, destillatio, etiam (quod alias salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimumque est, si haec secuta subita deiectio est. Fere uero quae in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueverunt. Ex iecinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus pessime sunt, quae intus tendunt, sic ut exteriorem quoque cutem decolorent: Ex his deinde, quae in exteriorem partem proniunt, quae maxime, quaeque planissime sunt. Quod si ne rupta quidem uomica, uel pure extrinsecus emisso febris quieuit: aut quamuis quieuit, tamen repetit: item si sitis est, si cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum, & pallidum; si nihil aeger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, fere senes moriuntur: ex ceteris, iuniores. At in tabe, sputum mixtum, purulentum, febris assidua, quae & cibi tempora eripit, & siri affligit in corpore tenui, periculum subesse testatur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit: ubi capilli fluunt: ubi urina, quaedam araneis similia subsidentia ostendit: atque in his odor foedus est: maximeque ubi post haec orta deiectio est: protinus moritur: Vtique si tepus autumni est: quo fere, qui cetera parte anni traxerunt, resoluuntur. Item pus expulisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus, ex eo morbo, uomicae, fistulaeque oriri: quae non facile sanescunt, nisi si multa signa bonae ualitudinis subsequuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut et mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt.

Cui uero

sine etiam sine hac

Cognitis indicijs, quæ nos, uel spe confortentur, uel metu terreat; ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. communes, quæ pluribus morbis opitulatur: propriæ, quæ singulis. antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent; quædam in aduersa tantum ualitudine adhibentur. Omne uero auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adjicit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut mollit. Quædam uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuvant. Demitur materia, sanguinis detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictione, gestatione, omni que exercitatione corporis, abstinentia, sudore; de quibus protinus dicam.

De sanguinis detractione per uenas.

Cap.

IX.

Sanguinem incisa uena mitti nouum non est: sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & foeminis uterum non gerentibus, uetus est. In pueris uero idem experiri, & in senioribus; & in grauidis quoque mulieribus, uetus non est. si quidem antiqui primam, ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus iudicabant, persuaserantque sibi, mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea uero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum; aliasque potiores obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim, non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ grauida non est, parum ualet, male sanguis emittitur. Emoritur enim uis, si quæ his supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier ualens, tuto curantur. Maxime tamen in his medicis imperitus falli potest, quia fere minus roboris illis ætatibus subest. Mulierique prægnanti, post curationem quoque uiribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quidquid autem intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est; cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solum uideat, sed uires æstimet; & ex eo colligat, possit necne superesse, quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere, quod duo corpora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, & obesum; inter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent; celerisque ea, si nimium est pinguis, quis affligitur. Ideoque uis corporis melius ex uenis, quam ex ipsa specie æstimatur. neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum superans, an deficiens materia læserit: Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia uel deest, uel integra est, istud alienum est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo uehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque uenæ tumunt, sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum morbi, neruorumque resolutio, & rigor, & distentio; quidquid denique fauces difficultate spiritus strangulat; quidquid subito supprimit uocem; quisquis intolerabilis dolor est; & quacunque de causa ruptum aliquid intus, atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo (ut supra dixi) non infirmitate, sed onere nocent. fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem uix pati posse uideatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusque sit, qui laborat, nisi temeraria quoque uia fuerit adiutus; in hoc statu, boni medici est ostendere, quam nulla spes sine sanguinis detractione sit; faterique quantus in hac ipsa re sit metus. & tum demum si exigerit, sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet. fatius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idque maxime fieri debet, ubi nerui resoluti sunt; ubi subito aliquis obmutuit; ubi angina strangulat; ubi prioris febris accessio pene confecit, paremque subsequi uerisimile est, neque eandem uidentur sustinere ægri uires posse. Cum sit autem imminere crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte, aliquis decidit, si contritus est, si ex aliquo subito casu sanguinem uomit; quamuis paulo antè sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est; ne si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur, tum demum nulla cruditatis suspitione remanente, id fiet. Ideoque ei rei uidetur aptissimus aduersæ ualitudinis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum iam spatio ipso materia exhausta est, & corpus corrumpit; ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum. Quod si uehemens febris urget, in ipso impetu eius, sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio est; si non decreuit, sed crescere desijt, neque speratur remissio, tunc quoque, quamuis peior, sola tamen occasio non omittenda est. Fere etiam ista medicina, ubi necessaria est, in biduum diuidenda est. fatius est enim in primum leuare ægrum, deinde perpurgare; quam simul omni ui effusa, fortasse præcipitare.

tare. Quod si in cura quoque aquarum, quae inter cutem est, ista respondet; quanto magis necesse est in sanguine respondeat: mitti uero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio. si partis alicuius, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima. quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mittendum. sic enim auerti materiam cursum, at illo modo, in id ipsum, quod grauat, euocari. sed id ipsum falsum est: Proximum enim locum primo exaruit: Ex ulterioribus autem, eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur. ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero uitium est, ex altero brachio; credo, quia si quid parum cessent, opportuniore hae partes iniuriarum sunt, quam quae iam male habent. auertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur: Desinit enim fluere quae uolumus, inde obiectis, quae prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem sanguinem, cum sit expeditissimum, usum habenti, tum ignaro difficillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nerui. ita si neruum scalpellus attingit, sequitur neruorum distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria incisa, neque coit, neque sanescit; interdum etiam, ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque uenae, si forte praecisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque uenam incidit. Non nunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multae res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium uena est; ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habirumque oportet attendere: Nam si is crassus, & niger est, uitiatus est; ideoque utiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat; protinusque is suppressus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit, ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aequè niger affluat, ac primo die profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, suppressum est; semperque ante finis faciendus est, quam anima deficiat. deligandumque brachium, super imposito expresso ex aqua frigida penicillo; & postero die, aucto medio digito, non autem scalpello, uena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumque sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus, & niger initio fluxerat, & rubere, & pellucere coepit; satis materiam detractum est, atque quod superest, sincerum est: Ideoque protinus brachium deligandum; habendumque ita est, donec ualens cicatrix sit; quae celerimè in uena confirmatur.

De sanguinis detractone per cucurbitulas. Cap. XI.

Cucurbitularum uero duo genera sunt, zneum, & corneum. Aenea, altera pater, altera clausa est. Cornea, altera parte aequè patens, altera foramen habet exiguum. In zneam, linamentum ardens conijcitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturque, donec inhaereat. Cornea, per se corpori imponitur; deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superque cera cauum id clausum est, aequè inhaereat. Vtraque non ex his tantum materiarum generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit. At si caetera defecerunt, caliculus quoque, aut pultarius oris compressioris, ei rei commodè aptatur, ubi inhaereat, si conuulsa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quae intus est, laedit, illo modo; ubi inflatio, hoc imponi solet. Vtus autem cucurbitulae praecipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua uitium est, quam exhauriri ad confirmandam ualitudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quae iam laesa est, esse mittendum. quod nemo cucurbitulam diuerse parti imponit (nisi cum profusionem sanguinis eo auertit) sed ei ipsi, quae dolet, quaeque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, quamuis etiam spatium aliquod accessit, siue corrupta materia, siue spiritu male habere. In acutis quoque quibusdam, si & leuari corpus debet, & ex uena sanguinem mitti, uires non patiuntur: Idque auxilium ut minus uehemens, ita magis tutum: Neque unquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa uena praecipuum periculum est, aut si in parte corporis etiam uitium est; huc potius confugiendum est. cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita leuius praesidium esse; nec posse uehementi malo, nisi aequè uehemens auxilium succurrere.

De deiectione. Confert hoc eaque lib. 3. Cap. XII.

Deiectionem autem antiqui uarijs medicamentis, crebraque alui ductione, in omnibus fere morbis moliebantur, dabantque aut nigrum ueratrum, aut filiculam, aut squamam aris (quam λεπιδωδον Graeci uocant) aut lactucam marinam lac (cuius gutta, pani adiecta, abundè purgat) aut lac, uel asininum, uel bubulum, uel caprinum; eique salis paulum adiciebant, decoquebantque id; & sublati his, quae coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum fere laedunt. ideoque omnibus catharticis aloue miscenda est. Alui si uehementius fluat, aut saepius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam

* ij

uenerunt in morbis longis, si corrigat, ad uisum male habet. In acutis, si leuius cap. 12. lib. 3. q. uena sanguinis, uires non patiuntur, ita deiectionem ut minus uehemens, ita magis tutum: Neque unquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quae iam laesa est, esse mittendum. quod nemo cucurbitulam diuerse parti imponit (nisi cum profusionem sanguinis eo auertit) sed ei ipsi, quae dolet, quaeque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, quamuis etiam spatium aliquod accessit, siue corrupta materia, siue spiritu male habere. In acutis quoque quibusdam, si & leuari corpus debet, & ex uena sanguinem mitti, uires non patiuntur: Idque auxilium ut minus uehemens, ita magis tutum: Neque unquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa uena praecipuum periculum est, aut si in parte corporis etiam uitium est; huc potius confugiendum est. cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita leuius praesidium esse; nec posse uehementi malo, nisi aequè uehemens auxilium succurrere.

Sanguis mitti debet, si totus corpus aegritudine sit, ex brachio. si partis alicuius, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima. quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mittendum. sic enim auerti materiam cursum, at illo modo, in id ipsum, quod grauat, euocari. sed id ipsum falsum est: Proximum enim locum primo exaruit: Ex ulterioribus autem, eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur. ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero uitium est, ex altero brachio; credo, quia si quid parum cessent, opportuniore hae partes iniuriarum sunt, quam quae iam male habent. auertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur: Desinit enim fluere quae uolumus, inde obiectis, quae prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem sanguinem, cum sit expeditissimum, usum habenti, tum ignaro difficillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nerui. ita si neruum scalpellus attingit, sequitur neruorum distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria incisa, neque coit, neque sanescit; interdum etiam, ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque uenae, si forte praecisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque uenam incidit. Non nunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multae res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium uena est; ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habirumque oportet attendere: Nam si is crassus, & niger est, uitiatus est; ideoque utiliter effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat; protinusque is suppressus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit, ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aequè niger affluat, ac primo die profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, suppressum est; semperque ante finis faciendus est, quam anima deficiat. deligandumque brachium, super imposito expresso ex aqua frigida penicillo; & postero die, aucto medio digito, non autem scalpello, uena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumque sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus, & niger initio fluxerat, & rubere, & pellucere coepit; satis materiam detractum est, atque quod superest, sincerum est: Ideoque protinus brachium deligandum; habendumque ita est, donec ualens cicatrix sit; quae celerimè in uena confirmatur.

De deiectione.

et angustia in deiectione. & in
modis utendi lactuca maritima,
& lacte aut sero.

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo
si uenter non sit sedent.
et si cathartici alio modo

in aduersa ualitudine medicamentum eius rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est: Ut cum ueratrum nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia infanientibus, aut ijs, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est eius rei causa, cibos, potionesque assumere, qui simul & alant, & uentrem molliant. Suntque ualitudinis genera, quibus ex lacte purgatio conuenit. Plerumque uero alius potius ducenda est; quod ab Asclepiade quoque sic uituperatum, ut tamen seruatum sit, uideo plerumque seculo nostro prateriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus uidetur, aptissima; ut neque saepe ea medicina tentetur; & tamen semel sumptum, uel bis, non omitteretur: Si caput graue est; si oculi caligant; si morbus maioris intestini est (quod Graeci κακον nominant) si in imo uentre, aut in coxa, dolores sunt; si in stomachum quaedam biliosa concurrunt; uel etiam pituita eò se, humor uel aliquis aqua similis confert; si spiritus difficilius redditur; si nihil per se uenter excernit. utique si iuxta quoque stercus est, & intus remanet; aut si stercoris odorem, nihil deiciens, aeger ex spiritu suo sentit; aut si corruptum est, quod excernitur; aut si prima inedia febrem non sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus sit, uires non patiuntur, tempus uel eius rei praterijt. aut si multum ante morbum aliquis portauit; aut si is, qui saepe, uel sponte, uel casu purgatus est, subito habet aluum suppressam. Seruanda uero illa sunt, ne ante diem tertium ducatur; ne ulla cruditate substante; ne in corpore infirmo, diuque aduersa ualitudine exhausto; ne uel in eo, cui satis aluus redditur, quotidie, qui uel eam liquidam habebit; ne in ipso accessionis impetu; quia quod tum infusum est, aluo continetur; regestumque in caput, multo grauius periculum efficit. pridie uero abstinere debet aeger, ut aptius tali curationi sit. Eodem die, ante aliquot horas, aquam calidam bibere, ut superiores eius partes madescant; tum immittenda in aluum est (si leui medicina contenti sumus) pura aqua; si paulo ualentiori, mulla; si leni, ex aqua, in qua foenum graecum, uel pitana, uel malua decocta sit: Si reprimendi causa, ex uerbenis. Acris autem est marina aqua, uel alia, sale adiecto; atque utraque decocta commodior est: Acris fit, adiecto uel oleo, elunitro, uel melle quoque. Si acrior est, eò plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neque calidum, ne alterutro modo laedat. Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet aeger, nec primae cupiditati deiectionis protinus cedere. ubi necesse est, tum demum relidere. fereque eo modo dempta materia superioribus partibus lenatis, morbum ipsum molit. Cum uero, quoties res coegit, desiderando aliquis se exhaustit, paulisper debet conuiescere; & ne uires deficient, utique eo die cibum assumere. qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quae expectabitur, aut in metu non erit, aestimari oportebit.

De uomitu. Cap. XII.

At uomitus, ut in secunda quoque ualitudine saepe necessarius biliosis est, sic etiam in his morbis, quos bilis concitauit. Ergo omnibus, qui ante febres, horrore, & tremore uexantur; omnibus, qui cholera laborant; omnibus, etiam cum quadam hilaritate infanientibus; & comitali quoque morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est (sicut in cholera) si febris est, ut inter horrores, asperioribus medicamentis opus non est; sicut in deiectionibus quoque supra dictum est: fatisque est, ea uomitus causa sumi, quae sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi ualentesque morbi, sine febre sunt, ut comitalis, aut insania; ueratro quoque albo utendum est; id ne agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet; omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper aegris prodesse, semper sanis nocere.

De frictione. Cap. XIII.

De frictione uero, & gestatione, adeo multa Asclepiades, tanquam inuentor eius, posuit, quod in eo uolumine, quod communium auxiliorum scripsit, cum trium tantum facere mentionem, uisum est. S. & aqua, & gestationis; tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores uiros in his fraudare, quae uel repperunt, uel recte secuti sunt: & tamen ea, quae apud antiquiores aliquos posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem & dilucidius ubi, & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades praeceperit; nihil tamen repperit, quod non a uetustissimo auctore Hippocrate, paucis uerbis comprehensum sit; qui dixit frictione, si uehemens sit, durari corpus; si lenis, molli; si multa, minui; si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tu utendu sit, cur aut astringendu corpus sit, quod fluens est; aut molliendu, quod induruit; aut digerendu in eo, quod copia nocet; aut alendum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod

(quod iam ad medicum non pertinet) facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nā & astrin-
gitur aliquid eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat. & mollietur eo detractio, quod duri-
ciem creabat; & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam re-
laxatam, penetrat. Diversarum uero rerum, in modo, causa est. Inter unctionem autem, & frictionem, mul-
tum interest: Vngi enim leuiterque pertractari corpus, etiam in acutis, & recentibus morbis oportet; in re-
missione tamen, & ante cibum: Longa uero frictione uti, neque in acutis morbis, neque in crescentibus
conuenit; præterquam cum phreniticis somnis ea requiruntur. Amat autem hoc auxilium ualētudo lon-
ga, & etiam a primo impetu, inclinata. Neque ignoro, quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse in
crescentibus morbis, non cum iam per se finiuntur, quod non ita se habet: Potest enim morbus, etiam qui
per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duabus de causis necessarium est; ut &
quā primū bona ualētudo contingat; & ne morbus, qui remanet, iterum quamuis leui de causa exasper-
retur. Potest enim morbus minus grauis esse, quā fuerit; neque ideo tamē solui; sed reliquijs quibusdam
inherere; quas admotum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa ualētudine, recte frictio
adhibetur; sic nunquam adhibenda est febre crescente. Verū, si fieri poterit, cum ex toto corpus ean-
cabat; minis certe cum ea remiserit. Eodem autem modo in iutis corporibus esse debet; ut cum infirmus
aliquis implendus modō est in partibus; aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius.
Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat: non in impetu tamen doloris, & membrum aliquod re-
solutum, ipsius frictione confirmatur. Longē tamen sapius aliud perfricandum est, cum aliud dolet; maxi-
meque cum a summis, aut a medijs partibus corporis euocare materiam uolumus; idēque extremas par-
tes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finunt, quoties aliquis perfricandus sit: Id enim ex ui-
ribus hominis colligendum est. Et si is quī per infirmus est, potest satis esse, quinquagies: si robustior, potest
ducenties esse faciendum: Inter utrunque deinde, prout uires sunt. Quo fit, ut etiam minus sæpe in mulie-
re, quā in uiro; minus sæpe in puero, uel sene, quā in iuene, manus dimouendæ sint. Denique, si certa
membra perfricantur, multa ualentique frictione opus est: Nam neque totum corpus infirmari, citō per
partem potest; & opus est quā plurimum materiz digerere, siue id ipsum membrum; siue per id aliud leua-
mus. At ubi totius corporis imbecillitas, hanc curationem per totū id exigit, breuior esse debet, & lenior;
ut tantum modō summam cutem emolliat, quod facilius capax ex recenti cibo, nouæ materiz fiat. In malis
iam ægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior eum fiti calet, ut supra posui. Sed tunc
quoque unicum in frictione præsidium est; quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinæ lo-
cum facere.

De gestatione.

Cap.

XIII.

Gestatio quoque, longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est: utilisque est; & his corporibus, quæ
iam ex toto, febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; & his, quibus lentæ morborum reliquæ
remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, uehementique febre, præcipueque arden-
te, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse. sed id periculose sit; meliusque quiete eiusmodi
impetus sustinetur, si quis tamen experiri uolet, sic experietur. si lingua non erit aspera; si nullus tumor;
nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. & ex toto, nunquam gestari cor-
pus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est; nisi tamen solis nervi dolentibus; neque unquam in re-
centi febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt, adhibenda, quæ sunt; & pro uiri-
bus cuiusque, & pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humilibi obsint. Gestationum
lenissima est nauis, uel in portu, uel in flumine; uehementior in alto mari, nauis, uel lectica, aut scañno; acrior
uehiculo. Atque hæc ipsa, & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri.
si ne id quidem est; at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est; atque ita lectus huius, & illuc manu im-
pellendus. Et leuia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt: Valentiora uero, his qui iam
pluribus diebus febre liberati sunt; aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre ua-
cent (Quod & in tæbe, & in stomachi uitis, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit) aut
ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manet. In quibus affectibus,
ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo quemadmodum
sani, neque firmi homines se gererent, præcepimus.

De abstinentia.

Cap.

XVI.

Abstinentiæ uero duo genera sunt; alterum, ubi nihil assumit eger; alterum, ubi non nisi quod oportet.
Initia morborum primū famem, sitimque desiderant; ipsi deinde morbi, moderationem; ut neque aliud
quā expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta inedia, protinus satietate esse.
Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quāto inutilius est in cor-

De frictione.

Oportet autem rationes vires in
frangere, quæ vel repugnare
vel recte secuti sunt: & cum ea
quod antequam adhibetur posita
autem postea reddere.

frictionis autem, si non
frictionis, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

in uero dicitur frictione. aut
Eod. omni frictio demit.
Eod. omni cura, siue adhibetur
ad rem, cum non potest.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

Eod. uero dicitur frictione. aut
frictio, si uicinas, si uero
corpus: si lenis, modica: si mu-
moribus: si modica, si lenis.

pore etiam agro? Neque ulla res magis adiuuat laborantem, quam tempeſtiua abſtinentia. Intemperates homines apud nos, ipſi cibi tempora curantibus dant: Rurſus alij, tempora medicis pro dono remittunt, ſibi ipſis modum uendicant. Liberaliter agere ſe credunt, qui cætera illorum arbitrio relinquunt; in genere cibi liberi ſunt, quaſi quærat, quid medico liceat, non quid agro ſalutare ſit; cui uehementer nocet, quæties in eius, quod aſſumitur, uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

De ſudore.

Cap. XVII.

Sudor etiam duobus modis elicitur, aut ſiccis calore, aut balneo. Siccus calor eſt, & harenæ calidæ, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium ſudationes, ubi e terra profuſus calidus uapor, edificio incli-
ditur, ſicut ſuper Baias in myrtetis habemus. Præter hæc, ſole quoque, & exercitatione is mouetur. Vtilia-
que hæc genera ſunt, quoties humor intus nocet, iſque digerendus eſt. Ac neruorum quoque quædam
uitia ſic optime curantur, ſed cætera infirmis poſſunt conuenire. ſolet exercitatio, tantum robuſtioribus;
qui tamen ſine febre, uel initio morbi, uel etiam grauius morbis tenentur. Cauendum autem eſt, nequid
horum, uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex uſus eſt, nam modo diſcuſſis febribus ini-
tium cibi plenioris, iunioris firmioris, ualitudini facit, modo febrē ipſam tollit; ſereque adhibetur, ubi ſum-
mam curam relaxari, euocarique corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timi-
dius eo utebantur. Aſclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, ſi tempeſtiua eſt, debet: & ante tem-
pus nocet. Quiſquis febre liberatus eſt, ſimulatque ea uno die non acceſſit; eo, qui proximus eſt, poſt tem-
pus acceſſionis, tuto lauari poteſt. At ſi circuitum habere ea febris ſolita eſt, ſic, ut tertio, quarto uel die re-
uertatur, quando cunque non acceſſit, balneum tutum eſt. Manentibus uero adhuc febribus, ſi hæc ſunt
lentæ, lienesque iam diu male habent; recte medicina iſta tentatur, cum eo tamen, ne præcordia dura ſint,
neue ea ſumeant, neue lingua aſpera ſit, neue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus ſit, neue tū-
febris increſcat. At in hiſ quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora ſunt; alterū
ante horrorem, alterum febre finita. In hiſ uero, qui lentis febricitant diu detinentur; cum aut ex toto receſ-
ſit acceſſio; aut ſi id non ſolet, certe lenita eſt; iamque corpus tam integrum eſt, quam maxime eſſe in eo
genere ualutudinis ſolet. Imbecillus homo iturus in balneum uitare debet, ne ante frigus aliquod experia-
tur. Vbi in balneum uenit, pauliſper reſiſtere, experiri que tempora aſtringantur, & an ſudor aliquis
oriatur. Illud ſi incidit, hoc non ſecutum eſt, inutile eo die balneum eſt; perungendus eſt is leniter, & auſe-
rendus eſt, ſi admodumque omni modo frigus, & abſtinentia utendum. At ſi temporibus integris primum ibi,
deinde alibi ſudor incipit; fouendum os aqua calida, tum in ſolio deſidendum eſt; atque ibi quoque uiden-
dum, num ſub primo contactu aquæ calidæ ſumma cutis inhorreſcat; quod uix tamen fieri poteſt, ſi priora
recte ceſſerunt. certum id autem ſignum inutilis balnei eſt. Antè uero, an poſteaquam in aquam calidam
ſe demittat, aliquis perungi debeat, ex ratione ualutudinis ſuæ cognoſcat. Fere tamen (niſi ubi nominatim,
ut poſtea fiat, id præcipitur) mox ſudore, leuiter corpus perungendum, deinde in aquam calidam demit-
tendum eſt, atque hîc quoque habenda uirium ratio eſt: Neque committendum, ut per æſum anima defi-
ciat; ſed maturius is auferendus, curioſeque in ueſtimētis inuoluendus eſt: ut neque ad eum frigus aſpiret;
& ibi quoque, antequam aliquid aſſumat, inſudet. Fomenta quoque calida ſunt, milium, ſal harena; quod li-
bet eorum calefactum, & in linteum coniectum. Si minore ui opus eſt, etiam ſolum linteum: At ſi maiore,
extincti titiones, inuolutique panniculi, & ſic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi, & in
uaſa fictilia, ad ſimilitudinem, quas lenticulas uocant, aqua conijcitur; & ſal ſiccis linteis excipitur, demitti-
turque in aquam bene calidam: tum ſuper id membrum, quod fouendum eſt, collocatur; iuxtaque igne
leuiter aſpergitur, ubi frigere coepit, ad ignem refertur; & idem in altero ſit; deinde in uicē in utroque inter
quæ deſcendit ſaliſ, & calidus ſuccus, qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. Hiſ omnibus com-
mune eſt, digerere id quod uel præcordia onerat, uel fauces ſtrangulat, uel in aliquo membro nocet. Quan-
do autem, quodque utendum ſit, in ipſis morborum generibus dicitur.

Qui cibi, potiones ue, aut ualentis, aut medie, aut imbecille materia ſint.

Cap. XVIII.

Cum de hiſ dictum ſit, quæ detrahendo iuant, ad ea ueniendum eſt, quæ nos alunt, id eſt cibum, &
potionem; hæc autem non omnium tantum morborum, ſed etiam ſecundæ ualutudinis communia præſi-
dia ſunt. Pertinetque ad rem, omnium proprietates noſſe. primum, ut ſani ſciant, quomodo hiſ utantur;
deinde ut exequentibus nobis morborum curationem, liceat ſpecies rerum, quæ aſſidue neceſſariæ erunt,
ſubijcere. neque neceſſe eſt ſubinde ſingulas eas nominare. Scire igitur oportet, omnia legumina, quæque
ex frumentis panificia ſunt, generis ualentiffimi eſſe. Id ualentiffimum uoco, in quo plurimum alimenti eſt;
itē omne animal quadrupes domeſticum; omne grande ferā, quales ſunt capræ, ceruus, aper, onager, omne
grandem autem, quales ſunt anſer, & pauo, & grus; omnes belluas marinas, ex quibus cetos eſt, quæque hiſ
pares ſunt; Item mel, & caſcum, quod minus mirum eſt, opus piſtorum ualentiffimum eſſe, quod ex frumen-
to, adipe, melle, caſeo conſtat. In media uero materia, numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, uel
bulbos aſſumimus: Ex quadrupedibus, lepore; aues omnes, a minimis ad phœnicopterū. itē piſces omnes,
qui ſalem non patiuntur, ſolidiue ſaliuntur. Imbecilliffimam uero materiam eſſe, omne olus, & quidquid
in cauliculo

in cauliculo nascitur; qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis; omnia poma, oleas, codeas, itemque conchilia. Sed quamuis hæc ita discreta sunt; tamen etiam quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res, alia uel ualentior est, uel infirmior. Si quidē plus alimenti est in carne, quàm in ullo alio. Firmius est triticum, quàm milium; id ipsum, quàm hordeum; & ex tritico, firmissima siligo, deinde simila; deinde cui nihil ademptum est (quod *αὐτόνυρον* Græci uocant) infirmior est. ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus uerò, ualentior faba, uel lentiscula, quàm pisum. Ex oleribus, ualentior rapa, napique, & omnes bulbi in quibus cepam quoque, & allium numero, quàm pastinaca, uel quæ specialiter radicula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & portum, quàm lactuca, uel cucurbita, uel asparagus. At ex fructibus surculorum, ualentiores uia, ficus, nuces, palmulæ, quàm quæ poma propriè nominantur. Atque ex his ipsis firmiora, quæ succola, quàm quæ fragilia sunt. Itemque ex his auibus, quæ in media specie sunt, ualentior ea, quæ pedibus, quàm quæ uolatu magis nititur; & ex his quæ uolatu fidunt, firmiores sunt quæ grandiores aues, quàm quæ minutz sunt, ut ficedula, & turdus. Atque ex quoque, quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant quàm quæ natandi scientiam nō habent. Inter domesticas uerò quadrupedes, leuissima suilla est, grauissima bubula. Itemque ex feris, quò maius quodque animal, eò robustior ex eo cibis est. Pisciumque eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur; tamē grauissimi sunt, ut aurata, coruus, scarus, oculata; tum plani; post quos, etiam leuiores lupi, mulique; & post hos omnes, saxatiles. Neque uerò in generibus rerum tantummodò discrimen est; sed etiam in ipsis, quod & ætate fit, & membro, & solo, & coelo, & habitu. Nam quadrupes animal omne, si lactans est, minus alimenti præstat: Item quò tenerior pullus, coherilis est. In piscibus quoque medietas, quæ nondum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue, ungule, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hēdo, ue, cum pectio listotum caput aliquantò, quàm cætera membra, leuiora sunt; adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus, pectora, colla, alæ, uel recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uerò pertinet, frumentum quoque ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa editus, quàm in harena; leuior in harena, quàm in limo. Quò fit, ut ex stagno, uel lacu, uel flumine, eadem genera grauiora sint: Leuior qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferū animal, domestico leuius; & quodcunque humido coelo, quàm quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingui, quàm macra; recentia, quàm salsa; noua, quàm uetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iuuulenta, quàm asla; magis asla, quàm elixa. Ouū durum, ualentissimæ materiz est; molle, uel sorbile, imbecillissimæ. Cum quæ panificia omnia firmissima sint; elora tamen quedam genera frumenti, ut alica, oriza, ptisana, uel ex ipsedem facta sorbitio, uel pulicula. Et aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus uerò, quæcunque ex frumento facta est; itemque lac, mulsum, defrutum, passum; uinum; aut dulce, aut uehemens, aut niustum, aut magis uetustatis, ualentissimi generis est. At acetum, & id uinum, quod paucorum annorum, uel aufterum, uel lene est, in media materia est: Ideoque infirmis, nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. firmiorque ex frumento potio est, quò firmitus fuit ipsum frumentum. firmior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod tenui; quodque temperato coelo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimumque; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum, quò plus mellis habet; defrutum, quò magis incoctū est; passum, quò ex sicciore uia est, eò ualentius est. Aqua leuissima, pluuialis est, deinde fontana; tum ex flumine, tum ex puteo; post hæc, ex niue, aut glacie. grauior his, ex lacu; grauissima, ex palude. Facilis etiam, & necessaria cognitio est, naturam eius requirentibus. nam leuis pondere apparet; & ex his quæ pondere pares sunt, eò melior quæque est, quò celerius, & calefit, & frigescit, quoque celerius ex ea, legumina percoquantur. fere uerò sequitur, ut quò ualentior quæque materia est, eò minus facile concoquatur; sed si concocta est, plus alit. Itaque utendum est materiz genere, pro uiribus; modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmissimis opus est. mediocriter firmos, media materia optime sustinet. & robustis apta, ualidissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest; magis in his, quæ ualentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura, ac proprietates cuiusque rei sit, quæ uescimur.

IX.
Cap. X. III.

Neque hæc solò discrimina sunt; sed etiam aliz res boni succi, aliz mali sunt, quas *δύσχυλεις*, uel *κακοχύλεις* Græci uocant: Aliz lenes, aliz acres; aliz crassiores pituitam in nobis faciunt, aliz tenuiorem; aliz idoneæ sunt stomacho, aliz alienæ sunt. Itemque aliz inflant, aliz ab hoc absunt; aliz calefaciunt, aliz refrigerant; aliz facile in stomacho acescunt, aliz non facile intus corumpuntur. aliz mouent aluū, aliz supprimunt. aliz citant urinam, aliz tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud aliter uel corpori, uel ualitudini conuenit.

Quæ res boni succi sint.

Cap. X. / X.

Boni succi sunt triticum, siligo, alica, oriza, amilum. Item & lenes sunt, & stomacho apte, & calefaciunt, quæ, hæc, quæ supra nominauimus. Medij inter teneros, durosque pisces, ut mulus, & lupus, uerna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum sorbile, portulaca, cochilæ, palmulæ. ex pomis, quodcunque neque

LIBER SECUNDVS

acerbum, neque acidum est. Vinum dulce, uel lenes, passum, defrutum, oleum, quæ ex his duobus in alterutro feruatæ sunt, uulua, rostra, trunculi quæ. In summa, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

Que res mali succi sunt. Cap. XXI.

Mali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro falsa, omne falsamentum, garum, uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, foeniculum, cuminum, anisum, lapauium, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunque acidum, uel acerbum est, acetum, omnia acra, acida, acerbata, oleum, pisces quoque saxatiles, omnesque qui ex tenerrimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, uirosique sunt, ut fere quos stagna, lac, limosique riuus ferunt, qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

Que res lenes, quæ uel acres sint.

Cap. XXII.

Lenes autem sunt forbitiones, pulicula, laganum, amilum, ptisana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est: Quod fere quidem in omni, quæ domestica sit, præcipue tamen in ungulis, trunculisque suum, in pectiolis, capitulisque hedorum, & uitulorum, & agnorum, omnibusque cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acra sunt, omnia nimis austera, omnia acida, omnia falsa, & mel quidem quod melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactuca, maximaque olerum pars.

Que res crassiores, quæ uel tenuiorem pituitam faciunt.

Cap. XXIII.

Crassiores autem pituita faciunt oua sorbilia, alica, oriza, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem omnia falsa, atque acra, & acida.

Que res stomacho idoneæ sunt.

Cap. XXIV.

Stomacho autem aptissima sunt, quæcunque austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæque contacta sale modico sunt: Item panis sine fermento, & elota alica, uel oriza, uel ptisana, omnis auis, omnis uenatio, atque utraque uel assa, uel elixa: Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris fumitur, macrum potius, quam pingue. Ex sue, ungula, rostra, aures, uulua sterilesque. Ex oleribus, intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, fiser. Ex pomis, cerasum, morum, sorbum, pirum fragile, quale crustulinum, uel neauia-num est. Item pira, quæ reponuntur, tarentina, atque signina. Malum orbiculatum, aut caudianum, uel amerinum, uel cotoneum, uel punicum absinthium. Vix ex olla, molle ouum, palmula, nuclei pinei, oleum albæ ex dura muria, eadem aceto intinctæ, uel nigre, quæ in arbore bene permaturuerunt, uel quæ in passo, defruto uel feruatæ sunt. Vinum austerrimum, licet iam asperum sit, item refinatum. Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpura, cochleæ, cibi, potionesque, uel frigide, uel feruentes, absinthium.

Que res alienæ stomacho sunt.

Cap. XXV.

Aliena uero stomacho sunt, omnia tepida, omnia falsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio panis, itemque uel ex milio, uel ex herdeo; oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo, garum uel estur, mel, multum, defrutum, passum, lac, omnis caseus, uua recens, ficus, & uiridis, & arida, legumina omnia, quæque inflare consueuerunt, item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapauium, apianum, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quidquid boni succi est, protinus stomacho conuenire, neque quidquid stomacho continetur, protinus boni succi esse.

Que inflant, aut inflationem leuant.

Cap. XXVI.

Inflant autem omnia fere legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id uinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto fiser, & pastinaca; bulbi, ficus etiam aride, sed magis uirides; unguæ recetes, nuges omnes, exceptis nucleis pineis; lac, omnisque caseus; quidquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uetere. Foeniculum uero, & anethum, inflationes etiam leuant.

Que res aut calefaciunt, aut refrigerant.

Cap. XXVII.

At calefaciunt piper, sal, caro, omnis iurulenta, allium, cepa, ficus arida, falsamentum, uinum, & quod meracius est, eo magis. refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca:

& lactuca: Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austera, pira fragilia, caro di-
za, præcipueque acetum, siue cibis ex eo, siue potio assumitur.

Que res intus facile intiantur, uel minime corrumpuntur.

Cap.

X X V I I I.

Facile autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius, quam ex tritico est; lac, mel;
ideoque lactantia, atque omne pistorium opus, teneri pisces, ostrea, olera, caseus, & recens, & uetus, crassa,
uel tenera caro, uinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quidquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dul-
ce, uel nimis tenue. At minime intus uitiantur, panis sine fermento, aues, & ex potius duriores, aurati pi-
sces, neque solum aurata pura, aut scarus; sed etiam loligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisque dura
caro; eademque aptior est si macra, si salsa est; omniaque salsamenta, cochlear, murices, purpure, uinum au-
sterum, uel refinatium.

Que res aluum mouent.

Cap.

X X V I I I.

At aluum mouent, panis fermentatus, magisque si cibarius, uel hordeaceus est: brassica, si sub cruda
est, lactuca, anethum, nasturcium, ocymum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lapathium,
beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, uina, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, uiz recentis
pingues, minutæ aues, cochlear, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes fere conclu-
læ, maximeque ius earum, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepium atramentum, si qua caro assumitur pin-
guis, eadem uel iurulenta, uel elixa, aues quæ natant, mel crudum, lac, lactantia omnia, mulsum, uinum dul-
ce, uel salsum, aqua, tenera omnia, tepida, dulcia, pingua, elixa, iurulenta, salsa, diluta.

Que res aluum astringunt.

Cap.

X X I X.

Contra astringunt, panis ex filigine, uel ex simila, magis si sine fermento est, magis etiam si uetus est;
intéditurque uis eius etiam si bis coquitur, pulticula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itemque ex
iisdem sorbitio, & magis si hæc ante fricta sunt, lenticula, cui uel beta, uel intubus, uel ambubeia, uel planta-
go adiecta est; magisque etiam si illa ante fricta est, per se etiam intubus, uel ex plantagine, uel ambubeia fri-
cta, minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisque si assa sunt; minutæ aues, merula, palumbus, magis
que si in posca decoctus est; graues quoque aues, quæ magis currunt, quæ uolant, lepus, caprea, iecur ex his,
quæ seui habent, maximeque bubulum, ac seui ipsum; caseus, qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatio-
ne, quæ in caseo transmarino uidemus; aut si recens est, ex melle, mulso, uel decoctus. Item mel coctum, pira im-
matura, sorba, magisque ea, quæ torminalia uocantur; mala cydonia, & punica, oleum, uel albe, uel permatu-
ra, myrta, palmulæ purpure, murices, uinum refinatum, uel asperum, ite meracum, acetum mulsum, quod infer-
buit, item defrutum, passum, aqua, uel tepida, uel præfrigida, dura (id est ea quæ tarde putrescit, ideoque plu-
uia potissimum) omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne, assa potius, quam elixa.

Que res urinam mouent.

Cap.

X X X I.

Vrinam autem mouent, quæcunque in horto nascentia, boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum,
ocymum, menta, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturcium, eruca, fœniculum. Præter hæc asparagus, cap-
paris, nepeta, thymum, satureia, laplanum, paffinaca, magisque agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione,
maxime lepus, uinum tenue, piper, & rotundum, & longum, sinapi, absinthium, nucleus pinei.

Que res somnum mouent, aut sensum excitant.

Cap.

X X X I I.

Somno uero aptum est papauer, lactuca, maximeque effluua, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum,
porrum. Sensus excitant nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueque pulcium, ruta, & cepa.

Que res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent,
aut emolliant.

Cap.

X X X I I I.

Euocare uero materia multa admodum possunt; sed ea, quæ ex peregrinis medicamentis maxime con-
stant, alijsque magis, quæ quibus ratione uicinis succurrunt, opitulantur, in præsentia differant. Ponant ea uero,
quæ prompta, & his morbis de quibus protinus dicimus sum, apta, corpus erodunt, & sic eo, quod mali est,
extrahunt. Habent autem hanc facultatem semina eruce, nasturcij, radicle, præcipue tamen omnium sinapi;
Salis quoque, & fici eadem uis est; seniter uero simul, & reprimunt, & molliunt, lana succida, uel aceto, uel
uino, quo oleum adiectum est; contrita palmulæ, furfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At simul
reprimunt, & refrigerant, herba muralis (parthenium, uel perdicium appellant) serpillum, pulcium,
ocymum, herba sanguinalis (quam Græci πολυπόλον uocant) portulaca, papaueris folia, capreolique uitium,
coriandri folia, hyoscyamum, muscus, sifer, apium, solanum (quam Græci σπινθιον uocant) brassicæ folia, intu-
bula.

b ii]

LIBER TERTIVS

bus, plantago, foeniculi semen, contrita pira, uel mala, precipueque cydonia, lenticula, aqua frigida, maxime
que pluuialis, uinum, acetum, & ex horum aliquo magis madens, uel panis, uel farina, uel spongia, uel cinis,
uel lana succida, uel etiam limeolum, creta, cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum, uer-
benarum, contusa, cum teneris caulibus folia; cuius generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, li-
gustrum, rosa, rubus, laurus, hederæ, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt, cocta mala cydonia,
malicorium, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, puluis, uel ex fecæ uini, uel ex
myrti folijs, amaræ nuces. Calefacit uero ex qualibet farina, cataplasma, siue ex tritici, siue ex farris, siue hor-
dei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panis, uel lenticulæ, uel fabæ, uel lupini, uel lini, uel foeni græci, ubi ea de
ferbuit, calidaque impofita est: Valentior tamen ad id, omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua, cocta. Pre-
terea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisque si uetus est, sal nigrum, git, piper, quin-
quefolium, feræque, quæ uehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant, quæ calefaciunt, & digerunt, &
emolliunt. Præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini, uel foeni græci semine. His autem o-
mnibus, & simplicibus, & permixtis uariè medici utuntur; ut magis quid quisque persuaserit sibi appareat,
quàm quid euidenter compererit.

LIBER TERTIVS.

De morborum generibus. Cap. I.

ROVISIS omnibus, quæ pertinent ad uniuersa genera morborum; ad singulorum cu-
rationes ueniam. Hos autè in duas species Græci diuiserunt, aliosque ex his acutos, alios lon-
gos esse dixerunt. Idque, quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdè alij inter
acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam
enim breues utique sunt, qui citò uel tollunt hominem, uel ipsi citò finiuntur. Quidam lon-
gi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitiù est. Tertiumque genus eorù est, qui modò acuti,
modò longi sunt. idque non in febribus tantummodò (in quibus frequentissimum est) sed in alijs quoque
fit. Atque etiam præter hos, quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non perimit; neque utique
longum; quia si occurritur, facillè sanatur. Ego cum de singulis dicam, qui cuiusque generis sit indicabo. Si
uidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere uidentur, & eos, qui oriuntur in partibus. In-
cipiam a prioribus, pauca præfatus de omnibus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi uendicare,
quàm ars, potest; utpote cum repugnante fortuna, nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscendum me-
dico est parum proficiente in acutis morbis, quàm in longis. Hic enim breue spatium est intra quod si quod
auxilium nõ profuit, æger exstinguitur. ibi, & deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo
ut ratio, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus, cum
penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. & acutus quidem quò uetustior est, longus
autem quò recentior, eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet; quod non omnibus ægris ea-
dem auxilia conueniunt. Ex quo incidit, ut alia, atque alia summi auctores, quasi sola uendicarint, prout cui-
que cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondit, non tanti putare auctorem, quanti ægrum; &
experiri aliud, atque aliud; sic tamen, ut in acutis morbis citò mutetur, quod nihil prodest in longis (quos
tempus ut facit, sic etiam soluit) non statim condemnetur, si quid non statim profuit. minus uero remo-
ueatur, si quid paulum saltem iuuat; quia profectus tempore expletur.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an consistentiam, an minuantur; & qua ratione ab initio,
qui languere incipit, curari debeat. Cap. II.

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit; non in his solis, in qui-
bus semper ita se habet; sed in his quoque, in quibus uariat. Nam ubi sine intermissionibus, accessiones, &
dolores grates urget, acutus morbus est. Vbi tenti dolores, lenta uel febres sunt, & spatia inter accessiones
porriguntur, acceduntque ea signa, quæ in priore uolumine exposita sunt; longum hunc futurum esse ma-
nifestum est. Videndum etià est, morbus an incrementum, an consistat, an minuat; quia quedam remedia incre-
scentibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. eaque, quæ decrecentibus apta sunt, ubi acutus incre-
scentibus ueniunt; hæcque, & antequam proximè reuertatur, & postea desinunt. Atque in longis quoque mor-
bis, etiam tales notas non habentibus, scire licet incrementum, si somnus incertus est, si deterius cõcoctio, si foe-
diores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idè magis pallet.
Ea uero quæ contraria his sunt, decedentis eius notæ sunt. Præter hæc, in acutis morbis, serius æger alen-
dus est, nec nisi iam inclinantis; ut primò dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustine-
re spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad
rem pertinet, uim totius corporis moliri, quàm proprie partes ægre sanentur. Multum etiam interest,
ab initio quis rectè curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest, in quibus assidue frustra
fuit. si quis temerè habuit, adhuc integris uiribus uiuit, admota curatione, momento restituitur. Sed
cum ab his corperim, quæ notas quasdam futuræ aduersæ ualitudinis exhibent; curationum quoque prin-
cipium

cipium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his, quæ proposita sunt, incidit, omnino optima sunt, quies, & abstinentia. Si quid bibendum, aqua. idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, biduo proximeque abstinentia, sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua; postea die etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc enim sæpe instans grauis morbus discutitur, plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut uino sperant, non quò non interdum id incidat, aut non decipiat, sed quò sepius fallat, solaque abstinentia sine ullo periculo medeatur. cum præsertim etiam pro modo terroris, moderari liceat; & si leuiora indicia fuerint, satis sit a uino tantum abstinere, quod subtrahum plusquam si cibo quid dematur, adiuuat. si paulò grauiora, satis sit, non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere. interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, & colere potissimum, satisque sit, rum ex toto a cibo, a uino, ab omni motu corporis abstinere, cum uehementer notæ terruerunt. Neque dubium est, quin uix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc maturè morbo occurrat, & grotet.

De febrium generibus.

Cap. III.

Atque hæc quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. sequitur uero curatio febrium, quod & in toto corpore, & uulgare maxime morbi genus est. Ex his, una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt: sed id raro euenit. In prioribus, & morbi sunt, & medicina. At quartanæ quidem simplices sunt, incipiunt fere ab horrore, deinde calor erumpit; finitaque febre, biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarum uero duo genera sunt; alterum, eodem modo, quo quartana, & incipiens, & definens illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longè perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur; ex octo autem, & quadraginta horis, fere sex, & triginta per accessionem occupat; interdum etiā uel minus, uel plus; neque ex toto in remissione desinit, sed tantum leuius est. id genus plerique medici *intermittens* appellant. quotidianæ uero uariæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus a calore incipiunt, aliæ a frigore, aliæ ab horrore. Frigus uoco, ubi extremæ partes membrorum inalgescunt; horrorem, ubi totum corpus intremittit. Rursus aliæ sic definiunt, ut ex toto sequatur integritas; aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat; ac sæpe aliæ uix quidquam, aut nihil remittant, sed ita ut continuant. Deinde aliæ feruorem ingentem habent, aliæ tolerabilē; aliæ quotidie pares fiunt, aliæ impares; atque inuicem altero die leniores, altero uehementiores; aliæ tempore eodem post die reuertuntur, aliæ uel serius, uel celerius; aliæ diem, noctemque, accessionem, & decessionem implent, aliæ minus, aliæ plus, aliæ cum decedunt, sudorem mouent, aliæ non mouent, atque aliæ per sudorem ad integritatem uenitur, aliæ corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singulæ singulis diebus fiunt, modo binæ, pluresue concurrunt. ex quo sæpe euenit, ut quotidie plures accessiones, remissionesque sint; sic tamen, ut una quæque alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoque confunduntur, sic, ut neque notari tempora earum, neque spatia possint. Neque uerum est, quod dicitur a quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret, si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. neque de re, sed de uerbo controuersiam mouent: qui cum aliter, aliterque in eodem morbo febres accedant, non easdem inordinatè redire, sed alias, aliasque subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si uerè diceretur. Tempora quoque remissionum, modo libera-

De curationum diuersis generibus.

Cap. IIII.

Et febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt, prout auctores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tutò, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est: sed fere periculosa esse nimium, & festinatio, & uoluptas solet. qua uero moderatione utendum sit, ut quantum fieri potest, omnia ista contingant (prima semper habita salute) in ipsis partibus curationum, considerandum erit. & ante omnia, quæritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui, medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur, eo quod cruditatem maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ ledere uidebatur, ducendo sepius aluum, subtrahabant. Asclepiades medicamentis sustulit; aluum non toties, sed fere tamē in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se aut eius remediū, uti professus est. Conuellendas enim uires egri putauit, luce, uigilia, siti ingenti; sic, ut ne os quidē primis diebus elui sineret. Quò magis falluntur, qui per omnia iocundā eius disciplinā esse contendunt; & is enim ulterioribus quidē diebus, cubantis etia luxuriæ subscripsit; primis uero, tortoris uicē exhibuit. Ego autē medicamentorum dationes, & aluum duci nō nisi rarò debere, concedo. & id nō ideo tamē agendum, ut egri uires conuellantur, existimo; quoniā ex imbecillitate, summū periculū est, minui ergo tantum materiam superantē oportet; quæ naturaliter digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaque abstinendus a cibo primis diebus est, in luce habendus æger (nisi infirmus) interdiu est: quoniā corpus ista quoque digerit;isque cubare quā maximo conclaui

b iiiij

debet. Quod ad firum uero, somnumque pertinet; moderandum est, ut interdum uigilet, noctu, si potest, co-
 quiescat, ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & sicci est, & ipsi fo-
 tet. quamuis id tempus aptum porioni non est: Commodeque Erasistratus dixit, saepe inferiore parte hu-
 morem non requirente, os, & fauces requirere; neque ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo qui-
 dem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibis datus, qui quando primū dari
 debeat, quaeritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe sexto, & id fortasse, uel in Asia,
 uel in Aegypto, coeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum triduo per omnia fatigarat, quarto die cibo de-
 stinabat. At Themison impet non quando coepisset febris, sed quando desisset, aut certe leuata esset, con-
 siderabat; & ab illo tempore, expectato die tertio, si non accesserat febris, statim, si accesserat, ubi ea uel de-
 sierat; uel si assidue inhaerebat, si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum
 est: Nam potest primo die primus cibis dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto,
 aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim, qualis mor-
 bus sit, quale corpus, quale coelum, quae aetas, quod tempus anni. minimeque in rebus multum inter se dif-
 ferentibus, quod intermittendum non est, perpetuum esse praeceptum temporis potest. In morbo, qui plus
 uirium aufert, celerius cibis dandus est, itemque eo coelo, quo magis digerit. Ob quam causam, in Africa
 nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius etiam puero, quam iuueni: estate, quam hyeme, dari debet.
 Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est; ut aegri uires subinde assidens medicus inspicat; &
 quandiu supererunt abstinentia pugnet; si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subueniat. Id enim eius offi-
 cium est, ut aegrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitatem fami prodat. Idque apud Era-
 stratum quoque inuenio, qui quamuis parum docuit, quando uenter, quando corpus ipsum exinaniret-
 ur; dicendo tamen, haec esse uisenda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur; satis ostendit, dum ui-
 res superessent, dari non oportere, ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest, ab uno
 medico multos non posse curari; eumque si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed
 qui quaestui seruiunt, quoniam is maior ex populo est; libenter amplectuntur ea praecepta, quae sedulitate
 non exigunt. It in hac ipsa re: Facile est enim dies, uel accessiones numerare his quoque, qui aegrum raro
 uident, ille assideat, necesse est, qui, quod solum opus est, uisurus est; quando nimis imbecillus futurus sit,
 nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi, dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem
 alia etiam de diebus ipsis dubitatio; quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam
 tunc de aegris iudicaretur, xpoipous nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus,
 uigesimalis primus; ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & uigesimo daretur.
 Igitur sic aegros nutriebant, ut dierum imparium accessiones expectarent: deinde postea cibum, quasi le-
 moribus accessionibus instantibus darent, adeo ut Hippocrates, si alio die febris desisset, reciduum timere
 sit solitus. Id Asclepiades iure ut uanū repudiavit: neque in ullo die quia par imparis esset, his uel maius,
 uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares sunt, & opportunius post eorum accessio-
 nes, cibis datur. Numquam etiam in ipso morbo, dierum ratio mutatur; sitque grauior, qui remissior
 esse consueuerat, atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam uirum antiqui fatabantur. Qui cum
 octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet; ipsi sibi
 repugnabant, non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potentiores.
 Plus enim tribuebant nono, & undecimo. Quod cum fecissent, sine ulla probabili ratione, ab undecimo
 non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei, quae septi-
 mus dies liberaturus sit, quartum esse grauissimum. Ita, illo quoque auctore, in die pari, & grauior febris esse
 potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco, quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum
 apprehendit; id est, quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum. In quo, & ab
 impari, ad paris rationem transit. & ne hoc quidem propositum coferuauit, cum a septimo die, undecimus,
 non quartus, sed quintus sit, adeo apparet, quacūque ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub
 illo quidem auctore reperi. Verum in his quidem antiquos tunc celebres, admodum pythagorici nume-
 ri sefellerunt; cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his
 coniectare, quando dandus cibis sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, num oporteat dari, cum iam
 bene uenae conquieuerunt; aut etiam pum manentibus reliquijs febris: Antiqui enim quam integerrimis
 corporibus alimentum offerebant; Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamē inhaerente, in quo
 unam rationem secutus est; non quod non sit interdum maturus cibis dandus, si mature timetur altera ac-
 cessio, sed quod scilicet quam sanissimo dari debeat: Minus enim corrumpitur, quod integro corpori infer-
 tur. Neque tamen uanum est, quod Themisoni uidebatur; si duabus horis integer futurus esset aeger, sa-
 rius esse tunc dare, ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id
 esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praeter, statim esse, principia cibi a decedente febre, quam
 reliquias ab incipiente excipi. Ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo, dandus est; si breue,
 etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio, si qua maxime in
 febre continua potest esse. Atque hic quoque quaeritur, utrum tot horae expectandae sint, quot febrem ha-
 buerunt: an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris iocundius inlidat, quibus interdum non ua-
 cat. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus praeterire, quamuis ubi longa febris fuit, potest
 de qua proximè dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium

Sicut autem dicitur, etiam si
corpus, vel quodlibet aliud, non
apparet, quia corpus consentit
ut non aliter, etiam in istis
terminis terminis aut quodlibet aliud
potest non esse aliud aliud
Sicut dicitur, etiam si non

Tertio quod die abne ego cum
mensuram habeo comedere
dabo. ut aliter fieri nunciat. a
viris substat. —
si quotidiana fit. ubi ex tot
de. i. i. mulat corpus internum

Si fides inagitur, rati, accedens
 Quod hic quidem iniquitatis, sed
 iniquitate de remittit, in coram
 illa se habet, ut maiori tempore deo
 Si altero de gravior, altero levis
 angus est, post graviores

Graviores fore accipi. leviore max
 ima, in seorsum antecedit.
 Eni in continua feb.
 An mane, quia remissus fore
 mutatur. 7^o aeris est.
 quia si prius fuit morbus.

A mendicis omnis quod fieri potest
 et prope fieri debet ut qui est
 an. tum al. t. d. y.
 In media nocte, s. finire la ora
 tione, c. d. l. g. s. s. i. m. a. d. i.
 te: fecerunt. c. d. l. g. s. s. i. m. a. d. i.

*Si fies yara, jengit gacred. Je.
Si p'urus atep. est die pams, u
at atep. arut dan deot, jg n.*

mendium de re pona de m...
 pona, pona, pona, pona, pona
 & eam a magis affugit.
 In negro corp. ideo ty aptius c.
 sic in remp. aut inclinatione
 pona, pona, pona, pona, pona

Omne est unum et singul
 Cuiusquam magis est propriu
 acceffu reducere: & i
 fatus, dare quoniam magis. co
 quoniam
 fphifim est tertio quoniam de
 bus: dare: i corpus in forma

multos & magis, si omne. fib.
rem. sunt, etia a primo die p
one citus dari debet quia de
grinus vnde coudorunt i la fo
eode die, si non plures accesi.
inde vir corpori deo.

fit post cas. 46. minus ubi da
post quas, si per corpus uicoret,
non daretur. —
fieri tpa vana, 7.
Ost. abo tempus e, 7. fere fin
deinde in dextis eius con

si ppter infirmitate necessitas
aliqnd offere qua increfcer
fatur in fructu. qua in pperit

fuit, non sit suspensum.
Non satis est, iussus in fo. me
interi, sed alia totius corp.
Quod ad dinare equatione.
et securus pueri conuincit, ut co

1. significavit 3. significavit 4. significavit 5. significavit 6. significavit 7. significavit 8. significavit 9. significavit 10. significavit 11. significavit 12. significavit 13. significavit 14. significavit 15. significavit 16. significavit 17. significavit 18. significavit 19. significavit 20. significavit 21. significavit 22. significavit 23. significavit 24. significavit 25. significavit 26. significavit 27. significavit 28. significavit 29. significavit 30. significavit 31. significavit 32. significavit 33. significavit 34. significavit 35. significavit 36. significavit 37. significavit 38. significavit 39. significavit 40. significavit 41. significavit 42. significavit 43. significavit 44. significavit 45. significavit 46. significavit 47. significavit 48. significavit 49. significavit 50. significavit 51. significavit 52. significavit 53. significavit 54. significavit 55. significavit 56. significavit 57. significavit 58. significavit 59. significavit 60. significavit 61. significavit 62. significavit 63. significavit 64. significavit 65. significavit 66. significavit 67. significavit 68. significavit 69. significavit 70. significavit 71. significavit 72. significavit 73. significavit 74. significavit 75. significavit 76. significavit 77. significavit 78. significavit 79. significavit 80. significavit 81. significavit 82. significavit 83. significavit 84. significavit 85. significavit 86. significavit 87. significavit 88. significavit 89. significavit 90. significavit 91. significavit 92. significavit 93. significavit 94. significavit 95. significavit 96. significavit 97. significavit 98. significavit 99. significavit 100. significavit

потбун!

temple of
Egypt,

Leibniz?

दस्तावेज

1881.

2. *gratant, e*
 3. *gratant, e*

Cap. VI.

Sed de cibo facilius quidem cum aegritudo est : quorum saepe stomachus humorespuit , etiam si mens concupiscit . De potione uero , ingens pugna est : eoque magis , quo maior febris est . Hæc enim si-

Et ad in ditione equitatis.
 ut temp. ditor securus eare caverit, ut co-
 tin. non etiam amodo laborat. in ditione,
 ut p. uerit. tunc, sique, ut si p. uerit.
 aut sunt, optimi, et ad equitatem non in.
 si p. uerit, si p. uerit, si p. uerit, si p. uerit.
 et cum equitatem sunt, tunc equitatem.

tim accendit, & tum maxime aquam exigit, cum illa periculofissima est. Sed docendus zger est ubi febris conquiescent, protinus sitim quoque quieturam; longioremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis zgris in potione, quam in cibo, indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet; nisi subito sic uenæ conciderunt, ut cibis quoque dari debeat. Secundo uero, ceterisque etiā, quibus cibis non dabitur; tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heracide Tarentino dictum, ratione caret; ubi aut bilis zgrum aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas poriones misceri nouam materiam corruptæ. Illud uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia porioni quoque; ubi sine illo datur, delignantur, aut cum zgrum dormire cupimus; quod fere sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo, potioneque, febris, & remissionis ratio det; non est expeditissimum, scire, quando zger febricitet, quando melior sit, quando desiciat; sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus, fallacissimæ rei; quia sæpe ista leniores, celeriores uel sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerumque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiā incipiente febre, subeunt, & quiescunt; ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo, grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & resoluit sol; balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus. Adeo ut, cum primum medicus uenit, sollicitudo zgrum dubitantis, quomodo ille se habere uideatur, eas moueat. ob quam causam, periti medici est, non protinus ut uenit, apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari uultu, percontarique quemadmodum se habeat; & si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire. tum deinde eius corpori manum admoouere. quas uenas autem conspectus medici mouet, quæ facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus, calor, equè fallax. nā hic quoque excitatur est, labore, somno, metus, solitudine. Igitur intueri quidem omnia etiā ista oportet; sed his non omnia credere; ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt; teporūque talis est, qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuque, febrem se se concipere; sed ita, si summa quoque arida inequaliter cutis est; si calor, & in fronte est, & ex imis præcordijs oritur; si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit; si color aut rubore, aut pallore nouo mutatus est; si oculi graues, & aut perficci, aut subhumidi sunt; si sudor cum sit, inæqualis est; si uenæ non equis intervallis mouentur. Ob quam causam, medicus, neque in tenebris, neque a capite zgrum debet residere; sed illustri loco, aduersus eum, ut omnes notas ex uultu quoque cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit, atque decreuit, expectari oportet, num tempora, partes uel corporis alia paulum madescant, quæ sudorem uenturum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui calidam aquam; cuius salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Huius autem rei causā, continere zger sub ueste satis multa manus debet; eademque, crura, pedesque contegere; quæ male plerique zgrum in ipso impetu febris, pessimeque, ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus coepit, linteam tepefacere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est; aut si is non uenit; ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo zger uidetur; sub ueste leniter ungendus est, tum detergendus; deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certè quam proximus; utique ex materia, quam leuissima, maximeque sorbitio. eaque, si magnæ febres fuerint, quæ tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic rectè adijcitur, quod corpus magis nutriatur; sed id si stomachum offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoque sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alica elota: si firmus est stomachus, & compressa aluus, ex aqua mulsæ; si uel ille languet, uel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo id satis est; secundo uero aliquid adijci potest, ex eodem tamen genere materie, uel olus, uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidem crescunt, hic solus idoneus cibus est: Vbi uero aut desinunt, aut leuantur; semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima; adijciendum uero aliquid ex mediocrate habita subinde, & uicium hominis, & morbi. Ponendi uero zgro uarij cibi (sicut Asclepiades præcepit) tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis uires sufficiunt; ut paulum ex singulis degustando, famē uitet. At si neque uires, neque cupiditas deest, nulla uarietate sollicitandus eger est, ne plus assumat, quam concoquat. Neque uerum est, quod ab eo dicitur, facilius cōcoqui cibos uarios; eduntur enim facilius; ad concoctionem autem, materie genus, & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, ut neque in crescente morbo, tutum est, zgrum cibo impleri; sed ubi inclinata iam in melius ualitudo est. Sunt aliz quoque obseruationes in febribus necessariæ, atque id quoque uidendum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat. quorum alterum, strangulat quod continet; alterum digerit. nam si astrictum est, dorrenda aluus est, mouenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, conculuisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, uigiliam, prodest: Vtile est etiam, ducere in balneum; prius demittere in solium, tum ungere; iterum ad solium redire, multaque aqua fouere inguina; interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere; uti cibo rarius, & ferius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque oleis, qualia sunt, lapaenum, urtica, malua, uel iure etiam cōcharum, musculorum uel, aut locustarum; neque danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis coget. Poteritque a balneo etiam pinguis, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi graecum fallum. Contra uero, si corpus profluat, sudor coercendus, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, quando cunque uolet, utendum. nō nisi leui gestatione, corpus agitandum; & pro genere mali, subueniendum.

subueniendum. Nam si uenter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & uomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est, uel nitro, uel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus unguendum est: si uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo, cui uinum austerrum sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cum uenit in balneum, prius unguendus, deinde in solum demittendus est. Si in cure uitium est, frigida quoque, quàm calida aqua melius utitur. Vbi ad cibum uentum est, dari debet is ualens, frigidus, siccus, simplex, qui quàm minimè corrumpi possit, panis tostus, caro assa, uinum asperum, uel certe subausterum; si uenter profluit, calidum; si sudores nocent, uomitusque sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

Cap. VII.

Desiderat etiam propriam animaduersionem in febribus, pestilentie casus. In hac minimè utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si uires sinunt, sanguinem mittere optimum est, præcipueque si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut leuata est, uomitu peccius purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis, ducere in balneum opus est; uinum calidum, & meracius dare, & omnia glutinosa: inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quò celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quòd si puer est, qui laborat, neque tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit, nisi ei utendum est, ducenda alui, uel aqua, uel ptisanæ cremore, tum demum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri, ut uiri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est: deinde dandus cibus ex leuissimis, tum is dormiat, postero quoque die, si febris manet, abstineatur. Tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportuna abstinentiam, cibosque opportunos, omisissis cæteris, nutriatur. Si uero ardens febris extorret, nulla medicamentis danda potio est; sed in ipsis accessionibus, oleo, & aqua refrigerandus est; quæ miscenda manu sunt, donec albescant, & conclauis tenendus, quò multum, & purum aerem trahere possit; neque multis uel stimulis strangulandus, sed admodum leuibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia iutis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia uexandus est. alendus maturius est, id est, a die tertio, & ante cibum, idem perungendus. Si pituita in stomacho consistit, inclinata iam accessione uomere cogendus est; & tunc dandum frigidum olus, aut pomum, ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus uel ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum uero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum, magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; & cum iam uenter, & præcordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, uomere debet. Quidam ne uomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida, tantum ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrumlibet factum est, multa uelte operendus est, & collocandus ut dormiat. Fereque post longam sitim, & uigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur, idque præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem, nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus; non ulcus, non delectio, non profluiui alui fuit, Siquis autem in eiusmodi febre leuiter tussit, is neque uehementi siti conflictatur, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertiana febris, quæ hemitritæos dicitur.

Cap. VIII.

At ubi id genus tertianæ est, quod iurgæon medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat: Habet enim plerumque frequentiores accessiones, decessionesque, ut aliud morbi genus uideri possit; porrigitque febris inter horas uiginti quatuor, & triginta sex; ut quod idem est, non idem esse uideatur. Et magno opere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est; & ubi ea uenit, protinus dari; plurimique sub alterutro curantis errore, subito moriuntur. Ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibum, qui neque incitet febrem, & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium.

Cap. IX.

Nonnunquam etiam lentæ febres, sine ulla remissione, corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu, medici cura esse debet, ut morbum mutet: Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his, frictio quoque ex oleo, & sale, salubris uidetur. At si diu frigus est, & corporis, & inactio corporis; non alienum est, in ipsa febre, dare multum tres, aut quatuor cyathos; uel cum cibo uinum bene dilutum: Intenditur enim sæpe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercule, ista curatio noua est, quia nunc quidam

Quo pestilentes feb. de.
in pestilentia, minime uide. et
aut fame, aut medicamentis uti
aut ducere aluum.
Si uires sinunt, sang. mittere opti-
d, p, q, u, q, i, ad del. p, b, s, d.
Si id parum tutum est, ubi febris aut
tenuata est, aut leuata est, uom-
itu peccius purgare.
baln. ratio.
Quo celerius eiusmodi tempestates
corripiunt, eo maturius auxilia
eliciunt, cum quadam temeritate rapienda
sunt.
Si puer est, qui laborat, neque
tantum robur eius est, ut sang. mittere
possit, nisi ei utendum est, ducenda
alui, uel aqua, uel ptisanæ cremore, tum
demum is leuibus cibis nutriendus.
Ex toto, non sic pueri, ut uiri,
curari debent: sed parcius in
agendum, non facile sang. mittere,
non facile ducere aluum, non
cruciare uigilia, fame uel, aut
nimia siti, conuenit.
Vom. post feb. eliciendus.
deinde cibus, somnus, qui
abstinentia in feb.
Inter opportuna abstinentiæ cibos
opportunos, nutriatur.
Si febris ardens extorret, nulla
medicamentis danda potio est.
mignis aquæ & olei, huius
conclauis tenendus, quò multum
& purum aerem trahere possit.
Non multis uel stimulis strangulandus,
sed admodum leuibus tantum
uelte operendus est, & collocandus
ut dormiat.
Fereque post longam sitim, & uigiliam,
post multam satietatem, post infractum
calorem, plenus somnus uenit, per quem
ingens sudor effunditur, idque præsentis-
simum auxilium est.
Sed in his tamen, in quibus præter
ardorem, nulli dolores, nullus præcordio-
rum tumor, nihil prohibens, uel in
thorace, uel in pulmone, uel in faucibus;
non ulcus, non delectio, non profluiui
alui fuit, Siquis autem in eiusmodi
febre leuiter tussit, is neque uehementi
siti conflictatur, neque bibere aquam
frigidam debet; sed eo modo curandus
est, quo in cæteris febribus præcipitur.

traditos sibi aegros, qui sub cautiore medicis trahebantur interdum contrariis remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoque ante Erophilum, & Erasistratum, maximeque post Hippocratem, fuit Petro quidam, qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat, ac si mouerat sudorem, explicuisse se aegrum iudicabat. si non mouerat, plus etiam aquae frigidae ingerebat, & tum uocere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam affam, & nimum homini dabat. Si non liberauerat, decoquebat aquam, sale adiecto, eamque bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. & intra haec, omnis eius medicina erat, eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his, quos Erophili, uel Erasistrati aemuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est remeraria ista medicina, quia plures, si protinus a principijs excepit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, fere quos ratio non restituit, remeritas adnuat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos aegros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere; quia curationem, ubi id quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & praecordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguae. Cap. X.

Considerandum etiam est, febres ne solae sint, an alia his quoque mala accedant. id est, num caput doleat, num lingua aspera, num praecordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & in id ingerere; deinde habere duo pittacia, quae latitudinem frontis, longitudinemque aequent. Ex his inuicem alterum in aceto, & rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam ipsam lanam succidam imponere. Si acetum offendit, puta rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit, oleo acerbo. si ista parum iuuant, teri potest uel iris arida, uel nuces amarae, uel quilibet herba ex refrigerantibus. Quorum quilibet ex aceto impositum, dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuyat etiam panis cum papauere iniectus, uel cum rosa, cerussa, spuma ure argenti. Olfacere quoque uel serpillum, uel anethum non alienum est. At si in praecordijs inflammatio, & dolor est; primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia; ne si calidiora fuerint, plus eo materiam concurret. Deinde ubi prima inflammatio se remittit, tunc demum ad calida, & humida ueniendum est, ut ea quae remanserint, discutiant. Notae uero inflammationis sunt quatuor, rubor, & tumor cum calore, & dolore. Quod magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est: Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est; protinus calidis, & sicis fomentis uti licet. Si uero lingua sicca est, & scabra, detergenda primu penicillo est ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter ferrosa, & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida; ubi penicillo deterfa est, ungi rosa debet, cui cerz sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedat. Cap. XI.

Solet etiam ante febres esse frigus; idque uel molestissimum morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus aeger est: haec enim paulo ante data multum mali adiicit. Item maturius ueste mulata regendus est. ad mouenda partibus his, pro quibus metumus, sicca & calida fomenta; sic, ne statim uehementissimi calores incipiant, sed paulatim accrescant. Perfricandae quoque ea partes manibus unctis ex uere oleo sunt, eique adijciendum aliquid ex calefacientibus: Contentique medici quidam uia frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus, nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum ultra manente febre, dant. deinde ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido, & tenui. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibum semel, & post febrem datus prodest. sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis decipiat: Saep enim in hoc quoque genere ualitudinis iam minui febris uidetur, & rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quae etiam immoratur, & iactatione, & febre, & quendam oris quem Graeci uocant, minuit. Illud satis conuenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem cibum, post leuiorem, aqua mulsam.

Curatio horridi in febribus. Cap. XII.

Horror autem eas fere febres antecedit, quae certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoque turissimae sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alui ductio, neque balneum, neque uinum, neque medicamentum aliud recte datur. incertum est enim, quando febris uentura sit; ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilij causa sit inuentum. Nihilque aliud fieri potest, quam uti primis diebus bene abstineatur aeger. deinde sub decessu febris eius, quae grauissima est, cibum sumat, ut ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur; quia facilius proponere nobis, & accessuum, & decessuum uices possumus. In his autem, cum ueterauerunt, utilis famis non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est; deinde diuidenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam

dam aquam subfalam, & uomere eum cogere, nam fere talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho reledunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æque celus, sæpe enim sic discutitur. Iam quæ quod genus febris sit, scire licet: itaque sub expectatione proxime accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera est, ut per tempus horrois in folio sit. si ibi quoque senferit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quantæ faciat: si quidem eo quoque modo sæpe id discutitur, si nec balneum quidem profuit, ante accessionem alium edat aut bibat calidam aquam cum pipere; si quidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem non admittit: Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur: Fomentisque protinus validioribus totum corpus circumdare conuenit, maxime quæ inuolutis extinctis reffis, & rationibus. Si nihilominus horror perripierit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta perfundatur; cui æque ex calefacientibus ali quid sit adiectum. adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit; maximeque in manibus, & pedibus; & spiritum ipse contineat, æque desistendum est, etiam si horror est: Sæpe enim pertinacia inquantis, malum corporis iunxit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumque uomere cogendus est; utendumque eidem est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescit; si quidem id quoque exonerato corpori prodest. Vltima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet: Caro glutinosa; uinum, cum dabitur, austerum.

Curatio quotidiana febris.

Cap. XIII.

Hæc ad omnes circuitus febrium pertinent, discernendæ tamen singule sunt, sicut rationem habent dissimilem. si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibus altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem, experiri balneum, & uinum; magisque si horrore sublato, hæc superest.

Curatio tertiana febris.

Cap. XIII.

Si tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est; medijs diebus, & ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, & unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis, Cleophrantus in hoc genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa calida aqua perfundebat; deinde uinum dabat. quod quamuis pleraque eius uiri præcepta secutus est, Asclepiades recte tamen præterijt: Est enim anceps, Ipse si tertiana febris est, tertio die post accessionem, dicit aluum duci oportere. quinto, post horrorem, uomitum elicere. deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & uinum. sexto die, in lectulo deueniri: sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse, uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur, tria remedia uomitus, alui ductionis, uini potus, per triduum, id est, die tertio & quinto, & septimo tentare. nec uinum, nisi post accessionem, die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est, incidit quæ in uetustatem; quo die febris expectabitur, in lectulo se continet, post febrem perficitur; tum cibo assumpto, bibat aquam, postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, unctioneque aqua tantum contentus conquiescat: Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit, & post febrem, uinum; & medio die, paulum cibi debet assumere.

Curatio quartana febris.

Cap. XV.

Eadem in quartana faciendæ sunt. Sed cum hæc tardè admodum finiatur (nisi primis diebus discussa est) diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desijt; eodem die, & postero, tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere; biduo proximo quantum fieri potest, hanc quidem, si quarto die, cum horrore febris reuertitur, uomere, sicut ante præceptum est; deinde post febrem, modicum cibum sumere, uini quadrantem. Postero, tertioque die abstinere; aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta; septimo die balneo frigoris præuenire; abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet; ac tum ita nono die, balneo frigoris præuenire, si febris redierit, ducere aluum, ubi ex eo corpus conquieuerit, in unctione uehementer perficari; eodem modo sumere cibum, & uinum; biduo proximo se abstinere frictione seruata. de cimo die, rursus balneum experiri; & si postea febris accessit, æque perficari: uinum copiosius bibere, ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia, cum ceteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus, idque agendū, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quod minus etiam, curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam aluum, deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit; tamen etiam febre liberatus, uix refectionem ualebit, adeo si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante febrem, neque post eam, tentandum erit; nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem, oportet magis, & uehementer perficari, cibum, & ualidum, & fortiter assumere. uino uti quantum libebit, postero die, cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, ungi, perficari fortiter, cibum accipere sine uino; tertio die abstinere, quo die uero febrē expectabit, antè surgere, & exerceri; dareque operam

Curatio quotidiana febris.
 oritur a biliosa in stomacho reledunt, & ex toto remittit: itaque discutitur, sæpe enim sic discutitur. Iam quæ quod genus febris sit, scire licet: itaque sub expectatione proxime accessionis, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera est, ut per tempus horrois in folio sit. si ibi quoque senferit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quantæ faciat: si quidem eo quoque modo sæpe id discutitur, si nec balneum quidem profuit, ante accessionem alium edat aut bibat calidam aquam cum pipere; si quidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem non admittit: Deinde eo modo, quo in frigore præceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur: Fomentisque protinus validioribus totum corpus circumdare conuenit, maxime quæ inuolutis extinctis reffis, & rationibus. Si nihilominus horror perripierit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta perfundatur; cui æque ex calefacientibus ali quid sit adiectum. adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit; maximeque in manibus, & pedibus; & spiritum ipse contineat, æque desistendum est, etiam si horror est: Sæpe enim pertinacia inquantis, malum corporis iunxit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumque uomere cogendus est; utendumque eidem est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescit; si quidem id quoque exonerato corpori prodest. Vltima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet: Caro glutinosa; uinum, cum dabitur, austerum.

Curatio tertiana febris.
 Si tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est; medijs diebus, & ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, & unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis, Cleophrantus in hoc genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa calida aqua perfundebat; deinde uinum dabat. quod quamuis pleraque eius uiri præcepta secutus est, Asclepiades recte tamen præterijt: Est enim anceps, Ipse si tertiana febris est, tertio die post accessionem, dicit aluum duci oportere. quinto, post horrorem, uomitum elicere. deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & uinum. sexto die, in lectulo deueniri: sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse, uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur, tria remedia uomitus, alui ductionis, uini potus, per triduum, id est, die tertio & quinto, & septimo tentare. nec uinum, nisi post accessionem, die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est, incidit quæ in uetustatem; quo die febris expectabitur, in lectulo se continet, post febrem perficitur; tum cibo assumpto, bibat aquam, postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, unctioneque aqua tantum contentus conquiescat: Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit, & post febrem, uinum; & medio die, paulum cibi debet assumere.

Curatio quartana febris.
 Eadem in quartana faciendæ sunt. Sed cum hæc tardè admodum finiatur (nisi primis diebus discussa est) diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desijt; eodem die, & postero, tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere; biduo proximo quantum fieri potest, hanc quidem, si quarto die, cum horrore febris reuertitur, uomere, sicut ante præceptum est; deinde post febrem, modicum cibum sumere, uini quadrantem. Postero, tertioque die abstinere; aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta; septimo die balneo frigoris præuenire; abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet; ac tum ita nono die, balneo frigoris præuenire, si febris redierit, ducere aluum, ubi ex eo corpus conquieuerit, in unctione uehementer perficari; eodem modo sumere cibum, & uinum; biduo proximo se abstinere frictione seruata. de cimo die, rursus balneum experiri; & si postea febris accessit, æque perficari: uinum copiosius bibere, ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia, cum ceteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus, idque agendū, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quod minus etiam, curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam aluum, deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit; tamen etiam febre liberatus, uix refectionem ualebit, adeo si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neque ante febrem, neque post eam, tentandum erit; nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem, oportet magis, & uehementer perficari, cibum, & ualidum, & fortiter assumere. uino uti quantum libebit, postero die, cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, ungi, perficari fortiter, cibum accipere sine uino; tertio die abstinere, quo die uero febrē expectabit, antè surgere, & exerceri; dareque operam

non oportet, ut in ipsam exercitationem, tempus febris incurrat: sic enim saepe illa discutitur. At si in opere occupavit, tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibum, uinum. Si uenter astrictus est, solvendus est. Sed hæc facile validiores faciunt, si imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. si hæc quoque uehemens onerat, intra quietem, & unctionem, & cibum, sistendum est, dandaque opera est, ne quæ cruditas in quotidianam id malum uertat. Nam quartana neminem iugulat: sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. Quod tamen, nisi culpa uel ægri, uel curantis, nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum.

Cap. XVI.

At si duæ quartanæ sunt, neque hæc, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est, aut si id difficile est, leuiter ambulare, considerare, diligenter inuolutis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desijt, cibum modicum sumere, & uinum. reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utranque cibum sumere: deinde uacuo tempore, & moueri aliquid, & post unctionem, cibo uti. Cum uero uetus quartana raro, nisi uere soluat, utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod ualitudinem impediatur. Prodestque in uetere quartana, mutare subinde uictus genus: a uino ad aquam, ab aqua ad uinum: a lenibus cibis ad acres, ab acris ad lenes transire, esse radicem, deinde uomere, iure uel pulli gallinæ uentrem resoluere, oleum ad frictiones adijcere, calefactia ante accessionem sorbere, uel acetæ cyathos duos, uel unum sinapis, cum tribus Græci uini salis, uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrram. Per hæc enim, similiaque, corpus agitando est, ut moueatur ex eo statu, quo detinetur. Si febris quiescit, diu meminisse eius diu conuenit, eoque uitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi a sano quoque aliquandiu timeretur.

Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit.

Cap. XVII.

At si ex quartana quotidiana facta est, cum id uitio inciderit, per biduum abstinere oportet: frictione uti, aquam tantummodo uesperis potui dare. tertio die saepe sit, ne febris accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibum post accessionis tempus est dandus. at si manet, per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest, fricatione quotidie utendum est.

De tribus insaniæ generibus: primo de eius curatione, quæ à Græcis phrenitis dicitur.

Cap. XVIII.

Et febrium quidem ratio exposita est. supersunt uero alij corporis affectus, qui huic superueniunt. ex quibus, eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus iungam. Incipiam ab insaniâ, primamque huius ipsius partem agrediar, quæ & acuta, & in febre est; Græci phrenitis appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere, & loqui aliena. Quod non quidem leue est, neque incidere potest, nisi in febre uehementi; non tamen æque pestiferum est: Nam plerumque breue esse consuevit, leuatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi, remedium aliud desiderat, quod in curanda febre præceptum est. Phrenitis uero tum demum est, cum cõtina dementia esse incipit; aut cum æger, quamuis adhuc sapiat, tamen quasdam uanas imagines accipit. perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt; si quidem ex phreniticis alij hilares, alij tristes sunt; alij facilius continentur, & intra uerba desipiunt; alij consurgunt, & uiolenter quædam manu faciunt, atque ex his ipsis, alij nihil nisi impetu peccant, alij etiam artes adhibent; summamque spem salutatis in captandis maiorum operum occasionibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem, eos, qui intra uerba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant, onerare asperioribus coercionibus superuacuum est: Eos uero, qui uiolentiùs se gerunt, uincire conuenit, ne uel alteri, uel sibi noceant. Neque credendum est, si uinctus aliquis, dum leuari uinculis cupit, sanum iam se fingat; quamuis prudenter, & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insaniæ est. Fere uero antiqui tales ægros in tenebris habebant, eo quod eis contrarium esse exterreri; & ad quietem animi, tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades, tanquam tenebris ipsos terrentibus, in lumine habendos esse dixit; neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaque est, utrumque experiri; & habere eum, qui tenebras horret, in luce; eum qui lucem in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger, si uires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere, ubi maxime furor urget, superuacuum est: simul enim febris quoque increscit, itaque tum nihil, nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur; rationem hanc secutus, quod neque insaniæ esset, nisi febre interna; neque sanguis, nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit; cum & intentio febris, somnum impediatur; & frictio, non nisi in remissione eius utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte sunt, alias omittenda, & continuata quoque febris habet tempora; quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remediij tempus. Quod si uires ægri patiuntur,

[illegible][illegible]

tristitia est prodest lenis, sed multa bis die frictio: Item per caput aqua frigida infusa; demissumque corpus in aquam, & oleum. Illa cōmunia sunt; infanientes uehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque uinum assumere; cibis uti post purgationem, ex leui materia quam leuissimis. nō oportere esse, siue solos, uel inter ignotos, uel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant. mutare debere regiones; & si mens redit, annua peregrinatione esse iaciandos. Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus infanientium speciei, similiue uisus genere curandum est; praterquam quod in hoc infaniz genere solo recte uinum datur.

Cardiaci morbi curatio.

Cap. XIX.

Hunc morbo præcipue contrarium est id genus, quod *καρδιακὸν* a Græcis nominatur; quamuis sæpe ad eum phrenitici transeunt. Si quidem mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente, immodico frigore digeritur. Licet que protinus sci re id esse, ubi uenarum exigui, imbecillique pulsus sunt: Sudor autem supra consuetudinem, & modo, & tempore ex toto thorace, & cernicibus, atque etiam capite pronumpit; pedibus tantummodo, & cernibus siccoribus atque frigentibus. At ubi id morbi genus est, curatio prima est, supra præcordia imponere, que reprimat, cataplasmata; secunda, sudorem prohibere, id præstat acerbum oleum, uel rosa, uel melinum, aut myrteum, quorum aliquo corpus leuiter perungendum; cæratumque ex aliquo horum, tum imponendū est. Si sudor uincit, delinendus homo est, uel gypso, uel argenti spuma, uel cimolia creta; uel etiam subinde horum puluere respargendus. Idem præstat puluis ex contritis *ἀνδρι* myrti, uel rubi folijs; aut ex austeri, & boni uini arida fecce. Pluraque similia sunt; quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Super hæc uero, quo minus corpus insudet, leui ueste debet esse contextus, loco non calido, fenestris patentibus sic, ut perflatis quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis, uino, ciboque succurrere. Cibis non multis quidem, sed sæpe tamē nocte hæc die dandus est, ut nutriat, neque oneret. is esse debet ex infimissima materia, & stomacho aptius, nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est, ne deficiat, tum & in friga ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meracum, & gelidum subinde, & liberaliter dandum est, adiecta polenta, si modo is æger parum cibi assumit, idque uinum esse debet, neque nullarum uirium, neque ingentium; recteque tota die, ac nocte, uel treis he minas æger biber. si ualidius corpus est, plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quod si stomachus resolutus, parum continet; & ante cibum, & post eum, sponte uomere oportet; rursusque post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum; interpositaque hora sumere alterum. si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis super illinendum est, qui ubi inauerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur; exque eo toti corpori calor, uenisque uis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum, pituitam, uel alicuius cremorem, ex inferioribus partibus iniicere; si quidem id quoque uirescitur. Neque alienum est, naribus quoque estuantis adiuuere quod reficiat, id est rosam, & uinum: Et si qua in extremis partibus frigent, unctis, & calidis manibus fouere. per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & uita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse uidetur, uerendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque uino tantum remoto, quotidie ualidiorem cibum debet assumere, donec satis uirium corpori redeat.

De lethargo, & eius curatione.

Cap. XX.

Alter quoque morbus est aliter phrenitico contrarius. In illo, difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est. At in hoc, marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas; *λέθαρρον* Græci nominant, atque id quoque genus acutum est; & nisi succurritur, celeriter ingulat. Hos ægros quidam subinde excitare nituntur, ad motus his, quæ per sternutamenta euocantur; & his, quæ odore foedo mouent; qualis est pix cruda, lana succida, piper, ueratri, castoreum, acinum, allium, cepa; iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum: si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem foedum mouent. Tharrias uero quidam accessione esse id malum dixit; leuarique, cum ea decessit. Itaque eos, qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest autem, in decessione expurgantur æger, an cum febris non leuatur, aut leuata quoque ea, somnus urgeat. Nam si expurgatur, adhibere ei, ut sopito superuacuum est, neque enim uigilando melior sit; sed per se, si melior est, uigilat. Si uero continens ei somnus est, utique excitandus est; sed his temporibus, quibus febris leuissima est, ut & excernat aliquid, & sumat. Excitat autem ualidissime, repente aqua frigida infusa, post remissionem. Itaque perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris, totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si æqualis ægro spiritus erit, si mollia præcordia: Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa, caput radendum; deinde postea fotuendum est aqua, in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die, imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacca, aut hedera cum rosa, & aceto. Præcipueque proficit, & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum, capiti frontiue impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest; maximeque opportunè cibis datus, id est in remissione, quanta maxima inueniri

niri poterit aptissima autem sorbitio est, donec morbus detrescere incipiat, si autem si quotidie graui accessio est, hæc quoque cotidie detur: si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem multa aqua. Vinum quoque cum tempestino cibo datum, non mediocriter adiuuat, quod si post longas febres, eiusmodi torpor corpori accessit, cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus, quatuorue horis, castoreum si uenter attractus est, mixtum cum scamonea; si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia molli sunt, cibus utendum est plenioribus: Si dura, in huiusmodi sorbitionibus subsistendum; imponendumque est præcordijs, quod simul & reprimat, & emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo.

Cap. XXI.

Sed hic quidem acutus est morbus: Longus uero fieri potest, eorum, quos aqua inter cutem male habet (in primis diebus discussus est): *ἡδὲν* Græci uocant. Atque eius tres species sunt: Nam modo uentre uelementer intendo, creber intus ex motu, spiritus sonus est, modo corpus inæquale est, tumonibus aliter, aliterque per totum id orientibus, modo intus in uinum aqua contrahitur, & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit. Primum *ὑδρωίτην*, secundum *μυοφυματίαν*, uel *ὀπὸς-ῥή*, tertium *ἀσθῆν* Græci nominant. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia; ob quam, ne ulcera quidem in his ægris facile sanescunt. Sæpe uero hoc malum per se incipit: sæpe, alteri uetusto morbo (maximeque quartana) superuenit. Facilius in seruis, quam in liberis tollitur: quia, cum desideret famem, sitim, mille alia remedia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur; quam quibus inuitis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chryssippi discipulus, apud Antigonum regem, amicum quendam eius, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicatum, negauit posse sanari. Cumque alter medicus, Epirotes, Philippus se sanaturum polliceretur, respondit, illum ad morbum ægri respicere, se ad animum, neque eum res, fessit. Ille enim, cum summa diligentia non medicum tantummodo, sed etiam regis, custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoque suam urinam, in exitum se præcipitauit. Inter initia tamen, non difficilissima curatio est, si imperata sunt corpori quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque æquo animo ferret necessariam sitim; ubi diu abstinerat, bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur, quidquid receptum est, multum, tedio demit. Si a stomacho retentum est, morbum auget: Ideoque in quolibet tentandum non est. Sed si febribus quoque est, hæc in primis submouenda est, per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque, quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, huiusmodi auxilijs opus est, multum ambulandum, currendum aliquid est. Superiores maxime partes sic perficiendæ, ut spiritum ipse contineret, euocandus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, uel laconico, uel elibano, similibusque alijs, maximeque utiles naturales; & siccæ sudationes sunt; quales super Baias habemus in myrtetis, balneum, atque omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapota dantur, facta ex abrotano, myrtæ, uel tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut uitam sustineat, optimaque est, quæ urinam mouet. Sed id ipsum tamen molli cibo, quam medicamento, melius est. Si tamen res coget, ut ex his aliquid detur, præstanter id decoquendum, eaque aqua potuenda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardus, crocum, cinnamum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oenanthe, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uua timinia (quam *ῥίζα ἀγρια* Græci nominant), abrotanum, rosa, folia, acorum, anaræ nucis, tragoriganum, stœrax, coriandrum, iunci quadrati & rotundi semen; illud *ῥίζα ὀξυς* hoc Græci uocant. Quæ quotiens posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primum tamen, quæ leuissima ex his sunt, id est, rosa folia, uel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque utile est, & austerum, sed quæ tenuissimum. Commodum est etiam hinc quotidie uentre metiri, & quæ comprehendit altum, notam imponere, postero die uidere si plenius corpus sit, an extenuetur: Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est, metiri & potionem eius, & urinam: Nam si plus humani excrementi, quam assumitur, ita demum secundæ ualitudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropem deciderat, se abstinentia bidui, & frictione usum: tertio die iam & febre, & aqua liberatus. Tius malum est, didicenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio, & ex ea dolor creber est, utilis quotidianis, aut alterno quoque die post cibum, nonuitus est. Fomentis siccis, calidisque utendum est. Si per hæc dolor cutis est, & tum his utendum. Vltimum auxilium est, si circibitula nihil profuerint, per alium infundere hementi, cum oleo, & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione a uentre abstinendum est. Imponenter exulcerandus est, & seruanda ulcera diutius. Vtiliter etiam scylla cocta delinitur cutis; sed diu post hæc inflammationes abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uirtus est, cui *ἀσθῆν* nomen est; eas partes quæ tumunt, subijcere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat. Si uis uchemenior est, caput

uelandum est utendumque frictione, madefactis tantum manibus aqua, cui sal, & nitrum, & olei paulū sit adiectum: sic, ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quod mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem, tota hora, post meridiem, semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quae reprimunt, maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talia, quatuor fere digitis, ex parte interiore, quā per aliquot dies, frequens humor feratur, atque ipsos tumores incidere, altis plagis oportet: Cōcutiendumque multa gestatione corpus est, atque ubi induruit, vuneribus cicatrices sunt, adiciendū & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum habitū reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximeque caro. Vinum, si per stomachum licet, dulcius, sed ita, ut inuicē biduo, triduo, uel, modo aqua, modo id bibatur. Prodest etiam lactuca marinæ (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen cum aqua potui datum. Si ualens est, qui id accipit, ei scylla cocta sicut supra dixi, delinitur. Auctioresque multi sunt, inflatis uescis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo, in uterū multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modicē oportet. malagma quod digerat, impositū habere; idque ipsum, super imposito triplici panuo, fascia, non nimium tamen uehementer astringere. quod a Tharria profectum, seruatū esse a pluribus uideo. Si secur aut lienem affectum esse, manifestum est; sicut pinguem contusam, adiecto melle, superponere. Si per talia auxilia uenter non ficitur, sed humor nihilominus abundat, celeriore uia succurrere, ut is per uentrem ipsum emittatur: Neque ignoro, Erasistrato displicuisse hanc curandi uiam: Morbum enim hunc iocineris putauit: Ideoque ita uisum esse sanandum; frustra que aquam emitti, quæ uitiatō illi subinde nascatur. Sed primum, non huius uisceris unius hoc uitium est: Nam si plene affecto, & in totius corporis malo habitu sit; deinde, ut inde coeperit; tamen aqua, nisi emittitur (quæ contra naturam ibi subsistit) & iocineri, & cæteris interioribus partibus nocet. conuenitque, corpus nihilominus esse curandum. neque enim sanat emissus humor, sed medicinæ locum facit; quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controuersiam uenit, quin non omnes in hoc morbo sic curari possint; sed iuuenes robusti, qui uel ex toto carēt febre, uel certē satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderunt, qui que malum corporis habitum habent, idonei huc curationi non sunt. Cibus autem, quo die primum humor emissus est, suuacius est; nisi si uires defuerint. Insequentibus diebus, & his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet; paulatimque euocandus æger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes, & idoneos cibos, donec ex toto conualecat. Balneum rarum res amat, frequentiore in ieiunio uotum. Si æstas est, in mare natare commodum est. Ubi conualuit aliquis, diu tamē alienus ei ueneris usus est.

De tabe, & eius speciebus, & curationibus.

Cap. XXII.

Dicitur sæpe & periculosius tabes eos male habere, quos inuasit. Atque huius quoque plures species sunt: Vna est, quæ corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decentibus, nullis uero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur, & nisi occurrat, tollit. & propter hanc Græci uocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit: aut enim nimio timore aliquis minus, aut auditate nimia, plusquam debet, assumit, ita, uel quod deest, infirmat, uel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Græci uocant, & appellat, ubi malus corporis habitus est: ideoque omnia alimenta corrumpuntur, quod fere fit, cum longo morbo intata corpora, etiam si illo uacant, refectionem tamen non accipiunt; aut cum malis medicamentis corpus affectum est; aut cum diu necessaria defuerint; aut cum inuitatis & inutiles cibos aliquis assumpsit; aliquid uel simile incidit. Huic, præter tabem, illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur, uel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, lōgeque periculosissima species, quam Græci uocant, & nominauerunt. Oritur fere a capite, inde in pulmonē detillat, hinc exulceratio accedit, ex hac, febricula leuis fit; quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est. pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quidquid excreaturum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaque qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit, in quo laboratur. deinde, si tantummodò non ali corpus apparet, causam eius attendere; & si cibi minus aliquis, quam debet, assumit, adicere; sed paulatim, ne si corpus infuetum subita multitudo onerauerit, concoctionem impediatur. Si uero plus iusto, quis assumere solitus est, abstinere uno die, deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adicere, donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc, conuenit ambulare locis quā minimè frigidis sole uitato; per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perficari, si potest, maxime per se ipsum, sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum; sic, ut interdum oleo quidam adiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque ieiunio prehendere per multas partes cutem, & attrahere, ut relaxetur; aut imposita resina, & abducta subinde, idem facere. Vtile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio recte cibi aliquid assumitur; aut, si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi uero esse debent ex his, qui facile concoquantur, qui maxime alunt. Ergo uini quoque, sed austri, necessarius usus est. mouenda urina. Et si malus corporis habitus est, primum abstinendum est, deinde aluius ducenda: tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiunis etiam usque sudorem. Cibus uero opus est copiosis, uarijs, boni succi, qui que etiam minus facile corrumpantur; uino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cætera quoque eodem

eodem modo ferientur. Quod si mah plus est, & uera *epilepsia* est inter initia, protinus occurrere necessarium est. neque enim facile is morbus, cum inueterauit, euincitur. Opus est si uires patiuntur, longa nautigatione, celi mutatione sic, ut deuisus quā id est, ex quo discedit æger, petatur: Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oritur, id est, ab anno duodecimo ad annū quintum, & trigessimū. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longe gestar: commodissimum est. Si nauigationem aliqua res prohibet, lectica, uel alio modo corpus dimouendum est. Tum a negotijs abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animū possunt, somno indulgendum; cauendæ destillationes, ne si quid cura leuam, exasperetur; & ob id uitanda cruditas, simulque sol, & frigus. Os obtegendum, sauces uelandæ, tussicula suis remedijs finiendæ. & quandoquidem febricula incurrat, huic interdum abstinencia, interdum etiam tempestiuis cibis medendum: Eoque tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sit; siue præcordia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est: in phthysi tamen, sicut in omnibus longis, difficilibusque febribus, recte dari potest. Quod si febris aut nondum incurrat, aut iam remisit; decurrendū est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primò acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto. uel ex eodem, intubus, porrum, lactuca: Dein lenis, ut sorbitio ex prusana, uel ex alica, uel ex amylo lacte adiecto. Idem orfza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem modò his cibis, modò illis utendum est. adiungendæque quædam ex media materia, præcipueque uel ex apina, cerebellum, uel pisci eulus, & his similia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deinde in cocta, pro medicamento est: uinum assumi debet lene, austerum. Hastenus non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, ualidioribus auxilijs opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utranque: item sub ipsis ossibus scapularum (quas ἀμπλάται Græci uocant) sic ne sanescere ultra sinamus, nisi tussis finita; cui per se quoque medendū esse manifestum est. Tunc ter, quaterque die uehementer extremæ partes perfricandæ: thorax scilicet manu perfricandus. post cibū intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis deinde diebus, demittendus est æger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum. cæteris diebus bibenda aqua: tum & uinum, si tussis non est, potius frigidum dandum; si æstus est, refrigerium. Vtile est etiam, cibos in remissionibus quotidie dari; frictiones, gelationesque similiter adhiberi. eadem acia quarto, aut quinto die sumere. interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, uel plantaginis succus per se, uel marubium ex melle concoctum; ita ut illius cyathus sorbitio sumatur, huius cochlear plenum paulatim delingatur; uel inter se mixta, & in cocta resina terebinthinæ pars dimidia, butyri, & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt, uictus, uelutulum, & natus, & sorbitio. Alius citra uitanda est. Vomitus in hoc morbo, si frequens est, perniciosus est; maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos; deinde ipse se suppresso spiritu, perficere; diu abstinere a uino, balneo, uenere.

De comitialis morbi curationibus.

Cap. XXXII.

Inter notissimos morbos, est etiā is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumæ mouentur; deinde interposito tempore, ad se redit, & per se ipsum confurgit. Id genus sapius uirorum quam foeminas occupat. ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & uita non periculosum; Interdum tamen, cum recens est, hominem consumit; & sæpe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris; in puelis, menstruum initium tollit. modò cum distentione membrorum, aut neruorum prolabitur aliquis, modò sine illa quidem. Hos quoque iidem, quibus lethargicos, excitare conantur; quod admodum supernacrum est; & quia ne lethargicos quidem is sanatur; & quia, cum possit ille nunquam expergisci, atque ita fame interire; hic ad se utique reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla neruorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet; si accessit, non utique mittendus est; nisi alia quoque horrantur. necessarium autem est, ducere aluum, uel nigro ueratro purgare, uel utrinque facere, si uires patiuntur. tunc caput tondere, oleoque, & aceto perungere; cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, alijque moles, & faciles cibi; neque caro, minimeque suda conuenit, sed mediz materiz: Nam & uribus opus est, & cruditates cauendæ sunt; cū quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia. item frigus, uinum, uenerem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrenitium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negotia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartū, et inuicem alterum quenuque, eadem hora cibi seruata, donec quatuordecim dies transeant: quos ubi morbus excessit, acutum deposuit, at si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is qui cadere consuevit, ei traditus est; protinus eo genere uictus dabitur, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolatur; utendumque tum uel sanguinis missione, uel inductione alui, uel nigro ueratro, sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus, per eos cibos, quos proposui sumatis omnibus, quæ cauenda dixi nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit; confugiendum erit ad album ueratrum, ac ter quoque, aut quater eo utendum, non ita multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterū unquā sumat, nisi conciderit. Medijs autem diebus uires eius erunt nutriendæ, quibusdam præter ea, quæ scripta sunt, adiectis. Vbi ma-

Si uires patitur, & inter initia, protinus occurrere necessarium est. neque enim facile is morbus, cum inueterauit, euincitur.

Opus est si uires patiuntur, longa nautigatione, celi mutatione sic, ut deuisus quā id est, ex quo discedit æger, petatur: Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur.

Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oritur, id est, ab anno duodecimo ad annū quintum, & trigessimū.

Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longe gestar: commodissimum est. Si nauigationem aliqua res prohibet, lectica, uel alio modo corpus dimouendum est.

Tum a negotijs abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animū possunt, somno indulgendum; cauendæ destillationes, ne si quid cura leuam, exasperetur; & ob id uitanda cruditas, simulque sol, & frigus.

Os obtegendum, sauces uelandæ, tussicula suis remedijs finiendæ. & quandoquidem febricula incurrat, huic interdum abstinencia, interdum etiam tempestiuis cibis medendum: Eoque tempore bibenda aqua.

Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sit; siue præcordia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est: in phthysi tamen, sicut in omnibus longis, difficilibusque febribus, recte dari potest.

Quod si febris aut nondum incurrat, aut iam remisit; decurrendū est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primò acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto.

Dein lenis, ut sorbitio ex prusana, uel ex alica, uel ex amylo lacte adiecto. Idem orfza quoque, & si nihil aliud est, far præstat. Tum inuicem modò his cibis, modò illis utendum est. adiungendæque quædam ex media materia, præcipueque uel ex apina, cerebellum, uel pisci eulus, & his similia.

Farina etiam cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deinde in cocta, pro medicamento est: uinum assumi debet lene, austerum. Hastenus non magna mole pugnatur.

Si uehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, ualidioribus auxilijs opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utranque: item sub ipsis ossibus scapularum (quas ἀμπλάται Græci uocant) sic ne sanescere ultra sinamus, nisi tussis finita; cui per se quoque medendū esse manifestum est.

Tunc ter, quaterque die uehementer extremæ partes perfricandæ: thorax scilicet manu perfricandus. post cibū intermittenda hora, & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis deinde diebus, demittendus est æger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum.

cæteris diebus bibenda aqua: tum & uinum, si tussis non est, potius frigidum dandum; si æstus est, refrigerium. Vtile est etiam, cibos in remissionibus quotidie dari; frictiones, gelationesque similiter adhiberi. eadem acia quarto, aut quinto die sumere.

interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, uel plantaginis succus per se, uel marubium ex melle concoctum; ita ut illius cyathus sorbitio sumatur, huius cochlear plenum paulatim delingatur; uel inter se mixta, & in cocta resina terebinthinæ pars dimidia, butyri, & mellis pars altera.

Præcipua tamen ex his omnibus sunt, uictus, uelutulum, & natus, & sorbitio. Alius citra uitanda est. Vomitus in hoc morbo, si frequens est, perniciosus est; maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos; deinde ipse se suppresso spiritu, perficere; diu abstinere a uino, balneo, uenere.

Inter notissimos morbos, est etiā is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumæ mouentur; deinde interposito tempore, ad se redit, & per se ipsum confurgit.

Id genus sapius uirorum quam foeminas occupat. ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & uita non periculosum; Interdum tamen, cum recens est, hominem consumit; & sæpe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris; in puelis, menstruum initium tollit.

ne experiret huius est, corpus eius leniter ex oleo uetere, cum capite (excepto uentre) permulceatur. tum am-
bulatione quam maxime longa, & recta utatur. post ambulationem, loco tepido, uehementer, & diu, ac no-
minis ducenties (nisi infirmus erit) perfricetur; deinde per caput multa aqua frigida perfundatur. paulum
cibi assumat, conquiescat; rursus ante noctem ambulatione utatur; iterum uehementer perfricetur, sic, ut
neque uenter, neque caput contingatur; post hæc coenet; interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno
aut altero, acia assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radat, ungatur oleo uetere, adiecto
aceto, & nitro. perfundatur aqua salsa. bibat ieiunus ex aqua castoreum. nulla aqua, nisi decocta, potionis
causa utatur. Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epota, tali morbo se se liberarunt; apud quos,
miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum uero pertinet; ultimum est iuxta
tatum, ex utroque crure, paulum sanguinis mittere; occipitum incidere, & cucurbitulas admouere ferro
candente, in occipitio quoque, & infra, quæ summa nertebra cum capite committitur, adurere duobus lo-
cis, ut per ea perniciosus humor euadat; quibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut perpetuum sit.
Ad leuandum id tantummodo, utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisque his, qui supra com-
preheni sunt; præcipueque uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

De regij morbi curatione.

Cap. XXIII.

Aequè notus est morbus, quem interdum arquatum, interdum regium nominant; quem Hippocra-
tes ait, si post septimum diem, febricitante ægro, superuenit, tutum esse; mollibus tantummodo præcordijs
substantibus. Diodes ex toto, si post febrem oritur, etiâ prodesse; si post hunc febris, occidere. Color autē
eum morbum detegit, maxime oculorum; in quibus, quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere
& sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities; & ubi corporis ue-
hemens motus est, spiritus difficultas, membro tumque resolutio. atque ubi diutius manet morbus, totum
corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere ægrum oportet, secundo ducere aluum; tum
si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, scamonem potui dare, uel cum aqua betam albam con-
eritam; uel cum aqua multa, nuces amaras, absinthium, anisum, sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades
aquam quoque salinam, & quidem per biduum, purgationis causa bibere coegat; is, quæ urinam mouent,
reiecit. Quidam, superioribus omissis, per hæc, & per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt.
Ego ubique si satis uirium est, traidiora; si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam tri-
duo; primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & uinum bibere Græcum salum, ut resolu-
tio uentris maneat. tum altero triduo, ualidiores cibos, & carnis quoque aliquid esse intra aquam manere.
deinde ad superius genus uictus reuerti, cum eo, ut magis satietur; omisso Græco uino, bibere integrum au-
sterum; atque ita per hæc uariare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad salum uinum
redeat. Per omne uero tempus, utendum est exercitatione, frictione; si hyems est, balneo; si æstas, frigidis
nationibus; lecto etiam, & conclauis cultiore. clauso loco uti ludis, lasciuia, per quæ mens exhilaretur; ob-
qua, regius morbus dictus uidetur. Malagma quoque, quod digerat, super præcordia datum, prodest; uel
arida ibi si quis impolita, si iecur, aut lienis affectus est.

De elephantia curatione.

Cap. XXV.

Ignotus autem penè in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quæ ex ægypti-
græci uocant; isque longis annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque intus dicantur. Summa
pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem con-
uertitur. Summa cutis inæquabiliter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur;
corpus emacrescit; os, suræ, pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusque sub
tumore condantur; febricula oritur, quæ faciliè tot malis obrutum hominē consumit. protinus ergo inter
initia sanguis per biduum mitri debet, aut nigro ueratro uenter solui; adhibenda tum quanta sustineri po-
test, inedia est. paulum deinde uires reficiendæ, & ducenda aluus. post hæc, ubi corpus leuatum est, utendu-
est exercitatione, præcipueque cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam sicis sudationi-
bus euocandus. frictio adhibenda; moderandumque inter hæc, ut uires conseruentur; balneum rarum esse
debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte da-
tur. Corpus contrita plantago, & illita, tueri optimè uidetur.

De attonitis, & eorum curatione.

Cap. XXVI.

Attonitos quoque raro uidemus; quorum & corpus, & mens stupet. Fir interdum ictu fulminis, in-
terdum morbo. ægyptiis hunc Græci appellant. His sanguis mittendus est. ueratro quoque albo, uel alui
ductione utendum. Tum adhibendæ frictiones; & ex media materia, minime pingues cibi, quidam etiam
acres, & a uino abstinendum.

De resolutione.

At resolutione nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud *παραλύσις*; hoc *παραλύσις* nominaverunt: Nunc utrumque paralyfin appellari uideo. Solent autem qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter capi. ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt; sed raro tamen ad sanitatem perueniunt; & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus uero nunquam acutus, saepe longus, fere sanabilis morbus est. Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio, uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix unquam sanitatem restituit, saepe mortem. tantum differt uitam. interim infestat. Post sanguinis missionem, si non redit, & matus, & mens, nihil spei superest. Si redijt, sanitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta est, prouidet malo corporis, uel sanguinis missus, uel alius ducta. Cetera eadem in utroque casu facienda sunt: Si quidem uitare praecipue conuenit frigus, paulatimque ad exercitationes reuertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet, uel gesterur, uel motu lecti concutiatur; tum id membrum, quod deficit, si potest, per se; si minus, per alium moueatur, & ui quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam torpentibus membris summam cutem exasperasse, uel urticis, cesam, uel imposito sinapi; sic, ut ubi rubere coeperit corpus, haec remoueantur. Scylla quoque contrita, bulbi quoque contriti, cum thure recte imponuntur. Neque alienum est, resina autem tertio quoque die diutius uellere; pluribus etiam locis aliquando sine ferro cucurbitulas admouere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum, uel nitrum aceto, & oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida marina; uel si ea non est, tamen falsa, magnopere necessarium est. At si quo loco, uel naturales, uel etiam manu factae tales natationes sunt, ijs potissimum utendum est; praecipueque in his agitata membra, quae maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex uenatione. potio sine uino, aquae calidae. Si tamen uetus morbus est, interponi quarto, uel quinto die, purgationis causa, uinum graecum falsum prodest. Post coenam, utilis uomitus est. Interdum uero etiam neuorum dolor oriri solet. In hoc casu, non oportet uomere, non medicamentis urinam mouere, non sine exercitatione sudores (ut quidam praecipiunt) expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo teniter satis diu corpus perficandum est. deinde retento spiritu, ab ipsa exercitatione, potius superiores partes mouendae, balneo raro utendum; mutandum subinde peregrinationibus totum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est; deinde inuoluenda, & subiicienda pruna lenis, & sulphur: atque ita id suffumigandum; idque aliquandiu faciendum. Sed ieiuno, cum bene iam concoxerit, cucurbitulae quoque saepe dolenti parti admouendae sunt; pulvisque contritis siminibus, sic, ut omnium par modus sit; idque imponere; fouere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Vtriculi quoque recte imponuntur, aqua calida repleti; aut bitumen cum ordeacea farina mixtum; atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione uehementi est: quod in alijs doloribus pessimum est. Tremor autem neuorum, atque uomitus, medicamentis quoque urinam mouentibus impeditur: Inimica etiam habet balnea, affasque sudationes. bibenda aqua est. acri ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusque, maxime per seipsum. pila, similibusque superiores partes dimouendae. cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur. Secundum cibum, curis abstinendum. rarissima uenere utendum est. si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter, diuque in lectulo perficari manibus puerilibus, potius quam uirilibus debet. Suppurationes autem, quae in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notae fuerint; primum id agere oportet, per ea cataplasmata, quae reprimunt, ne coctus iuuilis materiz fiat. deinde si haec uicta sunt, per ea malagmata, quae digerunt, dissipentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur, deinde ut mature scat; omnis tunc uomitiz finis est, ut rumpatur. Indicium quoque est, pus uel alio, uel ore redditum. sed nihil facere oportet, quod minus quidquid est puris, excedat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Vbi pus ferri desijt, transeundum ad faciles quidem, sed tamen ualidiores, & frigidos cibos, frigidamque aquam; sic, ut ab egehidis tamen initium fiat. primoque cum melle quaedam edenda; ut nuclei pini, uel graecae nuges, uel auellanae. Postea submo- uendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus, uel porri, uel arrubij; & omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus, quae non afficientur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumque erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omnimodo cauendus sanguinis uomitus est.



HACTENVS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi, curationesque in notitiam uenient, si prius eorum sedes breuiter ostendero. Caput igitur, eaque, quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoque terminantur, sed etiam quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque, circa guttur, uenæ grandes, quæ *pepynides* nominantur; itemque arteriæ, quas *peripnides* uocant, sursum procedentes ultra aures feruntur. Atque in ipsis ceruicibus, glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum asperam arteriam nominant; alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem; stomachus interior ad uentriculum fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit; quibus cum diuersæ uiæ sint, quæ coeunt, exigua in arteria, sub ipsis faucibus lingua est. Quæ, cum spiramus, attollitur; cum cibum portionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura, & cartilaginosa in gutture assurgit, cæteris partibus refidet. Constat ex circulis quibusdam, compositis ad imaginem earum uerberarum, quæ in spina sunt; ita tamen, ut ex parte exteriori, aspera; ex interiore, stomachi modo, leuis sit: eaque descendens ad præcordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax, & a tergo, spinæ ipsi iunctus in duas fibras, ungulæ bnbulæ modo diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculorum, in pectore, sub sinistiore mamma situm; duosque quasi uentriculos habet. At sub corde, atque pulmone, transversum, ex ualida membrana septum est; quod a præcordiis uterum diducit, & quæ nervosum. Multis etiam uenis per id discurrentibus, a superiore parte, non solum intestina, sed iecur quoque, lienemque discernit. Hæc uiscera proxima, sed infra tamen posita, dextra, sinistraque sunt. Iecur a dextra parte, sub præcordiis, ab ipso septo ortum, intrinsecus canum, extrinsecus gibbum; quod prominens, leuiter uentriculo insidet, & in quatuor fibras diuiditur. Ex inferiore uero parte, ei fel inhaeret. At lienis, sinistra, non eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis, & raris, longitudinis, crassitudinisque modicæ; isque paulum a costarum regione in uterum excedens; ex maxima parte, sub his conditur, atque hæc quidem iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis collis inhaerent, a parte earum refinit; ab altera, rotundi; qui & uenosi sunt, & uentriculos habent, & tunicis super conteguntur, ac uiscerum quidem hæc sedes sunt. Stomachus uero (qui intestinorum principium est) nervosus a septimæ spinæ uentrebra incipit, ac circa præcordia cum uentriculo committitur. Venterculus autem (qui receptaculum cibi est) constat ex duobus tergoribus. isque inter lienem, & iecur positus est; utroque ex his paulum super eum ingrediente. Suntque etiam membranulæ tenues, per quas inter se omnia ista connectuntur, iungunturque ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars paulum in dexteriore partem conuersa, in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam, *pylorum* Græci uocant; quoniam portæ modo, in inferiores partes, ea quæ excreturi sumus, emittit. Ab ea ieiunum intestinum incipit, non ita implicitum; cui tale nomen est, quia nunquam, quod accipit, continet; sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in sinus uehementer implicitum. Orbes uero eius per membranas, singuli cum inferioribus connectuntur; qui in dexteriore partem conuersi, & e regione dexterioris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transuerso committitur; quod a dextra parte incipiens, in sinistriorem peruenit, & longum est; in dexteriore non est. Ideoque cæcum nominatur. At id quod peruenit, latè sursum, atque sinuatum, minusque quam superiora intestina, nervosum ab utraque parte, huc atque illuc uolutum, magis tamen sinistramque inferioresque partes tenens, contingit iecur, atque uentriculum. Deinde cum quibusdam membranis a sinistro rene uentriculis iungitur; atque hinc dextra recuruatam, in imo dirigitur, quæ excernit. ideoque id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit uero uniuersa hæc omentum, ex interiore parte, læue, & strictum; ex superiore, mollius. Cui adeps quoque innascitur; quæ sensu, sicut cerebrum quoque, quod per eas, inde descendente urinam, in uescicam destillare concipiunt. Vescica autem, in ipso sinu subest: ipsa soluta, atque liberior est; aliter in uiris, atque in foeminis posita: Nam in uiris iuxta rectum intestinum est, potius in sinistra partem inclinata: In foeminis super genitale earum posita est; superque descendit ad colem: In foeminis, breuius, & plenius super uulua ceruicem se ostendit. Vulua autem, in uirginibus quidem admodum exigua est; In mulieribus uero (nisi ubi grauidæ sunt) non multo maior, quam ut manu comprehendatur. Ea, recta continuataque ceruice (quem canalem uocant) contra mediam aluum orsa, inde paulum ad dexterorem coxam conuertitur; deinde super rectum intestinum progressa, illius foemina latera sua innectit. Ipsa autem ilia, inter coxas, & pubem, imo uentre, posita sunt, a quibus ac pubes abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit; ab exteriori parte euidenti cute; ab interiori, autem membrana inclusum, quæ omento iungitur; *metonos* autem à Græcis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur a capite; et primo de eius dolore; deinde de morbo, qui circa faciem nascitur; tum de lingue resolutione; postremo de destillatione, et grauedine. Cap. 11.

His ueluti in conspectum quendam, quatenus scire curanti necessarium est adductis; remedia singulorum laborantium partium exequar, orsus a capite. sub quo nomine, nunc significo tam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, alias erit explicandus. In capite autem interdum acutus, & pestifer morbus est, quem ægyptii & Græci uocant. Cuius notæ sunt, horror calidus, nemorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus, sicut uox suppressatur; uel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis, maximè circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque grauis, neque periculosa per hominis ætatem est: Interdum grauior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui uel uino, uel cruditate, uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Hique omnes dolores, modò in febre, modò sine hac sunt; modò in toto capite, modò in parte interdum, sic ut oris quoque proximam partem excrucient. Præter hæc, etiam unum inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor entem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit; id potest quod Græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum, dixi, cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum; ex quibus, id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idque quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est, primam curationem habet, quæ sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiisque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, aluum ducere; sternutamenta excitare, nihil assumere, nisi aquam. sæpe enim dies unus, aut alter, totum dolorem hac ratione discutit; utique si ex crasso, uel cruditate origo est. si uero in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cutem. deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit. si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concuam imponere, subinde in aqua frigida expressam; ungere rosa, & aceto; uel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliæque refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput uehementer perfricare, deinde calido oleo implere, ueste uelare. quidam etiam id deuinciunt. Alij cervicalibus, uestimentisque onerant, & sic lenantur. alios calida cataplasmata adiuuant. Ergo etiam ubi causa incognita est, uidere oportet, refrigerantia magis, an calefacientia teneant; & his uti, quæ experimentum approbat. At si parum causa discernitur; perfundere caput primum aqua calida (sicut supra præceptum est) uel salsa, uel ex lauro decocta: tum frigida, posca. Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare, gargarizare his, quæ saluam mouent, cucurbitulas temporibus, & occipitio admoouere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora peruenire, & imposito sinapi, exulcerare ea, quæ male habent; antè lineteolo subiecto, ne uehementer arroadat; candentibus ferramentis ubi dolor est, ulcera excitare; cibum per modicum cum aqua sumere. ubi leuius est dolor, in balneo ire; ibi multa aqua prius calida, deinde frigida, per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reueni; sed postea semper, antequam quidquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium est; deinde imponere sinapi, sicut exulceret. si id parum profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, infudet, uehementer perfricetur; cibis, potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur, quem Græci *erysipelas* uocant.

Circa faciem uero morbus innascitur, quem Græci *erysipelas* nominant. Is cum acuta fere febre oritur. Os cum motu quodam peruertitur, ideoque nihil aliud est, quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoque corpore mutatio: somnus in promptu est. In hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum, si ne sic quidem discussum est, albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinem, uinum. sed si discussum his non est, utendum est cum frictione, in eo quod laesum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore; sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idque perfundere aqua calida, uel marina, uel certe salsa, sicut ei quoque sulphur adiciatur. post perfusionem iterum perfricare, sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus, ceratum; integris idem sinapi, donec arroadat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione lingue.

At si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic, ut sermo hominis non explicetur, oportet gargarizare ex aqua, in qua uel thymum, uel hyssopum, uel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, & os, & ea quæ sub mento sunt, & ceruicem uehementer perfricare; laesæ linguam ipsam fricare; manducare quæ sunt acerrima, idest, sinapi, allium, cepam; magna uisulitari,

De curationibus morborum. 811
Causis nomine, ignominia
quæ capite tegitur.
xeræda ap. acutus & pestiferus.
notæ sunt calidus, nemorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus, sicut uox suppressatur; uel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat.
Interdum in capite, longa imbecillitas, sed neque grauis, neque periculosa per hominis ætatem est.
Interdum grauior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui uel uino, uel cruditate, uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur.
Hique omnes dolores, modò in febre, modò sine hac sunt; modò in toto capite, modò in parte interdum, sic ut oris quoque proximam partem excrucient.
Præter hæc, etiam unum inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor entem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit; id potest quod Græci appellant.
Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum, dixi, cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent.
Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est.
Nunc de cæteris dicendum; ex quibus, id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idque quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est, primam curationem habet, quæ sanguis mittatur.
Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est.
Satiisque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere.
si postero die dolor remanet, aluum ducere; sternutamenta excitare, nihil assumere, nisi aquam.
sæpe enim dies unus, aut alter, totum dolorem hac ratione discutit; utique si ex crasso, uel cruditate origo est.
si uero in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cutem.
deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit.
si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concuam imponere, subinde in aqua frigida expressam; ungere rosa, & aceto; uel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliæque refrigerantia cataplasmata.
At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput uehementer perfricare, deinde calido oleo implere, ueste uelare.
quidam etiam id deuinciunt.
Alij cervicalibus, uestimentisque onerant, & sic lenantur.
alios calida cataplasmata adiuuant.
Ergo etiam ubi causa incognita est, uidere oportet, refrigerantia magis, an calefacientia teneant; & his uti, quæ experimentum approbat.
At si parum causa discernitur; perfundere caput primum aqua calida (sicut supra præceptum est) uel salsa, uel ex lauro decocta: tum frigida, posca.
Illæ in omni uetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare, gargarizare his, quæ saluam mouent, cucurbitulas temporibus, & occipitio admoouere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora peruenire, & imposito sinapi, exulcerare ea, quæ male habent; antè lineteolo subiecto, ne uehementer arroadat; candentibus ferramentis ubi dolor est, ulcera excitare; cibum per modicum cum aqua sumere.
ubi leuius est dolor, in balneo ire; ibi multa aqua prius calida, deinde frigida, per caput perfundi.
Si discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reueni; sed postea semper, antequam quidquam aliud, aquam bibere.
dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit.
In hoc tondere ad cutem necessarium est; deinde imponere sinapi, sicut exulceret.
si id parum profuit, scalpello utendum est.
Illæ cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, infudet, uehementer perfricetur; cibis, potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

De morbo qui circa faciem nascitur, quem Græci erysipelas uocant.

erysipelas
Causis nomine, ignominia
quæ capite tegitur.
xeræda ap. acutus & pestiferus.
notæ sunt calidus, nemorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus, sicut uox suppressatur; uel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat.
Interdum in capite, longa imbecillitas, sed neque grauis, neque periculosa per hominis ætatem est.
Interdum grauior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui uel uino, uel cruditate, uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur.
Hique omnes dolores, modò in febre, modò sine hac sunt; modò in toto capite, modò in parte interdum, sic ut oris quoque proximam partem excrucient.
Præter hæc, etiam unum inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor entem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit; id potest quod Græci appellant.
Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum, dixi, cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent.
Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est.
Nunc de cæteris dicendum; ex quibus, id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idque quod ex subita causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est, primam curationem habet, quæ sanguis mittatur.
Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est.
Satiisque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere.
si postero die dolor remanet, aluum ducere; sternutamenta excitare, nihil assumere, nisi aquam.
sæpe enim dies unus, aut alter, totum dolorem hac ratione discutit; utique si ex crasso, uel cruditate origo est.
si uero in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cutem.
deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit.
si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concuam imponere, subinde in aqua frigida expressam; ungere rosa, & aceto; uel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliæque refrigerantia cataplasmata.
At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit; tum caput uehementer perfricare, deinde calido oleo implere, ueste uelare.
quidam etiam id deuinciunt.
Alij cervicalibus, uestimentisque onerant, & sic lenantur.
alios calida cataplasmata adiuuant.
Ergo etiam ubi causa incognita est, uidere oportet, refrigerantia magis, an calefacientia teneant; & his uti, quæ experimentum approbat.
At si parum causa discernitur; perfundere caput primum aqua calida (sicut supra præceptum est) uel salsa, uel ex lauro decocta: tum frigida, posca.
Illæ in omni uetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare, gargarizare his, quæ saluam mouent, cucurbitulas temporibus, & occipitio admoouere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora peruenire, & imposito sinapi, exulcerare ea, quæ male habent; antè lineteolo subiecto, ne uehementer arroadat; candentibus ferramentis ubi dolor est, ulcera excitare; cibum per modicum cum aqua sumere.
ubi leuius est dolor, in balneo ire; ibi multa aqua prius calida, deinde frigida, per caput perfundi.
Si discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reueni; sed postea semper, antequam quidquam aliud, aquam bibere.
dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit.
In hoc tondere ad cutem necessarium est; deinde imponere sinapi, sicut exulceret.
si id parum profuit, scalpello utendum est.
Illæ cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, infudet, uehementer perfricetur; cibis, potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

ut uerba exprimantur, exerceri retento spiritu; caput sepe aqua frigida perfundere; nonnunquam multam esse radicula, deinde uomere.

De distillatione, ac grauedine.

Distillat autem humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares distillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter doler, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet, si in pulmonem, praeter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, xsthis, biliosa urina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) grauedo est: Hae nares claudit, uocem obtundit, tussim siccam mouet; sub eadem salua, sonant aures; uenae mouentur in capite, turbida urina est. Hae omnia, xopas Hippocrates nominat. Nunc uideo apud Graecos in grauedine hoc nomen seruari; distillationem, xerax, xypus appellari. Hae autem, & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consuerunt. Nihil pestiferum est nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere a sole, balneo, uino, uenere, debemus. Inter quae, iunctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. Ambulatione tantum acri, sed recta utendum est; & post eam, caput, atque os supra quinquages perficandum. Raroque fit, ut si biduo, uel certe triduo nobis temperauimus, id uitium non leuetur. Quo leuato, si in distillatione crassa facta pituita est, uel in grauedine nares magis patent, balneo utendum est; multaue aqua prius calida, post egelida fouendum os, caput que; deinde cum cibo pleniore, uinum bibendum. At si xque tenuis die quarto pituita est, uel nares xque clausae uidentur, assumendum est uinum amicum, aut sterum; deinde rursus biduo aqua; post quae, ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquam xgros agere; sed cetera omnia, quasi sanis facienda sunt; praeterquam si diutius aliquem, & vehementius ista sollicitare consuerunt: Huic enim quedam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic si in nares, uel in fauces distillauit, praeterquam quae supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perficandae uehementer inferiores partes, leuor frictio adhibenda thoraci erit, leuor capiti: deinde assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum, similiaque, quae pituitam faciunt crassiorem. Sitis, quanta maxime sustineri potest, pugnandum est. Vbi per hae, idoneus aliquis balneo factus, eo que usus est; adiungendus est cibo pisciculus, aut caro; sic tamen ne protinus istiusmodi cibi sumatur. uino, meraco, copiosius utendum est. At si in pulmonem quoque distillat, multoque magis, & ambulatione, & frictione opus est: eademque adhibita ratione in cibis, si non satis illi proficiunt, acrobatis utendum est, magis somno indulgendum, abstinendumque a negotijs omnibus: aliquando, sed serius, & balneum tentandum. In grauedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput uelare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere a potione; aut si res coegerit, non ultra heminam aque assumere. Tertio die panis non tam multum ex parte interiore, cum pisciculo, uel leui carne sumere, aqua bibere: Si quis sibi temperare non potuerit, quod minus plenior uictu utatur, uomere. Vbi in balneum uentum est, multa aqua calida caput, & os fovere, usque ad sudorem: tum ad uinum redire, post quae, uix fieri potest, ut idem incommodum maneat. Sed si manserit, utendum erit, cibis frigidis, aridis, leuibus, humore quam minimo; seruatis fritionibus, exercitationibusque, quae in omni tali genere ualitudinis necessariae sunt.

De cernicis morbis, curationibusque.

Cap. IIII.

A capite transitus ad cernicem est, quae grauius admodum morbis obnoxia est. neque tamen alius importunior, acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore neruorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam, & immobilem cernicem intendit. Priorem Graeci *opodotoron*, insequentem *impodotoron*, ultimum *teraxion* appellant. quamuis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea sepe intra quartum diem tollunt: Si hunc euaserunt, sine periculo sunt. Omnia, eadem ratione curantur, adque conuenit. Sed Aesclepiades utique mittendum sanguinem credidit: Quod quidam uideant esse dixerunt, eo quod maxime tum corpus calore regeret, isque esset in sanguine. Verum hoc celestem uel calefacit, uel refrigerat. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest, quae de sanguinis missione humido, & calido. Itaque plerique aqua calida multa cernices subinde perfundunt, id in praesentia leuat, sed opportuniore neruos *lizon* reddit, quod utique uisandum est. Vtilius igitur est cerato liquido, primum cernicem perungere, deinde ad mouere uelut *ambulas*, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex fouere, quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, ad mouere ad ignem, uel si xestas uetustissima cernicem, & scapulas, & spinam perficere. Frictio cum omnibus in homine ueterebris utilis remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendum uero praecipue frigus: Ideoque in eo conclau, quo cubabit xger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore

tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum habere: idque inno, uel cyprino calido madefacere, & super imposito pilleo uelare. nonnunquam etiam in calidum oleum, totum descendere; uel in aquam calidam, in qua fornum graecum decoctum sit, & adiecta olei pars tertia. Alius quoque ducta, sæpe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit, admoventur ceruicibus catartibutæ sunt, sic, ut cutis incidatur; eadem aut ferramentis, aut sinapi adurendæ. Vbi leuatus est dolor, moueri que ceruix corporis, scire licet, cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus cibus, quilibet mædeudus est: Sorbitionibus utendum, itemque ouis sorbilibus, aut a pullis mollibus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamque ex toto recte se habere ceruices uidebuntur, incipiendum erit a puticula, uel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quam uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus; ideoque in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus; et primum de angina, deinde de difficultate spirandi, ultimo de tussi. Cap. IIII.

Ut hoc autem morbi genus circa totam ceruicem; sic alterum æque pestiferum, acutumque in faucibus esse consuevit; nostris anginam uocant. apud Graecos nomen, prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet; sed corpus aridum est, uix spiritus trahitur, membra soluuntur. id uocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, uox nihil significat, oculi uertuntur, facies pallet, singultusque est; id *angina* uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare, non potionem potest; spiritus eius includitur. Leuius est, ubi tumor tantummodo, & rubor est; cetera non sequuntur; id *angina* appellant. Quidquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat, secundum est, ducere alium. Cucurbitula quoque recte sub mento, & circa fauces admouetur, ut id quod strangulat, euacet. Opus est deinde fomentis humidis: nam sicca spiritum elidunt. Ergo admoovere spongas oportet, quæ melius in calidum oleum, quam in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimæque est hic quoque salis calidi succus. Tum commodum est, hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthium, uel etiam surfures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere, eaque gargarizare. post hæc, palatum ungere, uel felle taurino, uel eo medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte respergitur. Si per hæc parum proficitur, ultimum est, incidere satis altis plagis, sub ipsis maxillis, supra collum, & in palato curra uiam; uel eas menas, quæ sub lingua sunt; ut per ea uulnera, morbus erumpat. quibus si non fuerit æger adiutus, scire licet, malo uictum esse. Si uero his morbus leuatus est, iamque fauces & cibum, & spiritum capiunt, facili ad bonam ualeitudinem recursus est. Atque interdum natura quoque adiuuat, si ex angustiore sede uisum transit in latiore. Itaque rubore, & tumore in præcordijs orto, scire licet, fauces liberari. Quidquid autem eas leuabit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulla decocta; deinde assumendi molles, & non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum reuertantur. Vulgo audio, si quis pulum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari: seruatumque cum ex sale cum is morbus urget, comburi carbonemque eius contritum in aquam mulsam, quæ potui datur, inficari, & prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quidquam periculi possit, quamuis in monumentis medicorum non legerim, tamen inserendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

Est etiam circa fauces malum, quod apud Graecos aliud, atque aliud nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed hæc, dum modica est, neque ex toto strangulat, *angina* appellatur. Cum uehementior est, ut spirare æger sine sono, & anelatione non possit, *angina* dicitur. Cui accessit id quod ne nisi recta ceruice spiritus trahatur, *angina* dicitur. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi: Quo insequentia acuta esse consuevit. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit, sibilum elidit; dolor in pectore, præcordijsque est, interdum etiam scapulis; isque modo decidit, modo reuertitur. ad hæc tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet in sanguinis detractione. Neque id satis est, sed lacte quoque uenter soluendus est. Liguanda alius, interdum etiam ducenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem etiam in lecto sublimè habendum est. thorax fomentis, cataplasmatibusque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuuandus est; & postea, uel malagma super imponendum, uel certe ceratum ex cyprino, uel irino unguento: Sumenda deinde ieiuno, potui mulla aqna, cum qua, uel hyssopus cocta, uel contrita capparis radix sit. Datur etiam utiliter, aut nitrum, aut nasturcium, frictum alium, deinde contritum, & cum melle mixtum; simulque coquatur mel, galbanum, resina terebinthina; & ubi coierunt, ex his quod fabæ magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut sulphuris ignem non experti, pondo & quadrans abrosani pondo, in uini cyatho teruntur, idque tepe factum sorbetur. Est etiam non uana opinio, uulpinum iecur, ubi siccum, & aridum factum est, contundi oportere, polentamque ex eo, potioni aspergi; uel eiusdem pulmonem quam recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Præter hæc, sorbitionibus, & lenibus cibis utendum est: interdum uino tenui austero, nonnunquam uomitu. Profunt etiam quæcumque urinam augent. sed nihil magis quam ambulatione lenta, pene usque ad lassitudinem; frictio multa, præcipue inferiorum partium, uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usque ad sudorem. In interiore uero faucium parte, interdum exulceratio esse

De faucium morbis. De angina. De difficultate spirandi. De tussi. De cataplasmatibus. De fomentis. De malagma. De cerato. De nitro. De resina. De galbano. De sulphure. De iecore. De pulmone. De uino. De uomitu. De ambulatione. De frictione. De sudore.

consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisque humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi; per quæ molliores alij partes eas fieri dicunt, opportunioreque uitio iam habenti. Sed si bene sic uitari morbus potest, tuta illa præsidia: si metus eius est, superuacua sunt. Vtique autem perficere facies periculosum est: exulcerat enim. neque utilia sunt, quæ urinæ mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare, quam suppressi melius est. Asclepiades, multarum rerum (quas ipsi quoque secuti sumus) auctor bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera. sed id suppressere sanguinem potest, ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est; quod idem quoque æquè probatur: porri, uel marrubij succus; uel nucs Græcæ cum trachantio contrita, & cum passo mixta; uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi, currendique necessaria est. Frictio a pectore uehementi toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neque nimium acres, neque asperi, mel, lenticula, tragon, lac, prisana, pinguis quoque caro, præcipueque porrum, & quidquid cum hoc mixtum est. Potionis quàm minimum esse conuenit. Aqua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydonæum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes, sin hæc parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum: curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu lædat, desiderat.

De tussi, & hæmoptia sanguinis spatio, uel qualiter excretionem.

Tussis uero fere propter faucium exulcerationem molesta est; quæ multis modis contrahitur: Itaque illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere; & uix, cum uetus facta est, editur. ac modo arida est, modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoque die bibere: spiritu retento currere, sed minime in puluere: ac lectione ut uehementi: quæ primo impeditur a tussi, post eam uincit. tum ambulare; deinde per manus quoque exerceri; & pectus diu perficere. Post hæc, quàm pinguius fit, uncias tres supra prunas incoctas esse. Præter hæc si humida est, profunt frictiones ualidæ: cum quibusdam calefacientibus; sic, ut caput quoque fictum uehementer perficitur. Item cucurbitulæ pectori admotæ. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum, donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusque Græcis, & amylo; primoque assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget, adiuvat uini austeri cyathus assumptus; dum ne amplius id interpositum tempore aliquo, quàm ter, aut quater fiat: Item laferis quàm optimi paulum deuorare opus est; porri, uel marrubij succum assumere; scyllam delingere; acetum ex ea, uel certe acre sorbere; aut cum spica alij contriti duos uini cyathos. Vt uis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, natationes: Cibus interdum mollis, ut malua, ut uetula: interdum acer, ut lac cum alio coctum. sorbitiones quibus lafer sit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit; ouum sorbile sulphure adiecto. potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc alij uinum. Magis terri potest aliquis cum sanguinem exspuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet: Exit enim modo ex gingiuis, modo ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingiuarum ullo uitio; ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens tota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore uenæ alicuius aperta, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neque lædat potio, aut cibus, neque quidquam aut ex ulcere excreatur aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinere feratur. Sæpe foemina, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt; auctoresque medici fuerunt, uel ex ea parte aliqua sanguinem exire, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto. Primam hæmoptiam, secundam sanguis ex ore, tertiam hæmoptiam appellant. ultima minime nocet, prima grauissimè. Ac sæpe quidè euenit, ut sanguinem pus sequatur. Interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinem proficit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est, ita uana, & periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit, expeditus & remedium, & finis est. Neque ignorari oportet, eis quibus hæc sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ uel post cursum uehementem, uel ambulationem dum febris abest, non esse inutile sanguinis mediocriter profluuium, idque per urinam reddendum, ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit, si tamen in eius urina nihil nouabit. Neque uomitum huius asferre periculum, etiam cum repetit; si ante confirmare, & implere corpus liquit, & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque rursus, aut calorem mouet. Hæc pertinent ad uniuersum: Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex gingiuis exit, portulacum manducasse satis est, si ex ore, continuisse eo merum uinum, si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoque grauer, erumpit (quia consumere hominem potest) commodissimum est, impetum eius, admotæ occipitis cucurbitula, sic, ut cutis quoque incidatur, auertere. Si id mulierum cni menstrua non feruntur, euenit, eandem cucurbitulam incisissimis guttibus eius admoovere. At si ex faucibus, interioribusue partibus processit, & metus maior est, & cura maior adhibenda. sanguis mittendus est; & si nihilominus ex ore processit iterum, tertioque, & quotidie paulum aliquid; protinus autem debet sorbere, uel acetum, uel etiam cum thure, plantaginis, aut porri succum imponendaque extrinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est, & id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum cura quoque, & femora, brachiaque

brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sepe commode respondere, experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed sat est, infra inguina, & super talos, humerosque humeros, etiam brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex his, quæ aliud astringunt, decoctum sit. at si abest febris, uel elota alica, uel panis ex aqua frigida, & mox quoque ouum dari potest: potui, uel idem quod supra scriptum est, uel uinum dulce, uel aqua frigida; sed sic bibendum erit, ut sciamus, huic morbo sitim prodesse. Præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublimis esse debet, recteque rotundetur: Facies sepe aqua frigida fouenda est. At inimica sunt uinum, balneum, uenus. in cibo olem, acia omnia. item calida fomenta, conclaue calidum, & inclusum. multa uestimenta corpori iniecta, etiam fricationes, ubi bene etiam sanguis conquieuit; Tum uero incipiendum est a brachijs, cruribusque: a thorace abstinendum. In hoc casu, per hyemem, locis maritimis; per æstatem, mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus.

Cap. V.

Faucibus subest stomachus; in quo plura longa uitia incidere consueverunt: Nam modò ingens calor, modò inflatio hunc, modò inflammatio, modò exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumque est eius malum, quo resoluitur; neque ulla remagis aut afficitur, aut corpus afficit. Ut diuersa autem uitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi exstuat aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est: imponendusque pulvis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua præstanda. Si inflatio est, profunt admodum cucurbitulæ; neque incidere autem necesse est. profunt sicca, & calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda abstinentia est. Vtilis in ieiunio potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est; maximeque quæ superiores partes moueat, quod genus in omnibus stomachi uitijs aptissimum est. Post exercitationem, opus est unctione, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius; interdum alui ductione: Cibis deinde calidis, neque instantibus. eodemque modo calidis potionibus, primò aquæ, post ubi resedit inflatio, uini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi uitijs præcipiendum est, ut quo modo se quisque æger refecerit, eo ut sanus utatur: Nam redit huic imbecillitas sua, nisi ipsam defendatur bona ualentia, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam ferè tumor, & dolor sequitur, prima sunt quies, & abstinentia. lana sulphurata circumdata; in ieiunio, abstinthium! Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fouendus est; deinde cibis quidem utendum est modicis: Imponenda uero extrinsecus, quæ simul & reprimunt, & molliunt, & deinde his detractis, utendū calidis ex farina cataplasma tis, quæ reliquias digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partiū adhibenda. Adhibendi leues, & glutinosi cibi, sed citra satietatē. Omnia acia, atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci; aut si id inflat, certè leni utendum; sed neque præfrigidò, neque nimis calido. Si uero pituita stomachus impletur; necessarius modò in ieiunio, modò post cibum, uomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nautigatio, frictio. Nihil edendū, bibendumque nisi calidum, uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt. Molestius est, si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui siccitantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem quod pessimū est, iram mouere. His rectè alui ducitur. potiones absinthio dantur; necessaria gestatio, nautigatio est, si fieri potest, ex nauis uomitus. uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uinum austerum. Vulgarissimum uero, pessimumque stomachi uitium est resolutio; id est, cum cibi non tenax est; potiusque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae. Item unctiones, frictionesque. His perfundi frigida, atque in eadem natæ; canalibus eiusdem subicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam a scapulis id quod contra stomachum est: Consistere in frigidis, medijs capitisque fontibus (quales cutiliarum, symbruinarumque sunt) salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquantur, quàm facile uiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque autem, neque uenationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimū est uinum frigidum, uel certè bene calidum, meracum, potissimum rheticum, uel Allobrogicum, aliud uero, quod & austerum, & resina conditum est. si id non est, quàm asperissimum, maximeque signinum. Si cibus non continetur, danda aqua, & eliciendus plenior uomitus est; iterumque dandus cibus; & tum ad mouendū duobus intra stomachum digitis, cucurbitulæ; ibique duabus, aut tribus horis continendæ sunt. Si simul & uomitus, & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, uel spongia ex aceto, uel cataplasma, quod refrigeret. Perficienda uero non diu, sed uehementer, brachia, & crura, & calefacienda. Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis, cucurbitula utendum est; protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit, post uomitum tene aliquid ex his, quæ non aliena stomacho sunt: Si ne id quidem tenuit, singuli cyathi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam meri camentum est radiculæ succus, ualentius, acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo, & menta, sed huius minima parte; quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aquæ frigidæ, quàm optime miscetur: Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

De stomachi morbis.
Stomachi morbi.
Frequentissimumque est eius malum, quo resoluitur; neque ulla remagis aut afficitur, aut corpus afficit.

Ubi exstuat, aceto cum rosa fouendus est; deinde cibis quidem utendum est modicis: Imponenda uero extrinsecus, quæ simul & reprimunt, & molliunt, & deinde his detractis, utendū calidis ex farina cataplasma tis, quæ reliquias digerant.

Interdum alui ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt.

Exercitatio, frictio inferiorum partiū adhibenda. Adhibendi leues, & glutinosi cibi, sed citra satietatē. Omnia acia, atque acida remouenda.

Vino, si febris non est, dulci; aut si id inflat, certè leni utendum; sed neque præfrigidò, neque nimis calido. Si uero pituita stomachus impletur; necessarius modò in ieiunio, modò post cibum, uomitus est.

Vtilis exercitatio, gestatio, nautigatio, frictio. Nihil edendū, bibendumque nisi calidum, uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt.

Molestius est, si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui siccitantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem quod pessimū est, iram mouere.

His rectè alui ducitur. potiones absinthio dantur; necessaria gestatio, nautigatio est, si fieri potest, ex nauis uomitus.

uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uinum austerum. Vulgarissimum uero, pessimumque stomachi uitium est resolutio; id est, cum cibi non tenax est; potiusque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi.

Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae. Item unctiones, frictionesque.

His perfundi frigida, atque in eadem natæ; canalibus eiusdem subicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam a scapulis id quod contra stomachum est.

Consistere in frigidis, medijs capitisque fontibus (quales cutiliarum, symbruinarumque sunt) salutare est.

Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquantur, quàm facile uiantur.

Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neque autem, neque uenationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris.

Potui quidem aptissimū est uinum frigidum, uel certè bene calidum, meracum, potissimum rheticum, uel Allobrogicum, aliud uero, quod & austerum, & resina conditum est.

si id non est, quàm asperissimum, maximeque signinum. Si cibus non continetur, danda aqua, & eliciendus plenior uomitus est; iterumque dandus cibus; & tum ad mouendū duobus intra stomachum digitis, cucurbitulæ; ibique duabus, aut tribus horis continendæ sunt.

Si simul & uomitus, & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, uel spongia ex aceto, uel cataplasma, quod refrigeret.

Perficienda uero non diu, sed uehementer, brachia, & crura, & calefacienda.

Si plus doloris est, infra præcordia quatuor digitis, cucurbitula utendum est; protinus dandus panis ex posca frigida.

Si non continuit, post uomitum tene aliquid ex his, quæ non aliena stomacho sunt: Si ne id quidem tenuit, singuli cyathi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat.

Valens etiam meri camentum est radiculæ succus, ualentius, acidi punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci punico malo est, adiecto etiam intubi succo, & menta, sed huius minima parte; quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aquæ frigidæ, quàm optime miscetur.

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

Id enim plus quàm uinum, ad comprimendum stomachum

De laterum doloribus.

De laterum doloribus.

Cap.

VI.

potest. suppressendus autem vomitus est, qui per se uenit, sic si nausea est. Sed si coarctatus intus cibus, aut compurrit (quorum utrumlibet rictus ostendit) eiiciendus est; protinusque cibus assumptis iisdem, quos proximè posui, stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praecpta sunt.

Stomachus lateribus cingitur, atque in his quoque uehementes dolores esse consueverunt: & initium uel ex frigore, uel ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. Sed interdum ne malum intra dolore est, isque modo tarde, modo celeriter soluitur. interdum ad pernitiem quoque procedit: oriturque acutus morbus, qui *pituitus*, à Graecis nominatur. Hunc doloris lateris febris, & tussis accedit; & per hanc, excreatur (si tolerabilis morbus est) pituita, si grauis sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quae nihil emolliatur. idque primo uirio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium uero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At siue lentior, siue uetustior casus est, uel superuacuum, uel serum id auxilium est; coniungendumque ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Rectè etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera, pustulasque exciter; & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Praeter hæc circumdare primum oportet latus abtolana sulphuratæ. deinde cum paulum inflammatio se remisit, siccis, & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet, nouissime resina imposita discurritur. Utendum cibus portionibusque calidis. uitandum frigus. Inter hæc tamen, non alienum & extremas partes oleo, & sulphure perfricare. Si leuata tussis est, leni lectione uti, iamque & acres cibos, & uinum mericius assumere. Quæ à medicis præcipiuntur, ut tamen sine his rusticos nostros oportet ex aqua, herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt; plus negotij est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc præter ea, quæ supra posita sunt, hæc animaduertenda sunt; ut cibus sit quam maxime remissus, & lenis, præcipueque sorbitio; eaque ex ptisana potissimum; aut ius, in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idque non nisi tertio quoque die detur; si tamen per vires licebit. potui uero, aqua mulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint, ex ratione uel adiectæ, uel leuata febris, apparebit; sic, ut in remissione quam maxima dent; cum eo tamen, ut sciamus, non esse eius generis iustitias facies committendas. sæpe enim, ubi nihil est quod excreatur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam, dixi etiam prius id genus esse tussis, quod nihil, quam quod pituitam moueret. Sed hic uinum sorbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur. inuicem eius cremor ptisanæ sumendus est. Vt his autem in ipso morbi furore sustinendus æger est; sic, ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora, & uini quoque aliquid dari potest. dū nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque mæserit tussis, intermittere oportebit uno die; posteroque cum cibo uini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est, uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualitudinis, dulce, uel certe lenè comodius est. Si malum inueterauit, athletico uictu corpus firmandum est.

De uiscerum morbis; ex primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus.

Cap.

VII.

A compagine uero corporis ad uiscera transeundum est; & in primis ad pulmonem ueniendum; ex quo uehementis & acutus morbus oritur, quem *peripneumonia* Graeci uocant. eius hæc conditio est: Pulmo totus afficitur. hunc eius casum subsequitur tussis, bilem, uel pus trahens; præcordiorum, totiusque pectoris grauitas, spiritus difficultas, magnæ febres, continua uigilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quam doloris habet. Oportet si satis ualida vires sunt, sanguinem mittere; si minores, cucurbitulas tamen dimouere. Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta decocta sit. Frictione uti diutissime in scapulis; proximè ab his, in brachijs, & pedibus, & cruribus; leuiter contra pulmonem. idque his quotidie facere. Quod ad cibum uero pertinet, huic nec falsis opus est, neque acris, neque alium astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo prius bile ouum, nuclei pinei ex melle, panis, uel elota alica ex aqua mulsa potui, deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida; aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. hæc autem altero quoque die incrementum constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires delinunt, adiuvande sunt aqua mulsa, profuntque aduersus dolores, imposita calida fometa, uel ea quæ simul & reprimunt, & emolliunt. Prodest impositus super pectus, sal bene euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum præter apertis paruam aerem recipere. Deinde in refectione, pluribus diebus a uino abstinere, gestatione, frictione uti, sorbitionibus, & prioribus cibis adjicere ex oleribus, porrum; ex carne, ungulas, & summa trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil molle, & lenè sumatur.

Alterius quoque visceris morbus, id est iocineris, æque modo longus, modo acutus esse consuevit; *ἰοκίνας* Græci uocant. Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est: idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoque dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdum singultus prope strangulat, & hæc quidem acuti morbi sunt. Longioris uero ubi suppuratio in iocinere est, dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio, ubi inueterauit malum, uenter, & crura, pedesque intumescunt; pectus, atque humeri, circaque iugulum utrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est: tum uenter soluendus est, si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida, quæ deducant, quibus recte iris, uel abfinthium adijcitur, post hæc malagma. Dandæ uero sorbitiones sunt, omnesque cibi, & calidi, & qui non multum alant, & fere qui pulmonis quoque dolori conueniunt; præterque eos, qui urinam mouent, portionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, saturia, hyssopum, nepeta, amyllum, silaum, lauri bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbz iecur recens, & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adijcere, uel sorbitioni, uel potioni licet, sic tamen ut parte assumantur. Neque alienum est abfinthium contritum ex melle, & pipere, eiusque cataportum quotidie deuorare. Abstinentum utique est ab omnibus frigidis; neque enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus, uitandus omnis labor, omnis uehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, icus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hyems est, calida; si æstas, tepida. Item liberalis unctio, & in balneo sudor. Si uero iecur nomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id, scalpello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione.

Cap.

IX.

At lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo, pars sinistra; eaque dura est, & prementi renititur, uenter intentus est, aliquis etiam cruribus tumor est. Vtæ aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem mix recipiunt. In uentura ambulatione, cursuque dolor, & quædam difficultas est. hoc uitium quies augeat. Itaque exercitatione, & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mixta, si nimium processerit, excitetur. Vntiones, frictionesque, & sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt, item lac & caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acceper se sorbere, & magis etiam quod seylla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta, nec oleæ ex muria dura, tinctæ in aceto lactucæ, intubique, & heræ ex eodem, ex sinapi, asparagis, armoracia, pastinaca, uingulæ, rostra, aues macra, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet abfinthium incoctum, at post cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim, uel præcipue lienem coërcet; quod animaduersum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata, exiguis lienes habent, potest etiam dari uinum tenue, austerum; omniaque in cibis, & potionibus, quæ urinam mouende sunt, præcipueque ad id ualent, uel trifolij semen, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel cithisus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel saturia, hæc enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoque bubulus utiliter esse datur, præcipueque eruca, & nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ ferunt. Fit ex unguento, & palmulis, quod *ῥυπόβαλον* Græci uocant: Fit ex lini, & nasturcij semine, quod uinum, & oleum adijcitur, fit ex cupressu uiride, & arida ficu, fit ex sinapi, cui seui birquinia renibus quarta pars ponderis adijcitur, teriturque in sale, & protinus imponitur. Multisque modis huic rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin etiam extrinsecus radice contritam, uel corticem eius cum fursibus; aut ipsum capparum cum melle contritum, imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus.

Cap.

X.

At renes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere, cubare molliter, soluere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere. Sæpe desiderare in aqua calida; neque cibum, neque portionem frigidam assumere, abstinerere ab omnibus salis acris, acidis pomis; bibere liberaliter; adijcere modò cibo, modò potioni, piper, porrum, ferulam, album papauer; quæ maxime inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purgata sunt, cucumeris semina, detractis corticibus, sexaginta, nuclei ex pinu siluestri duodecim, aneli quod tribus digitis summi possit, croci paululum; contrita, & in duas multi portiones diuisa. Si uero dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, iidem nuclei uiginti, nuges Græcæ quinque, croci paululum; contrita, & cum lacte, potui data. At super quoque recte quædam malagmata injiciuntur, maximeque ea, quæ humori extrahendo sunt.

an tumori emolliendo

De iocineris morbo & curatione. Hæc uisceris morbus, id est iocineris, æque modo longus, modo acutus esse consuevit; ἰοκίνας Græci uocant. Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est: idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoque dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdum singultus prope strangulat, & hæc quidem acuti morbi sunt. Longioris uero ubi suppuratio in iocinere est, dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio, ubi inueterauit malum, uenter, & crura, pedesque intumescunt; pectus, atque humeri, circaque iugulum utrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est: tum uenter soluendus est, si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida, quæ deducant, quibus recte iris, uel abfinthium adijcitur, post hæc malagma. Dandæ uero sorbitiones sunt, omnesque cibi, & calidi, & qui non multum alant, & fere qui pulmonis quoque dolori conueniunt; præterque eos, qui urinam mouent, portionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, saturia, hyssopum, nepeta, amyllum, silaum, lauri bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbz iecur recens, & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adijcere, uel sorbitioni, uel potioni licet, sic tamen ut parte assumantur. Neque alienum est abfinthium contritum ex melle, & pipere, eiusque cataportum quotidie deuorare. Abstinentum utique est ab omnibus frigidis; neque enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus, uitandus omnis labor, omnis uehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, icus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hyems est, calida; si æstas, tepida. Item liberalis unctio, & in balneo sudor. Si uero iecur nomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id, scalpello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo & curatione. At lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo, pars sinistra; eaque dura est, & prementi renititur, uenter intentus est, aliquis etiam cruribus tumor est. Vtæ aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem mix recipiunt. In uentura ambulatione, cursuque dolor, & quædam difficultas est. hoc uitium quies augeat. Itaque exercitatione, & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mixta, si nimium processerit, excitetur. Vntiones, frictionesque, & sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt, item lac & caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acceper se sorbere, & magis etiam quod seylla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta, nec oleæ ex muria dura, tinctæ in aceto lactucæ, intubique, & heræ ex eodem, ex sinapi, asparagis, armoracia, pastinaca, uingulæ, rostra, aues macra, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet abfinthium incoctum, at post cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim, uel præcipue lienem coërcet; quod animaduersum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata, exiguis lienes habent, potest etiam dari uinum tenue, austerum; omniaque in cibis, & potionibus, quæ urinam mouende sunt, præcipueque ad id ualent, uel trifolij semen, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel cithisus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel saturia, hæc enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoque bubulus utiliter esse datur, præcipueque eruca, & nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ ferunt. Fit ex unguento, & palmulis, quod ῥυπόβαλον Græci uocant: Fit ex lini, & nasturcij semine, quod uinum, & oleum adijcitur, fit ex cupressu uiride, & arida ficu, fit ex sinapi, cui seui birquinia renibus quarta pars ponderis adijcitur, teriturque in sale, & protinus imponitur. Multisque modis huic rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin etiam extrinsecus radice contritam, uel corticem eius cum fursibus; aut ipsum capparum cum melle contritum, imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. At renes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere, cubare molliter, soluere aluum, si aliter non respondet, etiam ducere. Sæpe desiderare in aqua calida; neque cibum, neque portionem frigidam assumere, abstinerere ab omnibus salis acris, acidis pomis; bibere liberaliter; adijcere modò cibo, modò potioni, piper, porrum, ferulam, album papauer; quæ maxime inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purgata sunt, cucumeris semina, detractis corticibus, sexaginta, nuclei ex pinu siluestri duodecim, aneli quod tribus digitis summi possit, croci paululum; contrita, & in duas multi portiones diuisa. Si uero dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, iidem nuclei uiginti, nuges Græcæ quinque, croci paululum; contrita, & cum lacte, potui data. At super quoque recte quædam malagmata injiciuntur, maximeque ea, quæ humori extrahendo sunt.

A visceribus ad intestina ueniendum est, quæ sunt et acutis, & longis morbis obnoxia. Primo æque facienda mentio est cholerae, quia commune id stomachi, atque intestinorum uitium uideri potest: Nam simul & deiectio, & uomitus est, præterque hæc inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse uideatur, interdum alba, nonnunquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc *cholera* Græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra comprehensa sunt, sæpe etiam contra manusque contrahuntur, urget sitis, anima deficit, quibus concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur. neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo, ubi ista coeperunt, aquæ tepida quæ plurimum bibere oportet, & uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur. sed etiam si non incidit, miscuissæ tamen nouam materiam corruptæ prodest; parsque sanatis est, uomitus esse suppressum. si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si uero tormina sunt, oportet frigidis & humidis fumentis stomachum fouere; uel si uenter dolet, iisdem egelidis sic, ut uenter ipse mediocriter calidus uiuetur. Quod si uehementer & uomitus, & deiectio, et sitis uexant, et adhuc suberuda sunt, quæ uomuntur, nondum uino maturum tempus est. Aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida, danda est. ad mouendumque naribus est *puteum* ex aceto, uel *polenta* uino aspersa, uel menta secundum naturam est. At cum diffusa cruditas est, tum magis uerendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad uinum: id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mixtum; uel polenta adiecta, uel melle quoque, assumere expedit; quotiensque aliquid aut stomachus, aut uenter effudit, potens per hęc uires restituere. Erasistratus primò tribus uini guttis, aut quinis aspergendam portionem esse dixit; deinde paulatim iterum adiciendum. Is si & ab initio uinum dedit, & metu cruditatis fecutus est, non sine causa fecit: Si uehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putauit, errauit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda portio abstintij est. Si extremæ partes corporis frigeant, ungenda sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adiectum, calidisque fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est; extrinsecus contra uentriculum ipsum, cucurbitula ad mouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere, somno, quique facile acquiescat. itemque lassitudine, & frigore. Si post suppressam cholera febricula manet, aluum duci necessariū est. tum cibus, uinoque utendum est. Sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumque uersatur, sicut cuius potissimum partis sit, non facile dici possit.

De colliaco uentriculi morbo.

XII.

In ipsius uero uentriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit; non uero a Græcis nominatur. Sub hoc neuter indurefcit, dolorque eius est. Alius nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit, extremæ partes frigesunt; difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia, calida cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant; post cibum uomere, atque ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro uentri, & coxis ad mouere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & uino falso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus ficis; sic tamen, ne quis aut cibus, aut humor uini uisus deuiat, sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos, ternos uel sumere, & cibum pro portione huius, comodeque facit, cyathos lactis, cyathos aquæ mixtus, & sic datus. Cibi que trantes, & acres, utiliores sunt; adeo ut lacti quoque recte contritum allium adijciatur. Procedente uero tempore, opus est gestari, maximeque nauigare; perficari ter aut quater die, sic, ut nitrum oleo misceatur, perfundi aqua calida post cibum; deinde sinapi imponere per omnia membra (excepto capite) donec arrodetur, & rubeat; maximeque si corpus durum, & uirile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem comprimunt. Assa, caro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui uero, plurius aqua decocta; sed quæ per binos, ternos uel cyathos bibatur. Si uetus uitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem deuorare, altero quoque die uinum, uel aquam bibere; interdum, interposito cibo, singulos uini cyathos sorbere; ex inferiori parte infundere plurius egelidam aquam, maximeque si dolor in imis partibus remanet.

De tenuiori intestini morbo.

Cap.

XIII.

Inter ipsa uero intestina consistunt duo morbi; quorum alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est, insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *cholera* nominauit. A plerisque uideo nuncillum priorem, & uerum hunc *cholera* nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet. Fit ex alterutro loco inflammatio; nec alius, nec spiritus infra transmittitur. si superior pars affecta est, cibus, si inferior, stercus per os redditur. si autem utrumlibet uetus est, adijciunt periculo, uomitus biliosus, mali odoris, aut uariis, aut niger. Remedium est, sanguinem mittere, uel cucurbitulas pluribus locis ad mouere, non ubique cute incisa: Id enim duobus, aut tribus locis satis est. Ex cæteris spiritum euocare abunde est. Tum animaduertere oportet, quo loco malum sit: solet enim contra id timere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est: Si infra est, aluum

aluum ducere (ut Erasistrato placuit) optimum est: & sæpe id auxilij satis est. Ducitur autem, percolato prisanz cremore cum oleo; & melle sic, ut præter ea, nihil adijciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum uentrem, paulatimque deducere: Inuenietur enim mali locus; qui necesse est, reni tatur; & ex eodem deliberari poterit, ducenda nec ne alius sit. Illa communia sunt; calida cataplasmata admoouere, eaque imponere a mammis usque ad inguina, & spinam, & sæpe mutare; brachia/cruraque perfricare, demittere totum hominem in calido oleo. Si dolor non quiescit, etiam in aluum, ex parte inferiore, tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui multum tepidum, non multum. nam ante, magna cura uitandum est, ne quid bibat. si id commodè cessit, adijcere sorbitionem. Vbi dolor, & febricula quierunt, tum demum uti cibo plenior, sed neque inflante, neque duro, neque ualido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid uinolentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoque uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio nisi bene iam confirmata intestinis reuertitur.

De morbo intestini plenis.

Cap. XIII.

Is autem morbus, qui in intestino plenior est, in ea maxime parte est, quam certam esse proposui. Vehemens inflatio, uehementes dolores dextra magis parte intestinum (quod uerti uidetur) prope spiritum elidit. In plerisque, post frigora, eruditesque oritur, deinde quiescit; & per ætatem sæpe repetens, sic cruciat, ut uita spatio nihil demat. Vbi is dolor, cepit, admoouere sicca, & calida fomenta oportet, sed primo lentâ, deinde ualidiora, simulque frictiones, ad extremas partes id est crura, brachiaque, materiam renouare. Si diffusum non est, quâ dolet, cucurbitulas sine ferro desigere. Est etiam medicamentum, eius rei causa comparatum, quod *καλόν* nominatur. id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum: sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. nisi finito uero tormento, recte neque cibus, neque potio assumitur. Quo uictu sit utendum, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *καλόν* nominatur, ex his constat. Cossi, anisi, castorei, singulorum Pondo denariorum trium, petroselini, P. denariorum, I I I. piperis longi, & rotundi singulorum P. ✱. I I. papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singulorum P. VI. quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

De torminibus id est dysenteria.

Cap. XV.

Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt, *Αντερρεπία* græce uocatur. Intus intestina exulcerantur: ex his tormina manant. Isque modò cum stercore aliquo, semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quædam carnosæ descendunt. Frequens deiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore, exiguum aliquid emittitur, atque eo quoque tormentum intenditur: idque post tempus aliquod leuatur, exiguaque requies est. somnus interpellatur, febricula oritur. longoque tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem; aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conuiescere: si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunium, sorbere uini cyathum, cui contrita radix quinque folij sit adiecta. imponere cataplasmata super uentrem, quæ reprimunt: quod in superioribus uentris morbis non expedit. quotiensque defecit, subluere aqua calida, in qua decoctæ uerbenæ sint. portulacæ, uel costæ, uel ex dura muria edisse. cibos, potionesque eas, quæ astringunt aluum. Si uetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere, uel prisanz cremorem, uel lactis, uel adipem, liquatam, uel medullam ceruinam, uel oleum; uel cum rosa, butyrum; uel cum eadem album crudum ex ouis; uel aquam, in qua lini semen decoctum sit; uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua in qua rosæ floris folia costæ sint. Leuant enim dolorem hæc, & mitiora ulcera efficiunt; maximeque utilia sunt, si cibi quoque secutum fastidium est. Themison, muria dura quam asperissima sic utendum memorie prodidit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destinguant; & ea, quæ urinam mouent. Si ea consecuta sunt, in aliam partem, humorem auertendo, profunt. si non sunt consecuta, noxam augent. Itaque, nisi in quibus promptè id facere consueuerint, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est, aqua pura calida; uel ea, quæ ipsa quoque astringat, dari debet. si non est, uinum tene austerrum. Si pluribus diebus nihil remedia alia iuuerunt, uetusque iam uitiū est, aquæ bene frigida potio assumpta, ulcera astringit; & uitiū secundæ ualitudinis facit. Sed ubi uenter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris fæces, pessimi que odoris descendere: solet purus sanguis profluere. si superius uitiū est, aluus aqua multa duci debet, tunc deinde eadē infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensque est etiam aduersus ulcera intestinorum, minij gleba, cum salis hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluat, cibi, potionesque esse debent, quæ astringant.

De leuitate intestinorum.

Cap. XVI.

Ex torminibus interdum intestinorum leuitas oritur; quæ continere nihil possunt, & quidquid

assumptum est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum agros trahit, interdum precipitat. In hoc uti que adhibere oportet comprimantia, quod facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo & super pectus ponitur sinapi, exulcerataque cute malagma, quod humore euocet; & ex uerbena decoctis aqua, desidat; & cibos, potionesque assumat, quae aluum astringunt; & frigidis utitur perfusionibus. Oportet tamē prospicere, ne simul his omnibus admotis, uitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debent, aliquibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc praecipue necessarium est, non quotiens libet desidere, sed quotiens necesse est; ut hanc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod aequē ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime seruandum est, ut cum pleraque utilia infirma sint (qualis est plantago, & rubea, & quidquid mali corio mixtum est) ea potissimum ex his dentur, quae maxime ager uolet. Deinde si omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid nimis uirile, sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt; & cum his sol, ignis, balneum, uomitus (ut Hippocrati uisum est) etiam albo ueratro (si caetera parum proficiunt) euocatus.

De lumbricis aluum occupantibus.

Cap. XVII.

Nonnunquam autem lumbrici quoque occupant aluum; hique modo ex inferioribus partibus, modo frigidius, ore redduntur. Atque interdum latos eos (qui peiores sunt) interdum teretes uidemus. Si lati sunt, aqua potius dari debet, in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit; aut cui adiectum sit contritum puluer hyssopum, uel piperis acetabulum, uel scamoneae paulum. uel etiam pridie, cum multum allium ediderit, uomat. Posteroque die, mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehendet, easque contusas in aqua tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adijciat nitri paulum, & ieiunus tribuat. Subiecta calida aqua in pectus. Si uero teretes sunt (qui pueros maxime exercent) & eadem dari possunt, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsâ, uel nasturtium semen cum aceto contritum. Edisse etiam lupinum, & allium, prodest; uel in aluum, oleum subter dedisse.

De tensesimo intestini morbo.

Cap. XVIII.

Est autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus supradictum est, quod *tenesimus* Graeci uocant. Id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neque unquam per se ingulet. In hoc equē atque in torminibus, frequens desidendi cupiditas est, aequē dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituita, mucoque similia, interdum etiam leniter subcruenta. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. Desidere oportet in aqua calida: sapiusque ipsum manum nitere, cum plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, agacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod *terracina* Graeci uocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum; eademque ex inferiori parte indita, quae torminum auxilia sunt, eadem uerbena decoctae, ut inferiores partes foucantur, alterius uero diebus aqua, alternis tene, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egeida, & frigida.

proprior ratio uicinis talis, qualem in tormina supra praecipimus.

De uentris fluxu, & curatione.

Cap. XIX.

Leuior etiam, dum recens, deiectio est, ubi & liquida aluus, & saepius, quam ex consuetudine, fertur, atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idque peius est. sed uno die fluere aluum, sepe pro ualitudine est, atque etiam pluribus, dum febris abest, & intra septimum diem id conquiescat. purgatum enim corpus, & quod intus laesum erat, utiliter effunditur. ueni spatium periculosum est: Interdum enim tormina, ac febriculas excitat, uiresque consumit. Primo die quiescere satis est, neque imperum uenitris prohibere; si per se desijt, balneo uti, paulum cibi capere. si mansit, abstinere non solum a cibo, sed etiam a potione. Postero die, si nihilominus liquida aluus est, aequē conquiescere, paulum astringentis cibi sumere; tertio die in balneum ire, uehementer omnia, praeter uentrem, perfricare, ad ignem, lumbos, scapulasque admonere; cibis uti, sed uentrem contrahentibus uino non multum meraco. Si postero quoque die fluat, plus edisse, sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, uomitu nitri, uix enim fieri potest, ut post hanc animaduersionem aluus non contrahatur. Alia uia est, ubi nelis suppressere; coenare, deinde uomere; postero die in lecto conquiescere, uespere ungi, sed leniter. deinde panis circa selibram ex uino amineo mero sumere. cum affum aliquid, maximeque auem, & postea uinum idem bibere, aqua pluri uiali mixtum; idque usque quintum diem facere, iterumque uomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem quam frigidissimâ. Ego experientia, quaeque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id tepido oleo ungi, cibum modicum assumere, uinum meracum quam asperum; impositam super uentrem habere cum crato rutam. In hoc autem affectu corporis, neque ambulatione, neque frictione opus est. uehiculo

est. uehiculo sedisse, uel magis etiam equo, prodest: neque enim ulla res magis intestina confirmat. Si uero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id, quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore, in græde uas coniicienda sunt pira, atque mala siluestria. si ea non sunt, pira tarentina iuridica, uel signina, mala scandiana uel amerina, myrapi: hisque adijcienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punicis, sorbibus, & quibus magis utimur etiam forminalia, sic, ut hæc tertiam ollæ partem teneat. tum deinde ea multo implenda est: coquendumque id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in unitatem quædam coeant. Id gustui non infuante est: & quandoque opus est, assumptum, leuiter, sine ulla stomachi noxa, uentrem tenet. duro, aut tria cochlearia uno die sumplisse satis est. Alterum ualētius genus est: myrri baccas legere; ex his nimum exprimere; id decoquere, ut decima pars remaneat, eiusque cyathum sorbere. Tertiū, quod quandoque fieri potest, malum punicum excuare: exemptisque omnibus seminibus, membranas, quæ inter ea fuerunt, iterum coniungere. tum infundere cruda oua, rudiculaque miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere: quod, dum humor intus est, non aduritur. Vbi siccu esse coepit, remouere oportet; extractumque, cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis, maius momentum habet. Itaque etiam in piperatum coniicitur: misceturque cum sale, & pipere. est quid ex his edendū. Est pūticula etiam, cum qua paulum ex fauo uetere coctum sit; & lenticula cum malicono cocta; rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo, atque aceto assumpta, efficacia sunt. atque ea aqua, in qua uel palmulæ, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens portione dandam esse dico, quæ astringat. Tritici quoque hemina in uino amineo austero decoquitur: idque triticum ieiunio, ac sitiēti datur. superque id, uinum id sorbetur. quod iure ualentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur uinum signinum, uel resinatum austerū, uel quodlibet austerū. Cōtunditurque cū corticibus, seminibusque suis punicū malū, uinoque tali miscetur, idque uel merū sorbet aliquis, uel bibit mixtū. sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis, superuacuum est.

De uulua morbo, & curationibus: item de vesica & Capite XX.

Ex uulua quoque foeminis uehemens malum nascitur: proximeque ab stomacho, uel afficitur hæc, uel corpus afficit: Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi uertuntur, nec spumæ profluunt, nec nerui distenduntur: sopor tantū est. idque quibusdam foeminis crebro reuertens, perpetuum est. Ubi incidit si satis uiriū est, sanguis misfus adiuvat. si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consueuit: admouere oportet naribus extinctum ex lucerna linamētum, uel aliud ex his, quæ foetoris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquæ frigida perfusio efficit. adiuvatque ruta contrita cum melle; uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet cassidum, & humidum cataplasma, naturæ libis puberænis impositum. Inter hæc etiam perficere coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se reuertitur, incidendum uinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. Cibis ex media materia dandus: si uero super uinum uentrem tertio quoque, aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè uidetur solanum in lac demissum, deinde contritum; & cera alba, atque medulla ceruina cum irino; aut seipum taurinum, uel caprinum cum rosa mixtum. Bandum potui etiam uel castrum est, uel git, uel anerum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato. si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recens suilla adeps, & ex onis album misceatur, idque apponatur: uel albu ex oue cum rosa mixtum, adiecto (quo facilius consistat) cōtrita rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulæ, cute incisa, inguinibus, uel etiam sub mammis admoræ. si maligna purgatio est, subiicienda sunt, coeuntia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptum, & gummi cum trito semine apiliquatum, & cum cyatho passii datum. Præter hæc, in omnibus uelice doloribus idoneæ potiores sunt, quæ ex odoribus sunt: id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusque: Idemque etiam decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admoræ cucurbitulæ, cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluens, maciem, & periculum facit; si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximeque in solē, uel ad ignem. Balneum ranum esse debet: neque longa in eo mora: cibis comprimens. Vinum austerum meracum, per estatem frigidum; per hyemem, egchidum; sed tantum, quā tum minimum sit. Infusa aluius quoque uel ducenda; uel lacte purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio; longior in balneo mora; cibis opus est teneris; uinum idē. In utroque morbo, uitanda omnia sunt, quæ urinam mouere consueuerunt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus.

Caput XXI.

EST etiam circa naturalia uitium, nimia profusio seminis. quod sine uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio, tabe hominem consumat. In hoc affectu, salutares sunt uehementer frictiones, perfusiones, uationesque quā frigidiſſime. neque cibi, nec potio, nisi frigida

assumpta. Vitare autem oportet cruditates; omnia infantia. nihil ex his assumere, quæ contrahere se-
men videntur: qualia sunt, frigo, similia, omnia alica, amylium, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nu-
clei pinsi. Neque alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex uerbena comprimantibus: ex
hisdem aliqua cataplasmata imo uentri, inguinibusque circumdare: præcipueque ex aceto rutam vitare:
& ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, et curationibus.

Caput XXII.

Superest ut ad extremas partes corporis ueniam, quæ articulis inter se conferuntur. initium à co-
xis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. isque hominem sepe debilitat: & quosdam non dimit-
tit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos morbos, uis pestifera huc se inclinat. que
ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoque affectamprehendit. Fouendum primum aqua calida est:
deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse uidetur, aut cum hordeacea farina, aut cum fi-
cu ex aqua decocta, mixtus capparis cortex concisus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, & mixta cum ac-
ida fecere: quæque refrigerant, imponere nocturne malagmata commodius est. Inutile quoque radix contusa
& ex uino austero postea cocta, & late super coxam imposita, inter ualentissima auxilia est: si ista non sol-
uerint, sale calido, & humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa
cute, ad mouendū sunt cucurbitula: mouenda urina. Alius si compressa est, ducenda. Vltimum est, &
in ueteribus quoque morbis efficacissimum, tribus, aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus
ferramentis exulcerare. Sed frictione quoque utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quod fa-
cilis ea, quæ coeundo nocuerunt, dirigantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis, sicut &
cæteris partibus, adhibenda est. Cum uero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut mate-
ria inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primum fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed
ea trahere, donec id uitium, cui per hæc opitulatur, conquiescat.

De genuum doloribus, et cura.

Caput XXIII.

Coxis proxima genua sunt: in quibus ipsi nonnunquam dolor esse consuevit. In hisdem autem
cataplasmatibus, cucurbitulisque præsidium est: sicut etiam cum in humeris, alijsue commissuris dolor
aliquis exortus est. Equitare, ei, cui genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi
dolores, ubi inueterauerint, uix citra uisionem finiuntur.

De articularum doloribus in manibus, pedibusque.

Caput XXIII.

IN manibus, pedibusque articularum uitia frequentiora, longioraque sunt. quæ in podagris, chi-
ragris uel esse consuevit. Ea raro uel castratos, uel pueros, ante foeminae coitum, uel mulieres (nisi quibus
menstrua suppressa sunt) tentant. Ubi sentiri ceperunt, sanguis mittendus est: Id enim inter initia sta-
tim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam ualitudinem totam præstat. Quidam etiam, cum a si-
nino lotio epoto se eluissent, in perpetuum, hoc malum euaserunt. Quidam, cum toto anno à uino, mul-
so, uenere, sibi temperassent, securitatem totius uitæ consecuti sunt. idque utique post primum dolo-
rem ferendum est, etiam si quiescit. Quod si iam consuetudo eius facta est: potest quidem aliquis esse
securior his temporibus, quibus dolor se remisit: Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id
reueritur, quod fere uere, autumno uel fieri solet. Cum uero dolor uiget, manu gestari debet: deinde fer-
ri. in ambulatione leui se dimouere. & si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem modo se-
dere, modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido leuiter perfricari, sudare, per-
fundique aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam mouentibus: quo-
tiesque plenior est, euomere. Vbi dolor uchemens urget: interest, sine tumore is sit, an tumor cum
calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquæ mari-
nam uel miniam duram seruare facere oportet: deinde in peluie coniungere: & cum iam homo pati potest,
pedes demittere: superque patam dare, & uestimento tegere; paulatim deinde iuxta labrum ipsum, ex
eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus defluat: ac deinde nocturne cataplasmata calefacientia im-
ponere, maximeque ibi radicem ex uino coctam. Sin uero tumor, calorque est, utiliora sunt refrigerantia:
recteque in aqua quam frigidissima, articuli continentur. sed neque quotidie, neque diu sit: ne nerui la-
dantur. imponendum uero est cataplasma, quod refrigeret. Neque tamen in hoc quotidie permanen-
dum: sed ad ea transeundum, quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in
uino coquendi: miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit. Vel ceræ, & adipis suillæ tan-
tundem unâ liquandū, deinde his uinū miscendum: atque ubi quod ex eo impositū est incaluit, detrahe-
dum, & subinde imponendū aliud est. Si uero tumores et obcaluerint, & dolent, leuat spogia, quæ imposita
subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur, aut pari portione iter se mixta, pix, cera, alumen.
sunt et plura idonea manibus, pedibusque malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tu-
more est, fouere oportet spogia, quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cu-
cumeris filicis radix decocta sit, tum inducere articulis crocum cum succo papaueris, & ouillo lacte: at

si tumor

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor nullus est, calidum

si tumor est, foueri quidem debet aqua egelida, in qua lentiscus, alia uerba ex reprimantibus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerussa, cui contrita herba muralis succus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedit (quem *oxyphor* Graeci uocant) excisus sic ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi leuare consuevit. Ex quo, in Asia, lapidi alio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt (quod intra dies quadraginta fit, nisi uitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus fructibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus uero articulorum dolor, certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso ictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore uomitus, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti, uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus, pedes replet: cum euident sit, omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exanimari. Ex quocunque autem morbo quis inualefcit, si tarde confirmatur, uigilare prima luce debet: nihilominus in lecto conuiescere. circa tertiam horam, leuiter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa, quantum uiuat, ambulare, circumfusa omni negotiosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa frictione uti. *toca* coelum, cibos saepe mutare. Vbi triduo, quatruiduo uel uinum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam, per hec enim fiet, ne in uitia tabem inferentia incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uita genus subito mutabit, & inordinataeget. Paulatim ergo debebit, omittis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo uiuat.

LIBER QVINTVS.

PREFATIO.



DIXI de his malis corporis, quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc transeundum est ad eam medicinae partem, quae magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt: & Erasistratus, & *h*, qui se *epicrator* nominauerunt: praecipue tamen *Ero* philus, deductique ab illo uirgideo, ut nullum morbi genus sine his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum, memoriae prodiderunt. qualia sunt, uel Zenonis, uel Andriæ, uel Apollonij, qui *Mys* cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte *Asclepiades* non sine causa sustulit: & cum omni fere medicamenta stomachum laedant, malique succi sint: ad ipsius uictus rationem potius omnem curam suam transfudit. Verum ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuevit, quae sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicinae partes ita innexae sunt, ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quae uictu curat, aliquando medicamentum adhibet: & illa, quae praecipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem uictus debet: quae multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac saepe simplicia opitulentur, saepe mixta: non alienum uideretur, ante proponere & nomina, & uires, & mixturas eorum: quod minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit. * *Idem fere praecipit cap. xii. lib. ii. & uersis paulum discrepantibus, saepe uisum: uide & cap. 4. lib. 3.*

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta fiunt: & primo de

his, quae sanguinem supprimunt. Caput I.

Sanguinem supprimunt atramentum sutorium (quod Graeci *χρυσόδακρυον* appellant) chalcitis, acacia, & ex aqua litium, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta uel cimolia, uel singularis, misy, frigida aqua, uinum, acetum, alumen, melinum, squama & ferri, & zris: atque huius quoque duae species sunt, alia tantum eris, alia rubri eris.

Que uulnus glutinant.

Caput II.

Glutinant uulnus, myrrha, thus, gummi, praecipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nasturcium, oui album, glut, ichthyocolla, uitis alba, contuse testis suis cochleae, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plaga est: etiam araneum reprimunt, alumen & scissile (quod *oxyris* uocatur) & liquidum, melinum, auripigmentum, crugo, chalcitis, atramentum sutorium.

Que concoquunt, & mouent pus.

Caput III.

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, rhuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Que aperiunt uulnera.

Caput IIII.

Vulnera aperiunt, tanquam ora in corporibus (quod *sopur* Graece dicitur) cinnamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, pulcium, flos albe uiole, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, pro-

gulegium, si ysa.

His malis, uictus ratio maxime

subuenit: ut medicamentis

antiqui auctores multum tribu-

erunt: ut

erant, adeo ut nulla morbi

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

erant, sine his curarent.

polis, oleum uetus, piper, pyretum, chamæpyris, uua aminia, sulphur, alumen, ruta, semen.

al. purgant.
Quæ purgant.

Caput V.

auripigmento & san-
daracæ in omni-
vis eadem est:
in bdelio & amon.

que hanc rotam ha-
ent, ut repetitas, san-
daracæ debent in singulis
et capitibus.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod ἀπορρυκνὸν à Græcis nominatur (Huic autem & sandaracæ in omnia eadem uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina pinea, & terebinthina liquida, cœnanthe, lacerti stercus, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium quod in omnia idem quod ammoniacum potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, coccum, gnidium, scobis eboris, omphacium, radícula, coagulum, sed maxime leporinum (cui eadem quæ cæteris coagulis, facultas, sed ubique ualidior est) fel, uittellus crudus, cornu ceruinum, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruum,

al. rodunt.
Quæ rodunt.

Caput VI.

Rodunt, alumen liquidum, sed magis rotundum, ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaracæ, minium, synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper utrunque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum & amarum nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cinnamomum, styrax, cicuta semen, resina, narcissi semen, fel, nuces amarae, oleumque earum, atramentum futorium, chryso colla, uera-

al. exedunt.
Quæ exedunt corpus.

Caput VII.

Admonitio.
fractas, pumex, & sal-
daracæ in omni-
vis eadem est:
in bdelio & amon.

si in uia, &
si in uia, &
si in uia, &
si in uia, &

Exedunt corpus, acaciæ succus, hebenus, erugo, squama æris, chryso colla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diaphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaracæ, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum futorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac capri, uel lactuce marine (quæ τριβυλλος à Græcis nominatur) alcyonium, fel, turturis fuligo, spodium, lenticula, mel, olea folia, marrubium, lapis hæmatites & phrygius, & alius, & scissilis, mysi, uinum, acetum.

al. adurant.
Quæ adurant.

Caput VIII.

Adurant, auripigmentum, atramentum futorium, chalcitis, mysi, ærugo, calx, carta combusta, sal, squama æris, æs combustum, myrra, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum, gnidium, allium, diaphryges, lac utrunque, quod proximo capite supra comprehensum est: ueratrū & albu, & nigrum, cantharides, corallium, pyretum, thus, salamandra, eruca, sandaracæ, uua aminia, chryso colla, ochra, alumen scissile, ouillum stercus, cœnanthe.

al. inducunt.
Quæ crustas ulceribus inducunt.

Caput IX.

Eadem fere crustas ulceribus, tanquam igne adustis inducunt: sed præcipue chalcitis (utique si cocta est) flos æris, ærugo, auripigmentum, mysi, & id quod magis coctum.

al. resoluunt.
Quæ crustas ulceribus resoluunt.

Caput X.

Crustas uero has resoluunt, farina triticea, cum ruta, uel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

Caput XI.

Ad potius usum, caprius lac,
T. paulo sic, croci, prasinum.

Ad discutienda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt abrotanum, hebenus, amaracus, alba uiola, mel, lilium, sampucus, cyprius, lac, fertula campana, serpillū, cupressus, cedrus, iris, uiola purpurea, narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum, cera, resina, uua aminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini, & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis aut molaris, crudus uittellus, amara nuces, sulphur,

al. euocant.
Quæ euocant, & educunt.

Caput XII.

Euocat & educit, ladanum, alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina, & pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex, farina lolij, grossi in aqua

in aqua costi, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

Que exasperata leuunt.

Cap. XIII.

Leuat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, oui album, lac, tragacanthum.

Que carnem nutriunt, et ulcus implent.

Cap. XIV.

Carnem alit, & ulcus implet resina pinea, ochra ætica, uel alterica, cera, butyrum.

Que molliunt.

Cap. XV.

Molliunt, æs combustum, terra crethria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula campana, narcissi & radix, & semen, rosæ folia, coagulum, uitellus crudus, amaræ nuces, medulla omnis sibi, pix, cholea costæ, cicuta semen, plumbi recrementum, liores ex gimasio, sulphur, butyrum, fusa.

Que cutem purgant.

Cap. XVI.

Item cutem purgat mel, sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixturis simplicium rerum, et de ratione ponderum, et quid malagma, et emplastrum, et pastillus, inter se differant.

Cap. XVII.

Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uariè, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumera mixturarum genera sunt; quæ comprehendi si possent, tamen esset superuacuum. Nam & iisdem affectus intra paucas compositiones sunt; & mutare eas, cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uolumine eas explicabo, quæ uel desiderari in prioribus potuerunt; uel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam; sic, ut tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel etiam paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri uolo, in uincia pondus denariorum septem esse. Vnus deinde denarii pondus, diuidi a me in sex partes, id est, sex uncias; ut idem in uncia denarii habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. Id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastillique (quos πεκλιοχὼς Græci uocant) cum plurima eadem habeant, differunt eo, quod malagmata maximè ex floribus, eorumque etiam surculis; Emplastra, pastillique, magis ex quibusdam metallicis fiunt. deinde malagmata cōtusa abundè mollescunt; nam super integram cutem iniiciuntur. Laboriosè uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt, ne lædant uulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum autem & pastillum hoc interest, quod emplastrum, utique liquati aliquid accipit. in pastillo, tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit: Arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. Ea uero, quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut uino, uel aceto coquuntur, & rursus cōcta inarescunt. Atque ubi utendum est, eiusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, pastillis illinitur, aut alicui molliori, aut cerato misceretur.

De malagmatis.

Cap. XVII.

Malagma aduersum calidas podagras.

His cognitis, primum malagmata subiiciam; quæ fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa recepta. Est tamen quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immaturæ, & alterius, coriandri seminis, acutæ lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum; cerati eloti (quod πεκλιοχὼς Græci uocant) selibram. Reliqua fere calefaciunt: Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt (quæ ἰκταρῶνα uocantur) pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Si materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet refinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondos; ceræ pondos. Aut in quo hæc sunt, æruginis rasæ, thuris, singulorum [P. I.] ammoniaci salis [P. V.] aquam æris, ceræ, singulorum [P. VIII.] refinæ aridæ [P. VII.] acetum cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio, & melle [P. II.]

Malagma ad iecur dolens.

Si iecur dolet, id in quo est balsami lachrymæ [P. XII.] costi, cinnamomi, casia, corticis myrræ, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis Illyricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum [P. XVI.] quibus adiungitur nardinum unguentum, donec cæratum crassitudo sit. & huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, refinæ terebinthinæ [P. XVI.] ceræ [P. X.] ex uino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

At si lienis torquet, glandis (quam *βελανον* Græci uocant) cortex, & nitrum, paribus portionibus contunduntur, respargunturque aceto quam acerrimo. Vbi cæratum crassitudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto, illinitur, & sic imponitur; supraque farina hordacea iniicitur, sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat: satiusque est id bis, aut ter fieri. Communem autem, & iocineri, & lienis, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris, Lysias composuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, refinæ, singulorum [P. II.] ammoniaci, bdellii, ceræ, seui taurini, iridis aridæ [P. III.] cactios acetabulo, piperis granis quadraginta, quæ contrita, irino unguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

Ad laterum autem dolores, compositio est [Apollophanis] in qua sunt, refinæ terebinthinæ, furis, fuliginis, singulorum [P. III.] bdellii, ammoniaci, iridis, seui uitulini, aut caprini a renibus ficti singulorum [P. III.] Hæc aut eadem, omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt. Ad idem latus, Andree quoque malagma est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, prodest impositum minutis, maioribusque abscessibus, item articulis, ideoque & coxis, & pedibus dolentibus. ite si quid in corpore collisum est, reficit; præcordia quoque dura & inflata emolliunt, ossa extrahit, ad omnia denique ualet, quæ adiuuare calor potest. id habet ceræ [P. I.] uisci, sciamini (quam aliàs sycomorum uocant) lachrymæ, singulorum [P. XI.] piperis, & rotundi, & longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellii, iridis Illyricæ, cardamomi, amomi, xylobalsami, thuris masculi, myrræ, refinæ aridæ, singulorum [P. X.] pyretri, cocci, gnidii, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ cretica, radice ex euumere agresti, refinæ terebinthinæ liquidæ, singulorum [P. XX.] quibus adiungitur unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

Malagmata ad resoluenda quæ stricta sunt, & mollienda quæ dura sunt, & digerenda quæ coeunt.

Præcipuum uero est ad resoluenda quæ stricta sunt, mollienda quæ dura sunt, digerenda quæ coeunt, id quod ad Polyarchum auctorem refertur, habet iunci quadrati, cardamomi, thuris fuliginis, amomi, ceræ, refinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Aliud ad eadem, Nilei crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) [P. * III.] ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorum [P. * XX.] ex quibus duo priora, ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura molliuntur id, quod Moschi esse dicitur, habet galbani unciam, thuris fuliginis [P. Z.] ceræ, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis aridæ [P. * II.] acetum heminas tres.

Malagma Medici ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerenda quæ coeunt, sub auctore Medo, quod habet ceræ [P. Z.] panacis [P. semis], squamæ æris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum [P. Z.] plumbi combusti [P. I.] & semis.

Malagma Panthemii ad fidem.

Ad eadem Panthemus utebatur calcis P. semis, sinapis conariti, item ferri græci, aluminis, singulorum P. I. Scui bubuli P. II. & semis.

Malagma ad strumas.

Ad strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quo peius id malum est, minusque facile dicitur, eo plura esse tentata, quæ in personis uariè responderunt. Andreas auctor est, ut hæc misceantur: urticae feminis P. X. I. piperis rotundi, bdellii, galbani ammoniaci, thymiamatis, refinæ aridæ, singulorum P. X. III. refinæ liquidæ, ceræ, pyrethi, piperis longi, lactucæ marinæ feminis, sulphuris ignem non experti, quod æruginis uocatur, fecis aridæ, aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucumerni filuestri, refinæ, singulorum P. X. V. Quæ ex leni uino contunduntur.

Aliud malagma ad id ualeat.

Expeditiùs ad idem fit, quod habet uisci, femeni, stercons, refinæ, sulphuris ignem non experti, pares portiones. Et in quo est sulphuris P. X. I. lapidis, quem ueteres uocant, P. X. III. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris duæ partes, refinæ terebinthinæ partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

Arabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula (quæ quædam uocantur) quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, refinæ, & liquidæ, & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum P. X. I. lapidis eius, quem ueteres uocant, P. X. III. quibus quidam adijciunt sulphuris P. II. + al. P. II. X.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

Est etiam proficiens in struma, & in his tuberculis, quæ difficiliter concoquantur, & in his, quæ uocantur uocantur, quod ex his constat. sulphuris P. X. II. nitri P. X. III. myrræ P. X. VI. fuliginis thuris P. X. I. femis, salis ammoniaci P. Z. ceræ P. I. + al. X.

Malagma protarchi ad parotidas, & fauam, & mala ulcera.

Protarchus autem ad parotidas, & quæ tubercula, quæ per uicem id est fauicel quædam nominantur, item mala ulcera, pumicis, refinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum P. X. V. III. cum ceræ P. X. VII. miscebat, hisque olei cyathum, & dimidium adijciebat.

Malagma aduersus pannum, & phymata.

Ad aduersus pannum, tum primum orientem (quod quædam græci uocant) & omne tuberculum (quod quædam nominatur) miscetur ochra, quæ attice nominatur, cum duabus partibus simile, hisque contunditur, subinde mel infillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Disartit etiam omne tuberculum (quod quædam uocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum P. X. I. galbani P. X. II. salis P. X. III. quæ excipiuntur ceratò ex rosa factò.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

Supprimat quæ omne quod abscedit, id in quo est galbani, fabæ fræse, singulorum P. X. I. myrræ, thuris, ex radice capparis corticis, singulorum P. X. III. Satisque omnia abscedentia digerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem supprimendum, & phymata.

At si satis sanguis subit, rectè imponitur, quod aduersus quædam quoque potest: Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, refinæ, & aridæ, & liquidæ pineæ: Item ex lentisci, thuris, iridis, singulorum P. X. II.

d iiii

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

negus dicitur uero, & quarta commodè his leniuntur galbani, nisci, ammoniaci, refinæ terebinthinæ in singulis P. ✕ I. seu taurini P. semis, fœcis cōbustæ quàm maxima portione, dum id ficius non faciat, quàm esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei, contusa.

Quod si facie contusa, liuor subcreuitus est, hæc compositio nocte, & die imposita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum P. ✕ I. bdellij, styrcis, ammoniaci, phymiamatis galbani, refinæ aridæ, & extensisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, ceræ singulorum P. ✕ III. Idè faba quoque imposita proficit.

Malagmata: stomachica ad aperiendum.

Sunt etiam quædam malagmata, quæ aperiunt, Græci uocant, quoniam aperiendi uim habent. Quale est quod ex his cōstat. piperis longi, spumæ nitri, singulorum P. ✕ II. crisimi P. ✕ III. Quæ cū melle miscentur. Idonea quoque etiam situmæ aperiendæ sunt eius generis. V. chementiusque ex his est id, quod habet calcis P. ✕ III. piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum P. ✕ X. mellis P. Z. olei heminam.

Niconis malagma, ad resoluendum, aperiendumque, ac purgandum.

Niconis quoque est quod resoluunt, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, paribus portionibus; quibus tantum picis, & ceræ adijcitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & neruos.

Ad ossa autem, Aristogenis fit ex his. Sulphuris P. ✕ I. refinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scylla partis interioris, plumbi eloti, singulorum P. ✕ II. thuris fuliginis P. ✕ VIII. ficus aridæ quàm pinguisimæ, seu taurini, singulorum P. ✕ VII. ceræ P. ✕ XI. iridis macedonicæ P. ✕ VI. sesami fricti acetabulum. maximeque neruis, & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthylei, ad articulos, & ad omnem dolorem.

Igitur Euthylei est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad uescicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos (quas apostas, Græci nominant) quod habet fuliginis thuris acetabulum, refinæ tantundem galbani, sine sulculis sescunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum P. ✕ III. ceræ P. semis. Aliud itè fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum P. ✕ XIII. refinæ liquidæ P. ✕ VI. ceræ P. ✕ XVI.

Malagma Sasogore, ad dolores articulorum.

Ad dolores articulorum, Sasogore plumbi combusti, papaueris lachrymæ, corticis hyoscyami, styrcis, peucedani, seu refinæ, ceræ pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

Chrysippi, refinæ liquidæ, sandaracæ, piperis, singulorum P. ✕ XII. quibus ceræ paulum adijcitur.

Clelypontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.

Clelypontis, ceræ creticæ, refinæ terebinthinæ, nitri quàm ruberrimi, singulorum P. semis, olei cyathi tres, sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teritur, & cū sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitū humoris emolliendum.

Malagma ad articulos.

Ad articulos, fici quoque aridi partem nepetæ mixtam, uel uuam taminiam sine seminibus, cum pu

Malagma Aristonis, aduersus podagras, & recentia phymata, & omnis dolores.

Eadem podagræ præidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chameleontis,

fix. chamæleontis, iunci rotundi, singulorum | P. * VIII. seu caprini ex irino liquati | P. * XX. iridis | P. * I. quæ in aceto quàm acerrimo iacere per Xiginti dies debet. Idem autem etiam recentia phymata, doloresque omnes discutit.

Theonî malagma ad pedum dolores.

At Theonius ad pedum dolores, seu a renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum super iniiciebat ammoniacum thymiana in aceto liquatum.

Numenij malagma ad podagram, ceterosque articulos induratos.

At Numenius, podagram, ceterosque articulos induratos, hoc molliciebat. abrotani, rosæ aridæ, papaveris lachrymæ, singulorum | P. * III. resinæ terebinthinæ | P. * III. thuris, spumæ nitri, singulorum | P. * VIII. iridis, aristolochiæ, singulorum | P. * XII. ceræ | P. * III. quibus adijcitur cedri cyathus unus, olei lauri cyathi tres, olei acerbi sextarius.

Dexij malagma, si quando callus in articulis increuit.

Si quando autem in articulis callus increuit, Dexius docuit imponere calcis | P. * III. cerussæ | P. * VIII. resinæ pineæ | P. * XX. pipetis grana | XXX. ceræ | P. Z. Quibus, dum contunduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris.

Ex emplastris autem nulla maiorem usum præstant, quam quæ cruentis protinus uulneribus iniiciuntur; evmæa græci uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem (nisi magna nis eam cogit) atque illius quoque impetum minuunt; tum glutinant uulnera, quæ id patiuntur, cicatricem huiusmodi inducunt. Constat autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque *αλπηρα* nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uulneribus iniicitur.

Optimum ex his est, quod barbarum uocatur. Habet æruginis rasæ | P. * XII. spumæ argenti | P. * XX. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum | P. * I. quibus adijciuntur olei, & aceti singulæ heminæ.

Choacæ emplastrum nigrum ad idem ualens.

Alterum ad idem, quod *χοακον* uocant, habet spumæ argenti | P. * C. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris, color niger est; qui fere talis fit, ex picæ, atque resinæ. At ex bitumine, nigerimus; ex ærugine, aut eris squama uiridis. ex minio rubet; ex cerussæ, albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Paucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ uarietas nonat. Ergo id quoque nigrum est, quod *βασιλικον* nominatur. Habet panacis | P. * I. galbani | P. * II. picis, & resinæ singulorum | P. * X. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum, ad idem.

At quod peruiride est, smaragdinum appellatur. in quo sunt resinæ pineæ | P. * III. ceræ | P. * I. æruginis | P. Semis, turis fuliginis | P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in unum cogantur.

Emplastrum rufum, ad idem.

Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad cicatricem uulnera perducere uidetur. Habet thuris | P. * I. resinæ | P. * II. squamæ eris | P. * III. spumæ argenti | P. * XX. ceræ | P. * C. olei heminam.

Paracollericum emplastrum, ad idem.

Præterea est, quam *παράκολλητον* glutinando, uocant. Constat ex his bituminis, aluminis scissilis | P. * III. spumæ argenti | P. * XL. & olei ueteris hemina.

Philotæ. Præterea sunt quædam generis eiusdem, quæ, quia capitibus fractis maxime conueniunt, necnon a Græcis nominantur. Philotæ compositio habet, terre erythræ, chalcitidis, singulorum $P. \times III.$ myrrhe, æris combusti $P. \times X.$ ithyocollæ, singulorum $P. \times VI.$ æugenis rasæ, aluminis rotundi, myli crudi, aristolochiæ, singulorum $P. \times VIII.$ squamæ æris $P. \times X.$ thuris masculi $P. \times II.$ cere $P. I.$ rosæ, & olei acerbi, ternos sythos, aceri quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur, hoc habet $P. \times IX.$

Emplastrum viride, ad idem valens.

Aliud ad idem viride peris combusti squame peris myrrha ichthyocolla singulorum P. * VI. myfi
cendi eruginis rase aristolochia liminis rotundi singulorum P. * VII. cere P. * Loler hēmaā, ace-
ti quod satis sit. IIII * g. gummi arabici IIII * g. oleum amygdali duri
gumi arabici fides trinitatis IIII * M. tercia XII * M. singulorum quatuordecim sibi IIII * g.
τετραδεδυκτον emplastrum ad pus mouendum zoi id est iso, zoi iijssyo iijssyo iso

Puri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. τῆς τετραφάρμακον α Græcis nominatur. habet pares portiones cere, picis, refinæ, seu taurini, si id non est, vitulini.

Ενεργητικὸν ἐμπλάστῳ ἀποὺ μοιενδὺμ, εἰ ἀπορῖανδὺμ ἡλεμ. 11V γ

Alterum ad idem, ^{ενεσφάριστον} nominatur, quod magis purgat. constat ex nouem rebus; cera, melle, seuo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina, uel uitulina, uel bubula, ^{υψο} hyppo, butyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quedam emplastra, quibus utriusque rei facultas est: quę si singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia reiicienda sunt his potius adhibitis, quę proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera

Est igitur ad vulnere artalum, quod habet squame eris. P. * VI. fuliginis. P. * XV. ammoniaci tantundem, resinę terebinthine liquide. P. * XXV. seu taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium. *Incipit liber IX de morbis oculi*

Iudæi emplastrum, fracto capiti accomodatum.

At inter ea, quę fractio capiti accomodantur, habet quidam id, quod ad auctorem Iudeum refertur. Constat ex his, folijs /P. * III. squamę erisrubri, eris combusti, fingulorum /P. * XII. ammoniacij, thymiamaris, thuris, fuliginis, refinę aride, fingulorum /P. * VI. refinę colophoniacę, cęre, seu vitulini curati, fingulorum /P. * XX. aceti, sesquicyathum; olei minis cyathum. ~~reservaturque~~ Gręci appellant, quę curata uocant, cum ex feuo puta, omnes membranę diligenter exemptę sunt, aut ex alio medicamento.

Diaphoridinon emplastrum, ad extrahendum.

Sunt etiam quedam emplastra nobilia ad extrahendum. Que ipsa quoque ^{impressu} nominatur. Quale est, quod quia lauri baccas habet ^{fructus lauri} appellatur. in eo est, refine terebinthine P. ~~✕~~ X. nitri, cere, picis aride, baccarum lauri, singulorum P. ~~✕~~ XX. olei paulum. Quotiens aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.

Aliud διαδραφνιδων, ad extrahendum, & pus mouendum.

Aliud eo nomine, quod puri quoque mouendo est; seu uitulini ammoniaci thymiamatis, picis, cere,
nitri, baccharum lauri, refinę aride, aristolochię, pyrethi pares portiones.

Philocratis emplastrum, ad extrahendum, & pus mouendum.

Preter has, est philocratis, quod habet salis ammoniaci P. * VII. aristolochie P. * VIII. cere,
refine terebinthine, fuliginis thuris, singulorum P. * XV. spume argenti P. * XXXII. Quibus, ut
pus quoque moueant, iridis P. * IIII. & galbani P. * VI. adiunguntur.

ἐπιπιδέειν emplastrum, ad extrahendum.

Optimum tamen ad extrahendum est id, quod a similitudine sordium, ^{ἐκωδύες} Græci appellant.

Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis, & rotundi, myfi, chalcitis, atramenti futorij cocti, panacis, salis ammoniaci, uisci, singulorum P. * IIII. aristolochiz P. * VIII. squamæ æris P. * XVI. refinæ terebinthinæ P. * LXXV. ceræ, & sepi uel taurini, uel hircini P. * C.

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

Hecateo quoque auctore, emplastrum generis eiusdem fit ex his: galbani P. * II. fuliginis thuris P. * IIII. picis P. * XVI. ceræ, & refinæ terebinthinæ, singulorum P. * VIII. quibus pauum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

Valensque ad idem emplastrum uiride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis P. * VIII. salis ammoniaci P. * VIII. Z. squamæ æris P. * XVI. myrrhæ, thuris, singulorum P. * XVIII. ceræ P. * CL. refinæ colophaniacæ, aut pineæ P. * CC. olei heminam, acetii sextarium.

De emplastris exedentibus.

Quædam autem sunt emplastra exedentia, quæ ^{seneca} Græci uocant; quale est id quod habet refinæ terebinthinæ, fuliginis, thuris, singulorum P. Z. squamæ æris P. * I. ladani P. * II. aluminis tantundem, spumæ argenti P. * IIII.

Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supercrescentem carnem coercet.

Exest etiam uehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, & supercrescentem carnem coercet id quod habet spumæ argenti, squamæ æris uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis alij, aristolochiæ P. sextantes, ceræ, refinæ terebinthinæ, thuris, olei ueteris, atramenti futorij, salis ammoniaci P. semis, eruginis, rasæ P. bessæ, acetii scyllitici heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora uulnera.

Sunt etiā aduersus morsus quedā accommodata; quale est Diogeni s. nigrum; quod habet bituminis, ceræ, refinæ pineæ aridæ, singulorum P. * XX. spumæ argenti P. * C. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris P. * XIII. cerussæ, & æruginis pallæ, singulorum P. * VIII. ammoniaci P. * XII. ceræ, refinæ pineæ, singulorum P. * XXV. spumæ argenti P. * XC. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ æris P. * XIII. galbani P. * VI. cerussæ, & eruginis rasæ, singulorum P. * XLV. spumæ argenti concoquitur.

Emplastrum rubrum, ad idem ualens.

Rubrum quoque emplastrum, quod ^{empor} uocatur, huc aptum est. Habet refinæ terebinthinæ P. * II. galbani P. * IIII. m. niij sinopici P. * V. thuris fuliginis P. * XI. ceræ P. * VIII. spumæ argenti P. * LVI. olei ueteris heminam.

Aliud emplastrum, ad idem ualens.

Item id quod ex his constat: squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum P. * IIII. galbani P. * VI. salis ammoniaci P. * XII. Z. ceræ P. * XXV. olei tribus heminis. Hæc autem alijs quoque recentioribus uulneribus recte imponuntur.

Emplastra non grauibz uulneribus accommodata, & maxime senilibz.

Sunt enim alba lenia ^{senilis} Græci uocant; fere non grauibz uulneribus accommodata, præcipueque senilibz: Quale est, quod habet cerussæ P. * XXXII. feni uitulini curati, & ceræ, singulorum P. * LVIII. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Aliud, quod habent cerussæ P. * XX. ceræ P. * XXXV. olei heminam, aquæ sextarium. Quæ quotiens adiunguntur cerussæ, uel spumæ argenti, scire licet, illa ex his coquenda esse. Est autem ea percanthida compositio, quæ supra posita est; ideoque elephantina nominatur.

Lēnia emplāstra.

Lēnia quoque quēdam emplāstra sunt, quas *λεπὰς* fere Greci nominant; ut id, quod habet minij P. * III. spumę argenti P. * XXV. cere & adipis suille, singulorum P. * XXVII. vitellos quatuor.

Emplastrum lene.

Alia compositio generis eiusdem; cere, refinę terebinthine, singulorum P. * VI. cerussę P. * VIII. spumę argenti, plumbi recrementi *(σκαρδα μολύβου)* Greci uocant singulorum P. * XX. cici olei & myrti, singulorum hemine.

Archagathi emplastrum lene.

Tertia, quę ad auctorem Archagathum refertur; mysi cocti, eris combusti, singulorum P. * III. cerussę coctę P. * VIII. refinę terebinthine P. * X. spumę argenti P. * VI.

Emplāstra eiusdem generis, ad leniendum apta.

|| a. Etiamnum generis eiusdem: spumę

Etiam num spumę argenti, cere, adipis suille, singulorum P. * XXVII. vitelli cocti quatuor, rose hemina. Aut cerati ex oleo myrteo facti partes tres, adipis suille pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut spumę argenti selibra, ex olei hemina, & aquę marinę altera, cocta, donec bullire defierit; cui paulum cere sit adiectum, aut pares portiones cere, seu, sibi, spumę argenti, cerussę.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia uulnera glutinanda, sanandaq; apti sunt.

Pastilli quoque facultates diuerfas habent: Sunt enim ad recentia uulnera glutinanda, sanandaq; apti. Qualis est, qui habet chalcitis, mysi, spumę nitri, floris eris, galle, aluminis scissilis modice cocti, singulorum P. * I. eris combusti, capitulum mali punici, singulorum P. * III. Hunc oportet diluere acetosic, ubi uulnus glutinandum est; illinere. At si neruosus aut musculosus is locus est, commodius est, cera to miscere; sic, ut illius octo partes, nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda uulnera.

Alius ad idem, constat ex his; bituminis, aluminis scissilis, singulorum P. * I. eris combusti P. * III. spumę argenti P. * XI. olei sextarium.

De sphragide, pastillo, quem Polybus confecit, ad glutinandum uulnus.

Sed longe polybi celeberrimus est *(σφραγίς autem nominatur)* qui habet aluminis scissilis P. * I. Z. atramenti futorij P. * II. myrrhe P. * V. aloes tantunden, capitulum punici mali, fellis taurini, singulorum P. * VI. Quę contrita, uino austero, excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obsecnis partibus; inflammationesq; eorum.

Ad ulcera sordida & nigritiem in auribus, naribus, ubi secenis partibus, inflammationesq; eorum; chrysocolle P. * I. atramenti futorij, aluminis scissilis, singulorum P. * II. halicacabi corticis P. * III. minij P. * VI. spumę argenti P. * XII. cerussę P. * XVI. Quę ex aceto & coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

Pastillus Andronis, ad uiam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.

Andronis uero est ad uiam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia; galle, atramenti futorij, myrrhe, singulorum P. * II. aristolochię, aluminis scissilis, singulorum P. * II. capitulum punici mali P. * XXV. ex passo coacta, & cum usus exigit, aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

Proprie autem ad ani fissa, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum, eruginis P. * II. myrrhe.

myrrhæ. P. * XII. stibis, lachrymæ papaveris, acaciæ, singulorum. P. * XVI. Quæ ex uino, & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc compositio: Caliz, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici, pares portiones conteruntur: deinde uinum lene instillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant. P. * Z. hinc singuli quotidie mane ieiuno dantur.

Cap. XXI.

De pessa.

Caput XXI.

Hæc tria compositionum genera, id est, quæ in malagmaris, pastillis, emplastrisque sunt, maximè præcipueque uarium usum præstant. Sed alia quoque utilia sunt: ut ea quæ foeminis subijciuntur (quæ Græci uocant) Eorum hæc proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum canis duabus adijcitur nitri. P. * II. Aut alij semen conteritur, adijcitur myrrhæ paululum, & unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris pars interior ex la-
te muliebri diluitur.

Ad uulvam molliendam.

Ad uulvam molliendam, oui uitellus, & foenum græcum, & rosa, & crocum temperantur. Aut elate-
rij. P. * Z. salis tantundem, uuz taminæ. P. * VI. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio, ad idem ualens.

Aut Boëtho auctore, croci, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. * III. myrrhæ. P. * X. Z. rosæ. P. * I. seui uitulini. P. * Z. ceræ. P. * II. miscentur.

Ad inflammationes uulvæ, Numenij Pessus.

Optima autem aduersus inflammationes uulvæ, Numenij compositio est: quæ habet croci. P. * Z. ceræ. P. * I. butyri. P. * VIII. adipis anferinæ. P. * XII. uitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

Ad exciendum è uulua infantem mortuum.

Si uero infans intus decessit: quod facilius eijciatur, malicorij ex aqua terendum: eoque utendum est.

Si mulier uitio locorum concidit, qua curatione utendum sit.

Si concidere uitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, conterendæque: deinde his mel adijciendum est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosâ mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem supercrescentem exedendam.

Caput XXII.

Quædam autem mixturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neque coactis utimur, sic, ut inspergamus: aut cum aliquo liquido mixta illinamus, quale est ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamæ, fuliginis thuris, singulorum. P. * I. æruginis. P. * II. Hæc autem eadem cum melle purgant ulcera: cum cera implent. Myli quoque, & galla, si paribus portionibus miscantur, corpus confur-
munt: eaque uel arida inspergere licet: uel excepta, cadmia illinere.

Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, parq; leniter exedendam, plures compositiones.

Putrem uero carnem continet, neque ultra serpere patitur, & leniter exest, mel, uel cum lenticula, uel cum marzubio, uel cum oleo folijs antè ex uino decoctis. Item sertula campana in mulso cocta, dein de contrita; aut calx cum cerato; aut amarae nuges citallio, sic, ut huius pars tertia sit, paulumque his croci adijciatur, aut quod habet spumæ argenti. P. * VI. cornu bubuli combusti. P. * XII. aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. * III. gallæ. P. * VIII. aristolochiæ. P. * X. Uehementius idem facit etiam adurendo auripigmentum cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta cõbusta. Itè sal cum aceto. Vel ea compositio, quæ habet chalcitidis, capirulorum punici mali, aloës, singulorum. P. * II. aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. * III. gallæ. P. * VIII. aristolochiæ. P. * X. mellis quantum satis sit ad ea cogen-
da. Vel cantharides. P. * I. sulphuris. P. * I. lolij. P. * III. Quibus adijciatur picis liquidæ quantum satis est, adiungendum uel chalcitis quoque cum resina, & ruta mixta, aut cum eadem resina, diphyres; aut uia amonia cum pice liquida. Idem uero possunt feces uini combustæ, & calceis, & nitri pares portio-
nes, uel aluminis scissilis. P. * ZZ. thuris sandaracæ, nitri, singulorum. P. * I. gallæ. P. * VIII. aristo-
lochiæ. P. * X. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

Est etiam hieræ compositio, quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. P. * II. aloës, thuris, alumi-
nis scissilis, singulorum. P. * III. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. P. * VIII. malicorij
contriti. P. * X.

Indei compositio.

Est ludæi, in qua sunt calcis partes duæ, nitri quam ruberrimi pars tertia, quæ urinâ impuberis pueri
coguntur, donec strigmenti crassitudo sit, Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

At iolas, chartę combustę, sandaracę, singulorum *P. X I. calcis* *P. X II. auripigmenti tantundem*
miscbat.

Ad sanguinis profusum, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis, & ad cancrum, & ad inducendam
cicatricem, & ad coercendam carnem crescentem.

Si uero ex membrana que super cerebrum est, profuit sanguis, uicellus combustus & contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profusum est, auripigmenti, squame eris, singulorum *P. X I. sandaracę*
P. II. marmoris costę *P. X III. inspergi debet.* Eadem cancro quoque obsunt. Ad inducendam cicatricem, squame eris, thuris fuliginis, singulorum *P. X II. calcis* *P. p. IIII.* Eadem incrementem quoque carnem coercent.

Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancrum.

Timeus Timeus autem ad ignem sacrum, uel ad cancrum, his utebatur: Myrrę *P. X II. thuris, atramenti*
futorij, singulorum *P. X III. sandaracę, auripigmenti, squame æris, singulorum* *P. X IIII. gallę* *P. X VI. cærußę combustę* *P. X VIII.* Eadem uel arida inspersa, uel melle excepta, idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda:

Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto in nares, excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, singulorum *P. X Z. castoreę* *P. X spumę nitri* *P. X I. struthij* *P. X III.*

Gargarizationes quibus fieri debent.

Gargarizatio Gargarizationes autem, aut leuandi causa fiunt, aut reprimendi, aut euocandi. Leuant lac, cremor uel pitisanę, uel fursurum. Reprimit aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel cotoneum malum, uel palmula decoctę sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, & quibus malis opitulentur.

Caput X XII.

Antidot. usus. Antidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt, quia grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur collis corporibus, uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel uiscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena, uel per morsus, uel per cibos, aut poriones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

Admonitio. Vnum est, quod habet lacryme papaueris *P. X Z. acori, malobathrij* *P. X V. iridis illyricę, gũmi*
mi, singulorum *P. X II. anęi* *P. X III. nardi gallici, foliorum rosę aridorum, cardamomi, singulorum*
P. p. IIII. petroselinij *P. p. IIII. Z. folij* *P. p. V. casię nigre, filis, bdellij, balsami, seminis piperis albi,*
singulorum *P. X Z. styracis* *P. V Z. myrrhę, oppoponacis, nardi lyri, thuris masculi, hypocistidis succi, sin-*
gulorum *P. X VI. castoreę* *P. X VI. costi, piperis albi, galbani, resinę terebinthinę, croci floris, iunci ro-*
tundi, singulorum *P. VI Z. dulcis radice* *P. p. VIII. Z. Quę uel melle, uel passo excipiuntur.*

Aliud antidotum, Ambrosia nominatum, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.

Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat: Costi, thuris masculi, singulorum *P. p. V. piperis albi* *P. p. Z. floris iunci rotundi* *P. II. cynamomi* *P. p. III. casię nigre* *P. p. IIII. croci* *P. p. IIII. Z. myrrhę, quam staten nominat,*
P. p. V. nardi indicij *P. p. V. Z. quę singula contrita, melle cocto excipiuntur.* Deinde, ubi utendum est, id quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in portione uini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Mithridatis quodidie fumendo Nobilissimum autem est Mithridatis, quod quotidie fumendo, Rex ille dicitur aduersus uenenorum
antidoti, dicitur aduersus pericula tutum corpus suum reddidisse. in quo hæc sunt: Costi *P. p. S. Z. acori* *P. p. V. hyperici, cumi-*
nenorum pericula, fuit ni, sagapeni, agacię succi, iridis illyricę, cardamomi, singulorum *P. p. II. anęi* *P. p. III. nardi gallici,*
corpus suum reddidisse lorum *P. p. IIII. Z. casię, filis, lolij, piperis longi, singulorum* *P. p. V. I. styracis* *P. V. Z. castoreę, thu-*
g. goshana radice, ris, hypocistidis succi, myrrhę, opoponacis, singulorum *P. V I. Z. malobathrij folij* *X VI. floris iunci ro-*
radix pontica, tundi, resinę terebinthinę, galbani, dauici cælici seminis, singulorum *P. p. V I. Z. nardi, opobalsami, sin-*
pro, rha pontica. gulorum *P. p. V I. Z. thalpis* *P. X V. Z. radice ponticę* *P. VII. croci, zinziberis, cynamomi, sin-*
gulorum *P. X VIII. r. Hęc contrita, melle excipiuntur: & aduersus uenenum, quod magnitudinē nu-*
ptiæ fabæ, uel quod Erui magnitudinem impleat, satis est. cis græcę impleat, ex uino datur. In cæteris autem affectibus corporis, pro modo eorum, uel quod ægy-

De acopis.

Caput X XIII.

Acop. usus. Acopa quoque utilia nervis sunt: quale est, quod habet floris iunci rotundi *P. II. Z. costi, iunci*
aliq. adu. Acopum nervis utile. quadrati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum *P. p. IIII. Z. myrrhę, æris combusti, singu-*
al. 33. lorum *P. p. VII. iridis illyricę, cerę, singulorum* *P. p. XIII. alexandrinij calami, iunci rotundi, aspalathi,*
xylobalsami, singulorum *P. X VIII. leui* *P. p. pinguenti irini cyathum.*

Acopum ad nervis utile.

Alterum, quod aduersus uocant, hoc modo fit: cerę *P. Z. olei tantundem, resinę terebinthinę ad nu-*

*al. P. 3. **

cis

cis iuglandis magnitudinem simul incoquuntur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quàm optimi mellis acetabulum: tum irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

Ex his ad ulcera purganda, & implenda.

Ex his autem græci uocant, liquida, quæ illiniuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maximè inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullæ uirulinæ, seu uirulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: Magis uerò emollit, si pro rosa cypirus infunditur.

Ad sacrum ignem.

Ad sacrum ignem, spumæ argenti, P. * VI. corni bubuli combusti, P. * II. conteruntur, adiiciturque inuicem uinum, & id quod specialiter fil uocatur, & mirteum: donec utriusque terni cyathi conijciantur.

De catapotis.

Capit. XXV.

Catapodium ad somnum accersendum, & leuationem doloris, & simul ad concoquendum.

Catapodia quoque multa sunt, uarijsque de causis fiunt. *Quod uinum uocant, quæ somno dolorem leuant.* Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est: Sunt enim ex uehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum, P. * I. myrrhæ, castorei, piperis, singulorum, P. * II. Ex quibus, quod erui magnitudinem habet, satis est deuorasse.

Catapodium ualentius ad somnum.

Alterum stomacho peius, ad somnū ualentius, ex his fit; mandragoræ, P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulorum, P. * III. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abundè est sumpsisse.

Catapodium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Siue autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta, siue inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem, eiusmodi catapodium: Silis, acori, rutæ siluestris seminis, singulorum, P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum, P. * II. papaueris lacrymæ, panacis, radices mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum, P. p. II. piperis granati. VI. Hæc per se cōtrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapodium aliud, ad multa ualens.

Quin etiam siluestris papaueris, cum iam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in uas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat: atque ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus, projicitur, & cum eo humore passi pari mēsurā miscetur, inferuetque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infixit, catapodia ex eo fiunt ad nostræ fabæ magnitudinem, habetque usum multiplicem. Nam & somnum faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succi, ac passi: Et tormina supprimunt ex uino liquata; & inflammationem uulue coercent, mixta cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoque accessit; & ex aqua frōti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapodium ad inducendum somnum, quod uulua dolens prohibuit.

Item si uulua dolens somnum prohibuit, croci, P. * II. anesi, myrrhæ, singulorum, P. p. I. papaueris lacrymæ, P. p. * III. cicinæ seminis, P. * VIII. miscentur, excipiunturque uino uetere, & quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

Ad sanandum iecur, nitri, P. * Z. croci, mirrhæ, nardi gallici, singulorum, P. * I. melle excipiuntur, daturque quod ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

Ad thoracis dolores finiendos, P. * I. thuris, casie, singulorum, P. * III. myrrhæ, cinnamomi, singulorum, P. * VI. croci, P. * VIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemine tres.

Catapodium Athenionis ad tussim.

Ad tussim, Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum, P. p. * I. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum, P. * I. Quæ separatim contusa, postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapodia manebina noctu dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis Tarentini ad tussim, & somnum.

Si somnum prohibet, ad utranque Heraclidis Tarentini, croci, P. * I. cinnamomi, castorei, papaueris lacrymæ, singulorum, P. * I. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum, P. Z.

Catapodium ad purganda ulcera in faucibus ruffientibus.

Quod si purganda sunt ulcera in faucibus ruffientibus, panacis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulo-

LIBER QUINTVS

rum **P. X.** galbani **P. Z.** hyssopi **P. Z.** conterenda sunt, hisque hemina mellis adijcienda; & quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice Calsij medici.

Collice uero Calsij, ex his constat; croci, anisi, castorei, singulorum **P. X.** III. perroselini **P. X.** III. piperis & longi, & rotundi, singulorum **P. X.** V. papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum **P. X.** VI. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum, aut secundas expellendis.

Infantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci **P. X.** I. aut cidi-
dami ceterici **P. X.** I. adiectum est.

Ad adiuuandam uocem.

Ex partu laborantibus, erisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Vocem adiuuat, thuris **P. X.** I. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinae.

Aduersus urinae difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, co-
sti uncia singulæ, styracis, resinæ terebinthinæ **P. sextantes**, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitu-
dinem fabæ ægyptiæ, & manæ, & cœnato dari debet.

Arteriace composio quomodo fiat.

Arteriace uero hoc modo fit: casia, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum **P. X.** I.
croci **P. X.** I. piperis grana **XXX.** ex passu tribus sextarij decoquuntur donec mellis crassitudo his fiat.
Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum **P. X.** I. coniunguntur in passu eundem modum decoquantur. Aut
eiusdem passu hemina tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adijcitur trita
casia **P. X.** I.

De quinque generibus noxarum corporis, & primo de uulneribus, quæ maxime
per tela inferuntur. Caput XXXVI.

Cum facultates medicamentorum proposuerim, genera, in quibus noxa corpori est, proponam.
Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in uulneribus. Cum quid intra se ipsum corruptum est,
ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in uesica calculus. Cum quid increuit, ut uena quæ intumescens,
in uaricem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus
medicamenta: alia, in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipue scalpellum, & manu
postulant: nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi
partem, sicut priorem; Et ante dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt: Tum de his, quæ
certas partes infestant. Incipiam à uulneribus. In his autem, ante omnia scire medicus debet, quæ insa-
nabilia sunt, quæ difficilem curationem habeant: quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, pri-
mo cum, qui seruari non potest, non attingere; nec subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius pere-
mit. Deinde, ubi grauis metus sine certa tamen desperatione est; indicare necessarijs periclitantis in diffi-
cili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse, uel fessisse uideatur. Sed ut hæc prudenti uiro con-
ueniunt, sic rursus histronis est, paruam rem attollere, quò plus præstitisse uideatur. Obligari quæquæ
est confessione promptæ rei: quò curiosius etiam circumspectat, ne, quod per se exiguum est malum, ma-
ius curantis negligentia fiat.

Quæ uulnera insanabilia sint.

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocineris portæ, cui in spina medulla
perculsa est, cuique aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuis intestinum, aut uentriculus, aut renes uul-
nerati sunt: cuiue circa fauces, grandes uenæ, uel arteriæ præcisæ sunt.

Quæ uulnera difficilem curationem habeant.

Vix autem ad sanitatem perueniunt, quibus ulla parte pulmo, aut iocineris crassum, aut membra
na, quæ continet cerebrum, aut lienis, aut uulua, aut uesica, aut ullum intestinum, aut septum transuerfum,
uulneratū est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque conditas uenas in alis,
uel poplitibus mucro descendit. Periculosa etiam uulnera sunt, ubicunque uenæ maiores sunt, quoniam
exhaustire hominem profusione sanguinis possunt. Idque euenit, non in alis tantum, atque poplitibus,
sed etiam in his uenis, quæ ad anum, testiculosque perueniunt. Præter hæc malum uulnus est, quodcum-
que in alis, uel forminibus, uel inanibus locis, uel in articulis, uel inter digitos est. Item quodcumque muscu-
lum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ uulnera tutiorem curationem habeant.

Tutissimum omnium quod in carne est, & hæc quidem loco, uel peiora, uel meliora sunt: modo ue-
ro periculum facit, quodcumque magnum est.

Observationes quedam et ætatis, et corporis, et uitæ, et temporis in uulneribus.

Aliquid etiam in uulneris genere, figuraque est. Nam peius est, quod etiam collisum, quam quod
tantum diffusum est. adeo ut acuto quoque, quam retuulo telo uulnerari commodius sit. Peius etiam
uulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo uel caro alia parte, abscessa, alia dependet. Pessima quæque
plaga in orbem est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quò deinde propius huic, illiue figura uulnus
est, eo

O b oia. ouzandru.
 d'aus e' u'ntun, g'etian c'etis
 guen g'etian a' ci'um g'et
 f'auto, guen ret'io f'orto u'ntun
 comedius.
 d'aus u'ntun d', ex quo aliquid
 fun d', ex quo se xro aia p
 ab'f'ia, aia d'ep'et.
 d'etia u'ntu' p'aga in o'f'um d'.
 t'ima, x'ie in'ce m'ade r'et'ia c
 d' al. cop'at.

Facius sanesit vno vel idolo

quam fensu: valens, qua infirmitate
neq. minus tenet, neq. minus plene
quam si alterum ex his d. ioh.

Habitus, quam corrupti generis

quam iners. sobrius & temperans
mo ventris deditus.
Oportunitatem t^{em}p^{or}is verum et

mit dieser, nach, fort, nach, für

liquide usque ad minimus calor, &
frigus integrant: maxime in notis
deco. permicio i. autumnus e.

De la Cruz

Nota S. pignatilis.

Journal of Management Education 30(6)

De Lingu. & Amic. 24

Sanguis omnibus notus.
 Sanguis est transiens, variis coloribus, qui
 coloratur.

purs crassif. a. b. d. l. elutinosus f. g. s.

aquas exit ex uentre recentis, aut
sanesciente.
Sanctus est istud utrumque tempus.
Sunt ex uiscere iam ad sanctitatem spectantia
sanies, uel cōtra, uel salutaris
id ēo tenet. Subalbidus enim

egyt, magamra, vbi nervus 6^{us} in

matio secuta ē.
 p^{er} h^{oc} p^{er} orationem & glutinosi
 utalida. m^{ult}o et alia s^{unt} m^{ult}o

bus électrique, train, tramway

quasi vincti colore et pinguitudine
oleo albo non dissimile, apparet
gms ulceris. faneiscentib.

Malus c. exquis. minima aut fer.

crassus, albus vel candidus, vel mi-
aut pituita mixtus, vel varius.
Opt. candidus, rubens, modice crassus.

glubiosus.

quo sanguis bonus ducit.

... восток и юго-восток.

sanies mala ē, multa; nimis tex-
 luida; aut pallida; aut nigra; aut
 noia; aut mali: spic aut.

Vicis, Quia ei autem credit

maior, non multa; molice' crassa,
rubicunda, aut subalbida.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanefcente. sanies est inter utrumque tempus, pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies, & pus, quaedam species Græcis nominibus distinctas habent: Est enim quedam sanies, quæ uel *ixor*, uel *melikhros* nominatur. Est pus, quod *elaidos* appellatur. *ixor* tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit, maxime quæ ubi nervo leso inflammatio secuta est. *melikhros* crassior, & glutinosior, subalbida, melli quæ albo sublimis fertur. Hæc quoque ex malis ulceribus ubi nervi circa articulos lesi sunt, & inter hæc loca, maxime ex genibus. *elaidos* tenuis subalbidum, quasi unctum colore, atque pinguitudine, oleo albo non dissimile, apparet in magnis ulceribus sanefcentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut uariis. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus eius uulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Item quæ postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæque proueniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus, & iuncta ei cutem erodit. Melior non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. *ixor* autem peior est, multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, caesus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria prioribus habet. *melikhros* autem mala est multa, & percrassa: melior, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est: Sed id quoque peius est multum, tenue, dilutum, magis quæ si ab initio tale est. Item quæ si color tero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quod minus est, quod crassius, quod albidius: Item quæ si leue est, si nihil olet, si equale est, modo tamen conuenire & magnitudini uulneris, & tempori debet: Nam plus ex maiore, plus nodum solutis inflammationibus naturaliter fertur: *elaidos* quoque peius est, multum, & parum pingue; quod minus etiam, quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio aduersus profusionem sanguinis in uulneribus

Quibus exploratis ubi aliquis ictus est, qui feruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne uel inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex sede uulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, sicis linamentis, uulnus implendum est: super praque imponenda spongia, ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, saepius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum ualent, aceto madefacienda sunt, id uelut uelut ad sanguinem suppressendum est: Ideoque quidam id uulnere infundunt. Sed alius rursus metus, quæ rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum: quæ uis pleraque ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profusio uincuntur: uenæ, quæ sanguinem fundunt, apprehendenda, circaque id quod ictum est, duobus locis deligenda, intercidenda quæ sunt, ut in se ipsæ coeant: & nihilominus ora præclusa habeant. ubi ne id quidem res patitur, possunt ferro cadenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso, ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, puta in fronte, uel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admoouere à diuersa parte, ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curatio aduersus uulnere inflammationem

Et aduersus profusionem quidem, in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem, in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, ubi latus est uel os, uel nervus, uel cartilago, uel musculus: aut ubi parum sanguinis, pro modo uulneris, fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit: sed pati fluere, dum tutum erit: adeo ut, si parum fluxisse uidebitur, mitti quoque ex brachio debeat: utique si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoque magis, si id uulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus latus uidebitur, præcidendus erit: Nam percussus, mortiferus est, præcisus sanitatem recipit.

De glutinatione uulnere

Sanguine autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel exhausto, si per se parum fluxit: longè optimum est, uulnus glutinari. Potest autem id uel quod, in cute, uel etiam in carne est: si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia inherens: si tamen etiam nunc integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his uero quæ glutinatur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet: maximeque si discissa auris ima est, uel imus nasus, uel frons, uel bucca, uel palpebra, uel labrum, uel circa guttur, cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, hiatque, neque in unum oræ facile attrahuntur: futura quidem aliena est: Imponenda uero fibula sunt (si prius Græci nominant) quæ oras, paulum tamen contrahunt: quod minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoque, quod alia parte dependens, alia inheret (si alienatum adhuc non est) futuram, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus uertitur, & inflammationem mouet, & glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est. nam id quoque inflammatur. Comprehendi uero futura, uel fibula, non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne, ubi suberit hæc, oportebit: quod ualentius hæreat, neque cutem abrumpat. Vtraque optima est ex acia molli, non nimis torta, quod mitius corpori infundat. Vtraque neque nimis rara, neque nimis crebra iniicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, uchementer afficit: quia quod saepius acus

corpus

corpus tranſit, quoque plura loca inieſtum uinculū mordet, eò maiores inflammationes oriuntur: magisque zſtate. neutra etiam uim ullā deſiderat: ſed eatenus utilis eſt, quā cutis ducentem quaſi ſua ſpōte ſubſequitur. Fere tamen fibulæ latius uulnus eſſe patiūtur: Sutura, oras iungit: quæ ne ipſæ quidem inter ſe contingere extoto debent, ut ſi quid intus humoris concreuerit, ſit quæ emanet. Si quod uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni uulneri primò imponenda eſt ſpongia ex aceto expreſſa. ſi ſuſtinere aliquis aceti uim non poteſt, uino utendum eſt. Leuiſ plaſa iuuatur etiam, ſi ex aqua frigida, expreſſa ſpongia imponitur. ſed ea quocunque modo impoſita eſt, dum ma det, prodeſt: itaque ut inareſcat, non eſt committendum. Licet quæ ſine peregrinis, & conquiſitis, & compoſitis medicamentis uulnus curare. Sed ſi quis huic parum confidit, imponere medicamētum debet, quod ſine ſeuo compoſitū ſit, ex hiſ, quæ cruentis uulncribus apta eſſe propoſui: Maxime quæ, ſi caro eſt, barbarū: ſi nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus (quales aures, uel labra ſunt) Polybi ſphragidem. Alexandrinum quoque uiride, neruis idoneum eſt: eminentibus quæ partibus ea, quam Græci *κατὰ τοὺς* uocant. Solet etiam collifo corpore, exigua parte ſindi cutis. quod ubi incidit, non alienum eſt, ſcalpelo latius aperire (niſi muſculi, nerui quæ iuxta ſint: quos incidi non expedit) ubi ſatis dēductum eſt, medicamentum imponendum eſt. At ſi id quod collifum eſt, quamuis parum dēductum eſt: latius tamen aperiri, propter neruos, aut muſculos non licet: adhibenda ſunt ea, quæ humorem leniter extrahant; præcipue quæ ex hiſ id, quod *πύρρος* uocari propoſui. Non alienum eſt etiam ubique uulnus graue eſt, impoſitum, quò id iuuetur, inſuper circundare lanam ſuccidam ex aceto, & oleo: uel cataplaſma, ſi mollis iſ locus eſt, quod leniter reprimat: ſi neruoſus, aut muſculoſus, quod emolliat.

Quomodo uulnus ligari conueniat.

Fascia uerò ad uulnus deligandum, lintea aptiſſima eſt: eaque lata eſſe debet, ut ſemel inieſta, non uulnus tantum, ſed paulum utrinque etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis reſeſſit, ab ea melius attrahitur: Si æque ab utraque tranſuerſa comprehendere oras debet: aut ſi id uulneris ratio non patitur, media primū inijcienda eſt, ut tum in utranque partem ducatur. ſic autem deliganda eſt, ut & contineat, neque aſtringat. quod non continetur, elabitur. quod nimis aſtrictum eſt, cancro periclitatur. Hyeme ſæpius fascia circuire debet: zſtate, quoties neceſſe eſt. Tum extrema pars eius inferioribus acu aſſuenda eſt: nam nodus uulnus lædit: niſi tamen lōge eſt. Illo neminem decipi decet, ut propriam uiſcerum curationem requirat: de quibus ſuprà poſui. Nam plaſa ipſa curanda extrinſecus uel futura, uel alio medicinz genere eſt. In uiſceribus, nihil mouendum eſt, niſi aut ſi quid ex iocine re, aut liene, aut pulmone duntaxat extrenio dependeat, præcidatur. alioquin uulnus interius ea uiſus ratio, eaque medicamenta ſanabunt, quæ cuique uiſceri conuenire, ſuperiore libro propoſui.

De ratione uiſus, & notis uulnrum, curationibusq; eorum.

HIS ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus eſt: iſque, ſi graue uulnus eſt, abſtinere quantum uires patiuntur, ante inflammationem, à cibo debet. bibere, donec ſitim finiat, aquam calidam. uel ſi zſtas eſt, neque febris, neque dolor eſt, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuū eſt: ſed ſemper pro uiribus corporis zſtimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere neceſſarium poſſit, tenuē ſcilicet & exiguum, qui tantum ſuſtineat. Multique etiam ex profluuiio ſanguinis inter morientes, ante ullam curationem, uino reſcindi ſunt; quod alioquin inimiciſſimum uulneri eſt. nimis uerò intumeſcere uulnus, periculōſum: nihil intumeſcere, periculōſiſſimum eſt. illud, indicium eſt magnæ inflammationis; hoc, emortui corporis. Protinusque, ſi mens homini conſiſtit, ſi nulla febris acceſſit: ſcire licet, maturè uulnus ſanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, ſi in magno uulnere, dum inflammation eſt, permanet. Illa pernicioſa eſt, quæ uel leui uulneri ſuperuenit, uel ultra tempus inflammationis durat, uel delirium mouet; uel ſi neruorum rigor, aut diſtentio, quæ ex uulnere orta eſt, eam non finit. Vomitus quoque bilioſus, non uoluntarius, uel protinus ut percuſſus eſt aliquis, uel dum inflammation manet, malum ſignum eſt, in hiſ duntaxat, quorum uel nerui, uel etiam neruoſi loci uulnerati ſunt. Sponte tamē uomere, non alienum eſt, præcipue hiſ, quibus in conſuetudine fuit; ſed neque protinus poſt cibū, neque iam inflammatione orta, neque cum in ſuperioribus partibus plaſa eſt. Biduo ſic uulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque ſanies ex aqua frigida eſt, eademque rursus inijcienda ſunt. Quinto iā die, quanta inflammatio futura eſt, ſe oſtendit. Quo die, rursus detecto uulnere, conſiderandus color eſt: Quod ſi liuidus, aut pallidus, aut uarius, aut niger eſt, ſcire licet, malum uulnus eſſe. idque quancūque animaduerſum eſt, terrere nos poteſt. album, aut rubicundum eſſe utis, commodiſſimum eſt. Item cutis dura, craſſa, dolens, periculum oſtendit, bona ſigna ſunt, ubi hæc ſine dolore, tenuis & mollis eſt. Sed ſi glutinatur uulnus, aut teniter intumuit, eadem ſunt imponenda, quæ primò fuerunt. Si grauis inflammatio eſt, neque glutinandi ſpes eſt, ea quæ pus moueant: aque quoque calide neceſſarius uſus eſt, ut & materiam digerat, & duriciam emolliat, & pus citet. Ea ſic temperanda eſt, ut & manu contingenti iō cunda ſit: uſque eò adhibenda, donec aliquid ex tumore minuiſſe, coloremque ulceri magis naturalem reddidiſſe uideatur. maxime quæ, ſi grande uulnus eſt, *τετραπάρημον*: ſi in articulis, digitis, locis cartilaginosis, *πύρρος*. Poſt id fomentum, ſi lata plaſa non patet, imponi protinus emplaſtrum debet: & ſi latius hiat, illud emplaſtrum liquari ex irino unguenti oportet: eo quæ illita linamenta, diſponi per plagam: deinde emplaſtrum ſuprà dari, & ſuper id ſuccidam lanam: minus quæ etiā, quàm primò, ſciz altrin gende ſunt.

Curationes propriae articularum.

Proprie quædam in articulis uisenda sunt: in quibus si præcisi nervi sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est: ea transuersa commodior est. Si re-
tuso & grani est, nullum in figura discrimen est. At uisendum est, pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque, & crassum diu fertur, neruum præcisum esse credibile est. Magis quo-
que maiores dolores, inflammationesque, quod maturius excitatæ sunt. Quamuis autem non abscis-
sus neruus est: tamen si circa tumor durus diu permanet: necesse est & diuturnum ulcus esse: & sano
quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tardè membrum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recuruato articulo, curatio adhibita est; quam in recuruando
eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa debet. Si
glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit: Si iam
pus profluit, ut deorsum sit. Optimum etiam medicamentum, quies est: moueri & ambulare, nisi sanis,
alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite, uel brachijs, quam qui inferioribus partibus
uulnerati sunt. Minimeque ambulatio conuenit, scemine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo
cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum uulnus purum est, inter res infestissimas est.
Nam id & humidum & fordidum reddit: ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Locus frictio re-
cte adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à uulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, uulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraque
id, emplastrum, uel *ινναφάρμακον* dandum est. Tum demum uero purum ulcus est, cum rubet, ac nimium
neque siccum, neque humidum est, ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium
aut aridum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est: id pu-
rum non est.

Quomodo uulnus implendum est.

Purgato, sequitur ut impleatur; iamque calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies remoueat. Locus
Lanz succidæ superuacuuus usus est: Lota melius circumdatur. Ad implendum autem uulnus proficiunt
quidem etiam medicamenta aliqua: Iraque ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa, exigua
mellis parte; aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa, *τετραφάρμακον*, aut ex rosa, linamenta. Plus tamen pro-
ficat balneum rarum. Cibi boni succi, uitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus: Nam & auis, & uena-
tio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, alienum est: Itemque us-
que ad cicatricem, si nerui, musculiue uulnerati sunt, etiam si altè caro, aut si plaga in summa cute, generis
tutoris est: potest non peruetus, modicè tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid mol-
liendum est (quod in neruosis locis musculosisque necessarium est) cerato quoque super uulnus utendum
est. At si caro supercreuit, modicè reprimat siccum linamentum; uehementius squama æris. Si plus est
quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehementiora, quæ corpus exedunt. Cicatricem post o-
nia hæc, commodè inducit lycū ex passo, aut lacte dilutum; uel etiam per se impositum siccum linamentum.

De uulneribus, quæ extrinsecus per uulnera incidunt, curationibusque eorum.

HIC ordo felix curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consueverunt. Interdum
enim uetustas ulcus occupat, induciturque ei callus, & circum oræ crassæ liuent. post quæ, quicquid me-
dicamentorum ingeritur, parum proficit. quod fere negligenter curato ulcere superuenit. Interdum uel
ex nimia inflammatione, uel ob æstus immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus astrictum est,
uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus à Græcis diductum in species est;
nostris uocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed etiam ser-
pit; deinde alijs, alijsque signis decernitur. Nam modò super inflammationem rubor ulcus ambit: isque
cum dolore procedit. *ἰσθμηλας* Græci nominant. Modò ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est.
Idque uehementius etiam putrescendo intrèditur. Vbi uulnus humidum est, & ex nigro ulcere humor pal-
lidus fertur, mali que odoris est, caruncule corrupte, interdum etiam nerui ac membranae resoluuntur, specul-
lumque demissum, descendit aut in latus, aut deorsum; eoque uitio nonnunquam os quoque afficitur: mo-
dò oritur ea, quam Græci *γάργαρα* appellant. Priores in qualibet parte corporis sunt: Hoc in promin-
tibus membris, id est inter ungues, & alas, uel inguina; fereque in senibus, uel his, quorum corpus mali ha-
bitus est. Caro in ulcere uel nigra, uel liuida est, sed sicca & arida; proximaque cutis plerumque subnigris
pustulis impletur; deinde ei proxima, uel pallida, uel liuida, fereque rugosa, sine sensu est. Vtterior, in in-
flammatione est, omniaque ea simul serpunt; Vlcus, in locum pustulosum: Pustulæ, in eum, qui pallet
aut liuet: Ballor aut liuor, in id quod inflammatum est: Inflammatio, in id quod integrum est, transit.
Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque sitis: quibusdam etiam delirium accedit. alij quamuis men-
tis sue compotes sunt, balbutiendo tamen, uix sensus suos explicant. Incipit affici stomachus: Fit foedi
spiritus ipse odoris. Atque initium eius quidem mali recipit curationem: Vbi uero penitus insedit, in-
sanabile est; plurimique sub frigido sudore moriuntur.

Curatio

Curatio ulceris.

AC pericula quidem uulnorum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello coniciendum est, excidendaque eius ora, & quidquid super eas liuet, æque incidendum. Si uaricula intus est, quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, nouatumque uulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus uulnibus exposita est. Si scalpello aliquis uri non uult: potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit; & cum ulcus sub eo exesum est, id quo cicatrix inducitur.

Curatio erysipelatis.

ID autem, quod *ignis* uocari dixi, non solum uulnere superuenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interdum periculum maius affert: utique si circa ceruices, aut caput constitit. Oportet, si uires patiuntur, sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia; maximeque cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluuiali exceptam; aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiecta; aut si tenerius corpus est, lenticulam. Quidquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris *P.* * I. cerussæ & croci, singulorum *P.* * XII. eaque cum uino conterenda sunt; & id his illinendum. Aut si durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est, neque dū serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem tenuis exedūt: repurgatumque ulcus, sicut cætera, nutriendum est. Si magis putre est, iamque procedit ac serpit; opus est uehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccat est cum aduritur. Post uisionem putris ulceris, superponenda sunt, quæ crustas à uiuo resoluunt; eas *ῥαχμα* Græci uocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle & resina uita, sed alijs quoque purgari potest, quibus purulenta curantur; eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio Gangrenæ.

Gangrenam uero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est; utique in corpore iuuenili, & magis etiam, si muscoli integri sunt: si nerui uel læsi non sunt, uel leniter affectu sunt, neque ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est; ideoque non multum, quod putresceret, fuit; consistitque eo loco uitium; quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu, primum est, si uires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quidquid aridum est & intentione quadam proximum quoque locum male habet: usque eo sanum corpus concidere. Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt; quæ pus mouere consuevit. ideoque ne aqua quidem calida. Grauius quoque, quamuis reprimentia, aliena sunt: Sed his quam leuissimum opus est. superque ea, quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihil magis malum constitit, uri id quod est inter integrum ac uitiatum loci debet. Præcipue que in hoc casu petendum, non à medicamentis solū, sed etiam à uictus ratione præsidium est: Neque enim id malū, nisi corrupti uisiosi que corporis est. Ergo primum (nisi imbecillitas prohibet) abstinentia utendum: Deinde danda, quæ per cibum portionemque alui, ideoque etiam corpore astringant; sed ea leuia. Postea si uitium constitit: imponi super uulnus eadem debent, quæ in putri aluum corpusque siccantibus. aqua uero pluuiali frigida. Balneum (nisi iam certa fiducia reddidit sanitas est) alienum est; si quidem emollitum in eo uulnus, citò rursus eodem malo afficitur. Solent uero non auxiliū est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrū, quod paulatim emoritur, abscidere. Hæc grauissimum uulnere curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est; aut ubi derafum, ac tritum uel aliquid est; aut ubi furculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum uulnus insedit. In primo casu, commodissimum est malicorium ex uino coquere, interioreque eius partem conterere, & cerato miscere ex rosa facto, idque supponere: deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum: quale *λεπρόν* est. Derafo uero detricto, imponendum est emplastrum *τετραφάρμακον*, minuendusque cibus, & uinum subtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit: Si quidem ex eiusmodi casibus sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculū uero, si fieri potest, oportet uel manu, uel etiam ferramento eicere. Si uel præfractus est, uel altius descendit, quam ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autem educit super imposita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita; si iā durior, antè in mulso decocta: Cui semper mel adiciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex furculis arundo est, quia aspera est. Eademque offensa etiam in filicis hastula est. Sed usu cognitū est, utranque aduersus alteram medicamentum esse, si contrita super imposita est. Facit autem idem in omnibus furculis, quodcūque medicamentum extrahendi uim habet: Idem altis tenuibusque uulnibus aptissimum est. Priori rei, Philocratis: huius, Hecatæi emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulnere inducenda, purgandaque sit.

VB I uero in quolibet uulnere, uentum ad inducendum cicatricem est (quod per purgatis iam, repletisque ulceribus necessarium est) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur; deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit.

Idem radix filuestris cucumeris prestat. Idem compositio, quæ habet elaterij. P. * I. spumæ argenti. P. * II. unguenti pondo. * III. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant, paribus portionibus mixta, ærugo, plûbum elotum, eademque rosa cotta, siue ungitur cicatrix (quod in facie fieri potest) siue id, ut emplastrum imponitur; quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concava est, stultum est decoris causâ rursus & dolorem, & medicinam sustinere. Alioqui res utrique succurri patitur: Si quidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæc: quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem, exedentia medicamenta coniicienda sunt: Super concavam, implentia; donec utrunque ulcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De uulneribus, quæ per morsus inferuntur, eorumque curationibus. Cap. * X. V. I.

DIXI de his uulneribus, quæ maximè per tela inferuntur: Sequitur ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sæpe canis, nonnunquam, ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam uirus. Itaque si uehemens uulnus est, cucurbitula ad mouenda est. Si leuius, protinus emplastrum iniiciendum, præcipueque Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui: si ea non sunt, uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his, quæ recentibus uulneribus accommodantur. Sal quoque his, præcipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri imponitur, superque id, duobus digitis uerberatur (Exsaniat enim) ac fassamentum quoque rectè super id uulnus deligatur.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

Utique autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula uirus eius extrahendum est. deinde si locus neque neruosus, neque musculosus est, uulnus id adurendum est. si uri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. tum uisito quidem uulneri super imponenda, quæ ceteris uisitis sunt. ei uero, quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quæ uehementer exedunt. post quæ nullo nouo magisterio, sed iam supra posito, ultus erit implendum, & ad sanitatem perducendû. Quidam post rabiosi canis morsum, protinus in balneum mittunt: ibique patiuntur desudare, dum uires corporis sinunt, ulcere adaperto: quod magis ex eo quoque uirus destillet. deinde multo meracoque uino excipiunt: quod omnibus uenenis contrarium est. idque cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo uidetur. Solet autem ex eo uulnere, ubi parum occursum est, aquæ timor nasci. Græci appellant. Miserrimum genus morbi: in quo simul æger & fitis, & aquæ metu cruciatur. quo oppressis, in angusto spes est. Sed unicuique tamen remediû est, ne opinantem in piscinam non ante ei prouisam projicere. Et si natandi sciētiam non habet, modo mersum, bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, ut inuitus quæque aqua satietur. sic enim simul & fitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus, in aqua frigida uexatum, neruorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina, protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem, præcipue id, quod primo loco posui. ubi id non est, aliud, si nondum eger aquam horret, potui ex aqua dandum est; & si amaritudine offenditur, mel adiiciendum est. Et si iam is morbus occupauit, per catapotia sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant: quamuis in ea multum antiqui uariarunt, ut in singula genera anguium singula medendi genera præciperent: atque alijs alia. sed in omnibus eadem maximè proficiunt. Igitur in primis super uulnus id mēbrum deligandû est: nō tamen nimium uehementer, ne torpeat. Dein uenenum extrahendum est. id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, ante scalpello circa uulnus incidere, quod plus uitiat iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est (quod tamen uix incidere potest) tum quodlibet simile uas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uulnus exsugat. Neque Hercules scientiam præcipuam habent hyæniæ, qui phylli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis (ut quædam etiam uenatoria uenena, quibus galli præcipue utuntur) nō gustu, sed in uulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit; & si stupente ea (quod per quædam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum phylli secutus, id uulnus exfluxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem præstabit. Illud, ne intreat, ante debet attendere: ne quod in gingiuis, palato uel alia uel parte oris, ulcus habeat. Post hæc, is homo loco calido collocandus est, sic, ut id, quod percussus erit, in inferiore partem inclinetur. Si neque qui exsugat, neque cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillū, uel uitulfinū, & uomere. Viuū autem galinaceū pullū per mediū diuidere, & protinus calidū super uulnus imponere, sic, ut pars interior corpori iugatur. Facit id etiam hædus agnus uel discissus, & calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoque, quæ supra cōprehensa sunt: Aptissimumque est uel éphesiū, uel id quod ei subiectū est. pīensque in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est: necessariū est exsorbere potionem meri uini cū pipere, uel quidlibet aliud; quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiat. Nam maxima pars ueneni frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

speciales

Speciales curationes aduersus ictus serpentium, & primo aduersus ictum Aspidis.

HAEC aduersus omnes ictus communia sunt: Vnus tamen ipse docuit, eum, quem aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset: & partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos estus, siti premeretur: ac locis siccis alium humorem non reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo, quoniam id, quantum refrigerandi uim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quod fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo uerisimile est, spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aduersus ictum scorpionis.

IN quibusdam etiam alijs serpentibus, certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt; quidam eodem modo contritum super uulnus imponunt: quidam super prunam eo imposito, uulnus suffumigant, undique ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super uulnus deligant. Bibere autem oportet herbe solaris (quam *herba solis* graeci uocant) semen, uel certe folia ex uino. Super uulnus uero etiam *suffures* ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle salustius. Cognoui tamen medicos, qui: *pione* ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

Aduersus aranei & scorpionis ictum.

ET ad scorpionis autem & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum super imponitur.

Aduersus Cerastris, & Dipse, & Hemorrhoidis ictum.

AT si Cerastris, aut Dipse, aut Hemorrhoidis percussit: catapotium, quod aegyptiis fabae magnitudinem aequet, arefactum in duas potiones diuidendum est, sic, ut ei rute paulum adiciatur. Tria folia quorumque & mentastrum, & cum aceto panaces aequae proficiunt. Costumque & calia, & cinnamomum recte per potionem assumuntur.

Aduersus Cherhydri ictum & Cerastris.

Aduersus Cherhydri uero ictum, panacis, aut laser, quod sit scrupulorum IIIIS. X. I. uel porri succus cum hemina uini fumendus est; & edenda multa saturata. Imponendum autem super uulnus, sterco caprinum ex aceto costum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, uel nepeta cum sale contrita, melle adiecto. Quod in eo quoque uulnere, quod cerastris fecit, equae ualeat.

Aduersus Phalangii ictum.

VB I uero phalangium nocuit, praeter eam curationem, quae manu redditur, saepe homo demittendus in solum est, dandusque ei myrrhae & uuae taminiae par modus ex passi hemina: uel radiculae semen, aut lolij radix ex uino, & super uulnus, suffures ex aceto costae; imperandumque, ut is conuirescat.

Aduersus ictus Italorum anguim, qui minus terribiles peregrini sunt.

Verum haec genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeque estuosis locis gignantur. Italia, frigidioresque regiones, hac quoque parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit herba betonica, uel cantabrica, uel centaureon, uel agrimonia, uel trixago, uel perlonina, uel marinae pastinacae, singulae binx ue trite, & cum uino potui datae, & super uulnus impositae. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum & ieiunii, & ieiunio magis nocere: Ideoque perniciosissime sunt, cum incubant. Utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo, uel in potione assumpta.

NON tam facile his opitulari est, qui uenenum, uel in cibo, uel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti; ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto uomere: Deinde, ubi praecordia exhausta, bibere antidotum. si id non est, uel merum uinum.

Specialia remedia aduersus quaedam uenena, & primo aduersus cantharidas.

SUNT tamen quaedam remedia propria aduersus quaedam uenena, maximeque leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panace cum lacte contusa, uel galbano uino adiecto dari, uel lac per se debet.

Aduersus cicutam.

SI cicutam; uinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is uomere cogendus. posteaque laser ex uino dandum. Isque, si febre uacat, in calidum balneum mittendus. Si non uacat, ungendus ex calefacientibus est. postquam quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

SI hyoscyamum; feruens mulsum bibendum est; aut quodlibet lac maxime tamen asininum.

Aduersus cerussam.

SI cerussam: ius maluae uel ius glandis ex uino contrite maxime profunt.

Aduersus sanguisugam, si epota est; & lac quod intus coit.

SI sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

SI fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum fule & aceto edenda est. Ipsi uero hi, & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocture genere idonei fieri. Nam siue ex oleo inferu erunt, siue puri furculus cum his inferuunt, omni noxa uacant.

De adustis corporis locis; & quomodo curari debeant.

Adustis quoque locis extrinsecus uis infertur. Itaque sequi uidetur, ut de his dicam. Hec autem optime curantur folijs aut lilij, aut lingue canina, aut betę in uetere uino, oleoque decoctis. Quorū quidlibet protinus impositum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quę mediocriter exedentia reprimendaque, primò & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent: Dein de ea, quę lenia, ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulę cū melle farina, uel myrrha, uel uino: creta cimolia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atque ubi usus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus, quolibet utitur: Sed idonea maxime est, quę uel plumbi recremetum, uel uitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel marrubio, donec crustę cadant. Tum etiam cū melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime ficcum linamentum.

De interioribus ulceribus, quę aliqua corporum parte corrupta nascuntur.

Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

Ab his quę extrinsecus incidunt, ad ea ueniendum est, quę interioribus corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. eius hæ notę sunt. Rubor est, superque eum non nimium pustulę eminet, maxime nigre, interdum subliuidę, aut pallidę. In his sanies esse uidetur, infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quàm naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est, eaque inflammatione cingitur; neque in eo loco leuari cutis potest; sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget; nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrunque. Idque uitium subter actis, quasi quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius; supra quoque procedens in albescent, dein liuidum fit, circumque exiguae pustulę oriuntur. Et si circa stomachum, fauces uel incidit, subito spiritum sepe elidit. Nihil melius est, quàm protinus adurere. Neque id graue est, nam non sentit, quoniam ea caro mortua est, finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde uulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undique à uiua carne diducta, quę trahit secum quidquid corruptum erat; purusque iam sinus curari potest impletibus. At si in summa cute uitium est, possunt succurrere quędam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque uero medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus à uiua corruptam partem resoluit. Certa que esse fiducia potest, fere ut undique uitiosa caro excedat, qua huiusce rei medicamentum exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utique ad ultionem properandum est, sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. Aquam liberaliter bibere expedit; magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De carcinomate, & eius curatione.

Non idem periculum carcinomate affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isque immobilis, inequalis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflare uenę quasi recurrantur, hæque pallent, aut liuent; nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, alijs dolorem affert, in alijs eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere, durior aut mollior est, quàm esse naturaliter debet; nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quę uocant Greci *carcinomata*, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulę similis, neque turgescit. Nam protinus aut resolutio neruorum, aut diffusio insequitur: Sæpe homo istus obmutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quę circa sunt, intenduntur & itumescunt. Ob quę pessimum id genus est, fereque primum id fit, quod *carcinomate* à Grecis nominatur: Deinde ex eo id *carcinomate* quod sine ulcere est: Deinde ulcus ex eo *thymum*. Tolle nihil, nisi *carcinomate* potest; reliqua curatio nibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam uis sunt medicamentis adurentibus: Quidam ferro adusserunt; quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam medicina proficit, sed adusta protinus concitata sunt & increuerunt, donec occiderent. Ex his etiam post inductam cicatricem, tamen reuerterunt, & causam mortis attulerunt. Cū interim plerique nullam uim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quę quasi blandiantur, quod minus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. discernere autem *carcinomate*, quod curationem recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest. Sed tempore, & experimento. Ergo ubi primum id uitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si leuatur malum, minuunturque eius indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ultionem. Si protinus irritatum est, scire licet, iam *carcinomate* esse; remouendaque sunt omnia acra, omnia uehementia. Sed si sine ulcere is locus durus est; imponi ficum quam pinguis-

simam,

simam aut *emplantu* satis est. Si ulcus *aequale* est, ceratum ex rosa iniiciendum est, adijciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. si id nimium supercreuit; tentanda squama aris est (quae lenissima ex adurentibus est) eatenus ne quid eminere pariat; sed ita si nihil exacerbauit. sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

De Therioma, et eius curatione.

Est etiam ulcus, quod *Suppura* Graeci uocant. Id & per se nascitur & interdum ulceri ex alia causa facto superuenit. Color est uel liuidus, uel niger: odor foedus, multus, & *mucosus* similis humor. Ipsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit: prurigne tantum mouetur. at circa, dolor est, & inflammatio: Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. ad id quoque malum serpit, quae omnia saepe intenduntur. Fitque ex his ulcus, quod *Empyema* Graeci uocant: quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ossa, corpus uorat. Id ulcus inaequale est, *conuexum* simile: inestque multus humor glutinosus: odor intolerabilis; maiorque quam pro modo ulceris, inflammatio. Vtrumque (sicut omnis cancer) fit maxime in senibus: uel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusque eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum a uictus ratione ordinandus est; ut quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo abstineat: aquam quam plurimam assumat. alius quoque ei datur, dein post inflammationem cibum boni succi capiat; uitatis omnibus acerbis, potionis quantum uolet, sic, ut interdum quidem aqua contentus sit: in coena etiam uini austeri aliquid bibat, non aequale tamen fame in his, quos *Empyema* urget, atque his, qui *Suppura* adhuc habebunt, utendum erit, & uictus quidem talis necessarius est. Super ulcus uero inspergenda arida aloë, *cantharis* est: & si parum proficiet, chalcitis. Ac si quis neruus, exesa carne nudatus est; contegendus ante linteolo est: ne sub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num remedijs opus est: ad eas compositiones ueniendum est, quae uehementius adurunt. Quidquid autem inspergitur, auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linana, uel olez folia ex uino decocta, uel marrubiū: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, ac bene expresso. Circaque, quā tumor ex inflammatione est, imponenda quae reprimant cataplasmata. Si sub his nihil proficitur; ferro locus aduri debet: diligenter neruis (si qui apparerent) ante contextis. Adustum uel medicamentis, uel ferro corpus primum purgandum, deinde implendum esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, et eius curatione.

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. eius duae species sunt. Alterum est subrubundum, aut mixtum rubore, atque pallore; exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimae perexiguae. In his semper fere pus, & saepe rubor cum calore est: serpitque id nonnunquam, sanescens eo, quod primum uiciatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis, ulcus continuatur; humorque exit, qui esse inter saniem, & pus uideri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueque in plantis. Alterum autem est in summa cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidum, inaequaliter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus; ac saepe id quod iam sanum uidebitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis, quae uictu receptura est, tumidior, & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniores tentantur; aut quae mali habitus sunt; sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his quae serpunt, sic prope difficillime tollitur. Medicamentum eius fortuitum est, uno die febris, quae humorem noxium absumat. Cuius quod crassius, & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum ledi, quod plus puris exeat; & id, quod ibi corruptum corpus est, extrahat. sed tamen si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alui ductione opus est. In omni uero sacro igne, neque lenibus, & glutinosis cibis, neque salis, & acerbis utendum est; sed his, quae inter utrumque sunt; qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, mes; exceptoque apro, omnis fere uenatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatorio, & uinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere, potio magis liberalis esse, quam cibus debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si uehementius, uino calido fouenda sunt. Deinde acui pustulae quaecunque sunt, aperiendae. Tum imponenda ea, quae putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata, ulcusque purgatum est, imponi leue medicamentum debet. In altero autem genere, possunt proficere mala cotonea in uino cocta atque contrita: Potest emplastrum uel *Hierē*, uel *terrapin*, cui quinta pars thuris adiecta sit: Potest nigra hedera ex uino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere, quod in summa cutis esse proposui, satis ad sanitatem, eadem lenia medicamenta proficient.

De Chironico ulcere, et eius curatione.

Chironicum autem ulcus appellatur, quod & magnū est, & habet oras *duas*, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neque in ulcere, neque in eius humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est: nihil serpit, ideoque nullum periculum affert; sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcusque renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his, Squamae eris, plumbi eloti combusti, singulorum P. * III. Cadmie, cere, singulorum P. * VIII. rosae quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus, quae ex frigore in pedibus & manibus oriuntur, et eorum curationibus.

Fiunt etiam ex frigore hyberno ulcera, maxime in pueris, & praecipue pedibus, digitisque eorum, non

Therionia & per se nascitur
interdum ulceri ex alia causa
Color est uel liuidus, uel niger
odor foedus, multus, & mucosus
Ipsum ulcus neque tactum, neque
canentum sentit: prurigne tantum
mouetur: at circa, dolor est, & in
interdum etiam febris oritur. Non
ex ulcere sanguis erumpit: ad id
quod malum serpit: quoniam
fit ex his ulcus, quod Empyema
Graeci uocant: quia celeriter
serpendo penetrandoque usque ossa
corpus uorat.
Id ulcus inaequale est, conuexum
simile: inestque multus humor
glutinosus: odor intolerabilis; maior
que quam pro modo ulceris, inflammatio.
Vtrumque, sicut omnis cancer,
fit maxime in senibus: uel his, quorum
corpora mali habitus sunt.
Curatio utriusque eadem est: sed in
maiore malo magis necessaria.
Ac primum a uictus ratione ordinandus
est: ut quiescat in lectulo.
ut primis diebus a cibo abstineat
aquam quam plurimam assumat.
alius quoque ei datur. Cibus boni
succus capiat; uitatis omnibus acerbis.
potionis quantum uolet, sic, ut interdum
quidem aqua contentus sit: in coena
etiam uini austeri aliquid bibat, non
aequale tamen fame in his, quos
Empyema urget, atque his, qui
Suppura adhuc habebunt, utendum
erit, & uictus quidem talis
necessarius est.
Super ulcus uero inspergenda
arida aloë, cantharis est: & si
parum proficiet, chalcitis.
Ac si quis neruus, exesa carne
nudatus est; contegendus ante
lineteolo est: ne sub eo medicamento
aduratur. Si ualidioribus etiam
num remedijs opus est: ad eas
compositiones ueniendum est, quae
uehementius adurunt.
Quidquid autem inspergitur,
auerso specillo infundi debet.
Super danda cum melle sunt
uel linana, uel olez folia ex uino
decocta, uel marrubiū: eaque
lineteolo contegenda in aqua
frigida madefacto, ac bene
expresso. Circaque, quā tumor
ex inflammatione est, imponenda
quae reprimant cataplasmata.
Si sub his nihil proficitur;
ferro locus aduri debet: diligenter
neruis (si qui apparerent) ante
contextis. Adustum uel medicamentis,
uel ferro corpus primum purgandum,
deinde implendum esse: apparere
cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne

Sacer ignis, malis ulceribus annumerari
debet. eius duae species sunt. Alterum
est subrubundum, aut mixtum rubore,
atque pallore; exasperatumque per
pustulas continuas, quarum nulla
altera maior est, sed plurimae perexiguae.
In his semper fere pus, & saepe rubor
cum calore est: serpitque id nonnunquam,
sanescens eo, quod primum uiciatum
est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi
ruptis pustulis, ulcus continuatur; humor
que exit, qui esse inter saniem, & pus
uideri potest.

Fit maxime in pectore, aut lateribus,
aut eminentibus partibus, praecipueque
in plantis. Alterum autem est in summa
cutis exulceratione, sed sine altitudine,
latum, subliuidum, inaequaliter tamen;
mediumque sanescit, extremis
procedentibus; ac saepe id quod iam
sanum uidebitur, iterum exulceratur.
At circa proxima cutis, quae uictu
receptura est, tumidior, & durior est,
coloremque habet ex rubro subnigrum.
Atque hoc quoque malo fere corpora
seniores tentantur; aut quae mali
habitus sunt; sed in cruribus maxime.

De Chironico ulcere.

Chironicum autem ulcus appellatur, quod & magnū est, & habet oras duas, collosas, tumentes.

Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neque in ulcere, neque in eius humore est.

LIBER QUINTVS

nunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est: Interdum pustule oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus: Prurigo maior est, nonnuquam humor exiit, sed non multus, qui referre uel pus, uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliquæ uerbena ex reprimentibus. Si nondum ad apertum ulcus: zs, quam maxime calidum quis pati potest, ad mouendum est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen aqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, et eius curatione.

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quædã ex pure & sanguine, quasi glandula oriuntur. Quæ uel præcipua fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, & siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice; sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus: In mammis quoque formidarum se repperisse chirurgicus Meges auctor est. Propter hæc, & album ueratrū recte datur, atque etiam sapius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem uel educant, uel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur, quæ exedunt, crusta que cum lo cū astringunt, tunc uero ut ulcus curant. Quæcunque autem ratio curandi est, corpus puro ulcere exercendum atque alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quæ cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anghem edit, liberari.

De furunculo, et eius curatione.

Furunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeque ubi iam in pus uertit. Qui ubi ad apertus est, & exiit, super apparet pars carnis in pus uersa, pars corrupta, subalbida, subrubra, quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur: Maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est, sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera defunt, imponi debent, primum non pingue emplastrum, ut id reprimat; deinde si non repressit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

De phymate, et eius curatione.

Phyma uero, nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam maius. Nam furunculus, qui dimittit magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit, sed inflammatio, dolorque sub eo minores sunt. Vbi nullum est pus, eodem modo apparet uentriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur, in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas in durtat, ne nascitur quidem. Quibus uero medicamentis discuteretur, supra propositum est.

De phygella, et eius curatione.

Phygella uero, est tumor non altus, latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor, distentioque uel hemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris, interdum etiam febricula; idque tardè maturescit: neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut in inguinibus. Panem ad similitudinem figuræ, nostri uocant, atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstrauimus. Sed cum oēs hi nihil nisi minuti abscessus sint; gñale nomē trahit latius uirtutē ad suppurationem spectans. idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius, maximeque eos, qui uentrē infectant. Sæpiusque oculis expositum est: Siquidem latus aliquid intumescit, ad similitudinem eius, quod phyma uocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit, & firmiter, uigiliamque exprimit. Interdū tamē nihil horū in cute deprehēdi potest: maximeque ubi altius pus mouetur: Sed cū siti, uigiliæque sentiuntur intus aliquæ punctiones; & quod desubito durius nō est, melius est: & quāuis nō rubet, coloris tamē aliter mutati est, quæ signa iā pure oriēte nascuntur: Tumor, ruborque multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus materia aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias, & paulo ante in erysipela proposui. Si iam durior est, ad ea ueniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est sicus arida confusa; aut fex mixta cū cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decocta. Licet etiā miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolis, uiscum: pondusque adijcere myrrhæ di midio minus, quā in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat: idque quō celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus

libus

sibus (quorum nomina, proprietatesque supra reddidi) recte sunt: eademque omnium curatio: tantummodo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities: Et si maior abscessus est, horror, aut etiam febricula permanet. Penitusque condita suppuratio. Si pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi illa se remiserunt, iamque is focus prurit, & aut subliuidus, aut subalbidus est, matura suppuratio est; eaque, ubi uel per ipsa medicamenta, uel etiam ferro, aperta est, pus debet emitti. Tum si qua in alis uel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt: In cæteris quoque partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si ualet corpus, æque linamenta superuacua sunt: In reliquis, parce tamē, nec, nisi plaga est, imponi debent. Commodè uero uel super linamenta, uel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex uino coctum. Quæ & per se, & mixta, idonea sunt. Si qua circa duriora sunt; ad ea mollienda, uel malua contrita, uel fœni græci, liniue semen ex passo coctum, super dandum est. Quidquid deinde impositum est, non astringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere, cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricē inducendam, conueniunt, quæ in uulneribus exposta sunt.

De fistulis et earum generibus, et curationibus

Nonnunquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs ulcerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quædam in singulis locis propria: prius de cõibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem alie breues sunt, alie altius penetrant; alie rectæ intus feruntur, alie multoque plures, trāsuerse; alie simplices sunt, alie duplices, triplices uel ab uno ore intus oritur: quæ tres sunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur; alie rectæ, alie flexæ & tortuosæ sunt. Alie intra carnem delinunt: Alie ad ossa, aut cartilaginem penetrant; aut ubi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt: Alie deinde facili, alie cum difficultate curantur: Atque etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem; adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est. Inimica, cõtraria his sunt: Itemque si fistula, os, uel cartilaginem, uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occupauit: si uel ad uesicam, uel ad pulmonē, uel ad uuluum, uel ad grandes uenas, arterias uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetrauit: Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum malum accedit, si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit: ut quod tendat, & quam altè perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an ficcior sit. quod extracto specillo, patet. Si uero os in uicino est (id quod discipulis) si iam necne eo fistula penetravit, quatenus nocuerit: Nā si molle est, quod ultimo specillo cõtingitur; intra carnem adhuc uirum est: Si magis id renititur, ad os uentum est. Ibi deinde si labitur specillū, nondū caries est. si nō labitur, sed æquali innititur: caries quæ uerū adhuc leuis est: Si inæquale quoque & asperū subest: uehemētius os exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet: puerumque esse ad eā, ex renixu patet. Sed ex his quædam colliguntur fistularum sedes, spatia, noxx. Simples uero hæc sunt, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quod simplici spatio conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque fere iuxta sint, caro, & neruus, & aliqua neruosa (quales fere tunice, membranaeque sunt) genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. si quidem ex carne pus leue, album, copiosius fertur. At ex neruoso loco: coloris quidem eiusdem, sed tenuius, & minus. Ex neruo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, nū in plures partes fistulæ penetrant; quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit, pus ferri, quod iam defierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne, & recens, & simplex est, ac neque rugosa, neque caua sede, neque in articulo; sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur; satis proficiet emplastrum, quod recentibus uulneribus imponitur, dum habeat uel salem, uel alumen, uel squamæ aris, uel æruginem, uel ex metallicis aliquid. exque eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius: Idque ea parte, qua tenuius est, altera antecedente, demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quæ in omnibus fistularum collirijs perpetua sunt. Idē deinde emplastrum in linteo superimponendum; supraque iniicienda spongia est in acetum antè demissa: soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à præcordijs fistula est, ex intervallo ieiunium radulas edisse, deinde uomere, necessarium est. uictus te callosa sit fistula: Callus autem neminem fallit, quia durus est, & ut albus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est: Quale est, quod habet papaueris lacrymæ / P. * I. gummi / P. * III. cadmiz / P. * IIII. atramenti futorij / P. * VIII. Ex quibus aqua coctis, collirium fit. aut in quo sunt gallæ / P. * I. æruginis, sandaracæ, aluminis ægyptij, singulorum / P. * I. atramenti futorij combusti / P. * II. aut quod constat ex chalcide, & saxo calcis; quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adiicitur. eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est, ex præcepto Meges, æruginis rase / P. * II. contere: deinde ammoniaci thymiamatis / P. * II. aceto liquare; eoque infuso, ex æruginē colligere. idque ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est, callum quibuslibet adurentibus medicamentis proderē; aut quibus hæc ma-

et ad rumpere / et explodere / uel exedere: quod malum / hinc uidetur

simè in effectu sunt, erodere. Satiùsque est, uel papyrum intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collij alstrictum, eo illinere. Scylla quoque cocta, & mixta cum calce, callum exest. Siquando uero longior, & transuersa fistula est; demisso specillo, contra principium huius incidi commodissimum est, & collirium utrinque demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut breuis, intraque carnem sit; collirio uti non debemus, quod unam partem curet, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium coniicienda sunt, isque ori fistulæ aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur, aut eadem ex uino liquada: Vel si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto sunt; atque intus infundendum, quidquid inditum est. Superponenda sunt, quæ refrigerent, & reprimant: nam fere quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta conijciat, per oricularium clysterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, uino: Si callus durior est, aceto: Si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua erium coctum sit, sic, ut huic quoque mellis paulum adijciatur. Fere uero fit, ut ea tunica, quæ inter ferrumentum, & integram carnem est, uicâ medicamentis tota exeat, infraque ulcus purum sit. quod ubi contigit, impone da glutiniantia sunt, præcipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum in modum collij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quàm impletur. Neque uerendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo, in unum eos iungat.

De melicera.

Est etiam ulceris genus, quod à faui similitudine, μυλκίον à Græcis nominatur: idque duas species habet. Alterum subalbidum, furunculo simile; sed maius, & cum dolore maiore. quod ubi maturefcit, habet foramina, per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus: Nec tamè ad iustâ maturitatem peruenit. Si diuifum est, multo plus intus corrupti, quàm in furunculo apparet, altiusque descendit. Raro fit, nisi in scapulis. Alterum est minus, super corpus eminens, durum, latum, subuiride, subpallidum, magis exulceratum: Siquidem ad singulorum pilorum radices, foramina sunt; per quæ fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis aut uisci referens, interdum olei. Si inciditur, uiridis intra caro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem mouere consuevit. Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponitur & ficus arida, & lini semen, quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam educentia: aut quæ propriè huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta & farina ex mulso cocta, sic, ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur; & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & uuæ catinix pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ purulent: deinde quæ purgent: tum quæ impleant.

De acrochordon, & Thymio, & Myrmecio, & Clauo, curationibusque eorum.

SVNT quædam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina, ut uicia sunt: ἀκροχορδὼν Græci uocant, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem: infra tenue, ad cutem latius; idque modicum est: quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed fere plura, maximeque in pueris; eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam medio crem inflammationem excitant: Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdurum, & in summo perasperum: Idque summum, colorem floris thymi representat (Vnde ei nomen est) Ibiq; facile finditur & cruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereque circa magnitudinem fabæ Egyptiæ est: raro maius: interdum perexiguum. modò unum, modò autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obscenis sunt: maximeque ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraque, quæ radices altius exiguunt, maioremque dolorem mouent: infra lata, super autem tenuia: minus sanguinis, mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque, aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur; præcipue tamen ex contuso (quamuis interdum aliter) doloremque etiam, si non aliàs, tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon, siue thymium, sæpe etiam per se finiuntur; & quò minora sunt, eo magis Myrmecia & clauus sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radicula relinquit; ideoque ne renascitur quidem. Thymio, clauoque excisis, subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem; eaque relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inheret, ideoque ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est: Nam sine ulla ui sic emollefcit; ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Toleratur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt: Aliisque id quod ex fece uini; myrmecis, id quod ex alumine, & sandaracæ fit, aptissimum. Sed ea, quæ circa sunt, folijs contigere debent,

debent, ne ipsa quoque exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficius in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum curationibus.

A T pustule maxime uernis temporibus oriuntur, earum plura genera sunt: Nam modo circa totum corpus, partem uel aspredo quedam sit similis his pustulis, quæ ex urtica, uel ex sudore nascuntur: Græci uocant; eaque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis oriuntur, nonnunquam maiores pustule linide, aut pallide, aut nigre, aut aliter naturali colore mutato; subestque his humor. Vbi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet: Græce nominatur. sunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Pridiction autem paulo durior pustula est, subalbida; acuta ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunquam etiam ulcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora; & modo tantum cum prurigne, modo etiam cum inflammatione aut dolore; exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id euenit in ætate puerili; raro in medio corpore: sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ *improba* uocatur: Ea colore uel sublimida, uel subnigra, uel alba esse consuevit. Circa hanc autem, uehemens inflammatio est; & cum ad aperta est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est: Neque enim ea, faba maior est. Atque hæc quoque *oritur* in eminentibus partibus, & fere noctu: Vnde nomen quoque à Græcis *ei improba* impositum est. In omni uero pustularum curatione, primum est, motum ambulare atque exerceri: Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acerbis & extenuantibus: eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc, si qui iam robustus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere: oleoque uinum miscere, & sic ungere: Tum descendere in solum. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit, imponenda lenticula est; detra: Etæque summa pellicula, ad medicamentum lenia transeundum; post lenticulam, rectè herba quoque sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Vlcerata ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine feni: Græci mixta, sic, ut his inuicem rosa atque intubi succus adijciatur, donec mellis crassitudo fiat. Propriè ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem *trypitum* uocant, P. * VIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent, tum hoc illini.

De scabie, & eius curatione.

Scabies uero, est humor cutis rubicundus, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio priuens, serpitque in quibusdam citò. Atque in alijs quidem ex toto definit, in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quod asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur: Itaque eam, quæ talis est, *exple* (id est seram) Græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem, quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spodijs, croci, æruginis, singulorum P. * I. cadmix P. * VIII. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris P. * I. ceræ P. * III. picis liquidæ hemina, olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum auctorem refertur: Habet hoc, farine lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoque licitum, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus rectè miscentur, & ex passo coquantur: Idque omnè pituitam ubique sustinet. At si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, uel sulphur pice liquidæ mixtum sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulatur.

De impetiginis speciebus, & curationibus.

Impetiginis uero species sunt quatuor. Minimè mala est, quæ similitudine scabiem representat: Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ab ea, quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uidenturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus, interposito tempore, squamulæ resoluuntur; certioribusque hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulæ fere, sed asperius, rubicundiusque, figuras uarias habens: Squamulæ ex summa cute discedunt, rosæb maior est, celerius & latius procedit; certioribusque etiam nonnunquam prior temporibus, et fit, et de finit: rubrica cognominatur. Tertia etiam num deterior est. Nam & crassior est, & durior, & magis tumet in summa cute finditur, & uehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & late & tardè eminas serpit. In temporibus autem oritur aut definit, neque ex toto tollitur: nigre cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quædam subalbidas, quædam lenticulæ similes: quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Atioquin uero humor eius albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque larius. Hæc uero omnia maxime genera oriuntur in pedibus & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud ualentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem nitri P. * II. sulphuris P. * III. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quædam subalbidas, quædam lenticulæ similes: quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Atioquin uero humor eius albidus est, cutis dura atque fissa est, proceditque larius. Hæc uero omnia maxime genera oriuntur in pedibus & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud ualentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem nitri P. * II. sulphuris P. * III. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

LIBER QUINTVS

De papulis, & earum curatione. *

Papularum uero duo genera sunt: Altera est, in qua per minimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leuiter que roditur, medium habet paulillo leuius, tarde serpit, id que uitium maxime rotundum incipit, eadem que ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam *αγρία* Græci appellant: In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturque; ac uehementius & roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem uertitur. Sed leuis papula, etiam si ieiuna satia quotidie defricatur, sanescit. Maior, commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: Alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum [P. * I. cantharidum purgatarum] P. * II. sulphuris ignem non experti tantundem, resinæ terebinthinæ liquidæ [P. * XX. farinæ lolij sext. iij. gith cyathos tres: picis crudæ sext.

De uiriliginis speciebus, id est de Alphi & Mela, & Leuce, & earum curatione.

Viriligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen feeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. *αλφω* uocatur, ubi color albus est, fere subasper, & non continuus, ut quadam quasi guttæ dispersæ esse uideantur: Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. *μελας* colore ab hoc differt: quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. *λευκη* habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, & altius descendit; in eaque albi pilis sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt: sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas, in quibusdam, uarijs temporibus & oriuntur, & desinunt: Leuce quem occupauit, non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: Altimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio demptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur: Incidit enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit (quod fere fit in duobus prioribus) remedijs locus est: Si humor albidus, sanari non potest: Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero, quod curationem recipit, imponenda lenicula mixta cum sulphure & thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Hirenem auctorem refertur: Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His in sole uiriligo perungitur: deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie quidem Myrone auctore, eos, quos alphi uocari dixi, hoc medicamento perungunt, sulphuris [P. p. Z. aluminis scissilis] P. p. Z. nitri [P. * IIII. myrti radice contrita aceta] bulum miscent: deinde in balneo super uiriliginem inspergunt farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hæc uero, quos melanas uocari dixi, curantur, cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorem insperguntur, tum genus id uiriliginis defricatur.

LIBER SEXTVS.

De uitij singularium corporis partium. Cap. I.

De capillis fluentibus.



DIXI de his uitij, quæ per totum corpus orientia; medicamentorum auxilia desiderant. nunc ad ea ueniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consueverunt, orsus à capite. In hoc igitur, capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur, adijcit enim uim quandam ad continendam ladanum, cum oleo mixtum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. nam quo minus caput quibusdam ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

De porriginis & eius curatione.

Cap. II.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quadam quasi squamulæ surgunt; exque à cute resoluuntur; & interdum madent, multo sapius sicæ sunt. Idque euenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco; huic quoque, modo malo odore, modo nullo accidente, fereque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. ac neque sine aliquo corporis uitio nascitur, neque ex toto inutile est. nam bene integro capite non exit: Vbi aliquid in eo uitium est, non incommodum est, summam autem potius subinde corrumpi, quam id quod nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde peccando repurgare, quam id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit (quod humore se quente fieri potest, magisque si id etiam mali odoris est) caput sæpe radendum est, dein id super adiuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus: quale est nitrum cum aceto, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficiatur, uehementioribus uti licet; cū eo, ut sciamus, utique in recenti uitio id inutile esse.

EST etiam ulcus, quod à fici similitudine, *σικωσις* à Græcis nominatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo uerò duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum est; alterum humidum & inæquale. ex duro, exiguum quiddam & glutinosum exit; ex humido, plus, & mali odoris. Fit uerò utrunque in his partibus, quæ pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum & rotundum est, maxime in barba: Id uerò quod humidum, præcipue est in capillo. Super utrunque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum, & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrastapharmacum ex aceto subactum; terra quoque *erithrea* ex aceto liquata, recte illinitur.

Arearum quoque duo genera sunt. commune utrique est, quod emortua summa pellicula, pili prius extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris; increscitque utrunque in alijs celeriter, in alijs tardè. Per quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabrâ fecit, sed ea, quæ *ἀλαπρία* nominatur, sub qualibet figura dilatatur: fit & in capillo & in barba. Id uerò, quod à serpentis similitudine, *ὀφιοσις* appellatur, incipit ab occipitio; duorum digitorum latitudinem non excedit; ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uicium in qualibet ætate est; hoc fere in infantibus: Illud uix unquam sine curatione; hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arearum, scalpello exasperant. quidam illinunt adurentia ex oleo, maximeque chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum tãpsia inducunt. sed nihil melius est, quam nouacula quotidie radere; quæ, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ, neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento. Scripsero satis est.

PENE ineptiæ sunt, curare Varos, & Lenticulas & Ephelidas. sed eripi tamen formis curatus sui non potest. Ex his autem, quas supra proposui, uari, lenticulæque uulgo notæ sunt; quamuis ratio ea species est, quam *ἐρύων* Græci uocant, cum sit ea lenticula rubicundior & inæqualior: ipsa uerò à plerisque ignoratur; quæ nihil est, nisi asperitas quædam & durities mali coloris. cetera non nisi in facie; Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco, uisum operæ pretium non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis, manè eluendum est, oleoque leuiter ungendum. Epheliden tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uerò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices, potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctoreta refertur: In ea, pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ cimoliz subcerulæ, nucum amararum, farinæ hordei atque erui; struthij albi, fertulæ cãpanz seminis. quæ omnia contrita, melle quam amarissimo coquantur; illitumque à uespere usque mane, eluitur.

SED hæc quidem mediocria sunt: Ingentibus uerò & uarijs casibus, oculi nostri patent. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum, & dulcedinem conferant, summa curatendi sunt. Protinus autem orta lippitudine, quædam notæ sunt, ex quibus quærenturum sit, colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita coeperint; si ea pituita lacrymæ mixta est, & ea lacryma calida est; pituita uerò alba & mollis, tumor non durus: longæ ualeitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida, pituita paulum, tumor modicus: Idque in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. Idque lippitudinis genus minimè cum dolore est, sed uix ante uiginti diem tollitur: nonnunquam per duos menses durat: sed quandoque finitur. Si pituita alba & mollis esse incipit, lacrymæque miscetur; aut si simul hæc utrunque oculum inuaserunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca & arida, dolorem quidem mouet, sed maturius desinit; nisi quid exulcerauit. Tumor magnus, si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est. si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulcerat; & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillisue est; ubi super magnum dolorem, lacrymæ salz, calidæque eunt, aut etiam si tumore inflato, diu lacryma cum pituita profluit. Peius etiam num est, ubi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit; nocturna uigilia urget. si quidem sub his oculis plerumque rumpitur: uotumque est, ut tantum exulceretur: Intus ruptum oculum febricula inuat: Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est, si de nigro aliquid albidum factum est; diu

manet. at si asperum, crassum est; etiam post curationem, uestigium aliquod relinquit. Curari uero oculos sanguinis detractione, medicamento; balneo, uino, uetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit: sed eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicinae summa est. neque minus in abstinentia & alui ductione saepe auxilij est. Hos igitur interdum inflammatio occupat: Ubi cum tumore in his dolor est, sequiturque pituita curfus nonnunquam copiosior uel acior: nonnunquam utraque parte moderatior. In eiusmodi casu, prima omnium sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die, loco obsecuro cubare debet, sic ut a sermone quoque abstineat. nullum cibum assumere (si fieri potest) ne aqua quidem: si minus, certe quam minimum eius. Quod si graues dolores sunt; commodius secundo die: si tamen res urget, etiam primo, sanguis mittendus est: utique si in fronte uenae tument, si firmo corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem curationem requirit; aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die, duci oportet. At modica inflammatio, neutrum ex his auxilium desiderat. satisque est, uti quiete & abstinentia, Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atque acior fiat: sed secundo die dari debet, id quod lenissimum uideri potest ex his, quae pituitam faciunt crassiorem: qualia sunt oua sorbilia. Si minor uis urget: pulicula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibusque diebus, quantum inflammationi detrahatur, tantum adijci cibis poterit: sed generis eiusdem: utique ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his, quae extenuant, sumatur: nihil potui, praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die, croci P. * I. & farina candida quam tenuissimam P. * II. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudine habeat: idque in linteolum illinere, & fronti agglutinare; ut compressis uenis, pituita impetum cohibeat. si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiat, nihil interest. Super inungi uero oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur; myrrhae, ad fabae; papaueris lacrymae ad lenticae magnitudinem. eaque cum passo conterantur, & specillo super oculum inducatur. Aliud ad idem; Myrrhae P. * I. Mandragorae succi P. * II. papaueris lacrymae P. * II. foliorum roseae, acutae seminis, singulorum P. * III. acaciae P. * III. gummi P. * VIII. Et haec quidem interdum. noctu uero, quo commodior quies ueniat, non alienum est superimponere candidi panis interiore partem ex uino subactam: Nam & pituitam reprimat, & siquid lacrymae processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id & durum, propter magnum oculorum dolorem uidetur; oui & album, & uirellus in uas defundendum est, adijciendumque eo mulsi paulum, idque digito permiscendum: Ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quae id excipiat; superque oculos imponi. Ea res & leuis est, & refrigerando, pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque hordeacea cocta, & cum malo cototheo cocto mixta commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo porissimum uri expresso, si leuior impetus est, ex aqua; si maior, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant; & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commode potest; & cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est, quae a Graecis uocant. satisque est puero, quod erui; uiro, quod fabae magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum, primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conijcitur: saepe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. A secundo die, graui quoque lippitudini, per indita medicamenta recte succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel alui ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse, manifestum est.

De diuersis oculorum collirijs.

M V L T A autem, multorumque auctorum colliria ad id apta sunt, nouisque etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta, & modice reprimentia facile & uarie misceantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collirium.

E S T igitur Philonis, quod habet cerussae elotae, spodij, gummi, singulorum P. * I. papaueris lacrymae combustae P. * I. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se terri, deinde mixta, iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore; gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime prestare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricentur.

Dionysij collirium.

Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymae combustae, donec tenerescat, P. * I. thuris combustae, gummi, singulorum P. * II. spodij P. * III.

Cleonis collirium.

Cleonis nobile admodum; papaueris lacrymae frictae P. * I. croci P. * I. gummi P. * I. quibus cum teruntur, adijcitur rosae succus, aliud eiusdem ualentius; squamam eris (quod *σόμμη* appellant) P. * I. croci P. * II. spodij P. * III. plumbi & eloti & combusti P. * VI. gummi tantundem. eius aliud quoque

quoque id idem est: maxime ubi multa pituita profluit. castorei / P. * Z. aloes / P. * L. croci / P. *
X I. myrrhe / P. * II. lycij / P. * III. cadmie curate / P. * VIII. stibis tantundem, acaciz succi / P. *
X II. quod cum gummi miscuit id quod habet liquidum in pixidecula seruatur. Theodotus uero huic
compositioni adiecit papaueris lacrymę combustę / P. * zris combusti & eloti / P. * II. nucleos palmaru
combustos numero / X. gummi / P. * XII.

Theodoti collirium, Acharisum appellatum.

A T. ipsius Theodoti, quod a quibusdam ex eo nominatur, eiusmodi est. castorei, nardi Indici
singulorum / P. * I. lycij / P. * II. papaueris lacrymę tantundem, myrrhe / P. * II. croci, cerussę elotę,
aloes, singulorum / P. * III. cadmie botryodis elotę, zris combusti, singulorum / P. * VIII. gummi / P.
* VIII. acaciz succi / P. * XX. stibis tantundem: quibus aqua pluuiatilis adijcitur.

Cythion, uel cephrion collirium.

Præter hæc, ex frequentissimis collirijs est id quod quidam a cinereo colore, quidam a cinereo colore, ap-
pellant; amyli, tragacanthę, acaciz succi, gummi, singulorum / P. * I. papaueris lacrymę / P. * II. cerul-
is elotę / P. * VII. spumę elotę / P. * XIII. quę æque ex aqua pluuiatili conteruntur.

Euelpidis collirium, tryzodes nominatum.

Euelpides autem (qui ætate nostra maximus fuit oculus medicus) utebatur eo, quod ipse compos-
fuerat; reusque nominabat. castorei / P. * II. lycij, nardi, papaueris lacrymę, singulorum / P. * I. croci,
myrrhe, aloes, singulorum / P. * III. zris combusti / P. * IX. cadmie & stibis, singulorum / P. * XII.
acaciz succi / P. * XXVI. gummi tantundem. quod grauior uero quæque inflammatio est, eo magis le-
niri medicamentum debet, adiecto uel albo oui, uel muliebri lacte. at si neque medicus, neque medicamē-
tum præsto est, sapius utrumlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum factu, infusum, id malum lenit.
Vbi uero aliquis releuatus est, iamque cursus pituitę constitit, reliquias fortasse leniores futuras, disci-
tunt balneum, & uinum. Igitur lauati debet leuiter ante ex oleo perfricatus, diutiusque in cruribus, &
femnibus, multa que calida aqua fouere oculos; deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi; a bal-
neo cauere, ne quo frigore afflatus uel ledatur: post hæc cibo paulo pleniore, quam ex eorum dierum con-
suetudine, uti; uitatis tamen omnia pituitam extenuantibus: uinum bibere lenę, subausterę, modicę
mentis, neque effusę, neque timidę; ut neque cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturque intus late-
tia acia. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem, quam attulerat (quod incidere
his solet, qui manente adhuc pituitę cursu, festinatu) quam primum discedere debet: nihil eo die ui-
ni assumere: cibi minus etiam quam pridie. deinde cum primum satis pituita substitit, iterum ad usum
balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam, siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus die-
bus neque dolor, neque inflammatio, & minime pituitę cursus finiatur. quod ubi incidit, iamque ipsa ue-
lut res matura est, ab his hisdem auxilium petendum est: id est, balneo ac uino. hæc enim ut in recen-
tibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt & accendere, sic in ueteribus, quę nullis alijs auxilijs ces-
serunt, admodum efficacia esse consueverunt. uidelicet hic quoque, ut alibi, cum secunda uana fuerint, con-
trarijs adiuantibus. Sed ante tonderi ad cutem conuenit. deinde in balneo aqua calida quamplurima
caput atque oculos fouere: tum utrumque penicillo detergere, & ungere caput irino unguento; contine-
reque in lectulo se donec omnis calor, qui conceptus est, finiatur, desinatque sudor, qui necessariò in capi-
te collectus est. Tum ad idem cibi uinique genus ueniendū sit, uti portiones meracę sint; obtegendumque
caput, & quiescendum. sepe enim post hæc grauis somnus, sepe sudor, sepe alui deiectio, pituitę cursus
finit. Si leuatum malum est (quod aliquando sæpius fit) per plures dies idem fieri oportet, donec ex to-
uentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio, tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat:
proprie enim moritur id (quoniam oculi procidunt) Græci appellant. His utique, si uires patiuntur, san-
guinem mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremque in eadem indici necessarium est. Opus au-
tem lenissimis medicamentis est: Ideoque Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est,
utuntur: Sed optimum est Nilei: neque de ullo magis inter omnes auctores conuenit.

Nilei collirium omnium optimum.

ID. habet nardi Indici, papaueris lacrymę, singulorum / P. * I. gummi / P. * I. croci / P. * II. fo-
liorum rosę recentium / P. * III. quę uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero coguntur. Neque
alienum est, malicorium, uel fertulam campanam ex uino coquere, deinde conterere: aut myrrham ni-
gram cum rosę folijs miscere; aut hyoscyami folia cum oui rosti uitello, aut farinam cum acaciz succo,
uel passo, aut mulso. quibus si folia quoque papaueris adijciuntur, aliquantò ualentiora sunt. Horum
aliquo præparato penicillo fouere oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua ante me myrti, uel ro-

Euelpides medicus oculus. qu.

Uo grauior quę inflammatio e-
eo magis leniri medicamentum debet
si neque medicus, neque medicamentum præsto
est, sapius utrumlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum
factu, infusum, id malum lenit.

Vbi aliquis releuatus est, iamque cursus
pituitę constitit, reliquias fortasse leniores
futuras, discunt balneum, & uinum.

Igitur lauati debet leuiter ante ex oleo
perfricatus, diutiusque in cruribus, & femnibus,
multa que calida aqua fouere oculos; deinde per caput
prius calida, tum egelida perfundi; a balneo cauere,
ne quo frigore afflatus uel ledatur.

post hæc cibo paulo pleniore, quam ex eorum
dierum consuetudine, uti; uitatis tamen omnia
pituitam extenuantibus: uinum bibere lenę, subausterę,
modicę mentis, neque effusę, neque timidę;

ut neque cruditas ex eo, & tamen somnus fiat,
lenianturque intus latentia acia. Sed si quis in balneo
sensit maiorem oculorum perturbationem, quam attulerat
(quod incidere his solet, qui manente adhuc pituitę cursu,
festinatu) quam primum discedere debet:

nihil eo die uini assumere: cibi minus etiam quam
pridie. deinde cum primum satis pituita substitit, iterum
ad usum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam,
siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus diebus
neque dolor, neque inflammatio, & minime pituitę cursus
finiatur.

quod ubi incidit, iamque ipsa uelut res matura est,
ab his hisdem auxilium petendum est: id est, balneo ac
uinum. hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt,
quia concitare ea possunt & accendere, sic in ueteribus,
quę nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse
consueverunt.

uidelicet hic quoque, ut alibi, cum secunda uana fuerint,
contrarijs adiuantibus. Sed ante tonderi ad cutem
conuenit. deinde in balneo aqua calida quamplurima
caput atque oculos fouere: tum utrumque penicillo
detergere, & ungere caput irino unguento; contine-
reque in lectulo se donec omnis calor, qui conceptus est,
finiatur, desinatque sudor, qui necessariò in capite
collectus est.

Tum ad idem cibi uinique genus ueniendū sit, uti
portiones meracę sint; obtegendumque caput, & quies-
cendum. sepe enim post hæc grauis somnus, sepe sudor,
sepe alui deiectio, pituitę cursus finit. Si leuatum
malum est (quod aliquando sæpius fit) per plures dies
idem fieri oportet, donec ex toto uentur.

Uo grauior quę inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat.
si neque medicus, neque medicamentum præsto est, sapius utrumlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum factu, infusum, id malum lenit.
Vbi aliquis releuatus est, iamque cursus pituitę constitit, reliquias fortasse leniores futuras, discunt balneum, & uinum.

se folia decocta sint: deinde ex illis aliquid imponi. Preter hec, ab occipitio incisa cute, cucurbitula ad-
mouenda est. Quod si per hec restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus per-
manet; scire oportet, lumen esse amissum. deinde futurum, ut inarescat is, aut in pus uertatur. Si suppu-
ratio se ostendit, ab eo angulo, qui propior tempore est, incidi oculus debet; ut effuso pure, & inflam-
matio ac dolor finiat, & intus tunice residant; quod minus foeda postea facies sit. Utendum deinde uel
hisdem collirijs est, ex lacte, aut ouo, uel croco, cui album oui misceatur. Ac si induruit, & sic emortuus
est, ne in pus uertetur: quatenus foede prominebit, excidendum erit: sic ut hamo summa tunica appre-
hendatur, infra id deinde scalpellum incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis
dolor finiat. Hisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde
per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in
palpebris: & in his ipsis oculis, modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est,
bus minuendus: lac potui dandum, ut acria, quae leserunt, leniantur. Quod ad cataplasinata & medica-
menta pertinet: his utendum, quae aduersus inflammationes proposita sunt. Atque hic quoque Nilei
collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebre parte est, ad cataplasinata aptissi-
mum est lini semen ex mulso coctum; aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, & curatione eorum.

Pustulae quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. quod si inter initia protinus incidit:
magis etiam seruanda sunt, quae de sanguine & quiete supra posui; sin ferius, quam ut sanguis mitti pos-
sit: alius tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique uictus ratio seruanda est. Medica-
mentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

Quandous collirium ad pustulas oculorum.

ID quoque, quod Philalethos uocatur, huic aptum est: Myrrha, papaueris lacrymae, singulorum
P. * I. plumbi eloti, terre samie (quae aene uocatur) tragacanthae, singulorum P. * III. stibis cocti, amy-
li, singulorum P. * VI. spodij eloti, cerussae elote, singulorum P. * VIII. Quae aqua pluuiatili exci-
piuntur. Vfus collirij, uel ex ouo, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, & eorum curatione; & de duobus collirijs.

EX pustulis ulcera interdum fiunt, ea quae recentia, & quae lenibus medicamentis nutrienda sunt, &
hisdem fere, quae supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hec, quod duobus uocatur. Habet etiam
combusti, & eloti, papaueris lacrymae fricta, singulorum P. * I. spodij eloti, thuris, stibis cocti & elo-
ti, myrrhae, gummi, singulorum P. * II.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Euenit etiam, ut oculi, uel ambo, uel singuli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant: idque &
acer pituita curfus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque
hisdem lenibus medicamentis, ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere
& implere consueverunt. Vitandaque omni modo causa, quae lacrymas excitet: curaque domesticorum.
quorum etiam si quid tale incidit, eius notitiae subtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres
cibi, non alio magis nomine his nocent, quam quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Genus quoque uitij est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur: Id est, Graeci nomi-
nant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit. Sed fere tempore interposito,
pituita curfus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit.
His alius ducenda, caput ad cutem tondendum, diuque quotidie ieiunis perficandum. His, ambulationi-
bus, aliisque exercitationibus diligenter utendum; gargarizandumque ex mulso, in quo nepeta, & pin-
guis ficus decocta sit: sepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, lacte uinoque
pingui utendum; bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia da-
da sunt, ne acriorem pituitam concitent. Super ipsos uero pediculos alia, quae necare eos & prohibere, ne
similes nascatur, possint: Ad id ipsum, spume nitri P. * I. sandaracae P. * I. uue taminie P. * I. simul
teruntur, adijeturque uetus oleum, pari portione, atque acetum, donec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus me-
dicamentis curantur: & de Andrea collirio, & de duobus uocatur.

Haecenus oculorum morbi, lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quae diuer-
sam

fam curationem desiderant; fereque in inflammationibus nata sunt, sed finitis quoque his manentia. Atque in primis, in quibusdam perseverat tenuis pituita curfus: quibus alius ab inferiore parte euocanda est: demendum aliquid ex cibo. Neque alienum est illi frontem compositione Andree, Quæ habet gummi/P. * I. cerussæ, stibis, singulorum/P. * II. spumæ argenti & coctæ & elotæ/P. * III. Sed & ea spuma ex aqua pluuiatili coquitur, & arida hæc medicamenta, ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque super iniiciendum est, ex farina, quæ frigida aqua coacta sit: cuiusque aut acaciæ succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoque, inciso uertice, recte accommodatur; aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod habet squamæ æris, papaueris lacrymæ, singulorum/P. * I. ceruini cornus combusti, & eloti, plumbi/eloti, gumi, singulorum/P. * III. thuris/P. * XII. Hoc collirium, quia cornum habet, *κέρκετος* nominatur. Quotiescunque non adicio, quod genus humoris adijciendum sit, aquam intelligi uolo.

Memigmenon Euelpidis collirium.

AD idem Euelpidis, quod *μειγμαμένον* nominabat. In eo, papaueris lacrymæ, & albi piperis singulæ uncia sunt, gummi libra, æris combusti/P. * I. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquā, profunt balneum & uinum. Cumque omnibus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum præcipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quæ pituitam crassiorem reddunt (sicut in hoc genere materiæ maxime promptum est) confugiendum est ad ea, quæ quia uentrem, corpus quoque attingunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, & de curationibus singulorum.

AT ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consuerunt. Ex his, supercrescentia, collirio, quod *μειγμαμένον* uocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, ex eo, quod *κρίνον* nominatur.

HABET æruginis/P. * III. gummi tantundem, ammoniaci, minij, sinopici, singulorum/P. * XVI. Quæ quidam ex aqua, quidam, quod uehementiora sunt, ex aceto terunt.

Phynon collirium Euelpidis.

ID quoque Euelpidis, quod phynon appellabat, hunc utile est croci/P. * I. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum/P. * II. æris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum/P. * III. piperis albi/P. * VI. Sed ante *κρίνον* hoc ungendum est.

Sphæron collirium Euelpidis.

ID quoque eiusdem, quod sphæron nominabat, eodem ualeat. Lapis hematitis eloti/P. * II. piperis grana sex, cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ, singulorum/P. * III. croci/P. * IIII. gummi/P. * VIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

Liquidum Euelpidis collirium.

Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat: in quo erant hæc. æruginis/P. * minij combusti, atramenti sutorij, cinnamomi, singulorum/P. * III. croci, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum/P. * I. myrrhæ/P. * II. æris combusti/P. * III. cineris ex odoribus/P. * III. piperis grana. * V. Hæc ex uino aultero teruntur: Deinde cum passi tribus heminis decoquantur, donec corpus unum sit: Idque medicamentum uetustate efficacius fit.

De canis oculorum ulceribus, & curationibus.

CAVA uero ulcera commodissime implentur ex his, quæ supra posita sunt, Sphæron, & id quod *κρίνον* uocatur. Idem Sphæron uetustis ulceribus, & uix ad cicatricem uenientibus, optime succurrit.

Hermionis collirium.

EST etiam collirium, quod cum ad plura ualeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad Hermionem auctorem: habet piperis logi/P. * IZ. albi/P. * V. cinamomi, costi, singulorum/P. * I. atramenti sutorij, nardi, casia, castorei, singulorum/P. * II. gallæ/P. * V. myrrhæ, croci, thuris, lycij, cerussæ, singulorum/P. * VIII. papaueris lacrymæ/P. * XII. albes, æris combusti, cadmiæ, singulorum/P. * XVI. acaciæ, stibis, gummi, singulorum/P. * XXV.

De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus factæ sunt: & quomodo curari debeant:

& de Asclepiæ, & Canopitæ, & Pyxino collirijs.

Factæ uero ex ulceribus cicatrices duobus uitijs periclitantur: ne aut caue, aut crassæ sint. Si caue

sunt, potest eas implere id, quod sphæron uocari dixi; uel id, quod asclepias nominatur: habet papaueris lacrymæ/P. * II. sagapeni, opopanax, singulorum/P. * III. eruginis/P. * IIII. cumini/P. * VIII. piperis/P. * XII. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum/P. * XVI. At si crassæ cicatrices sunt, extenuant uel Smilion, uel Canopite collirium: quod habet cinnamomi, acaciæ, singulorum/P. * I. Cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ, papaueris lacrymæ, gummi, singulorum/P. * II. piperis albi, thuris, singulorum/P. * III. æris combusti/P. * IX. cum aqua pluuiatili. uel Euelpidis Pyxinum: quod ex his constat: Salis fossilis/P. * IIII. ammoniaci, thymiamatis/P. * VIII. papaueris lacrymæ/P. * XII. cerussæ/P. * XV. piperis albi, croci, ficuli, singulorum/P. * XXXI. gummi/P. * XIII. eadmiæ elotæ/P. * IX. Maximè tollere cicatricem uidetur id, quod habet gummi/P. * III. eruginis/P. * I. crocomagmatis/P. * IIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

EST etiam genus inflammationis, in qua, si cui tument ac diffunduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti necessarium est: multaque aqua calida caput, atque oculos fouere: gargarizari ex lenticula, uel ex fici cremore; innungi acribus medicamentis, quæ supra comprehensa sunt: maximeque eo, quod sphæron nominatur, quod lapidem hæmatitem habet. Atque alia quoque utilia sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt: de qua protinus dicam. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur; interdum maior, interdum leuior; nonnunquam etiam ex aspritudine, lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, sitque ea in alijs breuis, in alijs longa, & quæ uix unquam finiatur. In hoc genere, ualitudinis, quidam crassas, durasque palpebras, & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt: uersasque, quotidie medicamentis suffricant. Quæ neque nisi in magna, uetustaque aspritudine, neque sæpe faciendæ sunt: Nam melius eodem, ratione uictus, & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaque oculorum palpebras, aqua calida fouebimus: Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collirium.

AT medicamentum id, quod Cæsarianum uocatur, habet atramenti futorij/P. * I. myli/P. * I. piperis albi/P. * V. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum/P. * II. cadmiæ lotæ/P. * III. stibis/P. * VI. Satisque constat, hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualitudinis, idoneum esse; exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

Hieracis collirium.

ID quoque, quod Hieracis nominatur, ad aspritudinem potest. habet myrrhæ/P. * I. ammoniaci thymiamatis/P. * II. æruginis rase/P. * III. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopite est, & id quod Smilion uocatur, & id quod Pyxinum, & id quod Sphæron. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, uel quàm optimo melle satis commodè aspritudo curatur.

De Xerophthalmia.

EST etiam genus aridæ lippitudinis, Græci appellant, neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægraui pituita in hærescunt; quantoque minor generis huius impetus, tantò finis minùs expeditus est. In hoc uitio, multum ambulare, multum exerceri, lauare sæpe, ibique desudare, multaque frictione uti necessarium est. cibi qui neque impleant, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medij. manè, ubi concoxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargarizare: tum deinde caput, atque os diutius defricare.

Rhinion collirium.

Collirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ/P. * I. papaueris lacrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum/P. * I. lapidis hæmatitis, lapidis phrygij, lycij, lapidis fossilis, singulorum/P. * II. æris combusti/P. * III. ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros colliria.

SI uero scabri oculi sunt, quod maximè in angulis esse cōsuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est, potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rase, piperis logi, papaueris lacrymæ, singulorum/P. * II. piperis albi, gummi, singulorum/P. * III. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum/P. * VI. nullum tamen melius est, quàm Euelpidis, quod Euphorion nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis assij, singulorum/P. * II. gummi/P. * XIII. piperis albi/P. * III. croci/P. * VI. plosorici/P. * XIII. Nulla autem per se materia est, quæ pforicum nominetur, sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus, ex aceto simul conteruntur, idque in uas fictile additum, & contextu ficulneis folijs, sub terra reponitur, sublatumque post dies uiginti, rursus teritur, & sic appellatur. Verù in basilico quoque collirio conuenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, & mel, & uinum. succurritque, & his, & aridæ lippitudini, si quis partem ex uino subactum, super oculum imponit. nam cum fere sit humor aliquis, qui modò ipsum oculum, modò angulos, aut palpebras exasperat, sic & si quid prodit humoris, extrahitur; & si quid iuxta est, repellitur.

Ad caliginationem

Ad caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur, remedia et colliria.

Caligare uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel aliam, consueverunt. si ex reliquijs lippitudinis id uitium est, adiuuat collirium, quod asclepias nominatur; adiuuat id, quod ex crocomagmate fit.

Caligare oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac, propter senectutem, imbecillitatem uel aliam consueverunt.

Compos.

Proprie etiam ad id componitur, quod *ἀσκληπιὰς* uocant. habet piperis, P. * I. croci ciliis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum, P. * II. psorici, gummi, singulorum, P. * III.

Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut etiam imbecillitatem fit.

At si ex senectute, alia uel imbecillitate id est, recte inungi potest, & melle quam optimo, & cyprino, & oleo uetere. Commodissimum tamen est, balsami partem unâ, & olei ueteris, aut cyprini partes duas, mellis quam acerrimi partes tres miscere. Vtilia quoque huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proximè, quæque ad extenuandas cicatrices, supra comprehensa sunt. Cuicumque uero oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo; ubi totum quidem corpus perficandum est: præcipue tamen caput; & quidem irino, donec insudet: uelandumque postea: nec detegendum, antequam sudor, & calor domi conquierint. tum cibus utendû acribus, & extenuantibus, interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

Nota. Cuicumque oculi caligabunt, si opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo fuit. Sud. gurg.

Caput non detegendum, antequam sudor & calor domi conquierint. Cib. qual. Gargariz.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoque (quam Græci *ἐνὸς ὕδατος* nominant) interdum oculi potentia, qua cernit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia, nonnunquam etiam certis obseruationibus discutitur. sanguinem ex fronte uel naribus mittere, in temporibus uenas adurere: gargarizando, pituitam euocare: suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. uicinus optimus est, qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

AC ne resolutio quidem oculorum (quam *παράλυσις* Græci nominant) alio uictus modo, uel alijs medicamentis curanda est: Exposuisse tantum genus uitij satis est. Igitur interdum euenit, modò in altero oculo, modò in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione neruorum, quæ uel hementer oculus ipse concussus est, ut his neque quòquam intendi possit, nec omnino consistat; sed huc illuc ne sine ratione moueatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

ἐνὸς ὕδατος interdum oculi potentia, qua cernit, se opponit.

Si inueterauerit, manu curanda est.

angu. ex fronte uel narib. mittere.

In temporib. uenas adurere.

Gargarizando pituitam euocare.

Suffumigare oculos acrib. medicamentis.

inungere expedit.

Uicinus optimus est, qui pituitam extenuat.

paralysis modo in altero oculo, modò in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione neruorum, quæ uel hementer oculus ipse concussus est, ut his neque quòquam intendi possit, nec omnino consistat; sed huc illuc ne sine ratione moueatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

Conu. med. t. n.

Calid. aqu. uisceraria.

Nonnulli cum aliquandiu nihil uiderent, repentina profusione alui, lumen repperunt. sic medicamentis mouentibus non alienum, quod omnino non in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Præter hæc, imbecillitas oculorum est, ex qua quidam interdum fati, noctu nihil cernunt, quod in foeminam bene respondentibus mensuris non cadit, sed sic laborantes inungi oportet humore iocineris maxime hircini; si minus, caprini, ubi ad alium coquitur, excepto; atque edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel asperitudinem extenuant, quidam contrito semine portulacæ, mel adijciunt eatenus, ne id ex specillo deflueret, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargarizationibus iisdem, his quoque utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.

ET hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur: Extrinsecus uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur; nihil commodius est, quam sanguine uel columbæ, uel palumbi, uel hirundinis inungere. neque id sine causa fit: cum horum acies extrinsecus læsa interposito tempore, in antiquum statum redeat, celeberrimeque hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonium restitui, quod per se sanescit. eorum ergo sanguis, nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussum uero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quam optimus teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo frigidamenti fiat: Id deinde miscendum

imbecillitas oculorum est, ex qua quidam interdum fati, noctu nihil cernunt, quod in foeminam bene respondentibus mensuris non cadit.

Sus iocineris hircini, ca.

Comu. med. t. n.

Exerc. baln. frict. gargariz.

Nota.

Extrinsecus uero, si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur; nihil commodius est, quam sanguine uel columbæ, uel palumbi, uel hirundinis inungere.

neque id sine causa fit: cum horum acies extrinsecus læsa interposito tempore, in antiquum statum redeat, celeberrimeque hirundinis.

Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonium restitui, quod per se sanescit.

eorum ergo sanguis, nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ & illi ipsi, & nobis.

Supra percussum uero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quam optimus teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo frigidamenti fiat: Id deinde miscendum

f. ii)

Extrinsecus uero, si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur; nihil commodius est, quam sanguine uel columbæ, uel palumbi, uel hirundinis inungere.

neque id sine causa fit: cum horum acies extrinsecus læsa interposito tempore, in antiquum statum redeat, celeberrimeque hirundinis.

Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonium restitui, quod per se sanescit.

eorum ergo sanguis, nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ & illi ipsi, & nobis.

De aurium morbis & est cum hordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici quæque prodiderunt: apparere cuilibet potest, uix ullum ex his, quæ supra comprehensa sunt, oculi uitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remedijs submoueri possit.

De aurium morbis, & curationibus. Cap. V.II.

Hactenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquantulum maius periculum est: nam uitia oculorum intra ipsos nocet: Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, mortemque præcipitant: quò magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo, ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere, & continere se debet: Postero die, si uehementius malum est, caput rondere, idque irino unguento calido perungere, & operire, at magnus cum febre, uigiliaque dolor, exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliquæ causæ prohibent, alijs soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata, proficiunt, siue fœni græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. recte etiam subinde admouentur spongiæ ex aqua calida expressæ. tum leuato dolore, ceratum circundari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen, melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet; adijci cataplasmata debet papaueris corticis fricti atque contriti, sic, ut ex his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passo mixto decoquatur. In aurem uerò infundere aliquod medicamentum oportet; quod semper ante tepefieri cõuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. & hæc quidem communia sunt. Medicamentum uerò est, & rosæ, & radicum haurundinum succus, & oleum, in quo lubrici cocti sunt, & humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita uerò ad inflammationem, doloremque leniendum, hæc fere sunt: castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur: deinde adijcitur his passum, uel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut inuicem modò rosa, modò passum instilletur; uel id, quod amarum in ægyptia faba est, conteritur, rosa adiecta; quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymæ; aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rosæ succo, uel castorei, myrrhæ, papaueris lacrymæ pares portiones cum passo; uel croci. P. * I. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum. P. * Z. quibus, cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho: idque ex primis medicamentis est; uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis, quæ habet castorei, opopanax, papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum. P. * II. spumæ lycij. P. * III. quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudine habeant, atque ita reponuntur. ubi usus requiritur, rursus idē medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum est, quotiescūque crassius medicamentum est, quod ut in aurem instillari possit, adijciendum eū esse humorem, ex quo id componi debet: donec satis liquidum sit. si uerò pus quoque aures habent, recte lyciū per se infunditur, aut irinū unguentum, aut portulicæ cum melle, aut centaureæ succus cū passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius cortice tepefactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhæ (quam stacten cognominant) P. * I. croci tantundem, nuces amaræ. P. * XV. mellis sesquicyathus; quæ contrita, cum utendum est, in cortice punici mali tepefiant. Ea quoque medicamēta, quæ oris exulcerati causā cõponuntur, æque ulcera aurium sanant; quæ si uetustiora sunt, & multa sanies fluit, apta compositio est, quæ ad auctorem Erasistratū refertur: piperis. P. * I. croci. P. * I. myrrhæ, myli cocti, singulorum. P. * II. æris cõbusti. P. * III. hæc ex uino teruntur; deinde ubi inauerunt, adijciuntur passi hemina tres, & simul coquantur; cum utendum est, adijcitur his mel, & uinū. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentū, quod habet lētisci. P. * I. gallæ. P. * I. omphacij. P. * I. succū punici mali. Est Menophili ualidum admodum, quod ex his constat: piperis longij. P. * I. castorei. P. * I. myrrhæ, croci, papaueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quàm optimi, singulorum. P. * III. quibus, cum teruntur, adijcitur acerum quàm acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, casia, singulorum. P. * I. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. * I. aloes. P. * II. mellis cyathi tres, uini sextarius; ex quibus uinum cū lycio decoquitur: deinde his alia miscentur, at si multum puris, malusque odor est; æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. * II. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquantur: ubi utendum est, dulce uinum miscetur; aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ acacia succi par pondus miscetur: hisque adijcitur hyoscyami succi dimidio minor, quàm unius ex superioribus portio: eaque trita, ex uino diluuntur. per se quoque hyoscyami succus satis proficit. Commune uerò auxilium aduersus omnes aurium casus, iamque usu comprobatum, Asclepiades composuit. In eo sunt, cinnamomi, casia, singulorum. P. * I. flores iunci rotundi, castorei, albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ niri, singulorum. P. * II. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conteruntur: atque ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo cõmune auxilium auribus laborantibus est, Polybi sphragis ex dulci uino liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, mixto uino per oticularium clysterem eluere, & tum infundere uinum austerum cum rosa mixtum: cui spodij paulum sit adiectum; aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis succum cum rosa aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ; si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur, & tum

& tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: & magis pus profluit; & caput utique tendendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargarizandum, & usque ad lassitudinem ambulandum, & cibo modico utendum est, si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundique aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbe sanguinalis, aut acacie adiecto. quod si super ulcera caro increuit, ea que mali odoris sanguinem fundit; aqua tepida elui debet; tum infundi id, quod ex thure, & zingibe, & aceto, & melle fit: aut mel cum crugine incoctum: squama quoque zris cum sandaraca contrita, per fistulam recte instillatur.

Adversus aurium vermes.

VBI uero vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi, cauendumque, ne postea nascantur. ad utrūque proficit album ueratrum cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo martium decoctum sit. sic emortui vermes, in primam auris partem prouocabuntur: unde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

SIN foramen auris compressum est, & intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho & dimidio, cruginis ratē, P. * II. adijciendum est; incoquendumque, & eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit: Item mellis, & rosę scrupuli duo: Item galbani P. * I. I. myrrhę cum melle, & fellistaurini, singulorum, P. * I. I. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

VBI uero grauius aliquis audire cepit (quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet: Apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera inna scitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle xugo, uel porri succus, aut cum mulso, nitri paulum; atque ubi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est: quod facilius ea per se diducta, oriculario specillo protrahatur. si sordes equę molles sunt, eodem specillo eximendę sunt. at si durę sunt, acetum, & cum eo nitri paululum coniiciendum est: Cumque emollię sunt, eodem modo elui aurem, purgarique oportet. quod si capitis grauitas manet: attondendum idem, & leniter, sed diu perfricandum est adiecto uel irino, uel laureo oleo, sic, ut utrilibet paululum aceti misceatur; tū diu ambulandum, leniterque post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibis quoque utendum ex imbecillissima & media materia; magis que assumendę dilutę potiones: nonnunquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem, castoreum cum aceto, & laureo oleo, & succo radiculę corticis; aut cucumeris agrestis succus adiectis contritis rosę folijs; immaturę quoque uux succus cum rosa instillatus, aduersus sorditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.

ALIUD uitij genus est, ubi aures intra se ipsas sonant; atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant: leuissimum est, ubi id ex grauedine est: peius, ubi ex morbis, capitis uel lōgis doloribus incidit: Pessimum, ubi magnis morbis uenientibus, maximeque comitali, prouenit. Si ex grauedine est, purgare aurem oportet, & spiritum cōtinere, donec inde humor aliquis expumet: si ex morbo, uel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem faciendā sunt: cibis non utendum nisi extenuantibus: In aurem dandus radiculę succus cum rosa, uel cū succo radicis ex cucumere agrestis, uel castoreum ex aceto & laureo oleo. ueratrum quoque cum aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, & inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his cepit, ideoque nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, uel irino, uel laureo oleo; aut huic mixtum castoreum cum succo nucum amararum; aut myrrha & nitrum, cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit uictus ratio: eademque faciendā sunt, quæ supra comprehendī: cum maiore quoque diligentia, & præterea, donec his sonus finiatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus, & inflammatio laureum oleū coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur: quibus quidā uel castoreū, uel myrrham miscent.

Ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda.

SOLET etiam interdū in aurē aliquid incidere, ut calculus, aliquodue animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanx paulum est; quod ipse is subit, & simul extrahitur; si non est secutus, aliudue animal est, specillū lana inuolutum, in resinā quam glutinosissimā, maximeque terebinthinā, demittendū, idque in aurem coniiciendum, ibique uertendū est: Vtique. n. comprehender & eximet; sin aliquid ex animæ est, specillo oriculario protrahendū est, aut hamulo retuso, paulū recuruato, si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi, sternutamēta quoque admota id cōmodē elidunt; aut oriculario clystere aqua uehementer intus cōpulsā, tabula quoque collocatur media in hærēs capitibus utrinque pendentibus; superque eā homo deligatur, in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat, sic, ut extra tabulā emineat: Tum malleo caput tabulę, quod à pedibus est, feritur: atque ita cōcussa aure, id quod inest, excidit.

f iiii

NARES uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquæ calidæ; id est spōgia expressa atque admota: fit & subiecto uase oris angustī, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, aut plumbi rectamento, aut cerussa; aut argenti spumam cum quolibet horum aliquis conterit; eique, dū teritur, inuicem uinum & oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudinem fecerit. si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresque crustas, & odorem foedum habent (quod genus Græci *ὀρνίθων* appellant) sciri quidem debet, uix er malo posse succurri: Nihilominus tamen hæc tentari possunt; ut caput ad cutē tondeatur, assidueque uehementer perfricetur, multa calida aqua perfundatur; multa ei deambulatio. sit; cibibus modicus, neque acer, neque ualentissimus; tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinæ terebinthinæ coniiciatur (quod specillo quoque inuoluta lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiat; sub his enim crustæ resoluuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent; puris ulceribus uapor aquæ calidæ subijciendus est; deinde adhibendum aut lycium ex uino dilutū, aut amurca, aut omphacium, aut mentæ, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit; aut interior scyllæ pars contrita sit, ut horum quilibet mel adijciatur; cuius cæteris admixtum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat; cum scylla utique pars maior; inuoluendumque lana specillum est, & in eo medicamento intingendum, eo quæ ulcera impleda sunt: rursusque linamentum inuolutum, & oblongum, eodem medicamento illinendū, demittendumque in narem est, & ab inferiore parte leniter deligandum: idque per hyemem & uer, bis die; per æstatem & autumnum, ter die fieri debet. Interdum uero etiam in naribus carūculæ quedam, similes muliebribus maxillis nascuntur; hæcque imis partibus, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero, est carūcula modò alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pendens narem implet; modò retrò, per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, ut post uiam conspici possit; strangulatque hominē, maxime austro aut euro flante; ferèque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat; quæ ferè *κακίνοδες* est: itaque attingi non debet. Illud aliud genus ferè quidem ferro curatur; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum, aut penicillum, ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracæ, singulorum / P. * I. atramenti sutorij / P. * II.

De dentium dolore, & curationibus. Cap. IX.

IN dentium autem dolore (qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest) uinum ex toto circuncidendum est. cibo quoque primo abstinendum; deinde eo modico, mollique utendum, ne mandentes dentes irriter; tum extrinsecus admouendum per spongiam uapor aquæ calidæ; imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendū; caputque uelandum est. quod si grauior is dolor est; utiliter & alius ducitur, & calida cataplasmata super maxillas iniiciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sepiusque mutatur. cuius rei causa, & quinque folij radix in uino mixto coquitur; & hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur, sic, ut paulum his salis adijciatur; & papaueris non nimium aridi cortices, & mādragoræ radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandū est, ne quod haustum erit, deuoretur. Ex populo quoque alba cortex radicis in hunc usum in uino mixto recte coquitur; & in aceto, cornu ceruinum rasum; & nepeta cum tedā pingui; ac ficus item pinguis, uel in mulso, uel in aceto, & melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. Specillum quoque lana inuolutum, in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. Quin etiam quedam quasi cataplasmata in derm ipsum illinuntur: in quem usum, ex malo puniceo acido, atque arido, malicorij pars interior cum pari portione gallæ & pinei corticis conteritur, misceturque his minium; eaque contrita, aqua pluuiatili cōguntur; aut panacis, papaueris lacrymæ, peucedani, uux taminæ sine seminibus, pares portiones conteruntur; aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ, peucedani, uux taminæ. Quidquid dentibus admotum est, nihilominus supra maxillam, ceratum, quale supra posui, esse debet; lana obiectum, quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum / P. * I. croci, pyretri, ficorum partes, singulorum / P. * III. Sinapis / P. * VIII. contrita, linteolo illinunt, imponuntque in humero partis eius; qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idque dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est: si uero exesus est dens; festinare ad eximendum eum, nisi res cōgite, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adijciendæ quedam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt: habet autem papaueris lacrymæ / P. * I. piperis / P. * II. ploreos / P. * X. quæ contrita galbano excipiuntur, idque circundatur aut Menemachi maxime ad maxillares dentes: in qua sunt croci / P. * I. cardamomi, thuris / fuliginis, ficorum partes, pyretri, singulorum / P. * I. III. sinapis / P. * VII. Quidam autem immiscent pyretri, piperis, claterij, singulorum / P. * I. aluminis scissilis; papaueris lacrymæ, uux taminæ, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum / P. * II. Quod si dolor exini eum cogit; & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo bacca hederæ coniecta in id foramen, dentem findit; isque fortè itans excidit: & plani piscis (quam pastinacam

nam nostri, *τρυφή* Græci uocant) aculeus torretur: deinde conteritur, resinaque excipitur; quæ dentis circumdata hunc soluit: & alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est, quia si dente seruato, dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agrestium experimento cogitur cum dens dolet, herbam mentastrium cum suis radicibus uelli debere, & in petrem consiji, supraquam infundi; collocarique iuxta sedentem hominem undique ueste contextum: tum in peluem candentes scilices demitti, sic, ut aqua regantur; hominemque cum hiantem ore uaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit; idque sæpe longiorem, sæpe annuam ualitudinem bonam præstat.

De tonsillis, & earum cura.

Cap. X.

SI uero tonsillæ sine exulceratione, per inflammationem intumuerint, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus. multa ambulatione utendum; caput in lecto sublimè habendum; gargarizandumque est ex reprimentibus. radix quoque ea, quæ dulcem appellant, contusa, & in passio, mulso uel decocta idem præstat. leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est: quæ hoc modo fiunt. Ex malo punico dulcis succus exprimitur, & eius sextarius intemigne coquitur, donec ei melis crassitudo sit: tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum /P. * II. per se conteruntur, paulatimque his adiunguntur uini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. Aut eiusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita ei adiunguntur. hæc uero /P. * V. omphacii /P. * I. cinnamomi, myrrhæ, casia, singulorum /P. * I. eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoque in hac ualitudine lenis esse debet, ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediatur, in lecto conquiescendum à cibo abstinendum, neque assumendum quidquam præter aquam calidam est: alius quoque ducenda est, gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum omphacio; Intrinsicus admouendus (sed aliquantulum diutius uapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiantur, si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt, deinde ex mulso, calido gargarizandum ex fico. At si modicus quidam tumor, & exulceratio est; furfurum cremori, ad gargarizandum paulum mellis adijciendum est, illinendaque ulcera hoc medicamento. Passi quàm dulcissimi tres heminæ ad unam coquantur, tum adijcitur thuris /P. * I. croci, myrrhæ, singulorum /P. * I. leniterque omnia rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est, atque hic quoque cibus lenibus opus est, quibus adijci dulce uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & que anthera sunt.

Cap. XI.

Ulceræ autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt, optimè his medicamentis curantur, quæ supra posita, ex malis punicis fiunt; continendusque sæpe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum; utendum ambulationibus, & non acri cibo. simulatque uero pura ulcera esse ceperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. prodestque assumptum pyrum mitium, pleniorque cibus, dum acerbis uacet. inspergiquæ ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adustis esse consueverunt, adhibenda sunt hæc compositiones, quas Græci *ἀνθρα* nominant: Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ, singulorum /P. * III. aluminis pares portiones, aut croci, myrrhæ, singulorum /P. * II. iris, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum /P. * III. iunci quadrati /P. * VII. aut gallæ, myrrhæ, singulorum /P. * II. aluminis scissilis /P. * II. rosæ foliorum /P. * III. quidam autem croci /P. * I. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum /P. * I. sandaracæ /P. * II. iunci quadrati /P. * III. miscent. Priora arida insperguntur; hoc cum melle illinitur, neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis. Verum ea longè periculosissima ulcera sunt, quas *ἀνθρα* Græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt; in uiris & mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumque os occupant; tum ad uiam, faucesque descendunt. quibus obsessis non facile fit, ut puer conualecat. ac mitior cogenda est exerceri ambulationibus, his quæ operibus, quæ superiores partes mouent; mittenda in balneum, iubendaque ibi calida aqua mammæ perfundere; tum alenda cibus lenibus, & his qui facile non ducenda est. Si pituita eius in os coit, uomere debet: Tum ipsa ulcera perungenda sunt melle, cui rhus, & collicito, melle, uel eo medicamento, quod ex moris fit; quorum succis, eodem modo, quo punici mali, que quidquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est, gargarizare debet ea, quæ adurendo, crustas ulceribus inducant; quale est scissile alumen, uel chalcitis, uel atramentum sutorum: prodest etiam fames & abstinentia, quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

LIBER SEXTVS

De gingivarum ulceribus.

Cap. XII.

Gingivæ quoque ulcera non alijs medicamentis egent, quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ in latere eius nascuntur, diutissime durant: Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non finit: ideoque limandus est. Solent etiam interdum iuxta dentes gingivæ tubercula quædam oriri dolentia, *napodōrris* Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perficere oportet; aut inter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta; deinde eluere os cremore lenticulæ; & inter hæc hiare, donec pituita satis profluat. In maiore uero inflammatione, ipsæ dem medicamentis utendum est, quæ ad ulcera oris supra posita sunt; & mollis linamenti paulum inuoluumendum aliqua compositione ex his, quas *avēpēs* uocari dixi; demittendumque id inter dentem, & gingivam: quod si durior erit, & id prohibebit; extrinsecus admouendus erit spongiæ uapor calidus, imponendumque ceratum. Si suppuratio se ostendet; diutius eo uapore utendum erit; & continendum ore calidum multum, in quo ficus decocta sit: Itemque subcridum incidendum, ne si diutius ibi pus permanserit, os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exciditur, sic, ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fouere eodem uapore: si maior est, lenticulæ cremore; uti hisdem medicamentis, quibus cetera ulcera oris curantur. Illa quoque ulcera in gingivis plerumque oriuntur: quibus eadem, quæ in reliquo ore, succurrunt. maxime tamen mandere ligultrum oportet, succumque eum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingivæ ulcere siue *napodōrris* fuit, siue non fuit diutius pus feratur: quod aut dente corrupto, aut fracto, uel aliter initato, offe, maximeque id per fistulam uenire consuevit. Ubi incidit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua excessit, recidenda est: si quid uitiosum est, radendum. post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero à dentibus gingivæ recedunt, eadem *avēpēs* succurrunt. Vtile est etiam pira, aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere: Idemque præstare non acce acutum in ore retentum potest.

De uia morbo & curatione.

Cap. XIII.

V V AE uehemens inflammatio terrere quoque debet: Itaque in hac, & abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res prohibet, alius utiliter ducitur; caputque super hæc uelandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rubus; & lenticulæ decocta sit. Illinenda autem ipsa uua, uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili, sic, ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur; constat ex his: alumine scissili; squama æris rubri; atramento sutorio, galla, myrrha, myfi: quæ per se contrita, mixtaque, rursus paulatim adiecto uino austero teruntur, donec is mellis crassitudo sit. Ubi horum aliquo illita uua est, chelidonie quoque succo per cochlear illita uua maxime prodest. Fere multa pituita decurrit; cumque ea quiescit, ex uino calido gargarizandum; quod si minor in ea inflammatio; lafer terere, ei que adijcere frigidam aquam satis est; eamque aquam cochleario exceptam, ipsi uue subijcere; ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quæ uel cum lalere, uel sine eo, hac curatione uue subiecta est.

De cancro oris.

Cap. XV.

SI quando autem ulcera oris cancer inuasit; primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, ei que occurrendum: deinde ipsa ulcera curanda. quod si in summa parte id uitium est, satis proficit *avēpēs* humido ulceri arida inspersa; sicciore, cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes due, auripigmenti pars una; si penitus malum descendit, chartæ combustæ partes tres, auripigmenti pars quarta; aut pares portiones salis fricti & iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est, linamentum in rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere, ne uicinum, & sanum locum lædant. quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coeijciunt, donec tabescere definat: deinde id acrum coquunt, donec exsicceretur: eumque salem contritum inspergunt. quoties autem medicamentum iniicitur, & ante, & post, os diluendum est uel cremore lenticulæ, uel aqua; in qua aut eruum, aut olea, aut uerbenæ decoctæ sint, sic, ut cuilibet eorum paulum mellis misceatur. acetum quoque ex scylla, retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficit: ex aceto cocto salis (sicut supra demonstratum est) rursus mixtum acetum: sed & diu continere utrumlibet, & id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id incidit; specillum lana inuolutum, in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum; ne per imprudentiam, adurentia deuoret. Et si dolor in gingivis est, mouenturque aliqui dentes, refici eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiunt, ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. & id quidem eque adustum, atque excisum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum uero ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum uisione nudantur: neque enim postea caro increfcit. Imponenda tamen adustis lenticulæ est,

est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

De parotibus, quae sub auribus oriuntur.

Cap. XVI.

HAEC in capite fere medicamentis egent. Sub ipsis uero auribus oriri parotides solent, modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est: itaque nullam nouam curationem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est; si ex aduersa ualitudine, illud inimicum est, maturarique & quam primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione.

Cap. XVII.

AD umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroque utendum sit; ante tentandum est, ut abstinere: alius his ducatur; imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ, & fuliginis, singulorum $\text{P.} \times \text{I.}$ cerussæ elotæ $\text{P.} \times \text{III.}$ plumbi eloti $\text{P.} \times \text{VIII.}$ ouis duobus; quibus etiam solani succus adiicitur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & uiterim conquiescere hominem, cibo modico uti, sic, ut uidentur omnia infantia.

De obscenarum partium uitio, & curationibus.

Cap. XVIII.

Proxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent; quarum apud Græcos uocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam usu sunt, cum omni fere medicorum uolumine atque sermone iactentur; apud nos foediora uerba, ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium, accommodata sunt. ut diffidit hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta seruantibus. neque tamen ea res a scribendo deterere me debuit: Primum ut omnia, quæ salutaria accepi, comprehenderem; dein, quia in uulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda est, quæ multisimè quisque alteri ostendit.

De colicis morbis, & curationibus.

Igitur si ex inflammatione coles intumuit, reduci que summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi uero glans contestæ est, oriculario quoque cystere inter eam, cutemque aqua calida inferenda est. Si mollitæ & extenuata cutis, ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est. Si tumor uicini, imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ folia ex uino cocta, sic, ut cuilibet eorum, dum tenetur, mellis paulum adijciatur; sursumque coles ad nentrem deligendus est (quod in omni curatione eius necessarium est) isque homo continere se debet, & abstinere a cibo, & potione aquæ tantum, si uindicta. a postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est; & cum ui quoque experiendum, an cutis sequatur; & si non parebit, teniter summa scalpello concidenda erit; nam cum sanies profluxerit, extenuabitur hic locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo uicta erit, siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra ue eam, in cole reperientur; quæ necesse est, aut pura sicca ue sint, aut humida & purulenta. si sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt; deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum; si leuis humor est, uino eluenda sunt; tum butyri & rosæ mollis paulum, & resinae terbinthinæ pars quarta adijcienda est, eoque utendum; aut si pus ex his profluit, ante omnia, elui mulso calido debet; tum imponi piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{II.}$ croci, myfi cocti singulorum $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ ex uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uuz madentiori, nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad eam, piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{I.}$ croci $\text{P.} \times \text{II.}$ myfi cocti $\text{P.} \times \text{I.}$ æris combusti $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ primò ex uino austero contemuntur, deinde ubi inaruerunt, iterum teruntur ex palmi tribus cyathis, & incoquuntur, donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoque cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulentam naturalia imponitur. folia quoque oleæ ex nouem cyathis uini coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis $\text{P.} \times \text{III.}$ lycij $\text{P.} \times \text{VIII.}$ mellis sesquicyathus, ac si plus puris est, id medicamentum ex melle; si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est, post curationem curare, quod si pus & multum, & cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paulum adijciatur; aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubium decoquendum est; eoque humore, eodem modo cum melle utendum; imponendaque eadem; aut etiam omphacium cum melle; aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis, aut æruginis, sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atque positio; aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ singulorum $\text{P.} \times \text{I.}$ minij sinopici $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ per se singula primò teruntur, deinde iuncta, iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant: tum in æneo uase leniter coquuntur, ne superfluant; cuiam guttæ

De parotidibus.

sub ipsis auribus oriri parotides solent, modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est: itaque nullam nouam curationem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est: si ex aduersa ualitudine, illud inimicum est, maturarique & quam primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione.

Ad umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroque utendum sit; ante tentandum est, ut abstinere: alius his ducatur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & uiterim conquiescere hominem, cibo modico uti, sic, ut uidentur omnia infantia.

De obscenarum partium uitio.

Proxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent; quarum apud Græcos uocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam usu sunt, cum omni fere medicorum uolumine atque sermone iactentur; apud nos foediora uerba, ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium, accommodata sunt. ut diffidit hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta seruantibus. neque tamen ea res a scribendo deterere me debuit: Primum ut omnia, quæ salutaria accepi, comprehenderem; dein, quia in uulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda est, quæ multisimè quisque alteri ostendit.

De colicis morbis.

Igitur si ex inflammatione coles intumuit, reduci que summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi uero glans contestæ est, oriculario quoque cystere inter eam, cutemque aqua calida inferenda est. Si mollitæ & extenuata cutis, ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est. Si tumor uicini, imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ folia ex uino cocta, sic, ut cuilibet eorum, dum tenetur, mellis paulum adijciatur; sursumque coles ad nentrem deligendus est (quod in omni curatione eius necessarium est) isque homo continere se debet, & abstinere a cibo, & potione aquæ tantum, si uindicta. a postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est; & cum ui quoque experiendum, an cutis sequatur; & si non parebit, teniter summa scalpello concidenda erit; nam cum sanies profluxerit, extenuabitur hic locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo uicta erit, siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra ue eam, in cole reperientur; quæ necesse est, aut pura sicca ue sint, aut humida & purulenta. si sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt; deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum; si leuis humor est, uino eluenda sunt; tum butyri & rosæ mollis paulum, & resinae terbinthinæ pars quarta adijcienda est, eoque utendum; aut si pus ex his profluit, ante omnia, elui mulso calido debet; tum imponi piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{II.}$ croci, myfi cocti singulorum $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ ex uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uuz madentiori, nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad eam, piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{I.}$ croci $\text{P.} \times \text{II.}$ myfi cocti $\text{P.} \times \text{I.}$ æris combusti $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ primò ex uino austero contemuntur, deinde ubi inaruerunt, iterum teruntur ex palmi tribus cyathis, & incoquuntur, donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoque cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulentam naturalia imponitur. folia quoque oleæ ex nouem cyathis uini coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis $\text{P.} \times \text{III.}$ lycij $\text{P.} \times \text{VIII.}$ mellis sesquicyathus, ac si plus puris est, id medicamentum ex melle; si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est, post curationem curare, quod si pus & multum, & cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paulum adijciatur; aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubium decoquendum est; eoque humore, eodem modo cum melle utendum; imponendaque eadem; aut etiam omphacium cum melle; aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis, aut æruginis, sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atque positio; aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ singulorum $\text{P.} \times \text{I.}$ minij sinopici $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ per se singula primò teruntur, deinde iuncta, iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant: tum in æneo uase leniter coquuntur, ne superfluant; cuiam guttæ

De colicis morbis.

Igitur si ex inflammatione coles intumuit, reduci que summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi uero glans contestæ est, oriculario quoque cystere inter eam, cutemque aqua calida inferenda est. Si mollitæ & extenuata cutis, ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est. Si tumor uicini, imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ folia ex uino cocta, sic, ut cuilibet eorum, dum tenetur, mellis paulum adijciatur; sursumque coles ad nentrem deligendus est (quod in omni curatione eius necessarium est) isque homo continere se debet, & abstinere a cibo, & potione aquæ tantum, si uindicta. a postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est; & cum ui quoque experiendum, an cutis sequatur; & si non parebit, teniter summa scalpello concidenda erit; nam cum sanies profluxerit, extenuabitur hic locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo uicta erit, siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra ue eam, in cole reperientur; quæ necesse est, aut pura sicca ue sint, aut humida & purulenta. si sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt; deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum; si leuis humor est, uino eluenda sunt; tum butyri & rosæ mollis paulum, & resinae terbinthinæ pars quarta adijcienda est, eoque utendum; aut si pus ex his profluit, ante omnia, elui mulso calido debet; tum imponi piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{II.}$ croci, myfi cocti singulorum $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ ex uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uuz madentiori, nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad eam, piperis $\text{P.} \times \text{I.}$ myrrhæ $\text{P.} \times \text{I.}$ croci $\text{P.} \times \text{II.}$ myfi cocti $\text{P.} \times \text{I.}$ æris combusti $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ primò ex uino austero contemuntur, deinde ubi inaruerunt, iterum teruntur ex palmi tribus cyathis, & incoquuntur, donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoque cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulentam naturalia imponitur. folia quoque oleæ ex nouem cyathis uini coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis $\text{P.} \times \text{III.}$ lycij $\text{P.} \times \text{VIII.}$ mellis sesquicyathus, ac si plus puris est, id medicamentum ex melle; si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est, post curationem curare, quod si pus & multum, & cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paulum adijciatur; aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubium decoquendum est; eoque humore, eodem modo cum melle utendum; imponendaque eadem; aut etiam omphacium cum melle; aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis, aut æruginis, sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atque positio; aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ singulorum $\text{P.} \times \text{I.}$ minij sinopici $\text{P.} \times \text{II.}$ quæ per se singula primò teruntur, deinde iuncta, iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant: tum in æneo uase leniter coquuntur, ne superfluant; cuiam guttæ

indurescunt, uas ab igne remouetur; idque medicamentum, pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad neruos ulcus descendere: profluitque pituita multa, sanies tenuis, malique odoris, non cocta, aut aqua similis, in qua caro recens lota est: doloresque is locus, & punctiones habet. Id genus quamuis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum: sic, ut thuris quoque paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit: supra uero à me positum est. præcipueque id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumque, neque frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera, coles sub cute excus, sic, ut glans excidat. sub quo casu, cutis ipsa circuncidenda est. Perperumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, uel excidit, uel abscinditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulcerique agglutinetur; ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque urinae cludat. Tubercula etiam quæ quædam Græci uocant circa glandem oriuntur; quæ uel medicamentis, uel ferro aduruntur; & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De cancri, qui in cole nascitur, curatione.

H A E C citra cancrum sunt; qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque uel præcipue ulcera infestat. Incipit à nigritie; quæ si cutem occupauit, protinus specillum subijciendum, eaque incidenda est: deinde ora uulsellæprehendenda: tum quidquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum demat, idque adurendum. quoties quid uisum est, id quoque sequitur, ut imponenda lentacula sit: deinde ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia curentur. At si cancer, ipsum colem occupauit; inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoque scalpello, quidquid corruptum est, sic, ut aliquid etiam integrum trahat, præcidi debet. Illud quoque æquè perpetuum est, exciso cancro, uulnus esse adurendum; sed siue ex medicamentis, siue ex ferro, crustæ occurrerunt, magnum periculum est, ne his deciditibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo longa quiete, & immobili pene corpore opus est, donec ex ipso crustæ pure leniter resoluantur. At si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingreditur, immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. si hæc parum ualeat, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrat, aduri diligenter & timide debet, neque ullo postea motu dandus idem periculo locus est.

De phagedæna in cole nascentis curatione.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod phagedæna à Græcis nominantur, oriri solet, in quo minime differendum: sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est; & si parum ualent, ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit; ac si sustinueris, usque ad uescam tendit: neque succurri postea potest. si id in summa glande, circa fistulam urinae est; prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum: si uero altè penetrauit, quidquid occurrat, præcidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs cancribus, facienda sunt.

De carbunculo, qui in cole nascitur.

Occalefcit etiam in cole interdum aliquid: idque omne pene sensu caret: quod ipsum quoque excidit debet. Carbunculus autè ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoque medicamentis utendus, maximeque chalcitide cum melle, aut æruginè cum cocto melle, aut ouilolo, stercore & contrito cum eodem melle ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad ora ulceribus componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

I N testiculis uero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex tato mittendus est: à cibo abstinentum: imponendum ex faba farina ex mulso cocta, cum cumino contrito ex melle cocto; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto: aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta, cum cupresso aut lilij radix contrita; aut si ijdem induruerunt, imponi debet lini uel foenigræci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulum croci sit adiectum. si uetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu rument, sanguinem mitti necessarium est, magisque, si etiam liuent. Imponendum uero utrunlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque proposita sunt: aut ea compositio, quæ habet nitri cocti **P. I.** resina pineæ, gummi, singulorum **P. II.** uux taminæ sine seminibus **P. III.** mellis quantum satis sit ad ea cogenda. quod si ex ictu testiculis aliquid desit, fere pus quoque increfcit; neque aliter succurri potest, quàm si inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

De rhagadibus, & condylomate, & hemorrhoidibus, alijsq; ani morbis;

et curationibus eorum; & primò de rhagadibus.

A N V S quoque multa, & dijsque plena mala recipit, nec in se multum abhorrentes curationes habet, at primum in eo saepe, & quidem pluribus locis, cutis exciditur. quiescere homo debet, & in aqua calida desidere: Columbina quoque oua coquenda sunt, & ubi induruerunt,

necunt, purganda : deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido fovei locus sic, ut inui-
cem utroque aliquis utatur : Tum tetrastapharmacum, aut *condyloma* rosa diluendum est, aut hyssopum recens
miscendum cum cerato liquido ex rosa facto : aut eidem cerato liquido, plumbum elotum adijciendum :
aut resinæ terebinthinæ myrrha ; aut spumæ argenti, uetus oleum ; & quolibet ex his id perungendum.
si quidquid læsum est, extrâ est, neque intus reconditum ; eodem medicamento tinctum linamentum su-
per dandum est ; & quidquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In hoc autem casu, neque acerbis
cibis utendum, neque asperis, nec aluum comprimentibus ; ne aridum quidem quidquam satis utile est, ni-
si admodum paulum ; liquida, lenia, pinguis, glutinosa meliora sunt ; uino tēpi uti nihil prohibet.

De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet, id ubi ortum est,
quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet, eadem seruari debent, quæ proximè scripta sunt hysdem
etiā omnis rectè tuberculū id fouetur. sed desiderare antè homo in aqua debet, in qua uerbenæ decoctæ sunt :
ex reprimentibus, tum rectè imponitur, & lenticula cum exigua mellis parte, & fertula campana ex uino
cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto, & cum eodem cerato contritum, uel cotoneum ma-
lum, uel malicorij ex uino cocti pars interior, & chalcitis cocta, atque contrita, deinde hyssopo, ac rosa ex-
cepta : & ex ea compositione, quæ habet thuris P. * I. aluminis scissilis P. * II. cerussæ P. * III. spumæ
argenti P. * V. quibus dum teruntur, inuicem rosa & uinum instillatur. Uinculum autem ei loco, lin-
teolum, aut panniculus quadratus est : qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias
habet, cumque subiectus est, ansæ ad uentrem datæ, à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniungantur ;
atque ubi artatæ sunt, dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit ; circumdatæque circa aluum inter
se nouissimè nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neque sub his curationibus desinit ;
aduri medicamento potest, quod ex his constat : æruginis P. * II. myrrhæ P. * III. gummi P. *
VIII. thuris P. * XII. stibis, papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū P. * XVI. quo medicamento, qui-
dam etiam ulcera, de quibus proximè dixi, renouant. si hoc parum in condylomate proficit ; adhiberi
possunt etiā uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transcundū est.

De hemorrhoidibus.

Tertium autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia : quæ sæpe san-
guinem fundunt ; *æmorrhoides* Græci uocant : Idque etiam in ore uulvæ forminatum incidere consuevit. At-
que in quibusdam parum tunc supprimitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores nō sunt : Habet enim
purgationem hanc, non morbum : ideoque curati quidam, cum sanguinis exitum non haberent : inclina-
ta in præcordia ac uiscera materia subitis, & grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desi-
dere in aqua ex uerbenis debet : imponere maximè malicorium cum aridis rosæ folijs contritum : aut ex
his aliqua, quæ sanguinem supprimit. Solet autem oriri inflammatio, maximè uiridura alui cum locū
læsit, tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum oris : imponendi uicelli cum rosæ folijs ex pas-
so subacto : idque si intus est, digito illinendum ; si extrâ, super illitum panniculum imponendum est. Ea
quoque medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis uero in hoc casu hysdē,
quibus in prioribus utendum est : si ista parum iuuant, solent imposita medicamenta adurentia, ea capi-
tula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio, inspergenda sandaracā est ; deinde impo-
nendū, quod ex his constat : squamæ eris, auripigmenti, singulorū P. * V. saxi calcis P. * VII. poste-
ro die acu compungendum. adustis capitulis, sit cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet. sed quoties
is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaque & ui-
ris & foeminis, quibus menstrua non proueniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

Si anus, uel os uulvæ procedit, qua curatione utendum sit.

At si anus ipse uel os uulvæ procedit, (nam id quoque interdum fit) considerari debet, purum ne
id sit, quod pronotum est, an humore mucoso circumdatum : si purum est, in aqua desidere homo debet,
aut salia, aut cum uerbenis, uel malicorio incocta, si humidū, uino austero subluendum est, illinendumque
sece uini combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaque plātago con-
trita, uel folia salicis in aceto cocta, tum linteo, & super lana æquè deliganda, cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo similis ano.

FVNGO quoque simile ulcus in eadem sede nasci solet. Id si hyems est, egelida ; si aliud tempus,
frigida aqua fouendum est. deinde squamā eris inspergenda, supraque, ceratum ex myrteo factum,
cui paulum squamæ, fuliginis, calcis, sit adiectum, si hac ratione non tollitur, uel medicamentis uehemen-
tioribus, uel ferro adurendum est.

De digitorum ulceribus.

Cap. XIX.

Digitorum autem uetera ulcera commodissimè curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum utri-
bet uinum adiectum est. In hysdem recedere ab unge caruncula cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

De digitorum ulceribus.

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-


Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

Uetera digitorum ulcera, in
quodam recedere ab unge caruncula
cum magno dolore consuevit, præcipue Græ-

ci appellant. & oportet alumen melinum rotundum in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum eius aridi fuit, tantundem mellis infundere, & radiculam miscere, donec similis croco colore fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum decoquere simul malum solent, cum paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerint. si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouendi aqua ex uerbena, imponendumque super medicamentum ita factum: thalctis, malicorum, squama aris excipiuntur fisco pigui leniter costeo ex melle. aut charta combusta, auripigmenti, sulphuris igne non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. aut æruginis rosa. P. * I. squama. P. * II. mellis cyatho cogitur. aut pares portiones miscentur / saxi calcis, thalctidis, auripigmenti. quidquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio. Et si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusque ferramentis adurendus est: & sicut reliqua uita curandus est. At ubi scabri ungues sunt, circumaperiri debent, quia corpus contingunt: tunc super eos ex hac compositione æque imponi: sandaracæ, sulphuris, singulorum P. * II. nitri, auripigmenti, singulorum P. * III. resina liquidæ P. * VIII. tertioque id die resoluendum est. sub quo medicamento, uitioli ungues cadunt, & in eorum locum, meliores renascuntur.

LIBER SEPTIMVS.

De chirurgica, & qui in ea clauerint, & qualis esse chirurgicus debeat, & quid in hoc libro describatur.



ERTIAM esse medicinæ partem, quæ manu curet, & uulgo notum, & à me propositum est: ea non quidem medicamenta atque uictus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat. estque eius effectus inter omnes medicinæ partes euidentissimus, si quidem in morbis cum multum fortuna cõferat, eademque sæpe salutaria, sæpe uana sunt: potest dubitari, secunda ualeudo, medicinæ, an corporis beneficio contigerit: In his quoque, in quibus medicamentis maxime utimur, quamuis profectus euidentior est; tamen sanitatem & per hanc fructu quærit, & sine his reddi sæpe manifestum est. sicut in oculis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu uexati sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quæ manu curat, euident est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiuuetur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc autem pars, cum sit uetustissima, magis tamē ab illo parente omnis medicinæ Hippocrate, quam a prioribus excolta est: deinde postea quæ diducta ab alijs habere professores suos coepit: in egypto quoque increuit, Philoxeno maxime auctore, qui pluribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit: Gorgias quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Hammonius alexandrinus, multi que alij celebres uiri, singuli quedam repperunt. ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeque nuper Tryphon pater, & Eucliptus, & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Megetes, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei discipline adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentie propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescere, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraque, animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari uelit eum quem accipit, non ut dolore eius motus, uel magis res desiderat, properet; uel minus quam necesse est, fecet, sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti proprie uendicandū sit: quia uulnerū quoque, ulcerumque multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi subiundicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare cõcipio. atque ubi se diuise medicus, non accipit; & in quibus uulneribus, ulceribus uel plus perfici manu, quam medicamento credo: tum quidquid ad ossa pertinet; quæ deinceps exequi aggrediar: dilatisque in aliud uolumen ossibus, in hoc cetera explicabo; præpositisque his, quæ in qualibet parte corporis sunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibimus.

De luxatis.

Cap. I.

Luxata igitur, in quacunque parte corporis sunt, quam primum sic curari debent, ut quæ dolor est, ea scalpello curis crebro incidatur, detergaturque eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamque etiam rubor est; quæ rubet corpus, si tumor quoque accessit, quacunque is est, id optimum auxilium est. tunc super danda reprimentia sunt, maximeque lana succida ex aceto, & oleo. quod si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello, imposita eadem mederi: Et si nihil aliud est, cinis quoque maxime ex sarmentis. si is non est, qualibet alius ex aceto uel etiam ex aqua coactus.

De his, quæ per se intumescent, quomodo excidenda, & curanda sunt. Cap. II.

VERVM hoc quidem promptum est. in his autem negotium maius est, quæ per se uitiis intus orto

orto, intumescunt, & ad suppuracionem spectant. Ea omnia genera abscessum esse aliàs proposui, medicamenta que eis idonea executus sum. nunc superest, ut dicam, in hisdem, quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ, quidquid illuc malæ, corruptæque materię coijt, extrahat; idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. interdum enim, sed rarò, quidquid abscedit, linamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Mezes, quia tunica omnis nervosa est, dicit non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur; sed subiecto iam vetustiore pure, callum circumdari. quod ad curationis rationem, nullo loco pertinet, quia quidquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neque ulla res prohibet, etiam si callus est; tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturior hæc interdum esse consuevit: ideoque quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij / nihil est. & ut aliàs scripsi, uel auertenda concurrens eo materia, uel digerenda, uel ad maturitatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est: si pus maturuit, in aliis quidem, & in inguinibus rarò secandum est. item ubicunque mediocris abscessus est. item quoties in summa cute, uel etiam carne, vitium est; nisi festinare curationis imbecillitas cogit. satisque est, cataplasma- ra efficere, ut per se pus aperiat: nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est: si autem altius malum est, considerari debet, nervosus ne is locus sit, an non sit. nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euocandū patet, paruaque postea cicatrix fit. At si nervi iuxta sunt, ignis alienum est, ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessaria uerò opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri possunt: inter neruos uerò, ultima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eique pus iungat, quo propius reperiatur. Itemque aliā rectam plagam desiderant in carne, quia fere uehementer cutem extenuat. tota eā super pus excidenda est. Semper autē, ubi scalpellus admouetur, id agendū est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ sint. cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in numero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluribus lineis incidendi sunt. dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana rodendo, finiet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit: nam ubi post longos morbos, totius corporis habitus vitiatu est, lateque se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet; scire licet, eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. ideoque excidere commodius est. maximè si circa articulos maiores id euenit, cubantemque ægrum fluens aluus exhaurit, neque per alimenta quidquam corpori accedit. sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrti folij fiat, quod facilius sanescat. idque perpetuū est: Ubicunque medicus ex quacunque causa cutem excidit, pure effuso, in aliis, uel inguinibus, linamento opus non est. Spongia ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque ea linamenta superuacua sunt, purgationis causa paulū mellis infundendū, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex uino expressa debet. quando autem linamentis opus sit, quando non sit, aliàs dictū est. cætera eadē incisa suppuratione, facienda sunt, quæ ubi per medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

De bonis, malis'ue signis exulceratorum.

Cap. III.

Protinus autem quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari, aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest: fereque huiusdem, quæ in vulneribus exposita sunt; nam bona signa sunt; somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum non fastidire; si febricula fuit, ea uacare: itemque habere pus album, seu, non foedi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas, sitis; cibi fastidium, febris pus nigrum, aut feculentum, & foedi odoris. Item procedente curatione, eruptio sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, orz carnosæ sunt: illa quoque ipsa carne hebere, nec firma: deficere tamen animam uel ipsa curatione, uel postea, pessimum omnium est. quin etiam morbus ipse siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est; siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in uulnere, rodentium non est. sed ut hæc ipsa fortuna huc illuc uel discernit, sic medici partiū est, eniti ad reperiendam sanitatem. ergo quoties ulcus resilerit, eluere id, si reprimendus humor uidebitur, uino ex aqua plumbatili mixto, uel aqua, in qua lenticula cocta sit, debeat. si purgandum erit, mulso; rursusque imponere eadem. Ubi iam repressus uidebitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conueniet, & foueri uulnus pari portione uini ac mellis, superque imponi spongiā, ex uino & rosa tincta. per quæ, cum caro producat, plus tamen (ut aliàs quoque dixi) uictus ratio eo confert. id est solutis iam febribus, & cibi cupiditate redditæ balneū rarū, quotidiana, sed lenis gestatio, cibi, potionesque corpori reficiendo. apteque omnia, quæ per medicamenta, suppuratione quoque rupta sequuntur, sed quia magno malo uix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

De fistulis.

Cap. IIII.

Aduersus fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti collirium non possit; si tortuose sunt, si multiplices, manus in manu, quam in medicamentis presidium est; minus quæ operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intus tendunt. Igitur, si sub cute, transuersa fistula est, demitti spe-

$\sin \theta$,
of

Ar modo
durior

К. Г. Гусев

in Air Force
column 62

11.1.2

سامر

land,

AN RECAP
PARADE

Archeology

જાન્યુઆરી

•

... ..

1. 1000

STEFAN
173

8

[illegible]

10. *pro, inter*
 11. *pro, inter*
 12. *pro, inter*
 13. *pro, inter*
 14. *pro, inter*
 15. *pro, inter*
 16. *pro, inter*
 17. *pro, inter*
 18. *pro, inter*
 19. *pro, inter*
 20. *pro, inter*
 21. *pro, inter*
 22. *pro, inter*
 23. *pro, inter*
 24. *pro, inter*
 25. *pro, inter*
 26. *pro, inter*
 27. *pro, inter*
 28. *pro, inter*
 29. *pro, inter*
 30. *pro, inter*
 31. *pro, inter*
 32. *pro, inter*
 33. *pro, inter*
 34. *pro, inter*
 35. *pro, inter*
 36. *pro, inter*
 37. *pro, inter*
 38. *pro, inter*
 39. *pro, inter*
 40. *pro, inter*
 41. *pro, inter*
 42. *pro, inter*
 43. *pro, inter*
 44. *pro, inter*
 45. *pro, inter*
 46. *pro, inter*
 47. *pro, inter*
 48. *pro, inter*
 49. *pro, inter*
 50. *pro, inter*
 51. *pro, inter*
 52. *pro, inter*
 53. *pro, inter*
 54. *pro, inter*
 55. *pro, inter*
 56. *pro, inter*
 57. *pro, inter*
 58. *pro, inter*
 59. *pro, inter*
 60. *pro, inter*
 61. *pro, inter*
 62. *pro, inter*
 63. *pro, inter*
 64. *pro, inter*
 65. *pro, inter*
 66. *pro, inter*
 67. *pro, inter*
 68. *pro, inter*
 69. *pro, inter*
 70. *pro, inter*
 71. *pro, inter*
 72. *pro, inter*
 73. *pro, inter*
 74. *pro, inter*
 75. *pro, inter*
 76. *pro, inter*
 77. *pro, inter*
 78. *pro, inter*
 79. *pro, inter*
 80. *pro, inter*
 81. *pro, inter*
 82. *pro, inter*
 83. *pro, inter*
 84. *pro, inter*
 85. *pro, inter*
 86. *pro, inter*
 87. *pro, inter*
 88. *pro, inter*
 89. *pro, inter*
 90. *pro, inter*
 91. *pro, inter*
 92. *pro, inter*
 93. *pro, inter*
 94. *pro, inter*
 95. *pro, inter*
 96. *pro, inter*
 97. *pro, inter*
 98. *pro, inter*
 99. *pro, inter*
 100. *pro, inter*

cillum debet, supraque id ea incidit; si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Ubi ad fines fistulæ uentum est, excidendus ex toto callus est, superque fibulæ dandæ: & medicamentum, quo glutinetur; at si recta subter tendit; ubi quò maximè ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet; dein fibula oris cutis iniicienda est, & æque glutinantia medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus (quod interdum osse uitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus mouentia. solent autem inter costas, fistulæ subter exire, quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda, & eximenda est; ne quid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septrum id, quod transuersum à superioribus uisceribus intestina dissecant, uiolare. quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus eo cum humore quasi bullante prorumpit; maximeque si hunc ore ille continuit. In eo, medicamini locus nullus est. in cæteris uero, quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt. cæteris, quæ ad uulnera accommodantur, uti licet. optimè tamen sicca linamenta, uel si purgandum aliquid uidetur, in melle tincta imponuntur. uentri nullum os subest; sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt; adeo ut Sistratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. & quidem quod maximè mirum uideri potest tutior fistula est contra iecur, & lienem, & uentriculum, quàm contra intestina; non quod perniciosior res ibi sit, sed quod alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras uulneris futuræ comprehendunt. quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque etiam, ubi tenuis fistula abdomen perumpit, excidere eam licet, futuraque oras conjungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa, necesse est latius foramen relinquit; quod nisi magna ui, utique ab interiore parte sui non potest, quæ quasi membrana quædam, finit abdomen: quam περὶτόν Græci uocant. Ergo ubi aliquis ingredi ac moueri cœpit; rumpitur illa futura, atque intestina soluntur. quo fit, ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperatione habet; ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriam etiam num animaduersionem desiderant eæ, quæ in ano sunt, in has demisso specillo ad ultimum eius caput incidit cutis debet, dein nouo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam eius partem, ob id ipsum perforatum, coniectum sit. ibi lino prehendum, uinciendumque cum altero capite est, ut laxè cutem, quæ super fistulam est, teneat. Idque lino esse debet crudum & duplex, triplexue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, cibum capere, perinde atque sanissimo. tantummodo id lino bis die saturo nodo ducendum est, sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neque committendum est, ut id lino putrescat. sed tertio quoque die nodus resoluendus est, & ad caput, alterum recens lino alligandum est; ductoque uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est, incidit; simulque & id sanescit, quod à lino relictu est; & id quod ab eo mordetur, inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem lino debet, quod celerius secet, noctuque penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adijcitur celeritati, sicut tormento quoque, si & lino, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur, ex ijs, quibus callum excidi posui. poterit tamen fieri, ut ad scalpelli curationem, etiam illud loci ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in hæc genera demisso specillo, duabus lineis incidenda cutis est, ut media inter eas habenula tenuis admodum efficiatur, ne protinus ora coeant: sitque locus aliquis linamentis, quæ quàm paucissima super iniicienda sunt; omniaque eodem modo facienda, qui in abscessibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt; recta fistula scalpello erit incidenda; ab eo, cæteræ, quæ iam patent, lino excipiendæ. si intus aliqua procedet, quod ferrum tuto peruenire non poterit; collirium demittendum erit. quibus autem in omnibus eiusmodi casibus (siue manu, siue medicamentis agatur) dari debet humidus, potio liberalis, diuque aqua, ubi iam caro increuit, tum demum & balneis raris utendum erit, & cibus corpus implentibus.

De ani fistulis.

De telis & corpore extrahendis.

Cap. V.

TELA quoque, quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe eijciuntur. suntque quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quas illa penetrarunt. omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic à scalpello accipit. nam contra mucronem caro inciditur. sed si non altè telum intedit, & in summa carne est, aut certè magnas uenas, & loca neruosa non transijt, nihil melius est, quàm qua uenit id euellere. si uero plus est, per quod telo reuertendum, quàm quod perumpendum est: iamque uenas, neruosque id transijt; commodius est aperire, quod superest, eaque extrahere. nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro, si medium mucro transijt, facilius sanescit, quod periculum est: quia utrinque medicamento fouetur: sed si retro telum recipiendum est: amplianda scalpelli plaga est, quod facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio; quæ maior fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte uulnus aperitur, laxius esse debet, quàm ut telo postea transeunte ampliatur.

[illegible]

Служеб. - V I.

De gansche

Capitis vasta tubercula, & appere
ac diffusi, & nec periculo terre
non diuise, omnia curant.

D. mona ita & ex parvula mignunt,
 pulcherrimis nigris oculis, & tunc su
 ciu sentis varie.
 Quid niter habent, et cetera. 5
 sic ex toto curant, nisi ex cetero
 maxime in his q. remanent, aut iag
 dam similia, aut ceteris uterq. p
 In his vero a cadunt, aut nulli, similia
 aut ferre putant, aut quos reia co
 gi, aut carni hirci & eruent, quib
 corne esse ceterum: ferri, gangra
 Affluunt salub. humi: sanguis p
 Alucendi, ugnudis humi: idag, p
 curescent.
 Perseuanti pinguet quida, idag lat
 fore clescent res in q. tota tunc
 sitem: sic ut ea labor ea in ceter
 a miter. 10
 Omnia dora aut, i caput cor
 ped mediam opavit nudare. ad
 tunc quq. cenda e, ut ceteru
 mter cois: quo ne ma e a mter
 corne, ea figurate. In ceteris ipa
 mura ea. quenda e, ptingunt aut
 & miter e audit. quo quenda

Siq; ab infiore parte tunica pulsus mōtū, ne irascatur; superior pars deinde dīus
qua sordem relinquenda ē. ubi tota exompta ē, communde ora, fusi. & yerm.
Si vol tota tunica, vel aliqua ex ea relictam ē, pus momenta adhibenda unt.

ex ea relictum est; pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum vitij, quæ scalpello, & manu curantur. Cap. VII.

SE D ut hæc neque genere vitij, neque ratione curationis inter se multum distant; sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter, aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris, uelut nasci solent pingues, grauesque, quæ uix attollere oculos sinunt: leuesque pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent: Fere uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello transuersam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne uesica ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere: facile autem sequitur. dein super ungi collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur: paucissimisque diebus cicatrícula inducitur. molestus est ubi incisa uesica est: Effundit enim humor: neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi: si fortè id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crith, tuberculo palpebrarum.

I N eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruulum nascitur, quod à similitudine ordeia Græcis nominatur: unica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id uel calido pane, uel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimis is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sæpe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quidquid intus humoris est, exprimi. Eodem deinde uapore postea quoque foueri, & superinungi, donec ad sanitatem perueniat.

De chalazia palpebrarum.

ALIA quoque quædam in palpebris, huic non dissimilia nascuntur: sed neque utique figura eiusdem, & mobilia simul, atque digito huc uel illuc impelluntur: ideoque ea Chalazia uocant. Hæc incidi debent: si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est, inungendum primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

De ungue oculorum, quod πτερόν à Græcis uocatur.

Vnguis uero (quod πτερόν Græci uocant) est membranula nervosa oriens ab angulo; quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eique officit. sæpius à narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueterauit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est; uel sic aduersus, ut in gremio eius, caput resupinus effundat. quidam, si in sinistro oculo uitium est, aduersum: si in dextro, resupinus collocari uolunt. alteram autem palpebram à sinistro diduci oportet; alteram à medico: sed ab hoc si ille aduersus est, inferiorem; si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum, paulum mucrone intus recuruato, subijcere extremo ungui debet, eumque infigere; atque eam quoque palpebram tradere alteri; ipse hamulo apprehenso, leuare unguem, eumque acu trajicere, linum trahente: deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue, si qua parte oculo inheret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum ueniat: deinde innixum modò remittere, modò attrahere; ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur (quod exulceratum uix ullam recipiat curationem) uel ex angulo quoque carumcula abscidatur; quæ, si uehementius unguis ducitur, sequitur: ideoque decipit: ac si abscissa est, pateat foramen, per quod postea semper humor descendit; ut Græci uocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue, scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo cadatur. Eo deinde ex melle linamentum super dandum est: supraque linteolum, & aut spongia, aut lana succida; proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. siquidem id quoque tertium periculum accedit: eodemque modo linamentum imponendum; ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur. sed ea curatione, uerna esse debet, aut certe ante hyemem: de qua re ad plura loca pertinet, semel dixisse satis erit. nam duo genera curationum sunt: alia in quibus eligere tempus non licet; sed utendum est eo, quod incidit; sicut in uulneribus, & in fistulis alia, in quibus nullus dies urget, & expectare, tutissimum & facile est; sicut. euenit in ijs, quæ & tardè crescunt, & dolore non cruciant: In his, uer expectandum est: aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus, uel æstas, quam hyems est: atque is ipse medius, iam fractus æstatibus, nondum ortis frigoribus. quò magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur: hoc quoque minori periculo subiecta est. & sæpe quò maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

De enchanti, tuberculo palpebrarum.

E X curatione uero unguis, ut dixi, uicia nascitur; quæ ipsa alijs quoque de causis oriri solent: interdum

De encyclij.

De αγνώστου.

[illegible]

De' Egypte.

[illegible]

Perilicium

[illegible]

De lagophthalmo.

De lagophthalmo. Si enim palpebrae, nulla id restituere curatio est; si exiguum, mederi licet. modus incidendi, & figura. Si cartilago incisa est, palpebra con-
ti neq. attolli potest. postea. Lamen. u. ius.

De ectropio.

Opium, inferioris palpebrae vitium, rursus sursum attollitur, sed pendet, neq. potest cum superiore coniungi. m.

Ratio incidendi...
modus aduendendi in senio.

De staphylomate.

Polyspa, similis acino figura in oculo, in quo summa albuginis tunica, ruptis minus modicis, aliquibus, siue
modis curandis cu acis.
& per sectionem. praxm.

De clauis.

Clauis vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à similitudine
e. i. sur acis. in quo.

De natura oculi.

Diffusio cum recens incidit, medicamentis
e. i. discutitur: sed ubi vetustior facta
manus curationem desiderat: quæ
subtili limas haberi potest.

Summas duas habet tunicas: ex
superior à Græcis, *epithima* dicitur
ut ea quæ parte alba est, latis crassa
pupillæ loco extenuatur. Huic inter-
ad iuncta est media parte, quæ pupillæ
modico foramine concava, circa
e. i. ulteriores partes ipsa quoq.
quæ *Xoposides* à Græcis nominatur. Iste qui
tenui summa tunica est, quæ à *epithima*
Xoposides nominatur. ea media sub-
e. i. coq. cauo continet quiddam, quod
similitudine, à Græcis *phlegma* vocat.
liquidum, neq. aridum est, sed quæ
tur humor, ex cuius colore, pupillæ
vel niger est, vel cæsius, cum summa
tota alba sit. In aut. supponitur
inter parte membranula includit.
his gutta humoris, e. i. ubi
qua videndi facultas propriè dicitur.
et *Xoposides* à Græcis nominatur.

ipsis pilis incidendum. initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui temporis in dextro, ab eo, qui naribus propior est, idque, quod inter duas lineas est, excidendum. deinde ore vulneris inter se sim-
plici futura committenda, operiendusque oculus est; & si parum palpebra descendet, laxanda utique: si
nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habecula ab anteriore ora excidenda. ubi secta est; alia
futura adiicienda; quæ supra tres esse non debent. Præter hæc, in superiore palpebra, sub pilis ipsis, inci-
denda linea est, ut ab inferiore parte ducti pili, sursum spectent. idque, si levis inclinatio est, etiam solum
satis tueretur. Inferior palpebra eo non eget. his factis, spongia ex aqua frigida expressa, super deliganda
est. postero die glutinans emplastrum iniiciendum. quarto, futura tollenda est: & collirio, quod inflam-
mationes reprimat, superinungendum.

De lagophthalmo oculorum.

Nonnunquā autem nimium sub hac curatione excisa, cure, euenit, ut oculus nō contegatur: idque
interdum etiam alia de causa fit: *lagophthalmos* Græci appellant. In quo, si nimium palpebræ deest, nulla id
restituere curatio potest. si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium, cutis incidenda est, innata
figura, cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plage usque ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil
laxa. nam si ea incisa est, palpebra concidit: neque attolli postea potest. cute igitur tantum diducta sit,
ut paulum in ima oculi ora descendat: hiantē scilicet super plagam, quam linamentum coniiciendum est;
quod & coniungi diductam cutem prohibeat; & in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum im-
pleuit, postea recte oculus operitur.

De ectropio.

VT superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit; ideoque oculus non conte-
git: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, & hiat, neque potest cum superiore commit-
ti. Atque id quoque euenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute: *ectropion* Græci
uocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tātū cornua ad
maxillas, non ad oculum, conuertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totū extrinsecus adu-
rendum est, deinde melle inungendum: at quarto die uapore aquæ calidæ fouendum, inungendumque
medicamentis ad cicatricē perducentibus.

De staphylomate oculi.

HÆC fere circa oculum in angulis, palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo, nō
nunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis; & similis figura aci-
no fit. unde id *staphyloma* Græci uocant. Curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere,
acu duo lina ducente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore, astringere
inter se: quæ paulatim secando id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem ex-
cidere: deinde spodium, aut cadmiā inficere. Utrolibet autem facto, album oui lana excipiendum, &
imponendum, posteaque uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis unguendus est.

De clauis oculorum.

CLAVI autem uocantur, callosa in albo oculi tubercula; quibus nomen à figuræ similitudine
est. Hos ad imam radicem perforare acu commo-*distissimum* est, infraque eam excidere; deinde lenibus me-
dicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionem; quia, cum recens incidit, medicamentis quoque sæpe discuti-
tur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat; quæ inter subtilissimas haberi potest, de qua
antequam dico, paucis ipsius oculi naturæ indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum
uel præcipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à Græcis, *epithima*
uocatur. ea, qua parte alba est, satis crassa: pupillæ loco extenuatur. Huic interior adiuncta est
media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulteriores partibus ipsa quo-
que plenior: quæ *Xoposides* à Græcis nominatur. Hæ duæ tunicæ cum interiora oculi cingant; rursus sub
his coeunt: extenuatæque, & in unum coactæ, per foramen quod inter ossa est, ad membranam cerebri
perueniunt, eoque inhereſcunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus uacuus est. deinde infra rur-
sus tenuissima tunica, quam Herophilus *epithima* nominauit. Ea media subſidit, eoque cauo continet
quiddam, quod à uitri similitudine, *phlegma* Græci uocant. Id neque liquidum, neque aridum est: sed
quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota
alba sit. Id autem superueniens ab inferiore parte membranula includit. sub his gutta humoris est
oui albo similis; à qua uidendi facultas proficiscitur; *phlegma* à Græcis nominatur. Igitur uel
ex morbo, uel ex ætate, conſciscit humor sub duabus tunicis, quæ locum uacuum esse pro-
posui: isque paulatim indureſcens, interiori potentia se opponit. Utique eius plures species
sunt: quædam sanabiles: quædam quæ curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immo-
bilis:

bilis: colorem uero habet marinz aquz, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. si magna est, si nigra pars oculi, amissa naturali figura, in aliam uertit; si suffusioni color cereuleus est, aut atro similis; si labat, & hac, atque illac mouetur; uix unquam succurritur. fere uero peior est; quò ex grauiore morbo, maioribus uel capitis doloribus, uel ictu uehementiore orta est. neque idonea curatio, si senilis ætas est; quz sine nouo uitio, tamen aciem hebetem habet. at ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoque curationi neque exiguus, neque còcauus, satis opportunus est; atque ipsius suffusionis quedam maturitas est. expectandum igitur est, donec iam non fluere, sed durities quedam concreuisse uideatur. ante curationem autem, modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: prius die ab omnibus abstinere. post hæc, in aduerso sedili collocandus est, loco incido, lumine aduerso, sic, ut contra medicum paulò altius sedeat. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. curari etià ipse oculus, qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterum lana imposta, & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus ad mouenda est, aut acuta, aut fortè non nimium tenuis; eaque demittenda, sed recta est, per summas duas tunicas, medio loco inter nigrum oculi, & angulum temporis propiorem, e regione medietatis suffusionis; sic ne qua uena ledatur. Neque tamen timidè demittenda est; quia inani loco excipitur; ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest; quia prementi nihil renititur. Ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leuiterque ibi uertitur, & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet; ubi deinde eam transiit, uehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadem aciem magis còcidenda; & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus latè offiunt. Post hæc, educenda acus recta est; imponendumque est lana molli exceptum auribum; & supra, quod inflammationem còerceat: atque ita deuinciendum. Post hæc opus est quies, abstinencia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo (qui postero die satis mature datur) primum liquido, ne maxillæ laborent; deinde inflammatione finita, tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

De pituita oculorum.

DE pituita quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad eam ueniam; quæ curatione ex manu possulant. Animaduertimus autem, quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere; quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam denique uitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum superuacua curatio est in his, qui ab infanti bus id uitium habent; quia necessario mansurum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. siquidem manu nihil adiuuantur. medicamentis, & uictus ratione, quæ crassiores pituitas reddat, ad sanitatem perueniunt. lata etiam capita uix medicinæ patet. Tum interest, uenæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutem sunt, an quæ inter membranam cerebri & caluariam superiores, fere per tempora oculos rigant: inferiores, per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt; non potest his, quæ sub osse, ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur: naso capere ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs usque ad uerticem illini debent. si fieri oculi esse ceperunt, apparet per eas uenas, quæ sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed leuior, duplex uitium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores uenæ exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoque gètibz celebre est; adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit, reperti in Græcia sunt, qui nonnem lineis cutem capitis inciderent; duabus in occipitio rectis: una super eas transuersa; dein duabus super aures, una inter eas item transuersa; tribus inter uerticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cognitisque ex motu maxillarum, musculorum initijs, leuiter super eos cutem inciderent. inductisque per retusos hamos oris, insererent lineamenta, ut neque inter se cutis antiqui fures committerentur; & in medio, caro incretceret, quæ uenas, ex quibus humor ad oculos transiret, altingeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à media aure ad mediâ alteram aurē: deinde à naribus ad uerticē. tum ubi lineæ còmittebantur, scalpello inciderunt; & post sanguine fuso, os ibidē adusserunt. nihilominus autē, & in temporibus, & inter frōtē atque caluariam eminentibus uenis idē cadēs ferrum admouerunt. fræquēs curatio est uenas in temporibus adurere; quæ fere quidem in eiusmodi malo tument; sed tamen ut inflentur, magisque se ostendant, ceruix ante modicè deliganda est, tenuibusque ferramentis & retusis, uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat: Id enim signū est quasi exccatorū itinerū, per quæ humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæ quæ uenæ, ideoque legi non pnt; eodē modo ceruice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quò magis uenæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter uerticem ac frontem: deinde ceruice resoluta, qua notæ sunt, uenas incidere. & sanguinem mittere, ubi satis fluxit, tenui-

De pituita oculi.

Quis nunquam siccescit oculus, sed semper humore tenui madet, ea aspritudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam denique uitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum superuacua curatio est in his, qui ab infanti bus id uitium habent; quia necessario mansurum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. siquidem manu nihil adiuuantur. medicamentis, & uictus ratione, quæ crassiores pituitas reddat, ad sanitatem perueniunt. lata etiam capita uix medicinæ patet. Tum interest, uenæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutem sunt, an quæ inter membranam cerebri & caluariam superiores, fere per tempora oculos rigant: inferiores, per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt; non potest his, quæ sub osse, ac ne his quidem succurritur, quibus pituita utrinque descendit: quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur: naso capere ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs usque ad uerticem illini debent. si fieri oculi esse ceperunt, apparet per eas uenas, quæ sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed leuior, duplex uitium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores uenæ exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoque gètibz celebre est; adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit, reperti in Græcia sunt, qui nonnem lineis cutem capitis inciderent; duabus in occipitio rectis: una super eas transuersa; dein duabus super aures, una inter eas item transuersa; tribus inter uerticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cognitisque ex motu maxillarum, musculorum initijs, leuiter super eos cutem inciderent. inductisque per retusos hamos oris, insererent lineamenta, ut neque inter se cutis antiqui fures committerentur; & in medio, caro incretceret, quæ uenas, ex quibus humor ad oculos transiret, altingeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à media aure ad mediâ alteram aurē: deinde à naribus ad uerticē. tum ubi lineæ còmittebantur, scalpello inciderunt; & post sanguine fuso, os ibidē adusserunt. nihilominus autē, & in temporibus, & inter frōtē atque caluariam eminentibus uenis idē cadēs ferrum admouerunt. fræquēs curatio est uenas in temporibus adurere; quæ fere quidem in eiusmodi malo tument; sed tamen ut inflentur, magisque se ostendant, ceruix ante modicè deliganda est, tenuibusque ferramentis & retusis, uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat: Id enim signū est quasi exccatorū itinerū, per quæ humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditæ quæ uenæ, ideoque legi non pnt; eodē modo ceruice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quò magis uenæ prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter uerticem ac frontem: deinde ceruice resoluta, qua notæ sunt, uenas incidere. & sanguinem mittere, ubi satis fluxit, tenui-

bus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide; ne subiecti muscoli, qui maxillas tenet, sentiat. inter frontem uero & uerticem, uehementer, ut sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiam nunc est asporum curatio; qui uerticem usque ad os adurunt, sic, ut squamam remittat. sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque comata sit: ubi uenas in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adicio: neque ut crusta decidant: neque ut ulcus impleatur, adustis uenis, esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur; cum per hoc siccescere eas partes opus sit: per illud, exhaustum opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infra da medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodum autem uenæ deligenda sint, quidque lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum uarices, dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur.

Cap. VIII.

VERVM ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt, quæ in hac medicinæ parte tractentur. solet tamen euenire, uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit; ideoque audiendi sit careat. quod ubi incidit; specillo tentandum est, aliter ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si aliter est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe, distentio oriatur neruorum, & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur: nam quæ cauum esse debet, uel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aperiendum, uel etiam scalpello incidendum. cumque id patefactum, & iam ulcus purum est: coniicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricem inducente; circaque idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit, ut ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures: in uiro putæ, perforatæ sunt, & offendunt; traicere id cauum celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. quod si magnū id foramen est, (sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet; supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea fuere; ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire. quæ res, cum in labris quoque & naribus fieri possit; eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisque, ac naribus, quomodo sarciri & curari possint.

Cap. IX.

CURTA igitur in his tribus, ac si qua parua paria sunt, curari possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus, deformitas sola timeri potest: in labris uero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessarii iactura fit: quia minus facile & cibis assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus: sed ex uicino adducitur: quod in leui mutatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna, non potest: neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficile ter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est: quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio curationis eiusmodi est: Id quod curatum est, in quadratum redigere, ab interioribus eius angulis, lineas transversas incidere, quæ citiorem partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea, quæ sic resoluimus, in unum adducere. si non satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. sic enim fit, ut facilius, quod adducitur, sequi possit: quod non ui cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & deorsum, non multum recedat. Interdum autem ab altera parte, cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit locum, reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est, ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imis uenarum partibus, neque ex angulis labrorum, quidquam attrahere tentabimus. utrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consueverunt: sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est: neque enim aut glutinatur, aut acu tuto traicitur. neque longè tamen excidi debet: ne inter duas oras liberæ cutis, utrinque coitus puris, fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suende sunt, utrinque cute apprehensa; & quæ priores lineæ sunt, ea quoque future iniicienda sunt. siccis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ulteriores uero lunatasque plagas linamentum dandum est, ut caro increscens, uulnus impleat; summaque cura, quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursusque idem medicamentum iniiciendum; fereque septimo die glutinatum est. tum future eximi, & uleus ad sanitatem perducere debent.

De polypi curatione per ferrum.

Cap. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento

hunc ferramento acuto, in modum spathe facto, resolvere ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. tum implicatum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimatur, eoque nares leniter implendz. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De oris.

Cap. XI.

ID autem uitium, quod à Græcis uocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos chirurgos non reperitur. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamen positum est uel futilem fistulam, uel eodem scriptorinum calamum, in nares esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os: deinde adustum locum, purgandum esse argillæ & melle. ubi purus est, lycio ad sanitatem perducendum. Mel nares incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoueri. tum sui nares debere, & adustum quidem ulcus eadem ratione curari. futuram uero illini uel spuma argenti, uel alio glutinante.

De ore uicis, quæ manu et ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

IN ore quoque quædam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicem imbecillitatem, modo propter gingivarum arecentium uitium. oportet in utrolibet candens ferramentum gingiuis admouere, ut leniter attingat, non ut insidat. adustæ gingiue, melle illinende, & mulso eluendæ sunt. ut pura ulcera esse coeperunt, arida medicamenta infundenda sunt ex his, quæ resprimunt. si uero dens dolores mouet, ex omique eum, quia medicamenta nihil adiuuant, placuit, circum radi debet, ut gingiua ab eo resoluatur. tum is concutiendus est: eaque faciendæ, donec bene moueatur. nam dens herens, cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. Idque etiā maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculos uel concutere. Tum, si fieri potest, manu, si minus, forfice dens excipendus, ac si exelus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur: secta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus, os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur: neque ideo nullum eius rei periculum est, utrique in dentibus breuib, qui fere longiores radices habent. sæpe enim forfex, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingiueprehendit, & frangit. protinus autē ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit, & uolsella protrahenda est. si non sequitur, incidi gingiua debet, donec labans ossis testa recipiatur. quod si fractum statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendum calidum ex farina & fimo cataplasma est, donec ibi pus moueatur: tum incidi gingiua debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. itaque etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo lēso, fistula fit, quæ eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars, & altera myrrhæ sit adiecta. continendumque ore crebro uinum meracū. atque in eo casu, uelandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acro utendum est. at si ex ictu uel alio casu, aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene harent, uinciendi sunt. continendaque ore reprimenda: ut uinum, in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit, circum purgandus, & euellendus est. is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat. quotiescunque dente exempto, radix relicta est; protinus ea quoque ad id facta forfice, quam Græci uocant, excimenda est. Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt (arradias autem Græcis appellantur) cum sub tenui tunica sint, oportet digito circum radere, & euellere: si ne sic quidem resoluuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De uua.

VV A, si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris: præcidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaque melius est his uti, quæ alias proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum, a pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba; præcidi debet. itemque si ima, liuida & crassa; summa, tenuis est. neque quidquam commodius est, quam uolsella prehendere, sub eaque, quod uolumus, excidere. neque enim ullum periculum est, ne plus minusue præcadatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est: idque præcadere, quo longior uua est, quam esse naturaliter debet. post curationem eadem faciendæ sunt, quæ in tonsillis proximè posui.

De lingua.

lingua quibusdam cum subiecta parte
imo natali die iuncta est, qui ob id
qui gudem possunt.

De lingua.

LINGVA uero quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est; qui ob id ne loqui
quidem possunt; horum extrema lingua, uolsella prehenda est, sub eaque membrana incidenda, ma-
gna cura habita, ne uenae, quae iuxta sunt, uiolentur, & profusione sanguinis noceant. reliqua curatio
uulneris, in prioribus posita est; & plerique quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cogno-
ui, qui succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem conse-
cutus est. adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet; non tamen perpetuum est id,
quod sequi conuenit.

De abscissu sub lingua.

De labris.

in sepe funduntur, eaeque res habet
colore etiam haec molestiam, quod
prohibetur, qui habundat eas rima
colore diducendo, sanguinem citat.
Et medicamento aut ferro cu-
et quali.

S V B lingua quoque interdum aliquid abscedit; quod fere consistit in tunica; doloresque ma-
gnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam exci-
denda est: deinde utrinque orae hamulis excipiendae, & tunica undique circumdata liberanda est; magna
diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

De ceruicis uitijs.

Xoçyλy; tumor in ceruice
cutis & asperam arteriam, quo
caro hebes, modo tumor eligit
aqueque mias includitur; interdu
minutus est, pili immixti.

L A B R A autem saepe funduntur. eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod fere
mo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo, sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt,
medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessarium est
tenui ferramento adurere; quod spathe simile, quasi transcurrere, non imprimi debet. postea facienda
eadem sunt, quae in auribus aduultis exposita sunt.

De ceruicis uitijs, et curatione.

Cap. XIII.

Curatio per cauteria, et anam.
Calipelli curatio breuior est.
morsu inciderunt, sequendi.
DON: Sutura & medicam-
ligamen. ratio.
tunica eximi non potuerit, natus
peragenda adurentia. Linam.

A T in ceruice, intercutem, & asperam arteriam, tumor increfcit (βρογχιαλιν Græci uocant) quo
modo caro hebes, modo humor aliquis melli, aqueue similis includitur: interdum etiam minutis ossibus
pili immixti, ex quibus quidquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari,
quibus summa cutis, cum superiecta tunica exeditur. quo facto, siue humor est, profuit; siue quid den-
sius, deinde digitis educitur: tum ulcus sub linamenti sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est: Medio
tumore una linea inciditur, usque ad tunicam: deinde uiriosus finis ab integro corpore digito separatur:
totusque cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel salem, uel nitru aliquis adiecit, eluitur. oraeque
una sutura iunguntur: ceteraque eadem, quae in alijs futuris super injiciuntur. Veniter deinde, ne fauces
urgat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamen-
tisque id curandum est: ceteris pijs mouentibus.

De umbilici uitijs.

Cap. XIII.

De ambliq uitijs.

minime est propter raritatem, id a
seruissimum, quod ipse non co-
gnat: a nullo, id quod non uideret;
omni omnibus est, ambliqum
ore prominere.

S V N T etiam circa umbilicum plura uitia; de quibus propter raritatem, inter auctores parum co-
stat. Verisimile est autem, id à quodque praetermissum, quod ipse non cognouerat: à nullo id quod non
uiderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecore prominere: causae requiruntur: Megetres
has posuit. modo intestinum eò irrumperet: modo omentum: modo humorem. Sostratus, nihil de o-
mento dixit: duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increfcere, eamque modo integram esse, mo-
do carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit: sed eadem tria causatus spi-
ritum quoque interdum eò dixit irrumperet. Heron, omnibus his quatuor positis, & omenti mentione ha-
buit, & eius, quod simul & omentum & intestinum habuerit. quid autem horum sit, his indicijs cognoscit-
tur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est: omni frigore comminuitur, non
solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. sonat interdum; atque ubi resupinatus est ali-
quis, delapso intestino, ipse desidit. Ubi uero omentum est, cetera similia sunt, tumor mollior, & ab una
parte latus extenuatum in uentrem est: si quis apprehendit, elabitur. Ubi utrumque est, indicia quoque
mixta sunt; & inter utrumque mollior. At caro durior est; semperque etiam resupinato corpore, tumor
prementique non cedit prioribus facile cedentibus. si uitiosa est, eadem notas habet, quas in carcinoma-
te exposui. Humor autem si premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit resupinato
quoque corpore, tumorem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex spiritu uitium est, medicinam non
admittit. Caro quoque carcinomati similis, cum periculo tractatur: itaque omittenda est. sana, excidi de-
bet, idque uulnus linamenti curari. Humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt, & uulnus
hisdem linamenti curant: in reliquis uariæ sententiae sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res
ipsa restatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est, delabatur. sinus uero umbilici, tum uacuis
à quibusdam, duabus regulis exceptus est; uehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur. à
quibusdam, id uitium acu traiecitatur, duo lina ducente: deinde utriusque lini duobus capitibus diuersis
partes astringuntur. quod in una quoque oculi fit; nam sic, id quod supra uinculum est, moritur.
adiecerunt

adiecerunt quidam, ut antequam uincerent, summum una linea inciderent, exciderentque, quò facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent: tum deinde uinxerunt, sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat: tum imam basim eius atramento notare: resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut si quid delapsum non est, manu cogatur. post hæc umbilicum attrahere, & quà notà atramenti est, lino, uehementer astringere. deinde partem superiorem, aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur. atque ut cætera uis, ulcus nutrire, id què non solum ubi intestinum, uel omentum, uel utrinque est, sed etiam ubi humor est, optimè proficit, sed ante quædam uisenda sunt, ne quod ex uinculo periculum sit. nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo fere anno ad quartumdecimũ. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est: at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. leuibus quoque tumoribus facile subuenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernũ uitandum est: uer idoneum maximè est: ac prima ætas non aliena est. præter hæc abstinerè pridie debet. neque id satis est: sed alijs quoque ei ducenda est, quò facilius omnia quæ excellerunt, intra aluum confidant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur?

Caput X.V.

A Q V A *his, qui hydropici sunt, emitti oportere alius dixi. nunc quemadmodum id fiat, dicen-*
dum est. quidam autem sub umbilico, fere quatuor interpositis digitis, à sinistra parte: Quidam ipso um-
bilico perforato, facere consueverunt: quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso: quia
quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita-
re, ne qua uena incidatur. Id tale esse debet, ut fere tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat. de-
mittendumque ita est, ut membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur: Et tum plu-
bea, aut zinea fistula coniicienda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgē-
te, quodam mora, ne tota intus delabi possit. Huius ea pars, quæ intra paulo longior esse debet, quam quæ
extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atque ubi maior
pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in uulnere, si id uisum non est, relinquenda.
deinde per insequentes dies, circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appa-
reat. quidam tamen etiam non ulla cute, protinus fistulam recipiunt, & super uulnus spongiam expres-
sam deligant: deinde postero die rursus fistulam demittunt (quod recens uulnus paulum diductum pati-
tur) ut siquid humoris superest, emittatur: idque bis ita fecisse contenti sunt.

De intestinorum vulnerum curationibus.

Cap. . X.V.I.

Nonnunquam autem uenter istu aliquo perforatur : sequiturque, ut intestina enoluantur : quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint : deinde an his color suus maneat, si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam retuli, latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod dubia spes, certa desperatione sit potior. interdum enim glutinatur. Tum si utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est (quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat) medicina omnis inanis est, si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est : Momento enim alienantur, externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus. & si angustius uulnus est, quam ut intestina commodè refundantur, incidendum est, donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adiectum. tum minister oras uulneris leuiter diducere manibus suis, uel etiam duobus hamis membranae interiori iniectis, debet : medicus, priora semper intestina, quae posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorum locum seruet, & positis omnibus, leniter homo concutiendus est. quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi confidant. his conditis, omentum quoque considerandum est : ex quo, si quid iam nigri, & emortui est, forfice excidi debet. si quid integrum est, leniter super intestina diduci, futura autem neque summæ cutis, neque interioris membranae, per se satis proficit, sed utriusque. & quidem duobus linis iungenda est, spissior quam alibi : quia & rumpi facilius motu uentris potest, & non æquè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duas acus fila coniungenda, eaque duabus manibus tenenda : & prius interiori membranae futura iniungenda est, sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinistiore à principio uulneris, orsa, ab interiori parte in anteriorem acui immittat. quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acui longe sit, quæ reclusa est : semel utraque parte traiecta, permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra : ea ueniat in sinistra, quæ in dextra continuat. iterumque eodem modo per oras immittendæ sunt. Atque ita tertio, & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus, includenda plaga. post hæc eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ. similiq; ratione ei quoque parti utraque futura iniungenda semper ab interiore parte acubus uenientibus, semper inter manus traiectis. dein glutinantia iniungenda, quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex acero impressam accedere debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impossibile his, leniter deligari uenter debet.

Interdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiritu, uel sub graui fasce, interior abdominis membrana superiore cute integra rumpitur. quod foeminis quoque ex utero saepe euenire consuevit; sitque praecipue circa ilia. sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat; hisque intenta cutis indecore intumescat. atque id quoque aliter ab alijs curatur. quidam enim per acum duobus linis ad imam basin immisissis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uua positum est, ut quidquid super uinculū est, emoriatur. quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem myrtacei folij (quod semper eodem modo seruandum esse iam posui) & tum oras sutura iungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte istumor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit; quaque integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, immittendū scalpello duarum linearum sunt: ut exciso medio, interior membrana utrinque rectam plagam habeat: quia quod uetus est, futura non in conloco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed ueterem habet; tenuis excidenda habena est, quae tantum ora cius exulseret. cetera, quae ad futurae reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

De uaricibus uentris.

Præter hæc euenit, ut in quorūdam uentribus uarices sint. quarum, quia nulla alia curatio est, quam quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo.

De testiculorum natura, & morbis eorum.

Cap. XVIII.

VENIO autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent: quæ quò facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quiddam medullis habent, nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. dolent autem in ictibus & inflammationibus tumidi, quibus hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos neruos, quos *νεύματα* Græci nominant: cum quorum utroque, binæ descendunt & uenæ, & arteriæ. hæc autem tunica conteguntur tenui; neruosa, sine sanguine, alba, quæ *ἐπιδιδυμὴ* a Græcis nominatur. super eam ualentior tunica est, quæ interiori uehementer ima parte inhaeret, & *ἐπιδιδυμὴ* Græci uocant. Multæ deinde membranulae uenas & arterias, eosque neruos comprehendunt; atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus tenues, paruaque sunt. hæc tenues propria utrique testiculo, & telamenta, & auxilia sunt. communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui tam conspicitur a nobis, *σχιόν* Græci, scrotū nostri uocant; isque ab ima parte, medijs tunicis leuiter innexus est; a superiore, tantum circumdatus est. Sub hoc igitur plura uitia esse consueunt: quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt. si quidem interdum uel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur. uel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit: tum pondere, eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam intestinum. atque ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores quoque partes nūm, subinde neruofas tunicas, & ob id, eius rei patientes diducit; *ἐκτομή*, & *ἐκτομή* Græci uocant, apud nos indecorum, sed commune his herniæ nomen est. deinde si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illucue conuersum, aut aliquo modo collocatum. itemque si retentus est spiritus, non magnopere increfcit: tamen uero inæqualis est, & mollis, & lubricus. at si intestinum quoque descendit, humor his sine inflammatione modo minuitur, modo increfcit: estque fere sine dolore; & cum conuiescit aliquis, aut iacet, interdum ex toto desidit, interdum sic dimiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore, & satietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit: frigore omni contrahitur: calore diffunditur, estque tum scroto, & rotundum, & tactu leue: idque quod subest, lubricum est, si pressum est, ad inguē reuertitur; demissumque, iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur. & id quidem in leuioribus malis euenit. nonnunquam autem stercore accepto, uastius tumet, retroque compelli non potest: affertque tui dolorem, & scroto, & inguinibus, & abdomini: nonnunquam stomachus quoque affectus, primum rursam bilem per os reddit, deinde uiridem, quibusdam etiam nigram. Integris uero membranis, interdum eam partem humor distingit: atque eius quoque species duarum sunt: nam uel inter tunicas is increfcit, uel in membranis, quæ ibi circa uenas & arterias sunt, ubi hæc grauata occurrerunt, ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est: nam modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit. Græci communi nomine, quidquid est, *ὑδρόκηλη* appellant. nostri (ut scilicet nullis discrimini bus satis cognitis) hæc quoque sub eodem nomine, quo priora habent, signa autem quædam communia sunt, quædam propria. communia, quibus humor deprehenditur. propria, quibus loci humorem subesse dicimus. si tumor est nunquam ex toto se remittens, sed interdum leuior, aut pp. famē, aut pp. febriculam, maximeque in pueris; hisque mollis est, si non nimius humor subest. at si his uehementer increuit, renititur, sicut uter repletus, & arte strictus. uenæ quoque in scroto inflantur; & si digito pressimus, cedit humor, circumfluensque, id quod non premitur, attollit; & tanquam in uitro cornu ue per scrotum

tum apparet: isque quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem eius sicprehenditur: si inter summam, mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos remittens subit. scrotum ipsius & albidius est. si ducitur, aut nihil, aut parvulum intenditur. Testiculus ea parte, neque visui, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit: adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat. prater hanc, & quæ integris tunicis ramex innascitur (scrotum) Græci appellant) uenæ intumescunt; hæc quoque intortæ, conglomeratæque ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculū, neruumque eius intumescunt. Ex his, quæ in ipso scroto sunt, oculis patent; hæc uero, quæ mediz, imæue tunicæ insident, ut magis conditæ, non æquæ quidem cernuntur; sed tamen etiam uisui subiectæ sunt; præterquam quod & tumoris aliquid est, pro uenarum magnitudine & modo; & id prementi magis renititur, ac per ipsum uenarum toros inæquale est; & qua parte id est, testiculus magis iusto. dependet, cum uero etiam super ipsum testiculū, neruumque eius, id malum increuit; aliquantulum longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, ut pote alimento amisso. Raro, sed aliquando, caro quoque inter tunicas increuit; Græci uocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert; & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atque ilia peruenit; partesque hæc intumescunt: neruus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indurescit super hęcinguæ quoque nonnunquam uarices implent: *βουβοκοίλιον* appellant.

De testiculorum curationibus communibus; & primo de incisione, & curatione inguinis, uel scroti. Caput XIX.

HIS cognitis, de curatione dicendum est, in qua, quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de communibus dicam. loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant; nã quæ uel sanari non possint, uel aliter *nutriri* debeant, dicendum erit, simul cum ad species singulas uenero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante riduum, bibere aquam pridie, abstinere etiam à cibo debet; Ipso autem die, collocari supinus; deinde si inguen incidendum est, idque iam pube contegitur, ante radendum est; & tum extento scroto, ut curis inguinis intesta sit, id incidendum sub imo uentre, quæ cum abdomine, tunicæ inferiores committuntur, aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur: perueniaturque ad eam, quæ media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demittendus est sinistra manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scroto, sursum uersus eum debet extendere, & quàm maximè ab inguinibus abducere, primum cum ipso testiculo; dum medicus omnes membranulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscedat: deinde sine eo, ut is delapsus, ipsi plagæ iungatur, digitoque inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua uitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores uero, ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundant. si media tunica uexata erit, aut sub ea malum increuit; excidenda erit, sic, ut alæ ad ipsum inguen præcadatur. infra tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. itaque ibi reliquendum est. Idem in ima quoque tunica, si læsa est, faciendum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea abscedenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat. Neque tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet: purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leniter demittendus est; uidendumque ne sanguis in scrotum descendat, ne ue concretus aliquo loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. lina, quibus capita eorum continebuntur, extra plagam dependere debent: quæ pure orto, sine ulla dolore excident. Ipsi autem plagæ iniiciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinuntur. solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda; sed leniter tantum ponenda sunt; supraque ea, quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto, uel lana succida, uel spongia. Et tertia eadem, quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. At cum infra incidi oportet, resupinato homine, subiicienda sub scroto sinistra manus est, deinde id uehementer apprehendendum, & incidendum. si parvulum est, quod nocet, modicè: ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculū infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. sed primò rectus scalpellus quàm tenuissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut transversa membrana secet, quæ inter summam, mediamque tunicam sunt. At si uitiū in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic, ut tertia quoque, si illa uitiū tegit. Ubique repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderatè scrotum oportet; medicum digito, manubrio, uel scalpello diductam inferiorem partem tunica, extra collocare; deinde eam ferramento, quo ad similitudinem curuum uocant, incidere, sic, ut in eandem intrare duo digitus index & medius possint. His deinde coniectis, excipiendæ reliqua pars tunicæ, & inter digitos scalpellus immittendus est: eximendumque, aut effundendum quicquid est noxiū. quacunque autem tunicam quis uolauit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra di-

xi. quàm altissime ab inguine in am paulo infra. Ceterum antequàm excidantur, hæ quoque uiri-
cili lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relinquenda sunt; sicut in alijs quoque uenis, quæ
id requisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oræque scroti futuris inter se committendæ; ne-
que paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio; neque multis, ne inflammationem augeant. At-
que hic quoque uidendum est, ne quid in scroto sanguinis maneat: tum imponenda glutinantia sunt.
Siquando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquid uel concretum ex eo decidit; incidi subter id debet;
purgatoque eo, spongiz aceto madens circumdari. Deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fa-
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluendum; sed his die tantum aceto irro-
randa lana uel spongia. si dolor est, tertia die resoluendum; & ubi fibulæ sunt, hæ incidendæ; ubi linamē-
tum id mutandum est; rosæque & uino madefaciendum id, quod imponitur. si inflammatio increuit, adij-
ciendum prioribus cataplasma ex lenticula & melle; uel ex malicorio, quod in austero uino coctum sit;
uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non conquiērit post diem quintum, multa calida aqua uulnus fo-
uendum, donec scrotum ipsum & extenuetur, & rugosius fiat. tum imponendum cataplasma ex triticea
farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa, si robustus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt.
neque dubium est, quodcumque initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus mouent, im-
ponenda sint: quod si pus in ipso scroto ortū est, paulum id incidi debet, ut exitus detur: linamentumque
eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter neruos, priore cataplasmate,
dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi uulnera pertinent. cetera & in curatione, & in uisui-
similia his esse debent, quæ in alio quoque uulnerum genere præcepimus.

De intestini curatione.

Cap. XX.

In scrotum descendit

HI S propositis, ad singulas species ueniendum est: ac si cui paruulo puero intestinum descendit,
ante scalpellum, experienda iunctura est. fascia eius rei causa fit: cuius loco pila assuta est ex panniculis
facta, quæ ad repellendum intestinum, ipsi illi subiicitur: deinde reliqua fasciæ pars arctè circumdatur. sub
quo sepe & intus compellitur intestinum: & inter se tunice glutinatur. Rursus si etas processit, multumque
intestini descendisse ex tumore magno patet, adiiciunturque dolor, & uomitus, quæ ex stercore, & ex crudi-
tate, eo delapso, fere accidunt. Scalpellum adhiberi sine perniciē non posse manifestum est. leuandum ta-
tummodò malum, & per alias curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde si ui-
res patiuntur, imperanda tridui abstinentia est: si minus, certè pro uiri corporis quàm longissime. Eodem
uero tempore super habendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc,
& farina hordeacea cum resina iniicienda; & his demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoque
adiectum sit: daudumque aliquid cibi lenis, calidi. quidam etiam aluum ducunt. id ducere aliquid in scro-
tum potest: educere ex eo non potest. per ea uero, quæ supra scripta sunt, leuato malo, si quando alias
dolor reuerterit, eadem erunt facienda. sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari super-
uacuum est: non quò excludi à scroto non possint (nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quò repul-
sa, inguinibus immorentur: ibique tumorem excitent: atque ita fiat mali non finis, sed mutatio. At in
eo, quem scalpello curari oportebit, simul atque ad mediam tunicam uulnus in inguine factum peruene-
rit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis, medicus
eam liberat. neque enim cum periculo lædatur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea, nò po-
sit. Ubi deducta autem erit ab inguine usque ad testiculū incidi debet, sic, ne ipse lædatur: tum
excidi. fere, tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit. si uir robustus est, ma-
iusque id uitium est, extrahi testiculū non debet: sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit: Inguē
eadem ratione, usque ad mediam tunicam scalpello aperitur: eaque tunica, eodem modo duobus hamis
excipitur, sic, ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum
uersus scalpello inciditur: sub eaque, index digitus sinistræ manus, ad imum testiculū demittitur, eumque
ad plagam compellit: deinde dextræ manus duo digiti, pollex atque index, uenam, & arteriam, & neruum
tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. quòd si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resol-
uuntur; donec ante oculos tota iā tunica sit. excisis quæ excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quo-
que eius uulneris, quod in inguine est, demenda habennula paulo latior, est, quò maior plaga sit; &
plus creare carnis possit.

De omenti curatione.

De omenti curatione.

Cap. XXI.

AT si omentum descendit; eodem quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen,
diducendæque tunice sunt. Considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod par-
uum est, super inguen in aluum uel digito, uel aucto specillo repellendum est. si plus est, sinere oportet
ret dependere quantum ex utero prolapsum est: idque adurentibus medicamentis illinere, donec emo-
riatur, & excidat. quidam hic quoque duo lina acu traiciunt, binisque singulorum capitibus diuersas par-
tes astringunt: sub quo æquè, sed tardius emoriatur. Adijcitur tamen hic quoque celeritati, si omentum
super uinculum illinatur medicamentis, quæ sic exedunt, ne erodant; Græci uocant. Fuerunt etiā qui
omentum forfice præciderent: quod in paruulo non est necessarium: si maius est, potest profusionem
sanguinis

irrigatione sanguinis facere : siquidem omentum quoque uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est . neque uero, si dissecto uentre id prolapsum fornice praeciditur (cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli non possit) inde huc exemplum transferendum est . Vulnus autem curari, si relictum omentum est, futura debet : si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est : si uero humor intus est ; incidendum est ; in pueris quidem inguen (nisi in his quoque liquoris eius maior modus prohibet) in uiris uero, & ubicunque multus humor subest, scrotum . deinde si inguen incisum est, eo protrahis tunicis humor effundi debet . si scrotum, & sub hoc protinus nitium est, nihil aliud, quam humor est effundendus : abscedendaeque membranae sunt, si quae eum continuerunt ; deinde eluendum id ex aqua, quae uel salem adiectum, uel nitrum habeat . si sub media, imaue tunica ; totae hae extra scrotum collocandae, excidendaeque sunt .

De ramice curatione . in scroto . Cap. XXII.

RAMEX autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quae ipsis uenis infigantur : cum eo, ne amplius quam has urant, maximeque ubi inter se implicatae glomerantur, eo ferrum id admouendum est : tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est : utendumque eo uinculo, quod idoneum esse auctor curationibus posui . tertio die lenticula cum melle imponenda est . postiectis crustis, ulcera melle purganda ; rosa impleda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt . quibus uero super mediam tunicam, uenae tument, incidendum inguen est, atque tunica promouenda, ab eaque uenae, digito uel manubriolo scalpelli separandae . qua parte uero inhaerebunt, & ab superiore, & ab inferiore parte, lino uinciendae : tum sub ipsis uinculis praecidendae, reponendusque testiculus est . At ubi supra tertiam tunicam **ramex** insedit, mediam excidi necesse est : deinde si duae tresue uenae tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uirio uacet ; idem faciendum, quod supra scriptum est ; ut ab inguine & a testiculo deligatae uenae praecidantur : isque condatur, sin totum id **ramex** obsiderit : per plagam demittendus digitus index erit ; subiiciendusque uenis, sic, ut paulatim protrahat, & quae adducendo ; donec is testiculus par alteri fiat . tum fibulae oris sic uinciendae, ut simuleas quoque uenas comprehendant . Id hoc modo fit : acus ab exteriori parte, oram uulneris perforat : tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur : per eamque, in alteram oram compellitur, uenae uulnerari non debent, ne sanguinem fundant : membrana semper inter has uenas est, ac neque periculum effert, & filo comprehensas illas abunde tener . itaque etiam satis est, duas fibulas esse . tum uenae, quaeunque protrahae sunt in ipsum inguen, aduerso specillo comprehendi debent . soluendi fibulas tempus, inflammatione finita, & purgato uulnere, est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat . Ubi uero inter imam tunicam & ipsum testiculum, neruumque eius, **ramex** ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscedit . nam neque ad generationem quidquam is confert, & omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet, sed totum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est . Idem in ima faciendum, neruusque, ex quo testiculus dependet, praecidendus . post id uenae & arteriae ad inguen lino deligandae, & infra uinculum abscedendae sunt .

De carne, quae inter tunicas testiculorum concreuit, et de neruo indurato . Cap. XXIII.

CARO quoque si quando inter tunicas concreuit ; nihil dubij est, quin eximenda sit : sed id, ipso scroto inciso fieri commodius est . At si neruus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest : Vigent enim febres ardentes, & aut uirides, aut nigri uomitus, praeter haec ingens sitis, & linguae aspritudinis ; fereque a die tertio, spumans bilis aluo cum rosione redditur . atque neque assumi facile cibis, neque contineri potest ; neque multo post extremae partes frigescent : tremor oritur : manus sine ratione extenduntur . deinde in fronte frigidus sudor, cumque mors sequitur .

De ramice inguinis . Cap. XXIII.

VB I uero in ipso inguine **ramex** est, si tumor modicus est, semel incidi ; si maior, duabus lineis debet, ut medium excidatur : deinde non extracto testiculo (sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui) colligendae uenae uinciendaeque, ubi tunicis inhaerebunt, & sub his modis praecidendae sunt . neque quidquam noui, curatio uulneris eius requirit .

Ad regendam glandem colis, si nuda est . Cap. XXV.

AB his ad ea transeundum est, quae in cole ipso fiunt : In quo, si glans nuda est, uultque aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest, sed expeditius in puero, quam in uiro : in eo, cui id naturale est, quam in eo, cui quondam gentium more circumcisus est ; in eo, cui glans parua, iuxtaque eam cutis, spatiosior uero ipse coles est, quam in quo contraria his sunt . Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est . cutis circa glandem apprehenditur, & extenditur, donec illam ipsam condat, ibique deligatur . deinde iuxta pubem, in orbe tergo inciditur, donec coles nudetur, magnaue cura cauetur, ne uel urinae iter, uel uenae, quae ibi sunt, incidantur . eo facto, cutis ad uinculum inclinatur, nudaturque circa pubem, uelut

circulus: eoque linamenta dantur, ut caro increſcat, & id impleat, ſatisque uelamenti ſupra latitudo pla-
ga præſtat, ſed donec cicatrix ſit, uinculum eſſe id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere:
at in eo, qui circuncifus eſt ſub circulo glandis ſcalpello diducenda cutis ab inferiore cole eſt. non ita do-
let, quia ſummo ſoluta, deinde deorſum uſque ad pubem manu poteſt: neque ideo ſanguis profluat. Re-
ſoluta autem cutis rurfus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua fouetur: emplaſtrumque
circa datur, quod ualentem inflammationem reprimat. proximisque diebus, ut prope à fame uictus eſt,
ne forte eam partem ſatietas exciteſt, ubi iam ſine inflammatione eſt, deligari debet à pube uſque circu-
lum. ſuper glandem autem, aduerſo emplaſtro impoſito induci. ſic enim ſit, ut inferior pars glutinetur:
ſuperior ita ſaneſcat, ne inhzreat.

Quomodo glans penis conteſta, aperiri poſſit.

Contra ſi glans ita conteſta eſt, ut nudari non poſſit (quod uirum Græci *phimosis* appellant) aperi-
da eſt. quod hoc modo ſit: Subtrahit à ſumma ora, cutis inciditur, recta linea uſque ad frenum; atque ita ſu-
perius tergus relaxatum, cedere retrò poteſt. quod ſi parum ſic profectum eſt, aut propter anguſtias, aut
propter duriſſimam tergoſis, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda eſt ſic, ut uertex
eius ad frenum, baſis in tergo extremo ſit. tum ſuper danda linamenta ſunt, aliaque medicamenta, quæ ad
ſanitatē producant. neceſſariū autē eſt, donec cicatrix ſit, coqui eſcere, nā ambulatio, atterendo, ulcus for-
didum reddit.

Inſibulandi ratio.

Inſibulare quoque adoleſcentulos, interdum uocis, interdum uelutudinis cauſa quidam conſue-
runt, cuiusque hæc ratio eſt. Cutis, quæ ſuper glandem eſt, extenditur, notaturque utrinque lateribus atramento,
quæ perforatur, deinde remittitur. ſi ſuper glandem notæ reuertuntur, nimis apprehenſum eſt, & ultra no-
tari debet. ſi glans ab his libera eſt, is locus idoneus ſibulæ eſt: tum quæ notæ ſunt, cutis acu filū ducente
transiit, cuiusque fili capita inter ſe deligantur, quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatrici-
læ ſiant. ubi hæ confirmatæ ſunt, exempto filo ſibula additur; quæ quod melior, eo leuior eſt, ſed hoc quidē
ſæpius inter ſuperuacua, quàm inter neceſſaria eſt.

De urinae reddendæ difficultate, & de calculo, curationibusque eorum.

Cap. XXVI.

RES uero interdum cogit emolui manu urinam, cum illa non redditur, aut quia ſenectute iter
eius collapſum eſt: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex ſanguine intus ſe oppoſuit. ac mediocriſ
quoque inflammatio ſæpe eam reddi naturaliter prohibet. idque non in uiris tantummodo, ſed in fo-
eminis quoque interdum neceſſarium eſt. Ergo æneæ fiſtulæ ſunt, quæ ut omni corpori ampliori, mino-
rique ſufficiant; ad mares tres; ad foeminas duæ medico habendæ ſunt. Ex uirilibus, maxima, decem &
quinque eſt digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor ſex.
Incuruas uero eſſe eas paulum, ſed magis uiriles oportet, leuiſque admodum, ac neque nimis plenas, ne-
que nimis tenues. Homo tum reſupinus, eo modo, quo in curatione an figuratur, ſuper ſubſeſſum, aut le-
uatum collocandus eſt: Medicus autem à dextro latere, ſiniſtra quidem manu, collem maſculi continere;
dextra uero fiſtulam demittere in iter urinæ debet. Atque ubi ad ceruicem ueſicæ uentum eſt, ſimul cum
cole, fiſtulam inclinatam, in ipſam ueſicam compellere; eamque, urina reddita, recipere. Foemina, breuius
urinæ, ſimiliter, & rectius iter habet. quod mammulæ ſimile, inter imas oras ſuper naturale poſitum, non
minus ſæpe auxilio eget: aliquantò minus difficultatis exigit. nonnunquam etiam prolapſus in ipſam
fiſtulam calculus (qui ſubinde ea extenuatur) non longè ab exitu inhzreſcit. eum ſi fieri poteſt, oportet
uellere, uel oſculario ſpecillo, uel eo ferramento, quo in ſectione calculi protrahitur. ſi id fieri non po-
tuit, cutis extrema quàm plurimum attrahenda, & condita glande, lino uincienda eſt; deinde à latere, recta
plaga coles incidendus, & calculus eximendus eſt: tum cutis remittenda. ſic enim ſit, ut incifum colē inte-
gra pars cutis contegat: & urina naturaliter profluat.

Que curatio calculoſis adhibeatur.

CVM ueſicæ uero, calculique facta mentio ſit, locus ipſe exigere uidetur, ut ſubijciam, quæ cura-
tio calculoſis (cum aliter ſuccurri non poteſt) adhibeatur. ad quam feſtinare, cum præceps ſit, nullo mo-
do conuenit. ac neque omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni uitio id experiendum eſt, ſed
ſolo uere, in eo corpore, quod iam nouem annos, nondum quatuordecim exceſſit; & ſi tantum mali ſub-
eſt, ut neque medicamentis uinci poſſit, neque etiam trahi poſſe uideatur, quò minus interpoſito ali-
quo ſpatio interimat. non quò non interdum etiam temeraria medicina proficiat: ſed quò ſæpius, uti-
que in hoc fallat; in quo plura & genera, & tempora periculi ſunt; quæ ſimul cum ipſa curatione pro-
ponam. Igitur ubi ultima experiſſe ſtatutum eſt, antè aliquot diebus uictu corpus preparandum eſt, ut mo-
dicos, ut ſalubres cibos, ut minime glutinofos aſſumat, ut aquam bibat. ambulandi uero inter hæc exer-
citatione utatur, quò magis calculus ad ueſicæ ceruicem deſcendat: quod an incident, digitis quoque,

cut in curatione docebo, demissus cognoscitur. Ubi rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda; quæ hoc modo ordinatur. Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum, & aduersum, super genua sua coxis eius collocatis comprehendit; reductisque eius cruribus ipsum quoque iubet manibus ad suas poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est, qui curatur, duobus sedilibus iunctis, duo valentes insidunt: quod & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur; atque alter, pro ut confedit, sinistrum crus eius; alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continet; super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus; & in angustū compulsa uesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num à lateribus duo valentes obijciuntur, qui circumstantes, seuare uel unum, uel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circuncis, atque sinistra manu, duos eius digitos, indicem & mediū, leniter prius unum, deinde alterum, in anum eius demittit; dextræque digitos super anum abdomen leniter imponit: ne si utrinque digiti circa calculum uehementer concurrerint, uescicam triant. neque uerò festinanter in hac re, ut in plerisque agendum est: sed ita, ut quam maxime id tutò fiat. nam læsa uesica, neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa ceruicem queritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem, nisi cum in hoc indicij suis cognitum est. si uerò aut ibi non fuit, aut recessit retrò; digiti ad ultimam uescicam dantur; paulatimque dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, necesse est in manus incidat eo curiosius deducitur, quod minor, leuiorque est, ne effugiat; id est ne sæpius agitata uesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur; sinistra digiti deorsum eum compellit, donec ad ceruicem peruenitur. In quam si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus, sic, ut transuersus sit. si quadratus, ut duobus angulis fideat: si altera parte plenior sit, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotunda nihil interesse ex ipsa figura patet; nisi si leuior altera parte est, ut ea antecedit. Cum iam eo uenit, ut incidi super uescicæ ceruicem iuxta anum, cutis, plaga lunata, usque ad ceruicem uescicæ debeat, cornibus ad coxas spectantibus paulum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est, etiam num sub cute, altera transuersa plaga facienda est, qua ceruix aperitur: donec urinz iter pateat: sic, ut plaga paulò maior, quam calculus sit. nam qui metu fistulæ (quam illo loco χολάδα Græci uocant) parum patefaciunt: cum maiore, eodem, periculo reuoluuntur: quia calculus, iter, cum ui promittitur, facit; nisi accipit. Idque etiam perniciosius est, si figura quoque calculi, uel asperitudo, aliquid eo contulit. ex quo & sanguinis profusio, & distentio neruorum fieri potest. quæ si quis euasit, multo tamen patientiorem fistulam habiturus est, rupta ceruice, quam habuisset incisa. Quæ uerò patefacta est, in conspectu calculus uenit. In cuius corpore, nullum discrimen est. ipse, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest. si maior; iniiciendus à superiore ei parte uncus est, eius rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi specie retusæ latitudinis; ab exteriori parte, leuior, quæ corpori iungitur; ab interiori asper, qua calculum attingit. isque longior potius esse debet: nam breuius, extrahendi uim habet. Ubi iniectus est, in utrunque latus inclinandus est, ut appareat calculus, & teneatur; quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoque eo minimo opus est: ne, cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram uulneris incidat, eamque conuulneret. in qua re, quod periculum esset, iam supra proposui. Ubi satis teneri calculus patet; eodem pene momento triplex motus adhibendus est in utrunque latus, deinde extrà, sic tamen, ut leniter id fiat, paulumque primò calculus attrahatur. quo facto, attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. quod si aliquando à superiore parte calculus parum commodè comprehenditur, à latere erit apprehendendus. hæc est simplicissima curatio. Sed uarietas rerum quasdam etiam num animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi; qui per se quidem delapsi in ceruicem, sine ullo periculo eximuntur: In uesica uerò non tutò uel hi conquiruntur, uel attrahuntur: quoniam ubi illa conuulnerantur, ex distentione neruorum, mortem maturant; multoque magis, si spina aliqua uescicæ inhæret: eamque, cum duceretur, duplicauit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in ceruice calculum esse: eo quod cruenta destillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiundum est; neque adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoque leniter intus digiti obijcendi, ne uiolenter promouendo, conuulnerent: tum incidendū. Multi hic quoque scalpello usi sunt; Me- ges (quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, quæ cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumque. id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito, sic deprimebat, ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat, incidere. quo conloquebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. quocumque autem modo ceruix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet: nulla propter festinationem, ui admota.

Signa calculorum, uel farenosorum, uel mollium

AT calculus farenosus, & ante manifestus est: quoniam & urina, quæ redditur, farenosa est; & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos, neque, neque leniter renititur, & insuper dilatur.

Signa calculi vel arenos.

vel mullum
ex tactu. & quo extrahendi
cum cautione.
inter calculi sunt, singuli protrahi debent
ut si quis exiguus supererit,
ut reliquias: singulis in uelica
nihil moueatur; inuentusque, celeriter
ita longa inquisitione uelica
inflammationes mortiferas: adeo
scilicet, cum diu frustra per
uelicam esset agitata, decesserint.
accedit etiam, quod exiguus calculus
egregius, uelica postea promouetur, excidit
autem maior; non uidetur, nisi rupta
extrahi posse, fridendum? quo
cautio.

Ammonius & Dorotheus.

De calculis foemin.

foemina, ubi paruulus calculus est, cal-
supernacius est: quia si urinam in
eum non compellit, quæ & breuior
in maribus, & laxior est. Ergo &
sepe excidit: & si in primo, quod
ingressus, abiret, rursus educitur.
Curatio in pueris. calculis.
si lusus diuini, tanquam masculo
fieri, per uia eius debent.
Locus inuenitur.
non conuenit, si plus ex muliebri
pore sanguinis profluit.

Eius curatio calculo euulso.

calculo euulso, si ualens corpus est,
magis uexatum, finire oportet
urine fluere, quæ minor inflammatio
est. atque ingreditur, quæ cum paulum
locum est, ut excidat, si quis uel
si sanguinis mansit, eod si perse-
chit, rursus ne uis omnis in uelica
fieri debet: idque protinus in imbecillioribus
ab ipsa curatione facienda est.
ut ut diuinatione neruorum pericula
ingratis, dum uelica eum agitur:
ut metus excipitur, remotis medi-
camentis, ne tantum sanguinis profluit,
excidat.

Ciccurbinal. iouis.

figura signi. cataplasma. n.
solum, & modus. uul.
fomentis eadem adhibendo offendat.
Vulnus. Lapsus sanguis cum oleo
inde oleo tepido madefaciendus est,
si foris ad uelicam admittatur, &
si foris non possit.
Cataplasma. damna. & uul.
in die, si spiritus difficilis reddat
urina non excidit, si locus circa pubem
inuenitur, circa licet, in uelica san-
guinem remanere.
eius excipi debet.
in cataplasma, vis. gn. nepe.
neque, nequid uis (si) maxime
relaxando, id uelice imbecillitas pueri.
Curatio in uexatis.

in sepe, neque sanguis in aqua cal-
habebatur, quæ adolecentis, infirmis
uolens, leui quam grauius inuenitur, an-
ne affligit, si uis corpus agitur
quam it, eum agitur est.
ramus & & qualis (si) & qualis
& si sit modica, & uelice inuenitur, an-
& si modica, & cum febre modica de-
sire dicti, patet per uia eius debent.
in his inuenitur, si uelice inuenitur,
in fomen. & phar. pus moue. purga-
vis emmaphar. uul.

Item mollis calculus, & ex pluribus minutisque, sed inter se parum astrictis compositis, indicatur, in se
atrahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes leniter permutatis subinde digitorum uicibus, sic oportet
abducere, ne uelicam lædant, ne ue intus aliqua dissipata reliquæ maneant, quæ post modum curatio-
ni difficultatem faciant. quidquid autem ex his in conspectum uenit, uel digitis, uel unco eximendū est.
at si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinqua-
tur. si quidem in uelica difficulter inuenitur; inuentusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione uesi-
ca læditur: excitaturque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam secti, cum diu frustra per digitos
uelica esset agitata, decesserint. quibus accedit etiam, quod exiguus calculus ad plagam, urina postea pro-
mouente, excidit. si quando autem is maior non uidetur, nisi rupta ceruice, extrahi posse, findendus est,
cuius repertor Ammonius, ob id *λιδωτός* cognominatus est. Id hoc modo fit: uncus iniicitur calculo, sic,
ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retrō reuoluatur. tum ferramentum adhibetur crassitudi-
nis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna
cura habita, ne aut ad ipsam uelicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura, ne quid incidat.

An recurat.

De calculis foeminarum.

ut si sit potius, quoniam urina in
ceruicem eum, decompellit, peruenit

Hæc uero curationes in foeminis quoque similes sunt; de quibus tamen parum proprie quædam
dicenda sunt, si quidem in his, ubi paruulus calculus est, scapellus supernacius est; quia is urinam in cer-
uicem non compellit, quæ & breuior quam in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in
primo, quod est angustius, inhaeret; eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis
necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti, tanquam masculo, mulieri, per naturalia eius debet.
in uirgini quidem sub ima sinistiore ora: mulieri uero, inter urinae iter, & os pubis incidendū est, sic, ut
utroque loco plaga transuersa sit, neque terri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quæ curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si ualens corpus est, neque magnopere uexatum, finire oportet sanguinem flue-
re, quod minor inflammatio oriatur: atque ingredi quoque eum paulum, non alienum est, ut excidat, si
quid intus concreti sanguinis mansit. quod si per se non destitit, rursus, ne uis omnis intereat, supprimi
debet. idque protinus in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est. si quidem in distentione ner-
uorum periclitatur aliquis, dum uelica eius agitur; sic alter metus excipitur, remotis medicamentis, ne
tantum sanguinis profluit, ut occidat. quod ne incidat, desiderare is debet in acre acetum, cui aliquan-
tum salis sit adiectum. sub quo, & sanguis fere conquiescit, & astringitur uelica; ideoque minus inflam-
matur. quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem
ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus; resupinus collocandus est, sic, ut caput humile sit
coxæ paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens,
deinde interpositis duabus horis, in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad
umbilicum aqua teneat, cætera uestimentis circumdata sint; manibus tantummodo, pedibusque nudatis,
ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet; quo sponsa subinde faci-
le detergendum est: finisque eius fomenti est donec infirmo offendat: tum multo is oleo perungen-
dus, inducendusque hapsus lanæ mollis tepido oleo repletus, qui pubem, & coxas, & inguina, & plagam
ipsam contectam eodem ante se linteolo. protegat; isque subinde oleo tepido madefaciendus est, ut ne-
que frigus ad uelicam admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur:
ea plus pondere nocent, quæ uelicam urgendo, uulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne uinci-
lum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficiliter redditur, si urina non excidit, si lo-
cus circa pubem maturè intumuit; scire licet, in uelica sanguinem concretum remanuisse. Igitur demissis
eodem modo digitis, leniter pertractanda uelica est, & discutienda, si qua coierunt. quo fit, ut per uulnus
postea procedant. non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum, per plagam in uelica
compellere: nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam: primo die conue-
nit. si timemus, ne quid intus sit: maximeque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit; cætera
eadem facienda sunt, ut demittatur in solum: ut eodem modo panniculus, eadem lana super iniiciatur.
sed neque sæpe, neque tandiū in aqua calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam uales
leui, quam grauiore inflammatione affectus; is, cuius corpus digeritur, quam is, cuius astrictum est. Inter
hæc uero, si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & fitis modica, & uenter imus, sed & medio-
cris est cum febre modica dolor; scire licet, recte procedere curationem, atque in his inflammatio fere quin-
to, uel septimo die finitur: quæ leuata, solum supernacium est. supini tantummodo uulnus aqua calida
fouendum est, ut si quid urinae rodet, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia; &
si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa temperabitur. huic curationi aptissimu
uidetur *εννεαφάρμακον* emplastrum: nam & seuum habet, ad pus mouendum; & mel, ad ulcus repurgandū
medulla etiam, maximeque uirulina, quod in id ne fistula relinquantur, præcipue proficit. linamenta ue-
ro tum super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum ad id continendum recte imponuntur. at
ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. quibus temporibus tamen, si
felix

[illegible]

Cap. XXVII.

[illegible]

As a point

fita

[illegible]

mentum (*Aluphoros* Greci uocant) in aceto tinctum, demittere: supraque, succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die solvere uncus, & sicut alia ulcera curare. cumque iam ad sanitatem tendet, plumbam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supraque, idem medicamentum iniicere, donec ad cicatricem plaga perueniat.

Que curatione partus emortuus ex uero excutatur. Cap. XXXIX.

VBI concipit autem aliqua, si iam propè maturus partus intus emortuus est, neque excidere per se potest; adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas potest: nam & summam prudentiam, moderationemque desiderat: & maximum periculum affert. sed ante omnia, uulua natura mirabilis, cum in multis alijs, tum in hac re quoque facile cognoscitur. oportet autem ante omnia, resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, ut foeminibus eius ipsius illa comprimantur, quo fit, ut & imus uenter in conspectu medici sit: & infans ad os uulue compellatur: quæ emortuo partu id comprimit, ex intervallo uero paulum dehiscere: hac occasione usus medicus, unctæ manus indice digitum primum debet inferere, atque ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusque alterum digitum demittere debet, & per easdem occasiones, alios, donec tota esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem, multum confert & magnitudo uulue, & uis neruorum eius, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur: cum præsertim intus nonnunquam etiam duæ manus dari debeant. Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum uentrem, & extrema corporis; neque dum inflammationem coepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. nam si corpus iam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi ægerrime potest; sequiturque sæpe cum uomitu, & cum tremore, mortifera neruorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitum eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in transuersum iacet: fere tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo sit. Medico uero propositum est, ut cum manu dirigat uel in manus, uel etiam in pedes; si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est, manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus, in caput; pes, in pedes eum conuertet. tum si caput proximum est, demitti debet uncus undique leuissimus, acuminis breuis, qui uel oculo, uel auri, uel ori, interdum et fronti rectè iniicitur; deinde attractus, infantem educit: neque tamen quolibet is tempore extrahi debet: nam si compresso uulua ore id tentatum est, non emittente eo, infans abruptitur: & unci acumen in ipsum os uulue delabitur: sequiturque neruorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur compressa uulua, conuiescere: hiantem, leniter trahere oportet: & per has occasiones paulatim eum educere. trahere autem dextra manus uncum, sinistra intus posita, infantem ipsum; simulque dirigere eum debet. Solet etiam euenire, ut is infans humore distendatur: ex quo eo profluat fœdi odoris sanies. quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore, extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus iniectus, facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans, non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commodè educitur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, uncus alè iniiciendus, paulatimque attrahendus est. sub quo, fere ceruix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. Remedio est ceruix præcisâ, ut separatim utraque pars auferatur; id unco fit, qui priori similis, in internam tantum partem per totam aciem exacuitur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere maiore parte extracta, caput in uacuum uuluum prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest: si tamen id incidit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo, non imperitus à sinistro latere eius debet assistere, & super imum uentrem eius, duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit, ut illud caput ad os uulue compellatur: idque eadem ratione, quæ supra posita est, unco extrahitur. At si pes alter iuxta repertus est, alter retrò cum corpore est; quidquid protrahitur est, paulatim abscidendum est. & si clunes os uulue urgere coeperint, iterum retrò repellendæ sunt: conquiritusque pes eius adducendus. alixque etiâ plurimæ difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, cõcisus excipi debeat. quoties autem infans protrahitur est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere; medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abruptat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocant (quod uelamentum infantis intus fuit) hisque ultimis apprehensis uenulas, membranulasque omnes eadem ratione manu deducere à uulua, totumque illud extrahere; & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum foeminibus, illa condant collocaanda est, modicum calorem sine ullo preflatu habente. super imum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, & rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his uulneribus, quæ in neruosis locis sunt, adhibeatur.

De anis uitijs, & eorum curatione.

Cap. XXX.

ANI quoque uitijs ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si quæ scissa in eo, uetustate induruerint, iamque callum habent; comodissimum est ducere aluum: tum spongiam calidam admouere, ut relaxentur illa, & foras prodeant. Ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & ulcera remouere: deinde imponere linamentum molle, & super, linteolum illitum melle, locumque

locumque cum molli lana implere & ita uincire altero die, deincepsque ceteris, lenibus medicamentis uti, quæ ad recentia eadem uitia necessaria esse, aliàs proposui & utique per primos dies, sorbitionibus cum sustinere paulatim: deinde cibis adicere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione, pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, neanus ipse suppuret. neque tamen ante properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius concitatur. his quoque uulneribus, lenibus cibis, hisdemque medicamentis opus est.

De condylomatum curatione. & de verrucis.

A T tubercula, quæ *condylomata* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. Alius ante omnia ducitur, tum uolsella tuberculum apprehensum, iuxta radices exciditur. quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increfcit, squama æris coercendum est. Ora etiam uenarum fundentia sanguinem, sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur; alius acutius ducitur, quod magis oræ promoucantur, eoque fit, ut omnes uenæ, quali capitula conspicia sint. Tum si capitulum exiguum est, basimque tenuem habet; astringendum li- no paulum supra est, quæ ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum, id exulcerandū est. quod nisi factum est, magni dolores sub- sequuntur: interdum etiam urinz difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero exci- piendum est; paulumque supra basim incidendum: neque relinquendum quidquam ex eo capitulo: ne- que quidquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. quæ incisum est, acus debet immitti: infraque eam, lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, imum quodque primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undique tenere ci- catrices sint. si sanguis profluit, excipendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda scemina; & inguina, & quidquid iuxta ulcus est, ceratumque super dandum est. farina, ordeacea calida implendusque is locus est: sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemque ca- taplasmate foueri. ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices, ac scemina liquido cerato perun- genda sunt: tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque, aut sex diebus, oriculario specillo li- namenta educenda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda: tum lenibus medicamentis, hisdemque, quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. finito uitio, quemadmodum agendum es- set, iam aliàs superius exposui.

De uaricum curatione.

Cap. XXXI.

A B his ad crura proximistransitus est. in quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & eorum uenularum, quæ in capite nocent, & eorum uaricum, qui in uentre sunt, curationem di- stuli: quoniam ubique eadem est. Igitur uena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu ex- ciditur. si recta est; si, quamuis transuersa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur: si curua est, & uelut in orbes quosdam implicatur, plures quæ inter se inuoluuntur, utilius excimere est: adurendi ratio hæc est. cutis super inciditur: tum patefacta uena, tenui & retuso ferramento candente modice præmi- tur: uitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id, interpositis fere- quaternis digitis, per totum uaricem fit: & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur: & exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam, incisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloque undique à corpore uena diducitur: caueturque ne inter hæc ipsa lædatur: erque retusus hamulus subij- citur; interpositoque eodem fere spatio, quod supra positum est, in eadem uena idem fit; quæ quo ten- dat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi iam idem, quacunque uarices sunt, factum est, uno loco ad- ducta per hamulum uena præciditur: deinde quæ proximus hamus est, attrahitur, & euellitur: ibi rursus absciditur. ac si undique uaricibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur: & super emplastrū glutinans iniicitur.

Curatio digitorum, coherentium.

Cap. XXXII.

A T si digiti uel in utero protinus, uel propter communem exulcerationem postea coheruerunt, scalpello diducuntur. dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur, atque ita per se uer- que sanescit. si uero sit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix, curam eum reddit; primum ma- lagma tentandum est. dein si id nihil prodest (quod & in ueteri cicatrice, & ubi ueni læsi sunt, euenire consuevit) uidere oportet, neruūne id uirium, an cutis sit. si neruū est, attingi non debet; neque enim sa- nabile est. si cutis, tota cicatrix excidenda est (quæ fere callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur) tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

De gangrene curatione.

Cap. XXXIII.

CANGRENA inter ungues, alasque, aut inguina nasci; & si quando medicamenta uin- cuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. sed id quoque cum periculo sum- mo fit: nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectione moriuntur.

De an uitijs & signa scissa in ano, reducta in uia- tangi catum habent, commo- di- gte ducere alia. Spongia scalpello opera. manon. lana, uulnium, uuln- Cuius ratio. signa ex istam. pus in his oritur, ubi id apparuit, incidendum est: ne quæ suppuret: eaq; tñ acti, pperandum non si crudum incisum e, in la- oñi multum accedit, & puris aliq- ampus constitutur.

De condylomatū cura- Alius ante omnia ducitur: tum uol- tuberculum apprehensum, iuxta radice- ciditur. ad eam uenæ, & hæmonia- ubi sanguini, qui effluit, sanies ad- alius acutius ducitur, quod magis oræ moucantur: eaq; fit, ut omnes uen- quasi capitula conspicia sint. quæ a tripe, uno. pper- ratiis quædam uenæ, scalpello eum, capitiue. In utrumque hamulo, & qui in eum, curatione. ducit eum. uia. i pper- i pper- uia, non omnia simul cur- ne tempore eadē uenæ, reuere, adu- spongia, nans. uenæ. Ceratū, uia. infusus, coroplastm. medicamē. uen- tepido continetur. Capitiue digito.

De uaricum curatione. uenarum orti uarices non diffi- tolluntur. curatio ead. Tena omnis quæ noxia e, aut ac- tescit, aut manu exciditur. si recta e, si, quamuis transuersa, simplex, si modica e, uenæ adu- si curua e, & uelut in orbes quos- dam implicatur, plures quæ inter se inuoluuntur, utilius excimere est. adurendi ratio hæc est. cutis super inciditur: tum patefacta uena, tenui & retuso ferramento candente modice præmi- tur: uitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id, interpositis fere- quaternis digitis, per totum uaricem fit: & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur: & exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam, incisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloque undique à corpore uena diducitur: caueturque ne inter hæc ipsa lædatur: erque retusus hamulus subij- citur; interpositoque eodem fere spatio, quod supra positum est, in eadem uena idem fit; quæ quo ten- dat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi iam idem, quacunque uarices sunt, factum est, uno loco ad- ducta per hamulum uena præciditur: deinde quæ proximus hamus est, attrahitur, & euellitur: ibi rursus absciditur. ac si undique uaricibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur: & super emplastrū glutinans iniicitur.

Curatio digiti. coherent. per scalpello. Empla- si sit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix, curam eum reddit; primum malagma tentandum est. dein si id nihil prodest (quod & in ueteri cicatrice, & ubi ueni læsi sunt, euenire consuevit) uidere oportet, neruūne id uirium, an cutis sit. si neruū est, attingi non debet; neque enim sanabile est: si cutis, tota cicatrix excidenda est: quæ fere callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

De gangrenæ curatione. Gangrena inter ungues, alas, inguina nasci; & si quando medicamenta uincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. sed id quoque cum periculo summo fit: nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectione moriuntur.

Verum hic quoque nihil interest an satis tutum praesidium sit, quod unicum est. Igitur inter sanam, uitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex zgra relinquatur. Ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid os nudetur: dein id ferrula praecidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhaerenti. ac tum frons ossis, quam ferrula exasperauit, leuanda est, supraque inducenda cutis; quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. quod cutis inducta non fuerit id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex aceto deliganda. cætera postea sic facienda, ut in uulneribus in quibus pus moueri debet, præceptum est.

LIBER OCTAVVS.

De positi & figura

De positi, & figura totius humani corporis.

Caput I.



Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quò facilius accipi possit, prius positis, figurisque eorum indicabo. Igitur caluaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque leuis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaque eius ab exterioribus partibus dura; ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interque ea uenæ discunt; quas his alimentum subministrare credibile est. fero autem caluaria solida sine suturis est: locis tamen æstuosis facilius inuenitur. & id caput firmissimum; atque à dolore tutissimum est. ex cæteris, quò futuræ pauciores sunt, eo capitis ualutudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite inducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modò sub imo capillo definit: modò frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in anguem committuntur: hæ uero, quæ super aures transuersæ sunt, totis oris paulatim extenuantur: atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Grassissimum uero in capite os post aurem est; quia capillus (ut uerisimile est) ob id ipsum non gignitur. sub his quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies futuram habet maximam, quæ à tempore incipiens per medios oculos, naresque transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. & maxillæ quoque in summa parte singulas transuersas futuras habent. à medijsque naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaque transuersa idem palatum secat: & futuræ quidem in plurimis hæ sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt; deinde narium; tum quæ in auribus habemus: ex his quæ oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. narium duo foramina, osse medio discernuntur: siquidem hæc primum à supercilijs, angulisque oculorum, osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine uerit, quò propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. sed ea foramina, quæ à summis adimas nares simplicia sunt, ibi rursus in binam trineque diuiduntur: aliaque ex his ad fauces perueniunt, spiritum reddunt, & accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte, in multa, & tenuia foramina diffunduntur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque, primo rectum, & simplex iter, procedendo flexuosum fit: quod ipsum, iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxtaque ea duo paruuli quasi sinus sunt. superque eos finitur os, quod transuersum à genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest, ab eadem similitudine à qua id Græci ὤσες appellant. Maxilla uero est molle os; eaque una est; cuius eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: à quo, utrinque procedit ad tempora: solaque ea mouetur. nam male, cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerò ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. alter processus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusque procedens sub osse iugali subit: & super id temporum musculis illigatur. alter breuior, & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auri est, cardinis modo fit: ibique huc & illuc se inclinans, maxillæ facultatem motus præstat. Duriores osses sunt. quorum pars maxillæ; pars superiori ossi malarum heret. Ex his quaterni primi, quia secant, à Græcis nominantur. hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos, utrinque fere maxillares quaterni sunt; præterque in his, in quibus tres ultimi, qui serò gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus; maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternisue nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem edit: recti que dentis recta etiam radix; curui flexa est: Exque eadem radice, in pueris nouus dens subit: qui multò sæpius priorem expellit: inter dum tamen supra, infraue eum se ostendit. Caput autem spina excipit. ea constat ex uertebis quatuor, & uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas: reliquæ quinque sunt proximæ costis. hæ tertes breues que ab utroque latere processus duos exigunt: mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro commissa descendit: circa quoque per duos processus tenuibus cauis perueniunt, per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebre exceptis tribus summis à superiore parte, in ipsis processibus

ma ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque leuis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaque eius ab exterioribus partibus dura; ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interque ea uenæ discunt; quas his alimentum subministrare credibile est. fero autem caluaria solida sine suturis est: locis tamen æstuosis facilius inuenitur. & id caput firmissimum; atque à dolore tutissimum est. ex cæteris, quò futuræ pauciores sunt, eo capitis ualutudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite inducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modò sub imo capillo definit: modò frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in anguem committuntur: hæ uero, quæ super aures transuersæ sunt, totis oris paulatim extenuantur: atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Grassissimum uero in capite os post aurem est; quia capillus (ut uerisimile est) ob id ipsum non gignitur. sub his quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies futuram habet maximam, quæ à tempore incipiens per medios oculos, naresque transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. & maxillæ quoque in summa parte singulas transuersas futuras habent. à medijsque naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaque transuersa idem palatum secat: & futuræ quidem in plurimis hæ sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt; deinde narium; tum quæ in auribus habemus: ex his quæ oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. narium duo foramina, osse medio discernuntur: siquidem hæc primum à supercilijs, angulisque oculorum, osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine uerit, quò propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. sed ea foramina, quæ à summis adimas nares simplicia sunt, ibi rursus in binam trineque diuiduntur: aliaque ex his ad fauces perueniunt, spiritum reddunt, & accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte, in multa, & tenuia foramina diffunduntur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque, primo rectum, & simplex iter, procedendo flexuosum fit: quod ipsum, iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxtaque ea duo paruuli quasi sinus sunt. superque eos finitur os, quod transuersum à genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest, ab eadem similitudine à qua id Græci ὤσες appellant. Maxilla uero est molle os; eaque una est; cuius eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: à quo, utrinque procedit ad tempora: solaque ea mouetur. nam male, cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerò ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. alter processus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusque procedens sub osse iugali subit: & super id temporum musculis illigatur. alter breuior, & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auri est, cardinis modo fit: ibique huc & illuc se inclinans, maxillæ facultatem motus præstat. Duriores osses sunt. quorum pars maxillæ; pars superiori ossi malarum heret. Ex his quaterni primi, quia secant, à Græcis nominantur. hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos, utrinque fere maxillares quaterni sunt; præterque in his, in quibus tres ultimi, qui serò gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus; maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternisue nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem edit: recti que dentis recta etiam radix; curui flexa est: Exque eadem radice, in pueris nouus dens subit: qui multò sæpius priorem expellit: inter dum tamen supra, infraue eum se ostendit. Caput autem spina excipit. ea constat ex uertebis quatuor, & uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas: reliquæ quinque sunt proximæ costis. hæ tertes breues que ab utroque latere processus duos exigunt: mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro commissa descendit: circa quoque per duos processus tenuibus cauis perueniunt, per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebre exceptis tribus summis à superiore parte, in ipsis processibus

ma ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque leuis, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillum gignente contegitur. eaque simplex ab occipitio & temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaque eius ab exterioribus partibus dura; ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interque ea uenæ discunt; quas his alimentum subministrare credibile est. fero autem caluaria solida sine suturis est: locis tamen æstuosis facilius inuenitur. & id caput firmissimum; atque à dolore tutissimum est. ex cæteris, quò futuræ pauciores sunt, eo capitis ualutudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite inducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modò sub imo capillo definit: modò frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in anguem committuntur: hæ uero, quæ super aures transuersæ sunt, totis oris paulatim extenuantur: atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Grassissimum uero in capite os post aurem est; quia capillus (ut uerisimile est) ob id ipsum non gignitur. sub his quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies futuram habet maximam, quæ à tempore incipiens per medios oculos, naresque transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. & maxillæ quoque in summa parte singulas transuersas futuras habent. à medijsque naribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaque transuersa idem palatum secat: & futuræ quidem in plurimis hæ sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt; deinde narium; tum quæ in auribus habemus: ex his quæ oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. narium duo foramina, osse medio discernuntur: siquidem hæc primum à supercilijs, angulisque oculorum, osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine uerit, quò propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. sed ea foramina, quæ à summis adimas nares simplicia sunt, ibi rursus in binam trineque diuiduntur: aliaque ex his ad fauces perueniunt, spiritum reddunt, & accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte, in multa, & tenuia foramina diffunduntur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoque, primo rectum, & simplex iter, procedendo flexuosum fit: quod ipsum, iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxtaque ea duo paruuli quasi sinus sunt. superque eos finitur os, quod transuersum à genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest, ab eadem similitudine à qua id Græci ὤσες appellant. Maxilla uero est molle os; eaque una est; cuius eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: à quo, utrinque procedit ad tempora: solaque ea mouetur. nam male, cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerò ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. alter processus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusque procedens sub osse iugali subit: & super id temporum musculis illigatur. alter breuior, & rotundior, & in eo sinu qui iuxta foramina auri est, cardinis modo fit: ibique huc & illuc se inclinans, maxillæ facultatem motus præstat. Duriores osses sunt. quorum pars maxillæ; pars superiori ossi malarum heret. Ex his quaterni primi, quia secant, à Græcis nominantur. hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos, utrinque fere maxillares quaterni sunt; præterque in his, in quibus tres ultimi, qui serò gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus; maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternisue nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem edit: recti que dentis recta etiam radix; curui flexa est: Exque eadem radice, in pueris nouus dens subit: qui multò sæpius priorem expellit: inter dum tamen supra, infraue eum se ostendit. Caput autem spina excipit. ea constat ex uertebis quatuor, & uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas: reliquæ quinque sunt proximæ costis. hæ tertes breues que ab utroque latere processus duos exigunt: mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro commissa descendit: circa quoque per duos processus tenuibus cauis perueniunt, per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebre exceptis tribus summis à superiore parte, in ipsis processibus

[illegible]

bus possint: quæ commissura osse paruo, molli, cartilaginoso regitur: patellam uocant. hæc super innatans, nec ulli ossi inhaerens, sed carne, & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus, est ex ossibus duobus: & enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoque, & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque sura recte nominatur. id breuius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. alterum a priore parte positum, cui tibiz nomen est, longius, & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiori capite committitur: sicut cum humero cubitus. atque ea quoque ossa, infra, supraque coniuncta, media, ut in brachio, dehiscunt. Excipitur autem crus infra ossa ex transuerso talorum; idque ipsum super os calcis situm est; quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet: & procedentia ex talo recipit: & in sinum eius inseritur. idque sine medulla durum, magisque in posteriorem partem proiectum, teretem ibi figuram representat. Cetera ossa pedis, ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt: plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

Ossa uitiata, & corrupta, quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur. Cap. II.

OMNE autem os, ubi iniuria accessit, aut uitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod uitiatum est, primo ferè pingue fit: deinde uel nigrum, uel cariosum, quæ super natis, grauibus ulceribus, aut fistulis, hisque uel longa uerustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso: & si latius eius uirium est, quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undique pateat: tum id quod pingue est, semel iterumue satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere, donec iam aliquid cruoris ostendatur: quæ integrius nota est. nam necesse est aridum sit id, quod uitiatum est. Idem in cartilagine quoque læsa faciendum est. siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities uel in summo osse est. siquidem id uel paulo diutius eodem ferramento adurendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid, & maturius desinat. finis est, cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finiri ex nigrities titium, soliditate quadam, ex carie manifestum est: accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem alijs descenderit, utrumlibet dubium est: In carie quidem expedita cognitio est. specillum tenue in foramen demittitur: quod magis, minusue intrando, uel in summo cariem esse, uel altius descendisse testatur. nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre. quæ ubi mediocria sunt, illa altè descendisse non potest: manifestior tamen ad acta terebra fit: nam finis uitij est, ubi scobis nigra esse desijt. Igitur si caries altè descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est: quæ altitudine uitium æquent. tum in ea foramina, demittenda candentia ferramenta sunt: donec inde siccum os ex toto fiat. simul enim post hæc, & resoluatur ab inferiore osse, quodcunque uitiatum est: & his sinus carne replebitur: & humior aut nullus postea feretur, aut mediocris. si autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uitiatum, totum eximendum est. si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue costa cariosa est, inutilis uitio est, & excidendi necessitas est. neque audiendi sunt, qui offe nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant: ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fieri potest eodem momento, & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni uitio liberandum est. longèque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio uerâ sanitatē reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebris, ferramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si paruulum est, quod læsum est, modiolis, quem *χαυδιον* Græci uocant. si spatiosius, terebris. utriusque rationem proponam. Modiolus, ferramentum concauum, terebra res est, imis oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque, interiore orbe cinctus, demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio, paulo minus, quam æqualiter, sursum procedit. si uitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si nigrities, angulo scalpri sinus exiguius fit, qui clauum recipiatur eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit. deinde is habena quasi imprimitur, parum proficit. si grauior, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rosæ, uel laetis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est, medius clauus educitur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uitium est, quam ut illo comprehenda tur, terebra res agenda est. ea foramen fit in ipso sine uitio ossis atque integri: deinde alterum non ita lōge, tertiumque, donec totus is locus, qui excidendus est, his cauis cinctus sit. atque ibi quoque, quatenus terebra

fiderit. Itaque si grauitus aliquis percussus est, si mala indicia subsecuta sunt, neque ea parte, qua cutis con-
uulsa est, rima reperitur: non incommodum est, parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, & tu-
 meat: eumque aperire. siquidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etia
 si frustra detecta est. Os fractum, nisi succursum est, grauib. inflammationibus afficit: difficiliusque po-
 stea tractatur. haro, sed aliquando tamen euenit, ut os quide totum integrum maneat: intus uero ex icu-
 uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus, magnos dolores mo-
 ueat: oculos quibus obcecet. sed fere contra id dolor est, & eo loco, cute incisa, pallidum os reperitur.
 ideoque id quoque os excidendum est. quacunque autem de causa curatio hec necessaria est, si nondum
 satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quidquid lzesum est, in conspectu sit. In quo ipso uiden-
 dum est, nequid ex ipsa membranula, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur: siquidem hec
 scalp pro, terebris tre lacerata, uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam comodius est
 ex toto ab offe diduci. Plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si ma-
 nu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis lit/eræ X. figuram accipit: ut dein-
 de à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. Inter quæ, si sanguis fertur, spōgia subinde in ace-
 to tincta combendens est: occupandusque obiectis linamentis. & caput altius excitandum. neque id ni-
 tium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continet, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In-
 omni uero fisso, fractio ue offe, protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant, quibus id excideret.
 sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluariæ causā componuntur: eorumque aliquid opor-
 tet ex aceto mollitū per se, super fissum fractum ue os imponere. deinde super id, aliquantū latius, quā
 uulnus est, eodem medicamento illitum lintecolum, & præterea succidam laniam aceto tinctam. tunc uul-
 nus deligare, & quotidie resoluerē, similiterque curare, usque ad diem quintum. à sexto diē etiam uapore
 aquæ calidæ per spongiā fouere: cetera ex eadem facere. quod si caruncula increfcere coeperit, & febrī
 culalut soluta erit, aut leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisque somni accedet: in eodem medicamēto
 erit perseverandum: Procedente deinde tēpore, emolliendum id emplastrum, adiecto cerato ex rosa facto,
 quod facilius carnē producat: nam per se reprimendi uim habet. Hac ratione, sæpe rimæ callo quodam im-
 plentur: estque callosus uelut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodē callo glu-
 tinantur. Estque aliquantū melius uelamentum cerebro, quā caro, quæ exciso offe increfcit. si uero sub
 prima curatione, febris intenditur, breuesque somni, & idē per somnia tumultuosi sunt: uulnus madet,
 neque alitur: & in tēpibus glandulæ oruntur: magni dolores sunt: ubique super hec, fastidium in-
 crefcit: tum demum ad manum, scalprumque ueniendum est. Duo uero sub ictu, caluariæ, pericula sunt;
 ne uel findatur, uel in medium desidat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ; uel quia altera super alterā
 excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit, ut humor ad membranā
 quidē descendat, exitum uero non habeat: ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat. Ubi
 medium desedit, eandem cerebri membranā ros urget: interdum etiam ex fractura, quibusdā uelut aci-
 leis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quā minimum ex offe dematur. Ergo si ora al-
 teri insedit, satis est id, quod eminet, plano scalp pro excidere, quo sublato, iam rima hiat, quantum cu-
 rationi satis est. At si oræ inter se comprimuntur; à latere eius interposito digiti spatio, cerebrā foramen
 faciendum est: ab eoque, scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem C. lit/eræ; sicut uer-
 tex eius à foramine, basis ad rimas it: quod si rima longius patet; ab altero foramine rursus similis sinus
 fieri debet: & ita, nihil latens in eo esse concauum est: abundeque exitus datur intus ludentibus; de-
 si fractum quidē os desedit, totum excidi necesse est: sed siue totum perfractum est, & ab alio ex to-
 to recessit; siue circumpositæ caluariæ inhæret; exigua parte ab eo, quod naturaliter se habet, scalp pro di-
 uidendum est. deinde in eo, quod desedit, iuxta rimam quā fecimus, foramina addenda sunt. si in
 angusto noxa est, duo. si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: & tum scalp pro utrinque ad ri-
 mam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: ima que pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum
 spectent. deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt; forfice ad id facta, colligenda sunt; maxi-
 meque ea, quæ acuta membranā infestant: si id ex facili fieri non potest; subiicienda lamina est, quā
 custodem eius membranæ esse proposui: & super eam, quidquid spinosum est, & intus eminet, exciden-
 dum est; eadem lamina, quidquid deorsum insedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut qua par-
 te fractio ossa tamen inhærent, solidentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento, sub medicamēto
 tempore excidat; spatiumque inter hec satis illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur: plus que
 in offe propugnaculi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo exciso. His factis, ea membrana, ac rima
 to. respersenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor re-
 manet, discutiat. tum idē medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium, ipsi
 membranæ imponendum est: cetera que eodem modo facienda sunt, quæ ad lintecolum illitum, & laniam
 succidam pertinent; collocandusque is loco interposito: & curandum quotidie uulnus, bis etiā estate, quod
 si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida, si usque eo tumebit, ut super os
 sa quoque emineat: coercebit eam bene trita lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro,
 uel adipe anserino mixta, ceruix que molli debet liquido cerato ex irino facto: at si parum pura mem-
 brana uidebitur, par modus eius emplastri, & mellis miscendus erit; idque superinfundendum; eiusque co-
 tinendi causā unum aut alterum linamentum iniiciendum; & super lintecolo, cui emplastrum illitum sit,
 contegendum. ubi plus pura membrana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnem
 producat.

cutis, ut altera parte fuerit? os adera hanc. Item si quibus periculis, si uulnus in eadem parte, quæ cutis alia est, non in eadem est, parte altera curare, quæ locis mollior sit, & tu meat, aperire: siquidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etia si frustra detecta est. Os fractum, nisi succursum est, grauib. inflammationibus afficit: difficiliusque postea tractatur. haro, sed aliquando tamen euenit, ut os quide totum integrum maneat: intus uero ex icu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus, magnos dolores moueat: oculos quibus obcecet. sed fere contra id dolor est, & eo loco, cute incisa, pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. quacunque autem de causa curatio hec necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quidquid lzesum est, in conspectu sit. In quo ipso uidendum est, nequid ex ipsa membranula, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur: siquidem hec scalp pro, terebris tre lacerata, uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam comodius est ex toto ab offe diduci. Plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis lit/eræ X. figuram accipit: ut deinde à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. Inter quæ, si sanguis fertur, spōgia subinde in aceto tincta combendens est: occupandusque obiectis linamentis. & caput altius excitandum. neque id nitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continet, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni uero fisso, fractio ue offe, protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant, quibus id excideret. sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluariæ causā componuntur: eorumque aliquid oportet ex aceto mollitū per se, super fissum fractum ue os imponere. deinde super id, aliquantū latius, quā uulnus est, eodem medicamento illitum lintecolum, & præterea succidam laniam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, & quotidie resoluerē, similiterque curare, usque ad diem quintum. à sexto diē etiam uapore aquæ calidæ per spongiā fouere: cetera ex eadem facere. quod si caruncula increfcere coeperit, & febrī culalut soluta erit, aut leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisque somni accedet: in eodem medicamēto erit perseverandum: Procedente deinde tēpore, emolliendum id emplastrum, adiecto cerato ex rosa facto, quod facilius carnē producat: nam per se reprimendi uim habet. Hac ratione, sæpe rimæ callo quodam implentur: estque callosus uelut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebant, eodē callo glutinantur. Estque aliquantū melius uelamentum cerebro, quā caro, quæ exciso offe increfcit. si uero sub prima curatione, febris intenditur, breuesque somni, & idē per somnia tumultuosi sunt: uulnus madet, neque alitur: & in tēpibus glandulæ oruntur: magni dolores sunt: ubique super hec, fastidium increfcit: tum demum ad manum, scalprumque ueniendum est. Duo uero sub ictu, caluariæ, pericula sunt; ne uel findatur, uel in medium desidat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ; uel quia altera super alterā excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit, ut humor ad membranā quidē descendat, exitum uero non habeat: ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat. Ubi medium desedit, eandem cerebri membranā ros urget: interdum etiam ex fractura, quibusdā uelut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quā minimum ex offe dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis est id, quod eminet, plano scalp pro excidere, quo sublato, iam rima hiat, quantum curationi satis est. At si oræ inter se comprimuntur; à latere eius interposito digiti spatio, cerebrā foramen faciendum est: ab eoque, scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem C. lit/eræ; sicut uertex eius à foramine, basis ad rimas it: quod si rima longius patet; ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita, nihil latens in eo esse concauum est: abundeque exitus datur intus ludentibus; de si fractum quidē os desedit, totum excidi necesse est: sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit; siue circumpositæ caluariæ inhæret; exigua parte ab eo, quod naturaliter se habet, scalp pro diuidendum est. deinde in eo, quod desedit, iuxta rimam quā fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: & tum scalp pro utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: ima que pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt; forfice ad id facta, colligenda sunt; maximeque ea, quæ acuta membranā infestant: si id ex facili fieri non potest; subiicienda lamina est, quā custodem eius membranæ esse proposui: & super eam, quidquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est; eadem lamina, quidquid deorsum insedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut qua parte fractio ossa tamen inhærent, solidentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento, sub medicamēto tempore excidat; spatiumque inter hec satis illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur: plus que in offe propugnaculi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo exciso. His factis, ea membrana, ac rima to. respersenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor remanet, discutiat. tum idē medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium, ipsi membranæ imponendum est: cetera que eodem modo facienda sunt, quæ ad lintecolum illitum, & laniam succidam pertinent; collocandusque is loco interposito: & curandum quotidie uulnus, bis etiā estate, quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida, si usque eo tumebit, ut super os sa quoque emineat: coercebit eam bene trita lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro, uel adipe anserino mixta, ceruix que molli debet liquido cerato ex irino facto: at si parum pura membrana uidebitur, par modus eius emplastri, & mellis miscendus erit; idque superinfundendum; eiusque continendi causā unum aut alterum linamentum iniiciendum; & super lintecolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura membrana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnem producat.

si fractio ossa tamen inhærent, solidentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento, sub medicamēto tempore excidat; spatiumque inter hec satis illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur: plus que in offe propugnaculi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo exciso. His factis, ea membrana, ac rima to. respersenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor remanet, discutiat. tum idē medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium, ipsi membranæ imponendum est: cetera que eodem modo facienda sunt, quæ ad lintecolum illitum, & laniam succidam pertinent; collocandusque is loco interposito: & curandum quotidie uulnus, bis etiā estate, quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida, si usque eo tumebit, ut super os sa quoque emineat: coercebit eam bene trita lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro, uel adipe anserino mixta, ceruix que molli debet liquido cerato ex irino facto: at si parum pura membrana uidebitur, par modus eius emplastri, & mellis miscendus erit; idque superinfundendum; eiusque continendi causā unum aut alterum linamentum iniiciendum; & super lintecolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura membrana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnem producat.

producat, quod ad abstinentiam uero, & primos, interioresque cibos, potionesque pertinet: eadem, quæ in uulneribus præcepi, seruanda sunt: eo magis, quò periculosius hæc pars afficitur: quin etiam cum iam non solum sustineri, sed aliis quoque apparebunt: tamen erunt uitanda, quæcunque mandenda sunt. ite fumus, & quidquid excitat sternutamentum, spem uero certam faciunt, membrana mobilis ac sui coloris; caro increscens, rubicunda; facilis morus maxillæ, atque cæuicis. mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, uel liuida, uel aliter coloris corrupti; dementia, acris uomitus, neruorum uel resolutio, uel distentio: caro liuida; maxillarum rigor, atque cæuicis; cæteraque, quæ ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem, quæ in cæteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt. Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere: eaque id, quod inter ossa uacuum est, replet. nonnunquam etiam super caluariam excrescit, quod si incidit, inspergenda squama æris est, ut id reprimat, cohibeatque; ea carni superdando, quæ ad cicatricem perducatur. omnibusque ea locis commodè inducitur, excepta frons ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est: Ibi enim uix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente, contenda sit. Illa utique capite fracto seruanda sunt, ut donec iam ualida cicatrix erit soluenda, uidentur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fracturarum curatione.

Cap. V.

IN naribus uero, & os, & cartilago frangi solet; & quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterum uel ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est, is locus cavius est. si cartilago, in alteram partem nares declinantur. quidquid in cartilagine incidit, excitat, dū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis. deinde in longitudinem implenda linamenta, & molli pellicula cincta, circumfusaque, intus adijcienda sunt. aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabrilis glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desiderare cartilaginem non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraque naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte, in qua nasus iacet; ab altera tenuius in id quod inferitur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, media illita mixtis inter se similia, & turis fuligine. eaque ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est: id enim corpori quasi gluten inhzescit: & cū induruit, nares commodè continet: sin quod intus inditum est, lædit (sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est) excitat, nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est: resolutur autem aqua calida: eaque tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque ubi aduersum, ut dictum est, utraque naris implenda est: ubi à latere, ea inquam os impulsus est. imponendumque ceratum, & paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantoque magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinsecus eadem habena, & super eam, ceratum; neque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum undique resolutum, cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quid ex humore, qui multus ex uulnere feretur: uolsella uero extrahetur. finitisque inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt: prius est, ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ, cutis quoque uulnus accessit, id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt: cuti uero super imponendum emplastrum: aliquod ex his, quæ recentibus uulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo uinculo deligandum est.

De aurium fracturarum curatione.

Cap. VI.

IN aure quoque interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est: sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari; circa tamen carnem increscere, solidarique eum locum. itaque si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sinitur. nunc autem de ea dico, quæ cute ita frangitur. In ea uero, si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter suppressente (quale lycium est aqua dilutum) donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne uitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est: quæ, quod est inter uenda atque in his quoque generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, de quibusdam ad omnia ossa pertinentibus.

Cap. VII.

AB his ad maxillam uenturus, indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum, ut lignum, in longitudinem finditur: modo frangitur transversum: interdum obliquum, atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnun

De maxillæ fract. cura.

LIBER OCTAVVS

quam acuta: quod genus pessimum est: quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso immittuntur, & carnem vulnérant; interdum neruum quoque, aut musculum, quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento sunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit: Maxilla uero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. Igitur in primis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore & ab ore omnino ossa in suam sedem compellenda sunt; deinde si transuersa maxilla fracta est (sub qua casu fere dens super proximum dentem excedit) ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, ulteriores, inter se seta deligandi sunt: id in alio genere fracturæ superuacuum est. cætera eadem faciendæ sunt: nam linteolum duplex, madens uino & oleo, super iniiciendum cum eadem similia, & eadem furis fuligine est. deinde aut fascia, aut mollis habena media in longitudinem incisa, ut utrinque mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. Illud quoque ad omnia ossa pertinet, dictum erit; tamen primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum; sublata inflammatione paulò pleniorē: eumque, qui carnem alat, per omne tempus, unum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foueri que per spongiam uapore aquæ calidæ: eademque quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur: quæ uel octavo die, uel septimo fere resoluitur. Ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse fouendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa conferuntur, transierint. fere uero intra quartumdecimum, & unum & uigesimalium diem sanescunt maxilla, mala, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. Inter uigesimalium & trigesimalium diem, crura, brachiaque: inter septimum & uigesimalium, & quadragesimalium humeri, & femina, sed in maxilla illud quoque adijciendum est, quod humidus cibus diutius sumendus est. atque etiam cū tempus processit in laganō, similibusque alijs perseverandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

De iuguli fracti curatione.

Cap. VIII.

Iugulum uero si transuersum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit: & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeque ubi motum est, elabitur. fereque id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur, sed cum humeri motu consentit. itaque eo subsistente, sub id humerus agitur. raro uero admodum in priorem partem iugulum inclinatur. adeo ut magni professores nunquam se uidisse memoriz mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. Verum ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu plane propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. ubi ad pectus conuersum est: ipsum quidem retrò dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est; nō id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus, ea, quæ carnem uulnerant, præcidenda sunt. tunc retusa ossa committenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum, si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerto ne fascia diducatur. quæ iugulo composito circumdanda est sæpius, potius quam ualentius: quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. Adextro uero iugulo, si id fractum est, ad alam finitram; à sinistro, ad dextram: rursusque sub ala sua fasciari debet. post hæc, si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est; supinusque homo collocandus: cæteraque eadem faciendæ, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa fere immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur, uel forantur, uel colliduntur, uel finduntur: ut mala, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est: quo sanescente, rimas quoque ossis, aut si quod ferrum est, callus implet. si cutis integra est, & os lesum esse, ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum, imponendumque ceratū est, & leniter deligandū, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fractarum curatione.

Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta viscera est, grauioribusque periculis is locus expositus est. hæc quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur; interdum fit, ut eam totam is casus peruerit. si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quidquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leniter indolescit; abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. ab uno uero & uigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum, cibus uberioribus est utendum, ut cures quam plenissimum fiat, quod melius os uesciat: quod illo loco tenerum, adhuc iniuriæ, sub tenui cute expositum est. per omne autem tempus curationis uitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis, & quidquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magnopere

os si uel immobilium uisita, curatio est, uel ea uolunt. si ante uisita uisita, rimas ossis, aut si quod ferrum est, callus implet. si cutis integra est, & os lesum esse, ex dolore colligimus, nihil aliud quam quiescendum, Ceratū, uisita. q. y.

IN spina quoque est, quod proprie notemus. nam si id, quod ex uertebra excēdit, aliquo modo
um est: locus quidem concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est, ea fragmen-
nosa esse. quo fit, ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hzc noscendæ rei causa sunt. me-
uentis uero hisdem opus est, quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

Similes rursus ex magna parte casus, curationes, quæ sunt humeris, & femoribus: communia etiam
lam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minimè periculose media franguntur.
propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est, eo prior est: nam & maiores dolores affert, &
ilius curatur, ea maximè tolerabilis est simplex, transuersa. peior, ubi fragmenta, atque ubi obli-
quissima excidunt; aliudque super aliud effertur. Idque ante omnia considerari debet: & sunt notæ ter-
tiæ in suis sedibus mota, resima, punitionisque sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero nõ ad-
eque, sed obliqua iunguntur (quod fit, ubi loco suo non sunt) membrum id altero latere breuius est: &
ulius eius rument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere: nam nervi,
ulique intenti, per ossa contrahuntur: neque in suum locum ueniunt, nisi illos per uim aliquis in-
tendat. si primis diebus id opusmissum est, inflammatio oritur, sub qua & difficile, & periculose
remis adhibetur. nam distentio neruorum, uel cancer sequitur, uel certum, ut mirissime alatur, pus.
si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. Intendere autem digitum, uel aliud quocuq;
membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra
dat. ualentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendunt. si firmiores nervi sunt (ut in uiris
stis, maximeque eorum feminibus, & cruribus euenit) habenis quoque, uel finitæ fascijs utrinque ca-
rtilorum deliganda, & per plures, in diuersa ducenda sunt. ubi paulò longius, quam naturaliter
debet, membrum uis fecit: tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt; indiciumque
repositi, est dolor sublarus. & membrum alteri parti æquatum inuoluendum duplicibus triplicis pan-
nibus in uino, & oleo tinctis; quos lintheos esse commodius est. fere uero his lex opus est. prima breuissi-
ma, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum feratur, & quasi in coctæa serpat; satisque
um ter hoc quoque modo circuire. altera dimidio longiore; eaque, qua parte os eminet, ab ea, si totum
ale est, undelibet super fracturam debet incipere, priori aduersa, deorsumque tendere; atque iterum
actura reuersa in superiore parte ultra priorem fasciam definere. super has iniiciendum latiore lin-
teratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet, triplex ea pannus obijciendus, eodem ui-
to oleo madens. hæc, tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic, ut semper insequens priori
rta sit; & tertia tantum inferiore parte tres in superiore faciant; quia satius est sæpius circuire, quam

[illegible]

adstringi. siquidem id quod adstrictum est alienatur, & cancro opportunum est. articulum autem quam minime uincire opus est: sed si iuxta hunc, os fractum est, necesse est. Deligatum uero membrum, in diem tertium continendum est: eaque iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa uisa sit; secundo laxior; tertio iam pene resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum, adiiciendaque prioribus quinta fascia est; iterumque quinto resoluendum est, & sexta fascijs inuolendum, sic, ut tertia & quinta infra, ceterae supra finiuntur. quotiescunque autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iuxta articulum fractura est, diu instillandum uinum est, exigua parte olei adiecta; eademque omnia facienda, donec adeo inflammatio soluat; uel tenuis quoque, quam ex consuetudine id membrum fiat. quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur. rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt: deinde eodem modo membrum deligandum, ferulaeque super accommodandae sunt; quae fissae, circumpositaeque ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinat, ab ea latior, ualentiorque ferula imponenda est. easque omnes citra articulum, esse oportet resimas, ne hunc laedant: nec ultra astringi, quam ut ossa contineant, & cum spatio laxentur: tertio quoque die paulum habentis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duae partes eius teporis, quod quoque os coarseret, compleantur: postea tenuis aqua calida fouere: quia primo digeri materiam opus est: tum euocari. ergo cerato quoque liquido id pleniter est unguendum: perfricandaque summa cutis est: laxiusque id deligandum est. tertio quoque die soluendum, sic, ut remota calida aqua, cetera eadem fiant. tantummodo singulae fasciae, quoties resolutae fuerint, subtrahantur. # alij, quod os quoque conseruet, si bibe potest abstinere, quo quoque os conseruet, si bibe potest abstinere.

De fracti humeri curatione.

H A E C communia sunt: illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur: sed homo collocatur alto sedili: medicus autem humilior, aduersus; una fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id sustineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto imo humero, deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, correpto, si dexter humerus ducendus est, dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, planam inijcit dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit, medicus. quo fit, ut leniter humerus extendatur. fascijs uero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus; ut ab eo, sub altera quoque ala, per pectus, & scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioque suspensio, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. per quae fit, ut minimè moueatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earum longissimae debent; a lacerto, breuiores: sed sub ala breuissimae. sepiusque ea resoluenda sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nerui rigescant, & inutile brachium efficiant. quoties solutae sunt, fractura manu continenda: cubitus, aqua calida fouendus, & molli cerato perfricandus; ferulaeque uel omnino non imponendae contra eminentia cubiti, uel aliquantò breuiores sunt.

De brachij fracti curatione.

A T si brachium fractum est, in primis considerandum est alterum os, an utrumque comminutum sit: non quòd alia in eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum, ut ualentius extendatur, si utrumque os fractum est: quia necesse est minus neruos contrahi, altero osse integro, eosque intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fascijs, ferulisque est. Deligari autem brachium debet paulum pollicis ad pectus inclinato (siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit) idque inuolutum, mitella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio, per angustis capitibus, collo inijcitur; atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. quòd si ex summo cubito id fractum sit, glutinare id iunctendo alienum est: sit enim brachium immobile. ac si nihil aliud, quam dolori occursum est, idem, qui fuit, eius usus est.

De crurum, femorumque fractorum curatione.

I N crure quoque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femorique est, quòd ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalis & inferiori parte foramina habet, per quae, si quis humor excesserit, descendat; & a planta, moram, quae simul & sustineat eam, & delabi non patitur; & a lateribus, caua, per quae loris datis, mora quidem, crus, femurque, ut collocatum est, detineat. Et se etiam is debet a planta, si crus fractum est, circa poplitem. si femur, usque ad coxam. si iuxta superius, caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa sit. neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur, summisque digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamen femori debilitas est, ubi fortunae, negligentiae quoque accessit.

De fracti

De fractu digiti curatione.

(non est tibi.) Digitum satis est ad unum furculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitoque contractos pertinentia.

HIS propriè ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt; primis diebus fames, deinde tum cum iam increfcere calum oportet, liberalius alimentum. longa à timo abftinentia; fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio eft, liberale; cum ea defit, modicum: tum etiam longior, ulterioribus & liquido cerato membris, & mollis tamen unctio. neque protinus exercendum id membrum, fed ad antiquos ufus reducendum eft. Grauius aliquantò eft, cum offis fractura, carnis quoque uulnus acceffit; maximeque fi id mufculi femoris, aut humeri, fenferunt: nam & inflammationes multò grauiorcs, & pròptiores cancròs habent. ac femur quidem, fi offa inter fe celferunt, fere præcidi necelfe eft. humerus uerò quoque in periculum uenit, fed facilius conferuatur. quibus periculis etiam magis id expofitum, quod iuxta ipfos articulos ictum eft: curiofius igitur agendum eft, & mufculus quidem per mediam plagam tranfuerfus præcidendus: fanguis uerò, fi parum fluxit, mittendus; corpus inedia extenuandum, ac reliqua quidem membra lentius intendenda, & lenius in his offa in fuam fedem reponenda funt. his uerò, neque intèdi neruos, neque offa tractari fatis expedit. ipfiquè homini permittendum eft, ut fic ea collocata habeat, quemadmodum minimè lædunt. Omnibus autem his uulneribus imponendum primò linamētum eft uino madens, cui rofe paulum admodum adiectum fit. cetera eadem deliganda falcis funt, aliquantò quàm uulnus latioribus; laxius fcilicet, quàm fi ea plaga non efferet, quànò facilius & alienari, & occupari cancro uulnus potelt; numero potiùs falcium id agendum eft, ut laxè quoque & æquè contineant. quod in femore, humeroque fiet, fi offa fortè rectè còcurrerint. fin aliter fe habebunt, catenus circundari falcia debet, ut impositum medicamentum contineat. cetera eadem, quæ fuprà fcripsi, facienda funt; præterquàm quod neque ferulis, neque canalibus inter quæ uulnus fanefcere non potelt, fed pluribus tantummodò, & latioribus falcis opus eft; ingerendumque fubinde in eas eft calidum oleum, & uinum; magisque in primò, fa-
me utendū uulnus calida aqua fouendū, frigusque omni ratione uitandū; & tranfeundū ad medicamen-
ta, quæ puri mouendo funt, maiorque uulneri, quàm offi cura agenda. Ergo quotidie foluendum, nutrien-
dumque eft. Inter quæ, fi quod paruulum fragmentum offis eminet, id fi retufum eft, in fuam fedem dan-
dum: fi acutum, antè acumen eius longius eft præcidendum: fi breuius, limandum: & utrinque scalpro
limandum: tum ipfum recondendum eft. ac fi id manus facere non potelt, uolfella, quali fabri utitur;
injicienda eft. rectè fe habenti capiti ab ea parte, qua fima eft: ut ea parte qua cibra eft, eminens os in fuā
fedem compellat. fi id maius eft, membranulisque cinguntur, linere oportet ea fub medicamentis refolui;
idque os, ubi iam nudatum eft, abfcidere: quod maturius fcilicet faciendum eft: poteltque ea ratione &
os coire, & uulnus fanefcere. illud fuo tempore: hoc, pro ut fe habet. Nonnunquā etiam in magno uul-
nere euenit, ut fragmenta quædam uelut emoriantur; neque cum cæteris cœant. quod hîc quoque ex
modo fluentis humoris colligitur. quò magis neceffarium eft, fæpius ulcus refoluere, atque nutrire. fequi-
tur uerò, ut id os per fe poft aliquot dies excidat: cum tam mifera antea conditio uulneris fit; tamen id
interdū maius, diutiusque facies: fæpe enim integra cutis offe abrupitur: protinusque prurigo, & do-
lor oritur. quæ foluere, fi accidit, maturius oportet: & fouere aqua per æftatem frigida: per hyemem, æge-
rida: deinde ceratum myrtum imponere. Interdum fractura quibufdam uelut acutis carnem uexat; quo
a prurigne, & punctionibus cognito, aperire id melius, eosque aculeos præcidere necelfe habet. Reliqua
uerò curatio in utroque hoc cafu, eadem eft, quæ ubi ictus protinus intulit puro iā utcere. cibus hîc quo-
que utendum eft carnem producentibus, fi breuius adhuc membrum eft, & offa loco fuo nō funt; paxil-
lus tenuis quàm leuiffimi generis inter ea demitti debet, fic, ut capite paulū fuprà ulcus emineat; isque quo-
tidie plenior adigendus eft, donec par id membrum alteri fiat. tum paxillus remouendus; uulnus fanan-
dum eft: catrix inducta, fouenda frigida aqua eft, in qua myrtus, hedera, aliz, ue fimiles uerbena funt; illi-
nendumque medicamentum, quod licet: & magis etiam hîc quiefcendum, donec id membrum confirme-
tur. fiquando uerò offa non conferbuerunt, quæ fæpe foluta, fæpe mota funt: in aperto deinde cura-
tio eft: poliunt enim coire. fi uetuftas occupauit, membrum extendendum eft, ut aliquid lædatur. offa
inter fe manu diuidenda, ut còcurrendo exalperentur, ut liquidum pingue eft, eradatur: totumque id, quali
recens fiat, magna tamen cura habita, ne nerui, mufculiue lædantur. tum uino fouendum eft, in quo ma-
licorium decoctū fit: imponendumque id ipfum oui albo mixtū. tertio die refoluendum, fouendumque
aqua, in qua uerbena, de quibus fuprà dixi, decoctæ funt. quinto die idem faciendum; ferulæque circundā-
dæ. cetera & antè, & poft, eadem facienda, quæ fuprà fcripsi. Solent tamen interdum diuerfa inter fe of-
fa conferuere: eoque & breuius membrum, & indecorum fit: & fi capita acutiora funt, alliduz pun-
ctiones sentiuntur. ob quā causam, frangi rursus offa, & dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua mul-
ta membrum id fouetur: & ex cerato liquido perficitur; intenditurque, & inter hæc, medicus pertra-
ctans offa, ut adhuc tenero callo, manibus ea diducit, compellitque id quod eminet, in fuam fedem; & fi pa-
uere iterum uetultæ fedi cogit. Nonnunquam autem rectè quidem offa cœperunt: fuperincrescunt uerò

Infra ad uulnera...
injicienda est acuta...
ab ea parte, qua fima est...

omnes...
primis diebus...
fames, deinde...
liberalius alimentum...
longa à timo abftinentia...
fomentum aquæ calidæ...
modicum: tum etiam...
longior, ulterioribus...
liquido cerato membris...
& mollis tamen unctio...
neque protinus exercendum...
id membrum, fed ad antiquos...
ufus reducendum eft...
Grauius aliquantò eft...
cum offis fractura, carnis quoque...
uulnus acceffit; maximeque...
fi id mufculi femoris, aut humeri...
fenferunt: nam & inflammationes...
multò grauiorcs, & pròptiores...
cancro habent. ac femur quidem...
fi offa inter fe celferunt, fere...
præcidi necelfe eft. humerus uerò...
quoque in periculum uenit, fed...
facilius conferuatur. quibus periculis...
etiam magis id expofitum, quod...
iuxta ipfos articulos ictum eft...
curiofius igitur agendum eft...
& mufculus quidem per mediam...
plagam tranfuerfus præcidendus...
fanguis uerò, fi parum fluxit...
mittendus; corpus inedia extenuandum...
ac reliqua quidem membra...
lentius intendenda, & lenius...
in his offa in fuam fedem reponenda...
funf. his uerò, neque intèdi neruos...
neque offa tractari fatis expedit...
ipfiquè homini permittendum eft...
ut fic ea collocata habeat, quemadmodum...
minimè lædunt. Omnibus autem his...
uulneribus imponendum primò linamētum...
eft uino madens, cui rofe paulum...
admodum adiectum fit. cetera eadem...
deliganda falcis funt, aliquantò quàm...
uulnus latioribus; laxius fcilicet, quàm...
fi ea plaga non efferet, quànò facilius...
& alienari, & occupari cancro uulnus...
potelt; numero potiùs falcium id agendum...
eft, ut laxè quoque & æquè contineant...
quod in femore, humeroque fiet, fi offa...
fortè rectè còcurrerint. fin aliter se habebunt...
catenus circundari falcia debet, ut impositum...
medicamentum contineat. cetera eadem...
quæ fuprà fcripsi, facienda funt; præterquàm...
quod neque ferulis, neque canalibus inter quæ...
uulnus fanefcere non potelt, fed pluribus...
tantummodò, & latioribus falcis opus eft...
ingerendumque fubinde in eas eft calidum...
oleum, & uinum; magisque in primò, fa-
me utendū uulnus calida aqua fouendū...
frigusque omni ratione uitandū; & tranfeundū...
ad medicamenta, quæ puri mouendo funt...
maiorque uulneri, quàm offi cura agenda...
Ergo quotidie foluendum, nutriendumque...
eft. Inter quæ, fi quod paruulum fragmentum...
offis eminet, id fi retufum eft, in fuam fedem...
dandum: fi acutum, antè acumen eius longius...
eft præcidendum: fi breuius, limandum: & utrinque...
scalpro limandum: tum ipfum recondendum...
eft. ac fi id manus facere non potelt, uolfella...
quali fabri utitur; injicienda eft. rectè se habenti...
capiti ab ea parte, qua fima eft: ut ea parte...
qua cibra eft, eminens os in fuā fedem compellat...
fi id maius eft, membranulisque cinguntur...
linere oportet ea fub medicamentis refolui...
idque os, ubi iam nudatum eft, abfcidere: quod...
maturius fcilicet faciendum eft: poteltque ea...
ratione & os coire, & uulnus fanefcere. illud...
fuo tempore: hoc, pro ut fe habet. Nonnunquā...
etiam in magno uulnere euenit, ut fragmenta...
quædam uelut emoriantur; neque cum cæteris...
cœant. quod hîc quoque ex modo fluentis...
humoris colligitur. quò magis neceffarium...
eft, fæpius ulcus refoluere, atque nutrire. fequitur...
uerò, ut id os per fe poft aliquot dies excidat...
cum tam mifera antea conditio uulneris fit;...
tamen id interdū maius, diutiusque facies: fæpe...
enim integra cutis offe abrupitur: protinusque...
prurigo, & dolor oritur. quæ foluere, fi accidit...
maturius oportet: & fouere aqua per æftatem...
frigida: per hyemem, ægerida: deinde ceratum...
myrtum imponere. Interdum fractura quibufdam...
uelut acutis carnem uexat; quo a prurigne, &...
punctionibus cognito, aperire id melius, eosque...
aculeos præcidere necelfe habet. Reliqua uerò...
curatio in utroque hoc cafu, eadem eft, quæ ubi...
ictus protinus intulit puro iā utcere. cibus hîc...
quoque utendum eft carnem producentibus, fi...
breuius adhuc membrum eft, & offa loco fuo...
nō funt; paxillus tenuis quàm leuiffimi generis...
inter ea demitti debet, fic, ut capite paulū...
fuprà ulcus emineat; isque quotidie plenior...
adigendus eft, donec par id membrum alteri...
fiat. tum paxillus remouendus; uulnus fanan-
dum eft: catrix inducta, fouenda frigida aqua...
eft, in qua myrtus, hedera, aliz, ue fimiles...
uerbena funt; illinendumque medicamentum...
quod licet: & magis etiam hîc quiefcendum...
donec id membrum confirmetur. fiquando uerò...
offa non conferbuerunt, quæ fæpe foluta, fæpe...
motata funt: in aperto deinde curatio eft: poliunt...
enim coire. fi uetuftas occupauit, membrum...
extendendum eft, ut aliquid lædatur. offa inter...
fe manu diuidenda, ut còcurrendo exalperentur...
ut liquidum pingue eft, eradatur: totumque id...
quasi recens fiat, magna tamen cura habita, ne...
nerui, mufculiue lædantur. tum uino fouendum...
eft, in quo malicorium decoctū fit: imponendumque...
id ipfum oui albo mixtū. tertio die refoluendum...
fouendumque aqua, in qua uerbena, de quibus...
fuprà dixi, decoctæ funt. quinto die idem...
faciendum; ferulæque circundandæ. cetera &...
antè, & poft, eadem facienda, quæ fuprà...
fcripsi. Solent tamen interdum diuerfa inter...
fe offa conferuere: eoque & breuius membrum...
& indecorum fit: & fi capita acutiora funt...
alliduz punctiones sentiuntur. ob quā causam...
frangi rursus offa, & dirigi debent. id hoc...
modo fit. calida aqua multa membrum id...
fouetur: & ex cerato liquido perficitur;...
intenditurque, & inter hæc, medicus pertractans...
offa, ut adhuc tenero callo, manibus ea...
diducit, compellitque id quod eminet, in fuam...
fedem; & fi pauere iterum uetultæ fedi cogit...
Nonnunquam autem rectè quidem offa cœperunt...
fuperincrescunt uerò

offa...
femur...
humerus...
brachia...
crura...
femina...
digiti...
contractos...
pertinentia...

De luxatis ossib.

minus callus; ideoque locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterque id membrum perficandum est ex oleo, & sale, & nitro, multumque aqua calida fusa fouendum, & imponendum malagma, quod digeratur, astricimusque alligandum. oleribusque, & proutera vomitu utendum: per quæ cum carne callus quoque extenuatur. confertque aliquid de sinapi, quod cum fici in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat, eoque euocat materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem uitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

Cap. XI.

† Si polius / Et aliquid de oleo
coris eo loco sit, nihil usque amittitur.

AC de fractis quidem ossibus hactenus dictum sit. mouentur autem ea sedibus suis, duobus modis, nam modo quæ iuncta sunt inter se, dehiscunt; ut cum latum scapularum os ab humero recedit; & in brachio, radius à cubito: & in crure, tibia à sura; interdum à saltu, calcis os à talo (quod raro tamen fit) modo articuli, suis sedibus excidunt. Ante de prioribus dicam. quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cauius est, depressusque digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur, atque in talis præcipua liquidem febres quoque, & caneros, & neruorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis apponunt, mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsi aliquid ubi incidit, protinus his locis proposita sunt, ut dolor, tumorque per ea tollantur. nā diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur: & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil usque admittitur. Maxilla uero, & uetebra, omnesque articuli cum ualidis neruis comprehendantur, excidunt aut uel expulsi, aut aliquo casu, neruis uel ruptis, uel infirmis; faciliusque in pueris & adulescentulis, quam in robustioribus, hi que elabuntur in priorem, & in exteriorem partem; quidam omnibus modis, quidam certis; sunt quædam communia omnium signa, quædam propria sunt cuiusque; liquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit: ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur; alia uero in singulis: quæ simulatque de quoque dicam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nunquam compellitur: neque in spina, uetebra, neque ea maxilla, quæ utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui neruorum uitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neque reposita sunt, minulquam ceteri, crescunt. Omniumque, quæ loco suo non sunt, caro exin crescit: magisque in proximo membro, quam in ulteriore. ut puta si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio: maior in hoc, quam in manus acie. tum pro sedibus, & pro casibus, qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quidquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. si illa occupauit, dum conquiescat, tunc lacellendum est. ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert, & corporis, & neruorum habitus. nam si corpustenne, si humidum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continent: sed id quod expulsus est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. Acibo si ualentioris articuli casus est, triduo; interdum etiam quinque diebus abstinere debet. bibere aquam calidam, dum sitim finiat. curiosiusque hæc facere, his ossibus motis, quæ ualidis, plenisque musculis continentur. si uero etiam febris accessit, multo magis deinde ex die quinto, fouere aqua calida: remotaque lana, ceratū imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto, donec omnis inflammatio finiatur. tūc infractionem ei membro adhibere: cibis uti bonis: uti uino modice: iamque ad usus quoque suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pessifer, sic alius saluberrimus corpori est. hæc communia sunt. nūc de singulis dicam.

De maxilla luxata curatione.

Cap. XII.

Maxilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraque. si alteram in contrariam partem modo utraque ipsa mentumque inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui secant, cauii sunt. At si utraque totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresque dentes longius, quam superiores excedunt; intentique super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic ut minister à posteriore parte caput eius contineat; uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius, scorteo puluino duro; eoque caput per ministrum urgeatur, quod sit immobilius. tum medici digiti pollices linteolis, uel fascijs, ne dilabantur inuoluti, in os eius coniiciendi: ceteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit; concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est: sic, ut omnia pene uno momento fiant. si in utraque parte prolapsa est, eodem omnia facienda; sed æqualiter retrò maxilla agenda est. reposito osse, si cum dolore oculorum, & cernicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mōta sunt, primo liquidioribus cibis conueniat, tum his præcipue; adeo ut sermo quoque, frequenti motu oris per neruos, laedat.

De capite luxato.

Cap. XIII.

Caput duobus processibus in duos sinus summæ uetebrae demissis, super cernicem contineri, in pri-

R eposito osse, si cum dolore oculorum & cernicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mōta sunt, primo liquidioribus cibis conueniat, tum his præcipue: adeo ut sermo quoque, frequenti motu oris, per neruos, laedat.

ma parte propofui . hi proceffus interdum in pofteriorem partem excidunt . quo fit ut nervus fub occipio extendatur : mentum pectori agglutinetur , neque bibere is , neque loqui poffit ; interdum fine uoluntate fermen emittat ; quibus celerrime mors fuperuenit . ponendum autem hoc efle credidi , non quod curatio eius rei ulla fit , fed ut res indicijs cognofceretur : & non putarent fibi medicum defuiffe , fi qui fic aliquem perdidiffent .

De ffrina luxata.

Cap. XIII.

I D E M cafus manet eos , quorum in ffrina uertebra exciderunt . id enim non poteft fieri , nifi ex medulla , quæ per medium ; & duabus membranulis , quæ per duos à lateribus proceffus feruntur : & nervis , qui continent , ruptis . Excidunt autem & in pofteriorem partem , & in priorem , & fupra feptum trāf nerfum , & infra . fi in utranque partem exciderit , à pofteriore parte uel tumor , uel finus oritur : fi fuper feptum id incidit , manus refoluuntur , uomitus , aut diftensio neruorum infequitur , fpiritus difficulter mouetur , dolor urget , & aures obtufæ funt . fi fub fepto ffrina refoluuntur , urina fupprimitur , interdum etiam fine uoluntate prorumpit . Ex eiuſmodi cafibus , ut tardius , quam ex capitis , fic tamen intra triiduum homo moritur . nam quod Hippocrates dixit , uertebra in exteriorem partem prolapſa , pronū hominem coſto candum efle , & extendendum : tum certe aliquem fuper ipſum debere conſiſtere , id intūs impellere . in his accipiendum eſt , quæ paulū exceſſerunt : non in his , quæ toto loco motæ funt . nonnunquam enim neruorum imbecillitas efficit , ut quamuis nō exciderit uertebra , paulū tamen in priore partem promineat : id non iugulat . fed ab interiore parte non contingit quidem poſſe : ab exteriore , fi propulſum eſt , plerumque iterum redit : niſi quod admodum rarum eſt .

De humero luxato.

Cap. XV.

Humerus autem , modo in alam excidit , modo in partem priorem . fi in alam delapſus eſt , & uictus cubitus recedit ab latere , rurſum iuxta eiufdem partis aurem cū humero porrigi non poteſt : lōgiusque altero id brachium eſt . fi in priorem partem ſummum quidem brachium extenditur , minus tamen quam naturaliter ; difficiliusque in priorem partem quam in poſteriorem cubitus porrigitur . Igitur fi in alam humerus excidit , & uel puerile adhuc eſt corpus , uel molle certe , & imbecilibus neruis intentum eſt , ſatis eſt collocare id in ſedili : & ex duobus miniſtris alteri imperare , ut caput late ſcapularum offibus leniter reducat , alteri ut brachium extendat . Ipſum , poſteriore parte reſidentem , ſenū ſub ala eius coire ; ſimulque neceſſaria eſt ſpaula lignea , & quæ craſſitudinem duorum digitorum habet , longitudine ab ala ad digitos peruenit . in qua ſumma capitulum eſt rotundum , & leniter cauum , ut recipere particulam aliquam mollia coniunguntur . eaque ſpatha , fascia inuoluta , quō minus tactu laedat , ad alam à brachio diriguntur , ſic , ut caput eius , ſummæ alæ ſubijciatur . deinde loris ſuis ad brachium deligatur : uno loco paulum infra humeri caput ; altero , paulum ſupra cubitum ; tercio , ſupra manum . cui rei protinus interualla tunc quoque foraminum aptata funt . ſic brachium deligatum ſuper ſcala gallinarie gradum trajicitur , ita alæ ut conſiſtere homo ipſe non poſſit . ſimulque in alteram partem corpus demittitur : in alteram brachium intenditur . eoque fit , ut capite ligni , caput humeri impulſum , in ſuam ſedem modo cum ſono , modo ſine hoc compellatur . multas alias efle rationes ſcire facile eſt , uno Hippocrate lecto ; ſed non alia magis uſu comprobata eſt . at ſi in priorem partem humerus excidit , ſupinus homo collocandus eſt : fasciaque , aut habena media ala circundanda eſt : capitaque eius , poſt caput hominis , miniſtro tradenda ; brachium alteri : precipiendumque , ut ille habenam , hic brachium extendat . deinde medicus , caput quidem hominis ſinutra debet repellere : dextra uero cubitum cū humero attollere : & os in ſuam ſedem compellere , faciliusque id in hoc caſu , quam in priore reuertitur . ſepoſito humero , lana alæ ſubijcienda eſt . ſi in interiore parte os fuit , ut ei opponatur . ſi in priore parte , ut tamen commodius deligetur : tum fascia primum ſub ala obſuſque ad eiufdem humeri caput tendere . ſæpiusque ad eandem rationē circumagi , donec bene id teneat . ſi uictus hac ratione humerus , comodius continetur . ſi adductus ad latus ſit , ad id quoque fascia deligatur .

De cubiti luxati curatione.

Cap. XVI.

I N cubito autem tria coire oſſa , humeri , & radij , & cubiti ipſius , ex his , quæ prima parte huius uoluminis poſita ſunt , intelligi potuit ; ſed cubitus , qui innexus humero eſt , ab hoc excidit . radius , qui adiūctus eſt , interdum trahitur : interdum ſubſiſtit . In omnes uero , quatuor partes excidere cubitus poteſt . ſed ſi in priorem prolapſus eſt , extentum brachium eſt , neque recuruat . ſi in poſteriorem , brachium curuum eſt , neque extenditur , breuiusque altero eſt : interdum febrem , uomitumque bilis mouet . ſi in exteriore , interiore uel brachium porrectum eſt , ſed paulū in eam partem , à qua os reſceſſit , recuruat , quidquid incidit , reponendi ratio una eſt . neque in cubito tantum eſt , ſed in omnibus quoque mēbris longis , quæ per articulum longa teſta iunguntur , utrumque membrum in diuerſas partes extendere , donec ſpatium inter oſſa liberum ſit . Tum id os , quod excidit , ab ea parte , in quam prolapſum eſt , in contra

am impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc, illucue
federunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quædam alia adhibenda. Ergo si in priorem par-
tem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis iniectis, satis est: deinde ro-
tundum aliquid à lateri parte ponendum est: & super id, repente cubitus ad humerum impellendus est.
at in alijs casibus, commodissimum est, eadem ratione brachium extendere, quæ fracto cubito supraposita
est, & tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. celerius tantum, & sæpius id resol-
uendum est, multoque magis aqua calida fouendum, diutius ex oleo, & nitro, ac sale perfricandum. in cu-
bito enim celerius, quam in ullo alio articulo, siue extra remanet, siue intus reuertit, callus circumdatur;
isque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De manu luxata.

Cap. XV. II.

MANVS quoque in omnis quatuor partes prolabitur, si in posteriorem partem excidit, porrigi
digiti non possunt; si in priorem, non inclinatur; si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut
ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. Reponi non difficillime potest super durum locum &
renitentem, ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic, ut prona sit, si in posteriore par-
tem os excidit, supina, si in priorem, si in interiorem, exteriorem uel in latus. ubi latus nervi diducti sunt, si
in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quæ in priorem, po-
steriorem uel partem prolapsa sunt, super imponendū durum aliquid; idque supra prominens os, manu ur-
gendum est; per quod uis adiecta, facilius in suam sedem compellit.

De palma.

Cap. XVIII.

IN palma quoque, ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in po-
steriorem. in latus enim moueri, paribus ossibus oppositis, non possunt, signum id solum est, quod omniū
commune est: tumor ab ea parte, in quam os uenit: sinus ab ea, a qua recessit. sed sine intento digito, tan-
tummodo bene pressum os, in suam sedem reuertitur.

De digitis.

Cap. XIX.

AT in digitis totidem fere casus, eademque signa sunt, quæ in manibus. sed in his extendendis, no-
tæque uel opus est, cum & articuli breuiiores, & nervi minus ualidi sint, super mensam tantummodo inten-
di debent, qui uel in priorem, uel in posteriorem partem exciderunt: tum iam palma compelli, atque id
quod in latus elapsum est, digitis restitui.

De femore.

Cap. XX.

CV M de his dixerim, de his quoque, quæ in cruribus sunt, uideri possum dixisse. siquidem etiam
in hoc casu, quædam similitudo est femori, & humero, & tibia, & cubito, pedi & manui; quædam tamē se-
paratim quoque de his dicenda sunt: femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem,
deinde in exteriorem; raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in interiorem partem prolapsum
est, crus longius altero, & uastius est: extra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, rariusque
fit, & minus inclinatur: Calx ingressu terram non contingit, sed planta ima. meliusque id crus, superius
corpus quam in priore casu fert; minusque baculo eget. si in priorem crus extensum est, implicarique nō
potest; alteri cruri ad calcem par est, sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc
casu præcipuus est: & maxime urina supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, commodè in-
grediuntur: torusque eorum pes est, sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusque est, ubi
constitit: calx quoque terram non cōtingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter re-
ponatur: uel repositum, rursus excidat. quidam iterum semper excidere contendunt: sed Hippocrates,
& Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se resti-
tuisse, memoriz prodiderunt. neque tot genera machinamentorum, quoque ad extendendum in hoc ca-
su femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque quidam
repperissent, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est: sic illud uerum est: cum ibi ualentissimi ner-
ui, musculique sint; si suum robur habent, uix admittere: si non habent, postea non contineri. Ten-
tandum igitur est; & si tenerius membrum est, satis est, habenam alteram ab inguine, alteram à genu in-
tendi. si ualidius, melius adducunt, qui easdem habenas ad ualida bacula deligarint: tumque eorum fu-
stium imas partes oppositæ mire obiecerint: superioresque ad se utraque manu traxerint. Etiam nū ual-
entius intenditur membrum super scænum, cui ab utraque parte axes sunt: ad quos, habent illa deli-
gantur. qui ut in torcularibus conuersi, rumpere quoque (si quis persequauerit) non solum extendere
neruos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scænum est, aut pronus, aut supinus,
aut in latus sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est; ea etiam inferior, à qua recessit
nervus extensus si in priorem os uenit; rotundum aliquid super inguen ponendum: subitoque super id

genu adducendum est eodem modo, eademque de causa, quidem in brachio fit: protinusque si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id, quod eminet, retrò cogere: minister contra, inde coxam propellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quam ut diutius in lectulo detineatur: ne si motum, adhuc nervis laxioribus, femur fuerit, rursus erumpat.

De genu.

Cap. XXI.

GEN V uero & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorem non prolabi, plerique scripserunt: potestque id uero proximum esse, cum inde opposita patella, ipsa quoque caput tibiae contineat. Meges tamen, cum in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriz prodidit. In his casibus, intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli, posunt. & id quidem, quod in posteriorem partem excidit, eodem modo, rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure, reconditur. cætera uero, manibus simul tum ossa, in diuersas partes compelluntur.

De talo.

Cap. XXII.

TAL V Sin omnes partes prolabitur. ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus, contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit, à posteriore, talus herius durus, & inflexus est: minusque is opus est. si in posteriorem laxa pene conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoque per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoque casu, diutius in lectulo perseverandum est: ne is talus, qui rotum corpus sustinet, parum confirmatis nervis, ferendo oneri cedat, rursusque pronumpat. caldamentis quoque humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum ipsum laedat.

De planta.

Cap. XXIII.

Plantæ ossa hisdem modis, quibus in manu, prodeunt, his, hisdemque conduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere: ne cum mediam plantam, imumque eius uinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat: ideoque suppuret.

De digitis.

Cap. XXIV.

IN digitis, nihil ultra fieri debet, quam quod in his, qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius, aut summus, canaliculo aliquo contineri, hæc facienda sunt in his casibus, ubi sine uulnere ossa exciderunt. Hic quoque & ingens periculum est: & eo grauius, quod maius membrum est; quo uel ualidioribus nervis, aut musculis continetur. ideoque humeris, femoribusque, metus mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est: Non repositis tamen, nonnullum periculum est. eoque maior in utroque timor est, quo proprius uulnus articulo est. Hippocrates nihil tutò reponi posse, præter digitos, & plantas, & manus dixit. atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipitent. Quidam brachia quoque, & crura reposerunt: & ne cancri, distentionesque neruorum orirentur (sub quibus in eiusmodi casu, fieret mors matura) sanguinem ex brachio miserunt. Uerùm ne digitus quidem (in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est) reponi debet ante inflammationem: aut postea, cum iam uetus res est. si quoque reposito osse, nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum uulnere, loco motum, neque repositum est, sic iacere conuenit, ut maxime cubantem iunat: tantum ne moneatur: ne uel dependeat. In omni talis morbo, magnum ex longa fame præsidium est. deinde ex curatione eadem, quæ propozita est ubi ossibus fractus uulnus accessit: si nullum os eminet, impedimento semper futurum est. id quod excidit, abscondendum est: imponendaque super arida linamenta sunt, & medicamenta non pingua; donec, quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est, facile noxæ postea pateat.

De digitis.

Cap. XXV.

F I N I S.

QVINTI SERENI MEDICINA.



Probe saluterum, quod pangimus,
Assere carmen:
Inuentumque tuum prompto co-
mitare fluore.
Tuque potens artis, reduces qui tra-
dere uitz

Nosti: atque in coelum manes reuocare sepultos.
Qui colis ægeum, qui pergama, quique epidaurū:
Qui quondam placida tectus sub pelle draconis,
Tarpeas arces, atque inclita templa petisti,
Depellens tetros præsentis numine morbos,
Huc ades: & quidquid cupido mihi sepe rogatus
Firmasti, cunctum teneris expone papyris.
Membrorum series certo deducta tenore
Ut stet, & assimilis medicinæ defluat ordo:
Principio celsa de corporis arce loquamur.

Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillas auribus addas,
Tum poteris alacrem capitis reparare uigorem.
Vel quæ septenis censentur gramina nodis,
Vtiliter hæctes: uel corno ex arbore sertum,
Pulchrumue potens una super aure locabis.
Aut illud mixto coctum clementer aceto
Cauti nare trahes: seu uisco linthea nexo,
Induces fronti: seu trita gramina mentæ.
Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris
Profuit: aut hedera ex oleo decocta uetusto:
Profuit: aut tochleis frontem tractare minutis.
Si nocuit cerebro uolentia solis aperto:
Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore,
Sanauit: profunt & amica papauera somno.
Si prius in lento madefacta terantur oliuo.

Hemicranio medendo.

PORTIO si capitis morbo tentetur acuto,
Allia diuersam lana contexta per aurem
Inducta profunt: & eodem balsama pacto.
Allia uel ternis piperis terna addita granis,
Trita hinc: certam dabit hæct tibi cura salutem.

Porriginis depellendo.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ,
Cum caput immensa pexum porrigine nungit,
Copia farris uti frendentibus edita saxis:
Hanc poterit maluz radix decocta lenare.
Aut tu foeniculum, nitrumque, & sulphura uiua
Contere: deinde caput permixtis abluc cunctis:
Furfuribusue nouis durum miscebis acetum;
Ut uarios crines tali des unguine puros.
Prodest & tarda demptus testudine sanguis:
Et prodest cedro demissus ab arbore succus.
Delinet interea glomerari farrea nubes:
Cessabit que grauis crebre porriginis imber.

Capillo tingendo.

QVOS pudet ætatis lōge, quos sancta senectus
Offendit: cupiunt præperos abscondere canos:
Et nigrum crinem fūco simulare doloso.
His prodest acri contrita cypressus aceto,
Vel frons lentisci, uel trista poma fabuci.
Lumbri quoque terrestres miscentur oliuo:
Et iuuenem præstant rediuuio flore capillum.
Præterea murem poterit depellere crinem
Rhesima ex facili cera, uiscoque coacta:

Ad nitidam speciem nigros flauescere crines,
Vngento cineris prædixit Tullius auctor.
Si prægnans, artus captiui foricis edit,
Dicuntur fortis nigrantia lumina fingi.

Phthiriasi arcende.

NOXIA corporibus quedā de corpe nostro
Progenit natura uolens abrumper somnos
Sensibus: & monitis pigiles intendere curas.
Sed quis non paucat pherecidis fata tragordi:
Qui nimio sudore fluens, animalia tetra
Eduxit: turpi miserum que morte tulerunt.
Sylla quoque infelix, tali languore peresus
Corruit: & foedo se uidit ab agmine uinci.
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoque liquore
Laxatis, ut sint simul alia tangere corpus:
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere sedri.
Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.
Vnda maris lentes capiti deducit iniquas:
Et quidquid crebri defendit sylvæ capilli.

Prurigini, papulis, & scabiei arcendis.

ILLOTVS sudor, uel copia nobilis escz,
Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
Ergo lutum prodest membris adhibere fricatis:
Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
Nec pudeat tractare simum, quem bucula fudit,
Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis:
Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
Proderit ex oleo puluis, quem congerit alce
Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
Feruantes papulas oleo curato liquenti:
Aut acido Baccho miscebis ferra lupini:
Atque hinc in calido percurres membra lauacro.
Pruritus autem salsos leuat humor aceti:
Sive mari lauidus sudor, cochleæque minutæ:
Quarum contactu perimetur acerba libido.

Frenezi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenensis furiosa mouetur,
Amittasque refert frendens amentia uires:
Sive calens febribus iactatos exedit artus:
Sive meri gustus, seu frigoris efficit aura.
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte
Tempora languentis medica redimire corona.
Illis etiam lanis suffire memento:
Ceritum sepe horrendi medicantur odores:
Atque ideo insanos etiam curantur est par.
Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.
Vngitur & succis, dederit quos parua fabuci.
Expressusque hedere mandatur naribus humor.
Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.
Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendo.

DEFLVII expulsi morbo latitante capillus
Si raro lauitur: seu uis epota ueneni est:
Seu salamandra potens, nullisque obnoxia flammis
Eximium capitis tactu deiecit honorem.
Non nunquam uariant maculæ: pariusque pariter
Orbis aspersum ducit noua uulnera tempus.
Vipereæ pellis cineres his addito rebus,
Roboreasue pilas, urfino ue ungitio seuo:
Vel testudineo magis permulceto cruore.

Frigori

fel. tauri. Sanescunt dentes: aut tauri felle iuuantur.
acetum. Aut acidi latices clauso uoluntur in ore:
rubus. Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris.
lentiscus. Lentiscus, myrtusque emendant oris odorem.
quod uero assumptit nomen de dente fricando.
ceruino ex cornu cinis est. Ceruino ex cornu cinis est: aut ungula porce
torrida. Torrida: uel cinis ex ouis, sed non sine uitro
muricis aut tosti. Muricis aut tosti: uel bulbi extincta fauilla:
ambitiosa putas. Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.
exesos autem dentes si forte quereris. Exesos autem dentes si forte quereris,
vre finum muris, patulisque, & hiantibus adde. Vre finum muris, patulisque, & hiantibus adde.
vel cinerem dentis ceruini extinguere aceto. Vel cinerem dentis ceruini extinguere aceto
conuenit. Conuenit: atque cauis immittere partibus apte.
prodest & puluis lumbrici, corpore tosto. Prodest & puluis lumbrici, corpore tosto.
ora ambusta cibo sanabis lacte canino. Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
saepe etiam gelida gingiuas collue lymphæ. Saepe etiam gelida gingiuas collue lymphæ:
dentibus ut firmum possis seruare uigorem. Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.
si uero infandum proserpit ad intima uulnus, Si uero infandum proserpit ad intima uulnus,
permisceto salem parili cum pondere thuris: Permisceto salem parili cum pondere thuris:
hinc tractato locum: miram experire medellam. Hinc tractato locum: miram experire medellam.
aut tu fume pilam, quæ caudis hæret ouinis: Aut tu fume pilam, quæ caudis hæret ouinis:
hec siccata dabit molles, & fracta farinas: Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas:
huius & attritu retrum mulcebitur ulcus. Huius & attritu retrum mulcebitur ulcus.

uæ faucibus, & quæ mollienda sunt, medendis.

causa. AEGRE sciunt teneræ fauces, cum frigoris atri
vis subijt. Vis subijt: uel cum uentris agitalis aer
vertitur. Vertitur: atque ipsas flatus grauis inficit undas:
vel rabiis clamor fracto cum forte honore, Vel rabiis clamor fracto cum forte honore,
planum radit iter: sic est Hortensius olim
absumptus: causis etenim confectus agendis, Absumptus: causis etenim confectus agendis,
obtruncit: cum uox domino uiuente periret: Obtruncit: cum uox domino uiuente periret:
et nondum extincti moreretur lingua diseri. Et nondum extincti moreretur lingua diseri.
ergo omni studio quæres inhibere dolorem: Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:
simplicibus lymphis confunditur ærium mel: Simplicibus lymphis confunditur ærium mel:
addit excussus niuea simillagine furfur: Addit excussus niuea simillagine furfur:
decocta hæc clauso simul exercentur in ore. Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
præterea fauces extrinsecus ungere prodest, Præterea fauces extrinsecus ungere prodest,
ursino & tauri seuo, cerisque remissis: Ursino & tauri seuo, cerisque remissis:
omnia quæ geminis æquabis lancibus ante. Omnia quæ geminis æquabis lancibus ante.
disce etiam miram ex humili medicamine curam: Disce etiam miram ex humili medicamine curam:
actiaco melli iungas agreste papauer, Actiaco melli iungas agreste papauer,
decoctum quæ simul mædes, mansum quæ uorabis. Decoctum quæ simul mædes, mansum quæ uorabis.
crinitæ porri radices quinque coquantur: Crinitæ porri radices quinque coquantur:
hinc aqua non feruens uoluatur fauce sonora: Hinc aqua non feruens uoluatur fauce sonora:
nec tamen in stomachum descendat gutta patente. Nec tamen in stomachum descendat gutta patente.
si uero afflictam langor deiecerit uiuam; Si uero afflictam langor deiecerit uiuam;
tunc horas aliquot pronus recubare memento: Tunc horas aliquot pronus recubare memento:
aut illam puluis tosti reuenabit aneri, Aut illam puluis tosti reuenabit aneri,
aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis. Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.
verum angina sibi mistum sale poscit acetum. Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.
quod prodest clauso uersatum agitare palato. Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore cervicis.

at si ceruicis, duratæque colla rigeant, AT si ceruicis, duratæque colla rigeant,
mira loquar geminus mulcebitur unguis poples: Mira loquar geminus mulcebitur unguis poples:
hinc longos pariter neruos medicina sequetur: Hinc longos pariter neruos medicina sequetur:
anferis aut pingui corpenia colla fouebis: Anferis aut pingui corpenia colla fouebis:
illitur & ualido multum lens costa in aceto, Illitur & ualido multum lens costa in aceto,
aut capre finius & bubuli, aut ceruina medulla. Aut capre finius & bubuli, aut ceruina medulla.
hoc etiam immotos flectes medicamine neruos Hoc etiam immotos flectes medicamine neruos
quos autem uocitant colles, attingere dextra Quos autem uocitant colles, attingere dextra
debebis, quæ Gallus erit pressante peremptus. Debebis, quæ Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, & colicibus medendis.

NOXIA si penitus colicem sequere uenena
perspicies, costa lactuca fronde leuabis. Perspicies, costa lactuca fronde leuabis.
proderit & caules assumere saepe madentes. Proderit & caules assumere saepe madentes.
interdum fauces tussi quatiuntur atroci: Interdum fauces tussi quatiuntur atroci:
allia tum sumes & costa, & melle peruncta: Allia tum sumes & costa, & melle peruncta:
semina uel raphani permixto dulcia melle: Semina uel raphani permixto dulcia melle:
aut si fraxinea semen de fronde reuellis: Aut si fraxinea semen de fronde reuellis:
interiora uora, uetitus contingere dente. Interiora uora, uetitus contingere dente.
ouum melle reses, domitum feruentibus undis, Ouum melle reses, domitum feruentibus undis,
marrubiū ue potens: hæc faucibus optima sumes, Marrubiū ue potens: hæc faucibus optima sumes,
frénabisque grauem facili medicamine tussim. Frénabisque grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QUI stomachum regem totius corporis esse
contendunt, uera niti ratione uidentur. Contendunt, uera niti ratione uidentur.
huius enim ualidus firmat tenor omnia membra: Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:
at contra eiusdem franguntur cuncta dolore. At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.
quin etiam, nisi cura iuuat, uitare cerebrum Quin etiam, nisi cura iuuat, uitare cerebrum
fertur, & integros illinc auertere sensus. Fertur, & integros illinc auertere sensus.
lactucæ semen nigre, quod lignea pila Lactucæ semen nigre, quod lignea pila
triuertit: admixto ieiunus sumito melle. Triuertit: admixto ieiunus sumito melle.
sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno: Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:
aut tritum semen raphani, mulsimumque iuuabit: Aut tritum semen raphani, mulsimumque iuuabit:
siue duæ partes absinthii, ac tertia rutæ, Siue duæ partes absinthii, ac tertia rutæ,
decoctis potantur aquis, siliquæque madentes: Decoctis potantur aquis, siliquæque madentes:
semina uel marathri forte cum lacte capellæ: Semina uel marathri forte cum lacte capellæ:
puluerum quoque decoctum curabit amice: Puluerum quoque decoctum curabit amice:
et potu, & foru stomacho conducit anetum: Et potu, & foru stomacho conducit anetum:
seu cochleas undis calefactas, ac prope iunctas Seu cochleas undis calefactas, ac prope iunctas
suppositis torrens prunis: uiuoque, garoque Suppositis torrens prunis: uiuoque, garoque
persusas cape: sed prodest magis esse marinas. Persusas cape: sed prodest magis esse marinas.
at male digestis si crapula leuiet escis, At male digestis si crapula leuiet escis,
ex pipere, & calida florem de rore marino Ex pipere, & calida florem de rore marino
ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum: Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum:
quæ coctis tanges epulis, ac rapta uorabis: Quæ coctis tanges epulis, ac rapta uorabis:
aut cubitum pergens succum cape tritæ aneti. Aut cubitum pergens succum cape tritæ aneti.
ventriculum Mergi sale iacto, contere ualde, Ventriculum Mergi sale iacto, contere ualde,
tosto pane super, piperis quæ puluere multo Tosto pane super, piperis quæ puluere multo
miscetur: capies diuinum munus in istis. Miscetur: capies diuinum munus in istis.
grana peregrini piperis diffundito quinque, Grana peregrini piperis diffundito quinque,
nihiaco melli: quæ mane inserta capesses. Nihiaco melli: quæ mane inserta capesses.
proderit hoc stomacho, uictas & coquoquet escas: Proderit hoc stomacho, uictas & coquoquet escas:

Felli nomitu, uel phibisi arcendis.

LVTEA si crescunt, præcunctis noxia fella:
allia parua nouem, piperis tot permole grana: Allia parua nouem, piperis tot permole grana:
quæ cyatho diluta gari, mandesque, bibesque: Quæ cyatho diluta gari, mandesque, bibesque:
hæc iterum septena capis, post denique quina. Hæc iterum septena capis, post denique quina.
præterea cautem, frondet si parua sabucus, Præterea cautem, frondet si parua sabucus,
decocto sale permiscet: ac iungis oliuo. Decocto sale permiscet: ac iungis oliuo.
tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas. Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.
profunt & pelagi latices, quos pondere iusto Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto
dulcibus associas lymphis, melli que liquenti: Dulcibus associas lymphis, melli que liquenti:
et niueus prodest ex ubere succus afellæ: Et niueus prodest ex ubere succus afellæ:
si tepido uino infundas, ac mella, piperque. Si tepido uino infundas, ac mella, piperque.
at uomitum radix narcissi pota mouebit. At uomitum radix narcissi pota mouebit.
si uero phthisis annofo sedet improba morbo, Si uero phthisis annofo sedet improba morbo,
intritas uino cochleas haussisse iuuabit. Intritas uino cochleas haussisse iuuabit.
proderit & uetens seui pila sumpta fuilli: Proderit & uetens seui pila sumpta fuilli:
quæ capulas quoque producit medicina salubris. Quæ capulas quoque producit medicina salubris.

Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA foecundo multum lactantia succo,
saepe sibi noxæ nimium manando fuerunt. Saepe sibi noxæ nimium manando fuerunt.

Fæce

Fece igitur ualida duri reprimuntur aceti.

Post partum tumidas iniuste assurgere mammas

Interdum aspicias : harum mala commemoratur

Murinus simus ex pluuio sedare liquore.

Sin autem clausis penitus dolor angit acerbis,

Lumbricis terre surgentes iunge corymbos.

Si castigatas studium est prestare papillas,

Ex hederæ sertis ambas redimire memento :

Protinus & raptas flammis mandare coronas :

Anseris aut seuum pariter cum lacte tepente :

Aut ouum illinito, tulerit quod garrula perdix :

Præterea pluuio decocta papauera rore

Hærescant inultis post absoluenta diebus.

Vis & phœbigenæ coelestia sumere dona,

Vbera cum tetris laniata doloribus horrent :

Naui ramentū & quæ nomine præssion herba est :

Et quæ uulgari sermone infana uocatur :

Græcus propria scit dicere lingua :

Necnon & calami radix, lapathi que legumen

Mixta dabunt miras, experto credè medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinende.

SI stomachus nondum concoctas expuit escas,

Sed magis atque magis uitium reuocando ualescit :

Allia cedemus, crebrumque trahemus odorem.

Sin etiam rutilus fertur de pectore sanguis,

Sorbitum mentæ, raphanus uel costa iuuabit.

Sepe lapis tenitur (specularem nomine dicunt)

Et mixtis hauritur aquis : sistiturque cruorem.

Vitru interdum raptus de subere cortex :

Et cinis ex calido prodest epota lyzo.

Ouorum cinis aut cochlearum, aut denique pelvis.

Aut cinis e' salicum ramis prodesse putatur :

Aut platani pilulas acri infundemus aceto :

Nullus erit sanguis, quem non cibus iste moretur.

Iecoris, & laceris uirg. medendis.

SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,

Protinus ex multa potanda eselisphactos herba est :

Sumitur & semen, quod fraxinus alta profudit :

Vulturis atque iecur : uel ius perdicis apricæ.

Præterea simili dragma pix dura, piperque

Franguntur : sic in molli puluere iuncta,

Egelidis miscentur aquis : recreant que bibentem.

Absinthi quoque decocti potabitur humor.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto,

Accensum extingues lapidem stridentibus undis :

Hinc bibis : aut aceris radicem tundis, & unâ

Cum uino capis : hoc præsens medicamē habetur.

Quid referam multis composita phlōnia rebus :

Quid loquar antidotum ? uanus quis ista requirat ?

At nos pauperibus præcepta feramus amica,

Necnon & iecoris queretur fibra lupini :

Iungenturque simul costū, posiumque, piperque :

Que diluta mero dantur potanda lyzo.

Est & uis morbi, quod telum commemoratur :

Cum subito dolor infans furit incitus ictu :

Perficus huic potum e' nucleos dabit interiore :

Quæ mihi cura satis, casu monstrante probata est.

splera curando.

QUANDO lēn tumido circūligat ilia uindco,

Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,

Mollibus ex hederæ tornantur pocula lignis :

Hinc trahet assuetos eger quoscumque liquores :

Aut uindis coctonum olerum potabitur unda.

Proderit exucto fluuiialis hirudo cruore :

Sive myrica potens : seu ros cum pane marinus :

Aut hederæ succus potu appositus iuuabit.

Necnon intactam ferro, quam uideris alnum,

Hinc liber eripitur : ferro sine decoquiturque :

Donec uistarum pars tertia sublit aquarum.

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.

Nonnulli memorant, consumi posse lienem,

Eruum si semper ieiuno sumpserit ore :

Arida si uisum feruente domatur aceto :

Et trita illinitur : uel splen apponitur hedi.

Marrubium in uino potu prodesse loquuntur.

Præterea piper, ac nepetē cum flore, & anetum,

Capparis, atque Apium, buglossaque iungitur unâ :

Horum decoctos latices potare salubre est.

Pulchrum, abrotanum, nitida cum mastice coctum

Ac thymbræ speciem, quā comemorat cephalore :

Prædixit spleni deus idem posse mederi.

Dulcia Plautus ait grandi minus apta lieni :

Splen tumidus nocet : & risum tamē addit ineptu :

Vt mihi sardois uideatur proximus herbis :

Irrita quæ miseris permiscet gaudia satis.

Dicitur excessus faciles auferre cachinos,

Perpetuoque quo frontem prestare seueram.

Præcordis sanandis.

LANGVIDA si duro turgēt præcordia morbo,

Miscetur mulx farris sextarius unus :

Necnon & lini sumum, siliqueque legumen :

Hæc decocta simul, nondumque tepentia noctis :

Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris,

Costa lines : durum ut possis mollire tumorem.

Ocma præterea, bulbiue linuntur anari.

Proderit & lymphis corpus mersare marinis.

Quin etiam catulum lactantem apponere mēbris

Comuenit : atque malū transcurrere fertur in illū :

Cui tamen extincto munus debetur humani.

Ne iunctis uirum ducit de coniuge coniux.

Quod superest, syraci iunges ramenta carinz.

Quodque decet ex rebus, decatartyma nite uocatur :

Masticis addentur cum puluere mollia farra :

Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

Lumbis, & renibus sanandis.

C V M sœuit penitus herens iniuria lumbis,

Ignem lapis candens datur exultantibus undis :

Hoc poteris potu tristem superare dolorem.

Aut pice cum molli nitru sulphurque, & acetum :

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.

Proderit hanc egri crebro perducere membris.

Aut caput asparagi cum uino sume uetusto :

Seu maui appone : modus conducit uterque.

Aut adipi mixtum lumbis inducito sulphur.

Sepe chelidonium cum succo palladis addes,

Farraque : quæ tremulis profunt sudantia flammis.

Fertur amygdalinæ succus nucis esse bibendus :

Pinsitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.

Aut tres ex uino cochleas feruescere coges :

Cumque suis domibus frages, pipis quoque grana

Ter quinque adicies : potuque iuuaberis illo.

Furfur item parca fuerit cum feruidus unda,

Post oleo madidus, succis immittitur aptis :

Que uix passuris urentia iungito membris.

medulla cerebri. Prodest ceruinae medicans natura medulla.
acet. malua. Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:
al. aut. nupt. fruct. Aut mistam teneris mandisse lilistaca maluis:
al. med. ap. Contritumque simul cum mastice confer anctum:
al. med. ap. Quodque decem rebus componi ex noie clarū est:
vis. His contingere locum. deus hac mihi certa pbauit.

Ventris dolori mitigando.

SI DOLO R infans tota defruit in aluo.

cau. Heminis tribus in lymph a ualidam quoque rutā.

cau. Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.

cau. Potus erit medicus non detrectante palato.

cau. Præterea niuei sterilis testa uritur oui;

cau. Quæ postquam in terram fuerit conuersa farinam.

cau. Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.

cau. Necnon iungenda est utero noua uirga miricæ:

cau. Illæsa hæc ferro, terraque intacta geratur:

cau. Aut medio uentris prodest aspergere terram:

cau. Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.

cau. Proderit & puluis facili sub cardine raptus.

cau. Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum.

cau. Conueniet; quod iam nobis documenta probarūt.

cau. Mentā quoque hoc pacto medicos dabit hausta sa.

cau. Coeliacos autē recreabis panē salubri,

cau. Quem madido farre effices, ac mollibus ouis:

cau. Quorum testa ferro prius euanesceat aceto.

cau. Refert & teretes bulbos mollire terendo:

cau. Cumque his leni clarum potare fluentum.

Hydropisi depellende.

CORRUPTI iecoris uitio, uel splenis acervo.

cau. Crescit hydrops: aut cū siccata febre medullæ.

cau. Atque auidæ fauces gelidum traxere liquorem.

cau. Tum lymph a intercus uirio gliscente, tumescit.

cau. Secernens miseram proprio de uiscere pellem.

cau. Conueniet tenere radix decocta sabuci,

cau. In geminis calidi cyathis potanda lyzi.

cau. Fraxineum semen cum Bacchi rose bibendum est.

cau. Aut calido filicis radicem mollit iaccho,

cau. Qui subito raptos uentos, succosque reuellit.

cau. Nec non appposito curantur dropace membra:

cau. Vngue quo frangit uirū langoris aquosi.

cau. Necnon in tepidis conuolues corpus arenis.

cau. Appositū quæ leues Neperæ gustuque inuabunt.

cau. Sæpe & Scyllino pelluntur noxia Baccho.

cau. Helleboro bene purgatur lymphaticus error.

cau. Aut huius uice quod fert semen lenta genista.

cau. Miscetur: nullis coctusque educitur undis.

cau. Est qui præualidum nitro sale miscet acervum:

cau. Atque olei succo refricat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SAPE cibi specie, uitio uel corporis ipso.

cau. Potibus aut duris restricta morabitur aluus.

cau. Vincetur talis mora gramine mercuriali,

cau. Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.

cau. Prunaque cōueniunt quæ mittit clara Damascus.

cau. Multos præterea medici componere succos

cau. Assuerunt: pretiosa tamen cum ueneris emptum.

cau. Fallēis: frustra que immensa nō misumata fundes.

cau. Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.

cau. Aut igitur tectum lana supponis alumen:

cau. Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci:

cau. Vel salsum mulsū capræ cum lacte capellis.

cau. Crede tamen potum meliorem lactis equini:

al. med. ap. Dicitur & ualidos asine lac uincere succos.

al. med. ap. Syluestris sici lachrymam prodesse loquuntur.

al. med. ap. Quodque satis melius uerbis dicemus Horati.

al. med. ap. Mitulus & uiles pellunt obstantia conchæ.

al. med. ap. Sed cochleas prius, urtica, aut fursure pasci:

al. med. ap. Purior hinc gustus, noxa sine, mouerit aluum.

al. med. ap. Sæpe thalassomeli iunctum cumulaui mus hymbri.

al. med. ap. Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.

al. med. ap. T A M uarij casus mortalia secla fatigant,

al. med. ap. Vt sint diuersis obnoxia corpora morbis.

al. med. ap. Sæpe etenim nimio cursu fluit impetus alui:

al. med. ap. Frenat commixto cū feruet brassica uino:

al. med. ap. Aut cerasi uicium longo iam tempore pomum.

al. med. ap. Succus amineæ uiris cum pane medetur:

al. med. ap. Mel bene permixtum calido potatur aceto.

al. med. ap. Vile quidem facili factū / tamen utile opinor.

al. med. ap. Si lentent medica data purgatoria dextra,

al. med. ap. Adiecto piperis medicatur puluere calda.

al. med. ap. Sin autem longo decurrent intima fluxu,

al. med. ap. Atque immane malum multo iam tempore gliscit,

al. med. ap. Torridus ex uino cortex potabitur oui.

al. med. ap. Ramentum niuei credunt prodesse Elephantī.

al. med. ap. Arbore pyramæa cortex direpta medetur.

al. med. ap. Axe sub atrito pix nigro mixta lyzo.

al. med. ap. Immensum poterit potu retinere fluorem:

al. med. ap. Numinis aut iussu cedrum cum mastice misces:

al. med. ap. Mollitamque picem, & rasum de nauibus unguet.

al. med. ap. Languida quo fidens medicamine mēbra fouebis.

al. med. ap. Proderit & pueris quos dentis origo fatigat,

al. med. ap. Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta,

al. med. ap. Atque apium, caulesque rubus quos fundit acuta:

al. med. ap. Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis, & tinea purgandis.

Q V I D non aduersū miseris mortalibus addit

al. med. ap. Natura? interno cum uiscere tinea serpens,

al. med. ap. Et lumbricus edax uiuant inimica, creent que.

al. med. ap. Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.

al. med. ap. Sæpe etiam scandens, oppletis faucibus hæret:

al. med. ap. Obsessasque uias uite concludit hanelæ.

al. med. ap. Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:

al. med. ap. Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ.

al. med. ap. Necnon & succus medici potatus aceti.

al. med. ap. Prodest præterea cum Baccho persica frondis:

al. med. ap. Democritus memorat mentæ conducere potum.

al. med. ap. Sumitur abrotanum, necnon & uile melanthum:

al. med. ap. Allia per sese sanant: aut ius coriandri.

al. med. ap. Quin & marrubiū decoctum, haustumque inuabit.

al. med. ap. Pulchrum ue potens, & agreste iugatur anethum.

al. med. ap. Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.

Coto sedando.

C V M colus inuisu morbi genus intima carpit.

al. med. ap. Mande galeritam uolucrum, quam nomine dicit:

al. med. ap. Aut pauidi leporis mædasta coagula pota:

al. med. ap. Siue apio tritas neperas cum mastice iunges.

al. med. ap. Necnon & species ambas redolentis anethi.

al. med. ap. Quarum decoctos patiens haurito liquores.

vesica, & calculo purgando, & urine prouocande.

al. med. ap. S I cui uesciæ tardus cunctabitur humor,

al. med. ap. Hæc mora rumpetur uino peruisa uetusto.

al. med. ap. Prodest & paruos acidos potare sabuci.

al. med. ap. Aut hederæ succum: aut lachrymosi rita synapi.

Necnon

^{ab ovis spini ubi.}
 Nec non resinas ex oricia terebintho,
 In speciem crulliz paruos glomerabis in orbes:
 Quos ternos, tepida mixtos haussisse medella est.
 Quondam etiam nimio princeps urina fluente,
 Irrigat exuuias, obscenoque inficit hymbri.
 Ergo cinis nepetæ, succus uel proderit haustus:
 Et uino trinus datur, aut cum lacte capellæ;
 Tum leporis cerebrum ex uino potare decebit.
 Si dolor internam uesicæ concoquit alium,
 Subueniet radix & frons epota cupressi:
 Pulchrum uel potens domitum feruentibus undis.
 Si uero in lapides densus conuertitur humor,
 Qui retinet cursus, gemitumque dolore frequentat;
 Saxifragam, seu sarxeiphagon succurrere credunt,
 Præterea semen myrti syluestris, iaccho,
 Atque oleo mixtum bibitur: nec desit acetum.
 V inaque fumantur fricto condita cumino.
 Siue palumborum capitur finus æriorum,
 Dulcadis sparsus succis, trituque solutus.
 Necnon obscœnus capraz potabitur humor:
 Obruit hic morbum, labefactans saxa remittit.

De conceptione, & partu.

I R R I T A coniugij sterilis si munera languet,
 Nec sobolis spes, multos iam uana per annos:
 Fœmineo fiat uitio res, nec ne, silebo:
 Hoc poterit magni quærens monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine uicta potenti
 Sæpe dedit foetus studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit fœmina uuluum:
 Aut ouis in stabulis fractas cum ruminat herbas,
 Pendentem spumam molli deducit ab ore,
 Atque illam meminit mixto potare falerno:
 Mercurialis item capitur communiter herba:
 Sic cubitum noctu coniux festinat uterque.
 Affubi iam certum spondet prægnatio foetum,
 Ut facili uigeat seruata puerpera partu,
 Dictamnum bibit: & cochleæ mandantur edules.
 At si per menses minus octo moratus in aluo,
 Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes.
 Putei bene purgati tunc conuenit hymbes
 Cuius opem ueram, casus mihi sæpe probarunt.
 Quin etiam sterco supponunt uuluis atri:
 Sentiat ut minime partus, qui proximus urget.
 Qua etiam, rutæ, & fragili miscentur anetho:
 Quæ diluta simul uino, atque exhausta medentur.

Proflusio cuiusque sanguinis, & matrici.

S I modicus pleno manat de corpore sanguis,
 Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.
 Quapropter multo naris completa cruore
 Cum fluit, ætritus cimex, conducit odore:
 Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:
 Hæc datur in nares, uel claudit densius aures.
 Contritis prodest cochleis obducere frontem:
 Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.
 Quod nisi supprimitur, sanguis potadus & ipse est.
 Præterea phariss caput emittit papyris:
 Detrahe quod superest, alio genitalia necte:
 Fœmineas prodest illinc uincire mamillas,
 Menstruus immenso si profluit impete sanguis;
 Succida lana malos remoratur subdita cursijs.
 Mortua quin etiam producit corpora partu.
 Sed quæcumque fluit uis immoderata cruoris,

Subernus cortex calidis potatur in undis,
 Ante minuatim studio uincente terendus.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Pileij calido purgatur fœmina potu.
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcumque bibetur.
 At si puniceos fundit uesica liquores,
 Marrubium ex passo tritum perfunditur undis:
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorẽ.
 Reliquias partus dictamni detrahit herba.
 Quod si fœminei properabit sanguinis hymbes:
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:
 Quorum aliquod lanis tectum, ad præcordia nectit:
 Hæc simul incantans, sisti debere cruorem;
 Ut lapis ille, uiz solitos iam desinit orbes.

Pilis quibuscunque internecandis, quæ oculos impediunt.

N O B I L I S hirsutas horret lasciuia fetas:

Et gaudet raptu nudari flore pilorum.

Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,

Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.

Nanque oculos infesta pilorum tela lacessunt.

Quodque illis dederat uallum natura tuendis,

Inde inimica seges proprios desecuit in orbes.

Ergo locum crinis uulsi continge cruore,

Quem dat auis tremulis simulat quæ pelibus alas:

Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.

Præterea quæcumque uoles auertere fetas,

Atque in perpetuum rediuiua obcludere tela,

Corporibus uulsi saniem perducito ranæ.

Sed quæ parua situ est, & rauco garrula questu;

Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit Hirudo,

Sumitur, & uiuens famia torretur in olla:

Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,

Auulsamque uetat rursus percrefcere sylum.

Omnibus obscœnis medendis.

Dicendum & quæ sit mēbris medicina pudēdis.

Languidus antiquo purgatur penis iaccho: I

Ac super illinitur fœcundæ felle capellæ:

Mane nouo myrti frondes commandere prodest,

Qui dolet, atque illas in uulnus despuat ipsum.

Fece etiam uini genitalia laura leuantur:

Et tumidos testes hercia lymphæ cohercet.

Vel bulbi ex mulso, uel cera immista cupresso:

Aut faba cum repidis baccho decocta fluentis.

Ramicis immensum fertur cohibere tumorem,

Fat madidum lymphis: medica cū fronde cupressi:

Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.

Sin autem existit durum tibi glandibus inguen;

Proderit induci cochleas cum melle minutas.

Obscœnos si pone locos noua uulnera carpent;

Horrentum mansa curantur fronde ruborum.

Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,

Mustellæ cinere immisso purgabitur ulcus,

Sanguine tum Ricini, quem bos gestauerit ante:

Herba chelidoniz fertur cum melle mederi:

Herbaque cum seuo folijs de mille uocata.

Scier, & articulari morbo.

S A E P I V Soccultus uicta coxendice morbus

Perfurit, & gressus duro languore moratur:

Populus alba dabit medicos de cortice porus:

Necnon & teneræ gracili de fronde geniste.

Arreptos caules acidoque liquore madentes

Sumere conueniet, rubiæ quoque ducere porum:

cochlear. Aut ex iuno cochleas haurire lyzo.

ad art. vnde. Si uero articulos tabes inimica per omnes

scus. mel. Hæserit : ex ficu betas ac melle ligabis.

scus. ym. Vel pelagi latices, simul & Baccheia dona

scus. ym. Sumere curabis : nimio sed par cito uino.

scus. ym. Ennius ipse pater, dum pocula siccant iniqua,

scus. ym. Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.

scus. ym. Furunculo medendo.

scus. ym. C V M sanguis nimius puri commistis atroci,

scus. ym. Aestuatur : & papulas alte sustollit acutas,

scus. ym. Resinam misces, & saxis ordea fracta

scus. ym. Consperfa hæc tepidis apponere conuenit undis :

scus. ym. Vis & hyoscyami ceræ, læuoque iugatum

scus. ym. Nectere : non minus hæc poterit medicina iuuare,

scus. ym. Prætereaque finum ex gallo, quem legeris albo,

scus. ym. Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.

scus. ym. Auribus aut pecudum molles expromito fordes :

scus. ym. Vnguine quo foris dabitur, medicina papillis.

scus. ym. Carboni medendo.

scus. ym. Horrendus magis est, perimit qui corpora carbo :

scus. ym. Vrit hic inclusus, uitalia rumpit acerbus.

scus. ym. Hunc ueteres quondam uariis pepulere medelis :

scus. ym. Tertia nanque Titi, simul & centesima Liui

scus. ym. Charta docet ferro talem candente dolorem

scus. ym. Executum, aut potio raparum semine pulsum.

scus. ym. Ni fieret, dicens uix septem posse diebus

scus. ym. Vitam produci : tanta est uolentia morbi.

scus. ym. Dulcacidum laticemque cumini semine iunges :

scus. ym. Arque finum pariter paphiz compone columbæ :

scus. ym. Hinc line duratas partes : & clausa uenena.

scus. ym. Præterea triti referant adoperta lupini.

scus. ym. Nonnullus calcem uiuam dissoluit aceto :

scus. ym. Fumantemque niuem papulis apponit acerbis :

scus. ym. Est qui gallinæ perducit stercore corpus :

scus. ym. Allia uel piperi parce commixta linuntur :

scus. ym. Pythagoræ cognata leui condita cumino

scus. ym. Proderit, & madida fermentum polline turgens.

scus. ym. Pani, uomica, & struma depellendis.

scus. ym. S V N T alij, quos dura mouet natura tumores,

scus. ym. Non minus horrendi, sed non ita perniciosi.

scus. ym. Vomica qualis erit, uel eidem proxima quædam.

scus. ym. Simplice resina miscentur hordea tinsa :

scus. ym. Et mulsos amnes : & purgamenta columbæ :

scus. ym. His bene decoctis languentia membra fouentur.

scus. ym. Mollis odorato faba iungatur coriandro,

scus. ym. Proderit appositum, molliorque aperitque tumore.

scus. ym. Aut de phalganio radix decocta palustri :

scus. ym. Quæ salis admixto tunderetur condimento.

scus. ym. Proderit & mansum, quod traxeris arbore uiscum.

scus. ym. Gramen Hyoscyami ceræ, seuoque uetusto

scus. ym. Concilia : mixtisque locos perduce dolentes.

scus. ym. Exercere etiam corpus, medicina potens est.

scus. ym. Ouum defindis in ficule, deinde putamen

scus. ym. Marrubij succo implebis, post melle liquenti :

scus. ym. Omnia consociata tepenti, prospera potu

scus. ym. Sumuntur, referantque malum, purgantque leuaturque.

scus. ym. Igni sacro medendo.

scus. ym. E S T etiam morbi species, quæ dicitur ignis :

scus. ym. Languida quo multo torrentur membra calore.

scus. ym. Vel tu uicino seuum bonis igne remittis,

scus. ym. Mollitumque lines : dederis uel fortibus oua :

scus. ym. Sed non cocta dabis : sic torrida membra fouebis :

Lumbricus terræ mixto inducetur aceto :

Aut parili noua Ruta modo : sed iungis oliuum :

Ouaque cum betis profunt super illita tritis.

Allia dant cinerem sociandum oleoque, garoque :

Vnguine quo gliscens deponet flamma furor em.

Sæpe chelidoniz pars candida iungitur oui,

Quæ medico potu, sed uilit trita capesses :

Admiscere memor lymphas, amnemque faterni.

Podagra depellende.

Quædā sunt rabida medicamina suma podagra,

Cui ter tricenās species Epidauritis imple

Dixit inesse deus : requiem tamē huic dare morbo

Fas erit : & tristem saltem mulcere dolorem.

Ergo agē, et arrepta salicis frondemque, librumque

Cum uino tere : sic contractos perline nervos :

At cum prima mali sese ostendat origo,

Feruida non timidis tolera cauteria plantis.

Seminecis uel hirci referato pectore calces

Inserere : sic diræ reprimēs primordia pestis :

Aut si corruptus perfederit altius humor :

Trita cupressus ibi baccho iungetur acerbo

Panibus & teneris cohibebunt addita questus

Parua sabucus item est hircino collita seuo :

Triticeæque acido manantes amne farinæ :

Aut nitidum ranæ decoctum uiscus oliuo

Siue chelidoniz succus sale mixtus aceto.

Sunt quibus apposita siccatur humidine sanguis :

Non audita mihi sit fas, sed lecta referre.

Hoc quidem rabidus morbo, per tempora messis,

Vicino plantas frumenti prefficit aceruo :

Eualitque grauem casu medicante, dolorem.

vulneribus ferro, aut uerberibus factis.

N A T V R A E uitij medicas obicimus artes,

Nunc & fortunæ iaculis obfistere par est.

Si cui forte lapis teneros uiolauerit artus,

Necte adipēs uisuli, simul & tritam chameciston.

Nec pudeat luteæ sterco producere porce

Sin autem seuo est laceratum uerberare corpus

Tum lexima cinis ceras dissoluit, & oua

Admixtoque oleo, uibices comprimunt atrox.

Si uero infrenus manat de uulnere sanguis,

Purpura torretur conchili perlita succo

Huius & atra cinis currentem detinet undam

Verrucæ quoque defectæ frenare cruorem

Dicitur ambustus tyrio de uellere puluis.

Præterea nimios referati uulneris amnes

Fœniculi cinis astringit, uel fimbria porri :

Siue finus manni cum testis uritur oui,

Et reprimat fluxidos miro medicamine cursus,

vulneribus quibuscunque casibus ætis.

C V M magna humanæ sint potera cōditioni,

Tā multæ innumeri species mihi uulneris adsunt :

Vt nequeam proprijs cunctis adscribere curas.

Iisdem igitur monitis casus sanabimur omnes :

Sic tamen, ut nullus medicinam eluserit error.

Ergo modus quicunque obringit uulneris arti,

Contritus cum melle dabit medicamina bulbus :

Herbaque, quæ folijs nomen de mille recepit :

Appositu prodest adipi permixta uetusto

Succida cum tepido necetur lana lyzo :

Ambustus uel cinis complebit uulneris ora.

Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.

Vt

Vt succis hederæ pulchrescit foeda cicatrix.

Ab homine, uel simia morsus.

Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis

Vulnera dente dedit: uirus simul intulit atrum.

Betoniam ex puro prodest assumere Baccho:

Necnon & rhaphani cortex decocta medetur:

Si rita admorsis fuerit circa nita membris.

Serpentum morsibus, & uenenis pellendis.

Cuspide non quisquam, longe neque cæde lanissa,

Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagittæ,

Quam citâ uipereo potis est affligier istu.

Quare aptam dicamus opem, succosque medentes.

Cui nocuit serpens, fertur caput illius apte

Vulneribus iungi: sanat, quæ lauciat ipsa.

Vt larissa curatus Telephus hasta.

Proderit & caulem cum uino haurire sabuci:

Aut coctum rhaphani librum, ritumque ligare:

Siue etiam excelsa folium de mole cupressi.

Mandabit lactens caprifici succus opellam:

Aut rithymalis atrox uulnus contrita perungit.

Carduus est nondum doctis fullonibus aptus:

Ex illo radix tepido potatur in amni.

Ceruino ex foetu commixta coagula uino

Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.

Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyzi

Betonicæ uel leues, gallinæ aut iura uetustæ.

Si uero horrendum uulnus fera læcet alpis,

Vinam credunt propriam conducere potu.

Varronis fuit ista senis sētentia: necnon

(Plinius ut mēmorat) sumpti iuuat hymbæ aceti,

Dicendum & quæ sit præcox medicina rimenti:

Cautio nanque potest diros peruertere morsus:

Si iecur exequum tardo de uulture portes,

Erras si uel si totos perduxeris artus,

Quas prius attritas uehementi spargis aceto:

Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:

Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.

Toxica præterea qua sint pellenda medela,

Expediam. sanguis poterit prodesse caninus:

Qui facili potu antidotos imitatur honestos.

Vis & mirificos cautus prædiscere odores:

Accensis quibus arcetur teterrima serpens,

Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:

Vel nepetâ: aut frondē rigide stirpemque miricæ.

Ichibus Scorpii, & morsibus Muris caci, uel Aranei.

Sunt minime species: sed dire uulnere pelles,

Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant.

Scorpius ut grauis est, & Araneus hæc mala semper

Captant securos multa iam nocte sopores.

Et documenta dedit nobis prostratus Orion,

Magna quod exiguis perimatur membra uenenis.

At qui uulnus atrox incussit, Scorpius ardens,

Continuo capitur: tunc digna cede retundis,

Vulneribusque actis fertur reuocare uenenum:

Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur:

Siue meri potu dissoluitur improba pestis.

Ad cunctos autem morsus, ichusque minorum:

Cafeus aptus erit pauide de lacte capellæ:

Cumque hoc assumi debeat origanus herba.

Hæc duo mirificis curabunt ista medelis.

Necnon foeniculo calidum annectatur anethum

Aut uiuum sulphur sicca cum fece lyçi.

Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:

Quo lita sanescunt depulso membra dolore:

Sin autem muris nocuit uolentia cæci,

Quæ sola signauit uoluentis orbita plaustris,

Illine: mira datur uili de puluere cura.

Subitaneo dolori, febrī, atque oſtocolo.

Nonnunquam existit subiri noua causa doloris:

Cuius origo latet, ueris reprimenda medellis.

Nanque chelidonium mixto sale necesse prodest.

Velleræque infuso recalentia sulphure sanant.

Ostocolon lento conducit melle perungi.

Sin autem calida depascent corpora febres,

Tunc apij succus leni soctatur oliuo:

Membra lines: fortique ferus mulcebitur ignis.

Nec spernedus adeps, dederit quem bestia Melus.

Seminis ceni lachrymam miscere liquori

Conuenit: atque artus illinc mulcere carentes:

Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad Typum quartanæ.

N E C tu crede leuem dilato tempore febrem:

Quæ spatium sibi dat magis, ut cessando cæscat

Lentato quæ crassatur quartana calore:

Ni medicas adhibere manus discamus & herbas.

Allia non pudeat terno cum cimice trita

Et diluta mero medijs haurire diebus.

Aut facilem iecoris murini ducere fibram.

Quatuor & duri iungantur scrupula Bacchi.

Mira est absinthii cum simplice portio lymphæ

Sume tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantumdem marathi, mulsam nec desit aceto,

In cultus cyatho prædicta salubriter hauris:

Illâ quinetiam spartum suppone tumentis,

Aut leporis trepidi diluta coagula trade.

Prodest & porus sed nullus doridis humor.

Quidam etiam miranda ferunt uemente calore,

Imantes sudum ueneris, munusque petendum.

Sed prius est oleo partus feruescere ranæ

Intruijs, illoque artus perducere succo.

Ad Typum tertianæ.

E S T etiam alternis febris rediuiua diebus:

Tempora discernens quasi iuste pondera libræ:

Vt possis igitur talem prohibere furorem,

Tu uolues cera sine caudis grana cumini,

Puniceæque indes pelli, colloque ligabis:

Pulei ramus lanæ uelatus amictu,

Tempore suspecto, medicos præbebit odores.

Præterea cumex potatur tritus in ouo

Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad Typum quotidiane.

A T qui continuis non cessat adire diebus,

Sed tantum certas morbus discriminat horas,

Triticum metuit granum (si credere dignum est)

Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.

Necnon ossa iuuant septis inuenta domorum.

Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.

Multaque præterea uerborum monstra filebo:

Nam febrem uario depelli carmine posse,

Vana superstitio credit, tremulæque parentes.

Hemitritico depellendo.

Mortiferu magis est, quod græcis hemitritæum

Vulgatur uerbis: hoc nostra dicere lingua

Non potuere ulli: puto, nec uoluere parentes.

Inscribis chartæ quod dicitur abraça fabra,
Sæpius, & subter repetis; sed detrahe sumam,
Et magis atque magis desint elementa figuris:
Singula quæ semper rapies, & cetera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.

His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.

Corallum uero, si collo necere uelles,
Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.
Talia languentis conducent uincula collo:
Letalesque abiget miranda potentia morbos.

Fracturis, & luxis sanandis.

Infandum dictu, cunctis procul absit amicis:
Sed fortuna potens, omen conuertat in hostes.

Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:

Linea deinde, superque inductas necere lanas:

Sæpius & succos conspargere pinguis oliui:

Bis septem credunt coalescere cuncta diebus:

Aut ueteri baccho capre simus inde petulo:

Hoc aperit clausum, trahit herens, sanat apertum.

Sin uero caput infestus colliserit ictus,

Ex oleo necti uestis debebit arachides.

Nesciet hec illinc, nisi cum sanarit, abire.

Quod si luxa suo decedent membra renore:

Vt refoemineos crines, ac iungere seuum

Congruet, ac tali medicamine mota ligare.

Aut malam ex pingui tritam apposuisse iuuabit:

Aut si conclusum seruauit tibia uulnus:

Stercus ouis placide iunges, adipisque uetustos:

Pandere quæ poterunt ulcus, patuloque mederi.

Neruis incisus, & dolentibus, atque contractis

Haud quisquam credet dissectos uulnere neruos

Ad solitum rursus reuocari posse uigorem.

Sed prodest retræ lumbricos indere tritos:

Quis uetus, & fanceus sociari axungia debet

Si uero occultus neruos dolor urit inertes,

Vulturis excisos adipem, rutamque remitte:

Aut ceram, & tali recreabis languida foru.

Conuenit & pelagi calidis perfundier undis.

Carica cum hetis lento, uel melle iugatur.

Aut bacheo madefacta ceras cum fronde cupressi:

Quo poteris potu recreare rigentia membra.

Sin autem subito replicantur corpora morbo,

Contractos reuocat neruos caro sumpta columbæ.

Agris somno asciscendo.

NON solum miseros teterima febris adurit:

Sed super optato pergit uiuare sopore:

Ne prosit placidi coelestia munera somni.

Charta igitur, narijs quam pinxit littera uerbis,

Vritur, inde cinis calido potatur in amni.

Prodest pulcram capiti subternere sepe.

Proderit & mixtam lymphis potare cupressum:

Palladijs iridem succis, quos flore rosarum

Iungis, & immisces madidum tritumque papauer:

Quo lita frons faciem prebebit nocte quietem.

Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.

Dilue præterea glomeratam quam gerit intus

Lanam aries inter geminæ coxendicis umbras:

Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargia expellenda.

DIXI mus hæc sortem miseris mortalibus esse,

Vt sint sepe mala inter se contraria morbi;
Denique nonnunquam somno sic membra grauantur,
Vt coniungantur letho sopor altus acerbo.
Ergo leui flamma torrentur cornua capre,
Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:
Quæ teritur prius: & uino confusa liquefit.
Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:
Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.
Quidam dira iubent, septeno cervice trito,
Vt uirientur aquæ, cyathusque bibatur earum:
Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.

Comitali morbo medendo.

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,

Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.

Sæpe etenim membris atro languore caducis:

Consilium populi labes horrenda diremit.

Ipse deus memorat dubitæ per tempora lunæ

Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.

Prodest cum ueteri Baccho, fel uulturis atræ

Sed cochlear plenum, gustu tibi sufficit uno

Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris

Aut apium elixum, aut conditum melle fel agni:

Marrubium uel pari confusum pondere mellis:

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno

Aptus mustelæ cinis est, & hirundinis una

Præterea pluuias hominis, quas calua lupina

Excepit, proiecta sinu, consumere prodest:

Aut lapis ex nido, uaga quem congeffit hirundo

Vellitur: ex nexu fouet, attollitque iacentem.

Pellitur (ut fama est) gustu quoque langor anethi.

Regio morbo pellendo.

REGIUS est uero signatus nomine morbus

Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:

Huic rubia ex mulla fertur conducere lymphæ.

Allia trita dabis uino madefacta calenti:

Vellera cum uino suffri sulphure prodest.

Dentibus, uel strigi inquietatis infantibus

NVDVM hominē primū mudi natura profudit:

Insuper excruciat, niueis cum dentibus armat

Collo igitur molli dentes necentur equini,

Qui primi fuerint pullo crescente caduci.

Aut teneris cerebrum gingiuis illine porci:

Aut leporis, niueo bibitur cum lacte caprino.

Præterea si forte premit stryx atra puellos,

Vt rofa immulgens exertis ubera labris:

Allia præcepit Titini sententia necti:

Qui ueteri claras expressit more rogas.

Combusturis igne, uel frigore factis

Sunt diuersa quidem mala frigoris, atque caloris:

Sed tamen amborum simili nocet ulcere uirus.

Illa quoque uita putas, quæ sum niue læsa rigente.

Conuersa in cinerem platani pila curat utrunque.

At uero ambustum flammis qui candidus oui

Succus inest, penna inductus sanare ualebit.

Aut tu succosæ cinerem perducito lanæ:

Aut uiuam ex oleo ueteri composito calcem:

Ordea uel franges, atque oui candida iunges.

Adsit adeps porcæ (mira est hæc forma medelæ)

Iunge chelidonijs, ac sic line uulnera succis:

Quodque recens uisit glacies, axungia simplex

Mulcet: & ex facili grata est medicamine cura.

et anceps admonitio. ⁵⁴ *filii omnia, quod dicitur in eorum intellectu, ipsoque sensu
et sensu, quod filii omnia in intellectu, sub ratione,
de re medica. 154. (Lingua). Et dicitur in eorum
intellectu, et quod in omni omnia dicitur quod dicitur,
sunt omnia et sunt, dicitur omnia sunt.*

+ Appinge hic e. R. Lenny Fanny P. A. Lemons
 libellum de ponderib. & mensuris,
 ex impress. Henrici Stegani.

Nancelius Lectoris.

Trotula mulier (nepti enim pro nyctio ab imperitis, aut sane ijs qui non legunt, citari solent)
 & pia, & sane docta, mulierem sexum congruentem. Lepido libello inscript de ijs omnibus, qui
 huc infirmo sexui ingruere solent valentius incommoda, sive a iugitate illibata, seu
 in coelibatu degenti, seu potius iura matrimonij in liberos procreatione educatione, profuturi.
 Obiter etiam & vix manibus arcana & mystica remedia ad prolem suscipienda, & peculiosos morbos
 profligandos, pie communi causae. In quo, sexus imbecillitate, doctrinae recentior scientia videretur
 # (quam intellam & puram) nisi. In unitate orationis, tamen id etatis usitata, huius mulierem quendam infanti
 # (quod est in alijs huiusmodi sequentibus) apparet, dimisi)
 # (quod est in alijs huiusmodi sequentibus) apparet, dimisi)
 In qua tanta stultitia videtur, quod aut quantum stultitia, tum deum agnosceret,
 cum perlegeris, & cum alijs codicibus videretur non esset tantum stultitia. Vale, Turonis. Cal.
 Sextilib. 1573.

TROTULAE DE MULIERVM PASSIONIBVS

ANTE, IN, ET POST PARTVM, CVM RELIQUIS

partum item inseruientibus, liber experimentalis mirificus.

De retentione Menstruorum, Cap. I.

Et quare prouocanda,



S igitur deficient Menstrua & mulier sit corpore extenuata, tunc phlebotometur euena que est sub cauilla pedis interius, que dicitur Saphena, primo die de uno pede, sequenti die de altero: & extrahatur sanguis secundum quod uirtus exposulauerit. Quia in omni egitudine generaliter cauendum & respiciendum est, ut non nimis debilitetur egrotas. Refert enim Galenus de quadam muliere, cui defecerant menstrua per nouem menses, & in toto corpore constricta fuerat & extenuata, cui et penitus defecerat comedendi appetitus: unde ipse extrahat ei sanguinem de predicta uena per tres dies, de uno pede primo die lib. I. secundo die lib. I. de altero pede, tertio die de primo pede iterum unc. VIII. & ita in breui spatio rediit color & calor uiuificus, cum debita totius corporis habitudine. Cum autem uenter fuerit dissipatus, sicuti frequentissime restrictis menstruis accidit, tunc accipe pilulas de quadam medicina competenti, & acue eas prout ipsum acumen poterit sustinere: & ei tribue. Postea phlebotometur de Saphena. Deinde balneetur: & post balneum bibat de calamendo, uel de nepita, uel mentha coctis cum melle: ita tamen, ut septem partes sint aqua, & nouem mellis. Et sepe balneum est intrandū. Et post balneum bibat de Diatesarōn, cum decoctione mellis & aque. Conferunt etiam omnia diuretica, ut foeniculus, spica, apium, cuminum, ameos, carui, petroselinum, & similia. Hæ omnes herbe, uel singulæ, in uino coctæ, uel cum melle, & potatæ conferunt. Galenus sic docet. Artemisia trita cum uino, uel in eo cocta, & potata multum confert. In balneo non modicum iuuat, si bibatur nepita, uel in ipso balneo coquatur: uel uiridis trita ligetur super uentrem, uel sub umbilico, uel super umbilicum. Vel decoquatur in olla, & mulier supponat sciam perforatā, & desuper sedeat cooperta undique, & per calatium, uel embotum fumus exeat: ut is introceptus, penetret ad matricem. Valet etiam artemisia cum his herbis admixta: thapsia, fiseleos, salvia, origanum, cuminum, ameos, sauina, melissa, pulegium, anethum, betonica, anisum, satyria, leuisticum: quæ omnes, uel quædam ex eis decoquantur in aqua: & impleatur sacculus unus lana minutissime carpinata, ut sit in modum puluinaris: & intingatur in illa aqua, & calidus uentri apponatur: & hoc fiat frequenter. Item Puluis optimus ad prouocanda Menstrua. Recipe flammula, cicuta, castorei, artemisia, centonice, myrrha, centaurea, salvia ana, fiat puluis, & detur drac. I. cum aqua decoctionis sauinæ & myrrhæ: & in balneo bibat, & detur una uice scrup. I. Si autem Matrix indurauerit, adeo ut istis adiutorijs non possint educi menstrua, Recipe fel tauri, aut aliud fel, & puluerem nitri, & cum succo apii, uel hylopi misceantur: & intingatur ibi lana carpinata: & post prematur ut sit dura, rigida, & longa, ut in uulnam possit immitti: & intromittatur. Aut fiat aliud pessarium in modum uirgæ uirilis: & sit concavum: ibique imponatur medicina, & iniiciatur.

De paucitate Menstruorum, Cap. II.

MULIERES autem quædam sunt, quæ cum ueniunt ad tempus Menstruorum, nulla, uel modica habent. Quibus sic subuenias: Accipe radices salicis rubens, de quibus ligantur dolia, & bene ab exteriori cortice munda, & pista: & eas pistatas cum uino, uel aqua, decoquendo distempera, & mane de ista coctione da ad potandum haustum tepidum. Si uero grauius laborat, tunc dabis ei cibum istiusmodi factum. Rubeam maiorem, & maluam teras: & cum farina hordei, & albumine ouorum misce: & inde fac crispellas. Valent etiam huiusmodi herbe suffumigare ad prouocanda menstrua. Vel ad idem accipe uerbena, rutam, & pista fortiter, & coque cum larido: & da patienti ad comedendum. Postea radicem salicis subtilis, & radicem rubee maioris tere, & da succum patienti cum uino. Mulieres item si pauca habent Menstrua, & cum dolore ea emittunt, Recipe betonica, pulegij, centonice, artemisie ana M. I. decoquantur in aqua, uel uino usque ad consumptionem duarum partium. Postea fiat colatura per pannum, & bibatur cum succo fumi terre. Si uero diu defecerint Menstrua, Recipe rheupontici drac. II. artemisie sicce, piperis, ana drac. I. & fiat inde puluis: de quo bibat mane & sero per tres dies: & cooperiat se, ita ut fudet. Item Recipe mentha, pulegij, rutæ ana M. I. salis gemmæ, drac. III. plantæ caulis ribeæ M. V. & tria capita porri. Hæc omnia coquantur simul in olla rudi: & bibat in balneo. Aliud, Recipe radicem ireos, leuisticum, herbam nepitam, coloquintidam, foeniculum, rutam: coquantur in uino, & illud uinum potui detur. Vel decoquantur in uino, sauina, apium, foeniculus, petroselinum, leuisticum, nepita: & bibatur. Item Recipe tanacetum, trifolium, artemisiam: frixa cum butyro, & pone super umbilicum. Medicus quidam in regione Franciæ sic fecit: Recipe zinziber, folia lauri, & sauinam: trita simul in olla rudi, ponantur super carbones uiuos in sede perforata, & desuper sedeat mulier, & fumum recipiat per inferiora: & sic menstrua redibunt, fiat ter, uel quater, uel pluries. Mulier autem quæ huiusmodi fomenta frequentat, uulnam suam ab intra inungat unguentis frigidis, ne nimis calefiat. Valet etiam ad prædicta fumigatio de cimini, foeniculo, anetho, calameto, mentha, urtica, omnibus simul commixtis, uel simplicibus. Valet ad idem scarificatio, & similiter coitus. Nocet autem minutio facta in manu. Comedat, si sit sine febre, porros, cepas, piper, allia, cuminum, pisces squamosos: & uinum forte bibat, si sit sine dolore capitis, & sine defectione neruorum, & sine febre, quia in omni febre nocet uinum.

De nimio fluxu mēstruorum. Cap. III.

SVNT & aliz Mulieres prædictis contrariæ: quæ habent mēstrua inordinate fluentia: quibus hoc modo succurras. Accipe folia ueteres, & pulueriza: & folia lauri fac decoqui: & his decoctis fiat suffumigium. Vel accipe cineres calidos, & misce cum uino rubeo calido, & cōfice in modū pastæ: & malaxa, & inde accipe ad modum cunei mediocri, & inuolutum panno lineo nouo impone adhuc tepidum. Vel accipe saluam, & camphoram: pista fortiter, & fac crispellas cum uino, & coque super tegula: & da patienti ad constringenda mēstrua. Postea accipe semen urticæ, & cornu cerui, & da patienti puluerem inde factum, ad bibendum cum uino. Restringit etiam hoc aliud remedium, quod sic fit. Accipe cornu cerui puluerizatum cum cinere urticæ mortuæ, & distempera cū aqua pluuiali: & da bibere, non omitrendo prædictum suffumigium: quod confortat matricem frigidam. Confortantur etiam isto fumigio. Recipe spicæ nardi, carioph. nudes muscatæ ana, puluerizata prouiciantur super prunas. Valent & ceteræ purgationes quas diximus. Abundant quoque mēstrua præter naturā. Quod contingit, quia uenæ matricis sunt amplæ, & apertæ. Vel quia quandoque crepantur, & fluit inde sanguis in multa quantitate: & apparet sanguis fluens rubens, & clars: Quia ex multitudine cibi & potus generatus est sanguis multus, qui cū non possit intra uasa contineri, prorumpit extra. Vel contingit quandoque propter nimiam sanguinis calefactionem, ex cholera redundante ex felle, quæ facit sanguinem ebullire: adeo, ut non possit in uenis contineri. Vel quia phlegma salum admiscetur sanguini, & ipsum attenuat, & à uenis facit prorumpere extra. Si sanguis, qui egreditur, sit citrinus, aut uergat ad citrinitatem, ex cholera contingit. Si ad albedinem, ex phlegmate. Si ad ruborem, ex sanguine. Huiusmodi ægitudines emergunt, propter humores interius corruptos: quam corruptionem natura designatur sustinere. Quandoque contingit propter diarrhoeam: ex qua sæpissime sequitur mors. His de causis mulier discoloratur, & macrescit: & si diu durauerit, in hydropsim de facili conuertitur. Epatis enim substantia in frigidatur, propter subtractionem sanguinis, per quem deberent mēbra in suo calore naturali conseruari. Vel quandoque accidit, propter defectum caliditatis succositate digerere nequeuntis, & debito modo humores commutare non ualentis. Si ergo sanguis est in causa, minuendus est de manu, uel brachio, ut sanguis sursum prouocetur. Sumendum est etiam aliquod leue castoricum. Si cholera sit in causa, quæ à felle redudat, detur frusta Saracenica, & rosata nouella cum succo uolarum, & scariolæ. Si contingat ex abundantia phlegmatis & cholæ nigræ, detur aliqua hierarum cum aqua calida, uel uino, secundum alios, & bibat. Post purgationem uero apponenda sunt quædam constrictiua exterius & interius, quæ constringant. Potest ergo aquam, in qua coctæ sint cortices mali granati, psidia, flores rosarum rubearum, gallæ, nux mīscata, folia quercus, bedegar, rubus, agrimonia, plantago. Hæc omnia immixta, uel simplicia iuuant. Post cibum, uel inter cibaria detur eis puluis lapidis hematitis cum aqua pluuiali distemperatus ad potandum: uel puluis coralli, & gummī, balaustiar, seminis myrti, portulacæ, boli armeni: & puluis de cornu cerui, plantaginis, cennodii, sanguinis draconis, spodii, seminis citoniorum. Comedat gallinas coctas in panē, pisces recentes in aceto coctos, panem hordeaceum. Bibat ptisanam de hordeo factam, in qua primitus coquatur radix plantaginis & bulliat cum ptisana, & melius erit. Postea bulliat in aqua marina donec crepat, & corrumpetur: & apponatur acetum, & coletur per pannum, & detur ad potandum. Bibat etiam uinum rubeum cum aqua marina lymphatum. Ponantur quoque uentosa ignitz inter mammillas, quæ sanguinem superius trahant. Iniciatur succus plantaginis per pessarium. Valet etiam succus semperuiuz, si cum uino bibatur albo. Similiter succus persicæ ualeat super uentrem linitus. Item accipe duo frusta laridi lata cum super umbilicum, & alterum super renes. Fiant etiam duo emplastra de absinthio cum axungia, & ligentur super renes, & uentrem: quibus si addantur folia myrti trita, melius erit. Aliud. Accipe testas nucis maioris, & fac puluerem, & da in potu cum aqua marina. Postea fac emplastrum de stercorebus ouium, uel ea tres dies cum aqua tepida, quantum poteris leuare cum duobus digitis.

De suffocatione matricis. Cap. IIII.

QUANDOQUE suffocatur Matrix: quandoque uidelicet sursum tollitur, unde prouenit subuerfio stomachi, & appetitus debilitatio ex debilitate cordis. Quandoque patiuntur syncopen, & ita euanescent pulsus, quod penitus non sentitur: ex eadem causa. Quandoque Mulier contrahitur, ita quod caput iungitur genibus, & uisu caret, & uocis officium amittit, natus distorquetur, labia contrahuntur, & dentes strigunt, & pectus sursum præter solitum eleuatur. Galenus refert de quadam Muliere, quæ ita patiebatur, & amiserat pulsum & uocem, & erat quasi defuncta: quia exterius nullum signum uitæ apparebat: sed tamen circa cor natura adhuc parum caloris retinuerat. Vnde quidam iudicabant eam mortuam. Galenus uero lanam bene carpinatam naribus & ori eius apposuit, cuius motu eam uiuam recognouit. Contingit autem hoc Mulieribus, quia sperma nimium corruptum abundat in eis, & in ueneno sam naturam conuertitur. Et præcipue accidit illis, quæ uiris non utuntur, maxime uiduis, quæ antea cōsueuerunt uti

caruali commercio. Virginibus etiam solet euenire, quæ ad annos nubiles perueniunt, & uiris uti non possunt: cum in eis maxime abundet sperma, quod per Masculum natura uellet educere. Ex hoc autem semine superabundante, & corrupto, quædam humilitas frigida dissoluitur, & ascendit ad partes quasdam, quæ à uulgo Collaterales dicuntur: quia cordi & pulmone sunt uicinz, & cæteris instrumentis uocalibus, unde solet fieri impedimentum uocis. Huiusmodi morbus solet etiam principaliter oriri ex defectu menstruum. Ideo cum deficiant menstrua, & semen superabundet, tanto molestior & prolixior est ægrotudo, magis quando partes occupat altiores. Summum igitur remedium est, ut manus & pedes mulieris moderate fricentur cum oleo laurino, & naribus applicentur ea, quæ sunt grauis odoris, ut galbanum, opopana cum castoreum, pix, lana combusta, pannus lineus combustus, & pellis combusta, & asa fortida. Sed tamen oleis & unguentis, quæ sunt odoris aromatici, debent uulue earum inungi intus & extra: qualia sunt oleum muscellinum, & oleum nardinum, sed super omnia melior est inunctio facta cum zibeto. Hæc enim menstrua attrahunt, & prouocant. Præterea apponantur uentose in inguine, & pectine. Item in sero accipiat diaciminum cum succo apij, uel nepite, uel cum syrupo de calamento. Vel Recipe castorei, pipere albi, costii, menthe, apij, ana drach. I. terantur, & distemperentur cum uino albo uel dulci, & da sero drach. III. Iustianus Medicus, contra hunc morbum præcipit quiniū deficcari, & in potu dari drach. I. uel cochlearia duo. Præcepit etiam uulpis priapum, uel caprioli accipi, & inde fieri puluerem, & per pessarium iniici. Ad idem multum ualet radix leuistici cocta & trita cum axungia, & ligata super umbilicum.

De descensu Matricis. Cap. V.

SI contingat post partum Matricem nimis de loco suo descendere inferius, calefiat auena prius humectata, & saccellata apponatur. Mouetur autem quandoque Matrix de loco suo, & quandoque descendit, & quandoque per uuluum egreditur foras. Et hoc contingit propter neruorum remolitionem, & frigidorum humorum abundantiam. Huiusmodi uero remolitio & infrigidatio contingit ex aere frigido per officina matricis subintrante, ut quando mulier delecta se directe opposuerit aeri frigido. Vel si super lapidem frigidum diu sedeat. Quandoque contingit ex balneo aquæ frigidæ, quia per hoc debilitatur matrix, ideo exit de loco suo. Interdum etiam contingit conatum pariendi. Si descendit, & non exit foras, apponenda sunt naribus aromatica, ut balsamus, muscus, ambra, spica, storax, & similia. Sed inferius fumigetur rebus fortentibus, ut est pannus lineus combustus, & similia. Fomentetur umbilicus, lana, uino & oleo infusa. Si uero Matrix exierit, distemperentur aromatica cum succo absinthij, & ex eis inungatur uenter cum penna. Postea Recipe Rutæ, castorei, ætheris ana partes equales, & decoquantur in uino usque ad consumptionem duarum partium: deinde da in potu. Saccelletur uenter & umbilicus de frumeto cocto. Postea Matrix egressa, manu apposita restitatur usque ad locum suum concussa. Postea Mulier intret aquam, in qua cocta sunt balauftia, rosa, cortices mali granati, galla, sumach, myrtilli, glandes, folia & cortices quercus, & nuces cupressi, & lenticula. Deinde fiat stupha, quæ multum ualet, quia Galenus præcepit eis facere stupham de buxo posito in olla super carbonibus uiuos: & Mulier sedeat desuper cooperta, & fumum intra se recipiat. Dieta sit frigida & stiptica sine cumino, pipere, & sine omni acumine. De fructibus comedat coctana, mespila, forba, mala æcra, & similia. Bibat uinum temperatum stipticitate participans. Experimentum probatissimum ad Matricem egressam. Recipe pulueris de corde cerui, foliorum lauri, ana drach. I. myrrhæ, scrup. I. distemperentur trita cum uino, & dentur potanda: & sic Matrix reuertetur in suum locum.

De motu Matricis ex suo loco, quæ tamen non eleuatur, neque deprimitur. Cap. VI.

ALIQUANDO mouetur Matrix de loco suo, non tamen sursum eleuatur uersus spiritalia, nec per officium egreditur foras, neque descendit. Cuius signum est: quod Mulier sentit dolorem in sinistro latere, menstruum retentionem, distorsionem membrorum, difficultatem mingendi, torsiones, & rugitus uentris. Accipe ergo e contra apium, & fornum græcum & trita cum uino da potui. Aliud. Recipe agniscum, semen plantaginis, atque satureiz: pulueriza, & da in potu cum uino, uel melle cocto. Ad hoc ut uulua non moueatur de loco suo, & ut nulla duritia molestetur. Recipe medullæ cerui, adipis anserini, ceræ rubræ, butyri, ana unc. II. quibus addendo fornum græcum, semen lini, coquantur in aqua ad lentum ignem usque ad plenam decoctionem, & iniiciatur per pessarium. Istud enim est utile contra plures morbos oris Matricis.

De nimia caliditate Matricis. Cap. VII.

CONTINGIT quandoque matricem distemperari in caliditate, ita quod maximus ardor & calor ibi sentiat. Cura hoc modo. Recipe opij scr. I. adipis anserini scr. I. ceræ, mellis, ana scr. III. olei unc. I. albumina duorum ouorum, & lac Mulieris: commisceantur, & iniiciantur per pessarium.

De Apostemate Matricis. Cap. VIII.

QUANDOQUE nascuntur in Matrice inflationes, & apostemata diuersi coloris. Si à felle exiēs cholera

lora causa est apostematis, sicut febre habet & cancer. Si à frigidis humoribus causa fuerit, tumidum & durum est apostema, & sentit Mulier in coxis, anchis, & tibijs grauedinem cum multo dolore. Aliquando nascuntur ibi apostemata ex uentositate, uel scitu, uel alijs lesionibus. Vel ex eo, quod nunquam menstrua deficiunt. Si nascuntur in eminentiori, uel anteriori parte Matricis, dolor sentitur circa uuluum, & inde nascitur stranguria. Si apostema fuerit interius in orificio matricis, dolor sentitur circa umbilicum, & renes. Si in parte posteriori, dolor sentitur in dorso sub costis, & uenter constipatur. Si de sanguine, uel cholera rubra sit natum apostema: febris adest continua, uel acuta, sitis, & dolor nimius. Si ergo sit de calida causa, expedit, ut ungantur Muliebria, & trahatur sanguis à uena, quæ cadit sub pede (sicut asserit Galenus) non de manu. Quia nocuum esset in passionibus matricis sursum trahere sanguinem, auferrentur enim menstrua. propterea ab inferiori parte trahatur sanguis iuxta uirtutem patientis. Et si fortis fuerit Mulier, ut possit sustinere, bis in die minuiatur. Postea accipiat in potu aquam eorum, quæ mitigant caliditatem. ut est succus morellæ, plantaginis, semperuiuæ, cassiaginis, mandragoræ, & similia. Fiat etiam emplastrum, quod mitiget dolorem, & confortet uirtutem. ut de succo portulacæ, semperuiuæ, psyllæ, plantaginis, scariolæ, & oleo rosato. Postea apponantur maturatiua, ut semen lini cum butyro, malua, & foeniculæ, cocta cum adipe anseris, uel gallinæ, albumen oui, melilotum. De his simplicibus, uel compositis fiat pessarium. Item dicit Galenus, quod multum prodest sedere in aqua, ubi cocta sit spica. Paulus docet fieri pessarium ad duriciem Matricis, & in uersionem eiusdem, & inflationem, & uentositatem à corpore eiciendam. Recipe medullæ uituli, adipis caponis, meliloti, taxonis ana ad pondus XII. denariorum. medullæ cornu cerui, scr. III. adipis anseris, gallinæ, ana drac. II. mellis drac. II. hyssopi, ceroti ad pondus VII. denariorum. Omnia terantur, & commisceantur, & distemperentur cum lacte mulieris, & oleo rosaceo, & iniiciatur per pessarium, & fiat inde emplastrum. Si frigidum sit, & generatum ex grossis humoribus, Recipe foenum græcum, melilotum, semen lini, & rutam: coquantur in aqua, & de substantia fiat emplastrum, & succus pessarietur. Sæpe utatur balneis & emplastris. Dicta sit subtilis, ut grossities humorum attenuetur. Et si ad saniem uolueris apostema ducere, apponantur maturatiua, & cutem rumpentia, ut sanies effluat. sicut semen lini, foenum græcum, farina hordei, cocta simul cum farina tritici, uel fabæ cum fimo columbarum syluestrium coctæ. Si autem apostema crepuerit, & sanies inde effluerit in uescam, bibat lac caprinum, uel asininum: & fiat pessarium de pilisana, & melle, & iniiciatur in matricem.

De Viceribus Matricis. Cap. I. X.

VLCERATUR quandoque Matrix de acumine medicinarum, uel materiarum. Quandoque ab exortu. quod cognoscitur per saniem egredientem, & dolorem, & punctiorem matricis. Si uulnera sint ex sanie, uel corrosione uenæ, sanies uergit aliquantulum in nigredinem cum foetore horribili. Primo ergo debent apponi mundificatiua saniei, & dolorem mitigantia. ut est succus morellæ, & plantaginis, cum oleo rosaceo, & albumine oui, cum lacte mulieris, & cum succo portulacæ, uel lactucæ, quæ sint frigidae nature. Dicta sit frigida. Balneetur in aqua, ubi cocta sint rose, myrtus, foenum græcum, psidia, lenticula, galla, balustia, & similia. Si uero uenæ putrefactæ sint, detur sanguis draconis, uel myrrha, uel bolus, uel thus, uel aristolochia longa. & de his simplicibus, aut compositis fiat clystere, uel pessarium. Nec minus ualet acacia, cum lino per pessarium injecta.

De Pruritu Vulue. Cap. X.

PRURITVS Vulue si fuerit, accipe camphoram, lithargyrum, baccas lauri, & albumen oui, & fiat pessarium, uel clystere. Galenus dicit, quod pulvis foenugræci cum sanguine anseris, ualet ad duriciem matricis: sicut testatur Hippocrates.

De impedimento Conceptionis, & de his quæ faciunt ad imprægnationem. Cap. XI.

QUAEDAM Mulieres sunt inutiles ad concipiendum: uel quia nimis tenues sunt & macræ: uel quia sunt nimis pingues, in quibus caro circumuoluta orificio matricis, constringit eam, nec permittit semen uiri in ipsam intrare. Quædam habent matricem ita lenem & lubricam, quod semen receptum nequeat in ea retineri. Quod contingit quandoque uitio uiri, qui habet semen nimis tenue, quod infusum matrici, liquiditate sua foras labitur. Quidam etiam uiri testiculos habent ualde frigidos, siccos: illi raro, aut nunquam generant, quia semen eorum est inutile generationi. Manifestum est igitur, quod Conceptio impeditur tam uitio uiri, quam mulieris. Si uitio mulieris, hoc dupliciter contingit. Vel ex nimia matricis caliditate, uel humiditate. Matrix enim quandoque sua lenitate præter naturam sperma injectum retinere non potest. Et quandoque præ nimia sui humiditate sperma suffocat. Et quandoque ex nimia caliditate matricis semen comburent, nequit concipere. Si ergo præ nimia caliditate & siccitate matricis mulier non posset concipere, hæc erunt signa. Labia uulue apparent ulcerata, & tanquam boreali uento excoxiata cum maculis rubris: adest & sitis assidua, & casus capillorum. Hæc ergo cum uideris, & mulier 30. annos habuerit, incurabilem iudicauimus. Si autem fuerit iuuenula, neque passio

diurna, sic ei subuenias. Accipe maluam, artemisiam, & in aqua decoque, & cū tali decoctione ter nel quater fumiges patientem: inter quas fumigationes, suppositoria, & etiam pessaria uuluz cum oleo muscelli no, & modico musco facies, ut matrix confortetur. Sed in die septimo post purgationem, uel fumigationem factam, accipe de Trifera magna ad modum glandis, & inuolue in bombace, & inde suppositorium facies uuluz, ut beneficio talis suppositorij & tot fumigationibus recipiat aliquam confortationem, lenitatem & lanuginem. In sequenti uero die eam facies cum uiro coire. Eadem quoque cura sequenti septimana, si expediat, utaris, faciendo suffumigationes prædictas, & alia, ut diximus, beneficia adhibendo. Hoc facies, quousque prædicta symptomata remittantur, & eā bis, uel ter facies coire in hebdomada, quia sic citius poterit impregnare. Si uero præ nimia humiditate matricis concipere non possit, hæc erunt signa. Oculos habebit lacrymosos assidue. Cum enim matrix trebro per nervos alligata sit, necesse est, ut cerebrum matrici compatiatur: unde si matrix nimiam in se habet humiditatem, ex ea cerebrum impletur, quæ ad oculos redundans, eos inuoluntarie cogit emittere lacrymas. Et quod cerebrum matrici compatiatur, signum est alienatio matricis ex menstruum retentione. Purgetur ergo in primis cum Theodoricon eruptio. Tumque tres uel quinque pilulas de eodem Theodorico, uel Paulino præcipimus fieri, etiam in bombace, ne dissoluantur, inuolui, & quantum prudenter possibile per pudenda intro mitti. Si uero matrix non bene purgata fuerit, in alio die eodem modo pessarium de Trifera, cum modico musco ei facies. Et hoc tam diu continuabis, donec à superfluitate, humiditatem euacuatam cognoueris. Et postea accipe parum de musco cum oleo muscatellino, uel alio odorifero: quod iterum per uuluum intromittatur. Et si bene purgata fuerit, sentiet odorem in ore: unde si quis eam osculetur crederet eam muscum in ore tenere. Item si sitim propter hanc purgationem habuerit, scias eam bene purgatam esse: quare ita purgata frequenter coeat, & concipiet. Quod si uitio uiri impediatur conceptio, sit hoc aut defectu spiritus spermæ impellentis, aut defectu spermaticæ humiditatis, aut defectu caloris. Si ex defectu caloris, signum est quod non appetit coitum. Vnde oportet talibus renes inungere cum aragon. Vel accipe semen crucæ, & euforbium, & in puluerem subtilem redige, & cum oleo muscatellino, & pulegino misceas, & inde renes inungas. Si autem fiat defectu spirituum, signum est, quia appetit, sed non engitur uirga. Cui succurrimus cum unguento multorum spirituum generatio. Si uero defectu spermatis, signum quia cum coit, nihil aut parum feminis emittit. Huic subuenimus cum augmentantibus & generantibus spermæ, ut sunt cepæ, passinacæ domesticæ, & similia. Si mulier fuerit sterilis, aut uir, hoc modo percipies. Accipe duas ollas, & in utranque pone cantabrum, & in unam earum cum cantabro infundas de urina uiri, & in alteram de urina mulieris: & sic ossa permittantur per nouem, uel decem dies. Et si sterilitas sit uitio Mulieris, inuenies uermes multos, & cantabrum foetidum in eius olla. & contra habebis indicia similia ex altera urina si sterilitas sit uitio uiri. Si uero in neutra urina talia signa uideris, nenter erit in causa sterilitatis: ideo tunc poterunt medicinæ beneficio adiuari ut concipiant. Vnde si uolunt concipere masculum, uir accipiat matricem & uuluum leporis, & faciat exiccare, & puluerizatum distemperet cum uino, & bibat. Similiter mulier faciat de testiculis leporis, & in fine menstruum iaceat cum uiro suo, & tunc masculum concipiet. Aliud remedium est. Accipiantur par & testiculi parui porci, quem solum scropha edidit, & siccentur: fiat inde puluis, & detur in potu masculino uel mulieri non potentibus generare, & concipient. Item si Mulier uult impregnari accipiat testiculos uerris, uel apri, & faciat deficcari, & in puluerem redigi de quo Mulier cum uino bibat post purgationem menstruum: deinde coeat cum uiro, & concipiet. Nota, dicit Galenus, quod mulieres, quæ habent uuluas angustas, & matrices strictas, non debent uiris uti, ne concipientes moriantur. Sed cum non omnes illæ possint abstinere, indigent nostro auxilio. Ideo si illarum quædam ob periculum mortis non auderet concipere, illa secum carne nuda ferat matricem capræ, quæ nunquam habuit foetum. Inuenitur lapis quidam dictus Gagates, qui gestatus in collo, uel etiam gustatus, prohibet conceptionem: Item accipe mustelam masculinam, & auferantur ei testiculi, & relinquatur uiuus: hos testiculos ferat secum Mulier in sinu suo, & liget eos in pelle asinerina, uel in alia pelle, & non concipiet. Si autem læsa fuerit in partu, & præ timore mortis non uult amplius concipere, ponat in secundina tot grana cataputæ, uel hordei, quot annis uult sterilis permanere. Et si in perpetuum uult sterilis permanere, plenam manum imponat.

De formatione Seminis concepti. Cap. XII.

PRIMO mense fit purgatio sanguinis. Secundo fit expressio sanguinis & corporis: tertio, unguis & capillos producit. Quarto, motum: & ideo nauseant mulieres. Quinto accipit fortis similitudinem patris uel matris. Sexto, nervorum constructionem. Septimo, ossa & nervos confirmat. Octauo, mouet natura, & infans rerum beneficio repletur. Nono, à tenebris procedit in lucem.

De situ Foetus in utero matris. Cap. XIII.

REFERT Galenus, quod ita ligatur foetus in matrice, sicut fructus in arbore: qui cum procedit à flore, tenerissimus est, & ex qualibet occasione corruit: sed cum adultus fuerit, & aliquantulum maturior, & firmatus adhæserit arbori, non de leui occasione corruit. Cum autem totaliter maturior fuerit, per se, & non alia occasione decideret. Sic cum primo educitur infans ex semine concepto, tenera & non firma sunt eius ligamenta, quibus alligatur matrici, & ideo de leui emittitur per abortum. Vnde Mulier propter

propter tussim, diarrhoeam, uel dysenteriam, uel motum nimium, uel iram, uel mutationem sanguinis potest totum amittere. Cum uero inbula est anima in puero, paulo firmitus adheret, neque cito labitur. Sed cum puer maturauerit, naturæ officio cito educitur. Vnde Hippoc. dicit, quod si mulier indigeat purgatione uel minutione, hæc non facias ante quartum mensem: sed in quinto, uel sexto potest purgari, uel minui, si necesse fuerit: sed tamen moderate cum cholagoga, uel apozimate, cum cautela, prout uirtus patientis poterit pati: ultra uero, & ante hoc tempus, periculosa erit euacuatio. Maturato tandem tempore partus, puer mox se uehementius, & nititur ad egressum: cum ipsius temporis natura uuluum aperiri facit: ut foetus inueniat sui exitus libertatem: & ita foetus, de cubili suo, scilicet de secundina, naturæ uigore expellitur.

De signis Impregnationis. Cap. XIII.

Ad cognoscendum, utrum mulier gesserit masculum, uel foeminam, accipe aquam de fonte, & mulier extrahat duas uel tres guttas sanguinis, uel lacus de dextro latere, & infundantur in aquam: & si fundum petant, masculum gerit: si supernatant, foeminam. Vnde dixit Hippoc. mulier quæ masculum gerit, bene colorata est, & dextram mammillam habet grossiorem: si pallida est, gerit foeminam, & sinistram mammillam habet grossiorem.

De Regimine pregnantium. Cap. XV.

MULIER quando incipit impregnari, cauendum est, ne nominetur, coram ipsa quod non possit haberi. quia si postulauerit, & non detur ei, dat occasionem abortiendi. Quod si appeteret argillam uel cretam, uel carbones, dentur ei fabæ coctæ cum zaccaro. Instante autem tempore partus sæpe balneanda est mulier: & iungatur uenter eius cum oleo oliuarum, uel cum oleo uiolarum: & comedat cibos leues, & digestibiles. Si uero pedes eius tumuerint, iungantur cum oleo rosaceo, & aceto. Et post cætera cibaria comedat uolaria, citonia, mala granata. Et si uenter eius uentositatem distendatur, accipe seminis apij, ameos, methæ, ana drac. III. masticis, garyophylorum, cardamomi, radicis rubæ maioris, ana drac. III. castorei, zeribariæ, ireos, ana drac. II. zucc. drach. V. fiat puluis subtilissimus, & conficiatur cum melle: & dentur ei scrup. III. cum uino: hoc enim materiam aufert uentositatem, & abortum prohibet, si prout decet, recipiatur.

De Regimine parturientium. Cap. XVI.

TEMPORE partus imminente, parat se mulier, ut mos est, Obstetrix similiter. Fiat quoque cum magna cautela sternutatio, confectis naribus & ore: ut maxima pars uirtutis & spirituum tendat ad matricem. Deinde detur ei decoctio foenigraci, muscilago lini, & psilij, uel parum theriacæ, uel diateffaron cum decoctione artemisiæ in uino. Itē de galbano cum asa foetida & myrrha, uel ruta fiat troiscus, & inde fiat fumigium ad nares. Super omnia caueat sibi à frigore. Et non fiat suffumigatio aromatica ad nares, sed ad orificium matricis tutius potest apponi. quia matrix sequitur odorifera, & fugit foetida. Ad hoc ualent species odoriferae, ut muscus, ambræ, lignum aloes, & similia pro diuitibus: item & herbe odoriferae, ut metha, pulegium, calamentum, origanum, & similia pro pauperibus. Notandum, quod sunt quædam physica remedia, quorum uirtus est nobis obscura, quæ ab Obstetricibus facta proferuntur. Teneat ergo patiens magnetem in manu dextra, & confert. Item rasuram eboris bibat. Item corallus in collo suspensus prodest. Similiter album illud quod inuenitur in stercore accipitris, datum in potu confert. Item in uentre hirundinis, siue in uido inuenitur lapis primogeniti, cuius lotura ad idem ualet, & ad alia multa.

De difficultate Partus. Cap. XVII.

SUNT autem quædam mulieres ita angustiosæ in officio partus, ut uix, uel nunquam se expediant: quod ex diuersis causis solet provenire. Quandoque enim calor extraneus superuenit circa interiora: unde ipsæ nimis angustiantur in partu. Quandoque nimis paruus est exitus matricis: uel quia nimis pinguis est mulier: uel quia foetus est mortuus non uiuans naturam in suo motu. Et hoc multum contingit mulieri iuueni parienti in heme: cum naturaliter habeat orificium matricis strictum, quod propter frigiditatem temporis & aeris plus constringitur. Quandoque ab ipsa muliere, calor totus exhalat. unde sine uiribus relinquitur, ideo deficit in expediendo se à partu. Primo ergo si acciderit difficultas partus, ante omnia recurrendum est ad Deum, deinde ad inferiora descendendo, expedit mulieri difficile parienti, balneari in aqua, ubi coctæ sint malæ, foenum græcum, semen lini, & hordeum. Inungantur latera, uenter, coxæ, & ilia cum oleo uiolarum, uel rosarum. Fricetur fortiter, & detur ei in potu oxyzaccata, & puluere menthæ, & absinthij, drach. I. Prouocetur sternutatio cum puluere thuris naribus imposito, uel cum puluere cindisi, piperis, uel enforbij. Ducatur mulier lento passu per domum. Et qui assistunt, non respiciant eam in uultum: quia mulieres solent inde uerecundari in partu, & post partum. Si autem puer non egrediatur eo ordine, quo debet, ut si prius tibiz, uel brachia extant: assistit obstetrix cum parua & suauis manu, humectata in decoctione seminis lini, & foenigraci, reponendo puerum in locum suum, ordine recto. Si uero puer sit mortuus, accipe rutam artemisiæ, absinthium, piper nigrum: & hæc trita da in uino, uel aqua sibi cocti sunt lupini. Vel teratur satureia, & ligetur super uentrem:

& exibat foetus siue natus, siue mortuus. Idē facit uerbena potata cum uino, uel aqua, uel aceto. Vel accipiat aqua salsa, uel rosata, & lac alina ana, & detur ad potandum. Vel accipiat butyrum cum melle & uino, & detur ab bibendū. Quod si adhuc tardetur partus, uel si foetus mortuus sit in ea, & non liberetur: accipe rutā, artemisiā, opoponacū, absinthiū cum modico oleo, & pauco zucc. terātur, & ponantur super inguina, uel super umbilicū: & melius ualet. Itē cingatur mulier de spolio serpentis, de quo serpens exiuit. Idem operatur lapis Aëtites, ligatus ad femur. Vel alligetur radix cucurbitę renibus eius, & auferatur quā citō foetus exierit, ne Matrix exeat post egressum pueri. Pręterea difficulter parturiētibus subueniendum est hoc modo. Paretur balneū, & intromittatur mulier: & post exitum fiat fumigium de spica, & similibus aromatibus, ad confortandū & aperiendū. Fiat etiam sternutatoria de helleboro albo in puluerem bene redacta. Dixit enim Copho: cōquassentur membra, & rumpātur coryledones, & sic foetus egredietur. Itē his qui multum laborant, pariēdo foetum mortuum sic succurrendū est. Ponatur patiens in lintheamine, & rendatur ā quatuor fortibus hominibus per quatuor angulos, capite patientis aliquantulū eleuato, huc & illuc, ab oppositis angulis fortiter trahatur lintheamen, & statim pariet, Deo fauente. Si autem secundina intus remanserit, properandum est ut exeat. Prouocetur ergo sternutatio ore clauso, & naribus. Aut fiat lixiuium de cinere facto de fraxino, cui admiscendo pulueris seminis maluz, drac. i. detur ei ad bibendū: & statim uomet. Vel detur ipse puluis de semine maluz cum aqua calida: & si uomat, bonum est. Et suffumigetur subtus oculis de ossibus piscium salforū, uel de ungula caballina, uel de sterco: re cati, uel agni: ista enim secundinam educunt. Valet etiam decoquere semen lini in aqua calida, & dare ad bibendū. Idem facit bdellium cum uino. Si uero sanguis non exierit post secundinam, fiant ea quę dicta sunt ad menstrua prouocanda. Quod si contingat difficultas partus, ex constrictione orificij matricis, cuius cura grauior est inter omnes, ideo tale subiungimus consilium. Prouideat sibi mulier in tribus ultimis mensibus in dicta, ita ut utatur leuibus cibis & digestilibus, ut per ea membra dilatentur: qualia sunt uittella ouorum, carnes, & iuscula pullorum, & minorum auium, scilicet perdicum, phasianorum, & piscium squamosorum cum bono condimento. Fiat quē ei balneum sepius de aqua dulci, in qua si apponantur herbe molliciatuz, sicut maturz, & huiusmodi: & melius erit. Sed fugiat balneum aerium & stupham. Et cum de balneo exierit, inungatur unguentis calidis, ut oleo laurino, & oleo de semine lini, & axungia anseris, uel anatis, uel gallinaz: & hæc inunctio fiat ab umbilico inferius cum prædictis unguentis calidis.

De regimine infantis.

Cap. XVIII.

INFANTIS aures premende sunt statim: & hoc multotiens est faciendum. Postea obseruandum, ne lac subintret aures, aut nares, cum ablatur. Et ligetur umbilicus tribus digitis ā uentre mensuratis. Quia secundum retentionem umbilici erit uirga uirilis maior, uel minor. Et ut rectius loquatur, unge palatum cum melle, & nares cum aqua calida. Et factis unctionibus, semper mundificetur, & musti lagines semper emungantur & emundentur. Puer præterea sepe est fricandus, & quælibet eius membra in unaquaque parte fasciā sunt retinenda, & iungenda: & rectificanda sunt eius membra, caput uidelicet, frons, nares, uenter, & renes temperentur, ne multa ex eis exeat unctuositas, uel humiditas. Quod si aliquid istorum appareat, diutius ā solita fasciatione cogatur abstinere, & diutius dormiat. Postea uero in aqua calida balneetur, & ad suam consuetudinem reducat: & si opus, de medicinis saporiferis parum detur, ut dormiat. Cutis eius æqualiter est mouenda: quod etiam consuevit fieri post mammillarum susceptionem. In principio natiuitatis oculi cooperiendi sunt: & summo opere cauendum est, ne sit in loco tucido. Ante ipsum sint diuersæ picturę, panni diuersi coloris, margaritę. Coram eo cantilenę, & facilibus utendum uocibus, nec asperis uocibus cantandum, neque rauris, sicut bombardis. Postquam hora loquendi appropinquaret, nutrix eius linguam frequenter cum melle & butyro ungat. Et hoc maxime faciendum est, cum loquela tardatur. Ante eum frequenter est loquendum, et facilia uerba proferenda. Cum uero tempus natiuitatis dentium uenerit, gingiuaz singulis diebus cum butyro & axungia gallinaz sepe fricandę sunt, & aqua hordei liniendę, gula & sphondylia inungenda. Quod si uenter eius laxabitur, superponatur emplastrum, quod fit ex cinino, & aceto: & admisceatur zuccarum, gummi arabicum, bolus armenus, & similia. Si uero uenter constringitur, fiat ei suppositorium de melle, & bombace, & stercore muris, & supponatur. Cum tempus aduenerit, in quo comedere incipiet, dandę sunt infanti ludere, & de eis fugere, & aliquid transgigire. Caro, quę est in pectore gallinarum, & phasianorum, & perdicum est ei tribuenda. Et postquam bene capere corperit, mammillarum substantiam mutare incipiens, eas in nocte sugere non permittas. Ita & in die ordinate ducendus est, bene obseruando, ne tēpore calido ā lacte remoueat. Si unum membrum pueri sit maius alio, ad bonam habitudinem sic potest reduci, si talis dispositio fuerit recens, quia inueterata nullo modo reducit. Fomentetur ergo primo cum decoctione bręcę ursinę, radices althęę, soliorū apij, petroselinj, & marathri, diutius bulliēdo in aqua. & membrum patientis ponatur super uas, & cooperiatur panno linceo, ut sudet. Postea camomilla, & althea incoquantur, & in illa uiscositate malaxetur cera, & totū membrū inde cooperiatur. Postea ligetur fascia linea stricte, & ita membrum patientis sudet per noctem unam: manē uero fricetur, ut spiritus exeat, & fluat ad locum dolorosum. Quo facto, fricetur statim cum dialthea, ita composita, ut sint duę partes dialtheę & tertia

tertia de oleo laurino commisceantur, & unguatur membrum predicto modo ter uel quater in die. Tunc quoque accipe diacerasos, ceroneū, oxycroceum, & adiuuicē puluerizentur. Deinde decoquatur althea, & pulvis ille malaxetur cum illa uiscositare, quousque bene adhaereat: & membrum totum patientis cooperiatur, & fascia ligetur. Et sic fomentando, & emplastra ponendo poterit alleuari. Quibus factis, iungatur requies & otium, & utatur calida & humida dicta, optimo uino, & mediocriter rubeo, quod bibat quousque curetur. Insuper & balneo aquae dulcis utatur.

De electione Nutrici. Cap. XIX.

IVVENEM oportet esse nutricem clarum colorem cum albedine & rubore permixtū habentem, quae nō sit partui uicina, neque multum à partu remota. Nō sit maculosa. Nec infirmos, neque nimis grossas habeat mammillas: potius grossum & amplum: pinguis sit mediocriter, non comedat salsa, nec acuta, nec acetosa, nec styptica, nec porros, aut cepas: neque ceteras species quae admiscuntur cibarijs pro sapore, ut piper, allium, erucam: & precipue uitet allium, sollicitudinem ac sibi à menstruum prouocatione caueat. Et si lac minuatur, pulvis de farina fabarum, & similiter rīsi, & de pane simile cum lacte & zuccaro faciat, dentur ei ad sorbendum: quibus augumentetur lac in quantum decoctione parū de semine sceniculi admisceatur. Si autem lac eius fuerit grossum, nutrimentum ipsius subtiliandū erit, & ita etiam cogatur laborare. Cui insuper dādus est syrupus acetosus, & uinū subtile. Si uero lac eius fuerit subtile, nutrimenta sint grossa & fortia, et somnis utatur longioribus. Quod si uenter pueri solutus sit, dētur nutrici quae cōstipant.

De his, quae Mulieribus sepe post partum accidunt. Cap. XX.

ACCIDIT mulieribus sepe dolor post partum. Matrix tūc tanquā fera syluestris, propter subitā euacuationē quasi uagando huc & illuc declinat. Vnde uehementens efficitur dolor. Accipe ergo cimas sambuci, & tere: ac succo extracto, cum farina hordei, & albumine oui distempera, & inde fac crispellas cum sanguine ad comedendum: & uinum calidū in quo cinnum bullierit da ad bibendum. Vel si post partū matrix doleat, Accipe storacis, calamitae, thuris, seminis apij, ana drac. I. semen racemorum nigrorum, drac. II. ponantur super carbones uiuos, & suffumigetur, quia multum confert. Sunt quaedā quae ex gravitate partus incidunt in rupturam pudendorum. Vnde Recipe radicem consolide maioris exsiccatam, cinnum, & cinnamomum: fiat pulvis, & iniiciatur in uuluum, & consolidabitur. Item quibusdam mulieribus in pariete male accidit, propter defectum assistentium. Sunt enim quaedā, quibus uulua & anus fiunt unum foramen, & idem cursus, unde ibi exit matrix, & indurefcit. Quibus in reponendo sic subuenimus. Matrici uinum calidum apponimus, in quo bullierit butyrum, & diligenter fomentamus, quousque matrix efficitur mollis, et tunc suauiter eam reponimus. Postmodū rupturam intra anū et uuluum tribus locis, uel quatuor fuimus cum filo de serico: postea pannum lineū uulue imponimus ad quantitatem uuluae. Deinde per se liquida linimus, hoc enim facit matricem retrahere, propter sui foetore. Demum sanamus rupturam cum puluere facto de consolida maiori, & minori, & cinno. Huiusmodi autē pulvis superaspersendus est: & collocetur mulier in lecto, ita ut pedes altiores sint, & ibi omnes operationes suas per octo uel nouem dies faciat: & quantū necesse fuerit, māduca: ibi egerat, & omnia alueta faciat. Hanc praeterea oportet abstinere à balneo, usque quō uiderit, quod balneū sustinere possit. Debet quoque abstinere ab omnibus, quae tussim faciunt, & ab indigestibilibus.

Ad praedictum igitur periculum euitandum, eis in partu diligentissime sic prouidendum est. Praeparetur pannus in modum pileae oblongae, & ponatur intra ad hoc, ut in quolibet conatu eijciendi puerū, illud firmiter ano imprimatur, ne fiat huiusmodi cōtinuitatis solutio.

Sunt quaedā, quibus post partū retinetur secundina. Ad illius expulsionē accipimus succū porri, & distemperamus cum oleo pulegino, uel muscatellino. Vel damus succū boraginis ad potandum, & statim educitur, quia fortasse uomet, & ex conatu uomendi educitur, quia succus ille uim habet talē, quae sufficit ad eius expulsionem. Sunt quaedam, quibus muliebria uentum suscipiunt, qui inclusus dolorem & tumorem facit. Istas fomentamus cum decoctione sinapis, uel rapae. Quibus quandoque partes illae pruriant: quas scalpendo excoquant: unde quandoque oriuntur pustulae, quae maximam inferunt lesionem. Ideo partes illas unguamus cum unguento, quod ualet contra uisuras ex igne, uel aqua calida factis.

Vnde ad huiusmodi excoquantiones, Recipe pomum unum, bolum armenum, masticem, olibanum, oleum, uinum calidum, ceram & sebum. Et conficiamus sic. Pomum mundatum ab interioribus & exterioribus corticibus, tritum ponimus ad ignem in olla cum oleo, cera, & sebo: & cum bullierit, masticem, & olibanum puluerizata imponimus. Postea facimus colari per pannum. Notandum, quod si aliquis propter uisuram hoc unguento unctus fuerit, loco inuncto solum hedere coctum in uino, uel aceto, uel gladio solum debet superponere, hoc enim remedium est honestum. Idem uentus per uuluum ingressus, ut supra diximus, & receptus in dextram partem, uel sinistram matricis, tantam generat uentositatem, quod quasi rupta uel ita appareat. Vnde communiter Trotula uocata fuit, quasi magistra operis. Cū enim quaedam puella debēs incidit propter huiusmodi uentositatē, quasi ex ruptura laborasset: cum eam uidisset Trotula, admirata fuit quamplurimum. Fecit ergo eam uenire in domum suam, ut in secreto cognosceret causam aegritudinis. Qua cognita, quod non esset dolor ex ruptura, uel inflatione matricis, sed ex uentositate: fecit hoc modo ei fieri balneum, in quo coquebantur malua & paritaria.

& eam intromisit : ac eas partes frequenter & satis planè tractauit mollificando : & diu fecit eam in balneo commorari : & post exitum à balneo faciebat ei emplastrum de succo rāpi barbari, & rapultri, & farina hordei : & totum illud ad ipsam uentositatem consumendam calidum apposuit : & iterum balneo predicto insistere fecit, & sic curata remansit.

Quibusdam post partum accidit immoderatus fluxus sanguinis. Quibus subueniendo extrahimus succū artemisiæ, saluiz, pulegii, perficariæ, & aliarum herbarum huiusmodi. & facimus crispellas, damus ad comedendum : et collocamus eas frequenter ad balnea : & hoc modo restringendo sanguinē eis subuenimus.

Vel aliter. Accipe argillam, & distempera cum aceto : & fiat emplastrum ad par in dextro latere. Et si fluxerit sanguis per nares, de hoc emplastro ponimus supra frōtem, & tempora, ex transuerso tempora & frōtem attingendo. Et nota, quod fluxus per nares non fit nisi quando peperit filium.

Sunt & aliz quæ laborant exitu Matricis post partum. Quibus bene succurrendo, Recipe artemisiam, pulicariam, iuniperum, camphoram, absinthium : decoquantur in aqua : & fiat balneum in quo sedeat usque ad mammillas.

Postea suauiter ponatur ad lectum : & iaceat suspensa piliis, ut matrix conuertatur in locum suum. Intromissaque matrice, Recipe puluerem pulegii, galangæ, spicæ nardi, nucis muscæ, garyophyllatæ : misce, & distempera cum oleo muscellino uel pulegino.

Et accipe pannum lineum ueterem, rariū, & subtilem, & intus liga hos pulueres, formando ad modum pilæ. Et matrice intromissa, os uuluz cum dicta pila obstrue, ut matrix iterum non exeat : & pilam ibi cum fascia superliga, ut non possit exire : & facias transire retrō usque ad renes & intra ilia, & ibi ligetur.

Sed antequam ibi ligetur, fiat tale emplastrum super renes. Recipe nasturtii, baccarum lauri, thuris, cinnamomi, ana q.s. omnibus puluerizatis, & ad ignem calefactis, distemperatisque cum melle fiat emplastrum, quod adhuc calidum super renes ponatur, ligando fasciā, cum qua ligata est pila uuluz, firmando emplastrum & pilam fortiter, ut moueant.

Et ipsa iaceat supina per nouem dies, & amplius si fuerit necesse. Neque se moueat, nisi causa magnæ necessitatis. Et da ei talem dietam, ut per decem dies non eat ad fellam, uel ad urinam faciendam sæpe.

Item in exitu uuluz post partum imponimus plumaceolum, comprimendo ut non exeat, nisi cum mingit. Tercio uero die facimus balneum, & in posterioribus facimus insufflari sequētes pulueres, ne tumescat.

Recipe zinziber, pyrethri, cinnamomi, ana fiat puluis. Ad hæmorrhoides inatas uitio partus : Recipe absinthium, abrotonum, cassiam ligneam, corticem cassiæ fistulæ. coquantur fortiter in uino : & inde fiat balneum. Et cum exierit de balneo, accipe puluerem aloës : confice cum oleo muscellino, uel pulegino, & intringe bombacem, et suppone.

Quibusdam accidit dolor mammillarum ex lacte. Accipe argillam, distemperetur in aceto, & fiat emplastrum : dolorem sedat, & lac cōstringit. Sed prius locum aqua calida fomentabis. Item nota, quod dolor, qui accidit in mammillis puellarum, de facili transit.

Quoniam hæc passio menstruis erumpentibus sanatur, quod in quibusdam puellis morbo caduco laborantibus, fit ex suffocatione matricis compressis spiritualibus. Contra apostema autem mammillarum fiat emplastrum de malua, uisco absinthio, artemisia, & cum axungia distemperetur.

Et cum caput apparuerit, contene nucleos, & appone. & si non rumpitur, cum phlebotomo aperiat : & exprime parum in principio, ne ex subita euacuatione fiat peius. Et tunc impone licinium singulis diebus bis, uel ter illitū uitello oui, aut & melius, unguento facto ex butyro Maji, uitello oui, & terebinthina : quod est mirabile, & benignum.

Quod si locus iste fuerit fistularius, cum cura hac poterimus subuenire. Recipe radicem mundam hellebori nigri, & intinctam oleo, uel melle impone, & puluerem de lappa combusta superaspere : id enim omnem fistulam mundat, & mortificat, dum modò inter ossa non fuerit. Ideoque ibi debet poni, quo usque mortificetur & delibetur.

Postea uulnus curetur.

De mala complexionē calida & frigida Matricis.

Cap. X X I.

V T igitur à nobis de curatione Mulierum compendiosa fiat traditio, notandum est, quod quzdam mulieres sunt calidæ, quzdam frigidæ. Ad quod tale fiat experimentum. Licinium cum oleo pulegino, uel laurino, uel alio oleo calido inungamus : & illud in quantitate parui digiti uuluz intromittamus de nocte quando uadit dormitum : & ligetur cum filo forti circa crura.

Quod si intus attractum fuerit, datum est nobis indicium, quod laborat frigidityte. Si uero expulsum fuerit, scimus eam laborare caliditate. Sed in utraque causa subueniendum est hoc modo. Si de causa laborat calida, supponatur suffumigium de herbis frigidis in hunc modum. Quoniam contraria contrariis curantur.

Ponamus igitur maluas, uiolas, & rosas in aqua, & istarum decoctione fumigamus. Si uero frigidityte laborat, quod melius est, pulegio, folijs lauri, & perficaria mulieri faciamus fumigium, similiter pessarium : & sic abundantia humorum mundificata, habiles erit ad concipiendum.

Postea faciamus fumigium feminis, quod miro modo confortat. Recipe garyophil. spicæ nardi, storacis, calaminthæ, nucis muscæ, & ponatur in testa ouis super carbones uiuos paucos, & paretur sella perforata, ut totus fumus ad interiora redundet.

De dolore Matricis.

Cap. X X I I.

A D dolorem Matricis prouenientem ex duritie ipsius, Accipe saxifragiam, cretam marinam, caules ueteres, artemisiam, maluam, radicem spargi : omnes herbas coque in aqua fortiter, & fac in his sedere patientem usque ad mammillas. Et cum exierit, pista maluam, artemisiam, camphoram, & eas pistoras in olla calefacias : & informa magdaleones cum paucō oleo laurino, uel pulegino : & suppone. Contingit & dolor

dolor Matricis ex abortu, uel ante tempus ex retentione mēstruorum. Quod fit sapius ex frigidityte, raro autem ex caliditate. Si ex frigidityte, signum est dolor, & punctura sinistri lateris. Tunc accipe pulegium, origanum, nepitā, lauri frondes, uel grana, & maluas in aqua bene fac bullire: & inde patientem fomenta. Postea accipe garyophyllos, spicā nardi, nucem mūscatā, galangā: & fiat suffumigatio, & per embotum fumum recipiat. Deinde trāserā magnā, uel potionem S. Pauli in modum auellane, suppone cum bombace. Si autem ex calore sit, tunc usu Veneris matrix desiccatur, & calefit. Signum huius est, quod ardor nimius circa partes illas est. Ideo accipe maluam, herbam uiolarum, flores rosarum, radices iunci: coquantur fortiter in aqua, & in eis fomentetur patiens: & eidem trāsera Sarracēica omni die supponatur.

De fluxu Matricis. Cap. X. X. I. I. I.

S V N T quædam Mulieres, quæ fluxum patiuntur Matricis, inftar spermatis, ut sunt quædam uerulæ, fluxum saniosum emittentes. Quibus prouocando mēstrua subueniendum est, cum sunt steriles. Sū & aliz steriles, simili modo saniem educentes. Hoc itaque est in consueto tempore eis adueniente. Cum enim eis mēstrua negantur, loco mēstruorum, propter earum frigiditytem, saniem emittunt, ac si ab epate fluxus descenderet. Quibus sic subueniendum est. Faciamus eis fumigium ex uino: uel aqua, in qua coctæ sint herbe calidæ, quales ponemus infra de stranguria & lapide. Postea distemperemus trāserā magnā in oleo pulegino, uel muscellino, & in panno lineo, uel lana succida, uel bombace inuoluamus, & uulue imponamus. Sunt & aliz iuuenes, quæ eodem modo laborant, propter defectum mēstruorum, sed istæ liberantur mēstruis prouocatis. Et notandum, quod quædam mulieres calidæ steriles facie sunt, nec laborant huiusmodi fluxu, sed siccæ tanquam uiri permanent. Sunt item quædam, quæ fluxum saniosum habent simul cum mēstruis. Quas facimus sedere super massā erucæ agrestis coctæ in uino, panno lineo interposito: dummodo sit calida. Ad idem, Recipe pulegium puluerizatum, & in sacculo ponatur, qui in tantum longus & latus fiat, ut utraque pudibunda ligari possiat: quem patiens ferre debet super uuluum ad fluxum prohibitionem. Et priusquam ligetur, debet ad ignem calcieri, ut confortentur tam anus, quam uulua.

De carne in Matrice exorta. Cap. X. X. I. I. I.

S V N T quædam mulieres, quibus frustra carnis pendent in matrice. Et nota, quod hoc eis contingit ex spermate intus retento, & inuiscato: quia post coitum se mundificant. Has igitur semper cum decoctione calida herbarum fomentamus.

De tussi acerrima Puerorum. Cap. X. X. V.

P A S S I O N I puerorum, quæ est quasi tussis acerrima, sic subuenimus. Accipe hyssopum, serpillum, & in uino decoque, & da ad bibendum. Vel grana iuniperi distemperamus cum uino, & damus ad bibendum.

De Sudore foetido. Cap. X. X. V. I.

S V N T quidam, qui habent sudorem foetidum ultra modum. Istis facimus pannum in uino intinctum, in quo bullierint folia myrtilli, uel ipsa herba, uel ipsi myrtilli.

De dolore Oculorum. Cap. X. X. V. I. I.

C O N T R A dolorem oculorum, accipe maluam, herbam uiolarum, summitates rubi, rosas siccas, uerbena, silerem montanum: & oculos inde fomenta in sero, & fac emplastrum de eisdem herbis cum albugine oui, & superpone.

De tela Oculorum. Cap. X. X. V. I. I. I.

S I tela sit in oculo, accipe comā marinā, & olibanum, ana æqualibus partibus: combure, & os sepiz non combustum pulueriza: & oculis impone his uel ter in hebdomada. Si de phlegmate fuerit, accipe polium montanum, pulegium, folia lauri, origanum, carui: & inde oculos fomenta. Unguentum ad idem. Accipe aloë epatici duas partes, olibani, gypsi, ana: de his duobus quantum de aloë epatico, pulueriza subtiliter, & confice cum axungia recenti, & locum unge.

De maculis Oculorum. Cap. X. X. I. X.

A D maculas oculorum, quæ remanent post ruborem, Recipe caryis marinæ unc. II. olibani, offis sepiz, ana unc. s. carnem marinā, & olibanum in puluerem redige, & os sepiz subtiliter rade. fiat puluis, et oculis imponatur. Si patiens esset puer, distemperetur cum aqua rosacea, & oculis immittatur. Vnde quæ oculis præcipue ualent, his uersibus habes: Forniculus, Verbena, Rosa, Chelidonia, Ruta: Ex his fiet aqua, quæ lumina reddit acuta.

S V N T & aliz Mulieres quibus Matricem contingit exire alia de causa. ut sunt illæ, quæ non possunt pati uirgam uirilem, propter sui longitudinem, uel magnitudinem, coactæ tamen patiuntur: sed matricem postea exit de loco, & indurefcit. Quibus subuenimus, ut dictum est. supra cap. 20. Vel accipe pannum, & inringatur oleo calido, pulegino, uel muscellino, & imprimatur, uel illiniatur, uel imponatur uulue: & ligetur quousque matrix calefacta recesserit per se. Sed caueat ab omnibus quæ tussim inducere possunt.

De inflatione Vulue.

Cap. XXXI.

V V L V A. mulieris quandoque inflatur ex coitu. Tunc sedeat in aqua decoctionis maluz, altheæ, & pulegij, & liberabitur. Vel accipe pulegium, pulicariam, folia lauri: bulliant in aqua, in qua sedeat mulier: deinde fiat ex prædictis suffumigatio.

De ruptura Vulue.

Cap. XXXII.

A D rupturam inferiorum partium post partum, accipe radicem consolidæ maioris, desicca eam bene, & pulueriza: & puluerem cinini subtilem, & cinnamomi etiam in uuluam injice: & consolidabitur.

De dolore Vulue.

Cap. XXXIII.

A D dolorem Vulue post partum, accipe rutam, artemisiam, camphoram: pista bene, & cum oleo muscellino, uel pulegino conficiantur: & calefacta in olla inuoluantur panno, & superponantur.

De Mulieribus mingentibus in lecto.

Cap. XXXIII.

M U L I E R E S quædam sunt, quæ nocte in lecto, uelint nolint, mingunt: quoniam meatus naturales paralytim patiuntur. Has igitur cum herbis calidis fomentamus.

De modo coarctandi Matricem, ut etiam corrupta, appareat uirgo.

Cap. XXXV.

N I S I de restrictione amplitudinis uuluz, propter honestam causam liceret tractare, nullâ de ea mentionem faceremus: sed cum per hanc impediatur aliquando conceptio, necesse est tali impedimento sic subuenire. Recipe sanguinis draconis, boli armeni, corticis mali granati, albuminis, masticis, gallarum, ana unc. I. uel unc. II. uel quantum uis singulorum, & in puluerem redige: & omnia simul in aqua calefacta conficiantur. & de hac confectioe pone in foramen transiens in matricem. Vel Recipe gallarum, sumachi, plantaginis, consolidæ maioris, aluminis, chamelez, ana unc. I. Decoquantur in aqua pluuiali: & cum ista decoctione fomententur pudibunda.

De crassis Mulieribus, & gracilibus.

Cap. XXXVI.

S V N T quædam mulieres, quibus non committitur carnale commercium: tum, quia uoto, tum quia religione tenentur, tum quia uiduz sunt. Nam quibusdam mulieribus non licet ad fecunda uota transire: quæ cum uoluntatem habeant coeundi, & non coeunt, ideo incurrunt grauem ægritudinem. Illis igitur fiat tale remedium. Accipe bombacem, & oleum muscellinum, uel puleginum, & inunge, & uulue impone. Quod si tale oleum non haberes, accipe triseram magnam, & cum modico uino calido resolue, & cum bō bace, uel lana succida uuluz impone. Hoc enim bene castigat, & refrænat luxuriam, dolorem eius & puriginem sedans. Nota, quod in hoc casu nullum pessarium est administrandum, ne matrix longa abstinentia restricta lædatur: quoniam os matricis, uuluz coniungitur ut ori labia nisi fiat conceptio. tunc enim retranshitur matrix. Alia enim est cura, qua reddimus matricem aptam ad concipiendum. Sed quoniam quædam sunt crassæ, quasi hydropicæ, & quædam graciles: tam ille, quam alie ineptæ sunt ad concipiendum. Vtrisque ergo diuerso modo subueniendum est. Vnde si fuerit phlegmatica, & crassa, faciamus ei balneum de aqua marina, & salsa. Ad moderationem tamen aquæ imponimus iuniperum, nepitam, pulegium, tanco-lam, absinthium, artemisiam, hyssopum, huiusmodique herbas calidas. In hoc balneo faciat morâ, quousque satis sudet. Postea recipiatur caute in lectum, & bene cooperiatur. Et si aliquando cibum petierit, detur ei in principio rosata nouella. Detur etiam cibus bonus, calidus, sani nutrimenti, & uinum optimum modice sumptum. Sic ter, uel quater in die fac ei balneum, & in crassior die similiter. Tercio uero die fiat fumigium optimū, & odoriferū, quod supra diximus. Hæc etiam curam uiris frigidis facimus. Sed loco fumigij, damus eis confortatiua calida. Si uero sit crassa, & quasi hydropica, distemperamus stercus uaccinum cum uino optimo, & inde illinimus eam: quæ sic linita intret stupham usque ad collum: quæ stupha multum caliditatis habeat ab igne facto ex sambuco, & ebulo: & in ea cooperta multum sudorem emittat, & in stupha moretur, donec quasi

quasi aliquantulum per inferiora se purget. Et erit quasi uiride illud quod exibat. Quæ postquam satis sudauerit, abluat se cum aqua prioris balnei, & sic cautè intret in lectum. Et hoc fiat bis, uel ter, uel quater in hebdomada, & satis gracilis inuenietur. Istam bene cibabis, & bonum quoque & odoriferum uinū potet. Viros etiam crassos hac cura reddimus graciles. Curamus etiam aliter uiros crassos multum ieiunando, & balneando. Similiter & faciendo eis sepulchrum iuxta litus maris in arena, modo dicto illinimus eos: & cum calor est fortissimus, tanquam positos in sepulchro, suffundimus arena calida, & inibi facimus multū & copiose sudare: & postea cum aqua prioris balnei optimè lauamus.

De retentione Secundine. Cap. XXXVII.

AD difficilem partum, & educendam Secundinam, accipe radicem petroselini, folia porrorum, & extrahe succum, & admisce pauco oleo: & da bibere patienti: & misce acetum in uuluum, & liberabitur.

De Abortu. Cap. XXXVIII.

CONTRA Abortum assuetum fieri quibusdam mulieribus in septimo mense, uel nono. Accipe oleum, ceram, puluerem thuris & masticis: misce, & inde ungatur mulier antè & retro in hebdomada bis uel ter: quia multum confortat Matricem, & cotyledones.

De exitu ani. Cap. XXXIX.

AN I exitus, est morbus cōmunis, tam uiris quàm mulieribus: & facit sanguinem fluere. In restringendo igitur sanguinem, & anum reponendo, subuenimus hoc modo. Primò fomentamus patientem cū decoctione uini, in quo bullierit absinthium: & cum hac decoctione bene fomentetur anus, & liniatur per totum cum caculio ad restringendum. Postea cineres de salice, & eius radice, & arista alicuius piscis salis facti, superaspergantur, & reponatur anus cum panno lineo. Et hoc fiat tribus diebus bis in die, & saluabitur. Sunt & alij, quibus non exit anus, tamen maximum dolorem patiuntur: & illis taliter subueniendum est. Puluerizetur aloë epaticum, & cum uino calido distemperetur: & cum adhuc est tepidum, intingatur in eo linum, uel lana, uel cotum, & ano imponatur: id enim dolorem mitigat, & inflationem ani aufert.

De dolore illiis. Cap. XL.

DOLOR Illiis quibusdam accidit: quibus sic subuenire solemus. Solatrum decoquimus in aqua cum cinere, & loco dolenti apponimus. Ad idem ualet sissaminum crudum decoctum cum semine, & loco dolenti applicatum.

De Stranguria. Cap. XLI.

STRANGURIAM patiuntur tam uiri, quàm mulieres. Viris autem succurrimus decoquendo nasturtium aquaticum: facimus cataplasma, & pectini superponimus: & in eius decoctione iubemus sedere patientem. Mulieribus uerò eadem passione laborantibus, facimus suffumigium ex mentastro, nepita, & pulegio. Item tam uiris, quàm mulieribus facimus stupham, in qua bullierint iuniperus, nepita, pulicaria, mentastrium, folia lauri, pulegium, absinthium, & artemisia: & in balneo damus benedictam simplicem: & sic liberabitur patiens. Nisi fiat impedimentum per lapidem confirmatum eijciendo arenulas, & se purgando per urinam.

De Lapide. Cap. XLII.

SI autem lapis adesset, decoquimus saxifragiam cū radice graminis in aqua ad consumptionem medietatis: de qua decoctione damus lapidosissimè potandum. Et si uinū appetit, concedimus eis ipsum lymphare cum huiusmodi aqua. Et hoc facimus bis uel ter in die, continuando per quatuor uel quinque dies. Quod si tunc non minxerit, erit signum lapidis confirmati. Tunc ergo, si fuerit in collo uesicæ accipe maluam, cretanum, cauliculum agrestem, saxifragiam, paritariam, nasturtium aquaticum, ameos, & semen urticæ: & decoque ista in liquore, cuius tertia pars sit uinum, & tertia oleum, & quarta aqua marina, uel salsa. Cum hac ergo decoctione fomentetur patiens bene, maxime circa partes illas apponendo herbas. Hac cura fuit quidam liberatus habens lapidem in uesica, quem post longam fomentationem fecit fugendo extrahi per foramen factum circa peritonæon, & fecit iungi uirgam, & maxime caput uirgæ cum oleo laurino, uel unguento aureo.

De Dysenteria. Cap. XLIII.

FIT dysenteria quandoque ex cholera, quandoque ex phlegmate. Cura igitur dysenterie phlegmaticæ est, ut primò suffumigemus cū thymo, epithymo, uel colophoniam: postea fomentemus cum eruca agresti. Contra dysenteriam uerò ex cholera, Recipe flores rosarum rubearum, decoquantur in aqua pluuiali: in qua decoctione intingatur rotum, seu bombax, & ano imponatur.

T R O T V L A D E

De Pediculis nascentibus in pectine, & sub asellis, & circa oculos.

Cap. XLIII.

AD pediculos, qui in pectine, & sub asellis nascuntur: Distemperamus cineres cum oleo inungentes illa loca. Contra pediculos uero generales circa oculos, facimus unguentum satis ualens ad expulsiōem eorum, & ruborem oculorum, et ad mirigationem doloris eorum: Recipe aloes, unc. I. ceruse, olibanī, ana unc. s. laridi quod sufficiat: larido minutim contrito: cetera puluerizata imponantur, & fiat unguentum.

De Scabie coxarum, uel & aliarum partium.

Cap. XLV.

AD hanc infectionem cutis ualet tale unguentum. Recipe radicem enulae, aceti, argenti uiui, olei ana ad placitum, cum axungia sic conficiendo. Radix enulae mundetur, & incidatur minutim, & postquam satis decocta fuerit in aceto, teratur in mortario cum axungia: postea argentum uiuum ponatur cum oleo & cum aceto, in quo cocta sit enula: distemperetur. Valet hoc unguentum illis, qui per pruritus se calendo excoriant. Notandum tamen, quod si quis hoc unguento se unxerit, aquam frigidam in ore teneat, ne dentes laedantur ab argento uiuo, quod circum quaque fluit.

De Cancro.

Cap. XLVI.

CANCROVM, ubicunque sit in corpore, mundamus, & puluerem factum de cinino, & uiridi aze superaspargimus, ut decet. Postea locum infirmum desiccatum inungimus hoc unguento. Recipe olibanū, masticem, ceram, oleum, picem græcam, galbanum, aloen, absinthium, artemisiam, parisiā, rutam, saluiam. Conficiantur sic. Terantur herbae, & infundatur oleum, & misceatur super ignem: & cum fuerit in supremo calidum, oleum coletur, & iterum igni apponatur: & cum incipiet bullire, apponatur cera: & postea cetera puluerizata, & decocta colentur, & superponatur hoc unguentum. Signum autem decoctionis est, cum gutta super marmor posita refederit, & indurauerit. Et nota, quod loco cancroso folia hederæ syluestris satis ualent in uino decocta, & superposita.

De Cancro nasi.

Cap. XLVII.

AD Cancrum nasi. Recipe pallam marinam, saluiam, colophoniam, hermodactylos, atramentum, id est, terram Campaniæ, omnia æqualiter: & pulueriza. Sed ante, quam puluerem istum ponas, ablue locum cum uino calido, in quo coctum sit absinthium: postea pone desuper puluerem predictum.

De formationibus & sironibus.

Cap. XLVIII.

AD formationes & sirones ubicunque sint in corpore, maxime in facie, & in fronte, frumentū distemperamus cum uino, puluere Olibanī apposito: & ad modum emplastri loco: apponimus.

De inflatione pedum.

Cap. XLIX.

CONTINGIT aliquando pedes inflari ex dolore matricis. Tūc accipe tribulos marinos, & coque in aqua marina uel salsa, & fumiga sepe pedes: & post fumigium cum fomentū erit tepidū, lauabis pedes.

De inflatione uirga uirilī, & testiculorum.

Cap. L.

SUNT quidam, qui in uirga uirili patiuntur inflationem, sub præputio foramina multa cum excoriatione: quibus sic subuenimus. Maluam in aqua bullimus: & bullitam exprimimus, ut nihil aquæ remaneat. postea pistamus cum sanguine calido, uel butyro sine sale, uel oleo, & igni apponimus, ac calidum super folijs caulium, & super pannum lineum positum, membrum uirile circundamus. Et hoc tale sit remediū ad inflationem tollendam. Deinde præputio enerso, cum aqua calida lauamus collum præputij uicerofum, & puluerem de pice græca, & carie lignorum, uel uermium, & rosarum, & de radice tapli barbatī, & myrtilli superaspargimus. Quod si deesset myrtillus, alia quatuor sufficiunt. Et hoc sic fiat bis, uel ter singulis diebus, donec sanetur. Ad testiculos uero inflatos fiat talis fomentatio. Accipe maluam, absinthium, uerbenam, bismaluam, cassilaginem, artemisiam, & caules: hæc omnia coquantur in uino forti, uel uetere, & inde fomentabis bis uel ter in die: & eas herbas pista, & misce cum melle, & bullias: & hoc totum cum uino superpone.

De pustulis paruis puerorum.

Cap. LI.

QUANDO pustulae nascuntur pueris parua, tunc illæ cum sale trito solui debent, & cum fasciā ligari, ut resoluantur: quibus pueris nec unctiosa, neque dulcia dari debent. Si uero in corpore pueri antitaxa apparuerit, detur nutricia aqua hordei, & quandoque scarificetur. Similiter & ipsa neque dulcia, neque

que salsa comedat. Quo casu lac nutritis hoc modo debet cognosci. Si gutta una distillata super unguem, nec nimis subtile, nec nimis liquidum, nec nimis grossum, nec nimis coagulatum apparuerit, habens bonū odorem, & puram dulcedinē. Salsum autem lac, aut male redolens, infantis nutrimento nō est conueniēs.

De foetore oris.

Cap. LII.

AD foetorem oris vitio stomachi, summitates myrtz terantur, & coquantur in uino, usque ad medietatem: & stomacho mundato tale uinum propinetur.

De casu Vuuula.

Cap. LIII.

HIS qui casum uuule patiuntur, sic subuenimus. Puluerem zinziberis, pyrethri, & cinnamomi decoquimus in uino, & facimus gargarizare, & puluerem horum calidum uuulz apponimus.

De uermē Manuum & pedum.

Cap. LIIII.

AD eiciendum uermem de manibus & pedibus, scilicet syronem. Accipe laterem calefactum, & ali quod uas plenum aqua: & postea super laterem candentem ponatur semen uisquiami: & patiens teneat pedes super fumum, & uidebis uermes quasi pilos in aquam cadentes. Item ad idem accipe paleam auenaz & combure in cineres: postea apponatur aqua calida quantum patiens poterit sustinere, & in ea teneat pedes quousque in frigidentur. Postea coletur, ita quod nihil aque remaneat, & stringantur bene cineres, ut aqua exeat: & separentur paulatim, & inuenies uermes instar fili per fumum uisquiami expullos. Sic similiter cadunt syrones manuum. Nota quod si locus corrodatus à uermibus: accipe paleam, & incinera, & postea ponatur in aquam calidam: & in illam aquam, quantum calidam sustinere poterit, collocaet patiens membrum, & exhibunt uermes: postea curetur locus, ut aliud uulnus.

De surditate aurium.

Cap. LV.

AD Surditatem aurium, accipe pinguedinem anguillarum recentium, quæ apparet post decoctionē illarum, & succum caprisolij, & barbz Iouis, & ouorum formicarum, plenam palmam: tere, & cola: & hæc omnia simul cum oleo misceantur, & decoquantur. Post decoctionem, admiscetur ei acetum: ut magis sit penetratiuum, uel uinū quod sufficit, & auri sanz infunde: & obturetur auris infirma, & super sanam iaceat partem: & manē caueat, ne uento appropinquet. Et fac illum per aliquantulum tempus super aurem sanam iacere: & iterum super infirmam.

De Glandulis.

Cap. LVI.

AD Glandulas artemisia calefacta simul trita, & superposita glandulas dissoluit. Quæ etiam in uino trita, & in melle cocta, glandulas faciei superposita mollificat, maturat, & attenuat.

De Hemorrhoidibus.

Cap. LVII.

AD hæmorrhoides innatas uitio partus, accipe absinthium, abrotonum, cassiam ligneam, cassiam fistulam, coquantur fortiter in uino, & facias mulierem ibi balnari: & cum exierit de balneo, accipe puluerē aloes confectum cum oleo muscellino, uel pulegino: & intinge bombacem, & superpone. Aliter, accipe sotulares ueteres, & pineam herbam, & coquantur ea in uino, & inibi fac sedere eam, quam diu pati poterit: & cum exierit de fomento, accipe alumen album puluerizatum, & suppone. hoc enim ita consolidat, ut reddat uiolatam, plusquam uirginem.

De dolore Dentium.

Cap. LVIII.

AD dolorem dentium, & eos confortandos si moti fuerint, Recipe salis armoniaci drach. XI. costi drac. XIII. melon, piperis, drac. III. folij, drac. II. confice sic. Sal & fustur in olla dimitte, donec carbone scant: & cum in frigidatum fuerit, cum cæteris speciebus tere, & in puluerem subtilissimum redige, & inde dentes, & loca ulcerosa frica. Item aliud, & est pimpinella, uel succus eius: dentes enim optime dealbat. Similiter herba eius trita, & apposita, tumorem gingiuarum emendat.

De Fistula.

Cap. LIX.

EXPERIMENTVM probatum ad Fistulam. Accipe foliorum caulis rubei, & seminis eiusdē radicis rubeæ maioris, ana partes equales: terantur, & in uino optimo decoquantur usque ad tres partes, fiat colatura, & addito melle coquatur ad spissitudinem, dentur quotidie duo cochlearia, manē & sero patienti.

Nota, quod si fistula fuerit in aliquo loco, cuius canale penetret ad oculos, ut iuxta nasum, curabilis est: quia nec incisionem, nec aliquam medicinam ibi administrare possumus, propter teneram substantiam oculorum. Quidam tamen testantur, quod talis fistula possit curari per solam agrimoniam, ex multo uina habitam, siue in potu, siue in puluere. Ad idem ualet Filipendula, & grana in fine radicis eius inuenta.

De Scabie manuum. Cap. LX.

AD Scabiem manuum sanandam, accipe lapatum acutum, & finum terræ, confice in modum unguenti cum axungia porcina, & butyro facto in Maio, quo inunge manus.

De ornatu, & partium eius: adq; faciem dealbandam. Cap. LXI.

RADICEM accipe dracontæ, & munda, & radicem iari, ana, tere in mortario cum axungia, & distempera cum aqua calida, & cola per pannum; & postea bene moueas, & sic stet per noctem: & in mane aquam suauiter remoue, aliam infundendo aquam: ad cuius linimenti confectionem optima esset aqua distillationis florum caprifolij. & hoc reiterando continua per quinque dies, ad reprimendam malitiam eorum, quæ possent interire faciei lesionem. Sexta uero die, abiecta aqua, expone, ut desiccetur. Postea accipe prædictæ confectionis, unc. II. cerusæ, unc. I. camphoræ, unc. V. boracis, gummi arabici, ana drac. I. Dissoluatur borax in aqua rosacea, fricando inter manus: & postea distemperentur hæc omnia cum aqua rosacea. De quo faciem dealbandam, accipe ad quantitatem fabæ, & distempera cum pauca aqua frigida inter manus fricando, & cum ambabus manibus faciem illinias, prius facie lota cum aqua & sapone: deinde cum aqua frigida aspergatur, & pannus subtilis superponatur, siue in mane, siue in sero hoc fiat: & talis decoratio faciei per tres uel quatuor dies durat. Vnguentum ad faciem dealbandam. Recipe cerusæ optimæ, unc. II. teratur, postea cribelletur per pannum, & quod in panno remanebit, abiciatur: & aqua plumalis admisceatur, & coquatur usque ad consumptionem aquæ. quod potest cognosci, quando uidebimus id coctum ferè esse desiccatum. tunc infrigidetur, & huic infrigidato & desiccato addatur aqua rosarum: & iterum bulliat, quousque fiat durum, & spissum, ita quod inde possint formari pilulæ minutæ. & cum uolueris inungi, accipe pilulam unam, & liquefiat in manu cum aqua, & inde fricetur facies bene, ut desiccetur: deinde cum aqua pura abluitur, & hoc durabit per octo dies. Secundo ad faciem rubificandam, accipe radicem iuricellæ, & munda, & inde minutim, & desicca. Postea pulueriza & distempera cum aqua rosacea, & cum bombace, uel panno lineo subtilissimo illiniendo: inducit ruborem faciei. Mulieri autem satis albæ, si rubore careat, facimus colorem rubeum, ut submentita, uel palliata specie albedinis color rubeus, quasi naturalis appareat. Item ad rugas faciei uetularum, accipe spatulam, id est gladiolum, & succum extrahe, & cum illo succo in sero faciem inunge, & in mane erit cutis eleuata, & rumpe- tur. Quam rupturam curamus cum prædicto unguento, in quo radix lilij recipitur, & puluere cutim extrahendo, quæ post rupturam lota, satis apparet subtilis. Item ad lentigines faciei, quæ sunt ex accidenti, accipe radicem dracontæ, & in puluerem redige, & ossa sepiæ, & olibanum, & de omnibus istis fac puluerem, & cum pauca aqua misce: & inde manus illinias fricando in mane cum aqua rosata, uel aqua fursuris, uel cum mica panis fricando, donec remoueas. Aliud. Pone in accerrimo aceto oua septem integra, & tam diu dimitte ibi, donec exterior testa in modum interioris pelliculæ mollescat, & cum eis admisce pulueris sinapis, unc. III. & simul tere, & inde faciem inunge frequenter. Item ad tollendos rubores faciei. Sanguifugas, quæ uariæ sunt, apponimus in calamo, loco prius loto cum uino, cui debent adherere scilicet circa nares, & aures ex utraque parte: aut uentosas ponimus super scapulas. Item ad uenas, quæ apparent in facie, uel in naso. Accipe de sapone partes quatuor, & quartam partem de pipere, & puluerizata apponimus loco, & prædicto modo curamus. Item ad asperitatem faciei ex sole, uel uento, & ad eam dealbandam & clarificandam. Accipe sepem ceruinum, bulliat in aqua, deinde in aliam aquam coletur, & colatum diu manibus malaxetur, & tunc adde puluerem crystalli & uermis. Nota singulare unguentum ualens ad solis adustionem, & quamlibet fissuram, maxime ex uento, & contra pustulas faciei ex aere, similiter contra maculas, & excoitationes faciei, quo utuntur mulieres Salernitanæ. Recipe radicem lilij, unc. I. cerusæ, unc. II. massicis, olibani, ana unc. V. camphoræ, drac. I. axungie, unc. I. aquæ rosatæ. q. s. Conficiantur sic. Radix lilij mundata decoquatur in aqua, & hæc extracta bene teratur, axungia uero liquefiat ad ignem, & bene colata, & à sale mundata: simul hæc duo distemperentur prius, addendo cerusam in aqua rosacea dissolutam: deinde reliqua, secundum artem puluerizata, & fiat unguentum. Hoc igitur unguento solent prædictæ mulieres se ad ignem inungere in sero, ut in mane, à prædictis, scilicet à solis adustione, & fissuris, & pustulis & huiusmodi, tam per aerem, quam per solis ardorem illesæ, de die permaneant. Id enim eleuat cutem, & pulchrè colorat. Neque mane lotionibus, uel aliquibus alijs est opus ad remouendum à facie: quoniam non derogat colori quoquo modo. Valet etiam ad repressionem pustularum in leprosis, & satis mundificatiuum est. Quoniam huiusmodi ornatu mulieribus in frequenti usu est. quia, si fuerint deformes, pateat eas. Ideo notandum, quando uoluerint se ornare, primo abluant faciem cum sapone gallico, & cum aqua calida, & cum colatura fursuris, & hoc fiat in balneo: postea inungant faciem prius desiccata cum oleo de tartaro, continuando per septem noctes, & totidem dies, uel etiam per quindecim, si uultus multum fuerit pannosus, & lentiginosus. Et quando uerecundantur inungere faciem de die, tunc solent se inungere

re de

re de nocte, & mane laua re cum aqua tepida, in qua resoluta fuerit pinguedo amidi ad mitigationem. Volens ergo Mulier faciem suam decorare, uadat ad balneum, & intret stupham, ibique faciem inungat cum oleo tartarino, & sic inuncta sudet optime: postea lauet faciem, ut patet ex supradictis. Et si uoluerit tollere pilos in facie, tunc post balneum faciem suam bene desiccata cum pano illinat hoc psilothro. Recipe colophoniam & ceram, & in uase fictili resolue: & his resolutis addatur parua gutta galbani, & diu coquantur, mouendo cum spatula. Deinde accipe mastice, olibanum, gummi Arabicum, & ceteris commisceantur. hoc facto, ab igne deponatur: & cum fuerit tepidum, faciem suam liniat: sed non tangat supercilia. Dimittat per horam, donec sit infrigidatum, postea remoueat illud. subtiliat enim cutem, & pulchra reddit faciem, & pilos remouet, & omnem spurcitiam reddit coloratam & lucidam. Item ad pannum remouendum post partum, illinat faciem cepa uel squilla, & inde cutis eleuabitur. eleuata autem cute sepum hircinum recens faciei superpone, & postea eleuatam cutem remoueas. Aliud ad pannum faciei remouendum. Accipe tartarum de uino albo fortissimo, & cum urina pueri madefactum, stuppis inuolue, & cum pano lineo per noctem sub cinere calido dimitte: mane uero proijcias pannum, & tartarum tere, & distempera cum melle, & unge faciem, ut supra diximus. Item ad cutem in facie subtiliandam. Accipe draconeam, uel maluam tere, uel bryoniam, pista fortiter, & postea misce cum melle albo, & fac bullire per duas horas, & in fine decoctionis adiuuge puluerem camphore, boracis, salis gemme, cum spatula diu mouendo, & usui reserua, & utere facie lota in aqua tepida, uel fursure, ter in hebdomada, & in die Dominica de hoc unguento inunge. Recipe camphoram, radicem lilij in aqua elixam, & axungiam porcinam recentem, hec omnia confice cum aqua rosacea, & utere. Item ad uermes faciei delendos, qui depilant. Accipe lapaſſi acuti, olibani, draconez, ossis sepiæ, ana partes æquales: fac puluerem, & ter in hebdomada frica, prius tamen facie bene lota in aqua fursuris, & in die sabbati faciem bene laua cum albumine oui, & amido, & per unā horam in facie remaneat: prius laua cum aqua recenti, & illini eam. Item ad serpiginem faciei accipe lapaſſum paruum, id est acutum, pista fortiter, & frica locum patientem diu: postea accipe fursur, & infunde in aqua bullenti, & inde laua locum patientem, & postea desiccetur, & fiat tale unguentum. Recipe enulam campanam bene incisam, & in aceto diu decoque: postea pista fortiter, & immisce puluerem olibani, mastice, lithargyrii, aloes, auripigmenti, cumini, argenti uiui extincti cum salina, ana unc. III. ossis sepiæ, unc. I. saponis & axungie, ana q. s. Confice cum aceto, in quo cocta sit radix enule. Mulieres Salernitanæ ponunt radicem uirticellæ, id est bryonie, in melle, & cum tali melle inungunt faciem suam, & miro modo rubescit.

Aliter. Mulieres ornant facies & labia sua accipientes mel despumatum, cui addunt parum bryonie, uirticellæ, cucumeris agreſſis, & parum aquæ rosacæ. Hæc omnia usque ad medietatem bulliant: quo unguento inungantur labia in nocte, & mane lauentur cum aqua calida. consolidat enim cutem labiorum, & eam subtiliat, & reddit tenderrimam, & ab omni ulceratione præseruat, & si ulcerationes in eis fiat, sanat.

Si uero mulier uoluerit se colorare, tunc optime fricat labia cum cortice radicis arboris nucum, & super dentes, & gingiuas habeat bombacem, & iningat in colore composito, & cum tali bombace ungat labia, & gingiuas interius. Color autem compositus sic fiat. Accipe herbam marinam, de qua Sarraceni tingunt pelles in colore uiridi, hæc bulliat in uase fictili nouo cum albumine usque ad tertiam partem: coloratur addatur bresilium frustatum incisum, & iterum bulliat, & iterum dimittatur infrigidari. Et cum tempus fuerit, apponatur puluis aluminis, & tunc in ampulla aurea, uel uitrea ponatur, & usui reseruetur. Hoc igitur modo tingunt mulieres Sarracenæ facies suas, quibus unctus desiccatis, ponunt ad dealbandam faciem aliquid prædictorum, ut cerotum, uel aliquid aliud, & apparet color pulcherrimus admixtus rubori, et albedini.

Item ad guttam oris lauam os cum uino tepido, dentes bene fricando: & hoc in mane, & idem facimus in sero, postea oleum rosatum circumdamus per noctem, & liberabitur in breui.

Item ad dentes nigros & male coloratos, Accipe cortices nucum maiorum bene mundatos ab interiori cortice, qui est uiridis, & fricamus ter in die dentes: & cum bene fuerint fricati, abluimus os cum uino calido & cum sale admixto, si placet. Similiter dentes sic dealbantur. Accipe marmor album combustum, & ossa dactylorum combusta, & uirum album, & regulam rubeam, sal, pumicem: & de his omnibus fac puluerem, in quo lana succida inuoluta, in panno lineo subtili dentes interius & exterius frica. Aliud ad idem, quod dentes emundat & albiſſimos reddit. Patis post prandium os lauet uino optimo: dente bene exiccare debet, & abstergere cum panno albo nouo: postea mastice quotidie fœniculum, uel leuisticum, uel petroselinum, quod melius est masticare, quia bonum reddit odorem, & bene gingiuas emundat, & dentes facit albiſſimos.

Puluis item ad dentes nigros dealbandos, & confirmandas gingiuas corrosas, uel comestas, & ad os male olens, optime facit. Recipe cinnamomi, garioſi, spicenardi, mastice, thuris, frumenti, absinthij, pedum cancrorum, ossium dactylorum & oliuarum, ana partes æquales, terantur omnia, & in puluerem subtilem redigantur, & inde loca fricentur. Ad idem. Recipe pumicis uſſi, salis, ana drac. X. cinnamomi, antisolij, ana drac. II. micellæ, q. s. pumicem, & sal cum sufficienti melle commisce, & in patella rudi super carbones pone, donec incenduntur, & aliz species in puluerem redigantur, & cum opus fuerit, dentes inde fricentur.

Linimentum ad manus dealbandas, & teuigandas. Aphodilli decoquantur in aqua usque ad consumptionem aquæ, & bene mouendo tartarum admiſce, & postea duo oua: & fiat linimentum, quo manus fricabis.

Item ad foetorem oris, nota, si mulier habeat os foetidum, causa putredinis gingiuarum, illi sic subueniendum est. Accipe calcem uiuam, sulphur uiuum, & auripigmentum de calce & sulphure, & puluerem cucurbitæ combustæ, & piperis. Et habeas peciam unam scarletæ, uel alciuius panni rubei, eamque minutim incidas, quanto plus poteris, & adde prædictis. Tunc habeas acetum fortissimum, & ponas in alio

uase fictili, & aliquantulum dimitte bullire : & postea pone auripigmentum, deinde sulphur, postea puluerem cucurbitæ & piperis per internalla, ad ultimum ponas peciam panni, & remoueas ab igne : & tunc extrahas ab olla, & ponas super tabulas diuissim per palullâ ad solem, & dimittas siccari : & de his autem siccatis fiat puluis, & ponatur super gingiuas cancrasas & putridas, eis tamen prius ablutis cum aceto tepido, in quo bullierit radix tapfi barbati. Putredine consumpta, de super spargatur puluis cinnamomi, & rosarum rubearum. Ego autem uidi quâdam Sarratenam cū hac medicina multas liberare, quæ accipiebat partem de folijs lauri, partem de musco, & iubebat mulieres tenere sub lingua, ne perciperetur ab eis grauis anhelitus. Id ego quoque laudo, ut mulier teneat hoc medicamen sub lingua die & nocte, et maxime quâdo debet coire cum alio. Si autem sotor oris fuerit causa stomachi, uel intestinorum, sic curetur. Fiat puluis de meliorialoe quod inueniri poterit, & distemperetur in modum syrupi, cum succo absinthij, de quo accipiat quotidie, sole oriente 4. cochlearia : quibus acceptis, accipiat totidem de melle, & sanabitur.

Item ad remouendas labiorum fissuras, debent ipsa perungi cum oleo rosato, uel semine lini decocto in ciclamine concuato, & etiam ex semine saxifragiæ cum succo centaureæ, uel aristolochiæ rotundæ trito liniantur. Ad idem ualet succus absinthij. Contra fissuras autem labiorum, propter nimios amplexus, & osculationes amantium, ualet inunctio facta de muscilagine seminis psilij : uel unguento de lilio. Si uero tales fissuræ fierent ex uento, uel aere, & similibus causis, tunc liniantur labia cum melle, & postea super aspergatur puluis colophoniz. Vel accipe nucem magnam, & decoquatur sub cinere calido, & rindeu teratur, & fissuris apponatur, admixto oleo tartarino, & sanabitur. Itē ad labiorum grossitiem fiat eorum attenuatio cū unctiōe mellis : aut aqua, in qua bullierit radix dracontæ, ireos uel scrophulariæ, uel etiam amidum, in mulla dissolutum, & puluis marmoris, & puluis pumicis assis, & ossis sepiz, misceantur, & ungatur locus mixto puluere alghithiz (id est, draganti) cum mastice siccata. De his ergo bene siccatis fiat puluis, & ponatur super gingiuas cancrasas & putridas, prius bene ablutas cum aceto tepido, in quo bullierit radix tapfi barbati. Putredine autem consumpta, habeat puluerem cinnamomi, & rosarum, & de super aspergat. Item ad subitam inflationem faciei, sufficit sola aqua calida suffumigatio. Similiter ad inflationem eiusdem, & oculorum, accipiat axungia recens, & cum senatione teratur, & superponatur. Et hæc de ornatu faciei & eius partium sufficiant. Vnguentum ad capillos aureos faciendos : recipe medianum corticē sambuci, flores genestæ, crocum, uitellâ ouorum, hæc coquantur in aqua, & quod supernatauerit, colligatur, & inde capilli inungantur. Item ad capillos cādidos faciendos. Apes quamplures in olla noua include, & ita incēde, & cum oleo tere, & inde caput unge. Ad idem ualet agrimoniz trita cū lacte caprino. Item ut capilli crescant tibiuis, accipe panem hordeaceum cum crusta, & sale, & adipe uris : tere, sed prius combure panem hordeaceum, & ex tali mixtura unge caput, & crescent capilli.

Item ut capilli fiant flauī, Recipe corticem nucis exteriorē, & corticem interiorē ipsius arboris : & coque in aqua, & cum ipsa aqua alumen distemper, & gallas, & cū istis distemperatis caput prius lotum linias, folia superponendo, & cum fascia ligando per duos dies poteris sic colorare. Et pectina caput, ut quod capillis adhæret, tanquam superfluum recedat. Postea appone tincturam quæ fit de croco orientali, sandalis, alcanna, cuius maior erit pars distemperata cum decoctione bresilij, & sic remaneat per tres dies, & quarta die abluatur cum aqua calida, & nunquam de facili remouebitur. Vel accipe radicem chelidoniz & agrimoniz, & rasuram buxi, & superliga stramen auenz : deinde cineres auenz, uel uitis, & fac lixiuum & caput laua. Vel recipe radicem chelidoniz, & rubet maioris, ana partes equales, tere, & cum oleo in quo diligenter ciminum, rasura buxi, chelidonia, & parum croci sunt cocta, distempera : & caput unge, & unctū maneat die ac nocte, & laua cum lixiuio, facto de cinere caulis, & paleæ hordei. Item fecem uipi albi coque ad spissitudinem ceroti cum melle, & unge capillos. Si uis eos habere flauos, prius prædicto modo parentur, ut inueniantur habiles ad tincturam. Postea galle cum oleo ponantur in testam, & comburantur, deinde de puluerizentur : & imponantur aceto in quo positum sit atramentum, quod fit in Gallia, & simul distemperentur. Item ad idem. Puluerem galangæ cum succo nucis misce, & fac bullire, & inde fiat inunctio ad tincturam capillorum. Item flores myrtæ, & gallitri coquantur in aceto, & ungatur caput. sed caueat a ebullit cum oleo, & inde caput ungatur, & cum folijs eiusdem superligetur caput. Item, ut capilli fiant spissif, accipe agrimoniam, & corticem ulmi, radicem uerbene, radicem salicis, abrotonum, semen lini combustum & puluerizatum, radicem canne, hæc omnia decoque cum lacte caprino, uel aqua, & ablue inde locū prius rasum. Item stipites & radices canlium puluerizentur, & cum eis admisceatur rasura buxi uel eboris puluerizata, & ex istis pulueribus fiat lixiuū, quod facit capillos aureos. Item ad capillos longos faciendos, teratur radix althææ cum axungia porcina, & diu bulliat in uino : postea apponatur ciminum bene tritum, & mastix, & uitellâ ouorum bene cocta parum simul miscendo : & postquam cocta fuerint, fiat colatura per pannum lineum, & dimittatur donec infrigidetur. deinde pinguedo supernatās accipiat, & inde caput bene ablutum ungatur. Item ad syrones capillos rodentes, Recipe flores myrtæ, genestæ, gallitri, coquantur in aceto usque ad aceti consumptionem, & inde extrema capillorum assidue fricentur. Hoc idem remouet fissuram capitis ex eo bene abluti. Item lupini amari puluerizentur, & in aceto bulliant, & inde capilli fricentur intra manus, hoc enim syrones expellit & occidit. Cum autē singulare studiū sit mulieribus ornare capillos, & post ornatum capillorum ornare faciem (cuius ornatus si fuerit pulcher, delectat omnes paleat mulieres) pro illarum explenda uoluntate recurre ad proxime narrata. Quod si mulier uelit habere longos capillos, & nigros, accipiat lacertam nigrā, & remotis capite & cauda, decoque in oleo

oleo communi: & tali oleo inungat. caput reddit enim capillos longos & nigros. Experimentum Sarra-
cenicum ad denigrandos capillos. Accipe corticem mali granati, maxime dulcis: teratur, & bulliat in aceto
uel aqua, coletur: & huic colaturæ addatur pulvis gallarum & aluminis, in multa quantitate, ut fiat spif-
sum in modum pultis, & hoc tali, quasi quadam pasta capillos inuoluat. postea fursur distemperetur cum
oleo, & ponatur super ignem in aliquo uase, quousque fursur totum fiat ignitum. hoc tale aspergat radici-
tus super caput, postea madesiat, & iterum caput in eadem colatura prædicta inuoluat, & dimittat per no-
ctem, ut melius inungatur, postea abluatur, & erit totum nigrum. Ad idem. Si mulier multos & nigros ca-
pillos habere uelit, accipe pomum coloquintidæ, abiectis carnibus, oleo lauri impleatur, addito semine ius-
quiami, & modico auripigmenti, & adiungantur sæpe cineres. Si uero molles, & lenes, & subtiles habere uo-
luerit, abluat eos sæpe cum aqua calida, in qua sit pulvis nitri & orobi. Sed ut mulier suauissima & planis-
sima fiat, & sine pilis à capite usque inferius, in primis eat ad balnea: & si non consueuerit, fiat ei stupha
hoc modo. Accipe tegulas, & lapides candentes, & eis in stupha positis sedeat mulier in ea. Vel aliter. Acci-
pe tegulas calidas, uel lapides nigros calidos, & ponas in stupham, uel foueam factam in terra: tunc super-
infundatur aqua calida, ut fumus resoluatur, & super sedeat. Mulier bene circumdata pannis, ut fudet. Cū
que bene sudauerit, intret aquam calidam, & abluat se optime, & sic exeat à balneo, & abstergat se bene cū
pāno lineo. Postea inungat se totam hoc psilothro, Recipe calcem uiuam bene cribellatam, & de ea pone
in uase figuli, uncias IIII. & decoque in modum pultis: postea accipe auripigmenti unc. unam, & iterum
coque, & proba cum penna an sit satis coctū. caue autem ne nimis coquatur, & ne nimis super curem mo-
retur, quia maximum faceret ardorem. Sed si ex psilothro accidat cutem uri, accipe populeo cum oleo ro-
faceo, uel uiolarum, uel cum succo semperniux. distempera applicando, donec sedetur calor, postea inun-
gatur unguento albo, donec cessauerit ardor. Aliud depilatorium. Calx uiua, & auripigmentum in saccu-
lo lineo posita bulliant, donec decocta sint: hanc decoctionem probabis ut superiorem. Si autem depila-
torium sit nimis spissum, appone aquam recentem ut rarefiat, & attenuetur. Nota, quod pulvis eius defice-
ratus ualet ad carnes malas corrodendas, & etiā ad capillos reparandos in capitibus tineosorum. Sed prius
cum oleo uel melle capita eorum inungantur, deinde pulvis superspergatur. Item ut fiat perpetua abla-
tio capillorum, Recipe ostra fornicarum, auripigmentum rubeum, & gummi hederæ, cum aceto: misce, &
inde locum depilandum fricabis. Vnguentum pro nobilibus, quod pilos remouet, cutim subtiliat, & ma-
culas aufert. Recipe succum foliorum cucumeris agrestis, & lac amygdalarum: his in uase positis admi-
sce calcem uiuam, & auripigmentum, subtiliter puluerizata: postea galbanum contusum distemperatum
cum modico uino, per diem & noctem, & cum ipso decoque. quo bene decocto remoueas substantiam gal-
bani, & addas parum olei, uel uini, & argenti uiui. facta decoctione, remoueas ab igne, & puluerem istarum
specierum appone. Recipe masticis, olibani, cinnamomi, nucis muscatæ, garyophyllatæ, omnium istorum
ana partes æquales. Istud unguentum suauiter redolet, & lene est ad mitigandum. Hoc psilothro nobiles
Salernitanæ uti consueuerunt. Cū igitur mulier se totam hoc psilothro inunxerit, sedeat in stupha mul-
tum calida: nec fricet se, quoniam excoariarentur membra eius: sed cū parum steterit, tentabit pilos euel-
lere à pectine: si uero leuiter non cadant, aquam calidam faciat super se infundi, & abluat se totam trahen-
do palmam suauiter. si enim cum impetu fricaret, cū cutis sit tenera, ex psilothro citò excoariatur. Hoc fa-
cto intret aquam tepidam, & bene abluatur, deinde exeat: & tunc accipiat fursur distemperatum cū aqua
calida, & postea colet, & super se fundat. Istud carnem mundificat, & lenit. Deinde lauet se aqua tepida,
& stet parum, ut cutis aliquantulum desiccetur. Postea accipiat alcannam cum albuminibus ouorum, &
inūgat oīa membra. hoc enim carnē lenit: & si qua fuerit uisura ex psilothro, hanc remouet, & lucidam red-
dit & suauem. & sic uncta stet parum, & tandem cum aqua calida abluat se, & postremo panno lineo al-
bissimo inuoluta uadat ad lectū. Post exitum quoque balnei ornet capillos suos, & imprimis abluat
eos cum tali lixiuio. Recipe cineres uitæ combustæ, nodos paleæ hordei, & lignum liquiritiæ, ut melius li-
niant, & panem porcinum: paleam, & panem porcinum bulliant in aqua, de pane, palea & cinere replea-
tur olla, habēs i fundo duo foramina, uel tria parua. aqua, in qua panis porcineus & palea prius decocta sint,
superducta fundatur in olla, ut per foramina coletur. Tali lixiuio mulier abluat caput suum: post ablu-
tionem dimittat siccare per se, unde capilli flauī, & lucidi fiunt. Cū autē pectinauerit se, habeat hunc pul-
uerem. Recipe rosas siccas, garyophyl. nucem muscatam, cardamomum, galangam, hæc omnia puluerizata
distemperentur cum aqua rosarum, & tali aqua aspergat capillos, & pectinet illos pectine, eadem aqua in-
tincto, ut melius redoleant: & fasciculos faciat, & prædictū puluerem superspergat, & miro modo redo-
lebunt. Nobiles, tam uiri quàm mulieres ferant muscum in capillis suis, aut garyophyl. aut utrunque: cau-
te, tamē, ne ab aliquo uideatur peplum, etiam cum quo caput ligatur, ponatur cum garyophyllata, & mu-
sco, & nuce muscata, & alijs redolentibus.

Pro conseruatione corporis humani ab aliquot infirmitatibus, aqua mirabilis effectus.

Cap. LXII.

RECIPE aque uitæ de uino meliore distillatæ lib. IIII. salis usti, lib. II. sulphuris mortui, lib. II. tar-
tari albi, unc. IIII. de carbonibus ligni auellanz, unc. IIII. salis petre, unc. III. Hæc oīa terantur, & cribel-
lentur, & misceantur inuicem: & superinfunde aquam uitæ supradictæ: & ponatur totum ad distillandum.

Operatio eiusmodi Distillationum.

Distillatio prima attrahit uirtutes omnium spirituum, ut nullum animal uenenosum poterit appro-

TROTVLA DE PASSIONIBVS MULIERVM.

pinquare ei. In ea cōseruantur carnes, pisces sicut in balsamo. Facit etiam recedere omnes lentigines, nec non & omnes maculas faciei : ipsamque clarificat. Expellit etiam omnem scabiem corporis : mundificat quoque omnes lacrymas oculorum.

Secunda Distillatio expellit apostemata, & superfluitates corporis. Dentes inualidos expellit, & sanat. Expellit etiam inflaturam hepatis.

Tertia Distillatio expellit omnes maculas, & omnem leprā. Anhelitum foetidum, & omne phlegma stomachi purgat, ut puta cibum indigestum.

Quarta Distillatio expellit sanguinē coagulatum in corpore, similiter & sanguinem refrigeratum.

Quinta Distillatio expellit morbum caducum à corpore humano.

Sexta Distillatio expellit omnes languores & infirmitates ex parte guttæ accidentes.

Septima Distillatio expellit podagram.

Octaua Distillatio præualet balsamo. Quod bene reserues.

Nona Distillatio ualet & reseruat sear : si aurum in ea soluatur.

Decima Distillatio. Si una gutta istius aquæ ponatur in scyphum, in quo sit uinum, & quod scyphus sit deauratus : inuenitur ibi spuma natans supra uinum, quod est purum aurum. Et omne illud quod tingeretur cum eo, est aurum pulchrum.

Notandum tamen, quod post quamlibet distillationē, feces debēt teri & cribellari, sicut in principio.

Aqua alia, seu Balsamus ad idem ferme.

Recipe Terpentinae tribus uicibus distillatæ : ultimò coniunctim, lib. I. ligni aloes similiter tribus uicibus distillati, lib. I. ambrae crudæ, lib. I. muscæ trita super lapidem ad modum liquidi unguenti, cum eisdem superaddito oleo, ut fiat unum corpus. Et distilla nouem uicibus. Balsamum hunc conserua. quoniam ipsum est perfectum, & sustinet.

Primo, omne iudicium ignis & aquæ.

Secundo, manum penetrat.

Tertio, ungendo faciem, iuuentutem conseruat.

Quarto, omnem incisionem consolidat.

Quinto, oculos mire purificat.

Sexto, ungendo cum ea totum corpus, nunquam putrescere ferunt : nec uermes ipsum ascendere.

Hermes philosophus posuit. Et ego feci, & probaui : & est uerissimum.

Aqua alia, per quam medicus mirabilia facit, & quasi propheta reputabitur.

Recipe limaturam argenti, æris, ferri, plumbi, chalybis, auri, spumæ argenteæ & aureæ, storacis, secundū diuitias & paupertates patientis. Ponantur primò in urina pueri uirginis primo die. Secundo die in uino albo calido. Tertio die in succo foeniculi. Quarto die in albumina oui. Quinto die in lac mulieris lactantis puerum. Sexto die in uino rubeo. Septimo in septem albuginā ouorum. Et hoc totum ponatur in Capellam ad lentum ignem : & quod distillauerit, serua in uase aureo, uel argenteo.

De laude aquæ huius est silendum, quia emi non potest. Virtus enim eius palliat leprosos. Lepram enim puram sanat, & destruit, omnem maculam delet, conseruat iuuentutem, oculum pulchrum facit, super omnia, taceo de secreto huius aquæ, quia timeo, ne habentes, superbia extollantur.

Puluis ad conseruationem uisus. Cap. LXIII.

Recipe betonica, ruta, chelidonia, saxifraga, leuistici, pulegii, anisi, cinnamomi, euphrasie, ana M. I. cardamomi, zinziberis, foeniculi, petroselinii, hyssopi, origani, fileris mōtani, ana drac. I. galangæ, unc. I. Zuccari, unc. I. Ex istis fiat puluis, & cum cibo continue sumatur : & uisus recuperatur, & seruatur.

Puluis prædictus ordinatus est per Magistrum Geraldum : cuius probā senex expertus est : qui annis duodecim usus fuit specillis uitreis, ita quod grossas literas sine ipsis uidere non poterat : sed postquam usus est hoc ipso puluere, sola una quadragesima liberatus est : intatū, quod toto tempore uitæ suæ uidit & legit literas minutissimas.

Ad uisum item.

Recipe tutiæ præparatæ, drach. I. Mafficis, drac. V. charabæ, scrup. I. camphoræ, scrup. V. uitrioli albi, scrup. II. fiat puluis omnino subtilis, ut athobol. ponatur in quartam partem aquæ rosatæ optime distillatæ ad solem tribus, aut quatuor diebus, serua in uitro bene obturato : & mane I. uel. II. guttas in hircos, oculorum impone.

F I N I S.

VIRIS ET PIETATIS ET LITERARVM

PROVE^H ENDARVM STUDIO CELEBERRIMIS, IOANNI REINEKE,

ET GVLIELMO RINCO, REI METALLICAE IN ILLVSTRI

COMITATV MANSFELDIANO PRAEFECTIS,

IANVS CORNARIVS MEDICVS PHT-
SICVS NORTHVSEN. S. D.

O MNES quidem bonae artes ac disciplinae; Viri celeberrimi à Græcis utpote acutissimi hominibus aut inuente sunt, aut certe ab alijs quibuscunque gentibus initio dato, per gratiam nationem sic excoltae sunt, ut apud nullas alias prius fuisse uideri possint. Verum uix ulla est alia, quæ & totam se gratiæ debeat, & tota in ipsius lingua adhuc resisteret, quàm Medicina. Tamen si enim non constet quando & ubi primum coepit, & mihi sane uideatur mox cum ipsis hominibus initium sumpsisse, ex naturæ instinctu ad experienda auxilia, contra tot mala ingruentia progressis, non minus utique, quàm alia quædam animantia ad salutaria remedia ex sese agnoscenda ac usurpanda aptis, tamen antiquissimi auctores Medicinæ Græci celebrantur, atque præteritis in præsens Apolline, Aesculapio, Machaone ac Podalirio, ob medicandi gloriam partim ætatis dignis iudicatis, partim non minus in diuina Homeri Iliade celebribus, primum summum artis auctorem ac scriptorem Hippocratem proferemus, cum quo nemo priorum aut posteriorum conferri meretur, utpote qui non, uelut illi quos recensui, uni seculo, sed omni posteritati scriptis suis commodauit, & ad eternitatem medicinam propagauit. Hunc præcesserunt tamen alij aliquot non ignobiles medici ac physici, & in primis Democritus. Insecuti sunt etiam multi, sed maxime clari, Diodes, Anaxagoras, Herophilus atque Erasistratus fuerunt, quorum tamen omnium scripta interciderunt. Hippocratis autem opera haud dubie diuini nominis beneficentia in hunc usque diem seruata supersunt, habentur, leguntur, & in ipsis adeo conseruata restat nobis uera medicina. Velimus enim nolimus fatendum est hunc solum esse & parentem artis & propagatorem, ut caliginosissimo errore inuoluti hallucinentur, quicunque aliunde, quàm ex istius doctissimi uiri scriptis, querendam medicam artem ducant, aut discendam tradant, aut edocti, ut sibi uidentur, feliciter se exercere posse sperant. Negas ergo tu, inquit, aliquis ex illis, quidquam esse apud Latinos homines auctorum, unde medicinam condiscere possimus? & unde accepta medicamina male affectus corporibus prosperè accommodare queamus? An tu Auicennam, Rasim, Auerroem, Albucasim, & quid opus est recensere singulos? tam multos Arabes scriptores insignes medicos, qui hodie in plerisque omnibus gymnasijs regnant, & latine leguntur, nullo loco ponis? & num tot Itali ac Galli medici, tot practicarum (ut appellant) scriptis editis clari, tibi non uidentur medici? & quidem tales, ut ex ijs etiam citra Hippocratis cognitionem ac lectionem, liceat esse medicis, & non uulgo tantum, sed & publicis etiam scholis doctoris titulo insigniri? Ego uero ut non negauerim sic hodie publice medicos fieri, sic constanter asseuero, tales non aliter medicos esse, quàm olim Musicos Timotheus esse iudicabat ab inepris artificibus institutos, nimirum quos omnes artem dediscere cogebat prius, quo apti fierent ad ueram musicam ab ipso discendam; atque id duplicato pretio exacto, cum geminus labor esset, & dediscendi prauam institutionem, & addiscendi ueram artem. Et sane cõsultum esset, ut omnes publicæ scholæ semel agnito errore, omnia tum Arabum, tum Italarum ac Gallorum barbarorum Medicorum opera, aut potius onera, quorum iugo non aliter quàm uilissima seruitute grauissime premuntur, excuterent ac exterminarent, & se Hippocrati uero artis medicæ Timotheo formandos concederent, uisuræ utique essent uel sero tandem, in quantis tenebris uersatæ fuissent, ubi ueritatis lumen ex Hippocrate ipsis illucesceret, ut tum ratione, tum experientia, quæ duo iudicandi de rebus omnibus uelut instrumenta hominibus à natura contributa sunt, constantissimâ & euidentissimâ Hippocratis scriptorum certitudinem cognoscere possint. Sed difficilimum est eos qui se semel alicuius sectæ opinionibus addixerunt, ad ueritatem reducere. At uero non penitus desperandum quando nuper adeo una Florentina academia relapsendi aliquando etiam alijs spem nobis exhibuit, quæ excusso Arabica & barbaræ seruitutis medicæ iugo, ex professo se Galenicam appellauit, & profligato barbarorum exercitu, unum totum & solum Galenum, ut optimum artis medicæ auctorem, in omnibus se secuturam pollicita est, quod cum fecit, non exclusit utique Hippocratem, super cuius scripta uelut firmissimâ basim & solidum fundamentum, omnia Galeni opera sunt extructa, utpote qui omnia quæ tradit, ubique omni arrepta occasione, ad reuerendum illum senem sic enim fere appellare solet referat, eius auctoritate defendat, ut qui primus omnium recta usus sit uia; ad quam proxime quidæ aspirarint Aristoteles & Theophrastus; multi uero alij postea descuerint, aut tandem etiam corruerint; in quibus omnibus refutandis, acerrimum Hippocratis iudicium præstat Galenus; ut nisi Galenus scripsisset, longè uilior Hippocratis gloria apud omnes esset, cum fuerint qui palam hominis doctissimi scripta incesse non erubuerint. Manetque hoc modo, quasi unum coniunctum corpus, Hippocratis & Galeni scriptorum acervus, in quo uidelicet uera medendi ars & ratio, eaque tota comprehensa est, ut præter hos nullis alijs medicis scriptis sit opus. Ingenij, saltem uigore opus est, & linguarum cognitione atque industria diligentia; quibus adhibitis summorum uirorum

EPISTOLA

scripta assequamur. Apud hos enim uelut dixi, græcos auctores medicina nobis restat, sic exculta ac propa-
gata est, ut ad nullos alios potius & maiore merito, etiam ipsam inuentionis gloriam referamus; atque nos
non aliter quam diuinos homines neneremur, ueluti per quos nobis & sana tutandi, & morbida corpora
sanandi ratio diuinitus est ostensa. Et sane hoc sensisse uidentur omnes medici, qui post uerum illū Hip-
pocratis discipulum Galenum scripserunt. Nam & Hippocratem & Galenum ex æquo sibi imitandos
proposuerunt, relictisque omnibus empiricis ac falso se appellantis methodicis, qui ab Hippocratis pla-
citis descuerunt, rationali uia ac methodo ab Hippocrate inuenta & indicata, & a Galeno exculta ac dil-
tata progressi sunt, Tales sunt Orbasius, Actius, Paulus, qui palam professi Galeni nomen, pleraque o-
mnia ex illius scriptis accepta prodiderunt. Porro latinos libenter ad huius cum græcis gloriæ participa-
tionem admitterem, sed nescio quomodo iā Medicina sic abhorruerint, ut nihil extet, quod hunc hono-
rem mereatur, præter unicum Cornelium Celsum; qui tamen & ipse octo libris de re medica editis, in ple-
nisque omnibus Hippocratem ipsum expressit, ut integras sententiarum periodos ex ipso descriptas sub
inde in eo uideas; Imò tota capita nihil aliud quam Hippocratis sententiās ad uerbum reddunt. Plinius
contra Romanam grauitatem uisum esse ait, si instar leuium hominum græcorum, artem medicam exerce-
rent, & hoc quæstu ex immani uitæ pretio facto. Sed & illud addit. Non fuisse futuram aliter quam Græ-
ce tractantibus fidem ac auctoritatem, cum etiam imperti linguæ minus crediderint se iuari ijs, quæ ipsi
aliquo modo intelligerent. Et ipse sane Plinius medicinam ex professo non tractauit, sed ut arbiter, quæ-
dam a se producta æstimauit ac expendit. Quare quò etiam latina res medica auctor redderet, annis su-
mus nuper ipsos græcos medicos latinos facere aggressi in primis optimum auctorem Hippocratem, sed
partim rei difficultate deterri, partim quæ sit ad rem opportunè cōficiendam Mœcenatis fauore ac be-
nignitate destituti, & eodem non longè post fato sublato; ab hac opera destitimus; non tamen ut penitus
hoc seculum desperare iubeam ab Hippocrate nostro latino legendo. Est enim bona pars eius operum
apud me conuersa; sed cui expoliendæ, atque ei quæ superest addendæ, tum anni isti, tum temporum inse-
licitas, in quibus tanta nullius pretij exilium, non sufficiunt. Neque enim expetendum a me puto, ut meo
priuato sumptu hoc otium mihi comparem, quò publica studia iuuentur, quanquam non ignorem, quan-
tam gloriam res ista mihi parere possit; hæc est enim scilicet, quæ ut ingens præmium nobis ab amicis pro-
ponitur; quam tamen ut non ambio, sic non adeo cornea fibra præditus sum, ut nō hinc iucundè afficiar.
Reges ac magnos principes hæc gloria decebat; ἀλλὰ, πάλαι ποτ' ἦσαν ἀλλοιοὶ μάλιστα. Mihi ut priuato, onerosior
quam honoratior existat. Hippocrate itaque relicto, Actium nuper paucis antè cognitum medicum, lati-
num exhibui ferme dimidiatum, addidimus & reliquum, si fuisset exemplaris græci copia, & nisi Italus, qui
dam interpres hoc onere me leuasset, qui partem quam ego nō habui de suo conuersam adiecit; quanquā
hoc ipsum opus uisum quidem nondum possideam, & ex integro moliar nouam cōuersionem; cum etiā
interim dum is hanc operam præstuit, mihi exemplaris græci reliqui copia contigerit. Sed & post Actiū,
suprà tractationem de respiratione, librosque de semine, & uteri dissectione, ac fetus formatione, omnia
a me primū conuersa, non ita dudum insignis opus Galeni de compositione pharacorum secundum
Iocos, Frobenio Typographo obtuli, latinum primum a me factum, & medicis commentarijs nostris addi-
tis illustratum, ex quibus Galeni quidem opus, omnibus Galeni scriptis, imò uniuersæ rei medicæ, uelut
Colophonem addit. Nostri autem commentarij, nisi penitus fallor, aliquot milibus difficultum ac obscuro
rum locorum, tum apud græcos, tum apud latinos medicos intelligendis sufficient, supra institutum hoc
est Galeni librorum κατὰ τόπους expositionem, & in integrum restitutionem. Sed tamen hæc omnia adhuc
non sunt alia quam a græcis accepta; hinc enim seu fonte perenni, Medicorum apollineis ora rigantur
aquis. Quo igitur & latina parte studiosos medicos iuuaremus, en uobis ornatissimi uiri, etiam latinum
αὐτοῦ, ἀπο medicum hunc Marcellum, qui quidem ex suo instituto hoc opus latine prodidit, sed tamen ut
in præfatione fatetur, hinc inde collectum, & præsertim ex latinis auctoribus, utroque, ut inquit Plinio,
Apuleio, Celso, Apollinari, ac Designatiano. sed & Siburio, Eutropioque ac Ausonio, quos proximo an-
te se tempore uixisse testatur, illustresque honoribus & ciues ac maiores suos appellat. Quare ex ijs adeo
uerbis clarescit, sub Gratiani & Theodosij magni Imperatorum ætatem hunc Marcellum floruisse, Gal-
lumque atque adeo Burdegalensem ciuem fuisse. Nam Ausonius medicus Ausonij Poetæ pater sub Va-
lentiniano uixit, & ipse Poeta Gratiani præceptor fuit, cur cōtemporaneum fuisse Marcellum uerisimile
est, imò etiam ἀνέπατρι, quando Siburium Eutropiumque ac Ausonium medicum ciues ac maiores suos
dicit. Sed & Eutropium sub Valentiniano uixisse constat, quanquam presbyterum & diui Augustini di-
scipulum fuisse Volaterranus ex Ptolemæo Lucensi tradat, & scripsisse Epitomen Romanæ Historiæ ab
urbe condita usque ad Iouinianum & Valentinianum Imperatorem; quæ res tamen nihil obstat, quò mi-
nus & medicus fuisse credatur. De Ausonio certè medico, ex Poetæ Ausonij filij Epicedio in patrem fa-
tis constat. Siburius uero, si tamen recte legitur, penitus obscurus existit. Est autem plane Empiricus to-
tus hic Marcelli liber, ex obseruationibus cum aliorum, tum ipsius congestus, adeo ut nec plebera & agre-
stium hominum remedia fortuita inquirere ac prodere neglexerit, atque ea magna ex parte superstitio-
sa, & quanquam Christianum fuisse appareat, cum ex aliquot locis, tum ex eius seculi ratione, tamen mi-
rum quam uana pleraque tradat a gentibus etiam fistulenda, præsertim ubi carmina attexit, & incanta-
tiones penitus ridiculas, aliquando græcas, aliquando lingua ignota, quod nimirum hoc ipsum est, quod
Plinius dixit, homines minorem fidem habere ijs, quæ intelligunt. Eiusdem uanitatis sunt & characteres
quidam peregrini proditi ab ipso amuletis gratiæ ad alligandi, & quædam anulorum sculpturæ gestandæ,
omnino

EPISTOLA NVNCVPATORIA.

ipse Galenus magis empiricos, atque remedia usu cognita probet, quàm methodicos ex ratione inconstan-
 ti ad morborum curationem progredientes, ut sperem, imò certò sciam, etiam rei medicæ studiosos non
 exiguo fructu hoc opus sibi comparaturos ac lecturos, maxime uestris, uiri celeberrimi, nominibus præful-
 gentibus, ac quasi illicentibus, de quibus iam còstans in ijs regionibus fama est, nos nihil nisi egregium ac
 publica commodans probare; & de te quidem Ornatissime Ioannes, frequenter in confabulationibus me-
 minit optimus & prudentissimus uir gener tuus Michael Meienburg-K, huius urbis syndicus, ac amicus
 noster summus, quàm uidelicet integro animo sis erga bona studia & ueram pietatem affectus, ut uel exi-
 miæ uirtutis tuæ gratia sæpe cupiuerim tibi notior esse. In te uero, optime Guilielme, eundem affectum
 cominus & coram etiam cognoui, ut non iniucunda mentio mihi de præclaris uirtutibus tuis apud hõne-
 tissimum iuuenem Casparum Ernestum generum tuum quotidie fere contingat. Magis enim mirum
 uidetur, in uobis adhuc uigere animum ad bona studia amplexanda ac iuuanda propensum, quem olim
 adolescentibus uobis in publicis Gymnasijs excitatum, declarare indies amplius non definiris; & hoc fere
 toti a literis ad rei metallicæ curam digressi ac quasi sequestrati, cum plerique, qui omnem ætatem in pu-
 blicis scholis detruerunt, iam ea ætate, qua uos estis, non solum non fructum aliquem studiorum ex se o-
 stentent, uerum etiam adolescentium studijs inuidentes incommodent; rimentes uidelicet, ne indies am-
 plius ipsorum ignauia, imò ignorantia mundo indarescat, aut etiam solis studiosorum ac doctorum titu-
 lis superbientes, alias uel in aulis magnarum colaces agant, uel caupones sint & pincernæ, sordidum qua-
 stum ex omni occasione captantes. Quare ubi, a curis & officijs, quibus præclare incumbitis, fueritis otio-
 fiores, aliquando ad hunc Marcellum medicum uobis inscriptum & a me dicatum, diuertentes, aut saluta-
 ria medicamenta legere ne pigrescite, aut superstitiosa sua uerter ridere satagite, Meque uestri nominis stu-
 diosum uel de fidicina hac amate. Opt. Valete. Northusa, Calendis septemb.

ANNO. M. D. XXXV.

INDEX MEDICINARVM INFRA SCRIPTARVM.

- Ad capitis omnes subitos & diutinos & multiplices dolores. Cap. I.
 Ad omnes dolores hemicranij & heterocranij subitos & diutinos. Cap. II.
 Ad uertiginem capitis. Cap. III.
 Pityriasi & porriginem, ac pruriginem, atque ulceribus, & lendibus, & pedunculis. Cap. IIII.
 Ad capitis reumata & purgationem, & ad pituitam & flegmatis deductionem, & restrictionem catarr. Cap. V.
 Alopecij, & tineis, & capillo fluenti, atque infirmo. Cap. VI.
 Capillo nigra & crispando, adiecta sunt, quæ phlegmata & perfrictiones capitis deducunt. Cap. VII.
 Ad omnes & multiplices oculorum dolores, medicamina & collyria, & remedia diuersa, physica & rationabilia de experimentis. Cap. VIII.
 Ad aurium dolores uniuersos & uitia omnia, & surditatem. Cap. IX.
 Ad omnia uitia narium, & ad pituitam. Cap. X.
 Vitij labiorum & gingiuis, & oscedini, & oris ulceribus, & foetori, & lingue pustulis & palati exulceratione. Cap. XI.
 Dentium doloribus & uitij eorum uniuersis. Cap. XII.
 Dentifricia diuersa de experimentis. Cap. XIII.
 Vix & faucibus & arterijs & raucedini. Cap. XIII.
 Ad anginam uel synanchem, & strumas, & parotidas, & reumata, & glandulas, & ea quæ faucibus hæserint. Cap. XV.
 Ad omnes molestias tussis, & subitæ, & diutinæ, ac uetustæ, & siccæ atque humide, & ad phthisicos atque eos qui sanguinolentum excreant, & ad empyicos & hæmoptoicos, atque eos qui sanguisugæ hauserint, nec non & stomachi stridorem. Cap. XVI.
 Ad suspiriosos, uel ad dyspnoicos, & ad omnes causas arteriarum, & ad uomitus restringendos & prouocandos, & ad sitim arcendam, & singultus inhibendos, & ad reumaticos & uulsos, remedia diuersa. Cap. XVII.
 Humerorum & ceruicū doloribus, & opisthotonis, & hircosis, & unguibus, & paronichijs. Cap. XVIII.
 Ad lichenem siue mentagram, uel impetiginem, & elephantiasin, & lepram & ad exanthemata, & maculas, & liuores tumoresque de facie abolendos, & ad genas scabras, & cicatrices malarum purgandas, & ad lentigines & stigmata delenda, remedia diuersa. Cap. XIX.
 Ad omnia stomachi uitia, & ad omnes eius causas, & dolores, & ad omnem cruditatem atque indigierem depellendam, & ad omnem uiscerum atque aqualiculi confirmationem, antidota, epithemia, potiones, oxyporia, unctiones, aliaque remedia nonnulla. Cap. XX.
 Cordis dolori & corco & præcordijs omnibus. Cap. XXI.
 Ad hepatis uitia omnia, & molestias uniuersas. Cap. XXII.
 Ad lienis uitia omnia, & molestias cunctas. Cap. XXIII.
 Pleuriticis & omnium laterum doloribus. Cap. XXIII.
 Lumborum & coxarum doloribus ac torporibus, & ischiadicis remedia. Cap. XXV.
 Renij & uescicæ doloribus & causis uniuersis, & calculo, & urinz difficultatibus, nec non & urinz incontinentiæ. Cap. XXVI.
 Coeliacis & dysentericis, & torminosis, & ad intestina rupta, internosque morbos, atque incontinentiam stercoris, remedia diuersa. Cap. XXVII.
 Lumbricis & tineis & interaneis causis, id est, tenesmo, & ad rosus uentris, & strophum. Cap. XXVIII.
 Ad colum & ileon remedia diuersa. Cap. XXIX.
 Ad uentrem resoluendum, nec non & choleram proijciendam atque inhibendam, sales & potiones & cataporia diuersa. Cap. XXX.
 Ad ani uitia, & fistulas podicis, & hæmorrhoidas. Cap. XXXI.
 Paniculis & inguinibus & intertriginibus. Cap. XXXII.
 Capariz & uerendis uirilibus uniuersis, & herniosis siue uiris siue infantibus, & rebus uenerijs, & eunuchis siue ferro faciendis. Cap. XXXIII.
 Genuum doloribus, & crurum ac tibiæ ulceribus, & uaricibus, & callis pedum, atque clauis, & uerrucis, & plantis, & pollicibus, & talis, & articulis, & pernionibus, & ruptis pedibus, & condylomatis neruorum atque articularum & ad extrahenda quæ casu calcata fuerint, uel quæ corpori inhæserint, diuersa remedia. Cap. XXXIII.
 Neruorum uitij ac doloribus omnibus, & arthritidi, ac paralyfi doloribusque medullarum, remedia diuersa. Cap. XXXV.
 Ad podagram calidam & frigidam, & chiragram remedia physica & rationabilia diuersa de experimentis, ut in alijs omnibus infirmitatum causis supra scriptum est. Cap. XXXVI.

Notis ponderum ac mensurarum Marcellus ijs utitur.

Θ

Α

Β

scrupulum
uictoriatum

pondo
sextarium

*

—

Ε

denarium
unciam

semunciam
semissem

MARCELLVS VIR INLVSTER EX

MAGNO OFFICIO THEODOSII SEN. FILII
SVIS SALVTEM DEDIT.

ECVTVS opera studioforum viroꝝ, qui licet alieni fuerint ab institutione medicinae, tamen huiusmodi causis curas nobiles intulerunt, libellum hunc de Empiricis quanta potui solertia diligentiaque conscripsi, remedium Physicorum siue rationabilium cōfectionibus & adnotationibus factum unde unde collectis. Nā si quid unquam congruum sanitati, curationique hominum uel ab alijs comperi, uel ipse usu approbau, uel legendo cognoui, id sparsim inconditumque collegi, & in unum corpus, quasi dissecta & lacera Aesculapius Virbij membra, composui. Nec solum ueteres medicinae artis auctores: Latino dimittam sermone perscriptos (cui rei operam, uterque Plinius, & Apuleius, & Celsus & Apollinaris ac Designatianus, aliique nonnulli etiam proximo tempore inlustres honoribus uiri, ciues ac maiores nostri, Siburius, Eutropius, atque Ausonius commodarunt) sed etiam, ut sciret, didici. Quorum uobis copiam labore nostro uigiliaeque faciendam, mihi dulcissimi, pro necessitate infirmitatis humanae, piissimum duxi; orans primum diuinam misericordiam, ne uobis uestrisque experientia huius libelli necessitas ulla nascatur. Tum si qua fuerit prospicienda salutaris & tuenda ualitudinis causa, gratulemini super hac re, labori studioque nostro; quod uobis absque medici intercessione, opem necessariam curationemque praestabit. Cuius scientiae beneficia, uice mutua caritatis humanae, cum omnibus infirmis amicis, notis, ignotisque, immo uero cum aduenis magis & pauperibus communicare debetis; quia & deo acceptior, & homini laudabilior misericordia, quae egro hospiti ac peregrino egenoque defertur. Moneo sane, si qua fuerint paranda medicamina, ne absque medico, aut incuriosius componantur, aut indiligenter habeantur. Nam licet attentissime species & mensuras specierum remedijs quibusque adscripsero, & ipsarum mensurarum notas, uel ponderum qualitates secundum Graecam traditionem & medicorum ueterum consuetudinem, seorsum libello huic inseruero, & non solum Romana sed etiam Graia expositione digesserō; tamen e re est, ut haec eadem cum peritionibus conferantur, ac saepius retractentur; & quae confecta fuerint, uel parata medicamina sub signaculis semper habeantur, ne aut casus incidat, aut malignitas alicuius obrepat, quae beneuolae & sincere parata corrumpat, sitque de remedio uenenum; & de salubritate perniciēs; elpeterque medicina, cum peccarit incuria. In summa, me haec benigne parasse, & tamen super ijs monuisse sufficiet uos, perinde sanitati uestrae, atque opinioni meae cōsuluille conueniet. Epistolas quoque eorum, quorum studium & amulam me esse scripsi, huic operi ne quid deesset, adieci; quarum lectio & incitare uos ad necessariam cognitionē, & instruere poterit ad salutem. Verficulis quoque lusum, migmarum & specierum digestionem compositis. Non quod sit dignum aliquid in carmine, sed ut lectorem, scrutatoremque huius operis & poemata pelliciat, & exoptatio blanda conciliet, quod opusculum in infima parte huius codicis collocaui, & ut sermone nostro opera haec solertia nostra composita claudantur, & nugas nostras multiplex foliorum celet obiectus.

De mensuris & ponderibus medicinalibus ex graeco translatis, iuxta Hippocratem.

NCIA habet drachmas numero VIII, scrupula XXIII. Mina habet lib. I. uncias II. Cheme habet sicut drachma, 3 III. Obolos habet denarius VI. Cotyla hemina facit acetabula siue oxybapha IIII. Olyscion facit hemine partem septimam, quod facit I & drachmas II. Cotylōs habet IIII. quod facit cyathos II. & cochlearia VI. Item Cotylus triunciarius habet hemine tertiam partem. Tetrobolon est quarta pars heminae. Chocnix sextarij duo sunt. Stater est quod metitur drachmas IIII. Est autem quanta semuncia. Denarius est argenteus drachma I. quod facit 3 III. Vi storiatus denarius dimidia pars drachmae est. Obolus minor drachmae sexta pars est. Cyathus pars octaua sextarij, sed ad pondus drachmarum pars decima est. Cochlearium, dimidia pars drachmae est. Tetrafarius semuncia est.

Item de ponderibus & mensuris medicamentorum, ex libro X X I Plinij historiarum naturalium.

Drachma attica denarij est argentei pondus. Drachma eadem habet in pondere obolos VI. Obolus habet chalcos X. Cyathus pendit drachmas X. Acetabulum, quod dicitur, habet heminae quartam partem. Hemina habet drachmas numero LX. Mina quam nostri minam uocant, pendit drachmas atticas centum.

Mensuras quoque ipsas Graecorum de medicinalibus ponderibus addidimus, quae sequenti pagina continentur, ut in huiusmodi rebus, si uisum fuerit, de fonte, quod aiunt, ipso petatur auctoritas.

Περὶ μέτρων καὶ σαδμῶν.

ἡ μὲν ἔχει ὀκτώ· ςξ
 ἡ λίτρα ἔχει οὐγγίας· ιβ
 ἡ οὐγγία ἔχει ὀκτὼ· η
 ἡ ὀκτώ ἔχει γράμματα· γ
 τὸ γράμμα ἔχει ὀβολοὺς· ε
 ὁ ὀβολὸς ἔχει κεράτια· δ
 τὸ κεράτιον ἔχει χαλκοὺς· ε
 ὁ μέδιμνος ἔχει ἡμίκτα· ιε
 τὸ ἡμίκτον ἔχει χους· ε
 ἡ χους ἔχει χοίνικας· ε
 ἡ χοίνις ἔχει κοτύλας· δ
 ἡ κοτύλη ἔχει ἡμίεσσον· ε
 τὸ τρύβλιον δὲ κοτύλη ἐστὶν α' πῶς·
 τὸ δέξβαφον δὲ τέταρτον ἐστὶ κοτύλης·
 ὁ κιάθων ἔκτον ἐστὶ κοτύλης·
 ἡ χίμη α' γὰρ ὀκτὼ μίαν·
 ἡ ἐλλάνω κοτύλη τοῦ ἐλαίου ἔχει· λ. α.
 ὁ δὲ ἔξτης· λ. β. ὁ δὲ ἰταλικὸς ἔξτης· λ. α. γ.
 ὁ δὲ ἄλλος οὐδ' ὅτι καὶ ἡ ἰταλικὴ κοτύλη ἔχει· γο. β.
 ἡ δὲ ἀλεξανδρινὴ κοτύλη ἐλαίου μὴ ἔχει· γο. η.
 οἶνου δὲ· γο. δ.

Τὸ κεράμιον ἔχει
 ἐλαίου οἶνου μέλιτος
 λ. ο. β. λ. π. λ. ςκ.
 τὸ κόγγιον ἔχει·
 λ. θ. λ. ι. λ. ιε.
 ὁ ἔξτης ἔχει·
 γο. ιη. λ. α. γο. η. λ. β. γ.
 ἡ κοτύλη ἔχει·
 γο. θ. γο. ι. λ. α. γο. γ.
 ὁ κιάθων ἔχει·
 γο. α. γ. γο. α. γ. γο. δ. γο. β. γ.

EPISTOLAE DIVERSORVM, DE QUALITATE ET OBSERVA-
 TIONE MEDICINAE. LARGIVS DESIGNATIANVS

FILIIS SVIS SALVTEM DICIT.



EGI ante hac Hippocratis Coi Epistolam medicinae auctoris uel peritissimi, quā de tuenda ualitudine ad Antiochum regem scripsisse fertur; cuius quia praecepta & monita uobis ad salutis custodiam nota cuperem, collegi ut potui, quidquid seriem eius continere meminera, eamque ore Romano interpretans scripsi. caui fateor ne ad uerbum uerba transferrem, quod minus pleraque linguarum diuersitate congruerent, si parum ponderis in significationibus ueris fieret, itaque explicandae rei aduersus obscuritatem consului. Igitur Epistola talis est.

ANTIOCHO REGI HIPPOCRATES COVS SALVTEM D.

Eam re in hoc regnandi munere & culmine reputans sustinere personam, ut rex magnus uita multis utilem in longum prouehere debeas, ingentem simul prouidentiae tuae metiens curam, qua experientissimus rerum, mathesim quoque apprime adeptus es, conuenire talibus regalis peritiae studiis arbitratus sum, domesticam quoque tuendi corporis & procurandae ualitudinis scientiam, super cuius obseruationibus ad te scribendum putavi, ut & quibus causis morbi existerent, & quibus praenoscerentur indicijs, & qualibus inter exordia perimerentur medelis ostenderem. Nam fere ut caeli turbulenta tempestas nunquam nisi praecedentibus solet signis ingruere, ita corporum imminetia pleraque incommoda, ortus proprijs significatione monstrantur. Spondeo autem pro ingenita docilitate, qua nostram quoque super ijs rebus solertiam probas, monitis meis auscultantem, posse te reliquum uitae tempus firma ualitudine & plena incolumitate producere. Corporis igitur humani sit a nobis quadripartita diuisio, cuius in partibus singulis ualitudinum moderatio continetur. Sunt autem partes haec, cum capite, oris sublimitas, pectoris

Regis uita multis

mathesis

Tuenda uale

ut ostendit

signa, curat

ut ostendit

monitis

pollicitatio salu

dico ostendit

latebra, uentris receptaculum, sentina uesicæ. Si capiti igitur eueniet incommodum, aut tenebræ offunduntur, aut cietur dolor, aut onusta quasi pondere supercilia sentiuntur. Aut fit temporum pulsus assiduus, aut tumescuntibus manebat oculis caligat aspectus, aut aures tinnunt, & accepto quodam interius tumultuantur sono. His ergo signis existentibus, caput est purgatione curandum. Sed super huiusmodi tamen leniore medela hyssopi uel origani indici coma iniecta defuncto sine mulse quæ septem uel plusculis diebus maceratur. De quo liquore postmodum coagitato atque colato tepido heminæ dimidium, aut ampliore modum gargarizari oportet die calido uel sereno, ita ut resupinato ore faucibus liquor ille contineatur aliquantulum, & agitur altera uice, idque sæpius fiat, donec heminæ dimidium consumatur, uel cum phlegmate proijciatur, sed hæc ieiunio adhibenda curatio est, quæ nulla capiti leuior aut commodior reperitur. Hoc remedium qui neglexerit, & indicij supra scriptis non occurrerit, necesse est sentiat aut oculorum uiria, aut ulcera intus auribus erumpentia, aut strumas in confinio colli, aut pulsus cerebri, aut suffocationem, aut circa guttur anginam, aut uicē defillationem, glândulas quoque patietur, & tabem fluentium capillorum, & ulcera per caput effervescentia, doloremque dentium creberrime. Quod si a pectore morbus minatur, qui esse simplex & non uolentissimus solet, ijs præsentitur indicij. Primum pectoris sudor intus testatur æthum stomachi laborantis. Splen erit quasi distensus & eminens, sputamentum fellitæ, scapulae cum lateribus grauabuntur, & improprio dolore marcescent assidue orationes ora deducunt, importune uigilæ somnos fugabunt, æthere spiritus siti nocturna maxime inardescet, expergescit mens erit tristis & nubila, post soporem, totius pene corporis pulsus, tremor in brachijs uel in manibus, sicca etiam tussis quatiet infirmum. His igitur sapienter occurratur, si consuetudo fiat sine ullo medicamine post coenam uomendi. Vtile autem est etiam ieiunium uomere, magis enim humor noxius qui stomacho infiderit egeritur. Itaque qui manebat uomiturus est, debet minutatim rasari radices manducare, easque uel succum earum transmittere, cardamum quoque, id est, nassurtium sed & sinapi, & erucam deuorare, & aquam inde tepidam super bibere, ac digito uomitum pronocare. Qui ista contempserit, erit ijs obnoxius utriusque pulmonis labore uexabitur, frenum sustinebit, atræ bilis infesta commorietur, ad usque uel sani eum furoris periculum trahet, iactabitur febribus acutis, inops somni agitabitur perniciosus uigilijs. Si quando autem morbus a uentre molitur, qui & ipse multiformi grassatur incommodo, hæc signa præmittit. Torquetur alius & correptos cibos immoderatis fluoribus fundit. Potus in amaritudinem uentitur, membrorum omnium existunt dolores, causa latente grassantes, nimis feriet ruboribus corpus, & acutis atque occultis febribus inardescit. Aduersum hæc uenter est molliendus sine grandi cura aut graui medicamento. Nam qui lapathum uel mercuriali herba usus fuerit, commodè aluum temperabit. Si parum proficiet hæc medela, & supra dicta indicia perseuerabunt, decoctus uicæ succus potui dabitur. Vtiliter accipiuntur & cymæ caulium multa aqua uehementer excoctæ. Etiam brassicæ humor melle admixto, & asperso sale temperatus bibi debet ad heminarum quatuor modum. Qui hæc adhibere cessauerit, ijs patebit iniurijs, ut aut coeliacus fiat, aut meatibus ruptis immoderato uentris fluore uexetur. Hinc dysenteria oritur & iliacus morbus, & ad superiora finis redundans uomitibus & empneumatis inficiet. Hinc ischijs passio erit dolorque coxarum, apoplexis etiam ijs originibus existet, hinc & sanguinis per interiores meatus, id est, per hemorrhoidas, fluxus multus emanat, articulorum quoque morbus, quem Græci arthritim uocant, istinc creatur. Cum uero ex uesica imminet origo uitiorum, & ipsa non minus causis pluribus nocens, ijs significationibus intelligitur; inflatio uesicæ adest; solet enim in eam multus ex alui meatu uentus immitti, inde assidua ructatio, inde incontinentes crepitus egeruntur, inde grauis somnus, inde urina sordida & diri odoris egeritur, & circa genitalia tumor surgit. His ergo animaduersis, tali subueniendum medela; feniculi & apij radices uino condito ueteri & odorato iniicies, & cum se hæc confusa macerauerint, cum uini cyathis duobus tantundem miscebis aquæ calidæ, & ieiunio potui dabis. Præterea radicis asparagi succus cum uino mixtus, optime sumitur, sed & ciceris albi non arietini decocti succus accipitur, ex hac ualitudine nisi in exordio curatio adhibita fuerit, per urinae difficultatem & hydrops nascitur, & dolor iecoris, & uiria renum, & stranguria uesicæ, uentrem molestissimi dolores uexabunt. Hæc sunt de prænotandis præueniendisque morborum causis. Addidi etiam, quibus, & quatenus per anni circulum pro temporum uariatione obseruatis, incolumitas custodiantur, ab hyeme igitur salubrius fiet exordium. Ex die VIII calen. Ianuarias corporibus humor accrescit usque ueris æquinoctium, quod incipit VIII calen. Aprilis. Hoc ergo tempore utendum calidissimis cibis, & optimis, uino aliquatenus indulgendum, usus etiam ueneris minime respuendus. Ex æquinoctio incipit phlegma crescere, id est, concretus humor & frigidus usque in ortum pleiadum, qui incipit pridie Idus Maias, ergo tum adhiberi cōuenit bene odoratos, sed & acres cibos, ex hinc sanguis ardentior febribus augmenta supeditat, nec minus humor obbibitur, usque ad æstiuæ temporis commutationem, quæ ad VIII calen. Iulias inchoatur, a quo die uenere abstinendum ieiunandumque. Ab octauo enim calen. Iulias æstiuæ progressio incrementa fellis exulscitat usque in autumnæ æquinoctium, quod est VI calen. Octobris, erit igitur utendum frigidis & sapidis & bene olentibus cibis, parcius ieiunandum, & a uenereo usu, ab VIII calen. Iulias certe per dies duodecim penitus abstinendum. post autumnæ æquinoctium, id est post diem VI calen. Octob. acres biles uires & augmentum sortiuntur, in occasum pleiadum, qui est III Idus Nouemb. humores etiam graues serpunt. Erunt igitur utendum acidis & acerbis cibis, uenere quoque abstinendum, parcius etiam ieiunandum. Ab hoc rursus tempore, id est, a III Idus Nouembris sanguis deficit, congruit igitur leuioribus cibis uti, uino indulgere, nec usum ueneris abstinere, in VIII

signa morbi. 4.
signa morbi. 4.
signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

signa morbi. 4.

Admonitio.

Admonitio.

1900 m. 10. 3. 4.
aquatic.
leafy stems
in water.
fls. 8.
leaves 1/2 inch
long.


2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845

[illegible]

S^r Epistol. n^ol. S^rppositi^o pagit
 in q^o scribitur, q^o n^ol. in
 * Dono S^rnoh^o q^o n^ol. in
 n^ol. q^o n^ol. in q^o n^ol.
 in q^o n^ol. in q^o n^ol.
 in q^o n^ol. in q^o n^ol.

apium uino austero madefacto, uel etiam earum herbarum radices contere, & ex uini cyathis duobus, & tantundem aquæ calidæ accipe adfiduè, uel dauci semen, & myrtum ex aqua calida fume, uel cicer album fume non arietinum, madefactum uino, ut supra scripsi, ebibe, uel radicem asparagi, uel erium erraticum, uel serpillum decoque, eiusque aquam uino mixtam bibe. Quæ qui negligunt, fiunt hydropici. Sequitur uis iocineris & renium & uelicez dolor. Fient quoque calculosi, stranguriam quoque sustinebunt, & uentris tumorem. Inueniri autem oportet ægri uires, quomodo possit sustinere medicinam, ut ita febri & cruditati eius adhibeatur. fiunt ergo cataplasmata adhibenturque, quæ apta sint capiti, uentri, uelicez, cruditati, frigori, calori, pro ut tempus exegerit. uri autem ad hæc oportet rosa, aceto, uino, oleo rino, linguam quoque ægri asperam melle perficari, uel mentæ folio. reliqua diligenti medico permittenda sunt, quia iuxta morbos debet adhibere medicinam. Quoniam ostendi corporis sani & imbecilli notas, per urinam denunciari, & adieci curationum consilia, nunc & compositiones medicamentorum adiciam; unum, ne nascantur corpori uitia, alterum, ut emendatio sanitatem reducat. Aduersus autem omnes impetus morborum duo sunt remedia certissima. Primum est, decimo quoque die ut te abstineas a cibo & portione. Deinde postero die laueris ciboque firmo uteris; quare & obseruatione efficies, nequid omnino uitij corpori tuo accadat, & perpetua sanitate sis tutus. Est & potio salubris, quæ omne corporis uitium elimat, & ualitudine confirmat. Eius portionis iam tecum habes compositionem, per annos enim complures amicissime Mœcenæ, cum Cæsare nostro pariter nos morari meministi; quo tempore hæc obseruando, nunquam in ullum corporis languorem incidisti. Quo tempore nec nostrum Augustum, quidquā molestius incommodi passum esse nosti. Ita enim me tecum habebis, si libellum meum legendo sæpius tractaris, qui plenius tibi me absente præstare consilium in omnibus poterit. Terentij Velpisi in ultimo libello leges dynames herbarum, quas ut crescentibus numeris Lunæ obserues, dum tollis & componis, curato. Si ita non feceris, & ad deminutionem Lunæ sustuleris, minus ualebunt. Ipsum etiam mare per Lunam augeri & minui scimus, cerebra etiam hominum augentur crescente Luna. Cum autem minuitur Luna, una quæque res deminutionem sentit; quod licet recognoscas, ex ijs quibus cotidie uteris: Tamen & per me admonitus, scies, omnibus & minui augmentum & augeri per lunam, quod si ita est, in herbis quoque legendis, componendisque medicamentis, uim eius & potestatem nos obseruare debere, ne dubites.

EPISTOLA PLINII SECUNDI AD AMICOS DE MEDICINA.



REQVENTER mihi in peregrinationibus accidit, ut propter meam aut meorum infirmitatem, uarias fraudes medicorum experier, quibusdam uilissima remedia ingentibus pretijs uendentibus, alijs ea quæ curare nesciebant, cupiditatis causa suscipientibus; quosdam uero comperi hoc genere grassari, ut languentes qui paucissimis diebus uel etiam horis possint sanari, in longum tempus traherent, ut & ægros suos diu in reditu haberent, & seniores ipsis morbis existerent. Quapropter necessarium mihi uisum est, undique ualitudinis auxilia contrahere, & ueluti in breuiarium colligere, ut quocumque uenissem, eiusmodi insidias uitare, & hac fiducia securior iter ingredi queam, ut & sciam, si quis mihi languor acciderit, non facturos medicos ex me uel ex meis reditum, nec taxaturos in commodorum occasionibus sanitates. Ante omnia autem puto in prompto habenda, quæ subito desiderata, difficillima uidentur inuentu; sicut oleum uetus, quod si ad manum non erit, celerissime fieri poterit. Deseruefactum enim, uel recentissimum, & odorem & uires uetustissimi præstat. Et, si forte curatio exegerit, aquam marinam in mediterraneo quæri, sollicitudini locus non erit, si ita prospiciatur; duo enim salis sextarij in quatuor aquæ sextarios missi, temperatissimam marini liquoris copiam facient. Oxymeli uero facile erit fieri, si in duobus cyathis mellis sextarius aceti addito pulegio & salis modico contemperetur. Polenta autem hoc modo fiet. Hordeum aqua perflutum, una nocte siccatur, deinde ad X. X. libras hordei adiunguntur tres libræ lini seminis, coriandri selibra, salis acetabulum. Tunc deinde hæc mixta torrentur, & mola franguntur. Omnibus autem curationibus mel optimum est, in quo apes moriuntur; & lana succida ea bona est, quæ de ouis collo fuerit adtonsa. Cinerem autem uel aliorum animalium desideratum sic fieri oportet; in ollam nouam mittitur uis, aut quodlibet aliud animal, quod putaueris exurendum; quod addito operculo, circumlitoque argilla, in furno feruenti torretur, spiramento per modico facto. Gargarizationes uero omnes calidæ utendæ sunt, sicut & fomenta, ut medendi ratio & usus ostendit.

Alia Epistola sane uerecundè & erudite,

CORNELIUS CELSVS, CAIO IULIO CALISTO SALVTEM D.



INTER maximos quondam habitus medicos Herophilus, Cai Iuli Caliste, fertur dixisse, medicamenta deorum immortalium manus esse; non sine ratione, ut mea fert opinio, probata. Animaduertimus itaque sæpe inter deliberationes contentionesque medicorum auctoritate præcedentium, dum quaeritur, quid nam faciendum, aut qua ratione succurrendum

rendum sit ægro, quosdam humiles quidem & alioqui ignotos, reuera peritiores uel quod fateri pudet, longè summoros a disciplina medicinz & ne aliis quidem eius professioni medicamento efficaci dato, protinus uelut præfenti numine, omni dolore periculoque liberasse ægros. Quamobrem spernendi sunt quidem, qui medicinam spoliare tentant usu medicamentorum, forsitan non a medendo, sed a potentia effectiue medicamentorum ita appellatam. Probandi autem sunt, qui omnimodo succurrere periclitantibus student. Ego certe aliquoties magnum seculum consecutus sum, ut uisum ex usu prospere datum medicamentorum, multosque ex eadem causa non mediocrem gloriam tulisse memini. Est enim hec pars medicinz uel maximè necessaria, certè antiquissima; & ob hoc primum celebrata atque illustrata. Siquidem uerum est antiquos herbas ac radices earum, corporis uitia curasse, quia timidum genus mortalium inter initia non facile se ferro ignique committebat. Quod etiam nunc plerique faciunt, nedicam omnes. Et nisi magna compulsi necessitate ipsius salutis, non patiuntur sibi fieri, quæ sanis uix toleranda sunt. Cur ergo aliqui excludant medicinam de usu medicamentorum, non inuenio, nisi ut detegant imprudentiam suam. siue enim nullum experimentum eius generis remediorum habent, merito accusandi sunt, quod tam negligentes in tam necessaria parte artis fuerint; siue experti quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt; quia crimine invidentia flagrant, quod malum cum omnibus animantibus inuisum debeat esse, tum præcipue medicis; in quibus nisi plenus misericordie & humanitatis animus est, secundum ipsius professionis uoluntatem, hominibus diisque omnibus inuisi debent esse. Idcirco ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicinz legitime est obligatus. Sed persequetur eos, cum res postulauerit, ut militans & ciuis bonus omni modo; quia medicina non fortuna, neque personis æstimat homines, uerum æqualiter omnibus implorantibus auxilia sua per recturam & succursuram se pollicetur, nullique inquam nocituram proficetur.

Hippocrates conditor nostræ professionis, initia disciplinz a iureiurando tradidit, in quo sanctum est, ut ne prægnanti quidem medicamentum, quo conceptum excutitur, aut detur aut demonstretur a quoquam medico, uidelicet longè præformans animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nefas existima uerint, spe dubia homines lædere, quanto scelestius perfecto iam nocere iudicabunt? Magni ergo estimauit nomen decusque medicinz conseruare, pio sanctoque animo quemque secundum ipsius propositum se gerentem, scientia enim sanandi non nocendi est medicina. quæ nisi omni parte sua plene excubet in auxilia laborantium, non præstat quam pollicetur hominibus misericordiam. Definant ergo, qui prodesse adfluctis aut nolunt, aut non possunt, alios quoque detertere, negando ægris auxilia, quæ per uim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibus, ratione aptoque tempore datus, tentat prodesse languentibus. Deinde si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum decurrit uim. Potentiora enim hec & efficaciora, quam cibi. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt difficultates aduersæ ualitudinis, tunc coacta ad sectionem, uel ultimum ad uisionem uenit. At Asclepiades maximus auctor medicinz, negauit ægris danda medicamenta. Quidam enim hoc mendacio etiam pro argumento utuntur. Poteram tamè, si uerum id esset dicere, quid Asclepiades senserit, forsitan non omnino in hanc partem animum intendit. Homo sanè fuit, qui parum feliciter se in hoc negotio gessit. Itaque non deterreor persona, cum re manifesta prodesse uideor. Nunc uero cum tam impudenter quidam de eo mala comminiscantur, quid possum ultra dicere, nisi quodammodo parricidium ac facilegium eos committere, qui hæc dicunt. Ille enim febricitantibus uitijque præcipitibus correptis, quæ oxypathe Græci dicunt, negauit medicamenta danda, quia cibo uinoque apte interdum dato, remediari tutius eos existimauit. Ceterum in libro, qui Parascuon id est, præparatumque compositiones & expertas & protinus paratas habeat. Vides ergo, quam non placeat Asclepiadi usus medicamentorum? cui nisi plura ad unum quodque genus uitij, medicamenta composita habeat, non uidetur dignus professione medicinz. Sed ista licentia, nomine tantummodo medicorum propter quorundam negligentiam latius processit. Raro enim aliquis priusquam se luosque tradat medico, diligenter de eo iudicat, cum nemo ne imaginem quidem suam committat pingendam, nisi probato prius artifice per quosdam experimenta, atque electa habeat, ne omnia pondera ac mensuras exactas, ne quid errorum in rebus necessarijs accidat. Videlicet quia sunt quidam, qui pluris alia quam seiplos æstimant. Ob quod sublata est unicuique studendi necessitas, & non solum antiquos auctores per quos consumatur professio, quidam ignorant, sed etiam comminisci falsa de ijs audent. Vbi enim defectus non est personarum, sed eodem modo malus bonusque habetur, disciplinz ac sectæ observatio perit, quodque sine labore potest contingere, & in quo dignitatis atque utilitatis præstare uidetur æqualitas, id unusquisque magis sequitur. Atque ut quisque uult, facit & medicinam. Quosdam enim a peruerso proposito nemo potest mouere; & sane omnibus permittit liberum arbitrium magnitudo professionis eius. Multos itaque animaduertimus unius infirmitatis sanandæ scientia, medici plenum nomen consecutos. Nos uero ab initio rectam uiam secuti, nihil prius in totius artis perceptione, quam homini permittitur, iudicauimus. Quia ex hac omnia comoda consecuturos nos existimabamus, non mediis fidijs tam pecuniæ aut gloriæ cupiditate, quam ipsius artis scientiæ. Magnum enim & supra hominis naturam duximus, posse aliquem tueri, uel recuperare suam & unius cuiusque bonam ualitudinem; itaque ut cæteris partibus disciplinz, ita huic quoque, quæ per medicamenta uirtutem suam exhibet, curiose insitimus, eò magis quod percipiebamus indies ex usu profectus eius,

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus


Medicamentorum vsus

Medicamentorum vsus

quos interdum supra fidem atque opinionem plurimorum exhibebamus. Sed quid ultra opus est probare, necessarium usum esse medicamentorum? præcipue tibi, qui, quia percepisti utilitatem eorum, idcirco a me compositiones quasdam petisti. Ego autem memor humanitatis tuæ, candorisque animi tui, quem omnibus quidem hominibus plenissime, mihi etiam peculiariter præstas, non solum quæ desyderas remedia, uerum etiam si qua alia de expertis in præsentem habui, in hunc librum contuli, quem ad te misi. Cupio enim mediis fidius quæ possum tuæ in me tam perseveranti benevolentie respondere, adiutus omni tempore a te, præcipue uero istis diebus, ut primum enim potuisti, non es passus cessare tuæ erga me pietatis officium, tradendo scripta mea latina de medicinalibus nostro Cæsari. Quorum potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres, simpliciterque indicares mihi quid sentiret de ijs. Plurimum enim iudicio tuo tribuo. Tu porro candidissimo animo & erga me benevolentissimo, dignos nomine editionis, non uerbis, sed re probasti; periculumque non minus tui iudicii, quam ego stili, propter me adisti; quo tempore diuinis manibus ea tradendo cōsecrasti. Fateor itaque me gratias tibi agere, quod & prius quam rogares, cōsummati amicissimo affectu uota mea, & quod contigit mihi fauore tuo, maturiorem percipere studij huius mei fructum ac uoluptatem. Ignosces autem, si pauca tibi uisæ fuerint compositiones, & non ad omnia uitia scriptæ; sumus enim, ut scis peregre, nec sequitur nos nisi necessarius admodum numerus libellorum. Postea autem, si & tibi uidebitur ad singula quæque plures compositiones colligemus. Oportet enim copiam quoque earum selectam habere, quoniam reuera quædam magis quibusdam, & non omnes omnibus conueniunt, propter differentiam scilicet corporum & affectionum, quarum iniriū a capite faciemus; summum enim & quasi primum locum hoc obtinet, dantes operam, ut simplicia remedia prima quæque ponamus. Interdum enim hæc efficaciora sunt, quam ex pluribus composita medicamenta. erit autem nota denarij pro Græca drachma; æque enim in libra denarij LXXXIII apud nos, sicut drachmæ apud Græcos incurrunt.

Alia Epistola eiusdem Cornelij Celsi.

CORNELIUS CELSVS PVLLIO NATALI SALVTEM D.



ECTIS duobus libris compositionum græcis, Pulli Natalis, quos misisti mihi, ut in latinum sermonem conuerterem, libenter parui tuæ uoluntati, dignos eos existimans, quibus operam impenderem; quos plenos utilitatis comperi; alioquin excusassem, ni me propositum haberet, nihil non dignum sublimi Romanorum maiestate, de bono medicinz artis splendidiſſime scribere, idque perennitati & litteris mandare. Habebit ergo & præsens tempus & futura posteritas, in hoc perpetuæ uoluntatis meæ, quæque gratissimum munus; si quidem bona ualitudine nihil est pulchrius. dedi autem operam, quantum potui, ut ad uerbum transferrem, quæ in græcis medicinalibus reperi, nec necessariam curam cultus orationis putaui; quia rectius duxi proprietates nominum edere, & rem ueram sub herbarum peregrinarum uocabulis explicare. unum genus fateor me translationis de industria declinasse, quo fere Græci utuntur in medicamentorum scripturis, omnia ad secundam personam dirigentes. Ego uero in usum medicamentorum, quæ edidi, omnis boni gratia, nullam malum, quam infinitam inferere personam. Admoneremque, nisi certum haberem, te non ignorare, me huiusmodi bona utilitatis magis, quam delectationis causa scripsisse. Græci medici pondera medicamentorum ad drachmas redigunt; quæ quia ad denarium nostrum conueniunt, octoginta enim & quatuor in libram incurrunt, pro nota Græcæ drachmæ, quæ est figura talis Z, notam denarij Latinam, quam nosti, posui, id est hanc X, & ad eius pondus Græcas drachmas rediges. & quando quæ uolui, præfatus sum, nunc quæ desyderas, explicabo.

Epistola Vindiciani Comitis Archiatrorum, ad Vñentinianum Imperatorem.



Vm sæpe, sacratissime Imperator, humani generis fragilitas falso de natura sua queratur, aliquando tamen potuimus redditis causis, ostensisque remedijs, uanas & innumeras quæmonias refrenare. Nam sicut rudis gubernator turbatum mare sulcans, incertus periculorum, dubius salutis cuncta rimatur; Ita & mortalium natura, quæ perpetua sanitate optat, suæ placida quæque desiderat. Sed quia nec mare semper potest esse tranquillum, nec unus in diem uenti spiritus durat, nec securus nautarum potest scandere, cum equor mole fluctuum tollitur, sic neque mortales possunt semper esse ualidi aut uiuentes, sed pro ætatis & temporis uarietate diuersis morborum aguntur incommodis. Quæ cum ita sint, clementissime Imperator, magna laus est ueterum instituta scrutari, maior uero gloria inuenta seruare. Siquidem illi uiam laboribus suis uirtutibus aperuerunt, nobisque iter intelligentiæ suæ sapientia reliquerunt. Vnde cum quidam febribus teneretur, & diu uentris duritia strangulatus, die duodecimo iam morti proximam uideretur, adhibitis ad curam multis, & magnis medicis, ut remedium consequeretur, hoc illis summum periculi præsidium uisum est, ut per intestinum clysterio ei curatio pararetur. cum ille imminenti periculo

periculo xstaret, & ueluti morti proximus, curationis etiam extrema deposceret; ego pudoris & reuerentie modum seruans, quem cunctis semper exhibui, prospexi ad tempus, ne ueluti turpis cura fortuito applicaretur. Cum ergo uidissem physin eius, quam de colore collegi, & siccitate uiscerum fatigari eum penitus aduersissem, ilico infuso sale aquam frigidissimam obtuli eius ardori; qui cum desiderio recentis, quo cruciabatur, totum quod ei oblatum fuerat, ebibisset, auctores medicinz magni, qui id spectabant, exclamauerunt, occidisti hominem. nec dum uox eorum ab ore manauerat, euestigio eum somnus occupauit, sudorque perfudit. Quibus ego presentibus, clementissime Imperator, tantis sudoris eius absterfioni, laboraui, ut si dici fas sit, Nilus ex eius corpore uideretur effluere, uenim cum xger expergefactus, recrementum se extinctis febribus, & ab infirmitate leuiorem esse sensisset, uentris etiam coepit desiderio uehementer urgeri. adlato itaque uasculo, omne alui onus, quo grauabatur, exposuit, ad tam durum foetorem, ut omnes qui illic aderant, fugarentur, dicentibus egregijs medicis, quod omnia eius interna putruissent. Post hoc, inter xger ad balneas mittitur, ut lauacro eius siccitas humigetur. qui perunctus unguentis remediabilibus, cum post balneum uestimenta accepisset, sitire se dixit; statim eum absinthio, in quo libillitum fuerat decoctum, progressum a balneo potaui, ne quid causationis in corpusculo eius maneret, quo uesica scybalis uel lapidibus per uicina loca meantibus premeretur. Precepi etiam ei escam fieri de mineralibus potantibus, id est, podocylis & uentriculo, in quem uentriculum acetum cyminatum modico adiecto lasere mitti mandaui, ut omnino excocta caro, etiam ossium duritiam emolliret, ut soluta eorum medulla cum iure ipso absorberetur. non dubium est autem, optime Imperator, quod ex indigestione externarum crudissimarumque crapularum, uel superfusa diuersi nimietate uini, repletis & plene tumentibus uenis, potus in uisceribus amarescunt, auferitur somnus, subsequitur calor, atque occultarum febrium pestis, & quzdam phrenesis pulsu cerebrum inquietat, uenter durefcit, qui iam dudum crudus repletus fuerat exuberantibus cibis; qui dum excoquuntur, consumpris quz humida sunt, inflammationes importunissimas faciunt; quz adiecta calida aqua amplius necesse est excitentur. Inde ergo uenter durefcit, inflatur pulmo, splen distenditur, pinz etiam iecoris porriguntur. Quibus coangustatum & coactatum fel exprimitur, quo infuso, tingitur corpus & fit luteum. Cum ergo peruenerit ad ea loca uenarum, in quz pocula hausta descendunt, duo mala iuncta, id est, res acris ac dulcis, cito auferunt animam; sicuti petrarum humidarum sudor igni subiectus, cito absorbetur ab igni, petra autem ipsa exusta & concremata, spongia efficitur; unde calx uel gypsum conficitur. ita calore febrium excoquitur uitium cruditatis, ciborumque congelitio. Quibus consumptis & exhaustis, frigida sine dubio superfundenda est, ne penitus arefcant. Nam nimirum estimas, o bone Imperator, calidam & frigidam mortalibus inclusam esse corporibus cum singulz res propriam habeant naturam. Ignis ignem, aqua aquam desiderat. sed ad horum iungendam societatem siue temperantiam procurandam, siluarum materies, lignumque deposcitur, quod & nutrit ac suscitatur, & rapit ignem, & frigidam uertit in calidam, sed non ita in nobis est coequandum. Accipe igitur serenissime Imperator, quod conueniens nobis putetur exemplum; thermarum scilicet ab se calidarum mixtio temperata, ubi nec ignis uidetur, nec lignum suggeritur, nisi uapor solus sponte conficitur, & aer calidus sine labore sentitur. nonne duo unum sunt? & diuersa atque contraria inuicem profunt; diuina providentia salubri permixtione ac temperie procurata, nonnullam corporibus abluendis sanantem przstant, competentemque medicinam przbentes, uarios languores a corporibus mortalium pellunt? Hzc cum ita sint, nihil aliud reor mortalibus przbendum, nisi id quod cum infirmi essent desiderauerunt, & oblatum sibi profuisse senserunt. His ergo utamur, quibus sumus bene experti, & quorum reumate carere non posset, productus est in medium conuentum multorum spectantium medicorum. Qui cum inspectus ab ijs fuisset, dixerunt ei palpebras incidi debere, comburi etiam hemicranium & raso capite uenas secari, quod Græci arteriotomion dicunt; imponi etiam elcharas; & cum iam omnibus locis debilitatum & cauterizatum caput haberet, nihilque ei tormenta, quz desiderio sanitatis patienter tulerat, profuissent, descebat omnibus infelicitatem suam. In ultimum hzc ab egregijs medicis inuenta curatio est, ut cum dexter oculus lacrymam funderet, uena ei dextri brachij laxaretur; cum sinister similiter in sinistro brachio fieret. Quod cum pati coepisset infirmus, flens & gemens illud Catonis sæpe dicebat, corporis exigua medico committe fideli. Ego autem dico, & perito. Restiti igitur ijs nec laxari uenam permisi; magnoque silentio facto, auctores nostros in medium protuli ac recitauimus, dixique ad eos: Si ex multario tormentorum genere miseraudus iste uel unam medelam fuisset adeptus, merito uos pateretur; sed cum, neque inunctione, neque incisione, neque combustionem, inundationem lacrymarum reprimere potueritis, cur indocte uenas ei laxari precepistis? cum hic iam semianimis, uisionem ipsam ferè perhorrescit. Vnde reddite mihi sapientissimi uiri hodiernaz causaz curationis, cur fuerit desuper oculus incisus, cur rasum caput, cur meacula exusta uenarum; meatus enim irrigatio si uenerit ad ea loca, in quibus habebat receptaculum collectionis suz, quo impetu exinde descendeat deorsum, recurrens rursus ad fontem cerebri, ibique coangustatus cum se uere coepit, uerendum est, ne perforans autem, ac pertundens cratem capitis, generet in eo uitia diuersa, aut ne iterum per aliquam uenarum erumpat ad aures, faciatque hominem surdum, totum oppilans auditum; aut uermes in auribus generet, uel naribus polypos nutriet, aut oculis xgilopia excitet, aut dentibus sit molestus, & faciat hominem oris foetidi, atque corrupti; uel quod maxime cauendum est, ne per uicem desillantem, aut exulceratam uitium ipsa mulce hominis corrupta languescat, pulmo nique & stomacho plagam inferat, lumbos quoque renesque dissoluat, & incipiat humor noxius pinguina

& coxas, & crura decurrens, facere contractiones talorum atque neruorum, paulatimque auferat gressus, totoque organo tabescente, uideamini potius consumplisse hominem quam curasse, cum uere uolenta morte uideatur de hac luce migrare. Nam si ceptarum acritudo aliquotiens nobis non manducantibus, nostris tamen oculis molesta est, aut sinapi, ubi & mel miscetur, leniri penitus non potest, sed calore eius commotum cerebrum ira deludat, ut oculos & nares acer humor infellet; quid putamus illi patiuntur, quibus circa oculos cura rursus aut igni adhibetur aut ferro? quare Imperator, fidem nostris auctori- bus adhibentes, non credamus quibuscunque medicinis, nec uulneri uulnus superponendum putemus; sed ita egris remedium porrigendum esse credamus, ut neque grauibz tormentis, neque intolerabili medicinz curatione crucientur. Plura ergo de obseruatione medicinz pietati tuæ ac posteris tuis, digna memoria tradidi, quæ homines docti de expertis remedijs prodiderunt; quæ tua diuina serenitas, oro, suscipiat, & ad memoriam cæteris relinquat.

(entete)

7 hoc debet solum insigniter morare. Hæc Marcellus incipit.
Incipit ad capitis omnes subitos & diuinos, & multiplices dolores. Cap. I.

Ad capitis dolorem etiam in febris primis diebus incommodi. serpylli — I. rosæ aridæ — II. inco-
quantur cum duobus sextarijs aceti acerrimi, donec ad dimidias perducantur. inde sumitur cyathus, &
duobus rosæ cyathis bene commiscetur, frequenterque curatur ex eo caput, ubi enim incaluit quod infu-
sum est, nisi recens adijciatur, nocet. Item prodest eodem modo ruta per se uel cum hederæ baccis decocta,
& capiti tepide infusa. Polygonos quoque herba, quæ latine sanguinaria dicitur, & menta multis profuit
eadem ratione decocta, & capiti tepide infusa. Dolorem capitis leuat spondylium, & agni semen, & plati-
ni pilulæ, similiter aceto incocta, rosa quoque duplici mensura, simplæ aceti commixta, sicuti & polygo-
nos superius dicta, debet excoqui, id est, ea quæ sanguinaria dicitur. cum autem plurimis diebus manserit
dolor capitis, tum omnium supradictorum oportet uncias singulas sumi, ijsque admisceri lauri baccarum,
castorei, nucum amaranum, pulegij, sambuci foliorum uncias singulas, & in aceti sextarijs quatuor decoque-
re ad dimidias, & eodem modo rosa admixta dupliciter, sed non tam frequenter caput curare. Ad omnem
capitis dolorem efficaciter prodest medicamen tale. crocomagmatis — I. aluminis scissi, uel gallæ — I.
hæc feri ex aceti aceto, & rosa duplicis ponderis uicissim adiecta oportet, usque dum mellis habeant spissi-
tudinem, atque inde frontem, & utrinque tempora oblinere. Ad capitis dolorem, cum inueterauerit,
bene facit hæc compositio. myrtæ * I. croci * II. amygdalarum amararum * II. rutæ uindis *
* III. spondylii & panacis * singulos, lauri baccarum * III. serpylli * II. castorei * I. te-
runtur hæc omnia cum aceto, & sunt pastilli; cum opus est diluuntur aceto & rosa in mellis spissitudine,
atque ita frons & tempora oblinuntur. Permanente uero capitis dolore, materiam quoque humo-
ris oportet detrahere ex eo per nares, uel per os, quæ res etiam auriculam uel dentem dolentibus prodest,
nec minus ijs, quibus subite uertigines obuersantur, quos scotomaticos greci dicunt. item comitiali mor-
bo correptis prodest, sed & caligine impeditos ex magna parte leuat. debent autem ij homines pridie ab-
stinere, & superioribus diebus aquam potare. per nares ergo purgatur caput, ijs rebus infusis per comu,
quod græcè rhinenchytes uocatur. hederæ succo per se uel heræ succo cum exiguo flore æris, uel cydami-
nis succo mixto lacte aut aqua, pari mensura bene detrahatur e naribus liquorem & hæc compositio. salis
nitri, aceti, olei ueteris, mellis, singularum rerum denarios binos, cyclamini, succi staphidos agrias, quam her-
bam pedunculariam, quod eos necat, quidam appellant, singulorum denarios binos. hæc in unum mixta,
naribus per cornu infunduntur, uel pinna longiore nares interius perfricantur. cum satis uisum fuerit flu-
xisse humoris aut sanguinis, ut reprimatur, aqua frigida pura nares diutius obliui oportet, uel croco mace-
rato in eadem pridie.

Sed si per os magis detrahere humoris materiam uisum fuerit, quia non sine tormento quodam per na-
res ea deducitur, suadebimus pyretri radiculam commanducare, atque subinde hiantem pati fluorem sali-
uz, uel uiam passam cum piperis albi rotidem granis dabimus commanducandam, & expuendam; æque
enim & hæc deducunt pituitam. bene facit & sinapi, ex aceto tritum; sed non excastratum gargarizare,
trium cyathorum mensura, admixta mellis libra una, detrahatur enim & hæc compositio largiter pituitam.
Cum uero diu caput dolet & adronderi pressius & adradi prodest, ut possit diutius fricari, & aqua cali-
da foveri pura uel lauro incocta, quo tempore etiam sternutamentum concitare non alienum erit hoc me-
dicamento, quod ex ijs rebus componitur. ueratri albi, castorei, struthij, quod est radix lanaria, piperis albi,
singulorum denarios singulos. hæc confusa tenuiter forato cribro transmittantur, cum opus fuerit per
pinnam, aut calamum scriptorium naribus insufflentur, uel spicillo tincto in aqua & excusso, naribus ini-
untur; proderit autem ad sternutamentum etiam per se confusum, & eadem ratione iniechum ueratrum
album, linguam enim siccam & aridam sternutatio statim inuadat.

Capitis dolorem quamuis ueterem & intolerabilem protinus tollit, & in perpetuum remediatur torpe-
do nigra uix imposita ei loco, quiri dolor. — it, donec desinat dolere, & obtorpescat pars; quod cum pri-
mum senserit qui dolet, remoueatur remedium. ne sensus auferatur eius partis, plures autem parædæ sunt
torpedines eiusdem generis, quia nonnunquam uix ad duas tresue respondet curatio, id est, torpor, quod
signum est remediationis.

Ad capitis dolorem factum ex perussione, prodest rosæ bonæ succus infusus capiti, sed cum succo de
moris sicco pari mensura admixto.

+ Vossianus passim pro botanica.

7 uolens ut pignus 143.
nigrum, sicco, & aridum, sternutamentum statim
inuenit.

Ad capitis

Ad capitis dolorem factum ex perfrictione satis prodest oleum irinum cum serpyllo & exiguo aceto infusum; magis autem si aut iridis radix aut peucedani succus prioribus admixtus fuerit. prodest & ruta cum oleo irino & exiguo aceto cocta, & tepide infusa capiti; nec minus profunt folia lauri cum irino oleo & exiguo aceto trita & infusa capiti.

Ad capitis dolorem factum ex uino nimio profunt quidem & ea quæ diximus proficere ad capitis dolorem ex perfrictione factum. profunt & rutæ folia trita cum aceto admixta eis rosæ, & nuces amaræ eodem modo. faciunt & agni folia quæ nascuntur in uirgultis, quibus Græci pro uiminibus utuntur, eademque lygus appellant, cum iridis aridæ radice trita, mixta eis rosæ atque aceto.

Ad capitis dolorem factum ex uino aut casu & sublimi, prodest rosæ & irinum oleum aceto decoctum; item rosæ aridæ folia macerata prius passo, deinde cocta atque trita, & ita imposita, simili modo profunt; & sertula campana similiter facta prodest, uel myrti folia tenera ex uino trita cū myrrâ, & pulegium ex uino tritum, & mala cydonea uino cocta & trita atque imposita capiti plurimum profunt.

Medicamentum quod repellere possit ea quæ ad caput redundauerunt, castorei uictoriati tertiam partem, sphondylii * I. nuceis amaræ * X. rutæ folia * II. filii massaliotici * II. cum aceto prius hæc teruntur diligenter, deinde rosæ admiscuntur.

Ad diutinos capitis dolores, salis integri mensura, quantum manus plena comprehendere poterit, coquitur ex oleo superfluo ita ut superet salem, deinde cum omnino nihil incurrerit de sale asperum, perungitur dolens capitis pars hoc oleo, superque lana succida eodem oleo rincta imponitur. Sertulæ campanæ coronæ quinque ex passo & aqua frigida pari mensura coquuntur, donec permadescant, tunc teruntur admisciturque opij quod satis sit, uel papaueris lacryma quæ sopora à quibusdam appellatur, ad uictoriati pondus adijcitur, ex ijs pannus quantum satis est linitur, & utrinque tempora ringuntur.

Ad capitis dolorem omnem efficaciter prodest, baccarum lauri denarii semissis. scamoniz * I. croci uictoriati pondus, teruntur hæc optime ex aceto & rosæ, cum opus est, dolens pars capitis perungitur. hoc medicamentum successus mirificos habet. Ad dolores capitis puerorum, maxime eius partis quam bregma Græci appellant. lini semen tritum ex aqua imponere oportet; uel oliuæ folia tenera trita cum uino, adiecit uiridi oleo, simili modo superponere: uel opij quantum fabæ ægyptiæ magnitudo est, & salis duas partes, & pulegij partem unam terere oportet cum aceto, deinde adijcere ugentum supra scriptum, & sic perungi dolentem partem capitis.

Ad ulcuscula in capite similia mammari capitulis, ex quibus fanies manant, radi caput oportet, & ex nitro lauari. furfures quoque ex melle coctos imponere utile est, uel bulbos scillæ ex aqua coctos, ita ut aluminis liquidi tantundem ponderis ammisceatur, & sic caput inlinatur.

Ad ea quæ feruescunt in capite cum rubore, lini semen contusum, & melle consparsum imponendum est. Ad capitis dolores in febre, rutæ siluaticæ feminis, uel rutæ noditis radicis, ex qua rhus nascitur, myrræ, pyrethri, aphronitri, salis ammoniaci, piperis longi, hederæ albæ foliorum uel baccarum, bdellij, galbani, balsami, iris illyricæ, singularum specierum denarios denos. castorei denarios quatuor. balani unguentariæ * II. rhamni * X. trita omnia in unum coniunguntur cum aceti scillitici quantum sit libra una. sed ita temperabitur medicamen, donec spissitudinem mellis recipiat, atque ita reponetur in naso fictili. & cum opus fuerit, inde sumetur quantum satis sit, quod in linteolo bene tenero spisso inlinatur, perunctumque rosaceo modico, imponetur.

Si ualior fuerit dolor capitis, medicamentum tam spissum fiat infra scriptum, quàm est emplastrum, & linteolo denso imponatur: agni feminis & peucedani radicis * III. iridis * I. aceto prius maceratas has species excogites uel contundes, & rosæ dilues, atque ita raso capiti impones. Ad uehementes foeminarum capitis dolores, & suffocationes quæ de uulua ueniunt, quod genus ualitudinis Græci hystericiæ pniga uocant, & ad eos qui caduci appellantur, & ad freneticos, & qui uertigines habent. sphondylii denarios sex. castorei * VI. peucedani * II. nucum amararum * VI. hæc cum aceto & rosæ bene trita & permixta capiti infunduntur. Ad diutinos capitis dolores, etiam ueternosos, quos græci lethargicos uocant, & phreneticos, & ad omnia uitia quæ circa caput generantur, etiam ad podagram. ceræ * LXXXIII. olei ueteris * LXXXIII. aluminis fissi * VI. glutinis taurini * X. peucedani * XX. casiz * X. resinæ terebinthinæ * XX. picis liquidæ * X. galbani * XIII. aloes * XVI. taurinum gluten cum aceto ad ignem soluitur, peucedanum & casia uino macerata conteruntur & taurino glutini commiscuntur: cætera ad ignem liquida dum calent, supra scriptis admiscuntur. Quæ bene subacta manu reponuntur: cum opus fuerit, pondus inde denarii sumitur, & dilutū aceto atque rosæ capiti infunditur, sed melius facit hoc medicamentum linteolo inductū, raso capiti impositū.

Ad capitis dolorē sine febre, bene facit de experimēto capitis de-rasio, aquæ potatio, cibi abstinentia, uētris solutio. sed tū etiā rosæ atque aceto curādū caput. pdest etiā de-trahere pituitā, sinapi aut hyssopo ex passo decocta. itē herbe pedunculariæ semine, quā græci staphida agnā uocat, trito cū pipere et melle, oleo admixto; aut ipsius herbe pedūcularis semine p se melle admixto.

Permanente autem diutino capitis dolore, profunt ei huiusmodi perunctiones. ruta cū aceto & oleo calefacto. iridis radix cum aceto. salicis folia trita ex aqua. serpyllum aceto tritum & inferuēfactum cū oleo & aceto. Millefolium quod græci polygonon appellant cum ruta tritum, admixto aceto & oleo. nuces amaræ purgatæ tritæ cum aceto & oleo, ita ut hæc interdum uelut cerotum cum linteo fronti superponantur. similiter prodest & ruta syluatica trita cum aceto & oleo, quasi cerotum fronti superposita. aut agni albi semen ex posca tritum. aut ocimum uiride uel semen eius ex aqua tritum.

Ad diutinos capitis dolores, etiam ueternosos, quos græci lethargicos uocant, & phreneticos, & ad omnia uitia quæ circa caput generantur, etiam ad podagram. ceræ * LXXXIII. olei ueteris * LXXXIII. aluminis fissi * VI. glutinis taurini * X. peucedani * XX. casiz * X. resinæ terebinthinæ * XX. picis liquidæ * X. galbani * XIII. aloes * XVI. taurinum gluten cum aceto ad ignem soluitur, peucedanum & casia uino macerata conteruntur & taurino glutini commiscuntur: cætera ad ignem liquida dum calent, supra scriptis admiscuntur. Quæ bene subacta manu reponuntur: cum opus fuerit, pondus inde denarii sumitur, & dilutū aceto atque rosæ capiti infunditur, sed melius facit hoc medicamentum linteolo inductū, raso capiti impositū.

Ad capitis dolorē sine febre, bene facit de experimēto capitis de-rasio, aquæ potatio, cibi abstinentia, uētris solutio. sed tū etiā rosæ atque aceto curādū caput. pdest etiā de-trahere pituitā, sinapi aut hyssopo ex passo decocta. itē herbe pedunculariæ semine, quā græci staphida agnā uocat, trito cū pipere et melle, oleo admixto; aut ipsius herbe pedūcularis semine p se melle admixto.

Permanente autem diutino capitis dolore, profunt ei huiusmodi perunctiones. ruta cū aceto & oleo calefacto. iridis radix cum aceto. salicis folia trita ex aqua. serpyllum aceto tritum & inferuēfactum cū oleo & aceto. Millefolium quod græci polygonon appellant cum ruta tritum, admixto aceto & oleo. nuces amaræ purgatæ tritæ cum aceto & oleo, ita ut hæc interdum uelut cerotum cum linteo fronti superponantur. similiter prodest & ruta syluatica trita cum aceto & oleo, quasi cerotum fronti superposita. aut agni albi semen ex posca tritum. aut ocimum uiride uel semen eius ex aqua tritum.

Ad diutinos capitis dolores, etiam ueternosos, quos græci lethargicos uocant, & phreneticos, & ad omnia uitia quæ circa caput generantur, etiam ad podagram. ceræ * LXXXIII. olei ueteris * LXXXIII. aluminis fissi * VI. glutinis taurini * X. peucedani * XX. casiz * X. resinæ terebinthinæ * XX. picis liquidæ * X. galbani * XIII. aloes * XVI. taurinum gluten cum aceto ad ignem soluitur, peucedanum & casia uino macerata conteruntur & taurino glutini commiscuntur: cætera ad ignem liquida dum calent, supra scriptis admiscuntur. Quæ bene subacta manu reponuntur: cum opus fuerit, pondus inde denarii sumitur, & dilutū aceto atque rosæ capiti infunditur, sed melius facit hoc medicamentum linteolo inductū, raso capiti impositū.

Ad capitis dolorē sine febre, bene facit de experimēto capitis de-rasio, aquæ potatio, cibi abstinentia, uētris solutio. sed tū etiā rosæ atque aceto curādū caput. pdest etiā de-trahere pituitā, sinapi aut hyssopo ex passo decocta. itē herbe pedunculariæ semine, quā græci staphida agnā uocat, trito cū pipere et melle, oleo admixto; aut ipsius herbe pedūcularis semine p se melle admixto.

Permanente autem diutino capitis dolore, profunt ei huiusmodi perunctiones. ruta cū aceto & oleo calefacto. iridis radix cum aceto. salicis folia trita ex aqua. serpyllum aceto tritum & inferuēfactum cū oleo & aceto. Millefolium quod græci polygonon appellant cum ruta tritum, admixto aceto & oleo. nuces amaræ purgatæ tritæ cum aceto & oleo, ita ut hæc interdum uelut cerotum cum linteo fronti superponantur. similiter prodest & ruta syluatica trita cum aceto & oleo, quasi cerotum fronti superposita. aut agni albi semen ex posca tritum. aut ocimum uiride uel semen eius ex aqua tritum.

& impositum; aut hedere albē folia quatuor cum aqua mulsā, aut gī, quod græci melanthion uocant, eodem modo fronti impositum aut naribus iniectum prodest. Ad torridam aut constrictam autem capitis bene facit castoreum, & balsamum, & peucedanum, incoctum simul & seorsum in uaso cum aceto & cum oleo capiti infusum. Faciunt etiam huiusmodi medicamenta capiti superposita, quæ Græci cataplasmata dicunt. iridis radices confusæ * VI. & pusillum rosæ siluaticæ seminis cum farina hordeacea cocta, aut feniuli radices similiter coctæ cum farina hordeacea. Prodest etiam ad nimios dolores capitis constrictio eius per fasciolam non nimium latam, ita ut ea per mediam frontem & utraque tempora circumdetur. bene facit & fomentum per spongas molles aquæ calidæ, decoctis in ea prius lauri folijs & capitibus papaueris adhibitum. & unctio capiti facta ex folijs lauri & agni & populi, tritis cum aceto & oleo. Ad ulcera quæ in capite efferuescunt, cum humoris manatione prodest aqua calida bis ter uel die per spongiā sepius super ulcera expressa, quod Græci catantlesin appellant. Perunctio nes autem, quas Græci synchismata uocant, & ea quæ superposita dolentibus partibus idem cataplasma ta appellant, eiusmodi profunt. folia salicis ex aqua trita, aut uitis albæ radix aqua pura cocta, aut lenticu la ex aqua cocta aut asparagi radices ex melle coctæ. Ad capitis dolorem, folia lauri uel baccas uel florē terere oportet cum aceto & irinum oleum illis admiscere, atque ita caput naresque perungere. Facit & iridis radix cum malo cydoneo cocta ex aqua pariter imposita. Ad omnem capitis dolorem inter initia profunt aquæ refrigerantes, & repellunt eum, interdū admixto pane, uel polente polline consperso ace to. Plantaginis quoque succus, & rubi, aut lentisci, aut millefolij, aut herbæ urceolaris, aut rhus syriaci, aut maciæ, quam Græci anagallida appellant, item menthæ succus, uel intiborum, uel myrti, uel staphidos agniæ infusus capiti plurimum prodest. Ad diutinos capitis dolores prodest infusum capiti oleum ue tus cyprinum uel irinum cum peucedano, sphondilio, & castoreo. imponi autem statim oportet lini semi nis farinam & hordeaceam in unum coctam ex posca; sed postea prodest impositum cerotum ex cyprino oleo factum cum ruta. Item benefacit cerotum ex irino aut syriacino oleo cum butyro, dummodo ca lefacto medicamine caput perungatur. Opobalsamo autem cū serpyllo & rosa uel peucedano prodest etiam lethargicos perungi. Ad omnem capitis dolorem benefacit centaureæ tenuis succus cū aceto ca lido infusus capiti. Ad capitis molestum & diutinum dolorem medicamina infra scripta facies; hedera nigra folia trita admixto aceto, oleo, uino, æquis portionibus quod sufficiat, in uasculo quolibet feruere facies, ac postea frontem & tempora lines. Cicutæ folia, aut si folia non fuerint, radicē eius teres & fron ti inlines, aut in sacculo lineo ad frontem suspendes. Aloes & VI. croci & VI. gummis & VI. albi oui & coctas minutas numero V. hæc uniuersa conteres in mortario marmoreo, & aceto admixto, fron ti inlines. Rasamē pastæ, quod in magide adhæret & VI. & creta & VI. & bulborum incocto rum & III. tritos & medullam siue uirellum oui gallinaci, conteres pariter ex aceto, & fronti inlines. Muris cerebrum tolles, & in uinum mittes, ac maceratum & tritum fronti inlines. Euforbij & I. cro ci & VI. permisce cum aceto, & pariter bene tritum fronti inlines. Hederae succus densus fronti & temporibus inlinitur, & cum siccatus fuerit iterum inlinitur, quo facto dolori capitis potenter subueni tur. Ad compescendum capitis dolorem, pollinem thuris cū uisci scrupulo pariter fronti inline, quod si dolore medium caput findi uidebitur, hedera contunde, ac succum eius oleo rosaceo misce, & cum lin teolo mundo fronti inducito; tempora quoque ex eo & nares perunge; quod si grauior dolor fuerit, etiā cerebro superfunde. Limaci calculum, quem in capite habet tolle; quod nō facile facies, nisi ei, dū in uia repit, caput subito abscideris; quem lapidem quamdiu tecum habueris, nunquā ullum dolorem capitis, nec senties nec patieris. Lauri baccas numero quinque ex aceto contere, aut septem pilulas stercons capri ni ex aceto tere & fronti inline. Herba in capite statim cūlibet nasci solet, ea decrecente luna sublata, capiti quæ circumligata, dolorem tollit, hemicrania etiam efficaciter medetur, si in panno rufo lino rufo ligata capiti uel temporibus alligetur. Radicem atractylidos herbæ quam nostri carduum uocant, uel eius ramum, uel florem acia ligatum & capiti circumdatum, dolori eius mederi constat. Nec minus herbam polygonon quam rubiam uocamus, circumdatam capiti dolorem tollere experti sumus. Ra mus spinæ albæ alligatus capiti, efficaciter medetur. Sinapi quoque cū ruta & aqua tritum & ad mellis crassitudinem redactum. Corona ex herba hierobotane, quam nos uerbenam dicimus, facta, capiti quæ imposita dolores tollit. Cucurbitæ uiridis ramenta cerebro imposita, infantibus quoque, qui ex dolore capitis nauseam patiuntur, ualidissime profunt. Herba strumus contrita & cum oleo permixta imposita quoque temporibus, & toto corpori cum ipso oleo perducta, incredibiliter & capitis dolorem tollit, & languorem si quis fuerit, corpore discutit. Radix cupressi tenuis capiti circumdata dolorem eius le uat. Baccæ lauri impari numero contritæ, & oleo adiecto calido fronti impositæ profunt. Oleum ex nuce iuglandæ, quæ manducatur, expressum, subitum capitis dolorem, si eo perfricetur, mire compescit. Malum cydoneum, palmulæ quinque, papaueris caput unum, dempto semine, usque ad quatuor cyathos cum aqua ad tertias decoctum & cū mulsā aqua potui datum, ualde prodest. Folia mali punici diligen ter contrita, & deinde succus eorum, uel ipsa, oleo permixta, potenter etiā inueteratos dolores persanant, si inde assidue frons & tempora perfricentur. Cū intrabis urbem quamlibet, ante portā lapillos qui in uia iacebunt, quot uolueris, collige, dicens tecum ipse, ad capitis dolorem te remedium tollere, & ex ijs unum capiti alligato, ceteros post tergum iacta, nec retrō respice. Creta, quæ cimolia appellatur, cocta ex aceto, fronti imposita potenter medetur. Sal cum ruta tritum adiecto melle fronti inlitum, certissi mum remedium est. Facula qua insectores utuntur, si spondam lecti priorem, qua uir cubat perunxeris, & spondæ

& spondæ medio inligaueris, dolores capitis remediabis. // Ex eadem aqua, de qua bos aut asinus biberit paululum sumptum & potatum tollit efficaciter capitis dolorem. Porri sectiui succum coctearia duo, & unum mellis, permixta ituro dormitum uel in nares uel in auriculam tepidum infunde, statim proderit. Pollinem filiginis admixto cui albo, & quidpiam salis conficato, & fronti inlinito, & fascia superligato, mirabile est. Anethum ita ut de horto collectum fuerit, decoquitur ex oleo, & succus eius capiti infunditur.

Si de capitis dolore difficilis somnus sit, amygdalino oleo caput perungi oportet. Si de sole caput doleat, cupressi folia contrita cum polenta de hordeo, uel amygdalis, & succo portulacæ fronti inlinuntur. Magnetis lapis, qui antiphyson dicitur, qui ferrum trahit & abiicit, & magnetes lapis, qui sanguinem emittit, & ferrum ad se trahit, collo alligati aut circa caput, dolori capitis medentur. Experimentum est mihi, pulegium in oleo coquere, eoque frontem & tempora & cerebrum perungere.

Glebulas de limine uel ipso cardine erasas cum aceto simul permisce, eoque luto frontem inlines, quo caput confestim grauissimo dolore releuabis. Terra uirga in ortum manè comecta, & sub lectum ad caput conlocata, unice prodest. Duo folia lauri circūcisa rotundabis, resinaque terebinthina glutinabis & utrisque temporibus adfiges, nisi reddita sanitate non decident. Hirundinum pulli lapillos in uentriculis habere conserunt, ex quibus qui albi maxime fuerint, si in manu etiam singuli teneantur aut circa caput lino

nectantur, ueterimos & diutinos capitis mulcent dolores, nisi contactu terre, lapillorum potentia minuat. Cornicis cerebrum coctum & cibo sumptum, graues & inueteratos dolores capitis effectu mirabili pellit. Vulturis cerebro paululum cedri, si immiscueris, & nares inde intrinsecus caputque perfriqueris, omnes dolores statim minues.

Ex quacunque causa grauedinem capitis exortam, quæ intempesium concitet somnum, sine dolore discutit, si quis impetigines in asini cruribus naturaliter natas detrahat, easque in scobē delimas, immixto aceto naribus penitus obfuset. Si dolor ex cerebro gignetur, hederæ folia septem & nucleos purgatos ex persicis septem, ex oleo & aceto decoques, pariterque conteres, atque inde tempora & frontem dolentis obduces.

Ruta trita aceto & oleo rosaceo mixta, mirifice dolorem capitis auertit, cerebro uel temporibus infusa. Caput ocimi tritum cum rosaceo oleo aut myrteo & aceto, fronti rectissime imponitur.

Serpyllum decoctum ex aceto & tritum, recte imponitur temporibus & fronti. Corona de pulegio prodest capiti imposita, si terram non tangat. Si difficilis somnus est ex dolore capitis, oleo amygdalino caput ungere oportet & tempora; nucleorum uero persici farina cum melle & aceto fronte inlita prodest; nuclei quoque amygdalini triti utiliter imponuntur.

Etiā in febribus baccæ lauri impari numero in oleo contritæ & capiti inlita, sanant dolorem. Hederæ folia mollissima trita ex aceto & rosaceo aduersus omnem dolorem fronti inlinuntur.

Panaxæ radix in oleo conteritur, & deinde capiti instillatur. Ossa de capite uulturis alligari prodest capiti dolenti. Gallinaceus pullus inclusus abstinetur nocte & die, deinde eius gallinacæ pluma uel erista alligatur ad collum aut dolentis caput, ac statim medetur.

Surculus ex nido milui, puluino dolentis caput superpositus prodest. Murenatum pellium exustatum cinis ex aceto fronti inlinitus prodest. Codex matutini rorem pascentis caput arundine præciditur, & in linteolo licio alligatur, colloque suspenditur, continuo medetur.

Fracto capiti tela aranæ ex oleo & aceto imposita non recedit nisi sanauerit. Cornu ceruini exusti cinis inlinitus fronti ex aceto & rosaceo prodest.

Lanam ouiculæ de inter femora uelles & combures, & in aceto intingues, & super tempora dolentis ligabis. Lanam arietis de fronte uelles, & combures in operculo olla nouo, & in mortario conficabis, atque ex aceto fronti inlines.

Sertulæ campanæ fasciculum ex aceto decoques, & fronti inlines. Caput si dolere coeperit, ouo cum melle mixto in balneo laui, statim cessabit dolor. Intybi contusi succum oleo rosaceo, & aceto acri, æquali mensura mixtum, capiti laborantis infunde.

Betæ nigre succus temporibus dolentis impositus, mirum remedium est. Serpyllum in aceto decoctum fronti laborantis infunde, uel temporibus imposito. & si somnus difficilis est, oleo amygdalino caput perunge.

Rutam uiridem ritam cum aceto acerrimo & oleo rosaceo, æquali mensura, toto capiti laborantis infunde. Lauri baccas XXXV. piperis grana XXXV. tere, & tritas cum ouo albo temperabis, & fronti impones.

Ossa de persicis etiam duracinis franges, & nucleos eorum colliges & siccabis in umbra & cum necesse fuerit, cum ouo albo temperabis & fronti superimpones. Caput si quis sic doluerit, ut medium fundi uideatur, hederæ contusæ succum per linteolum delicatum mundum exprimat & oleo etiam rosaceo admisceat, & sic frontem & tempora perungat, & cerebro & naribus inde & auriculis infundat.

Caput si ex frigore doluerit, unguentum irinum cum oleo laurino misce, & calefactum cerebro superfunde & insuper lanam unctam circa caput pone. Sicuti nulla de causa subito caput & tempora doluerint, myrra ex uino crassius trita tempora oblinat; uel fabā fream in aqua prius mace

ratā, postea in uino decoctā tritamque inlinat frontem, uel baccas lauri impari numero coterat prius, deinde admixto oleo diligentius terat, adinstar collyrii, & postea in tutili calefaciat, eoque caput perficeret. Purgatio aut capitis, ne supra scripta nascatur, utilissima fertur hæc, si hyssopi aut origani summitatibus coctis, & ex mulse aquæ cotyla dimidia coctis, os adfiduè colueris. Capitis ulcerationes sanantur, si succo de betæ e radice expresso caput in balneo pfricetur.

Si qui in capite tubera nascuntur, cupressi baccas uirides in uino decoctas tritas tuberibus adponat, ita ut per dies quinque in capite alligatum & signatum medicamen maneat, post diem quintum soluat ac renouet, & hoc si necesse fuerit ter aut quater faciat, intra diem uicesi-

LIBER

mum perfanabit. Brassicæ succus naribus infusus capite purgato, dolorem quoque eius efficaciter adimit. Radix pyrethri in sole diu commanducata, etiam pituitam expellit. Hiera maior faciens ad capitis nimium & ueterem dolorem, & ad phlegmata spissa & constricta laxanda & prouocanda, ex calida aqua ieiunis data, ad spleniticos ex posca, ad hepaticos ex uino græco, ad accessiones quotidianas ante suspensionem datur ex muria, quia & uentrem temperat, maxime prodest etiam melancholicis & scotomatibus; danda autem omnibus ieiunis & bene digestis ad modum nucis auellanae, quæ constat ex speciebus ijs, stichados — I. ꝯ. VI. agarici — I. ꝯ. VI. colocyntidos, id est, cucurbitæ, quod habet interius molle inter semina siccata — I. ꝯ. VI. opopanax ꝯ XV. sagapeni ꝯ XV. petroselini ꝯ XV. aristolochiæ rotundæ ꝯ XV. piperis albi ꝯ XV. cynamomi, spicæ nardi, myrræ troglodytis, folij, croci, uncias singulas, mellis uero optimi despumati tantum mittes, quantum sufficiat pulueri specierum supra scriptarum colligendo, ad spissitudinem congruentem, deinde confectum medicamen in uasculo uitreo aut fictili sub signaculo reponatur. Cupressi tenuissimi radice caput coronatū dolorem breui ponit. Pulegij florem destringes & teres ex aceti cyathis duobus, adijcies rutæ tantundem quantum pulegij, & unā cepam, & salis bolum, cum omnia trita erunt, adijcies olei boni cyathum, & tenuiter subcoques, ac bene permiscebis, atque aduersus pilos caput ex eo diligenter perunges.

Ad omnes dolores hemicranij & heterocranij subitos & diutinos.

Cap. II.

Hircinum finum tritum cum aceto scillitico misce, & fronti & temporibus inline. hoc ad dolorem hemicranij sedandum etiam in perpetuum prodest. Tius, & myrram, & ouum teres simul, & fronti induces uel temporibus, subitus cum hemicranij dolor fuerit. Laser cyrenaicum cū aceto tere & inline frontem cum temporibus. Hemicranium statim curant uermes terreni pari numero sinistra manu lecti, & in limine cū terrā de limine eadem manu triti, & cum aceto optimo eadem manu fronti uel temporibus inliti, cum dolor urgebit. Finum uel cinerem colearum & granum sinapis cum aceto ad ternos scripulos miscere, & temporibus inline prodest. Herba strumus & stercus murinum contrita, & ex aceto fronti inlita, celeriter dolores etiam heterocranij abolent. Officula in capite porci duo natu raliter forata inueniuntur, id est unum in dextera parte, & aliud in sinistra, quæ reperta & reposita, & cum opus fuerit licio suspensa, medelam capiti prout inuenta sunt præstant, id est dextrum dexterae parri, & si nistrum sinistra; sed præter te & ægrum officula tertius non contingat, quæ ad hanc necessitatem colligi diligenter & seruari debent. Piperis grana XXI. murini fini pilulas XXI. sinapis quantum tribus digitis possis tollere, teres & aceto acri ad ceroti modum permiscebis, & ita fronti impones, & aluta desuper teges. Laseris granum medicinalibus digitis auri iniice ex ea parte, qua caput dolebit, statim proderit. Herbe meliloti interiora, & oui cocti uitellum cum uino modico tere diligenter, & inde hemicranij uel tempora quæ dolebunt inline, confestim sanabis. Pampinum continuo de uite lectum cū oleo coques atque simul tritis diligenter tempora inline. De muris fimo pilulas septem teres, & cū aceto fronti uel temporibus dolentibus inline. Si uir aut adulescens aut infans hemicraniam patietur, obseruet ut semper luna septima, & septima decima, & uicesima septima se tondeat, mirum remedium habebit, neque curet, si dies martis aut saturni in has lunas inciderit. Heterocraniam siue hemicraniam discutit hæc compositio, gallæ syriacæ — III. crocomagmatis — III. aloes — III. sed gallas prius tundes & cribabis, tum cætera similiter tunsā & cribata miscebis, idque medicamē in pyxide conditū seruabis, cumque usus exegerit, ex aceto temperatum partē frontis quæ dolebit impones. Terre ægyptiacæ partes duas, crocomagmatis partem unam cum aceto diligentissime ac minutissime contere, & partem quæ dolebit, inlinito. Opii — I. colophonij — I. myrræ — I. hyoscyami — I. peucedani — I. anethi — III. crocomagmatis — I. seorsum hæc tundes, & cribata in mortario diutissime coteres, & ex aceto optimo de hoc puluere collyria formabis, cumque opus fuerit in cote ex aceto teres, & spissum parti frōtis & temporum, quæ dolebit ante diligenter deterisæ frequenter induces. Grana hederæ & serpyllum pari pondere teres ex aceto, & inde totum uerticem perfricabis. Baccas lauri ex aceto tritas adiecto oleo fronti impones aduersum heterocranij molestias. Peucedanus herba trita & ex aceto & oleo fronti inlita heterocraniam statim sedat. Herba uel hederæ in capite statuat cuiuslibet nasci solet; ea si in panno rufo acia rufa, uel lino rufo ligata, capiti uel temporibus alligetur, mirum remedium hemicrania, uel heterocrania præstabit. Nouem grana piperis in uino optimo teres, atque ex eo frontem & tempora inline in ea parte capitis quæ de hemicrania dolebit. Succum de allio in eam aurem, ex cuius parte dolor hemicranij fuerit, infundes.

Ad uertiginem capitis. Cap. III.

Ad uertiginem capitis, quā Græci scotoma uocant, peucedani * II. castorei * I. spondij * I. baccarum lauri purgatarum * I. terentur hæc omnia diligenter, & ex ijs componetur medicamentum, quod cum opus erit, admiscebitur ei rosæ & aceri quod satis sit, est enim hoc mirabile medicamentum. Cerebri dolores ex quibus etiam subita uertigines oriuntur, discuties si planta ulmea caput circūligaueris, atque coronatus ita triduo dormieris, expertus es. Veteres dolores capitis & uertigines citō emendabis, si betæ nigra

nigra succo tempora perlinas; idem præstat intibi succus si cum rosaceo oleo & aceto mixtus, caput inlinatur. Ad uertiginem abolendam efficacissimum est, si abrotonum tritum in uini portione repidum bibatur, uel cum oximelle non acri accipiat. Quibus uertigines fiunt, aut quibus mens perturbatione capitis alienatur, cochleæ singulæ contritæ maiores cum suis testis ex calida passi uel defruti potione datæ diebus plurimis, profunt, si post triduum continuum interpositum, iterum plurimis diebus accipiantur. Qui unam cocteam maiorem semicoctâ comederit die primo, sequenti duas, tertio tres, quarto duas, quinto unam, remedium experietur non solum ad uertiginem, sed etiam ad suspiria & uomitus prodest. Vertiginem capitis abolet uertonice fasciculus cum aqua nitida ad tertias excoctus, aut apij uiridis fasciculus cum fure similiter decoctus & ex mulla aqua tepida potatus. Hyoscyami ramusculum in aquæ sextarijs tribus usque ad tertias decoques, & dabis per triduum potui quartarios singulos, aut etiam minus pro habitudine, uel ætate, uel sexu. Trifolium herbam, quæ gallicè dicitur uisumarus, aqua frigida macerato, & eam aquam diebus decem bibito, sed ut herbam quotidie mutes. Misy libra una cum aceto acri contrita & fronti inlita, mirabiliter uertiginem sedat.

Pityriasi, & porriginis, ac pruriginis, atque ulceribus, & lendibus, & pedunculis capitis.

Cap. IIIII.

Pityriasis & porriginis capitis quæ plerumque in perniciem se conuertunt, nisi occurratur, perungi oportet assidue bulbis tritis, sulfure uiuo, & uino bono in unum permixtis. Item prodest cedria tantum ungere caput, uel alio trito & aceto & nitro. Farina foeniculi ex uino capiti inducta, porriginis expurgat; furfures quoque idem præstant, si caput inde assidue in balneo luatur. Oesypum ex oleo tritum & instillatum capiti, pityriasi medetur. Ex uino & oleo & cedria pruritus scabiemque capitis tolli manifestum est, si ungatur assidue. Pruriges capitis discutit fel ouillum inlitum cum creta cimolia, donec arescat, mirum est. Nitrum alumini admixtum pruriges capitis tollit, si inde frequenter fricetur & lauetur. Ulcera in capite, tanquam proprius morbus præcipue infantibus nascuntur, sed & uiros & mulieres grauius molestant. hæc ergo felle taurino cum aceto reperfuso inlita, efficaci remedio sanantur. Seuum uituli cum sale subactum, utilissime adhibetur pityriasi. Testarum muricum uel purpurarum exustarum cinerem ex melle ulceribus capitis imponi oportet. Allium cum sua ueste cõburitur cinisque eius ex oleo capiti ulceroso imponitur. Oleum amygdalinum cum uino optimo permixtum expurgat capitis uitia. Folia rubi in quo mora nascuntur, arida contrita capiti insperguntur, & desuper lana succida & charta superponitur. Malua erratica cum urina humana, id est puerili trita & imposita, ualde siccatur capitis humores. Omnia autem capitis ulcera cum purgata sunt, iucundissime ad cicatricem perducuntur sic. spumæ argenti tunse selibra, & cere libra, cerussæ libra, olei rosacei libra, cum liquefacta & mixta & trita fuerint, hæc refrigerantur & adiunguntur ijs ouorum incoctorum quatuor lutea, id est uitellæ, & simul pistillo in mortario permiscuntur, atque inde inducitur caput; mirum remedium experieris. Nasturtij semen mixtum adipi anserinæ tritumque, furfures capitis assidua lauatione depellit. Betæ uiridis contusæ expressæque succo porriginosum caput frequenter in balneo lotum omni tæbe purgatur. Semine falicis contrito caput lautum furfures cito deiecit. Ouo gallinaceo caput inlinito, postea aqua uel succo herbæ cyclaminis, quæ orbicularis dicitur, caput lauato, hoc pacto lendes necati ultra non renascuntur. Puerile lorium nitro admixtum, ulcera quæ erumpunt, lauto capite mire delinunt; expertum remedium. Cornu ceruinum in scobem limatum, & cum uino potum lendes enecat, renascique non patitur. Stercus scrofinum uino immixtum, cum rosa liquida id est rosæ succo, lendes pedunculosque discruciat. Felle uituli caput perunctum, lendes exterminat. Axungia ueteris semuncia, seui caprini semuncia, resinæ perlucidæ semuncia, aluminis insectorij semuncia, alumen teres in mortario, cætera igni resoluens & confundes, ac sic leni uapore deficere uel excoqui facies, ut ex omni confusione uncia medicaminis restet, tum caput lautum diligenter, atque siccatur hoc medicamine perunges, porriginemque discruciat. Scobem citream ex aqua deferuere facies, nitrumque asperges, atque inde caput porriginosum oportet lauare. Fimo bubulo uiso succu betæ admisceri, atque inde caput porriginosum lauari oportet. Porriginem potentissime hac potione purgabis; rosamarinum teres, succumque eius uino uel aqua scripulis tribus dabis potui; sed qui sumit, supra limen adfistat, idque triduo faciat. Fraxineo cinere lixiuiam maturam nimis facies, eaque caput lauabis in balneo; quod cum siccaueris, saponem & argenti spumam conteres, eoque caput perfricabis porriginemque exterminabis, si capiti lauto atque siccato hoc medicamen addideris. Cretæ cimoliz P. I. nitri alexandrini P. I. sulphuris uiui P. I. hæc omnia tunduntur atque cribrantur, & capiti porriginoso imponuntur. Mali punici corium ex aceto coquitur, & succus eius capiti porriginoso imponitur, & frequenter abluuntur, ita ut & ipsum pomum excoctum teratur & sic exprimat. Anethi furculi uruntur, eiusque pulueris cribrati — I. cicharæ — III. remittes in olei 8. I. & adicies gallæ tunse semunciam, inlinesque eo porriginosum & ulcerosum capite, contra pilum, & postea lauabis in balneo. Compositio optima & experta ad uitia capitis omnia superscripta; pumicis uncia, castorei — V. spumæ argenti uncias V. I. cyperi — III. myrtæ — III. myrobalani — III. sulphuris uiui — I. oia tudes & cribrabis & pmixtis pro aphronitro in balneo uteris, Adipis ueteris suille P. I. & picis cedriæ P. I. igne dissolues. tū staphidos agriæ tunse uncia miscebis, & ante horā, quā ad balneū uadas, ita caput uitij supra scriptis laborantem, contra pilum fricabis, ut infideat medicamen. quod non antè dilues, quā ad folium uenias. si autem medicamini huic adieceris ladani scripulum, capil-

cap. fortius. lum nutries pulchriorem.

Furfures capitis extenuabuntur, si stercore murino liquefacto in aceto ca-
put in balneo perfricueris. Lotio taurino caput si laueris, porriginem uetustissimam tollit.

Al. m. tuftam porriginem mire adimes, si herbae cyclaminis, id est orbicularis succo, sulphuris aliquantum misce-
ris, & fel scrofinum, atque inde caput in balneo bene perfricabis. Vlcera capitis subito nata sanantur
si alini stercoreis succo, & scilla contrita quantum satis uidebitur, & bubulae adipis tantundem miscueris,
atque ad capitis ulcera ueluti ceroto usus fueris. Fel taurinum mixtum cum nitro & uino & oleo quod
satis sit, ulcera capitis uel feruescentem scabiē sanat. Vlcera recentia & uniuersa uitia ulcerum in ca-
pitate sanant uermes, qui in arbore caua uel putrida nascuntur triti & in panno impositi. iidem uermes co-
busti, & cum anetho sicco pari pondere triti & impositi sanant etiam carcinomata. Inula in oleo di-
cocta & contrita & cum butyro ouillo & melle imposita, Cacoethe maligna emendat, eadem ratione cu-
rantur & tubera; sed hoc uitij, emplastri panno inlini debet. Vermes ulceribus capitis uel quibuscun-
que innati, ranarum felle tolluntur. ea uero quae intrinsecus serpunt, balsamento uetere tunso in uicē em-
plastri imposito sanantur. Radix peponis contrita & adposita, sanat ulcera, quae capiti in modū faui
concreverunt. Semen rasani tritum & ex aqua adpositum, sistit omnia ulcera. Porrum capitātū
contritum & ex melle impositum, uniuersa ulcera optime purgat. Allium contritum cum sulphure
& resina, ulcerum & fistularum quaelibet uitia extrahit. Vetera ulcera etiam carcinosa foueri de-
bent aqua calida, in qua excocta sint holera diuersa. deinde ipsa holera trita si imponantur, ualde profunt.

Farina lini seminis, uel farina erui, uel lenticulae, decocta & ex melle adposita, suppurationes & pustulas ul-
cerum sanat. etiam genitalibus laborantibus bene adijciatur. Cinis uitium cum axungia uetere imposi-
tus, pustulas omnes in qualibet parte corporis curat & sanat. Folia oliuae commanducata & imposi-
ta ulceribus manantibus medentur. Oleastri cauliculi teneri decocti, & cum melle impositi, carnes su-
pra oscula in uulneribus quaelibet prohibent excrecere. Herba chelidonia contrita & cum axungia
uetere subacta & imposita, ulcera uetusta & putrida purgat & sanat. Nuges iuglandes perueteres con-
trita, uel quod melius est, comanducata & imposita, singulare remediū ulceribus praestant. Glandes
de robore trite cum axungia & impositae, duritias, quas Cacoethes medici uocant, emendat & reprimunt.

Pix brutia cum melle trita & imposita, ulcera omnia purgat & sanat. eadē pix ex uua passa purgata & cum
axungia uetere imposita, ulceribus medetur. Aqua in qua lentiscum decoxeris, ulcera quae serpunt
utiliter fouebis. Hedera ex uino decocta, ulceribus quibuscunque imponitur, prodest. Cinis ex
offibus agnorum recte adhibetur ulceribus, quae non trahunt cicatricē. Pulmo arietinus calidus ad-
positus, carnes excrecentes in uulneribus exaequat & reprimat. Vim serpentium ulcerum coarctat
calx uiua ex aceto & oleo rosaceo temperata atque inlita, rosaceo autem & ceræ permixta, mox perducit
ad cicatricē. Carcinomata curantur coagulo leporis cum pari pondere capparis, quod utrumque uino
aspersum unā teritur & sic adponitur. Carcinomata, quae serpunt circa ulcera, fel ursinum uel cinis de
alini ungula exusta, per pinnulam bene adponitur. Vlcera quae sordidata sunt, fimi uitulini cinere &
muliebris lacte purgantur. Vetus ulceribus uettonica cum sale contrita & adposita medetur. Idē pre-
stat farina lupini incocti, & sine cortice inspersa cum uino. Ad porrigines detergendas, ruta fasciculū &
sulphur uiuum cum uino uetere simul decoque, & caput ex eo in balneo laua; ante tamen aqua tepida sicut
est consuetudinis, elue. Ad papulas in capite effervescentes, uel qualibet parte corporis, etiā ad ignē
sacrum benefacit hoc medicamentum, ruta uiridis P. I. I. spumē argenti P. I. S. aceti. 8 I. olei uiridis 8 I.
cum aceti parte spuma & ruta teruntur, donec leuia fiant, postea quod superest aceti, uicissim cum oleo adijci-
tur, uel superfunditur medicamini, dum teritur, & cum bene tritum & permixtum fuerit, tum imponitur
locis necessarijs. Ad pedunculos necandos hoc medicamine uteris. oleum cum puluere cineris cuiuslibet
de foco, sed bene creti, pariter miscebis, & ita teres, ut sit ad spissitudinem mellis, atque inde cum opus
fuerit, caput unge. Ad pedunculos in omni parte corporis necandos efficac hoc remedium est, elle-
bori radices uncia, staphidos agrie uncia, simul trita adiectoque oleo totum corpus perunctum, etiam in
tunicis necabuntur. Nitri alexandrini, & staphidos agrie aequale pondus, aphronitri quoque aliquā
portionem, & sulphuris uiui particulam simul terito, ac decimo die in balneo corpus fricato, omnes pe-
dunculos necabis. Serum id est aquam lactis, quae remanet facto caseo, si quis adiecto aceto in portio-
ne aliquotiens sumpserit, ita liberatur a pedunculis, ut penitus extirpentur, nec postea in eo renascantur.

Ceruini cornus scobes limatae, & ex uino potui datae, pedunculos in capite lentesque nasci non sinunt.

Ad capitis reumata, & purgationem, & ad pituita, & phlegmatis deductionē, & restrictionē Catarrh. Cap. v.

Ad reuma, quod de capite descendit, medicamentū facies tale. nitri — VI. pyretri — I. S. capparis —
II. struthij — II. hec omnia trita & in puluerē tenuissimū redacta permisce, atque in balneo feruenti
ita utere, ut tertiā partē pulueris de superscripta mensura specierū mittas in caput, & perfrices diu ac diligē-
ter, ut per sudorē digeras, postea aqua tepida laues caput, & in frigida mergas, & crasso sabano diligēter sicca-
bis. Ad reumata capitis, talpā in uasō fictili clauso ita in furno torreto, ut tenuissimū puluerē ex ea facias,
cui addes puluerē piperis albi ex granis decē & octo, & coaleare unū de succo ocimi; de quo medicamine
dabis cui medēdū erit, in portione uini ueteris calida coaleare unū, ita ut in balneo, in quo nūquā lauit nec
laturus sit, in folio remediū accipiat, & interposito biduo, alternis iterum accipiat; sed cui remedio opus
est, XIX. ferme diebus porcina, liquamine, & holeribus abstineat. Ad idē trochiscus, croci drachmas duas.

myrra

myrræ — II. calchati — II. cymini — II. opij drachmas II. turis — I. Crocomagmatis drachmas II. aluminis scissi — I. hæc omnia contrita austerissimo uino permiscebis, ut sint ad crassitudinem mellis, & inde frontem densissime superlines usque ad capillos, intermissa semita super nasum; præcluso enim itinere, quod ad oculos humori patere cōsueuerat, uiam facies, qua de cerebro per nares fluxus omnis emanat, & hinc perpetuus decursus fiet, quo humores oculorum ab omni inundatione siccentur. hac curatione in perpetuum lippitudo remouebitur, sed ijs quos nimium reuma humoris urgebit, ex aceto acri trochiscus supra scriptus imponatur.

Ad distillationes perfrictionesque & grauedines, cyclaminis herbæ, quæ latine orbicularis dicitur, radicem supra carbones cultello radito, fumumque eius ramenti naribus trahito.

Hyoscyami drachmas duas, apij seminis bene purgati drachmas quatuor, anethi bene purgati drachmam unam, opij pondus uictoriati argentei unius; hæc omnia trita & cribrata permisceto, & ex aqua passillos temperato, atque ex ijs singulos in aquæ calidæ cyathis duobus, cum dormitum ibit, cui medendum erit, potui dato. eiusdem herbæ radices si decoquantur, succusque earum ad crassitudinem mellis missus in aquam, naribus trahatur, omnem a capite pituitam detrahit mire.

Creta cimolia ex aceto trita, & quā densissime fronti imposita, pituitam sistit. Mastichen cum pipere qui diu comanducauerit, calefacto cerebro humorem pituitæ naribus effundit.

Ad catarrhū siue distillationem humoris ex capite, turis \mathfrak{Z} . unum, piperis \mathfrak{Z} . unum, conteres diligenter & uini nouelli, quod sufficiat, admiscebis, & naribus tepidum infundes, uel gargarizabis, sed utilius est naribus infundi.

Ad caput leuiter purgandum, sinapi tritum ante diem in aceto infunde ad heminæ mensuram, & ex eo intra os tene, & gargariza in sole calido ieiunus, & aperto ore postmodum sede, ut humor decurrat.

Staphidem agriam sumito, & pro modo sinapis granum, & uiam passam commisce cum betæ semine, & ex eo facito passillos; quibus si opus fuerit, adijcies acetum, & eos ieiunus in sole aut in balneo comanduca, & apertum os tene, ut humor defluat.

Ad caput purgandum, quod fuerit humorosum, staphidos agriæ \mathfrak{Z} . III. pyrethi \mathfrak{Z} . II. hyssopi \mathfrak{Z} . III. pariter, hæc pro modo assidue in ore missa comminues & masticabis, incuruato capite, ut humor ex masticatione defluat; quod facito aut ad solē, aut in loco tepido.

Ad pituitam ex ore euocandam, aris floris scrupulus unus, & de succo hederae idem pondus in unum mixtum, & naribus infusum, euocant pituitam, & defluere compellunt.

Radix pyrethi in sole comanducata pituitam & humorem capitis patefacto ore depromit. Betæ radicibus tunsis, recte succus eius naribus ducitur ad humorem capitis extrahendum.

Mellis & sinapis triti æqualiter mixtæ partes tepescunt, & humor multus e capite post longam gargarizationem deducitur.

Ad catarrhū restringendum mittes in ollam rudem pro modo ollæ heminam rosæ ficcæ, & tres heminas aquæ mulsæ, & heminam sapæ, inhiibe nucem pineam; hæc coques ad tertias & tepidum gargarizas.

Rumicis acumina tenera colliges, siue rubi, & herbam quam alij burdunculum uocant, alij linguam bouis, addes etiam rosæ heminā, hæc omnia in ollam mittes, præterea addes fursuriculas in linteo ligatas, ad hoc ut amaritudinem herbæ deliniant, & sic fursuriculæ ipsæ in sacello combulliant; hæc omnia ad tertias decoques & tepidum gargarizabis.

Experimentatum remedium aduersum ingruentem catarrhū, ut coena te abstineas, & ab holere, & a rebus falsis & liquaminosis. Nam indigestione cibi, & uitio cruditatis nascitur catarrhus, abstinentum sane ante omnia pinguibus cibis. Sed si de perfrictione fuerit catarrhus, caldamentis adhibitis ilico sopietur, quod si de cruditate, placabitur illa re sola, ut non coenetur, donec penitus fluxus eius arescat. cum substrictus fuerit, ad consuetudinem coenandi reuertēris.

Ad catarrhū restringendum, sapæ heminas tres, & satureiæ fasciculum, & hyssopi aliquantum feruere simul facies, quousque inde sextarius fiat, & sic gargarizabitur ter in die in loco tepido, aut ad solem, atque hoc tādī facies, donec inhibeat omnis catarrhus; atque illis diebus, quibus gargarizas abstinebis liquamine, & holere, & falsis ac pinguibus cibis.

Ad catarrhū restringendum, quinque partes uini, & sextam mellis miscebis, ac tepescies & sic gargarizabis.

Alopecij, & tinea, & capillo suenti atque infirmo.

Cap. VI.

Herba quæ dicitur trichomanes, uel adianton, eadem & callitrichos appellatur, contusa & cum oleo inlita uel incocta, alopecias facile curat.

Cepe longum, quod cepitius nominatur, super alopecias terito frequenter, quo facto capillos maturius excitabis.

Nucis escariæ, id est iuglandis testa contusa, uel combusta, & minutatim trita atque adiecto oleo imposita infantum alopecij, capilli nascuntur. Infantum alopeciarum uitia anferinæ adipis perfrictione suppleuntur.

Gallinaceorum stercus cum oleo utroque permixtum, alopecij utile est.

Adeps ursina cū fungis, qui in lachno lucernæ concrescunt, subacta, & alopecij perunctione imposita, pristino decori caput reuocato crine restituit.

Stercus murinum cum aceto tritum ad alopecias unctas forma priore mirabiliter crines commodat.

Lac caprinum incoctum, sed non adulteratum, aut uitiatum, recte alopecij infricatur, mirū est.

Vitium capitis, in quo sunt alopecie, prius raditur. post illic cepa acerrima perfricatur, deinde hordeum cōbustum & in puluerem redactū cum ursina adipe permixtū super imponitur.

Herbæ cardui agrestis i mortario usque ad leuitatē terito, succoque eius expresso, locū alopecie i. dieb. oblinito, sed bis per dies singulos perunctione renouata.

Cū sinape nasturtiū tritū alopecij inlinitum, efficaciter prodest. Cydonia mala discocta cum uino, dehinc trita, ceræque liquefactæ addita, & capiti imposita, capillum nutriunt.

Opobalsamo operepretium est alopecias ungere, ut cito capilli nascantur. Nitri ru

bri V III . pumicis II . falis ammoniaci V III . teres diligenter & postea miscebis, priusque caput alcyonio & nitro commixto perfricabis, mox medicamen impones; quo facto capilli nascentur. Magnam foeditatem capiri adferunt alopecie, quæ sic emendantur, ex pelle uiperarum cinerem facies atque assidue illic asperges, emendabis sine mora uitium. Fermentum sulphuris combusti, quod a fullone factum fuerit, cum oleo rosaceo miscebis, & de pinnula capiti inlines. Roboris pilulæ, quæ gallas simulant, cum adipe urfina trite emendant alopecias. Glandis quoque fagine exustæ cinis cum melle alopecijs inlitus prodest. Cupressi pilularum exustarum puluis tritus, ungularum muli, uel mulæ exustarum cinis, & oleum myrtinum, cinis quoque uel fimus murium tritus, & cinis exusti erinacei recentis uel fimus erinacei recens, & sandaracha, hæc omnia cum aceto, & cum pice liquida mixta & imposita, etiam fluentes capillos continent. Leporinæ lanæ exustæ cinis cum oleo myrtino & felle taurino, & alumine trito miscetur, tepesfactumque medicamen inlitum admodum prodest. Muscarum capita combusta & cum melle trita, capiti inlita, mire alopecias tollunt. Fimum columbinum si quis cum aceto tritum capiti imponat, alopecias & cicatrices omnes sanabit. Capilli & barba nascentur etiam glabro, si lichenem asinid est collectionem duram, quæ est circa curam eius, comburas & teras, & puluerem illum ex oleo uetere imponas. hoc ita ualidum est, ut si mulieri inde maxillam unxeris, barbas ei nasci facias. Erinacei caput & pellicula combusta, cinisque ei adiecto melle inlitus, alopecijs cito prodest. caput autem eius per se combustum, & adiecta ipsius adipe, cinis ille alopecijs inlitus, etiam cicatricosis facit pilos renasci. quod si totum ipsum quis exurat, & puluerem eius bene tritum cum adipe urfina caluo ad integrum capiti imponat, decorem pristinum restituet capillorum. Ad tineam curandam, sulphuris uiui — II . falis fossicij — I . tunsa & contrabrata hæc, raso capiti & loto in balneo confricabis, ita ut prius de oleo locus capitis tineosus perungatur, & sic puluis iste aspergatur, & diu fricetur, quousque liquefiat sudore capitis. hoc modo intra sex dies curabitur tineæ. facit hoc medicamen & ad scabiosos, prodest & ijs quibus pustulæ nascuntur in facie tanquam elephantiaæ rubentes. Ad capillos qui post infirmitatem decidunt, confirmandos, cedria & oleo pari pondere mixto assidue eos unge & leuiter pectina, laudabis effectum. Ad capillos decedentes confirmandos adipem urfinam cum ladano miscebis, & caput perunges, uel loca defluentium capillorum; aut ladani uncia una & cœnelæ uncij duabus, tritis & permixtis caput perunges. Ad fluentes capillos, scobæ de cornu ceruino permisce cum semine myrti nigræ, adiecto butyro oleoque, & capiti raso densissime obline, etiam ex infirmitate fluentes capillos efficaciter continebis. Sandaracha cum aceto incocta & emplastri more imposita, fluentem capillum ualidissime solidat. Si quis maleficij capillos perdiderit, hæc eos ad pristinam formam ratione reparabit, si lacertum falsum martensem cum suo capite, & lanæ purpureæ optime in conchylio tinctæ duas ligulas, & chartam cubitalis mensuræ separatim confurat, cineremque permisceat conteratque cum oleo cedrino paulatim adiecto, ut crassitudinem uelut glutinis faciat, eoquæ medicamine glabrum locum perfricet, ita ut prius diu linteo asperiore detergat. Aphronitri floris pilulas XXX . nucæ pineam, de qua propter uetustatem nuclei deciderint, tunsam, saponis gallici selibram, uini aminei cyathos tres, simul permiscebis & conteres, & caput glabrum inlines; hoc medicamine etiam crispi capilli nascentur. Malua cum sua radice uehementer coquitur, ex cuius aqua capillus cui curatione opus est, in balneo assidue lauatur. Olei cicini — III . ladani — III . ladano trito paulatim admiscebis oleum, & cum mellis crassitudinem feceris, radices capillorum assidue inlines.

Capillo nigrando, & incrispando; ijs adiecta sunt quæ phlegma, & perfrictiones capitis deducunt.

Cap. VII.

Crispando capillo compositionem huiusmodi facies; aphronitri floris tortulas numero XXX . nucem pineam, de qua propter uetustatem nuclei delapsi sint, tunsam & in puluerem redactam, saponis gallici — III . & aminei uini cyathos III . atque inde caput inlines & in balneo lauabis, sphondilio quoque caput perungatur, sed prius radatur. Cornum arietis uratur, cinisque eius cum oleo conteratur, atque inde derafum caput frequenter ungatur. Capillis nigrandis infectio optima, hirundinum sterus quantum sufficiat, cum aceti sextario, mitte in uas fictile, atque in fimo caballino per dies XXXV . suffossum habeto, ac sic macerato; atque hoc medicamento rasum caput inlinito in umbra per peniculum pictoris; sed seuo ceruino facie prius perunge, nequid inde destillet, & maculet, & dum siccatur infectio, oleum intra os teneto, ne & dentes inficiantur, ac postquam imposueris medicamen, quarto die caput lauato. Medium lapidem conterito, eique admisceto nardi puri quantum satis uidebitur; quo medicamine si frequenter caput ungas, prohibebis canos nasci, & in locum canorum nigri emicabunt capilli. Experieris uerum remedium, si agnū candidissimi capitis decoxeris, atque inde caput eius, quæ canum esse nolis, ungi præceperis. Hoc facito ne capilli canescant, radicem unam caulis quanto ampliorem & uetustiore in furno siccabis, eamque minutissime concides, & in ollam rudem mittes, & aqua fontana recenti implebis, & ad medium decoques operata olla, tū in balneo caput sapone optimè lauabis. Cūque satis mundū effectus, etiā ea aqua quā paraueris de radice caulis, caput ita confricabis, tanquā solū ex ea laues, mox capillum linteo inuolues, nec ulla supra aqua ungeris & ita siccabis; hoc purus ages, puris etiā ministris usus. Ad nigrā dū capillū egregie facit, si oui coruinū, quæ sunt interiora, impari numero in uas creū mittas, atque illic diu coagites, & raso capite in umbra per peniculum pictoris imponas, sed donec siccetur infectio, & oleū in ore teneri oportet, & seuo ceruino facie perungi, ne distillatibus guttis maculetur. tāta. n. solet esse uis eius, ut et dentes

dentes dum siccatur inficiat. quarto autem die caput lauari oportet post medicamen impositum. **Vermium terrenorum cinis**, oleo adiectus, quo uti foeminae in pectendo solent, capillos prohibet fenescere mutari. Folia cupressi trita & ex aceto capiti inlita, & inficiunt canos & in eorum locum nigros educunt capillos. Nuclei iuglandes adhuc uirides & teneras, & totidem glandes nelles ex arbore adhuc uirides, & necdum maturitate solidatas, atque in pila contusas exprimes, earumque succo, ad inficiendos canos dum caput pectis, pectinem tinges. Sanguisugarium sextarius duobus sextariis nigri uini miscetur & xl. diebus in uasculo plumbeco diligenter clauso maceratur; postmodum cum ipso uino conteruntur hirudines, & in sole calido, capiti derafo ad permurandos capillos, eam succus imponitur; oleo, ne dentes inficiantur, donec succetur medicamen, in ore detento. Erui filiquae priusquam arescant cum folijs & caule suo conteruntur, & raso capiti ut capilli nigrescant protinus inlinuntur. **Herbae quae graece chamaeacte, latine ebulus, gallice odocots dicitur**, exprimitur etiam cum suis granis, eiusque succo cotidie inlito pectine, crines qui inficiendi sunt, perducuntur. Pomorum de moro maturimorum — **III. acaciae** P. I. caricas, numero VII. quanto nigriores, pariter macerabis celesti aqua in uasculo creto clauso, atque inde capillos semper inlines & fricabis; sed quae superfuerint in eodem uasculo permaneant, diuturnitate enim efficaciora sunt. Compositio efficax ad capillos inficiendos & confirmandos & specie augendos, foenogreci sextarium, lini seminis tantundem, calami aromatici P. I. schoeni P. I. cassiae P. I. gallae trichidos P. I. ladanii — **III. Rhois coriarij** P. I. aquae fluuiialis 8. XIX. omnia haec in unum uas mittere, & diebus XL. sub diuo positum iubebis cotidie per puerum uirginem commoueri. Ita ut si quando puer ipse defuerit, signetur, neque a quoquam nisi a puero alio uirgine contingatur; postea recondes diligenter & sub signaculo habeto, & cotidie aqua eadem caput inrota, & pectine inde madefacto caput pectet. Ad phlegmata de capite & aqualiculo deducenda, scillae libram unam in aqua 8. III. infusam coques ad tertias. postea aceti optimi sextarium adijcies, & tamdiu iterum simul omnia excoques, quamdiu ad sextarium perducas; tum colabis, & adijcies mellis optimi P. II. Iterumque omnia simul tam diu coques, quamdiu ad mellis crassitudinem ueniant. Compositio pulueris ad reuma totius corporis, sed maxime ad capitis, nec non & ad perfrictiones & constrictiones cerebri resoluendas; Euforbij — **II. piperis** — **III. batarum lauri siccarum** — **III. sansuci** — **II. centaureae** — **III. aristolochiae longe** — **III. iris illyricae** — **III. myrrae** — **III. bdellae** — **III. cicidos** — **III. stypterie schistes** — **III. niri alexandrinii combusti** & uino uetere extincti — **III. salis ammoniaci** — **III. haec omnia** contundenda, deinde cribanda & permixta in uasculo uitreo habenda; cum necesse erit conspergendum in balneo capitis hic puluis uel membris dum adhuc sicca sunt, id est antequam sudent, & perfricanda diutissime; postea quam puluerem consperferis, de hinc lauandum caput in calore frigida aqua, & obseruandum, ne in calidam caput mergas, in frigidam sane quoties uolueris merge, & postea sabano diligenter exlicca.

Confectio siue dispositio emplastri, cui uocabulum est **Distamnos**.

+ sane insignis, & magni usus.

Distamni part. XXV. chamemeli part. XIIII. sphagni part. IX. cyperi part. VII. polij part. XII. lapidis gagatz part. VII. cere rusae part. XII. resinae terebinthinæ part. XIIII. ammoniacae guttae part. XXXV. propolis part. XII. psimmythij part. XII. chalcantii part. XXIIII. galbani part. XXV. chamaepityos part. VIIII. trifolij part. IIIII. pentafolij part. IIIII. aristolochiae grossae part. XXXV. centaureae aut gentianæ part. XII. lithargyrij part. CL. resinae colophoniae part. L. terrae ampelitis part. XXII. picis brutiae uel siccae, si terra ampelitis non fuerit part. XII. lepidos chalcij id est, squamæ ferri part. XVIIII. diphrygis part. VIIII. aloes part. XVI. libani candidissimi part. XII. opopanax part. VII. chamædryos part. XII. marrubij part. XII. artemisij part. IIIII. iris illyricae part. VII. libanitidos part. VI. olei ueteris part. XLVIIII. resinae pityinæ part. XXII. chalcicecaumenu part. XVIIII. milti part. XII. chalcitidos part. X. myrrae part. VII. eruginis part. I. Oleum uetus, quantum mittendum fuerit, pro modo specierum supra scriptarum, mittes in ollam nouam, & calefacies leni flamma uel potius igne, tunc mittes sed paulatim de manu inspergens lithargyrium bene tritum & assidue spathomela agitabis, quousque oleum ita inficiatur, ut colorem lithargyri trahat, & aliquantulum spissescat; postea aut picem brutiam tritam mittes, aut quod melius est, terram ampelidem similiter tritam, pro qua diximus picem brutiam mitti debere, quia terra ampelitis uera difficile inuenitur; ijs additis cum coeperit medicamen bene permixtum esse, ceram rufam pro modo, ut supra scriptum est, postea resinam pityinam remissam adijcies, nec non & resinam colophoniam; post haec mittes ammoniam cum thymiam, id est, guttam bene tritam & cribellatam, post addes lepidos chalcij, nec non & chalcicecaumenu, deinde addes milti, deinde diphryges, deinde chalcitum, postea chalcanthum & psimmythium; post haec addes libanon leucon, id est, thus album & myrram & aloen. super ijs omnibus addes resinam terebinthinam & galbanum, & lac uel humorem panacis, id est, opopanax. Sed oes has species predictas optime tritas & cribellatas mittere debes ad mensuram uel partes supra scriptas, prout uolueris conficere medicaminis copia, quae cum oia bene mixta fuerint & bene agitata, ollam tolle de foco, & deinde calido adhuc medicamini herbas supra scriptas bene tritas & cribellatas infundes. imo manu uel digitis moderantibus paulatim insperges, & assidue spathomela commouebis & permiscebis. post haec oia mittes chamemelum, & iterum igni non

nimio adposita olla lente & paulatim decoques medicamen, ita ut illud manu non contingas, sed spartho-
mela agites; cōfecto autem medicamine uteris sic. ad dolorem temporum uel hemicranij linteo spisso in-
duces medicamentum, & sic fronti uel temporibus adpones. Si uero humore capitis reumatizantis oculi
grauabuntur, per rotam frontem emplastrum inductum linteo similiter impones. Si in naribus uel in au-
ribus dolor aut uulnus fuerit, siue carnulenta erunt, aut humor inde manabit, oleo rosaceo solutum me-
dicamen immittes. Si fauces angina uel glandula & parotides occupauerint, aut inguina panicula tenta-
uerint, in initio doloris medicamen linteo inductum, sed siccum adpones. facit & ad splenis dolorem aluta
inductum & adpositum, nec nō & laterum dolori prodest similiter impositum. Empyicis uel hæmoptoi-
cis, id est, qui sanguinem de uisceribus per os eieciunt, proderit, si thoraci inductum aluta imponatur. facit
& ad thraumatia, & ad arthritim pro malagmate adpositum, protrahit & sagittas & fudes, & si qua corpo-
ri inhaerint, similiter adpositum. ad loca uero pudenda, id est, ad penem siue ad podicem, cū aliquod illic
uulnus fuerit, solum medicamentum cera & oleo myrtino adponitur. Si uero muliebribus causis fuerit
necessarium, id est, si uulua dolorem uel carcinomata contraxerit, ponetur cū oleo fusinato, ita ut empla-
strum contra illum locū, qui in causa est, adponatur. ad carbunculos sane & anthracas & escharas aliaque
reumatizantia, uel ad strumas & apostemata, medicamen solum aliquantulum melle debebis adpone-
re. cū autem purgatæ fuerint pustulae uel collectiones & uulnera, tum sine melle emplastrum cum puro
medicamine adpones. facit & ad furunculos similiter siccum adpositum, & ad omnem pustulam & macu-
lam curandam. Rumpit enim quæ concreta sunt, & purgat, & cicatricat. Cū autem uulnus est, de quo
immodicus sanguis erumpit, adpositum hoc medicamentum ilico & sanguinem sistit, & uulnus curat, &
cutem constringit, & cicatricem tenuem facit. Resolutio autem uel cōpositio adponendi uulneribus me-
dicaminis, talis est. mites huius medicaminis — III. & adijcies ceræ — I. olei ueteris — VI. ijs uero
qui habent, aut in capite, aut in auribus, aut in naribus causas & uulnera, adponendum sic resolues medi-
camen sine cera. oleum sane pro tempore, id est, si æstas fuerit, minus adijcies; si hyems, amplius infundes.
facit & ad morsus serpentium & ferarum omnium, & ad morsus hominis, & canis rabidi. neruorum quoque
incisiones uel collisiones salubriter curat. quibus cū incedendum fuerit, addes oleum rosaceum cum mo-
dico aceto lane succidæ infuso. Cū autem adposueris ijs causis hoc medicamentum, post triduum aut post
dies quinque ligaturam quam feceris solues. si uero ictu aliquo caput fractum fuerit & testa conlisa, medi-
camen rosaceo oleo liquefacies, & si ipsi fracturae uel uulneribus infundes. infuso uero interius medica-
mine, nihilominus desuper solum medicamen linteo inductum adpones, & supra ligabis lanam succidam
oleo & aceto modico infectam. de ipso autem medicamine si succenderis in cubiculo, uel in domo, fugabis
serpentes, & si qua illic mala sunt, foras eijcies. hoc ipso medicamine incenso suffita mulier facile purgabi-
tur, etiam si pecus intra uterum habuerit immortuum; saluberrimum autem esse omnibus & uirilibus &
foemineis causis, ne dubites, si primum diligenter ac sollicitè conficias, deinde ut supra scriptum est, scien-
ter utaris.

Ad omnes & multiplices oculorum dolores, collyria & remedia diuersa, etiam physica de probabilibus
experimentis. Cap. VIII.

AD conturbationes & lippitudines subitas epiphorasque oculorum scio multa collyria, tamen
tarde, magnos tamen effectus habere. sed nulli collyriorum tantum tribuo, quantum lycio indico uel per
se; hoc enim inter initia, si quis ut collyrio inungatur, protinus & dolore præsentis, & futuro tumore libe-
rabitur; superuacuum est autem nunc laudes eius referre; in alijs enim expertus, intelliges simplicis rei uix
credendos effectus. oportet ergo ut minime quater quinquies uel ex intervallo lippientem inungi. deinde
cū cōhiberint oculi, ad singulas inunctiones, ex aqua quam poterint sustinere calidissima spongijs ex-
pressis uaporari diutius, eodemque die in balneum duci eum, qui inunctus fuerit, ita ut cum cætero cor-
pore, caput quoque & faciem calidæ immergat, & foueat; uinumque post balneum ita ut adfectus est, su-
mat. postero die si qua uestigia epiphoræ remanserint, inungi collyrio aliquo aciore aquato sub uespere
debet, & rursus in balneum duci, & uinum bibere. hoc modo uno ferme die tollitur epiphora, præcipue
incipiens, neque adhuc alio medicamento tacta. sed si ea uis fuerit epiphoræ, ut non concedat uno die, ex-
pectari oportebit donec impetus eius sedetur, & ita æger in balneum ducatur, cæteraque fiant, quæ præ-
cepimus fieri. idem hoc medicamentum etiam supra oculos inlitum, tardius quidem, sed eosdem effectus
præstat, maxime in teneris corporibus, ut mulierum & puerorum, quorum oculi nullius medicamenti uim
sustinere possunt. triduo autem aut quadriduo plerumque tollit dolorem adiutum oui infusione, & aque
calide uapore. Compositio collyriorum, quam maxime probo ad recentes epiphoras uel conturbatio-
nes oculorum tumoresque & dolores. plantaginis tritz succi cyathos II. teri oportebit cū croco quod
sufficiat, id est * II. deinde cætera quæ infra scripta sunt, admisceri pridie macerata cum succo herbæ
supra scriptæ, id est, aloes indicæ * IIII. gummis * IIII. postea eiusdem plantaginis succi cy-
athos duos addi, ut cū spissata fuerit commixtio, collyria fingantur. Vtrunque autem genus medicamen-
ti eximie prodesse iudico, proprietate quadam, sed præcipue quod nullam in se asperitatem habet, ut
pleraque, quibus fere inunguntur homines. nā quæ ex cadmia, aut ære uiso, eiusdemque generis pigmen-
tis componuntur, quamuis curiosè terantur, naturam tamen suam amittere non possunt. nunquam enim
ut succus diluuntur, sed cū ad summam subtilitatem perducta sunt, tamen quasi puluerulenta necesse
est mancant,

est maneat, quæ oculorum partes uelut configunt. certe exteriorius punpunt foramina prima, & tuniculæ oculi ab initijs adhibita interdum molestiorem futuram concitant epiphoram. Quo nomine etiâ quod dicit glauciū dicitur, probo in initijs; nanque prodest hoc genere, quod ex eadem materia constat, quæ nullâ asperitudinem habet; quandoquidem componitur ex croci * V. sarcocollæ * X. glaucij succi * XX. tragacanthi * V. & opij * V. hoc enim ego adicio, & ita melius respondet; sed opium & in hoc, & in omni collyrio medicamentoque uerum adijci oportet, quod ex lacte ipso papaueris siluatici capitum fit, nō ex succo foliorum eius, ut insitiores huiusce rei compendij & lucri causa faciunt. illud enim cum magno labore & exiguum conficitur; hoc sine molestia & abundanter teritur. ante omnia, crocum aqua pluuiali infusum macerari debet. deinde adijciatur illi sarcocolla, glaucium, opium, tragacanthū; prius enim omnia seorsum macerari oportet, non multa eius generis aqua; id est pluuiali, ut quàm primū, id est, si fieri poterit, eodem die fingantur collyria; solet enim hoc diu neglectū, mortario inacescere: ijs fere uero primis diebus, collyrijs, non sine cæteris auxilijs, prout res postulat, abstinencia dico, & sanguinis detractio- ne, meliusque ea cæteris proficere adfirmo. Cum uero pluribus quis diebus uexatus fuerit epiphora, & perseverantia humoris, atque pituita ipso calore oculorum glutinosior uisa fuerit, quod fere sexto septi- mo uel die accidere solet: tunc proderunt & ea collyria, quorum genus superius improbauimus, compo- sita ex rebus metallicis: facilius enim tum patientur oculi, si modo exulcerati non fuerint, iniuriam: quorū præcipue hoc mihi placet, quod a colore phæon dicitur. accipit autem hæc; aris usti * XII. cadmiæ ustæ * XII. stibij cocti * VI. acaciæ chylismatis * VI. croci * IIII. aloes * III. opij * II. castorei uictoriati pondus, myrræ, lycij, idem ponderis, gummis * XVIII. aqua pluuiali quæ sunt dura, macerantur, & diu teruntur, donec leuissima fiant; postea cætera alio mortario singula trita ad- miscentur. cum tollendum est, id est, cum sunt fingenda collyria, gummi adijcitur. hoc quidam etiam in initijs utuntur cum oui aquato liquore per se. Nec non & hoc collyrio quidam in initijs utuntur, quod a cinereo colore spodiæcon appellatur. Componitur autem ex ijs; cadmiæ botryitidos ustæ super testa, donec candescat, & uino falerno extinctæ * XL. cretæ samiz, quam altera uocant, * LXXX. stibij cocti * XX. opij * V. gummis alexandrinæ * XX. teruntur hæc omnia pluuiali aqua macera- ta, ultimum gummi adijcitur. antè sane cætera ad leuitatem summam terantur, & ne prima tuni- cula oculi exesa aliâsue exulcerata sit, ut putum ulcus sit, diluuntur oui albo, quod est fere tenuissimum. Collyrium psittacinum a colore ita dictum; facit ad epiphoras quæ cum tenui & acri lacryma existunt. item adustio- nes & solutas cicatrices & uastum tumorem; quod quia loco interdum uidetur propellere oculū, proptè- sin uocant, cum oui albo, quod est tenue, imponitur. sed præcipue facit, cum quasi sanguine suffusi sunt oculi; & ob id, nullum nisi lenissimum collyrium patiuntur: recipit autem hæc; croci * IIII. cadmiæ lotæ, * IIII. stibij * IIII. opij * II. gummis * II. amyli recentis & dulcissimi * IIII. eodem ordine quo scripta sunt, in mortario debent teri ex aqua pluuiali; amyli autem, cum iam fingen- dum erit collyrium, adijciatur. interdū autem & hoc super inungantur, qui prius Athenippio curati sunt. ijs fere collyrijs lenibus, omnia quæ cum tumore & dolore fiunt circa oculos, remediāmus. Perunctio- nes oculorum lippientium siue inunctiones quæ appellantur galaticæ, huiusmodi sunt. crocomagmatis * I. myrræ & croci * VII. aluminis fissi * VI. turis * VI. gummis * VI. rosæ floris * VI. uino chio non falso conspersa teruntur hæc omnia diligenter. deinde confecta in collyrijs aut pilulis reponuntur. Perunctio oculorum ad omnem epiphoram satis utilis. croci — I. myrræ — I. crocomagmatis — I. aris floris — I. aluminis fissi — I. turis — I. ex uino teruntur hæc optimè. ijs Cosmus medicus adijcere solitus erat etiam mādrazoræ succi — I. & lentisci succi — I. ac deinde per- mixtis omnibus formare collyria uel pastillos, aut in uas stanneum recondere, & cum opus esset uti, ad inungendum uel superliniendum. Est huiusmodi medicamentum, quod perichristarion uocant græci, quod medicamentum satis efficax est; quo ita uti oportet, ut palpebræ subtiliter inde superlinantur, ne quid intra oculum fluat. recipit autem hæc; croci ficuli * III. magmatis croci * XII. turis * III. aluminis rotundi * VI. opij * II. myrræ * II. gummis * III. ex uino falerno teruntur hæc uel asperguntur. & cum bene leuia facta sunt, ad crassitudinem boni mellis spissantur, adijcitur postea passi cretici * I. & reponitur in pyxide stannea. cum enim passum adiectum fuerit, collyrium erit; nā ex ipso superlini debet. Benefacit hoc medicamentum ad superliniendos oculos, quo Augustus usus est. alumi- nis fissi * XL. turis * X. aloes * XV. croci * XV. opij * II. gallæ * X. rosæ foliorum aridorum * X. plantaginis succi uel seminis * X. ex uino falerno teruntur hæc uel asperguntur, & cum leuia facta sunt, ac mellis spissitudinem habent, adijciuntur ijs passi sextarius, uel quod sufficiat, & re- ponitur in uaso stanneo uel argenteo. Collyrium nigrum ab Antigono repertum, ad omnia intacta fa- ciens; accipit cadmiæ * XXXV. S. stibis * XXIII. piperis * VIII. æuginis rasæ * VII. gummis * XXIII. teritur ex aqua pluuiatica atque conficitur. Cosmus adiecit huic col- lyrio centaureæ tenuis succi * X. quod rectè factum reor. Collyrium, quod ad omnem epiphoram & inquietationem & tumorem facit, sedandum siue dolorem, accipit hæc; pompholygis * VIII. cicur- tæ succi aridi, id est siccati * VI. opij * IIII. mādrazoræ succi aridi * V. acaciæ * VI. gum- mis * V. teritur ex coriandri teneri succo. hoc collyrium prodest etiam extra oculos perunctum, id est circumlitum. Collyrium ab Asclepiade ad epiphoras speciatim repertum. cretæ samiz denarios unde- cim, opij denarios decem, stibij denarios XL. gummis denarios uiginti, aloes denarios decem: teruntur hæc & conficiuntur ex aqua pluuiali. Collyrium quod habuit Cosmus medicus inter arcana, mirifi-

cum ad omnia oculorum uitia. acacie * X L. spumæ argenti trita bene & lota, donec candidissima & leuissima fiat. * XII. plumbi usti & loti * X V. I. stibij * X I. cretæ samiz denarios duodecim, cerussæ * X V. III. cornuum ceruinorum ustorum & lotorum, quod erit candidissimum, * V. III. squamæ æris denarios quatuor, opij * I. III. æruginis rasæ denarios septem, cardamomi interioris * quatuor, lapidis hæmatitæ * quatuor, lapidis fissi * quatuor, tamaricæ seminis * I. III. croci * III. turis denarios quatuor, myrræ * quatuor, opobalsami * quatuor, lycij * quatuor, aloes * quatuor, costi * quatuor, piperis albi * duos, cicutæ succi aridi * V. III. ammoniaci guttarum * V. III. bdellæ * octo, saluincæ purgatæ * sex, gummi * X X V. teruntur hæc omnia diligenter ex uino chio non falso austero, uel ex uino falerno, ac deinde confestim collyria finguntur & in umbra siccantur, quod & de alijs omnibus collyrijs obseruari oportet.

Collyrium acharistum theodosium ab Antigono inuentum, ad omnem epiphoram & omne uitium oculorum. acipit hæc, acacie * X X. stibij * X. croci * I. S. aloes * duos, myrræ * duos, cadmiæ * octo, castorei uictoriati duas tertias partes, opij * unum, lycij * duos, eris usti * octo, cerussæ * quatuor, nar dipicæ * unum, & tertias eius, gummi denarios uiginti, palmarum ossa, siue nucleos ustos, denarios triginta. trita hæc ex aqua pluuiatica conficiuntur. Monemerum collyrium dicitur, quod dolores in impetu statim tollit, conficitur sic. lepidos unciam unam, æris usti semunciam, hæmatitæ — unam, myrræ unciam unam, opij semunciam, unum hoc collyrium mirabiliter prodest, ijs qui cicatrices nō habebunt, ex quo infusum, & leui admodum agitatione contritum.

Ad suffusiones oculorum, quas Greci hypochymata dicunt, forniculi succi liquidi * tres, opobalsami * tres, mellis attici * tres, olei uiridis * tres, hyenæ felis * unum, euphorbij * unum. hoc oleo diluitur, & ita admiscetur cæteris. aqua uti oportebit hoc medicamento; est enim acerrimum, & undique humores trahit, quamobrem nō sunt inungendi, qui capitis dolorem aut grauedinem habent, & ante biduum aut triduum aquam bibant, quos destinaueris eo inungere, quamquā melius facient, si etiam perseveranter aquam potauerint; uitio enim molestissimo facilius inter initia carent. non autem præterit me, habere te prudentes ocularios, quibus si nomina dixeris collyriorum hoc in libro scriptorum, contendunt forsitan se quoque habere eadem composita; sed si pondera aut effectus comparare uoles, longè diuersos inuenies. ego enim ipse eodem nomine multa composita, non iisdem ponderibus & rebus interdum habeo, sed maxime probatis utor. nec utique adfirmo, non posse & alios eadem habere; nam & ipse ab alijs accepi, sed raro scio oculariorum quosdam simpliciter tradere compositiones, meque multum elaborasse, ut ueras & incorruptas acciperem, cōscius sum mihi. neque illud rursus dico, nouas omnis & non aliquibus notas me in hoc libro congesturum compositiones, uerum etiam quasdam nūlgatas & ut ita dicam, publicatas. eiusmodi enim quia efficaces sunt, etiā plurimis in notitiam ueniunt. Collyrium efficacissimum ad tumorem oculorum & lacrymarum nimium fluxum, etiam supra perunctum uel inlitum efficax est, accipit, acacie * X V. I. cadmiæ * duodecim, aloes * duos, croci, myrræ, opij lecti, singulorum denarios binos, castorei * unum, gummi * octo. teruntur hæc omnia diligenter & ex aqua permiscuntur, atque inde statim collyria formantur ex aqua, quæ sunt omnino mirifica. Xerocollyrium optimū ad epiphoras acres & initia lippitudinis; croci 3 duo, sarcocollæ 3 duo, aloes hepatitidos 3 unum, glaucij 3 unum, hæc omnia diligenter trita simul recondes in pyxide cuprea, & pro xerocollyrio uteris.

Ad epiphoras & lippitudines oculorum, remedia de experientia & physica diuersa.

AD lacrymas & tumores oculorum lippientium restringendos, atramentum sutorium, id est chalcantum uiride, cyprinum, tundes & cribrabis, & factum mollissimum puluerem ex oui incocti albo, id est lacryma consperges, & facies collyria, quæ in umbra siccabis, atque inde palpebras inunges & tempora inlines. Si ex reumate lacryma abundans est, oui albo collyrium temperabis. Si lippitudo & sanguinis infusio est, ex acetō temperabis, & desuper oculos circumlines, ita ut nihil interius de medicamine ingrediatur, tempora quoque dolentis eodem superlines.

Brassica cruda trita cum pane candido madefacto subacta, ac fronti inlita, dolorem oculorum plurimū releuat. Medicamen ad oculum diutina lippitudine uel epiphora laborantem intrinsecus curandū. lapidis gagatis scripula sex, tundes, cribrabis, & aqua pluuiali, uel fontana, conspersum puluerem liquidū facies. deinde in ampulla uitrea repones. cum necesse fuerit, pinnā aquilinā uel columbinā laborantē oculum inunges; quo facto, & caliginem & infusum sanguinem absterges, clariorem que uisum restitues.

Dolores oculorum tempore hyemis frigore contractos, qualiter curare debeas. Concham æream de melle albo abintus perunge totam, eandemque supra galtrum lotij uirilis ex ea parte, qua melle inlita est, superpone, ad lotium uersus, & per dies triginta bis in die lotiū agitari facito, ut omnis odor uel acritudo lotij, & uirtus eius ad mel in concha hæreat. postea rades concham ipsam, id est, quod melle inlitum fuerat, & rasuram tundes in mortario, & cribrabis diu, & repones in ampulla, uel uitrea uel cuprea; cum necesse fuerit, ex melle temperabis, & intrinsecus oculum perunges; mirabile remedium experiēris in omnibus ferme oculorum etiam grauioribus causis. Gramen, quod in summo trifulcum habebit, decrescente luna radicitus sublatum, quamplurimum repone. deinde ex multis unum auspicante lippitudine ad collum subliga, celeriter incumbentem epiphoram discuties. Si impetus oculorum eruperit huiusmodi remedium confestim adhibebis; atramenti sutorij — I. in aquam mundam defundes, idque acriter feruere facies.

re facies, tum operies ut feruor paululū conqueſcat; atque ubi modicum intepuerit in concham tranſfun-
des, ibique faciem demerges, & oculos patefacies intra ipſam aquam; paululum quidem admordebit, ſed
certiſſimo experimento, dolorem incumbentem auertet. + Colophonie modicum phoenicio inliga &
collo lippientis ſuſpends, ſtatim proderit. + Dolorem oculorum ut anno integro non patiaris, cum
primum ceraſia erunt idonea eſu, id eſt, quaſi matura, de tribus ceraſijs lapillos pertundes, & gairano lino
inſerto pro phylacterio uteris, uoto prius facto contra ſolem orientem, quod eo anno ceraſia non ſis man-
ducaturus. Herba que appellatur perifterion, diſcoques ut mafeſcat ex aqua fontana ad tertias, & inde
oculos fouebis impetu laborantes, intra triduum perſanabis. + Vitanda perpetuo lippitudinis gratia
obſerua, ut Kalend. Ianua. eo tempore, quo Kalend. ſolis die fuerint, & etiam hora prima uel octaua, &
deinceps alio die ſolis, & tertio ſolis die ſimiliter, collyrio tenui inungaris, dum conuerſus ad orientem ro-
gabis deum, ut eo anno dolere oculos tuos non ſinat. + Cum primum hirundinem audieris aut uide-
ris, tacitus ilico ad fontem decurres uel ad puteum & inde aqua oculos fouebis, & rogabis deum, ut eo
anno non lippias, doloremque omnem oculorum tuorum hirundines auferant. + Expertum remedium
ad lippitudinem, ne unquam teneatur, ſi quis obſeruet ſine intermiſſione aut obliuione, ut quotiens laue-
rit, deducta utriſque manibus ad pedes inſimos aqua, ſtatim manus ambas ad oculos referat, atque ad angu-
los eorum utraque manu perfricat, & hoc ter facere debebis. Aduerſus humores & ſubitos impetus o-
culorum & epiphoras, radices betæ maximè nigre ex aqua tepida lauabis, & expreſſas ſabano ſiccabis. de-
inde tundes in piſone marmoreo & ſuccum inde linteo intorto exprimes. tum leuiter ad carbones deſpu-
matum tepefacies, & naribus infundes. ita ut is, cui medeberis, aquam tepidam in ore contineat; & ſi unus
oculus laborabit, diuerſæ partis nares infundes, & melle attico continges. Si tamen uideris oculos ſucci il-
lius inſuſione turbatos, herbe quam quidam cerebellum canis appellant, radix ex aqua decoquitur, eo que
humore oculi aduerſus epiphoras utiliter ſouentur. Farina ordeacea & galla contuſa cum aqua permi-
xta & collecta, oculis cum tepore impoſita, tumores doloresque ſedabis. Coriandrum uiride tritum lacti-
que mulieris immixtum, & tumentibus uel dolentibus oculis adpoſitum, ſtatim prodeſt. idem & apium
preſtat ſimiliter impoſitum. Ros coeſte manu munda collectum, & rutæ ſiluaticæ contuſæ ſucco ad-
mixtum, in plumbea pyxide reconditum, cum opus fuerit aduerſum epiphoras oculorum fronti & ſuper-
cilijs impones. Vino, in quo laurus fuerit decoctus oculi ſoti dolore potentiſſimè leuabuntur.
Spina alba combuſta & bene trita cum ouo ſuperinſita, uel inuncta, ſedat mirificè dolores oculorum.
Gallæ contritæ turis que pari modo puluis uino permixtus & fronti inlitus, tumorem oculorum dolo-
remque ſedat. Crebro lacrymantes oculos ut exſicces, lucernam oleo cedrino repletā accenſamque,
ſuperpoſito uel iuxta ſuſpenſo æneo uaſculo permitte conſumi, inde fuliginem collectam in pyxide cy-
prina reconde, & cum opus fuerit, inunge, miraberis efficaciam medicamenti. Caprinus caſeus recens
coagulatus ſupra oculos poſitus, dolores cito lenit. + Rumicis ſyluatici radicem luna decreſcente colli-
ge, & tecum habeto nitidiſſimè; quandiu eam tecum habueris, non lippies. Democritus adfirmat, felle
hyenæ ſi frons perfricetur, epiphoras incipientes & omnem oculorum dolorem poſſe ſedari. + Si mu-
lieris ſaliua, quæ pueros non puellas ediderit, & abſtinuerit ſe pridie uino & cibis acrioribus, & in primis
ſipura & nitida erit, angulos oculorum tetigeris, omnem acritudinem lippitudinis lenies humoremque
ſiccabis. Chelidonia herba in hirundinum ſtercore naſcitur, quæ oculis plurimum ſuffragatur; maxi-
mè autem caliginem deterget, ſi paulatim inde oculi ſuffundantur, quos cito in priſtinam formam reuo-
cato uigore reparabit. + Hirundinis uentriculo ſciſſo albi ac nigri lapſculi inueniuntur, qui ſi lupino
aureo includantur, & collo ſuſpendantur, omnem dolorem oculorum perpetuo auertent. ſed & contra
quartanas proſunt, croceo linteo uel panno inuoluti linoque ad collum ualidiore ſuſpenſi. Mel in
quo apes fuerint mortuæ, utiliſſimum eſt oculis ſi nitidum ac purum opportune & paulatim infundatur.
Qui ciconiæ pullum elixatum comederit, negatur multis annis continuis poſſe lippire. Hirundinū
pulli plena luna excecantur, reſtitutaque eorum acie, capita comburuntur; horum cinere cū melle mixto
rectè uſus fueris ad reparandam oculorum claritudinem. + Lacertam uiridem excecata ac cuprea,
in uas uitreū mittes, cum annulis aureis, argenteis, ferreis, & electrinis, ſi fuerint, aut etiam cupreis, deinde
uas gypſabis, aut claudes diligenter atque ſignabis. & poſt quintum uel ſeptimum diem aperies, lacertam-
que ſanis luminibus inuenies; quam uiuam dimittes, annulis uerò ad lippitudinem ita uteris, ut non ſolum
digito geſtentur, ſed etiam oculis crebrius adplicantur, ita ut per foramē annuli uiſus tranſmittatur. obſer-
uandum ſane in primis, ut in loco nitido atque herbido deponatur ampulla, & cum lacerta diſceſſerit, tū
annuli colligantur. obſeruandum etiam, ut luna uetere, id eſt a luna nonadecima in uiceſimam quintam, die
iouis, Septembri menſe, capiatur lacerta, atque ita remedium fiat; ſed ab homine maximè puro atque ca-
ſto. + Lacerti uiridis, quem ceperis die iouis, luna uetere, menſe Septembri, aut etiam quocunque alio,
oculos enies ac cuprea, & intra bullam uel lupinum aureum claudes, colloque ſuſpends; quod remediū
quādiu tecum habueris, oculos non dolebis. lacertum ſane eodem loco in quo ceperis dimittes. uel etiam
ſi ſanguinem de oculis eius lana munda excipias, eamque phoenicio conuoluas, colloque ſuſpendas, uteris
efficaciſſimo aduerſum oculorum dolorem remedio. + Cancri oculus ſubtiliter ſublatus & in phoeni-
cio conligatus colloque ſuſpenſus, lippitudini incipienti medetur; ſi tamen remediū a caſto homine fiat.
De manu ſiniſtra muſcam capies, & dum capies, dicere debebis nomen eius, cui remedium facturus es, te
ad curandos oculos eius muſcam prendere. tum uiuam eam ligabis in linteo, & ſuſpends collo dolentis,
ne retro reſpicias. Ad epiphoras oculorum ſedandas, limaces complures tere in mortario nouo uel

nitido, & adijce ibi ouum gallinaceum incoctum, & ringe illic lanam succidam, & fronti impone. Ad ep-
 phoras oculorum, pulsem fabaceam sine sale, sine ullo uncto, tepidam linteolo inline, & oculis de nocte
 impone, ita ut non alliges, continuo feruor recedit. Vt omnino non lippias, cū stellam cadere uel transcur-
 rere uideris, numera, & celeriter numera, donec se condat, tot enim annis quot numeraueris, non lippies.
 Ad lippitudinem inter principia sedandam, in chartam uirginem scribe *ουβανι*, & licio, quod in tela fue-
 rit, collo lippientis innecte. Incipiens lippitudo mirifice & sine dubitatione depelletur, si in charta uir-
 gine scribas, & collo dolentis licio suspendas, *φωφωφωφω*, & hoc praeligamē purus castus facias. Hoc etiam
 remedium indubitatē impetus oculorum, si prouenias, prohibebit, scriptum in charta uirgine, *εουβανι*,
 quod ad collum dolentis licio suspendi debet. sed & coepta
 atque inueteratam lippitudinem sedat, si in faciendo ac suscipiendo praeligamine, castimonia ab utroque
 feruetur. In lamella aurea acu cuprea scribes, *ορνα ουβανι*, & dabis uel suspendes ex licio collo ge-
 standum praeligamen ei qui lippiet; quod potenter & diu ualebit, si obseruata castitate die lunæ illud fa-
 cias & ponas. Ne anno perpetuo lippias, de acinis nouem uuē albē, antequam uiam gustes, nouies te
 inunges, ita ut intra oculos tuos grana singula singulis uicibus infundas. Stercus caprinū uino consper-
 sum tritumque & impositum oculis atque obligatum, omnem dolorem tumoremque detergit. Oculos
 cum dolere quis coeperit, ilico ei subuenies, si quot literas nomen eius habuerit, nominans eandem, totidē
 nodos in rudi lino stringas, & circa collum dolentis innectas. Si impetus dolorem prouenerit, ablinthium
 uetus & fuliginem conteres diligenter, tum mellis quantum satis uidebitur, adijcies, & denuo teres, atque
 ex eo oculos inlines, ualidissime proderit. Ne anno perpetuo lippias, cū primum cucumerem nactus
 fueris, in fontana aqua eum per triduum esse in uasculo mundo permittes. deinde oculis adaperis, faciem
 tuam ea aqua fouere curabis. Qui crebro lippitudinis uitio laborabit, millefolium herbam radicitus
 uellat, & ex ea circulum faciat, ut per illum aspiciat, & dicat ter, excicum acinosos, & totiens ad os sibi cir-
 culum illum admoueat, & per medium expuat, & herbam rursus plantet. Quæ si reuixerit, nunquam is
 qui remedium fecerit, uexabitur oculorum dolore. ad utrumque oculum hoc facito. quæ si minus reuixe-
 rit, ex alia iterum faciat. oportet autem dari operam, ut non nimis herba constringatur, quod facilius plan-
 tata confurgat. Capē longæ succus opobalsamo mixtus, & succo foeniculi, adiecta adipe anserina, inci-
 pientes hypochyses discutit, caliginesque extenuat. Accipitrem si decoquas in oleo fusino, donec caro
 eius resoluatur, & ex eo oculos frequenter inungas, & hypochysim & caliginem discuties. Chameleon
 tis fel tantam uim habere creditur, ut hypochyses intra triduum inunctionibus sanet. Lupi finus diu
 perfrictus ad summam leuitatem, cum melle mixtus, & inunctione adhibitus, oculorum hypochysim discuti-
 tit, & ad summam claritudinem eos perducit suffusione ficcata.

Xerocollyria, & remedia physica diuersa ad xerophthalmiam, & caliginem, & asperitudinem detergendam.

Ad caliginem & asperitudinem oculorum, siccamque perturbationem, sine tumore, quam xerophthal-
 miam greci appellant, facit hoc collyrium, quod psonicon dicitur, accipit hæc. croci * XII. psoni-
 ci * XIII. psimythij * III. opij idem, piperis albi idem, gummis * II. cum aqua pluuiali te-
 runtur hæc, collyria statim inde finguntur, ne confectio dilata uanescat. Collyrium ad caliginem & asperi-
 tudinem, quod stratoticon dicitur, recipit hæc, psimythij * VI. piperis albi * I. onipaci * II.
 cadmiæ * III. opobalsami * II. opij * I. gummis * II. ex aqua pluuiali hoc teritur atque co-
 nfitur, quod melius superiore ad caligines facit. Collyrium quod stacton uocant greci, ad eadem fere
 quæ supra scripta sunt, utile, sed magis mulieribus prodest, accipit hæc. Cadmiæ * II. stibij * VI. pi-
 peris albi * I. æruginis rasæ, & misyos, donec puniceum fiat, usti * singulos S. æris floris * I. S.
 gummis * V. quidam ijs addunt, opobalsami * II. trita hæc diligenter pluuiali aqua asperguntur,
 & in collyria colliguntur. Collyrium acre, ad extenuandas cicatrices quamuis ueteres, caliginesque an-
 gulorum, quod semel inunctum, plurimis diebus effectum præstat. oportet autem eo aquato uti, diu enim
 tenet morsum, accipit hæc. ammoniaci guttæ, quæ sit sine sorde, P. I. æruginis P. S. gummis P. I. primū
 cum aqua pluuiali teritur ærugo, postea cætera adijciuntur macerata aqua pluuiali, & tum collyria fingun-
 tur. Fel testudinis cum melle optimo mixtum & diu coagatum, mirè caliginē tollit, si oculi inde adsi-
 due circumlinantur, aut subtiliter suffundantur. Calliblepharum xerocollyrium primum, accipit hæc.
 æs ustum, stibium, cadmiæ, æquis ponderibus miscebis, teresque diligenter, & donec spumam non faci-
 ant, neque crescant, ad ignem lentum agitabis in uaso æreo; ibique tādū esse patiēris, donec refrigerentur
 atque siccentur; quæ postea ad mortarium nitidissimum transferes, atque illic iterum ex uino uetere opti-
 mo teres, tādū quousque siccentur; de quibus puluerem tenuissimum factum, intra pyxidem cream con-
 des, eoque uelut stibio cum uolueris uteris. Xerocollyrium optimū conficitur sic, lapidis phrygij — II.
 croci — I. falis ammoniaci — II. folij — II. æris usti — III. piperis albi — I. omnia seorsum diutis-
 simè & diligētissimè teres, ut puluerem tenuissimum facias, quem permixtum recondes in doliolo uitreo,
 & cum uolueris, puluere ipso pro ut uolueris, uteris. Xerocollyrium optimū & ad initia lippitudinis pro-
 batum, constat ex ijs, croci — II. farcollæ — II. aloës hepatitidos — I. glaucij — I. teres hæc omnia dili-
 genter, & puluerem tenuissimum in pyxide cuprea recondes, & cum opus fuerit, & intra oculos & ad su-
 perliniendos uteris. Capilli muliebres super testam cōbusti & cum spuma argenti contriti atque ad sum-
 mam leuitatem redacti, xerophthalmias & prurigines oculorum efficaciter sanant, si inde inungantur. Ad
 caliginem

caliginem abolendam de experimento uteris hoc remedio; salem ammoniacum exustum tere & permisce cum lotio pueri inuestis, atque inde adfidue oculos inunge uel superline. Naturalem succum argemoniz, succum millefolij, & succum arnoglossæ, id est plantaginis, colliges diligenter ac nitide equali mensura, & de succo marrubij, rutæ, serpylli, euforbij, exprimes per linteum delicatum, & admiscebis \ominus binos ijsque adijcies mellis optimi despumati libram unam, atque omnia simul diu conteres. deinde iterum colabis tenui linteo, & recondes in uasculo uitreo, atque uteris cum opus fuerit, ad suffundendos & superliniendos oculos caligine laborantes; quibus hoc remedio citò aciem acutissimam reddes. Maluz succis expressus cum farina tenui miscetur ac diutissime teritur, postea adijcitur mellis despumati aliquid, ac uini uti liquidius fiat, potenter inde inunguntur oculi caligine laborantes. Ros nocturnum colliges nitidissime in prato, & in ampullam mittes, atque adijcies illi mellis attici \ominus XII. & opobalsami \ominus VI. ac pariter utrumque miscebis, & sic uteris ad inungendum uel superliniendum; mirum remedium experieris. Succum uettonicæ tenuissimum oculis infunde, clariores eos facies, & importunam lacrymarum destillationem citò ficcabis. Fel cameli solum per se fronti inlinum prodest aduersum caliginem, sed ne omnino lippiat, decoctum cum mellis optimi cyathis tribus, & croci uncia in unum miscebis, & sic suffusionē ad oculos facies, uel etiam superlines inde caligantes & lippientes oculos. hoc medicamine etiā excrecentes carnes in oculis & cicatrices curantur. Ad caligines oculorum detergendas, medicamē ualde efficax; rosæ siccæ pugnos duos plenos, cum radice foeniculi diligenter purgati, & foeni græci pugnum unum plenum in ollam nouam mittes, & decocta prima aqua effusa, sic postea decoques ut spissescat; deinde mellis attici unciam supermittes, & piperis scrupulum bene triti, addes etiam passi cretici aliquantulum, ut liquidius facias, deinde per linteolum delicatum colabis, & ad suffusionem uel superlinationem oculorum uteris. Perdici fel mixtum melli attico caliginem tollit, si oculis adfidue infundatur, sed cū modo & equali mensura. Aquilæ fel cum melle attico, myrrâ uera, & nitro albo, singulis uncijis mixtum, oculis uisionem acutissimam præstat, si cum modo infundatur. Ut acie certiore intueri omnia possis, ficus africanæ etiam ueteris, dummodo pinguior, ad ignem calefactæ succo expresso, uinoque diluto, oculos inunges, gratulaberis remedio. Vipera uiua mittitur in uas nouum fictile, & adijcitur ei succi foeniculi cyathus unus, & furis granum unum. deinde uas obturatur argilla, & circumlinitur, & in furnum feruentem mittitur, atque illic excoquitur, donec cinis fiat. hoc de experimento hypochyses caliginesque potenter atque mirifice purgat. Anagallidos herbæ flos purpureus ad mensuram obolorum trium diligenter tritus, & cum pauxillo uini ueteris mixtus, inunctioni caligantium oculorum mirabiliter prodest. Laceratæ pissinæ, quæ in segetibus morantur, quas Græci aruras uocant, comburito, & ad tenuissimum puluerem redigito, atque ex eo cum uino aut melle optimo caligantes oculos inunge, ualde proderit. Centauræ minoris succo oculi ex melle inuncti, caligine citò deposita, tenuissimam aciem resumunt. Foeniculi radices contrusæ succo, tantundem mellis optimi despumati, utinam attici, misceto, eaque lento igne ad mellis crassitudinem discoquito, repositaque in pyxide etiam ærea habeto; cum erit opus, cum aqua cisternina aut muliebri lacte inungito, quamuis crassas caligines citò discuties. Foeniculi radices decoctæ aqua oculos adfidue foueto, citò omnem caliginem tolles. Caliginantibus oculis, uisus acutior restituitur, neque facile in hoc uitium incidet, qui usus fuerit remedio tali, ut centauræ manipulum nitidum in uini optimi, sed nouellastri congium mittat, aut etiam excoquat, ac triduo in uasculo clauso uel operto macerati faciat. Deinde post triduum, heminam eius uini mixtam cum calida aqua, adiecto melle ieiunus manente illic centaurea cotidie bibat. Lauri folia XX. leuiter contrita, passo diluito, & linteo colato & in calcabulo decoquito ad crassitudinem mellis, atque ex eo inungito, efficaciter caliginem discuties. Baccæ myrti supra carbones uiuos ad suffumigandum positæ, caliginem extenuant, si oculis apertis fumum earum patienter exceperis. Pulli hirundinum uel assi, uel elixi, in cibo sæpius sumpti, oculis caliginantibus efficaciter profunt. Lapidem bostrychiten tecum semper habeto, quia ad aciem oculorum excitandam efficaciter prodest. Muris agrestis, id est, qui in campis inuenitur, combusti cinis contritus, & cum melle assidue inlitus, aciem oculorum caligine extenuata confirmat. Scarabæus coloris smaragdini tanquā beneficij oculis præstare dicitur, ut uisionē ei acutissimā reddat, qui cū contēplatus fuerit assidue. Coctæ africanas ueras super spissam craticulā dispositas ponito, & carbones acres assidue suggerito, ut æqualiter comburantur, deinde mortario terito, ut tenuissimum ex ijs puluerem facias, adiectaque mellis attici coryla una, iterum ualidissime terito, & postmodum in uasculo fictili reponere, & signa, & cum aliqui mederi uoles, spicillo inde cum inunge, intra paucos dies integram aciem eius claramque restitues. Fit ex uipera collyrium ad caligines oculorum adaperiendas discutiendasque mirificum. comprehensam igitur occisamque uiperam in uaso fictili repones, eamque illic putrescere permittes, donec ex ea uermiculi nascantur; hos eliges & conteres & adijcies ijs croci paululum & iterum teres, atque inde collyria facies, & sic cum melle attico, aut lacte muliebri oculis inunges. idem præstat & cinis uiperæ combustæ, sicut supra scriptum est, sed cum ijs quæ hic adiecta sunt, temperatus. Salem quā candidissimū ieiunus si quo, optimo mixtum & diu coagitarum, caligines eximit, si assidue inde oculi suffundantur, aut superlinantur. Adipes omnium fluuiatium piscium in sole liquefactæ adiunctoque melle inunctioni adhibite, mirifice oculis caligantibus profunt. Herbæ chelidoniz succum, foeniculi succum, ad quartarios singulos misce cum mellis optimi quartarijs quatuor, & oculos grauedine & asperitudine laborantes inunge, mirè proderit, sed simul omnia decoque in uaso æreo, & sic inunctioni referua. Lapis medius in lu-

pina pellicula subligatus collo, atque ita diu portatus, sed prius muliebri lacte pertractatus, non tantum caliginem tenuare, uerum etiam hypochysim discutere, & obductam aciem aperire confuerit. Hygra quæ prodest ualde ad caliginem detergendam, conficitur sic. croci — I I. piperis albi unciam, aphronitri unciam, myrræ unciam, mellis attici unciam. crocum & piper ex uino teres. nouissimè aphronitrum & myrram seorsum conteres, & sic uniuersa coniunges, atque ad suffundendum uteris ex melle. Hygra mirifica quæ & caligines abigit, & oculis suffusis lumen instaurat, accipit hæc. opobalsami ℥. III. myrræ ℥. III. opopanacis ℥. I. S. mellis attici felibram. opopanacem primum ex uino teres diligenter, tum myrram adijcies & teres, postremum opobalsamum addes, atque omnia communiter terendo, admiscebis & postea ad inungendum uteris. Fellis gallinæ uel uulturini, quod longè magis prodest, scriptuli & mellis optimi unciam, bene trita coniunges, atque in pyxide cuprea habebis, & opportune ad inungendum uteris; hoc nihil potentius caliginem releuat. Rosmatutinum quod in hæserit rutæ, & succum chelidoniz, & mel optimum despumatum pari mensura permisce, atque ad tertias decoque, & in pyxide cuprea reconde, & caligantes oculos infunde. Fellis terræ, & chelidoniz, utriusque herbæ succum, cum mellis optimi despumati pari mensura permisce, atque ex eo caligantes oculos inunge, efficacissimo medicamine uteris. Satureiæ uiridis succo tenuissimo si adfiduè angulos oculorum contingas, caliginem cito discuties. Idem præstat & rutæ succus per linteum tenue expressus, in pyxide ærea conditus, atque angulis oculorum caligantium adpositus. hoc cuiuslibet ætatis hominem infirmissimi uisus mirabiliter curat, certe si aliquid mellis attici fuerit admixtum.

Remedium ad tumorem oculorum uel nimiam desillationem.

Pulegij flores destringe, eosque madefacito ex aqua frigida, & contere bene, atque ex eo panni tenuissimi partem dimidiam line, ut ex altera parte panni integas oculos, & cum ibit dormitum, cui medendum erit, supra oculos pones, ipsa nocte tumorem humoremque oculorum eius sedabis. Ad oculorum subitum impetum uel dolorem, remedium efficax sic. succum cardonis, succum urticæ alexandrinæ, succum bugilloniæ, crocum, atramentum futorium, æquis mensuris ista coniunges, & addes ijs sapæ modicum, & aceti quantum sufficiat, & decoques ad spissitudinem mellis liquidi, atque ita oculos inde superlines, ut modicum ingrediatur eos, & delacryment, continuo sanabuntur.

Ad uulnera, ulceraque, & cicatrices, atque carbunculos, crustasque oculorum, & glaucomas atque albugines detergendas, & palpebras componendas, collyria & remedia de experimentis physica & rationalia diuersa.

Ad sordida ulcera oculorum crustasque habentia quas medici escharas uocant, & ad carbunculos oculorum, quos anthracas dicunt, facit bene & per se, mel atticum purum pyxide cuprea conditum, & repositum sub signaculo mēsis ferme duobus; quanto enim diutius in pyxide ea manserit, efficacius fiet. sed præcipue hoc, quod quidam diasmyrenon, nonnulli enodes, quia boni odoris est, nominant, quod etiam ad pustulas papulasque & suppurationes oculorum, & ad cicatrices non ueteres, & ad palpebrarum recentem etiam in corporibus tenerioribus asperitudinem facit; oportet autem eo ad sordida ulcera diluto oui albo, id est aquatissimo uti, deinde cum lacrymæ fluere desierint, cineraceo collyrio super inungi; item ad pustulas ex ouo tritum facit, ad papulas uero & ad dolores cum rubore & distensione oculi sicca, bene imponitur cum lacte mulieris. ex aqua autem ad cicatrices recentes extenuandas & palpebrarum asperitudinem tollendam teri debet, & subiecto spicillo, aut inuersa palpebra oculis inferi. componitur autem ex ijs rebus; pompholygis lotæ * VIII. æris usti * VIII. croci * IIII. myrræ * IIII. nardi spicæ * I. & pondus uictoriati, lapidis hematitæ * II. S. piperis albi grana X. opij * I. & pondus unius uictoriati. gummis * X. teruntur hæc cum chio uino, & confestim collyria finguntur, atque in umbra ficcantur. Acriore autem collyrio ad cicatrices extenuandas, & ad palpebras asperas utimur; quod quia ex quatuor rebus, ut quadriga equis constat, & celeres effectus habet, harma dicitur. recipit hæc, æris usti * IIII. tureæ arboris corticis * IIII. ammoniaci guttæ * IIII. gummis * IIII. teruntur hæc ex aqua pluuiali. hoc etiam superunctum ad puerorum epiphoras & qui non suffiunt unctionem, optime facit. Collyrium, quod proprie facit ad asperitudinem palpebrarum & calositatem. oportet autem aut subijcere spicillum palpebræ, aut inuertere ipsam palpebram, & sic inungere. recipit æris usti * XIIII. eruginis * VI. croci * X. myrræ * I. cassiæ rufæ fistularum uictoriati pondus, piperis albi grana XLV. gummis denarios nouem, cum uino chio hæc teruntur, & sic colliguntur. Ad palpebrarum ueterem asperitudinem, & excrescentem carnem, quam sycolim Græci uocant, in qua est callum durissimum. est autem liquidum medicamentum, quod ideo hygra appellatur, quod etiam carnem ex palpebris tollit sine magno dolore. Recipit hæc, myrræ, turis, croci, misyos singularum specierum denarios ternos, chalcitidis * VI. hæc teruntur diligenter ex aceto acri; ubi leuia facta erunt, & habebunt spissitudinem passî, miscetur ijs mellis attici P. I. deinde in patella æris cyprij super carbones posita inferuescit, donec mellis habeat non nimium liquidi spissitudinem, atque ita reponitur in pyxide æris cyprij. Cum opus est, inuertitur palpebra & per spicillum adponitur; quod medicamentum suffricatur curiose in oculo ad delacrymationem; & ubi desierit mordere, rursus inuerti oportebit palpebram, atque ita pollice impresso, membranas innantes adducere, quæ facile subsequuntur; post hoc cinereo collyrio

collyrio ex aqua inungendi erunt oculi crassius, hoc medicamentum, multorum annorum callos & asperitudo palpebrarum desperatas a quibusdam medicis oculariis, paucis diebus tollit. Collyrium ad

ulcera, papulas & epiphoras. cadmiz * VIII. cerussæ * IIII. amyli * III. opij * II. acaciæ * I. gummis denarios duos. tragacanthi denarium unum. ouorum semicoctorum vitellos duos, fabæ sine cortice, id est, purgata modicum, quæ ante diem ex aqua macerari debet cum tragacantho, atque ita teritur, tum formari collyria, quæ lachrymarum impetum & iugitatem potentissime sedant ac reprimunt.

Collyrium dionysianum, quod appellatur theodotion, ad lacrymam tenuem restringendam, & ad ulcera & asperitudo palpebrarum & ad cicatrices recentes efficacissimum, conficitur sic. cadmiz * III. æris usti & loti * VIII. crocomagmatis * VIII. stibij * IIII. opij * IIII. castorei * IIII. nardi syriaci * IIII. lycij * IIII. acaciæ * XVI. croci * VIII. myrræ * VIII. palmarum ossa uel nucleos uustos, numero XII. gummis * VI. uini austeri ueteris bene odorati sextarium unum. teruntur hæc diligenter, & confestim ex ijs collyria fiunt, atque in umbra siccantur.

Collyrium stratioticum, facit ad tumores oculorum & lacrymam acrem compescendam atque ad palpebras asperas & ad caligines & cicatrices ex itinere & puluere & fumo collectas. cadmiz denarios octo. cerussæ * VIII. crocodili stercoreum * IIII. æruginis rarsæ * II. castorei * S. omphacij andi, aluminis fissi atque usti denarium unum. piperis albi * V. opij * I. S. gummis * VI. teruntur hæc diligenter, & ex uino salerno colliguntur, atque inde collyria formantur. Collyrium quod appellatur

sphragis, ab Antigono medico inuentum, facit ad omne ulcus & ad omnem uisionem & plagam & ruptionem tunicularum oculi, & ad omnia oculorum uitia, præter epiphoram incipientem; accipit hæc, cadmiz * IIII. pompholygis * X. opij * IIII. amyli * IIII. acaciæ * IIII. tragacanthi * IIII. gummis * II. teruntur diligenter hæc species, & ex aqua pluuiatica, collyria componuntur. Collyrium stratioticum pforicum, compositum ex cadmiz * XII. S. croci * XII. piperis albi * XV. cerussæ * II. opij * II. gummis * IIII. chalcitidis * I. componitur autem pforicum sic, teruntur hæc seorsum singula bene siccata: deinde in unum collecta, aceto consperguntur, ac postea in ollam

fistilem nouam conijciuntur cum ipso aceto, quam bene opertam in equino stercore obrui oportet, atque illic haberi per dies XL. postea hæc permixtio in sole areferi debet, ac deinde teri, & tum aqua pluuiali collyria formari conuenit; de quibus & inungi oculos, ut supra scriptum est, causis grauib; laborantes, & superlini optimum est.

Ad oculorum omnem dolorem & præsentem & ueterem, & ad caliginem atque albuginem, & pruritum atque antiquam, ut ita dixerim, cæcitatem. Nam ut auctori huius remedij de experimento credamus, duodecim annorum cæco intra dies uiginti unum restituisse se dicit; quanto autem recentior ualitudo fuerit oculorum, tanto uelocius curabitur medicamine tali. collyria multi generis, id est, uel decem confectio num æquali uel numero uel pondere, infundes in lotium pueri uirginis, & ad uncias singulas collyriorum, quæ infuderis, septena grana piperis in mortario nitido diligentissime teres, ut puluerem subtilissimum facias, & cum mellis optimi despumati coëlearibus tribus miscebis, & iterum diligenter teres, postea simul confundes omnia, id est, collyria, lotium, & piper illud cum melle, & iterum diutissime ac diligentissime teres, collectumque nitide in pyxide cuprea recondes, atque ex eo quemlibet oculorum causarum intus, id est, intra oculos inunges. quod si per tempus medicamen spissatum fuerit, lotium puerile infantis, quantum opus fuerit, ut more collyrij liquidum fiat, infundes, & sic sub cilio & palpebris, id est, intra oculos, sicut diximus, sollicitè inunges. hoc medicamine multis experimentis probato, constat nihil esse præstantius, si quis eo castus & purus utatur.

Medicamen barbaricum ad omnis oculorum causas uel impetus, siue sint scabri & lacrymosi, siue etiam uermiculos habeant aut brigantes, qui cilia arare & exulcerare solent. in ollam rudem mittes tres sextarios aceti acerrimi & ferrum, id est, clauos ueteres minutos, uel alia minutalia ferri uetusta, & claudes ollam diligenter; operculum tenuiter pertundes, & in illo foramine pones aut cannam aut sambucum perforatam, unde habeat spiramentum; mittes tamen in eandem ollam cum aceto & ferro, rosæ siccæ unciam unā semis. ac postea ollā ipsam cooperies fimo caballino recenti, ita ut spiramen illud ollæ per calamum liberum sit, hoc est ut supra molem illā fimi caballini, quo fuerit olla constricta uel operta, solum spiramen emineat, ut semper habeat anhelitum, quindecim diebus, quibus necesse est ut in fimo illo perseveret. nam omnino obseruabis, ne unquam illis XV. diebus deoperiatur. sextadecima die tolles ollam de stercore illo, & diligenter mundabis, ne quid illic sordidum hæreat; & cum patefeceris ollam, mittes in eam fœniculi uiridis succum, quanta est mensura bonæ potionis in uino. deinde agitabis diu & colabis linteo tenui & mittes in bucculare rude uel diligenter nitidatum, deinde lento igne decoques, & semper agitabis, cum aliquantulum coxerit, addes in sextarium medicaminis, tria coëlearia mellis optimi despumati, & iterum diligenter coagitatum repones in ampulla uitrea, aut pyxide cuprea, ac sub signaculo habebis; & cum opus fuerit, ad caliginem & albuginē detergendam interius oculos inunges. Ad præsentem autem impetum uel dolorem, quamuis uehemens sit, desuper oculos inlines. quod si grandis feror oculorum & acres uel frequentes lacrymæ erunt, etiam tempora & frontem medicamine inlines, ita ut in die uel quater superlinas; & cum siccata fuerit superlitio ipsa, non abies eam, sed semper addes nouam inductionem. quod si scabri oculi fuerint, aut uermes, qui palpebras exarent, & inde sit tumor inuectus, cilia superiora & inferiora, id est, palpebras ipsas, ubi causa ualitudinis est, inunges; experiēris ad omnia ferè oculorum uitia mirificum medicamentum, si castus & purus eo utaris; de quo tamen dum in fimo est, uix tertia, aut certè media pars remanere debet. ita enim melius fiet, nā quanto plus consumitur uapore fimi illius, tantò magis confortatur; & ideo maior olla esse debet, ut pro-

penfius medicamen fiat; quod & diu feruari oportet, & multis neceffarium eft. Ad oculos fcarbos & palpebras perforatas humore uetufto, uel pedunculis exelas, remedium praeſens barbaricum quidem, ſed multis probatum. Scarabaeum pilofum, qui ſimilis eſt ſcarabeo uero, in ſepibus uetuftis lapidoſis, in foſſatis ſepium requies, qui cutiones ſunt, colore pſeudoſtauo, quaſi leonino, piloſi, lucentes, ante ergo quam illum cutionem tollas, folium caulis primo mane cum ſuo ſibi rore uel gutta concluda in eodem folio teneatur, ut ubi cutionem illum inuenieris, digitis que pollice & medicinali adprehenderis, conſeſtim ſupra folium illud caulis teneas, ut ſupra guttam illam lotium eius excipias; quia ubi manu adprehensus fuerit, ſtatim ſe ſubmeijt. prouidendum ergo, ut uelocius ſupra folium illud caulis ponatur, ne lotium eius quod cito effundit, alibi excidat; quod commixtum cum illo rore caulis per ſpicillum palpebris impones, & loca ſcarba, uel exela inter pilos perunges, effectum rei cito miraberis. quod ſi caſu uno in loco, uel in diuerſis, plures iſtos cutiones inuenieris, omnium lotium uel humorem quemadmodum diximus, in folio caulis humidi ſtatim de horto ſuſcipere debebis. & adiectis guttis aliorum de caule foliorum in uafculo uitreo recondere, ut cum opus fuerit, praeto habeas, quia diſticulte huiusmodi beſtiolae inueniuntur. Ad albuginem oculorum detergendam efficax hoc remedium. uulpem uiuam capies, ei que linguam praecides, ipſamque uiuam dimittes, linguam autem eius arefactam, phoenicio ligabis, & collo eius, qui albuginem patietur, ſuſpendes. Herbae ſymphonicae ſurculum collo eius, qui albuginem patitur, lino ſuſpendes, ita ut per dies triginta illic ſit; quanto recentior albugo fuerit, tanto citius ſanabitur. Roſmarinum combure & puluerem eius cum melle attico diligenter tere ac permiſce, atque inde inunge, conſeſtim ſubuenies ei, qui albuginem patitur. Fabam fractam purgatam atque uſtam, ad ſummam leuitatem teres, & oculos inde albugine occupatos adſidue ex aqua circumlines, miro remedio ſubuenies. Piſcis marini felle, qui ſcorpionem dicitur, oculi inuncti, caligine atque albugine quamuis craſſa cito liberabuntur. Sanguis columbarum de loco pinnae eo momento, quo pinna auellitur, oculis dum adhuc tepet, debet infundi, qui ſcitu aliquo uulnerati aut ſanguine ſuffuſi fuerint; album quoque oui incoctum cum croco trito oculis ſuperpoſitum, & lana alba ſuccida inuolutum medetur. Ranam de lacu prendes, & ſpino oculos ei ſubtiliter erues, atque in panno coccineo de licio ligatos, oculis internis, cruentis ſuperpones, cito medeberis. Mel atticum & ſtercus infantis, quod primum dimittit, ſtatim ex lacte mulieris, quae puerum allactat, permiſcebis, & ſic inunges; ſed prius eum, qui curandus eſt, erechim ad ſcalam alligabis; quia tanta uis medicaminis eſt, ut eam niſi alligatus patienter ferre non poſſit; cuius beneficium tam praefens eſt, ut tertio die abſterſa omni macula, mirifice uiſum reddat incolumem. Ad cicatricem uel plumbum extenuandum, & aſperitudinem pruriginemque oculorum purgandam, & humorem ſiccandum, & ad ſcabras ac ſcabidas palpebras, atque alia oculorum uitia, unum hoc remedium uel praecipuum eſt. folia oleagina commanducato diligenter, eorumque ſucco, quem in ore collegeris, quotidie ieiunus oculos ablingito, uel in lineto per linguam, celeriter uitia ſupra ſcripta diſcuties. Ex hirundinum pulis fit calliblepharion bonum, quod aſperitudinem pruriginemque oculorum potenter expurgat: nec patitur quidquam in ijs moleſtiae congreſcere, humidus quoque naturaliter oculos exſiccatur; quod hoc modo componitur; capita pullorum quam plurima igne lentiffimo comburuntur, & trita in puluerem tenuiſſimum rediguntur, quae adinixta recenti adipe gallinae, inunctioni maxime proſunt. Intibi ruſtici, de quo naſcuntur cauliculi complures, contriti, lucus in oculum inſtillatus, celeriter cicatrices & plumbum oculorum eximit. Caput ſtellionis combuſtum, & tritum, & melli attico admixtum, oculos lacrymofos inunctione adſidua ſiccatur & ſanat. Pulmonis hedi combuſti cinis pruriginem oculorum diſcutit, & ſcabras palpebras emendat, ſi quaſi ſtibiū imponatur. Felle catelli dierum ſeptem, oculi ex melle inuncti, cito a leucomate liberabuntur. quidam etiam adfirmant efficaciffimum remedium eſſe ad detergendam glaucomata ſi catello dierum ſeptem caput uiuenti diſſindatur, & de dextra parte cerebri oculus dexter, de ſiniſtra ſiniſter, inuncto illic ſpicillo inungatur.

Vt leucomata & albuginem quamuis denſam ex oculo detergeas, turam & anturam herbas uiuentes nitidiſſime collectas contundes, & per linteam tenue ſuccum earum exprime, eo que oculos inunge. Leucomata ut extenues & diſcutias, utere medicamine quod conſicitur ſic; pumicis combuſti triti ꝑ. XIIII. chalcitidis ꝑ. VII. gummi ꝑ. quatuor, & ſinapis puſillum ut toleretur, adijcies; haec omnia in tenuiſſimum puluerem redacta, in unum permiſce, & ex aqua fontana facito collyria craſſiora; quibus ſic uteris, ut circumdetur tribus partibus tera collyrium, ſed extremum collyrij ſit leue ac tenue; quod in ipſum leucoma imponas, & iube oculum adoperiri pauliſper, ne excidat collyrium; quod ſi exciderit, iterum reponatur, poſt haec inunge oculum leni collyrio, ſtatim emittet quaſi ſquamam. ſi ergo magnum leucoma fuerit & craſſum, ita curabis, ſin autem tenue, cum impoſueris medicamen, maturius tolles, poſtea uero utere ad inunctionem collyrio, quod graeco uocabulo diacopon appellatur; etenim apud medicos hoc collyrij genus magnam habet effectus ſui dignitatem. Turturis ſimus ad ſummam leuitatem tritus & cum melle attico, aut etiam alterius generis, dummodo optimo & deſpumato inunctus, leucomata oculorum potenter extenuat. Galli gallinaei maxime albi fel ex aqua dilutum, & inunctione adhibutum, leucomata oculorum & hypochyſes ſanat, & aciem luminum confirmat. Stercus quoque gallinae album cum oleo uetere tenuiſſime tritum & ad poſitum, idem oculis remedij praestat. Fel uituli diſtenter collectum ad cotylae menſuram, in uas aureum mittitur, tenuique igne admoto ita excoquitur, ut ſpiſſetur; deinde mellis boni tantum mittitur, quantum fellis illius decocti remanſerit; adijciuntur poſtea myrrae tritae drachmae duae, & croci una, & aris ſlos pauillum, ac poſtea ſimul omnia diu coagitata ad tertias decoquuntur,

tias decoquuntur; quod medicamen in pyxide zrea debet reponi, satis utile; & leucomatis, & cicatricibus, & omnibus uitij oculorum, si adfidue inde, & opportunè inungantur. Vt leucomata oculorum efficaciter discutias, ungulas asini uiuentis lima, & scobe earum quàm tenuissimo, qui leuitate sua oculos nō offendat, cum lacte muliebri mixto, frequenter inungito.

Araneus albus cruribus longissimis ac tenuissimis cum oleo uetere cōtritū, per inunctionem adfiduam leucomata eximit, & ideo plures cum oleo sufficienti teri oportet, ne ante confirmatam sanitatem medicamen necessarium desit.

Cæpa longa contusa exprimitur, eiusque succus opobalsamo, uel quod efficacius est, lacti mulieris admixtus, leucomata, & cicatrices, & quæ græci argemata appellant, miro effectu inunctione adhibita extenuat atque persanat.

Anemone dicitur à Græcis herba, quæ tantam uim remedij habere creditur, ut portata ab eo uel subligata collo eius, qui glaucoma patitur, intra dies quadragintaquinque cum sanissimum reddat.

Vt glaucoma incipiens celeriter discutatur, herbam serpyllū decoque, & eius aqua oculos adfidue fove, postea piceliquida pura ac nitida uelut collyrio inunge, citò recipies sanitatem.

Perdicis unius fel, opobalsami cyathum unum, cyperi sidonij cyathi partem dimidiam, trita hæc & ad summam leuitatem perducta, permixtaque in pyxide plumbea repones, & inunctione aduersum glaucomata, & hypochyses, & caliginem mirè ueris.

Corui marini fel inunctione adhibitu, caligines tollit, albugines & cicatrices extenuat, carnes excrescentes compescit, fluoresque oculorum reprimat.

Pisciculi, qui equum marinum simulat, fel, ouorum albumini mixtum & cum lana succida oculis adpositum, melius remedium superscriptis oculorum causis, quàm ullum aliud medicamen præstare manifestum est.

Scrofina adipe recenti si quis contritos angulos oculorum, quos græci canthus uocant, interius exteriusque inunxerit, uermiculos qui noxij sunt oculis potenter educit.

Sepiz testa interior, quæ mollis est, diligentissime trita, & muliebri lacte permixta, atque inunctioni adhibita, supradictis oculorum causis plurimū prodest.

Nardi indici uel syriaci ex uino uetere triti siccati que puluis, pro xerocollyrio oculis impositus mirabiliter prodest ad ualitudines superscriptas.

Mei optimum despumabis, ut bene purum sit, & admiscebis pari mensura succum rutæ & herbæ chelidoniz, atque ad tertias decoques; & cum omnia bene permiscueris, in ampulla uitrea sub signaculo seruabis, & uteris miro medicamine ad scabros, & lippos oculos inungendos.

Item ad oculorum causas, remedia physica, & rationabilia diuersa, id est, oculis ictu latis, & si quid felitō eos fuerit ingressum, & aduersum molestias pilorum, & ad egilopas, & ad nyctalopas, & ad narulos, id est, ordeolos oculis infestos, ipse addite infra collyriorum diuersorum confectiones.

Quocunque ictu latus oculus, si sanguinolentus uidebitur, palumbinus ei uel perdicis, uel turturis sanguis, aut si hæc animalia non erunt, columbinus de pinna sublatus statim, id est adhuc calens infundatur.

Bitumine, sulphure, & ture permixtis, oculos ictu latis suffumigato, statim sanabis si frequenter id feceris.

Herba, quam græci farcocollam, nos argemoniam appellamus, si uiridis erit trita, sin arida, calida aqua macerata, quò facilius teri possit, inlita oculis sugillationes liuoresque eorum mature discutit.

Sanguine hirundinis recenti actepido inunctus oculus ictu latus, & cruore suffusus statim sanabitur.

Radix rutæ trita, & inlita oculis cruore suffusis, etiam commansa, & adfidue posita, plurimum prodest; uinum quoque, in quo ruta diu fuerit macerata, rationabiliter infunditur.

Mulieris primiparæ puræ ac nitidæ salua ieiunis instillata oculis liuorem suffusionemque quamlibet cruentam, efficaciter adimit.

Herbæ uetronicæ folia teres, & salis triti modicum adijcies, & super ictu percussu uel cruoribus suffusum oculum conligabis, mirè proderit. nam quando ei id solueris, uidebis ex eo sanguinem distillare, ita omnem causam extrahet.

Lana succida madefacta oleo uinoque permixto ac tepens oculis superposita, optime uitia supra scripta persanat.

Ad eiciendum, quæ casu oculum intrauerint, herbam artemisiā uelles radicatus, & inde coronam factam capiti impones, sed is cui medendum erit, dum coronam illam in capite habet, quantum fieri potest oculos apertos habeat.

Digitis quinque manus eiusdem, cuius partis oculum sordicula aliqua fuerit ingressa, percurrentes & pertractans oculum, ter dices, tē tunc relōncō, brē gān, grello, ter deinde spues, terque facies.

Item ipso oculo clauso, qui carminatus erit, patientem perfricabis, & ter carmen hoc dices, & toriens spues, in mon dercomarcos axatison. scito remedium hoc in huiusmodi casibus esse mirificum.

Si arista uel quælibet sordicula oculum fuerit ingressa, obcluso alio oculo, ipsoque qui dolet, patefacto, & digitis medicinali ac pollice leuiter pertractato, ter per singula despuens dices, os gorgonis bafio, hoc item carmen si ter nouies dicatur, etiā de faucibus hominis uel iumen ti os, aut si quid aliud hæserit, potenter eximit.

Leporem marinum, uel eius sanguinem cum oleo tere, atque ex eo uulforum de oculis pilorū loca frequenter perunge, post quod & si renascentur pili, molliores erunt; quibus iterum euulsis, supradictum medicamen inducitur, tum uerò non renascentur.

Si autem etiam lacrymas oculi defillant, adfidue, uitate uis, hederam & uitem exustas, & in puluerem tenuissimum redactas, pari mensura cum supra scriptis permisce ad spissitudinem mellis, atque inde inducito, uel superline frequenter oculos, & confestim defluet humor noxiū, & aduersum uulfos palpebrarum pilos proderit.

Si felle hyenæ loca, quibus molesti sunt pili in palpebris nati adfidue tangantur, confestim tabescent; certè si prius uulsis superducatur, non renascentur.

Pilos oculis molestos si exstirpare penitus uolueris, loca eorum, cum prius eos euulseris, ranæ marinæ felle continge, quod si fel eius repositum aruerit, aquam marinam ei modicè admisce.

Si arista uel quælibet sordicula oculum fuerit ingressa, obcluso alio oculo, ipsoque qui dolet, patefacto, & digitis medicinali ac pollice leuiter pertractato, ter per singula despuens dices, os gorgonis bafio, hoc item carmen si ter nouies dicatur, etiā de faucibus hominis uel iumen ti os, aut si quid aliud hæserit, potenter eximit.

Leporem marinum, uel eius sanguinem cum oleo tere, atque ex eo uulforum de oculis pilorū loca frequenter perunge, post quod & si renascentur pili, molliores erunt; quibus iterum euulsis, supradictum medicamen inducitur, tum uerò non renascentur.

Si autem etiam lacrymas oculi defillant, adfidue, uitate uis, hederam & uitem exustas, & in puluerem tenuissimum redactas, pari mensura cum supra scriptis permisce ad spissitudinem mellis, atque inde inducito, uel superline frequenter oculos, & confestim defluet humor noxiū, & aduersum uulfos palpebrarum pilos proderit.

Si felle hyenæ loca, quibus molesti sunt pili in palpebris nati adfidue tangantur, confestim tabescent; certè si prius uulsis superducatur, non renascentur.

Pilos oculis molestos si exstirpare penitus uolueris, loca eorum, cum prius eos euulseris, ranæ marinæ felle continge, quod si fel eius repositum aruerit, aquam marinam ei modicè admisce.

Si arista uel quælibet sordicula oculum fuerit ingressa, obcluso alio oculo, ipsoque qui dolet, patefacto, & digitis medicinali ac pollice leuiter pertractato, ter per singula despuens dices, os gorgonis bafio, hoc item carmen si ter nouies dicatur, etiā de faucibus hominis uel iumen ti os, aut si quid aliud hæserit, potenter eximit.

Leporem marinum, uel eius sanguinem cum oleo tere, atque ex eo uulforum de oculis pilorū loca frequenter perunge, post quod & si renascentur pili, molliores erunt; quibus iterum euulsis, supradictum medicamen inducitur, tum uerò non renascentur.

Si autem etiam lacrymas oculi defillant, adfidue, uitate uis, hederam & uitem exustas, & in puluerem tenuissimum redactas, pari mensura cum supra scriptis permisce ad spissitudinem mellis, atque inde inducito, uel superline frequenter oculos, & confestim defluet humor noxiū, & aduersum uulfos palpebrarum pilos proderit.

Si felle hyenæ loca, quibus molesti sunt pili in palpebris nati adfidue tangantur, confestim tabescent; certè si prius uulsis superducatur, non renascentur.

Pilos oculis molestos si exstirpare penitus uolueris, loca eorum, cum prius eos euulseris, ranæ marinæ felle continge, quod si fel eius repositum aruerit, aquam marinam ei modicè admisce.

Sicut uolueris pilos uulfos non solum in oculis, sed etiam in locis uerecundioribus non renasci, lacte mulieris eo die expresso, quo peperit, contingere crebrius loca de quibus pilos tuleris. Pili si oculis molesti erunt, potenter uteris hoc medicamine. lacerta uiridis sel misce cum uino albo, quantum sufficere existimaueris, & mitte in uas æreum, positumque ad solem tam diu agita, donec crassitudinem mellis habeat, atque ex eo loca pilorum uulforum ungue. Lucernam fictilem de papyro & medulla uaccina concinnato, atque eius fumo, siue fuligine uel ligni, pro calliblephario utere, quo palpebras exelas & glabras sepius inungendo, decentissimas facies. Glabris palpebris pilos induces, si æsypo, quod sub armis uiuum nascitur, adiecta myrra, pariterque in mortario trita, spicillo calido loca pilis nuda perduxeris. Pilos oculis molestos diligentissime uelles, atque eorum loca hircino sanguine recenti, aut leporis, aut uespertilionis inlines, uel canino lacte continges, aut acu cuprea calido aceto sepius delibuta perduces. Capnos nomine, est herba, cuius succus uino mixtus atque in litus locis, de quibus pili ab oculis fuerint extirpati, renasci eos non permittit. Ranunculum uiridem comprehensum, acu cuprea pungito, & sanguine eius excepto, palpebras, de quibus pilos tuleris, subinde continge, nunquam renascentur. Sanguisugorum in olla combustarum tritus delicatissime cinis, & uulsi pilis palpebrarum impositus uel inspersus, renasci eos non sinit. Adipe uituli si palpebras crassiores perunxeris, extenuabis eas, & ad sanitatem perduces. eiusdem medulla cum cera & oleo rosaceo equis ponderibus liquefacta & permixta, & ad emplastrum modum imposita, duritias palpebrarum, & si qua illic in modum pilularum nascuntur, commollit ac discutit. Aegilopia emendat simus columbinus ex aceto coctus & inlitus, cicatrices quoque oculorum & albugines mire detergit. Inula rustica radix ualide commenducata, & cum succo suo imposita, ægilopas potenter emendat. quia ubi aruerit, cadit, recentior donec persanet, assidue debet imponi. Ad nyctalopas abolendas lychniten lapidem, quem nos carbunculum dicimus, tecum habeto, magno remedio uteris; quem ut uerum esse scias, sic experire, si festucas leues admotas ad se rapit, sicut lapis magnes ferrum rapere consueuit. Iecur ouillum, id est, ouis candidæ discoctum, cum aqua madesactum contritumque & oculis superpositum, nyctalopas purgat. Varulis id est, hordeolis oculorum remedium tale facies. annulos digitis eximes, & sinistra manus digitis tribus, oculum circum tenebis, & ter despues, terque dices, rīca, rīca, forō. Si in dextro oculo uarulus erit natus, manu sinistra digitis tribus, sub duo orientem spectans, uarulum tenebis & dices, nec mula parit, nec lapis lanam fert, nec huic morbo caput te sciat, aut si creuerit, tabescat. cum hæc dixeris, iisdem tribus digitis terram rāges, & despues, idque ter facies. Efficax hoc remedium hordeolis, nouem grana hordei sumes, & de singulis uarum punges, perque singula puncta carmen dices; & proiectis nouem granis, septem alia corripies, & similiter de singulis punges, & carmen septies dices. abiectis etiam ijs, quinque sumes, & idem quinquies facies. idem de tribus granis similiter. idem de uno similiter. carmen autem hoc dices. *καὶ γὰρ καὶ γὰρ καὶ σὺ καὶ σὺ καὶ σὺ*. Item hoc remedium efficax; grana nouem hordei sumes, & de eorum acumine uarulum punges, & per punctorum singulas uices, carmen hoc dices. *καὶ γὰρ καὶ γὰρ καὶ σὺ καὶ σὺ καὶ σὺ*. Item digitum medicinale uarum contingens, dices ter. *ἰνγὰ ρία, γαλῆρῖα, uarumque grano hordei ardenti, aut stipula forni, aut palea ures.*

Confectiones collyriorum diversorum de experimentis sic.

Collyrium factum ad recentes caligines, & coeptas suffusiones oculorum, conficitur sic. cadmiz *
 VIIS. nardi celticz * IIII. acaciz * IS. aris usti * IS. stibij cocti * IS. myrriz * I. lycij
 * I. croci * I. cerussz * I. aloes * I. zruginis * I. lepidos cypriz * I. opij * I. S. piperis
 grana uiginti. castorei * I. S. gummis * VII. hæc omnia in puluerem tenuissimū redacta, aqua plu-
 uiali colliges, & collyria inde formabis, quæ in umbra siccentur. Collyrium nomine monemerōn, fa-
 cit ad impetus lippitudinis ex ouo inunctum, ita ut cum oui liquidissimo inunxeris lippientem, pusillum
 sustineat, & iterum eum inunges, quem cum bis aut ter inunxeris eadem die iube bis lauari. hoc collyrium
 facit ad scabritudines, & diatheses tollendas ex aqua inunctum, recipit autem hæc. Lapidis hæmatitis
 * XII. pompholygis * XII. croci * XII. myrriz * XII. aris usti * VI. Nardi fyraci *
 XII. piperis albi grana XX. opij * VI. Gummis * IX. hæc uniuersa in puluerem tenuissimum
 redacta, postea cum falerno uino cōteres, atque inde collyria facies, quæ diu in umbra siccentur. Col-
 lyrium dialibanos, ad suppurationes oculorum, conficitur sic. cadmiz * S. cerussz * XII. opij * I.
 gummis * S. rosæ siccz * I. gentianz * S. puluerem tenuissimum ex ijs factum, cum aqua pluuiali
 teres, & ita collyria, qualia uolueris, effinges. Collyrium dialepidos accipit hæc. croci * III. spicz-
 nardi * V. cadmiz * I. S. hæmatitidos * I. piperis grana V. myrriz * I. eris usti * S. lepidos
 * I. gummis * I. rosæ uiridis foliorum purgatorum * II. hæc ut supra de alijs collyrijs scriptum
 est, trita aqua pluuiali subiges, & ita collyria formabis. Collyrium ad lippitudines, & primos impetus
 oculorum, conficitur sic. Acaciz * X. cadmiz combustz & de lacte caprimo aut muliebri, quod melius
 est, extinctz & runsz & cribratz & lotz bene, donec aqua eius limpida sit, * X. hoc quoque pluuiali
 aqua colliges, & ita collyria formabis. Collyrium diamisyos, quod facit ad asperitudines oculorum
 tollendas & ad lacrymas substringendas, componitur sic. misy combures hoc more; conijcies illud in pulta-
 rium, & purgabis, & in furnū mittes, ut tam diu coquatur, donec sit sanguineum. huius ergo * V. spice
 nardi * V. croci * II. cadmię * S. eris usti * S. opij * S. myrriz * S. lepidos cypriz * S.
 gummis * I. S. hæc runsa & cribrata cum uino optimo teres atque inde collyria formabis.

Quidam

Chari Singh.

4. *unus*.

142

[illegible]

• 1947

二、

1

1. 1.

התעורר

2

Cap. 19 IX

ii

aurem. Nihil hoc medicamine potentius neque certius, etiam si intrinsecus cancerauerint aures. Porros uirgines, id est non plantatos, impari numero, & lumbricos terrenos impari numero capies, & simul ex oleo optimo ad tertias decoques, & tepidum inde quod sufficiat, infundes auriculæ.

Laser cum lacte caprino incocto recenti miscebis, & inde aures prius dilues, ac postea fel taurinum, & oleum cedrinum æquis portionibus mixtum, tepens infundes; hoc dolores mirè mulcet, & dubium auditum confirmat, & pus collectum expurgat. Coriandrum uiride teres, & in uini cyatho miscebis & colabis, & lana molli in aurem instillabis, & eadem lana obstrues aurem.

Ad aures quæ grauiter dolent, & uetera uulnera intrinsecus habent, mellis optimi unam partem, aceti acerrimi duas partes confusas decoques feruoribus tribus, & longius ea ab igne remouebis, donec commotus feruor conquiescat. tum nitrum addes eò usque, donec ex uapore agnoscas nitrum resedisse; & iterum leni igne recoques, ne efferueat; tunc addes fel hircinum, uel aprugnum, uel uerrinum aut porcinum, dum modo non de scrofa, & commouebis, & iterum concoques, ac tepefacies, & inde quantum faris est, auribus infunde.

Adeps ranarum palustrium liquefacta si tepens in aures infundatur, dolores nimios mitigabit. Dolor aurium sedatur etiam camino lacte & urfino, si recens instilletur. Terreni uermes cum anseris adipe, uel cum oleo decocti, sine dubio medentur auribus purulentis. Vrina apri seruatur in uitro, sed melius cum uestica ipsius, quomodo ei sublata fuerit; hæc tepens infusa auribus, unice prodest.

Bestiolæ multipedes quæ contractæ in globulos complicantur, in oleo excoctæ infusæque auribus, statim profunt. Tres araneæ uiuentes in oleo si ferueant ad focum positæ, atque inde tepidum auribus quod sufficiat, instilletur, citò medebuntur.

Seuum uirulinum adipe anseris mixtum, adiecto ocimi succo, tepidum auribus infusum optimè sanat. Raphani quoque, id est, radices quæ manducatur, succus infusus auriculæ dolenti, infinitum prodest. Gari excellentis cyathum, & aceti optimi cyathum, & mellis dimidium cyathum, super aquam feruentem in alio uase coques, & frequenter despumabis de pinnula, tepidoque medicamine aures inrorabis & conchyliata lanula claudes; ualde hoc remedium inter experimenta laudatur.

Fraxini tenerrima folia rudes & exprimes succum eorum, atque auribus dolentibus tepidum infundes. Fraxini recentem surculum, id est, humore proprio adhuc madentem, ex una parte in foco pones, & cum per aliam partem succus ebulliet, suscipies eum diligenter, & oleo addito tepidum auribus instillabis.

Cardui siluatici semen ex oleo coques ita leniter, ne uratur; quod postea colabis per linteolum, & tepidum infundes dolenti auriculæ, ac deinde lana purpurea obturabis. Croci, myrtæ, furis, uncias quaternas conteres & adijcies mel atticum, quantum sufficere putaueris, ac decoctum medicamen auriculæ infundes.

Galbanum cum oleo rosaceo remissum, & ter aut quater infusum auribus mirè dolores tollit. Aluminis liquidi — IIII. mellis — III. aceti quartarios tres; alumen cum aceto teres, & simul omnia concoques ad tertias; hoc medicamen tepidum auriculæ infusum, pus optimè purgat, uermes necat, aquam etiam si intrauerit, educit.

Herbæ polygoni, quam nos sanguinali dicimus, succus expressus & infusus, mira efficacia dolorem ulceraque aurium sanat. Adeps anseris miscetur croci succo, & alij confusi succo; quæ infusa auribus, incommodos sonitus tinnitusque earum propriè & unice tollunt.

Pueri inuestis urina recens auriculæ dolenti & ulcerosæ instillata, omni humore ficcato, & dolorem tollit, & ulcera, mira celeritate per sanat.

Lotio humano uetere si quis iam desperatū auris uitium eluerit, salutē integrè lenito dolore restituet. Fel ouillum mulso mixtum si clysterio addideris, & inde auriculas inrigaueris, expurgatis ulceribus certissimam sanitatem consequeris. idem fel cum lacte mulieris instillatum, etiam ruptas interius auriculas certissime sanat.

Coriandri uiridis succus cum lacte muliebri mixtus, infusus auriculæ, dolorem omnem potenter aufert. Cannabi feminis uiridis succus tepens instillatus auribus dolorem apertè tollit.

Senecionis herbæ succus itidem auribus insertus, eandem efficaciam præstat; quod ab experto scriptum & proditum est. Si auricula aliquo pacto uitiata fuerit, anserina adipe infusa, diligenter expurgabitur, sanitati que reddetur.

Compositio medicaminis ad omnia fere aurium uitia, sic, mellis sextarium, aceti bene acris heminam, radices quæ manducantur tres, mittes in ollam rudè bene lotam; sed mundas & integras radices mittes & pariter decoques. sed ut ne refrigeretur medicamen, citato igne usque ad modum luti aquatioris decoquatur; deinde cum refrigeratum fuerit, condes illud in uasculo uitreo, ac tepefactum, quamdiu dolorem & tinnitum, uel sonitum auriculæ perleniat, in aurem de spicillo infundes.

Infirmatis auribus prodest præcipuè picis flos, quem pisselæon Græci uocant, cū oleo cōmuni mixtus, ita ut tertia pars sit olei; nam & dolorem sedat, & non patietur suppurationem fieri; & si facta fuerit, eodem medicamine per sanat. ad summam, ego ipse diu uexatus auris tædio, cū multis frustra usus essem medicamentis, ab hoc sum per sanatus, & alios complures sanauī. florem autem picis appello, qui excipitur dum ea coquitur, lana superposita eius uapori. hoc etiam grauem odorem de aure profinus tollit.

Ad auriculæ tumorem & dolorem sine ulcere, prodest herbæ urceolaris aut cucurbitæ ramentorū succus recens ac tepens per strigilem, in foramen auris dolentis infusus.

Cutiones bestiolæ sunt multipedes, cute dura & solida, quæ tactæ, complicant se in orbē pilulæ rotundissimæ, polypodas Græci appellant. hæc complures coctæ cum oleo molli in uase ferreo, remedio sunt auribus laborantibus, si inde curentur.

Gloris pingue, & galline adeps, & medulla bubulina uel taurina liquefacta repensque infusa auribus plurimum prodest. Benefacit hoc medicamentum, & ad tumorem, & ad exulcerationem aurium, aceti acris sextariis duobus incoquantur mala granata duo, quibus coriarij utuntur; & quia semper acida sunt, nec unquam maturefcunt, thōas oxias hęc gręci dicunt.

Tum deinde adiunguntur ijs & admiscuntur aluminis filii — II. acacie succi — II. & cum bene permixta hęc & coagitata fuerint, reponitur medicamentum in ampulla uitrea; cum opus est, ad tumorem, calidum per strigilem infunditur, & foramen summum auriculę lana succida tegitur, ad ulcus autem, frigidius medicamen per eiusdem generis lanam & auriscalpium iniicitur. Aliud medicamentum, ad tumorem aurium & exulcerationem; mellis cyathi III.

aceti acris cyathus I. S. miscentur, postea adijcitur gari optimi cyathus unus; deinde carbonibus inferuescit; cuius spuma surgens pinnulā abijcitur, & tam diu coquitur uel agitur, donec habeat spissitudinem; hoc calido ad tumorem, frigido ad ulcus, cum oportebit uteris. Item benefaciet hęc compositio etiā ad ueterem aurium dolorem; aluminis P. I. mellis P. II. hęc in mortario prius bene permisceri oportet; deinde olla noua excoqui, donec habeant mellis spissitudinem; cum opus est, infunditur in auriculam ex lana conchyliata, eaque clauditur. hoc & combustum locum sanum reddit, sine dolore, & sine cicatrice, si ei protinus imponatur.

Si caro excreuerit in foramine auri, comprimetur sine dolore aut ferro, hoc pastillo qui conficitur sicaluminis filii P. II. zruginis P. II. misyos. usti P. II. rubricę sinopidis P. II. gummi P. I. teruntur species priores ex aceto acris donec quasi collyrij confectio leues fiant; ultimum gummi adijcitur, & finguntur pastilli, qui ad omnia ulcera faciunt, aqua diluti, emplastri more impositi, cū aut tumores compescendi sunt, aut cicatrices sedandę; sed aquarioribus ijs uti oportet, cum cicatrix duccenda est, ut facilius auriculę inserantur. benefaciunt iidem & ad nares, qualibet causa exulceratas & grauius olentes.

Araneas uiuentes in aceto macerabis, & sic conteres, atque inde aure elues, statim proderit. Mel, butyrum, & oleum rosaceum, pari mensura permisce, ac tepidum auriculę dolentis infunde. Fel aprugnum, & oleum amygdalinum, pari mensura permisce, tepidumque laboranti auriculę instilla.

Tumorem fordesque auriculę optime curat, cucurbitę uiridis succus, & porrus capitatus cum oleo decoctus atque infusus. Ad auriculę dolorem, hastulę regię radice succus, cum melle uel uino infunditur; interdum admisceri oportet thuris & myrrę partem, uel capparis foliorum succum infundere, uel rutę succum, aut eius semen tritum cum rosa, & lentisci succū cum rosa aut amygdalino, uino admixto infundi oportet.

Si pus aut sanies manabit ex aure, maluz succum uino & amygdalino immixtum, uel succo rosę uel rosaceo, tepefactum instillari oportet, protinus effectum exhibebit. Draconez succus aut semen tritum cum rosa aut amygdalino, & uino infusum, purulentę auriculę sanitatem maturam præstat.

Crocum tritum cum lacte muliebri, si instilletur tumori auri plurimum prodest. Hysopum contusum & cribratum cum aceto & nitro & melle infusum, bene facit ad tinnitus aurium atque inflationes; sed melius, si cyprinum oleum admixtum fuerit. Ad tumores & ad dolores auri prodest, croci & opij par pondus ex aqua tritum, aut ex uino tenui infusum. Opopanax cum rosa & amygdalino, & uino trita recte laborantibus auribus instillatur.

Alium rotundum tritum cum aceto, repositum in pyxide plumbea, & cum opus fuerit, cum aceto & rosa infusum auribus prodest. Opobalsami, rosę, croci unguentarij, opij, singulorum æqua pondera, trita, tepefacta, infusa auribus profunt.

Virentis papaueris succus cum rosa uel amygdalino, & uino, uel porri seminis succus cum lacte muliebri, uel ueratrium album tritum cum amygdalino oleo aut rosaceo, uel succus granorum punici mali cum rosa aut oleo amygdalino infusus, dolentibus auribus prodest.

Croci — VII. nucis amarę — V. II. mellis boni cyathos III. aceti boni quod satis erit, mittes, ut spissitudinem habeat medicamentum mellis liquidi, & simul permixtum atque excoctum, dolentibus auribus instillabis.

Myrrę, croci, opij, nardi spicę, thuris corticis, mali punici aridi, fabę ægyptiacę pulpam, nucum amaranum interiora, mellis boni, singulorum * IIII. castorei * II. aluminis filii * II. piperis longi * I. tritis ijs omnibus diligenter & cum aceto acerrimo mixtis atque excoctis, fieri oportet medicamentū tam temperatum, ut simile sit passo. hoc tepefactum instilletur, etiam exulceratis auribus mirę prodest.

Ad incipientes dolores aurium & exulceratas aures, hoc medicamen facies; thuris — IIII. mellis — III. uini austeri cyathos II. aceti acerrimi cyathū I. nardi syriaci * II. myrrę * I. S. croci * I. S. nuces amaras numero III. aphronitri uictoriati pondus, piperis longi * I. fabę ægyptiacę grana purgata IIII. hęc omnia primū per se, deinde in unū mixta teruntur, & tepida dolentibus auribus instillantur.

Castorei obolos I. id est, duas partes uictoriati, radice lanarię, salis ammoniaci, ueratri albi idē ponderis; quibus superadijcies croci uictoriati pondus, olei irini & mellis pari mensura, id est, singulorum * XV. ea seorsum prius singula trita, miscentur in unū, faciunt bene ad dolorem & ulcera aurium tepide inserta.

Dolenti auriculę oportet farinā ordeacea per se coctā, ex aqua multa cataplasmatismore a foris imponere; uel farinam lini seminis & foeno gręci in unum coctam, uel alteram earum cum farina ordeacea, similiter ex aqua multa coctam; oportet etiam extra adhiberi spongas molles & aqua calida bene expressas, deinde tepidum instillare amygdalinum oleum uel laurinum sepius in die.

Prodest bene auribus infirmis. huiusmodi medicamentum; myrrę denarium unum. croci denarium unum. styracis globulos non ampliores, quā cicer est, numero XXX. piperis longi grana XXX. nuces amaras numero XXX. cum aceto hęc teruntur, tādū donec habeant spissitudinē passi, atque ita reponuntur in pyxide cuprea, aut in doliolo uitreo; cū opus fuerit, medicamentū rosa admixta liquefactū tepidū fiet, quod in lana succida auribus instillabitur.

Nardi syriaci * VI. aphronitri * VI. myrrę * IIII. piperis longi &

turis * IIII. mellis attic denarios quatuor, balani, qua unguentarij utuntur in pilulis * VII. fabz zgyptiacz interiora quz sunt amara, * VII. diligēter & seorsum trita prius hzcc, postea permixta cum aceto leuigantur, & cum res postulauerit rosacei olei quod satis sit, admiscebatur, atque ita tepens instillabitur hoc medicamentum, quod protinus omnes aurium sedabit dolores. Hzc quoque compositio statim dolores aurium sedat, centauriez succo, si non fordidum ulcus fuerit, ex aqua uti oportebit, cum autem multum puris erit, uinum admiscebatur.

Supra opinionem efficac auribus hoc medicamentum reperitur; myrrz, croci, opij, nardi syriaci, turis corticis, mali punici aridi, fabz zgyptiacz, quz sunt interiora, nucum amararum idem, mellis boni, singulorū * quaternos, castorei * II. aluminis fissi * III. piperis longi * I. omnia prius seorsum diligenter teruntur, postea cum aceto acerrimo mixta tenentur tandiu, donec habeant spissitudinem passii. cum opus fuerit, medicamentum instillatur tepidum; idem facit egregie & ad ulcera aurium sananda atque purganda.

His qui surdi sunt, & quorum aures sonant succus uiaz immaturz & rosz, pondere pari admixtus tepideque infusus plurimū prodest. Faciunt bene ad aurium uitia, & emplastra quz scripta sunt in libro secundo, plurima rosa, uel amygdalino, & uino diluta, præcipue quz inscribuntur, Cyzicena.

Terreni uermes cum adipe anseris decocti infunduntur auribus, etiam ad iam deplorata uitia. Spuma argenti * VI. olei laurini librā teres in mortario, & coques ad spissitudinem mellis, & auriculz dolenti infundes. si autem & cætera, quz infra scripta sunt, habueris, eadem medicamine admiscebis; croci * I. myrrz * II. rosæ siccz * II. hzc uniuersa pariter miscebis, & auriculz dolenti infundes, qua re, curabis & concretionem siue hyperfarcosim aurium, si addes & aluminis schisti * II. olei cedrini cyathos IIII.

Aduersus grauitatem audiendi, sel bubulum cum urina hirci, auriculz, quz molestiam surdiginis patitur, instillabis, statimque subuenies. Auribus purulentis nitrum uino liquefactum recte infunditur, quia statim prodest. Ad aurium dolorem, quz pus emittent, laridum uetustissimum teres in mortario, & succum illum lana delicata collectum in auriculam immittes, & subinde aqua calida fouebis; & iterum succum illum infundes, mira uelocitate sanabis.

Pullinum sanguinem tepidum in eam aurē, quz obtusior erit, uel dolebit, infundes. Lotium caprinum sub eo momento, quo egeritur, tepidum auri obtusz infundes. Apri etiam lotium in fumo siccatum & melle liquefactum, auri infunditur, & remediatur surdiginem uel dolorem. Ad auris dolorem, mel stillatitium opus est, quod ita facies. fauum contundes & suspendes in linteo nitido & denso, & quod decurrerit, suscipies in calice; quem calicem postea pones in ollula fabri cum calida feruentissima, quantum calix sufferre possit, atque inde medicinali spicillo in aurē infundes, quz dolebit, quam lana claudes. iacere autem debet in alio latere is, cui medendum est, tandiu, donec combibat mel quod infusum fuerit.

Sambuci uiam maturam exprimes, & pones ut confidant sordes, & post hzc colabis, ut sit liquidissimus succus; de hoc liquore duas partes mittes & unam mellis stillatitij, aut certe atticij optimi, & sic decoques in uase duplici ad tertias, tum decoctum recondes, & cum opus fuerit, calidum per spicillum medicinale in aurem infundes, ita ut postmodum ipsam de lana marino conchylio infecta claudas. Cuniq; uiridis succus expressus, atque auriculz infusus, unice dolorem tollit.

Vettonicz herbz uiridis & recentis folia, uel per se, uel in aqua madefacta terito, succumque eorum excipito, deinde adiecto rosæ succo aut rosaceo oleo tepido, in aurem instillato, lanaque claudito, mirum est. Si auricula interius ulcerosa erit, porri sectiui succum 8. I. cum mellis hemina ad tertias decoquito, & per sanam, tepidum in aurem instillato.

Cannabis foliorum succus auriculz instillatus, uermes innatos necabit, & si quod aliud animal inreperit, interficiet. Eiusdem seminis uiridis succus instillatus, dolorem omnem auriculz potenter auertit.

Cæpæ succus cum melle permixtus, & auriculz instillatus, grauius audientes emendat, dolorem sedat, purulenta expurgat, uermes enecat. aquam etiam, quz ingressa fuerit & omnem humorem educit.

Cyminum siluestre contritum & succo ruz immixtum, instillatumque, auriculz dolorem lenit, uentos quoque interius sonantes remouet atque omne uitium potenter emendat. Herbam quā græci polygonon, nos aliquot uocabulis, sed præcipue sanguinalem dicimus, mira efficacia dolores aurium discutere, etiam nos experti sumus, si expressus succus eius tepidus auribus instilletur.

Senecionis herbz succus cum liquido nardo instillatus, & dolores & ulcera aurium sanat. Oleum laurinum strigili ferreæ inditum, atque ita calefactum infusumque auriculz dolorem sedat.

Vermes ex qualibet arbore rubri coloris contriti cum oleo & infusi, dolores aurium sedant. Aqua ingressa auriculam si cum rosæ succo aut rosaceo oleo, in cortice mali punici calefactus, & auriculz inditus, mirè succurrit.

Gallæ ex uino decoctæ humor instillatus auriculz, ex qua sanies fluit, etiam quæ fuerint purulenta, purgabit. Refina terebinthina remissa adiecto muliebri lacte instillata, ruptas auriculas potenter sanat.

Nucis iuglandis foliorum succus tepidus instillatus, dolenti auriculæ mirè proderit. Myrræ trite uistoriati argentei pondus, & lanæ succidæ non carptæ, combustæ pulueris tantundem, infuso spasso cretico simul terito, donec ad crassitudinem mellis redigas, tum calefactum per triduum auriculæ infundito, quarta die sanam efficies, & mirabere magnum remedium.

Turis masculi, myrræ troglodyticæ, croci eorycij, tantundem ponderis, nucū quoque amararū tantundem miscebis, sed omnia ad summā leuitatē contrita adiecto aceto teperabis, ita ut medicamē ad crassitudinē liquidi mellis adducas, tū in pyxidē plūbeā transfundito, atque illic sub signaculo conditū habeto; cū opus erit, purgata prius auricula utere, ita ut ex eo lanulā madefactā inseras, hoc auxilio usque ad pfectā sanitatē uti poteris; nāque nō solū dolores aurium, sed & uetera & purulenta uitia potentissime expurgat & sanat.

Galbanū rosā liquida aut ungueto nardino dilutum

luta in instillatumque, dolorem aurium lenit. Alumen mulfum optimo dilutum & lana instillatum, dolorem aurium sanat. Gallinæ adeps liquefacta & tepide instillata, quodlibet vitium aurium sanat. Galli gallinacei ex uentriculo interiore membrana, quæ proijci solet, arefacta tritaque ex uino, adiecto paululo opij, medicamen auribus utilissimum facit, quod calefactum, infusum suppurationem eius expurgat & sanat. Adeps anserina cum croci succo mixta & tepesfacta ac sic infusa, aquam & omnem humorem de auriculis euocat & persanat. quod si ex ictu aliove casu auricula uitiata fuerit, tunc per se anserina adeps sola diligenter expurgata, leuique igne liquefacta, infusa auriculæ, & dolorem tollit, & uitium persanat. eadem adeps adiecto ocimi succo tepesfacta instillataque, dolores auricularum infantilium leuat. Aranei triti humor expressus, & rosæ liquidæ quantum uidebitur, immixtus, lanaque molli madefacta, auriculæ infertur, continuo dolorem releuat. Spuma equi recens detracta & cum oleo roseo infusa, auricularum quamuis uehementes dolores resoluit. Verrinum fel in mali punici cute sicca tepesfactum infusum, que purulentas auriculas expurgat. Verris cum scrofa saliet, priusquam in terram destillet de uerendis eius uirus, exceptum tepesfactumque & cum aquæ modico auriculæ inditum, quamuis molestos dolores releuat, quod etiam circa auriculam inlitum plurimum prodest. Apri lorium infusum auriculæ ualde medetur, quod quia uetustum magis prodest, collectum seruari debet in uasculo uitreo, ut sit ad remedia præparatum. Cum selle uitulino & aceto pari mensura serpentis fenectus id est exuiæ decoctæ, & lanula madefacta medicamentum auriculæ insertum, maxime utilitatis esse creditur, si prius feruenti aqua de sponsia aurem foueris. Vituli adipem resolutam succo ocimi adiecto, si pariter tepesfactam auriculæ infuderis, amarissimo incommodo laborantem continuo liberabis. Medulla eiusdem uituli recens cum cymino contrita infusaque, quamuis magnos dolores auriculæ statim releuat, & intra triduum tollit. Lorium caprinum instillatum, dolorem sedat, quod magis prodesse suppurationis auribus adfirmatur, ob quam causam præsentis auxilij plures exceptum & cornu caprino inditum, in fumo suspensum, diligenter ad necessarias medelas referuant. Pueri impubis mingentis lorium exceptum & recens ac tepidum auriculæ suppuratione instillatum, humore exsiccat, dolorem tollit, & mira celeritate ulcera ad sanitatem perducit. Salua hominis ieiuni auriculæ indita, uermes si qui erunt, erumpere ex ea constat. Butyrum recens instillatum, humores doloresque aurium sedat. Terrestris lumbrici combusti ac triti, & cum rosa liquida mixti, infusi que, aurium dolores citissime sedant. Lac muliebre mixtum cum sulphure, auriculæ infusum, dolorem lenit. epiphoras quoque earum resoluit, hoc potentius si etiam extrinsecus eodem lacte aures perunxeris. Si dextram aurem aquam ingressa fuerit, sinistro pede insistes, & caput in dextram partem inclinabis, similiter facies ediuerso si sinistra auricula aquam acceperit. Gari optimi cyathum unum, mellis optimi dimidium cyathum, aceti optimi cyathum. hæc mixta in calice nouo denso super aquam feruentem, quam leni pruna feruere facies, ita despumabis, ut pinnula omnis spumas eijcias, deinde cum bene fuerit despumatum, medicamen recondes, & cum uti uolueris tepesfacies, & tenuiter infundes, & madefacta lanula aurem claudes. hoc medicamento ad omne uitium aurium mirifice uteris. sed si tumor auriculæ erit, succum coriandri uiridis tepidum prius infundes. deinde supra scriptum medicamen cum tumor desiderit, instillabis. Purulentæ & obtusæ auriculæ & dolorem tolles & auditum confirmatissimum reddes, si prius eluas eam lafere cum recenti caprino aut mulieris lacte permixto, deinde instilles tepidum fel taurinum, cum oleo cedrino æquis portionibus mixto. Fellis aut lactis canini ꝑ unum, mellis optimi ꝑ unum, miscebis, conteres, & in strigili calefacies, & auriculæ infundes, & lana obcludes, nihil potentius neque certius hoc medicamine etiam si intrinsecus cancerauerint aures. Cardui siluatici semen ex oleo coques, ita lente ne uratur, id colabis per linteum & tepidum infundes, & purpura aurem obturabis. Herba leucadion cum uinaceis in unum trita, adiectoque aceto & aqua commixta, expresso per linteum succo eius, & cum lana alba auribus inferto, post tertium diem exempta, auditum restituere adfirmatur. Cardamum, id est, nasturtium tritum cum fico, atque auriculæ inditum, ijs qui grauius audiunt, prodesse fertur. Oleum ex nuce iuglande instillatum auriculæ, grauius audienti ualde prodest. Cedri resina hyssopi decocti aqua diluta, & auriculæ indita, sonitus rinitusque omnis discutiet, & auertet dolorem. Oua formicarum contrita & auribus instillata, quamuis obtusos auditus adaperire creduntur. Canis adeps cum oleo uetere & succo absinthij auribus instillata, quacunque ex causa exsurdatis aures, miro modo reparare creditur. Aphronitrum delicatissimum, & mel optimum, & acetum acerrimum, conteres pariter usque ad summam leuitatem & auriculæ infundes, non solum auditum restitues, sed & dolorem emendabit. Parum audientes acetum utiliter gargarizant. Si aliquod animal aurem intrauerit, præcipuum remedium est, murinum fel aceto dilutum instillare. Gliri seu blattæ pellis detrahatur, & intestina eius decoquantur in uase æreo nouo cum mellis heminis tribus usque ad tertias, atque ita seruetur, ut cum opus est strigili medicamentum tepesfactum auribus infundatur. Si caro creuerit in auriculæ foramine, comprimetur sine ferro & dolore, medicamine tali, aluminis unciam semissem, misyos uisti — S. sinopidis rubricæ — S. gummi — S. tritis cæteris ex aceto acri & ad instar collyrii leuigatis, gummi admiscetur, ut pastilli corpus efficiat, & sicut collyrium tritum superponitur, aut infunditur, hoc & dolori, & pûtori, & uulneri medetur auriculæ.

Corticæ de fraxino uiridi contunde, ac succum eius tepidum, auriculæ assidue infunde, donec persanetur. Mel, myrrâ, acetum, in se coques, & in aurē tepidum mittes. Aphronitrum delicatissimum, & mel optimum, & acetum acerrimum cōteres pariter, usque ad leuitatē, & tepesfactum, auriculæ infundes, propter effectum medicame-

* iterum scripsimus. Porri sectini succum & lotium apri, & oleum cyprinum pari pondere coniunges, & tepefactum auribus instillabis. Herbam, quæ gallice uernetus dicitur, conteres & exprimes, & incum eius auriculæ non audientis infundes, hoc remedium etiam dolorem emendat. Herbam, quæ gallice dicitur blutthagio, nascitur locis humidis, eam teres, succumque eius etiam si modicus fuerit, cum modico aceti confundes, & pariter teres, colatumque ac tepefactum auribus instillabis. Radicis fyracæ succum in aurem, quæ auditu difficili erit, infunde, gratulaberis remedium.

Ad omnia uitia narium & ad pituitam, remedia physica & rationabilia diuersa, de experimentis multorum. Cap. X.

Plerumque erumpit nimium e nariibus sanguis, qui cum abundanter fluxit, nisi celerius supprimatur, periculum adfert, proderit ergo aqua frigida uel posca subinde totam faciem per spongiam refrigerare. Acetum acre infundere in aurem prodest, cuius e regione sanguis fluit, aut in utranque mittere, si ex utraque nare manabit. Gypso totam faciem cum fronte, & maxime nares, crassius oblinere prodest; & caput frigida aqua multa perfundere. Cucurbitam quoque medicinalem occipitio adfigere, plurimum prodest. Inijcere autem intus in nares oportebit coctæ uiuæ carnem per se, aut cum floris polline tritam. Verbenam herbam, quæ quia multa est & ubique nascitur polygonos appellatur, inferi nariibus prodest. Similiter facit & lyfimachios herba trita imposita. Eodem genere proderit & spon-

giz particulam præfectam apte forfice, & ad amplitudinem narium figuratam inijcere paulo pressius, aceto infectam, & interdum eodem insperlam. Gallæ & chalcitidis pulvis curiosè tritus, atque in unum æquis ponderibus mixtus, insertusque nariibus, optimè sanguinem sistit. Bene supprimit & hoc medicamentum sanguinem de nariibus profluentem; mali corticis, quo coriarij utuntur, P. I. aluminis ægyptij P. I. chalcitidis P. I. diligenter trita hæc & in unum permixta per succidâ lanâ inijci nariibus oportebit; facit autem etiam ad omnem ex qualibet parte corporis, uel ex quolibet uulnere sanguinis eruptionem. Quoniam interdum, ita ut diximus, minus curati, naris uitio præfocari uidentur, maxime cum obturato utroque foramine narium, spirandi facultas eripitur; non alienum est scire, qua ratione utrique præstari possit, ut neque spiratio impediatur, nec remedium efficacissimum, per quod opitulatio nariibus modicè plenior. deinde aptare ad longitudinem nasi, atque ita præcidere, ut ex utraque parte perforata sit, atque inuoluere eam fasciola tenui lineæ quasi infita, & explorare circuitum eius, donec uideatur in nares cum ciuitatione quadam recipi posse; atque ita ut est circumuoluta immergere eam naso, aceto acri infectam, & per eam inijcere interdum acetum acre, uel succum supra dictorum medicamentorum. hoc autem remedio magis uti oportebit, cum per utrasque nares fluxerit sanguinis abundantia. Si quando ulcuscula in nariibus fuerint, sanabuntur fomento aquæ puræ calidæ per molles spongas, & medicamentorum infra scriptorum perunctione, id est, succo de moris cum uino tepefacto permixto composito ad spissitudinem mellis. Rosæ aridæ uel recentis folijs tritis ex uino, melle adiecto, infici nares utile est.

Vuæ immaturæ succo eodem modo composito, quo succum de moris componi debere supra diximus, nares fluentes repleti per commodum est. Malorum puniceorum dulcium atque acidorum succo, eodem modo composito, nares stipandæ sunt. Myrti baccis atque folijs tritis ex uino in mellis spissitudine, De terebinthi, lentisci, rubi, fruticibus & folijs succo similiter composito uti debetis. Sertula campana ex passo decocta & infusa nariibus prodest. Mel per se coctum & cum galla syriaca contusa, ac tenui cribro transmissa permixtum atque infusum nariibus prodest. Grauedines narium sedabuntur, quæ ex sole aut perfictione generantur, abstinentia ciborum falsorum & inter initia uino remoto, aqua largiore potata, capite & nariibus, nec minus ore diligenter operto. nec non fomentum ex aquæ calidæ uapore, per spongas molles adhibere extra oportebit. subinde etiam garizare lac tepidum, aut humorem ptisanæ, aut aquam in qua furfures filiginis deferbuerint, uel aquam ex fœno græco decoctam. Sorbitiunculæ quoque profunt, quæ fiunt ex amylo, uel ptisana, uel oryza. Ad ulcera in nariibus sedanda plumbi stercus, quod sconiā dicunt, ex uino, myrteo oleo uicibus adiecto teri oportet, donec spissum fiat, & ita nariibus infundatur. Facit & hoc medicamentum bene grauedini narium. pompholygis * III. uino falerno & rosæ uicibus adiecta teruntur, donec medicamentum mellis habeat temperationem, & ita nariibus paulatim infunditur. Ad grauem odorem narium (ozenam Græci hoc uitium uocant) prodest egregie hoc medicamentum, æruginis P. I. aut squamæ æris P. I. in mellis P. I. coqui oportebit, & eo uti assidua infusione. Ad polypos sanandos; misyustum, chalcitidem ustam, æs ustum, eris squamam, paribus ponderibus siccata hæc bene teres, & eo pulvere uteris assidue. Quia uero plerumque uexantur nares grauedine, quæ ex humore earum efficitur, non alienum est scire eius quoque rei remedia. prodest igitur quies unius diei, & ab omni re abstinentia; perungendæ nihilominus nares erunt, bitumine liquido, aut myrrâ facta, uel pice liquida; postero autem die, pastillus infra scriptus in noctem super cibum dandus erit, & si opus fuerit, per triduum continuum eodē tempore dabitur, qui recipit hæc; capij seminis * III. anisi * III. alterci seminis, quod hyoscyamos dicitur * II. opij denarium dimidium. fiunt autem pastilli ponderis uictoriat, & alij tertia parte detracta; dantur cum aquæ cyathis III. faciunt autem & ad oculorum epiphoras, & stomachi nauſeam, & e-

quinquas, & ad omnem fluorem. Sistet sanguinem seuum ex omento pectoris nariibus inlitum; coctæ contritiæ

Ad ulcera in nariibus sedanda plumbi stercus, quod sconiā dicunt, ex uino, myrteo oleo uicibus adiecto teri oportet, donec spissum fiat, & ita nariibus infundatur. Facit & hoc medicamentum bene grauedini narium. pompholygis * III. uino falerno & rosæ uicibus adiecta teruntur, donec medicamentum mellis habeat temperationem, & ita nariibus paulatim infunditur. Ad grauem odorem narium (ozenam Græci hoc uitium uocant) prodest egregie hoc medicamentum, æruginis P. I. aut squamæ æris P. I. in mellis P. I. coqui oportebit, & eo uti assidua infusione. Ad polypos sanandos; misyustum, chalcitidem ustam, æs ustum, eris squamam, paribus ponderibus siccata hæc bene teres, & eo pulvere uteris assidue. Quia uero plerumque uexantur nares grauedine, quæ ex humore earum efficitur, non alienum est scire eius quoque rei remedia. prodest igitur quies unius diei, & ab omni re abstinentia; perungendæ nihilominus nares erunt, bitumine liquido, aut myrrâ facta, uel pice liquida; postero autem die, pastillus infra scriptus in noctem super cibum dandus erit, & si opus fuerit, per triduum continuum eodē tempore dabitur, qui recipit hæc; capij seminis * III. anisi * III. alterci seminis, quod hyoscyamos dicitur * II. opij denarium dimidium. fiunt autem pastilli ponderis uictoriat, & alij tertia parte detracta; dantur cum aquæ cyathis III. faciunt autem & ad oculorum epiphoras, & stomachi nauſeam, & e-

quinquas, & ad omnem fluorem. Sistet sanguinem seuum ex omento pectoris nariibus inlitum; coctæ contritiæ

Ad ulcera in nariibus sedanda plumbi stercus, quod sconiā dicunt, ex uino, myrteo oleo uicibus adiecto teri oportet, donec spissum fiat, & ita nariibus infundatur. Facit & hoc medicamentum bene grauedini narium. pompholygis * III. uino falerno & rosæ uicibus adiecta teruntur, donec medicamentum mellis habeat temperationem, & ita nariibus paulatim infunditur. Ad grauem odorem narium (ozenam Græci hoc uitium uocant) prodest egregie hoc medicamentum, æruginis P. I. aut squamæ æris P. I. in mellis P. I. coqui oportebit, & eo uti assidua infusione. Ad polypos sanandos; misyustum, chalcitidem ustam, æs ustum, eris squamam, paribus ponderibus siccata hæc bene teres, & eo pulvere uteris assidue. Quia uero plerumque uexantur nares grauedine, quæ ex humore earum efficitur, non alienum est scire eius quoque rei remedia. prodest igitur quies unius diei, & ab omni re abstinentia; perungendæ nihilominus nares erunt, bitumine liquido, aut myrrâ facta, uel pice liquida; postero autem die, pastillus infra scriptus in noctem super cibum dandus erit, & si opus fuerit, per triduum continuum eodē tempore dabitur, qui recipit hæc; capij seminis * III. anisi * III. alterci seminis, quod hyoscyamos dicitur * II. opij denarium dimidium. fiunt autem pastilli ponderis uictoriat, & alij tertia parte detracta; dantur cum aquæ cyathis III. faciunt autem & ad oculorum epiphoras, & stomachi nauſeam, & e-

quinquas, & ad omnem fluorem. Sistet sanguinem seuum ex omento pectoris nariibus inlitum; coctæ contritiæ

deez contritz & fronti inlitz, similiter profunt. Aranei tela sicca adposita subuenit narium cruentis fluoribus; ex feruenti aqua uapor narium tractus, medetur earum grauedini. Gallinacei cerebrum uel sanguis colubinus ob id seruatus remedioque adhibitus, narium prodest. sed si ex uulnere immodice fluat sanguis, fimus caballinus quomodo egeritur, adpositus statim subuenit. De porro sectio trito nares fluentes recte obturantur. Lana succida coniicitur in nares cum oleo rosaceo, & auriculæ de lana succida obturantur, & ita sanguis profluens continetur. Coagulum agninum ex aqua subactum & infusum narium fluentibus mire prodest. Adeps de anseribus cum butyro pari pondere infusus, profuit narium sistit. Terra uel argilla, de camino, uel de furno antiquo teritur, & ex aceto temporibus & cerebro, narium quoque inlinitur uel infunditur, quæ res profluentem nimie sanguinem sistit. Tus & resina in farinam redacta, narium induntur, quod remedium etiam ex ore manantem sanguinem cohibet. De sanguine ipso qui fluit, nomen eius in fronte scribe cui medendum est, aduersum profluum narium, statim subuenies. Scribes carmen hoc in charta uirgine, & linteo ligabis, & medium cinges eum uel eam, quæ patietur de qualibet parte corporis sanguinis fluxum. *fructu, cum, cucuma, uicuma, cum, uma, maa.* Item carmen hoc utile profluiuo muliebri. Stupidus in monte ibat, stupidus stupuit, adiuro te matris ne hoc iracunda suscipias, pari ratione scriptum ligabis. Myrram cum nardo puro contere, & inde nares tange, mane & uespera, subuenies sanguini nimium profluenti. Veru ferreum candens in aceto assidue extingue, & fumum eius narium ducito. Ruta sæpius olefacta, uel trita inlita, sanguinem ex narium nimis fluentem retundit. Radix urticæ capiti imposita, si manibus utrisque supra caput continueatur, mire prodest aduersum profluum narium. Herba polygoni corona capiti imposita, narium profluentibus mirabiliter medetur. Costum contusum & cribratum narium infricato, & profluum sistit, & ulcera sanabit. Rana rubetæ occisæ in fumo arefactæ particula quantæ uidebitur, in linteo inuoluta, & ex licio collo suspensa eius cui nares fluunt, mire prodest. Linu uel papyrus ligata summitati ueretri uirilis, sanguinem profluentem narium mire reprimat. Pili caprini combusti, adiecta pice & aceto inserti narium, citò sanguinem sistunt. Lana succida ex oue formina decerpta, atque intorta, madefacta que rosa liquida, & narium indita, sanguinis abundantiam reprimat. Codex tritz cum aceto, narium inditæ, quamuis magnos fluores sanguinis compescunt. Si forminz sanguis ex narium nimie defluat, mamillæ eius unctantur corrigio caprino. Si pilos sub uentre uiuo lepori candidos uelles, & seruabis, & cum usus exegerit, intortos narium fluentibus fulcies. Specularia combusti ex aceto temperantur & fronti eius inlinuntur, cui nares fluunt. Spongiz africanæ combusti cinis si narium hauriatur, plurimum prodest. Si & per nares & per os sanguis fluat, herba uerbena, quam greci hierobotanen dicunt, cum suis radicibus ex aqua decocta & percolata potatur. Porrum sectiuum tere, & succum cerebro eius infunde, qui profluiuo narium laborat, statim medebere. Millefolium ex aceto teritur, & narium hauritur, continuo quamuis nimium sanguinem sistit. Si ex una nare sanguis defluit, diuersam auriculæ cera obrutabis. Carme ad profluum sanguinis ex quocunque membro manantis, locum ex quo defluit, digito medicinali tanges & uicies septies dices, & quotiens uolueris, repetes, donec fluorem peruincas, socnon socnon, mire prodest. Pollicem & medicinalem digitum a fronte usque ad cerebrum, & inde usque ad ceruicem duces, & nonagies nouies dices, firmio, quod ad aurem eius partis dici oportet, de qua nare sanguis propensius fluit. Herbam uertoniam teres, cui paululum salis, quantum duobus digitis pollice & medicinali capere potueris, adijcies, & formatam pilulam rotundam narium inseres, & omnibus uitij purgatas nares citò ad sanitatem perduces. Polypum emendat herba proserpinalis, quæ græcè dracotium, gallicè gigarus appellatur, uel si succus eius narium infundatur, uel si papyrus inde infecta, & spicillo inuoluta, narium inferatur, & postera die educatur, omnis enim morbi radices extrahi eius iniectione manifestum est. Nares grauiter olentes emendat succus hederæ frequenter infusus. Cuius nares foetebunt, remediabitur, si nares multo osculetur. similiter proderit mulieri, si nares multo basiauerit. Qui polypum patitur, brassicæ erraticæ radicem conterat, & eius succum assidue narium quantum potuerit, ducat, intra triduum remediabitur. Succum hederæ & aristolochiam, & cypenum, & dracontæ semen, & melilotum, æquis mensuris contere ac narium infunde; quo facto non solum foetorem, sed etiam carcinoma narium curabis. Naso grauiter olente, succus hederæ frequenter infunditur, dracontæ quoque succus cum melle inditur; quæ res etiam carcinomata extirpat. Ficus etiam ueteres contritz & in olla cum posca coctæ, narium instillantur. hoc omnia narium uitia emendat. Ruta ex aceto acri conteritur, atque inde pinnula intingitur, ea in nares coniecta, sanguinem fluentem efficaciter cohibet. Stercus asinæ aridum narium infusum, sanguinem sine intermissione fluentem citò compescit. Stercus caballinum exprimitur dum recens est, eiusque succus narium trahitur ab eo, cui importunius fluunt. Radicem symphyti, quod halum gallicè dicunt, commanducet & glutiat qui profluiuo narium laborat. Ad aurem eiusdem partis, de qua per narem sanguis fluit, dici oportet ter nouies. etiam postea similiter dices. Scribes in charta uirgine, & collo suspendes lino rudiligatum tribus nodis ei, qui profluiuo sanguinis laborat. Si in manu dextra duo digiti medijs lino simul copulentur, statim proderit aduersum pituitam, & grauedinem & distillationem narium. Cinis testarum ex ostreis, si in morem salis, pane colligatur, & uoretur, statim ad remouendam grauedinem narium proficit, porri quoque capita, si incocta, si sine pane manducantur, plurimum prodest. Corrigio canino rudi, nec unquam uincto, quilibet digitus in quauis manu ligatus, remedium defillantibus narium præstat. Oleum calidum

eunti dormitum ei qui grauedinem narium patitur; in cerebrum infunditur & in aures immittitur, illico prodest. Ostrea ita ut lecta sunt, adhuc testis suis clausa, in carbonibus coquantur, atque ita cibo dantur ei, qui narium grauedinem patitur. creta quoque cimolia ex aceto tusa quam densissima fronti eius imponitur, cui sanguis uel pituita descendit. Mastichē cum pipere mixtam qui diu commanducane rit, calefacto cerebro omnem humorem narium cohibet. Git calidum tostum in linteolo conligatū & sepe odoratum, grauedinem narium & pituitam depellit. tunicę quoque ueteris combustę fumus frequenter naribus admotus idem præstat. Proderit ei plurimum, qui grauedinem narium patitur, si in charta se emungat, eamque alligatam, epistolę modo, in publicum abijciat; & si in cinerem se emungat, æque proficiet ad sanitatem. Salem torreat & in noctem sibi ad cerebrum in sacco liget, qui pituita patitur. Coepam afram conditoriam contusam cum aceto acerrimo commiscebis, & adpones naribus eius, cui sanguis fluit, ut ad se naribus trahat, & quasi sorbeat, statim cessabit sanies, & fluxus inhibetur. Radicem cannabis brachio dextro ligato; si totum brachium cinxeris de ipsa radice, melius erit; sin uero partem habueris, collo suspende ligatam licio, quod in tela fuerit. & ut scias quanta uis sit huius remedij, ubi alligaueris hanc radicem, statim sanguis perstringetur; cum solueris & remoueris, fluet. Caprificum, quæ in lapide nascitur, colliges siue ficcā, seu uiridem, id est ipsum pōmum, & in pelle caprina inuolutum ligabis de licio, quod in tela fuerit, & ei loco adpones, unde erit sanguinis fluxio, statim cohibebitur; siue uiro de naribus, siue mulieri de locis uerecundioribus fluat.

Vitij labiorum, & gingiuis, & oscedini, & oris ulceribus, & foetori, & lingua pustulis, & palati exulcerationi, remedia physica & rationabilia diuersa de experimentis. Cap. XI.

Vitia oris, & faucium, & ulcera quæ in ore fiunt, & celeriter nigrescūt, inter initia oportet rebus simplicibus, id est aqua calida per se, uel mulla, postea uero decocta aqua cū lenticula, uel palmulis, uel capreoli, id est summitatibus uitium, uel malis cydoneis, aut piris tyriaticis, aut rosę folijs, adiecto melle curari. Adeps anserinus aut gallinaceus rimas labiorum egregie curat impositus. Nigrescentibus ulceribus proderit colluere os aqua, in qua coctum sit lentiscum, uel rubus, uel myrtus, uel rhus syriacus, uel oleastrum, uel iunci radix, quam græci cyperon uocant; aut similiter adiecta per se, & decocta galla syriaca contusa. oportebit autem perungere adidue ulcera succo rubi, lentisci, oleastri, rosę uiridis foliorum. facit bene & sal tritum cum melle inculcatum copiose ad nigredinem talium ulcerum eruendā. Labia rupta uel exulcerata, mira celeritate sanabis, si ceram in oleo rosaceo ad ceroti modum liquefeceris, cumque in caccabo uel acetabulo conserbueris, anchusę radices adieceris, & refrigerato unguine in noctem labia inleueris. In oui testā, membrana quæ hæret, ruptis labijs recte adponitur. Alga marina sicca candidaque adposita, labijs ruptis efficaciter prodest. Allij tunicula uel operimetum pari modo labijs profuturum, ut hærescat imprimuntur. Seuum bouis uel uituli cum adipe anserino impositum, rimas scissurasque oris optime iungit. Fagi folia commanducata profunt exulceratis labijs & gingiuis, si cum Serpillum herbam, quam galli gilarum dicunt, ieiunus diu commanducet, cui os foetebit & glutiat. Murinus cinis, id est puluis exusti muris, cum melle dentibus infriktus halitum foetidi oris emendat. Folia myrti & lentisci pari pondere & gallę syriacę dimidium pondus una teri oportet, & sparsa uino manē a ieiuno commanducari, uel ori foetido imponi. Capitis leporini exusti cinis cum nardo uel cum melle impositus, lenit graue olentia oris ulcera. Acorum ponticum ieiunus uice mastiches mandat, qui emendari uoluerit oris foetorem. Contra oris foetorem, organum & salem pari mensura conteres, & inde manē ac uespera gingiuas fricabis; ut uero os tuum semper bene oleat, cyperum commanduca, uel intra os tene. Oscedinem herba britannica uiridis, sumpta in cibo lactucę modo, sanat; trita etiam atque expressę succus si ore contineatur, mire prodest. quod si uiridem nō habueris, aridam infunde uino & deinde fume eam & exprime, illumque succum intra os adidue tene, aut etiam gargariza, mire prodest. Cicer columbinum maceratum tritumque & gingiuis inlitū prodest. Vlcerā gingiuarum, tonsillarumque carbunculos, hac ratione curabis; polentę partes duas, & salis partem unam, bene contusam conspargito ex mulso, deinde ex ijs panes tenues facito, eosque furno aut clibano pistoris coquito, & cum opus fuerit, bene contritos ex aqua gingiuis inlinito, continuo sanabuntur. Arboris pruni folia cum uino decoquantur, eorū succus expressus intra os retentus plurimum prodest. Galbanum melle dilutum, ulcera in ore, quæ græci aphthas uocant, inlitum sanat. Puluis tenuissimus costi, ulceribus quæ in ore erunt, adpositus, mire prodest. Lingue ulcera uel pustulę bene accipiuntur, si olea uel oleastri succo foliorum & sulphure tritis, adidue perfricentur. Rosę flos luteus, alumen scissum, galla, iris, pari pondere omnia diligenter teruntur, & oris ac lingue uitia frequenter eo puluere perfricantur. Cyclaminis succus melli lycio æqualiter mixtus, linguam & totius oris ulcera potentissime sanat; humorem quoque & pituitam largiter infusam deducit. Pustulę cū subito in lingua nascuntur, priusquam idem loquaris, extremę tunicę, quā uestiris, orā pustulam tanges, & ter dices, tam extremus sit qui me male nominat; & totiens spues ad terram, statim sanabere. Solent gingiuę quorundam fluore infestari, quas pregnantēs quidam uocant, profunt ijs lentisci folia arida contusa & cribrata tenuiter perforato cribro, facit & cinis eiusdem lentisci foliorum exustorum impositus, & aqua eiusdem decocti os elutum inuatur. Compositum hoc medicamentum prodest gingiuis, & ad omnia ulcera quæ in ore fiunt, utile est, quod anthera a Græcis appellatur. recipit hæc aluminis filii, * III. myrtę

III. myrræ * II. croci * II. cyperi id est iunci radices * tres gallæ * II. rosæ lutei floris * II. sandarachæ ponticæ * III. turis masculi * II. hoc medicamine arido uti oportebit. uel etiam cum melle mixto ad parulidas aut epulidas, id est, ubi ex transuerso gingiua suppuratur, uel ubi super extremum molarem increfcit.

Molestè interdum gingiuis & cancer per os serpit, qui inter initia negligens, breui temporis spatio mortis causa est. oportet ergo cum primum uisus fuerit, antequam latius serpat, faucesque occupet, misyri usto quamplurimo cum melle uti sæpius; sed ante dentes & os collui debent oleastri aqua decocti, aut corticis mali granati.

Prodest & hoc medicamentum etiam in omni parte corporis positum, contra cancerem, quod uocatur andronios. recipit autem hæc, mali granati corticis * X. terræ mali * IX. aloes * quatuor, myrrhæ * II. gallæ * VII. aluminis fissi * quatuor, zris floris * II. teruntur hæc siccata curiosè, deinde admiscetur passum creticum, ut habeat spissitudinem mellis; cum opus est, uino austero diluitur & soluitur. facit hoc medicamentum & ad carbunculos, & ad ignem sacrum, & ad zonam, quam Græci herpetem dicunt.

Codlearum inanum exustarum cinis cum melle gingiuis impositus, mirè prodest, si sit hæc assidue curatio. Gingiuas humidas & fetentes hoc medicamine mirè sanabis; alumen scissum, turis masculum, aloen epatitidem pari pondere; hæc in puluerem tenuissimum rediges, & simul permixtis uteris, ita ut prius os uino uetere conluas, & sic gingiuis digito medicamen adponas. utile est interdum admixto huic pulueri melle despumato, gingiuas contingere. Ad gingiuarum nimium tumorem, & fetorem, & carcinomata, medicamen hoc facies decrescente luna, die iouis, sic, piperis grana nouem teres cum modico lasere, & cucurbitam siccam combures, & caput sardæ combures, ac separatim omnia diligētissime teres, ita ut in puluerem tenuissimum redigantur, eoque sicco gingiuas asperges uel continges; & cum iterum adhibere uolueris medicamentum, uino uetere bono os elues. sed illis diebus, quibus adhibes curationem, oleum & porcinam non manducabis; quo facto, facile te absolues supra scripta omni molestia gingiuarum.

Ad ulcera quæ nascuntur pueris uel infantibus utriusque sexus in ore, aut in gutture, aut in stomacho, quæ pluribus uno tempore solēt accidere, & ideo pestilentiosa appellantur, ualde utile est adhibere medicamē huiusmodi. myrræ, nardi syriaci, aluminis fissi, costi, gallæ syriacæ immaturæ, carnis agninae aridæ, corticis malorum punicorum, omnium paria pondera seorsum contunduntur, & postea in unum miscuntur, atque inde dantur ad diem duæ drachmæ cum uini austeri cyatho uno.

Malipunci floris * II. myrræ * II. aluminis fissi * II. croci * II. puluis ex ijs tenuissimus factus insufflatur per arundinem quod satis sit, faucibus uel gingiuis, quod factum & intrinsecus & forinsecus omnibus uitij oris infantum statim medebitur.

Medicamentum quod facit ad omnia, præcipue autem ad ea uitia, quæ in ore subsistunt, & abalienationes auditus; & ad tumores aurium, & puris inde manationem, & dolorē, & ad palpebras asperas, & ad ulcera sordida in oculis, atque in ano & neretro, nec non & ad carbunculos. uti autem eo oportet cum resoluendum & eliquādum est aliquid ulceris, cum melle, cum autem constringendum, cum uino austero; sed ubi ulcera cicatricem ducere oportebit, aut sordida & tetri odoris expurgari, cum ceroto ex rosa facto.

proficit autem & ad tumentes atque compressas feminæ uuluas, prope os ipsius uuluz adhibitum; est enim ad omnia muliebria utile, cum rosaceo oleo adpositum. facit etiam ad narium uicia & polypos & cætera ulcera, daturque ijs qui sanguinem eijciunt, quantum faba est, cum aquæ duobus cyathis tepida; recipit autem hæc, crocomagmatis optimi * VI. misyos usti * V. aluminis rotundi * VII. rosæ aridæ * III. zris floris * III. gallæ syriacæ * XV. omphacij aridi * VIII. squamæ zris * VI. chalcitidis ustæ * VII. mellis despumati s. I. hæc omnia seorsum prius & in unum postea cum uino trita, admixto passo

atque melle, coquuntur molli pruna in uase rubri eris, id est cupreo, ita ut subinde agitetur & coquat lentissime, donec mellis spissitudinem habeat; quod medicamentum recondi debet in pyxide cuprea & signari.

Ad ea quæ in ore subsistunt, & ad puerulorum uel infantum ulcera pestilentiosa, croci * III, myrræ * VI. gallæ syriacæ * III. aluminis fissi * II. turis * II. rosæ floris * VI. glycyri zæ succi * VIII. iris * VI. crocomagmatis * VI. nardi syriaci * V. piperis * I. S. & eius tertias, costi * III. cinnami * VI. cassiæ * VI. polij * II. mellis quod satis sit. hæc trita, diligenter concorporantur, & in uasculo creto aut uitreo custodiuntur, & cum opus est, uitij oris & faucium remedio adhibentur.

Anthera ad ulcera & sanguinis eruptiones, & ad eminentias quasi callosas circa angulos geularum, & radices dentium; facit & ad uetera, & ad longioris temporis fissuras in ano, quas græci rhagadas appellant. chartæ ustæ, plumbi usti, squamæ rubri eris, auri pigmenti * binos. sulphuris uiui * I. ficcis ijs & bene tritis uti oportet; est enim efficacissimum omnibus suprascriptis medicamentum.

Anthera ad gingiuas tumentes, & ad ulcera abalienata in ueretris, & ad ea in quibus nimium caro uitiosa excreuerit; cyperi denarios duos, croci denarios duos, myrræ * I. aluminis fissi denarios duos, sandarachæ denarium unum; hæc trita seorsum, & in unum mixta reponuntur, & sicca supra dictis uitij adhibentur.

Dentium doloribus, & uitij eorum uniuersis, remedia physica, & rationabilia diuersa, de experimentis. Cap. XII.

Ad dentium dolorem quamuis plurimi dicant forficem remedium esse optimum, multa tamen citra hanc necessitatem scio profuisse. itaque cum excelsus est aliqua ex parte dens, non si uideo protinus tollendum, sed excidendū scalpro medicinali, quæ cauatus est; quod sine ulla sit dolore; reliqua enim solida pars eius, & speciem, & usum dentis præstabit. sed cum dolor urgebit, uarie sedādus est, partim collutione quo-

rundam, partim commanducatione, nonnunquam suffitione, aut impositione aliquorum remediorum. prodest ergo colluere os frequenter radice herbæ quinque foliæ incoctæ uino. item herba urceolari & cui pressi baccæ aqua incoctis. alterci quoque radix bene accipit, aut eiusdem semen linteolo spisso inligatū, & aqua sæpius inferuefactum; etiam succus eius repens dentibus adhibitus plurimū prodest. Sufficit autem dentes oportet ore adaperto, alterci semine carbonibus adposito, atque subinde os colluere aqua calida, in qua radix eius fuerit incocta; interdum enim e' dentibus quasi uermiculi quidam eiciuntur. leuat dolorem dentium & bitumen suffitum. item commanducare proderit mentastrum uel radicem cotyledonis, quæ herba similia folia cymbalis habet, nasciturque fere in parietibus humidis. pyretri quoque radix commanducata multorum leuauit dolorem. nec minus alumen fissum linteolo spisso circumdatum, & ita diutius dolentibus impressum dentibus medetur. imponere uero ipsi dolenti oportet denti totū hoc medicamentum, quasi emplastrum, quod conficitur sic. peucedani succi * III. opopanacis * unum, turis denarios duos, uiz passæ sine granis * I. hæc omnia per se contundi iubebis, deinde ceram comisceri, & ceroti modo emplastrum fieri. ubi fuerit grauior dolor dentis, auriscalpiū lana molli inuoluitur, deinde tingitur feruentissimo oleo, atque ita denti proximisque gingiuis superponitur; post hoc medicamento dens operitur. si repetierit aut permanserit dolor nihilominus, iterum auriscalpiū cū lana inuolutum ex oleo candenti eodem modo imponi sæpius oportebit, donec dolor omnis adimatur.

Si quando mouebuntur dentes, confirmandi erunt alumine, quo insectores utuntur & melle attico, ita ut duæ partes sint mellis, tertia aluminis. hæc misceri & teri oportet in mortario, deinde in patella fictili feruefieri ut spissentur, atque ita recondi in quolibet uase, dum ne æneo. hoc medicamentum primum austerum est, & nimis constringit dentes, postea remissius uidetur. Proderit motis dentibus & hoc medicamentum, aceti acerrimi 2. I. cedriæ 3. I. aluminis fissi P. II. teritur alumen cum aceto, miscetur deinde cedria, & una omnia uase æneo coquantur, tædā pingui mota, donec in mellis spissitudinem temperatam redigantur. hoc medicamento si quis ter in mense dentes perfecerit, dolorem eorum non experietur.

Ad dentium dolorem bene facit muria ex piscibus lacertis ueteribus, si quis ea subinde os colluat, uel herbam pedunculariam si quis commanducat, & subinde pituitam, id est humorem noxium expuat, uel marubio sicco contrito & cribrato, si quis dentem cum gingiuis tegat. Facit bene & aqua, in qua marubium coctum est, cum os aliquis inde colluerit. Item millesolium commanducatum, uel anemones herbæ radix cum pari pondere fici commanducata, pituitam dentium detrahit. Cornu ceruinum combustum tritum cum aceto, dentibus adpositum prodest. Radix lapathi cum uino coctā, uel tædā pinguis incoctā aceto; uel papaueris capita, & cortex malipunici, pari pondere uino incoctā, uel cithynthi radix similiter cum uino coctā, uel colocynthidos interiora cū lacte & aceto, pari mensura trita atque permixta; uel alterci radix cum aceto coctā; uel capparis radix coctā cum aceto uetere; uel iunci radix, quam græci cyperum appellant, uel cucurbitæ radix, quam iidem sonchon appellant; uel pyrethrum commanducatum, aduersum dolorem dentium plurimum profunt, si & aqua ipsa, quæ incoquantur, ore teneatur.

Rosæ floris quod est luteum * V. I. I. crocomagmatis * octo, myrræ * octo, gallæ syriacæ * III. ijs in unum mixtis & tritis uti oportet siccis, ut hoc ex puluere gingiuæ assidue dentesque tangantur. Rosæ lapillos uel grana, quæ in folliculis eius postea quam esse desierit inueniuntur, assabis & in puluere rediges ad * III. floris quodque eius sicci * I. I. myrræ * I. teri facies, & siceo puluere aduersum dolorem dentis uteris, ita ut prius os colluas aceto falso tepido. Rosæ caninz succi, quam Græci tyridam uocant, uel ipsius herbæ radices * II. lycij * I. cum uino austero coqui facies, & adiuces aluminis * III. myrræ * I. & de sepiarum testis quæ sunt interiora * II. ijs tritis & in unum incorporatis, dentes & gingiuas continges; post hoc, uino austero os collues. Cyperi * V. I. I. sandarachæ * V. I. I. gallæ duas partes, piperis albi * I. aluminis fissi * II. myrræ * II. & huius medicamenti similis est usus sicut superioris, ut sicco puluere gingiuæ & dentes tangantur assidue, & post uero uetere os eluatur. Sinapis grani * III. piperis * I. herbæ pedunculariæ sicce * V. I. cyperi idem, nitri * I. I. pyretri * I. I. I. origani * I. I. I. lauri foliorum tenerorum * I. bituminis aridi * V. I. in sole hæc omnia teruntur, & ex aqua deinde pastilli fiunt, quorum unus ad diem datur commanducandus dentium causa. Piperis * II. sinapis in grano * XII. anethi * V. I. uiz passæ pinguis exgranatæ * XXIII. pyretri * III. herbæ pedunculariæ * III. hyssopi de denario duas partes, lauri folia numero X. eris floris * II. hæc cum melle decoquantur, atque inde pastilli fiunt, ob salubritatem dentium commanduntur. Emplastra autem dentibus dolentibus poni oportet eiushmodi: aphonitri * I. I. piperis * III. herbæ pedunculariæ * V. resine terebinthinæ tantundem; hæc colliguntur, & inlita linteolo, uel aluta, dolenti maxillæ imponuntur; sed si excauatus fuerit dens, iniectur in cauernam eius quantum sit satis medicamenti, ad explendum locum, cum cera tegitur exterior pars foraminis. Item emplastrum alio modo conficiendum aduersum dentium uitia; pyretri * III. I. cedriæ * III. I. amurcæ coctæ * X. VI. sulphuris uiui * X. VI. picis liquidæ * XII. I. bituminis aridi * VII. estiuus temporibus confici oportet hoc medicamentum, ita ut sub ortu sideris canis hæc terantur in sole calidissimo, donec habeant ceroti teneri spissitudinem. Item aliud emplastrum aduersum dentium dolores; piperis, pyretri, sulphuris uiui, foreos, singulorum * III. I. amurcæ * V. I. arboris mori lacrymæ * V. picis liquidæ * II. aluminis fissi * III. I. cedriæ * X. bituminis aridi * VI. herbæ pedunculariæ * II. similiter sub ortu canis componitur hoc emplastrum, & ut supra scriptum est, adhibetur maxillæ in qua dens dolet, linteolo denso uel alute inlitum. Item aliud emplastrum,

cedriæ * III. I. amurcæ coctæ * X. VI. sulphuris uiui * X. VI. picis liquidæ * XII. I. bituminis aridi * VII. estiuus temporibus confici oportet hoc medicamentum, ita ut sub ortu sideris canis hæc terantur in sole calidissimo, donec habeant ceroti teneri spissitudinem. Item aliud emplastrum aduersum dentium dolores; piperis, pyretri, sulphuris uiui, foreos, singulorum * III. I. amurcæ * V. I. arboris mori lacrymæ * V. picis liquidæ * II. aluminis fissi * III. I. cedriæ * X. bituminis aridi * VI. herbæ pedunculariæ * II. similiter sub ortu canis componitur hoc emplastrum, & ut supra scriptum est, adhibetur maxillæ in qua dens dolet, linteolo denso uel alute inlitum. Item aliud emplastrum,

cedriæ * III. I. amurcæ coctæ * X. VI. sulphuris uiui * X. VI. picis liquidæ * XII. I. bituminis aridi * VII. estiuus temporibus confici oportet hoc medicamentum, ita ut sub ortu sideris canis hæc terantur in sole calidissimo, donec habeant ceroti teneri spissitudinem. Item aliud emplastrum aduersum dentium dolores; piperis, pyretri, sulphuris uiui, foreos, singulorum * III. I. amurcæ * V. I. arboris mori lacrymæ * V. picis liquidæ * II. aluminis fissi * III. I. cedriæ * X. bituminis aridi * VI. herbæ pedunculariæ * II. similiter sub ortu canis componitur hoc emplastrum, & ut supra scriptum est, adhibetur maxillæ in qua dens dolet, linteolo denso uel alute inlitum. Item aliud emplastrum,

mirum

Dolorem dentium & gingivarum hac maxime curatione cōpescas, si mellis — I. aluminis insectorij —
 I I I. subferuefacias in pultario, & agites ac misceas, tepefactumque medicamen ore contineas. Acorn
 ponticum cum aceto & cum rēda usque ad quartas decoctum, rectissime aduersum dolores dentium gar
 garizatur. Succus cyclaminis & mel lycium æquis portionibus miscentur, atque inde dolor dentiū con
 fricatur. Lapathi radix in aceto acerrimo coquitur, atque eo aceto dentes conluuntur, uel fouentur.
 Millefolij radix sub primo dolore dentium commanducabitur, & iisdem dentibus, qui dolebunt, diu com
 manducata retinebitur, intolerandam molestiam præsentissimo remedio coercebit. Oleū cum aceto ex
 terio decoctum, dum adhuc calet, recte ad sedandos dentiū dolores ore retinebitur, ita ut plus aceti quam
 olei mittatur. Radix terræ mali furculo emta & commanducata, si ore contineatur, inter initia quidem
 excandescere facit dolorem dentium, sed mox eum potenter extinguet. Porcelli lactentis uentriculo,
 id est aqualiculo exempto, quod in interiore cute luteum adhæret, lanæ coniunges, madefactaque ea, illū
 humorem auriculæ inferes, cuius e diuersa parte dens dolebit, certissimo remedio statim subuenies.
 Mori radix tempore mēsis inciditur, ea succum aptissimum inhibendo dolori dentium emittit, quē ideo
 colligi & seruari oportet, ut cum opus fuerit, dentibus imponatur. Nucleus gallæ commanducatus, me
 detur dolori humorique dentium. Hyoscyami radix mixta uel madefacta aceto & commanducata, mi
 re dentibus medetur. Plantaginis radix recte manditur, eiusdemque succo in aceto decocto salubriter
 dentes conluuntur. Fimus corui lanula obuolutus, denti cato insulcitur minutatim, ac sine dolore cū
 discutiet. Veretruū id est bulbus, quod est genus cepæ, in aceto decoquitur, idque aceri ore continetur,
 ut mobilitas dentium sistatur. Rumicū in quibus mora nascuntur, pampini decoquuntur in uino au
 stero, quod uinum assidue ore detentum, uel ipsa folia commanducata dentes labantes confirmant. Be
 stiola quæ brassicæ innascitur, dens uiriosus sæpius confricatus, intra dies paucos eicitur. Aeris florem
 floresque hederæ pari pondere in unum terito, uinoque misceto, ac naribus moderatē, cum dentium do
 lor fuerit, infunde, statim omnis molestia dentium compescitur & sanatur.

Dentificia diuersa de experimentis. Cap. X I I I.

Dentificium, quod splendidos facit dentes, conficitur sic. farinæ ordeaceæ s. I. conspargi oportet
 aceto cū melle mixto, & subigi diutius, atque ita in globulos diuidi sex; quibus dilatatis, admisceri salis fos
 sitij semunciam, deinde furno coqui, donec in carbonem redigantur. tunc teri oportebit eadem, & admi
 sceri spicæ nardi, uel folij quod satis uidebitur, ad odorem faciendum. hoc Octauia Augusti foror usa est.
 Dentibus curandis benefacit radices edulis, id est quæ manducatur, cortex arefacta & contusa cribrataque
 pro dentificio adhibita. Vinum candidum, quod simile est crystallo, diligenter tritum, admixta spica
 nardi, pro dentificio adhibuit plurimum prodest. Utuntur plerique etiam huiusmodi dentificio;
 herbam urceolarem, quam plurimam cum radice colligunt, deinde lotam, uno die siccant, post diem recen
 ti muria macerant, tertio die expressam in olla noua componunt, subinde salis fossitij quasi tabulatā in
 terponentes, atque ita percoquant fornace balneari, donec in carbonem redigatur, postea tritz admiscet
 spicæ nardi quod satis sit, quia & candidos facit dentes, & confirmat, Augustam constat hoc usam Mella
 linam. deinde aliorum Cæsarum matrimonia hoc dentificio usa sunt. Cornuum ceruinorum ustorū
 in olla, & ad cinerem redactorum, s. I. mastiches chiz ✕ V I I I. salis ammoniaci semunciam, diligen
 ter hæc trita in unum concorporantur, & perfricandis dentibus adhibentur. Folij — I. costi — I.
 piperis ✕ V I I I. mastiches grani — I I. hordei farinæ nitidæ, s. V I I I. singulatim singulas species
 tundi uel teri facies, & terni tenuissimo cribro. farinam uero hordei in ollam grandem nouam mittes, &
 adijcies mellis optimi quantum sufficiat, ut neque sicca sit, neque supernatet farina. postea simul specie
 bus omnibus in ollam misis, adijcies fasciculos septem herbæ parietalis, ita ut folia huius herbæ sint in fa
 sciculis, non uirgule; deinde operculo superposito & clauso, uel gypato diligenter de argilla, mittes in fur
 num calidum, ita ut usque in alteram diem furni feruor duret, donec exurantur omnia, quæ sunt in olla.
 quæ cū exusta fuerint, simul uniuersa diligenter tundes uel teres & cribrabis, & puluere eo quotidie uter
 is, ad candorem dentium faciendum, & gingiuas firmandas, & catarrhum restringendum. Dentificium
 ad dentes nigros emendandos; hordei farinam delicatam, & sal tritum cum melle confricato, donec sibi co
 hereant, & postea pastam ipsam linteo inuolutam comburito, ac puluerem tenuissimum facito, atque eo
 dentes manē ac uesperē confricato, cito candidissimos facies. Lapis parius tritus ad summam leuitatem
 & pro dentificio adhibitus, intra diem decimum, quamlibet nigros uel pallidos dentes purgabit. Nitro
 cocto atque contrito, uelut dentificio, utere ad dentes purgandos. Porci ungularum ossa combusta tri
 taque & cribrata, adiecto nardo, & folio, frictione frequēti dentes candidissimos præstant. Lana succi
 da melle inlita, dentes perfricti miro modo candorē maximū consequuntur. Dentificiū optimum ac
 saluberrimum sic. cyperi — I I. salis ammoniaci — I I. pumicis uncias tres, marmoris candidi uncias
 tres, Ichœni anthos, uncias quatuor, casia uncias I I. folij unciam I. piperis albi unc. I. specularis usti
 — I. corui ceruini usti — I. ostrei testarum ustarum — I. aluminis scissi — I. mastiches — I. guris
 optimi — I. myrræ unc. I. tunis cribratisque his omnibus & in puluerem tenuissimum redactis, atque
 permixtis ad incolumitatem & nitorem dentium uteris. Pernæ scrofinæ os quod est amplissimum, cō
 bustum tritumque, opimum & salubre dentificiū præstat; gingiuas enim siccatur & adstringit, dentesque
 ab humoris iniuria & tumore defendit. Cybium optimum ac uetustissimum ollæ inditur, atque argilla
 circumlinitur,

circumlinetur, & furno ardenti obijcitur, ut ad cinerem cybiū excoquatur. tunc adiecto pario lapide con-
tulo, salamenti supra dicti fauilla conteritur, hoc dentifricium ita bonum est, ut ad inanitatem dentes nō
finat peruenire.

Mastiches — I. ris optimi uncia una, myrræ unc. I. folij unc. I. iris illyricæ unc.
I. cassiæ unc. I. tere hæc diligenter atque permisce, & dentifricium facito, quod mirabere. **Nardi spi-
cæ** — I. amomi — I. piperis — I. ijs tunsis cribratisque ad incolumitatem dentium utendum esse de
experimentis suademus.

Compositio dentifricij, quam **Artemius Dianio** ostendit, contra dentium stridorem. panem candidum
ficum uetustum, qui teri possit, salem, piper, folium, costum, cornu cervinum, hæc æquis ponderibus teres
ad maximam leuitatem, & quotidie inde dētes curabis; quo facto stridorem eorum omnem humoremque
depelles. **Ad colorem nigrum** reducit dentes, nigrum cū porro rudi costum, & pro dentifricio sum-
ptum.

Ad dentes nigros purgandos, panem candidum & pumicem pari pondere combure & tere,
atque adfiduē hoc dentifricio utere. **De sepiarum ossibus**, quod est molle, unc. quatuor, salis ammo-
niaci uncias I I. marmoris candidi — I I. schœni anthus unc. I I I. cassiæ unc. I I. folij unc. I. piperis
albi semunciam, herbæ cyclaminis succum & mel lycium quantum sufficiat, æquali mensura permisce, qui-
bus rebus dentifricium egregium facies, quod dolorem dentium sedat, eosque confirmat & candidissimos
reddit, sed quæ terenda sunt, diligentissime terantur, atque cribrentur, & sic omnia misceantur, quod den-
tifricium, nec non & alia omnia supradicta, in pyxidibus ligneis aut corneis debent recondi.

**Vna & faucibus, & arterijs, & rauce dini, remedia physica, & rationabilia diuersa de
experimentis.** Cap. I I I I.

Ad faucium uixque tumorem, hac fere omnes compositione uti debent, quæ nullam asperitudinē
habet, & satis efficax est. uix amineæ acerbæ cū primum granum eius incipit perlucere, succi s. I I I.
mellis attici s. I. misceto in unum, atque in æneo uase coquito, subinde mouens, donec mellis habeat spif-
situdinem, atque inde fauces continges.

Altera ad eiusmodi molestias compositio, cū diutius uexa-
tæ sunt partes supradictæ, ut faciliē placentur: aluminis fissi denarios I I. gallæ tunsæ * I I. ompha-
cij aridi * I. croci * I. passi cretici s. I. hoc decoquitur uase fictili ad medias, ita ut quæ terenda sunt,
diligenter trita admisceantur; utrumque autem medicamentum signatum stanneo reponendum est uascu-
lo, & uix uel fauces adfiduē inde tangendæ.

Vbi suppuratio faucium suspecta est, diutius permanē-
te earum tumore, & interdum febriculis non sine horrore incurrentibus, oportebit quidem gargarizare
aquam mullam, uel cum ficis aridis decoctam, sed perungi fauces utile est hoc medicamento, quantum ta-
ctus sustinere poterit, paulo pressius, quod conficitur sic. mellis boni despumati heminam, resinæ terebin-
tinæ P. I. rosæ succi cyathos V. resinam cum rosâ duplici uase, ut solent unguentarij uti, liquefieri opor-
tet, deinde admisceri mel, & coqui donec spissum fiat medicamentum. hoc etiam cū eruperit suppurati-
o, uti oportebit; expurgat enim & expellet omnia. **Vnam** supprimit diuinentem, sal & galla con-
tusa æquis ponderibus, admixta, & ita per coctile adposita.

Item gallæ * I I. æris floris * I I. menarum sine ouis, id est piscium salforum capita X. hæc comburantur, & ita cæteris bene tritis trita
admiscantur; sed postea nihilominus in unum diutius terantur. oportet autem tangi digito humido me-
dicamentum, & sic uiam ab imo rectam diu supprimit sursum uersus.

Ad arteriam exasperatam sim-
plicia quidem hæc faciunt, gummi alexandrinum, uel tragacanthum per se sub lingua retentum; sed com-
posita hæc ad tumorem arteriæ maximē profunt: papaueris siluatici iam maturi, uiridis tamen adhuc, ca-
pita quàm plurima uase fictili coniunguntur, atque aqua superfunditur tanta, ut supersint de uasculo duo
uel tres digiti. hæc ubi triduo macerata fuerint, eodem uase incoquantur, donec madescant, postea expri-
muntur, omnisque aquæ percolatæ prius diligenter mensura capitur, ad cuius soliditatē mellis attici quar-
ta pars miscetur: deinde in duplici uase tam diu coquitur, donec mellis habeat spissitudinem. hoc medi-
camentum & ad auriculæ tumorem & ad tussim facit.

**Altera arteriace ad fluorem arteriæ, & ad rau-
citatem, & ad tussim, & ad spissum sonum uocis.** accipit hæc, tragacanthi * V I. gummi acanthini, quod
ex uermiculis qui illic sunt, uerum docetur, denarios sex, myrræ denarium I. ris denarios I I. croci *
I. piperis albi grana X X. cariotarum recentium trium pulpas medias, detracta exteriore cute, uix passe
incorrupte, purgatis interioribus granis, denarios V I I. gummi & tragacanthum passo cretico, uno die
& una nocte macerari oportet, postero die pilo mundo contundi & cætera trita mortario curiose admisce-
ri. inde dari debet sub magnitudinis globulus, & sub lingua teneri, & deuorari statim quod liquefactum
fuerit. hoc medicamentum pipere detractō, & ad tumorem arteriæ facit, seruandum autem est pyxide bu-
xea.

Arteriace, qua melior non est; refertur autem in **Asclepiadem medicum** optimum, facit ad om-
nia superius dicta, & quidquid in arteria uitij est, efficaciter curat. constat ex his, myrræ optimæ pinguis de-
narios X X I I I. tragacanthi candidi denarios X X X V I I. glycyrrizæ radicis denarios X V I I.
resinæ terebinthinæ ueræ denarios X X X V I. tragacanthum sicut est, contundi & percribrari tenui fo-
ramine oportet. deinde myrram tritam seorsum admisceri, & rursus utraq; in unum diu teri, atque ita
in pilam coniungi, & ibi cū concaluerint omnia ictu pile assiduo, terebinthinam paulatim misceri, donec o-
mnium unitas fiat. postea glycyrrizam contusam & cribratam, mortarioque nihilominus diligenter trita,
sensum adspergi conuenit. sed ubi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant &
pilulas faciant uix magnitudine; fit enim citò durissima hæc arteriace; & hoc ipso præcedit cæteras, quia

*Artemius Dianio
dedit.
Ad faucium stridorem.
panem cand. sal. piper, folij
costum, cornu cervini.*

Schœni anthus. nig.

*vis.
Dentif. recondenda
in pyxidibus ligneis aut corneis.*

Ad faucium uixque tumorem.

*uix amineæ, acerbæ, mel, sella,
alumen, amplexical, crocus, passus,
sal, statim per, in pyxidibus recondenda.*

*Case.
Suppuratio suspecta, &
febriculis uti conuenit.
Gargarizans ex aqua mulla,
fictili.*

*Topica.
mel, terebinthina, succus rosæ.*

modus utendi.

*Unguentum
Vasculum
Ad arteriam exasperatam,
sup. ptamplæ, resinæ, s. s. s.,
gummi alexandrinum, tragacanthum,
capita papaueris, uel. s. s. s.,
gummi acanthini, crocus, piper,
crocus, uix passa, passus, uix,
glycyrrizæ, terebinthinæ.*

modus utendi, X

Gummi acanthini, uix, uix.

modus utendi.

linguae subiecta non facile soluitur, & ita diutius exhibet salubritatis effectum.

leuissime terito, ex eo succum exprimito, quo uua contacta potenter subleuatur.

satini, seu siluestris ex uino decocta, & saepius gargarizata, uuam resiliere compellunt.

uere uua contacta, eodem die resilit, si ter ei interiectis horis medicamen fuerit adpositum.

summi uerticem si quis uua laboranti mordeat inopino, omni cum molestia liberabitur.

pio doloris uua bene subleuatur, si aqua frigida uel posca assidue gargarizetur.

num adiecto croco ab inscio ne fastidiat, epotum, uel gargarizatum, mirum in modum uuam reprimat, & consumit.

Cinis testarum ustrarum ex ostreis cum melle tenuissime contritus uuz inlitus prodest.

Rubi coliculi teneri discoquuntur ex uino, idque uinum gargarizatur, quod confestim uuam prominen-

tem coercet. Folia rubi arefacta in umbra, in cinerem concremantur; is cinis in coctuari uuz subiectus,

praesentaneo remedio eam contrahit: Hirundinum exustarum cinis usque ad periculum laboranti,

uuz, cum melle mixtus potenter inlinitur. Alumen scissum leuiter tritum uel tunsum, uuz subditu

prodest. Chalcitidis scripulum unum, suris scripulos tres, calcis uiue denarium, misyos, nardi, folij sci-

pulos binos, croci sicci, scripulos duos; omnia tunsa & cribrata in unum miscebis, deque eo puluere in co-

cleari posito, uuam tanges, ter mane, ter ante balneum, certum experieris remedium.

panis micam, carbonem mortuum in phoenicio alligabis, & lino circa collum uuam dolenti suspendes.

Succo uel lacte caprisici in coctuari posito, uua optime subleuatur.

pressus & tepesactus ab eo, qui uuam dolet, salubriter gargarizatur.

inuenitur, phoenicio obuolutus, linoque ligatus, collo suspenditur eius qui uuz uitio laborat.

coniuunctis digitis ducens, dicat. crissi, crasi, cancrasi. quibus dictis, rursum manus a gutture ducat, & ter hoc

faciat. Laboranti uuz diuturno labore, haec cura succurrit. hirundinem uiuam testa africanae cochlee

includes, eamque phoenicio inuolutam, lino circa collum subligabis, intraque diem nonu, omni molestia

liberaberis. De uua passa eliges granum, quod unum intrinsecus nucleum habeat, eumque in phoeni-

cio alligabis, & faucibus, id est, in regione uuz inferes, & tenebis, & dices, uua uiuam emendat; mox ipsum

phoenicium supra uerticem eius tenebis, & idem dices, cumque ter ipsum feceris, & carmen dixeris, collo

dolentis subligabis. Rosae siccae partes duas, myrti partem unam, cum aqua malsa decoques, & labo-

ranti de uua dabis gargarizandum. Lenticulam, ficus siccas, & surfures, cum aqua malsa decoques, &

pro gargarismo uteris ad uuam reparandam. Allium cum sale tritum, in coctuari adpositum uuz,

uehementer eam releuat. Allij umbilicum quo grana continentur, atque ubi radices inhaerent, cum

ipsis radicibus, in phoenicio conliga, & laboranti de uua, luna septima phylacterij more suspendes.

Ouum exinanitum completum uiua terra, loco clauso si abscondatur ab eo, qui de faucibus & arteria ha-

borabit, remedio praesenti sibi subuenit. Olei ueteris quod satis erit, insusum naribus, tumorem arte-

riarum, represso periculo suffocationis, euincit. Fium columbinum, ficus aridas, & nitrum tundes,

eaque mixta extrinsecus adpones, hoc medicamentum asperitatem faucium mollit, destillationemque ta-

stigmat. Coctez terra tantum excussa, in lota coquuntur, dehinc trita cum passo cretico aduersum fa-

cium molestias hauriuntur. Ut faucium duritiam lenias, medicamen facies tale. myrti uncias III.

croci unc. I. tragacanthi uncias tres, ammoniaci uncias tres, mellis quod satis sit. omnia haec trita atque per-

mixta recondes, & parato certoque subsidio, ad arterias crassiores, & ad difficultatem uocis utens.

Ad tumores uuz & faucium reprimendos, gargarizari oportet tepidam aquam malsam cum humore ptis-

ae & cum melle decoctam. passum quoque cum glycyrriza, uel hyssopo, uel foeno graeco, uel lini semine

decoctum iuuat, nec non & aqua maluarum illic incoctarum gargarizationi plurimum prodest.

Bene opitulatur & fomentum per spongiam adhibitu ex aqua calida arteriae & faucibus, quas partes po-

stea regi oportebit lana succida pura. Sedant tumores faucium & uuz, perunctiones quaedam, ut suc-

cus de moris coctus in mellis spissitudine. Item mali punici granorum succus. Item uuz acerbz

succus eodem modo decoctus. prodest & lentisci & terebinthi, & rhus syriaci, & myrti & rubi, & rosae

succus si cum melle haec omnia decoquantur: pruna quoque profunt matura, si aqua in qua cocta fuerint,

gargarizetur, aut os ex ea colluatur. haec omnia profunt etiam anginam habentibus, & cetera uitia in ore

nata efficaciter curant. Non desinente faucium tumore, profunt non solum fomenta molliter adhi-

bita faucibus atque arterijs per spongas aquae calidae, sed etiam cataplasmata uel fomenta de farinis: ite-

que imponi oportebit iisdem partibus, farinam ordeaceam ex aqua pura, uel malsa coctam, uel lini semi-

nis farinam, uel foenograeci farinam similiter coctam. sed mirifice profunt pulsi hirundinum pingues saliti,

uel recentes asli, in cibo sumpti; protinus enim omnem praefocationem, & tumorem faucium tolluntque-

rum si purare fauces uidebuntur, oportebit saepius gargarizare aquam cum ficis aridis coctam, uel aquam

malsam cum supra scriptorum admixtione: quod si tantus fuerit tumor, ut etiam praefocari aut strangu-

lari fauces uideantur, aluum subtrahere clysterio oportebit, aut sanguinem emittere de brachio, uel sub

lingua uenam praecidere. Thymbrz ex aqua coctz, uel aceri uapor, per arundinem ore receptus pro-

dest ad tumores oris, & gutturis, & faucium. Origanum tritum cum melle impositu, ulcera oris pur-

gat, nec patitur calongius serpere; coctum uero cum aqua & arida ficu, atque assidue gargarizatum, facit

& ad alia uitia, id est & ad anginam, & linguam fideratam, quod genus morbi Graeci paralyfin uocant.

Sorbtionibus uti oportebit, eos qui de uua & faucibus laborant, factis ex amylo, ptisana, oryza, alba, fari-

na triticea, faba alba, urtica tenera cum lacte decocta; deinde cum ex aliqua parte releuati fuerint, tum uti

ouis

ouis sorbilibus debent.

Ad uuas callosas, & nimium tumentes, mirifica hæc compositio est, facit & ad cætera faucium, & oris uitia; est autem hæc, æris floris * I I. chalcitidis * I I. picis liquidæ cyathum. coquitur pix donec amittat odorem, deinde adiungitur ei mellis cyathi sex; atque iterum utraque mixta inferuescunt. post hoc, adiungitur uini aminei sextarius, & rursum coquitur, ubi autem bene decoctum fuerit, cætera supra scripta, quæ sicca sunt, trita adiunguntur, iterumque decoquitur medicamentum, donec sit spissum uelut mel.

Rhus quo coriarij utuntur foliorum tenerorum collectorum æstate, priusquam semen arbusculæ eorum habeant, * X X I I I I. macerantur in aquæ nitidæ congijs tribus, totidem diebus, totidemque noctibus, deinde expressa folia abijciuntur, aqua in qua macerata fuerant, transfunditur in uas æreum, & coquitur donec in mellis spissitudinem redigatur; oportet autem moueri aquam ipsam nudicula, uel spathomela æris rubri. postea adijci debent trita hæc, myrræ, turis, nardi syriaci, cinnamomi, callicæ, singulorum denarij bini. deinde bis ter uel feruescere medicamentum, & reponi in pyxide cuprea. facit ad omnia uitia, quæ in ore nascuntur, & ad uuam, & arterias, & anginam, & ad auriculas ex quibus puris multum fluit, & ad ueretra, & ad nigredinem carbunculorum, crustas quoque, & papulas omnes, & maxime ea humoris uitia, quæ in nocte concitantur, expurgat. sed si uetustate medicamentum inaruerit, remittitur, & temperatur uino austero bene calido.

Remedium Cosmi medici ad anginam, & ad omnia uitia quæ in ore nascuntur, & ad aures pute manantes, & ad carbunculos, atque ad ueretra, quæ nigredinē duxerint, & ad crustas, & ad ulcera in pedibus subtrita calciamenti; rhus syriaci * I I. myrræ * I I I. callicæ * I I. croci * I I. mellis attici cyathos I I. coquitur medicamentum lente in cinere calido, donec spissum fiat, reponitur in uase æreo.

Arteriæ ad grauedines oris, & capitis, & ad pleuriticos, & per tussim, sanguinem ejicientes. conficitur sic, passi cretici sextarij duo decoquuntur ad tertias. deinde admiscetur turis uictoriati duæ tertiarum partes, myrræ dimidia, croci una, tragacanthi denarius unus, gummis * I. piperis grana numero uiginti, glycyrrizæ succi * I I I. carthotarum pinguum succi exemptis interaneis, * I I I. gummi, & tragacanthum in aqua mulsa maceratur: deinde utraque trita cæteris bene tritis, & leuigatis admiscuntur; post hoc globuli finguntur ad fabæ magnitudinē, quos sub lingua teneri oportet, & quod de ijs liquefactum fuerit, statim deuorari. hæc compositio facit ad omnia arteriæ uitia, & thoracis, & ad uocis interceptionem.

Compositio, quæ dicitur stomatice, facit ad tonsillas, & uuas tumentes, & ad uulnera, & ulcera in auriculis uetera, excepta ex libris Ptolemæi regis, qui Euergetes appellatus est, accipit hæc, succi ex moris facti, & in sole cocti 8. unum semis, glycyrrizæ succi * I I. corticis lycij * S. myrræ troglodyticæ * I. aluminis fissi * I. nardi indicij * S. mellis attici cyathos I I I. uini mali cyathum I. quæ arida sunt, seorsum teruntur, & in unum cum uino temperantur. deinde passum ijs admiscetur, & coquuntur omnia in cinere calido, donec mellis spissitudinem habeant. non oportet autem ignorare, utiles esse arteriam imbecillam habentibus gestationes, deambulationes, corporis uocisque exercitationes; contraria autem balnea, & omnia quæ uidentur caput implere, uel humores excitare. Vuae & faucium dolori, simus agnorum priusquam herbam gustent, in umbra arefactus, & confectus, atque emplastrum more adpositus medetur.

Succo coctæ acui transfossæ inlita uua sanatur, ita ut ipsa coctæ in fumo postea suspendatur. Vuae destillationi, quæ omnibus fere periculosa est (nam & phthisin, & syntexin, & alias molestas ualitudines creat) profunt porri sectui folia non cocta sine pane adsidue manducata.

Oleum calidum ei, qui de uua, & arterijs laborat, eunti dormitum in cerebrum, & in aures infundi utile est.

Vuam toto anno non dolebit qui cum primum uuam uiderit procedentem, sinistra manu digito medicinali, & pollice granum uulsu sic transglutierit, ut dentibus non contingat.

Stercus caballinum recens colliges, & in furno calefacies; tunc oleum medio capiti infundes contra uuam, & sic stercus prædictum in panno, uel in linteo spisso, capiti superligabis in noctem.

Fruenti grana super candentem tegulam pones, & disperges ea, & cum uideris ex ijs humorem nigrum exire, de coctuario colliges, & subinde uuæ adpones, statim remediabis.

Ad fauces, & arteriam impeditam, remedium utile sic, croci drachmas octo, nardi drachmas duas, schoeni anthus drachmam unam, amyli drachmam I. S. rosæ seminis drachmam unam, mellis attici cyathum unum, cum tenuissimo puluere specierum supra dictarum miscebis, & decoques tenuiter, & ad perunctionem faucium uteris.

Lac bubulum recens mulsum, & lento igne calefactum gargarizatumque, arteriam constrictam infuso catarro, & fauces exasperatas, pristinae sanitati restituta perlanat.

Vuae dolenti, & destillanti medicamentum præsentaneum, sic, gallæ rufæ semunciam, aluminis fissi scripulos I X. myrræ pinguioribus scripulos I X. cunicularis herbe aridæ super mundam tegulam combustæ cineris semunciam. hæc omnia in tenuissimum puluerem redacta, & in unum permixta seruantur uase uitreo, & per triduum, coctæare semiplenum ieiuno, & bene digesto intra os inferitur, ut uuam contingat, & inlinat.

Cauticum ad uuam penitus minuendam, uel consumendam, sic; sceniculi drachmam unam, calcis uiuæ drachmam unam. aphronitri drach. I I. chalcanthi drachmas I I. toni drachmas I I. confusa hæc, & in puluerem redacta permisce, & subige cum cinere lixiuij ficulnei, & impone sicutum, ita ut hæreat uuæ, uel faucibus.

Raucis, & grauedini uocis plurimum prodest, tragacanthum si sub lingua diu teneatur, aut piper, & paulatim salua quæ collecta fuerit, sorbeatur.

Raucis si ova incocta recentia singula per triduum ieiunus hauserit, statim remediabitur.

Raucis si in balneo clament, & aerem calidum intra fauces recipiant, satis utile est. oleum quoque uiride in ore tepidum teneant, & adsidue gargarizent, etiam in balneo plurimum prodest.

Ad uocem clarificandam, radicem edulem, quæ incocta manducatur, cum mulso coque, & deinceps ipsum mulsum bibe, & radicem ipsam manduca.

Ad uuam destillantem, platani pilulam, quam singularem inueneris, lino traiectam suspende collo laborantis. Vuam caniculatam, & cocteam germanam combure, & contere, atque ex eo puluere mixto, pollice summo, uel certe coctario, uuam ieiuno tange per triduum. ^{Herba cymbalitis radicem ante foliorum colliges sinistræ manus digitis pollice, & medicinali in nomine eius qui uuam dolebit, & licio conligatam collo eius suspende.} Picem mollem cerebro eius impone, qui uuam dolebit, & præcipue ut super limen stans superiori limiti ipsam picem capite suo adfigat. ^{Ad dolorem uuæ scribes in charta, & collo laborantis in linteolo suspendes, formica sanguinem non habet, nec fel; fuge uua, ne cancer te comedat.} Araneam, quæ sursum uersus subit, & textit, prendes, & nomen eius dices, cui medendum erit, & adijcies, sic citò subeat uua eius, quem nomino, quomodo aranea hæc sursum repit, & textit; tum ipsam araneam in chartam uirginem lino ligabis, & collo laborantis suspendes, die iouis, sed dum prendes araneam uel phylacterium alligas, ter in terram spues. ^{Medicamen causticum ad uuam sine ferro tollendam, de quo etiam ischiadici curantur; calcis uiuæ — I. saponis albi pilulas tres, sinopidis, hoc est minij, modicum, fixiuuium unde operantur coactiliarij aliquantum, in unum miscebis hæc, & coagitabis diu, & repositum habebis, ut cum opus fuerit, utaris.} Descriptio trochisci plurimis rebus satis utilis, id est, ad uetus tussis, & reumata, quæ in arterijs confurgant, ad paralyticos, ad eos qui ex incommodo tremunt, ad ueneticam, ad hydropicos, ad opisthotonicos, ad pedum subitos dolores, uel grauedines, ad longas uiscerum causas, uel dolores, ad phthisicos, ad inedia, ad lienis, ad hepatis, & ad intestinorum dolores, ad duritiam quoque hepatis resoluendam, ad partus extrahendos, qui ante maturitatem fuerint enecati, & si quid post partum relederit euocandum, quod medicamentum ab Eutychno archiatro primum traditum fertur, cuius descriptio talis. Styracis * IIII. iris illyricæ denarios IIII. hyoscyami * I. opopanax * IIII. myrræ troglodyridis * IIII. resinæ terebinthinæ * II. piperis albi * XII. aphronitri * XI. opij * XI. galbani * IIII. hæc omnia diligentissime tusa, cribrata, & trita, ut permisceri inter se possint, aqua nitida in unum colliges, ita ut styracem, & galbanum separatim ante contundas, quæ simul confusa, aqua colliges, & trochiscos ad mensuram oboli facies, & cum necessarium fuerit, ex aqua calida bibendos dabis, cum cyathis tribus ternos, prout ætas, aut uirtus fuerit.

Ad anginam, uel synanchen, & strumas, & parotidas, & reumata, & glandulas, uel consillas, & ad ea quæ faucibus hæserint, euocanda, remedia rationabilia, & physica diuersa de experimentis. Cap. XV.

Anginæ prodest sanguinis detractio, cucurbitarum adhibitio, cæteraque auxilia, quibus medici efficacia utuntur; medicamenta autem simplicia hæc recte faciunt. laser cyrenaicum aqua dilutum crassius per pinnam faucibus adhibetur; uel euphorbium aqua dilutum similiter impositum. compositionum autem hæc sunt apta; fellis taurini, salis, aceti, mellis, olei ueteris, æquas partes in unum misceri oportet, & cum opus fuerit pinna perficere fauces diutius laborantes. Item bene facit, & hoc medicamentum compositum sic. githi * II. pyrethri * I. sagapeni uictoriati pondus; trita hæc cum melle miscentur, & ita faucibus adhibentur. Facit bene, & medicamentum hoc compositum sic. fellis taurini * II. suc cucumeris siluatici * I. cachryos, & mlyos animati * singulos; trita hæc melle admixto reponuntur; cum opus est, aqua tepida diluuntur, & fauces exinde perunguntur, cogunturque inde quam plurimum deuorare, qui faucium dolore uexantur; soluit enim uentrem, & ita uehementissime prodest. Item benefacit, & hoc medicamentum. hirundiniorum pullorum exustorum cineris * I. hyssopi * I. nitri * I. piperis denarii semissem, laseris * II. hoc medicamento, & sæpius fauces, & pressius fricari oportet. Multis, & hoc profuit medicamentum. costi, opij, anesi, sichoeni, cassiæ rufæ, singulorum denarios binos, githi denarium unum, amomi uictoriati pondus, asari, quod est semen, * II. aluminis fissi * I. galbani quod est medium, magnitudine ciceris pilulas numero quinque, croci denarios II. crocomagmatis uictoriati pondus, myrræ uictoriati pondus, aristolochiæ Græcæ denarios IIII. cinnami denarios tres, hirundinum siluestrium exustorum pullorum cineris denarios V. nardispicæ uictoriati pondus; melle artico despumato comprehenduntur hæc omnia diligenter trita; cum autem opus fuerit reparari hoc medicamentum, adijcietur quod satis erit eiusdem mellis, & sic faucibus inferetur. hoc Liua Augusta semper compositum habuit, & reconditum in uasculo uitreo; facit enim mirifice aduersum anginam, & synanchen. Medicamentum ad anginam, quod deuoratur quantum digito uno tolli, uel colligi potest; componitur ex ijs; thus syriaci denarii semissem, hyssopi tantundem, caparum cypriarum capita tria, laseris cyrenaici quantum erui granum est, uini bene odorati cyathos tres. cum uino cepærita teruntur, ut soluantur, deinde mittuntur in uas æris rubri, atque adijciuntur cætera, & coquuntur ad mellis crassitudinem. hinc dabitur bis, uel ter digito lingere ei cui medendum est. Ad synanches molestiam, & faucium dolorem periculosum, efficax medicamen, conficitur diligenter, & reconditum in præsidio habetur. ius in quo hirundinum pulli costi fuerint accipitur tepens, & intra fauces continetur, atque aliquid inde transmittitur. Sed præcipue contra synanchen prodest, si hirundininos pullos uiuos in nido prenas, & uiuos incendas, ut puluis ex ijs fiat, die iouis luna uetere. sed obserua, ut impares in nido inuenias, & quanti fuerint exuras. horum in calida aqua puluerem bibendum dabis, & de ipso puluere digito locum synanches ab intro contingens; miraberis remedium; sed in lotis manibus remedium facies.

Rutam,

Rutam, allium, laser, æquali mensura trita, si ex uino gargarizet, qui synanchen patitur, certum, & præsens remedium sentiet.

Præcantabis ieiunus ieiunum, tenens locum qui erit in causa, digitis tribus, id est medio, pollice, & mediana, residuis duobus eleuatis, dices, exi hodie nata, si ante nata, si hodie creata, si ante creata, hanc pestem, hanc pestilentiam, hunc dolorem, hunc tumorem, hunc ruborem, has tollēs, has tonsillas, hunc panum, has paniculas, hanc strumam, hanc strumellam, hanc relegendem, euto, eduto, exento, de istis membris, medullis.

Ad tonsillas herbæ quæ lingua bubula dicitur, radix, circa collum inligata plurimum prodest.

Gladioli folium medium diuisum, & in similitudinem coronæ in se connexum, ac pro foras circa collum habitum, tonsillas sedat.

Pruni arboris folia ex uino decocta, & gargarizata tonsillas molliunt.

Turis manna, & myrra, & cinnamomum, & galbanum æquis ponderibus separatim ad leuitatem confusa, cribrataque, & cum resina terebinthina ceraque decocta plurimum, atque emplastri modo adposita, sanant tonsillas.

Si adipe leonina tonsillæ interius perungantur, eodem die sanabuntur.

Lac caprinum, uel bubulum, uel ouillum recens mulsum, dum calet, uel etiam calefactum, gargarizatum, tonsillarum dolores, & tumores citò sedat.

Plantago, uel eius radix diligentissime contrita, cum axungia uetere imposita in panno, uel linteo, prodest anginae, uel tonsillis.

Cyclaminis succum, & mel lycium æquis portionibus miscebis, & eo gargarismatio ad omnia faucium uitia potenter uteris.

Pulticulum ex alica facies, in quam capita porcorum confusa mittes, & simul decoques, & deinde colabis, & sorbitione ea contra faucium molestias cum uolueris, uteris.

Si quis grillum manu contriuerit, & ad tonsillas, uel suas, uel alterius tenens ter adplicuerit, tactu illo tumorem sanabit.

Tonsillis renes uulturini aridi in melle triti, uel decocti, mirum remedium præstant, si pro emplastro adponantur.

Cypz longæ conditoris succo, adiecto melle permixto, interiora faucium pertractantur; quo facto, angina laborantem a periculo liberabis; resina quoque, uel liquore cedri arboris angina adfide peruncta sanatur.

Myrti foliorum succus gargarizatus, uel etiam transmissus, anginae plurimum prodest.

Myrram contritam ex aqua tepida constanter absorbendam dato ei, qui anginae periculo laborat, statim eum liberabis.

Hirundinum combustarum cinis cum melle attico mixtus, faucibusque inditus, & anginam reprimet, & ulcera si qua arterijs inerunt, contacta purgabit sanabitque.

Taurinum fel melle permixtum, & extrinsecus faucibus adpositum, uel pro unguine inductum, anginas efficaciter sanat.

Idem præstat, & caprinum fel similiter adpositum.

Si subita angina ita facies præfocabuntur, ut nullum auxilium celeriter inueniri possit, ferro quam acutissimo ex uenula quæ sub lingua est, in parte sinistra, quæ statim de hoc morbo pallefcit, sanguis emittatur, continuo subuenietur.

Herbæ proserpinalis, quæ dracontion dicitur, contrita succo admisceto salis aquam, & olei parum, atque inde linguam, & quæ sunt circa linguam, & fauces perficito, donec uomat cui medebere, citò sanabitur.

Alumen tritum ex posca gargarizatum, anginae molestijs prodest.

Lini semen, & anethum cum sale, & oleo, & aceto decoctum, bene contra faucium dolores gargarizabitur.

Nucis iuglandis nuclei triti cum ruta, & oleo impositi, faucibus profunt.

Ruborum caules teneri tenentur, succusque eorum expressus, & in sole coagitatus donec spissetur ad crassitudinem mellis, ab interiore parte faucibus, & gingiuis inlitus, plurimum prodest.

Pullus hirundinis siluestris, uel melius si ripariolæ, certè etiam domesticæ, assus, uel elixus comestus, anginam uelocissime certissimeque sanat; adeo ut hominem ab hoc morbo per totum annum tutissimum præstet.

Ad parotidas sedandas; asphodeli herbæ radix inuoluta lana fusca, & circa collum suspensa, remedio plurimum erit.

Brassicæ stirpes siue stipites arefactæ, uel combustæ, & in puluerem redactæ, & cum axungia uetere subactæ, atque emplastro alutario parotidibus impositæ, satis profunt.

Lupino crudo deme folliculos, atque ex eo farinam tenuissimam facito, quam melle subactam, uice malagmaris parotidibus adponas, continuo dolores tumoresque sedabis; idem præstat, & cum aceto decoctus similiterque adpositus.

Herba uerbena cum plantagine in ore contrita, adiecto modico salis, pro emplastro adposita, parotidas mirè discutit; quas cum aperuerit, detracto sale sola contrita, & imposita, celeriter sanabit, nec cicatricem magnam faciet.

Noctue iecur diligenter seruatum, atque ex unguento nardino trito auriculis subinde infusum, celeriter parotidum uitium omne persanat.

Ostrei testarum combustarum cinis cum melle impositus parotidas citò soluit.

Aqua marina tepida, uel ex marino sale infecta, parotidas spongia prius elue, tum calcè cum axungia uetere subacta imponito, confestim sanabis.

Spumæ argenti P. I. olei ueteris P. II. salis ammoniaci P. II. galbani P. I. simul hæc omnia permiscebis, ita ut spumam argenti in oleo decoquas usque ad crassitudinem mellis, tum adicies salem, & pones, ut ferueat. item galbanum addes, & rursus pones, ut ferueat. postea simul omnia colabis, & recondes, & cum opus fuerit, more emplastri miro remedio sedandis parotidibus uteris.

Vitium exustarum cinis cum cera, & resina paribus ponderibus adpositus, parotidibus prodest, sed una decoctus.

Stercus columbinum tritum cum farina hordeacea ex melle subactum, & calidè adpositum, nascentes parotidas comprimit.

Adeps ursina pari pondere cum seuo taurino, & cera permixta atque adposita, parotidibus mirum remedium est.

Pingue laridi quod inter cutem, & carnem macra est, si parotidibus adponatur, & illic ligetur, citò sanabuntur.

Mus araneus si in orbita inciderit, naturali fato illic detentus emoritur. hunc illic inuentum, argilla, aut linteo, aut phœnicio inuolue, & ex eo ter circumscribe parotidas, quæ in corpore subito turgebunt, mira celeritate sanabis.

Maluæ radice lino, uel licio traiecta, aut amoglossæ, id est plantaginis radice similiter collo circūdata strumas sanari manifestum est.

Mentastri succus cum uino gargarizatus frequenter, strumas tumoresque discutiet.

Farina hordeacea, pix liquida, cum cera

boni quantarium, & dabis bibere ex aqua calida, si iam per dolorem faucium manducare non poterit.

Adipis ueteris — I. furis grana I I I. laferis grana I I I. satyreiz pusillum, alij spicas X I. teres, & calefacies flammula tenui, atque inde collum eius, & fauces diligentissime perfricabis, qui de talibus laborabit.

+ Remedium ualde certum, & utile faucium doloribus sic scribas in charta hæc:

Εἰς ὃν τριπλῆς χροῖον Τονοῦδον,

Καὶ ταῖς τρεῖς τοῦ Τονοῦδον. In dibonon sup. rino gilla. onil zino mullo

Σαῖον με σέμιν νετέρον ὑπέριτε.

quam chartam in phœnicio obuolutam, lino conligabis, colloque suspendes; meminerisque, ut mundus hæc facias, & ne tertia manu scriptura tangatur.

Gallam tunsam, & cribratam, atque alumen utrumque æquis portionibus sumes, & prius in ollam nouam mittes, & mel bonum, atque alumen utrumque adijcies, & in unum decoques; atque inde orificia genarum, & fauces intrinsecus perfricabis.

Vettonicam, argemoniam, uerbenam, rubum, senecionem, mentam, cucurbitam siccam, hinc amplius mittes sardæ caput assatum, piperis modicum; teres hæc omnia diligenter, & miscebis. & sic etiam per pinnulam delicatam faucibus inferes, mirè hoc remedio carbunculum, & quidquid mali intra fauces erit, curabis.

Olei boni cyathum unum, & succinum uerum, in ollam nouam mittes, atque ad medias decoques. deinde succinum tolles, & combures, & teres, & puluerè eius in oleum supra scriptum mittes, & unâ iterum diligenter teres, atque inde collibus quotiens opus fuerit, adpones, experieris magnum remedium.

Ad parotidas conuenit noctuè cerebellum butyro mixtum adponi, discutit enim fere eas sine dolore, & molestia; oportet autem per aquam marinam feruentem, nouis spongijs illic demersis, & linteo, uel sabano intorto, utrinque expressis, uaporare eas, atque ita oblinire hoc medicamentum, superque tegere lana sulphurata totam maxillam.

Bene discutit parotidas iris illyrica contusa cocta ex passio, & more cataplasmatibus farinæ hordeaceæ, calida bis, uel ter in die impoita.

Discutit, & hoc medicamentum parotidas antequam suppurent, quod conficitur sic. spumæ argenti P. I I. cerussæ P. I. salis ammoniaci P. I. æris floris P. I. aceti 8, I. olei ueteris 8, I I. spumam, cerussam, salem, per se, & cum aceto terere te oportet mortario marmoreo, deinde oleo admixto traicere in caccabum amplum, ne extra effundatur, & ad ignem ponere; efferuescet enim ualde. cum hæc super igne posita habuerint emplastri mollis temperaturam, deponi oportebit caccabum; cum uero desierit feruere, paulatim aspergere æris florem, & mouere spathula medicamentum, ne extra fundatur, & rursus coquere, donec habeat emplastri spissitudinem, debebis.

Ad strumas benefacit radix cucumeris siluatici cocta ex aqua mulsa, & trita, atque ita impoita. hibiscum quoque eodem modo coctum, & impoistum melius facit.

Marinilepores oleo ueteri inieci, benefaciunt discutiendis strumis; sed cum ipso oleo in plumbea pyxide clusi, quam diebus quadraginta diligenter alligatam oportet haberi. postea ex eo pinnula oblinenda sunt strumæ, superque eas pellis lanata non nimium tinsa, tegendi gratia imponenda est. præcipi autem oportet, ne quis hoc medicamento manus inquinet, aut inquinatas priusquam bene eluerit, ad os referat.

Ad strumas, & ad duritias mammarum, misce facit hoc medicamentum, antequam suppurent, & post purificationem nihilominus utile est; accipit hæc. olei ueteris P. I. spumæ argenti P. unum, gallæ syriacæ P. I I. mannæ P. I. & unciam, galbani P. I. cum oleo coquitur spuma, donec ceroti spissi habeat temperaturam, deinde admiscetur ei galla, & secundum hanc manna. cum emplastri habuerit spissitudinem, tollitur ab igni medicamentum, & cum desierit feruere paulatim galbanum miscetur, deinde linitur in aluta.

cum opus est adponi, tertio uel quarto die soluitur, si non suppuraerint strumæ, sed si apertæ fuerint, hyeme alternis soluetur, æstate quotidie.

Malagma ad strumas, & ad omnem duritiam relaxandam mirificum, sic, resinz terebinthinæ P. I I. ceræ selibram, propolis, quam quidam ceram sacram uocant, P. I. galbani P. I. olei ueteris selibram, hæc omnia cum oleo ad ignem liquefieri oportet, & postea misceri uisci de quercu P. I. xiphij radices, quod nos gladiolum appellamus, P. I. feculæ putris; P. I. aphronitri libræ quadrantem, opopanacis P. I. hæc omnia ordine quo scripta sunt trita cribrataque in caccabum conijciuntur, opopanax oleo diluitur, & soluitur, ubi temperaturatum est medicamentum, manibus subigitur, linitur cum opus est aluta, & sic adponitur.

Glandulis facies remedium sic; farinam, mel, crocum, & caricis, si mul misce, & cōtere, atque unum corpus facito, & ita linteo inline, & super glandulas pone.

+ Carmen mirum ad glandulas sic; albula glandula, nec doleas, nec noceas, nec paniculas facias, sed liquefcas tanquam salis in aqua; hoc ter nouies dicens, spues ad terram, & glādulas ipsas pollice, & digito medicinali perducas, dum carmen dicis; sed ante solis ortum, & post occasum, facies id, pro ut dies aut nox minuetur.

+ Glandulas manè carminabis, si dies minuetur; si nox ad uesperam, & digito medicinali, ac pollice continens eas, dices; noue glādulæ sorores, octo glādulæ sorores, septē glādulæ sorores, sex glādulæ sorores, quinque glādulæ sorores, quatuor glādulæ sorores, tres glādulæ sorores, due glādulæ sorores, una glādula soror, noue fiunt glādulæ, octo fiunt glādulæ, septē fiunt glādulæ, sex fiunt glādulæ, quinque fiunt glādulæ, quatuor fiunt glādulæ, tres fiunt glādulæ, due fiunt glādulæ, una fit glādula, nulla fit glādula.

+ Ad ea quæ faucibus inherebunt remedium; si os aut arista hæserit gulæ, uel ipse cui acciderit, uel alius, confestim ad focum adcurrat, & titionem uerset, ita ut pars eius quæ ardebat formsecus emineat, illa uero quæ igni carebat, flammæ inferatur; conuertens uero titionem ter dices remedij gratia te facere, uti illud quod hæserit in faucibus tuis, uel illius quæ peperit illa, sine mora, & molestia eximatur. hoc inter certissima remedia subnotatum est.

Herba appellatur uincaperuina, ex qua si fauces obligaueris dormitū eunti, eius cui aliquid ex ijs inhaerit, manè sanus confurget.

+ Omnia quæ hæserint faucibus, hoc carmen expellet, Heilen

+ Item fatti
exurgiti cone

Ad reumaticos efficax remedium, sic, mustela die iouis, luna uetere capta, uiua in olla rudi ita excoquitur, ut teri possit, & in puluerē redigi, qui puluis collectus ex melle, & bene contemperatus, ieiuno reumatico ad diem per coctile dabitur, sed unius ligulæ mensura, mirè proderit. Ad synanchen remedium efficax, sic, rapæ seminis heminam, caulium seminis heminam, opopanacis semunciam, laferis ʒ iiii. alij modicum, salis montani modicū, omnia hæc diligentissime trita, & melle collecta, laboranti dabuntur, mensura, ac ratione ita ut terna coctilearia ieiunius accipiat.

Ad omnes molestias tussis, et subita, et diutina, ac uetusta, et sicca atque humida, et ad phthisicos, atque eos qui sanguinolentum, et purulentum excreant, et ad empyricos, uel pleumoniacos, atque eos quibus casu sanguis intra stomachum intresperint, nec non et ad stomachi fridorem, et ne media doceant, remedia physica, et rationabilia diuersa de experimentis. Cap. XVI.

modico, ternæ, uel quaternæ in noctem, sed digēstis. Aliud catapotium ad tussim ueterem, quod & suspirio, & phthisi tentatos, & lienosos, & icter durum habentes sanat; idem inflationem tollit, & purgat mulierum, si qua ex partu sordida resederint, conficitur sic. styracis ✕ VI. myrræ ✕ II. S. opopana- cis ✕ V. resinæ terebinthinæ ✕ IIII. alterci feminis ✕ I. irisillyricæ ✕ I. nitri ✕ I. piperis albi ✕ II. galbani ✕ II. opij ✕ I. irim, altercum, piper, contundere oportet, & cribrare. nitrum morta- rio terere, cætera pilo comminuere, & postea omnia permiscere, ac facere catapotia magnitudinis fabz. inde ternæ, uel quaternæ in noctem, uel sicca, uel ex calida aqua dare, quæ & ad inflationes, distensionēsque cum aquæ calidæ cyathis tribus utiliter dantur. Ad eam rem remissior quidem pastillus, sed non con- temnendus, accipit hæc. croci, myrræ, alterci, opij, pondera paria contusa miscentur/depumato atrico melli, fiunt pastilli eiusdem ponderis, ut supra scriptum est; dantur iuxta statem, & uires in noctem, licet & hinc catapotia facere propter eandem causam utile sit, sed tunc aquæ mel adijcitur. Pastillus ad tussim, & ad sanguinem reiicientes, & ad stomachum solutum habentes; facit & ad deiectionem uentris, & uelice- dolorem. accipit hæc, apij feminis ✕ VI. rosæ foliorum arefactorū in umbra ✕ XII. myrræ ✕ XII. croci ✕ XI. opij ✕ IIII. apij semen, & crocum, & folia rosæ contuuntur cribranturque, myrræ teritur, opium aqua maceratur, omnia deinde in unum miscentur, aqua adiecta fiunt pastilli ad pondus denarij semissis, aut tertia parte detracta; dantur stomachum imbecillum habentibus, & sanguinem reiicientibus ex aquæ frigidæ cyathis duobus, cæteris ex calidæ totidem cyathis dari debet. Pastillus ex odoribus, qui benefacit ad omnem internum dolorem, propriis autem ad tussim & uentris

destillationem,

destillationem, & oculorum epiphoras, facit & ad suspirium, & ad lateris dolorem, & ad phthysicos, uesci-
ca quoque uel renibus laborantibus, uel sanguinem de urina reddentibus cum dolore, utiliter datur; acci-
pit hæc cinnami, cassiæ, croci, singulorum \times ternos, alterci seminis, & apollinaris herbarum radices singulorum
denarios quaternos, piperis denarios II. opij denarios II. suris denarios III. nardis picæ \times II. uino
falerno contusa, & trita hæc, ut debet, consparguntur; fiunt pastilli ad pondus denarii semissis, aut tertia
parte detracta; dantur in noctem prout ægri uires sunt, cum aquæ calidæ cyathis duobus, aut tribus.

Medicamentum, quod per coctilem deuoratur, benefacit ad tussim aridam, & eos qui difficulter gluti-
nosa excreant, & præfocari uidentur interdum. sed præcipue prodest ijs, qui dolorem lateris cum febre
sentiunt, quos Græci pleuriticos dicunt. liberat enim omni periculo eos. hoc medicamentum Apulei Cel-
si fuit, & præceptoris nostri Valentis, nec unquam ulli uiuus compositionem eius dedit, quia magnitudi-
nem opinionis ex ea traxerat; est autem hæc mellis atticæ libram, piperis nigri denarios duos, myrræ troglo-
dytidis, & cassiæ denarios singulos, stachyos nardi denarium I. cinnamomi hemibolum; quod si non ha-
bueris cinnamomum, duplicem cassiam conijcies. piper contunditur diligenter, & cribatur; myrræ teritur
mortario marmoreo. postea utraque in unum miscentur, deinde mellis optimi despumati adijcitur quan-
tum sufficiat, ut sit pseudoliquidum. dantur inde phthysicis coctileia quina uel sena, pleuriticis etiam plu-
ra, & sæpius; sed intervallo. hoc est non simul omnia dari oportet. & tum maxime cum tussunt, & præfo-
cari uidentur, difficulterque spirant, siue etiam non tussunt, & phlegma illis interius coquitur dari debet,
protinus enim excreant quæ optant, & transitum spiritus habent, & tussire desinunt.

Alterum me-
dicamentum ad tussim aridam, conficitur sic. Nasturtij animati seminis unciam, alterci seminis
unciam, opij denarium unum. myrræ semunciam, sulphuris uiui semunciam, piperis albi — I. melle
colligitur hoc medicamentum, datur fabæ ægyptiæ magnitudine ex cyathis aquæ calidæ I II. in no-
ctem; facit autem hoc medicamentum, & ad lateris dolorem, & ad stomachi inflationem grauedinemque,
coeliacis quoque, qui subito uniuersa deiiciunt, prodest, & dolenti superpositum; uel circumdatum denti,
& si exesus est, in cauernam eius insertum, utile est. præterea ad horrores febrem præcedentes, quæ circui-
tum habent, datum ante horam accessionis, utilissimum est, sed prius corpore perfricato oleo calido. pro-
dest, & ijs qui sine horrore circuiitu febrium uexantur; quamobrem lexipyretos hæc compositio dicitur.

Alia compositio ad tussim aridam, & glutinosam, & difficulter excreantibus; purgat etiam interanea, uo-
micas & suppurationes; accipit hæc, lini seminis, urticæ seminis, nasturtij seminis; iris illyricæ radices æquis
ponderibus. hæc in puluerem redigi, & misceri oportet cum melle, & frequenter ieiuno per coctilem da-
ri. \dagger Stercus porcinum siccum inligatum phœnitio, & colto suspensum, tussim molestissimam sedat.

Hyssopi — I. mentæ siccæ — I. pulegij sicci — I. mellis decocti — II. marrubij — I. papaueris — I.
sunt qui addunt, & sulphuris uiui semunciam, hæc trita permiscuntur, ut pseudoliquida sint, & per coctile
re dantur, ita ut per triduum coctileia singula, qui tussit, ieiunus accipiat. \dagger Hederæ folia tria cum tri-
bus granis piperis, ex uini cyatho, & aquæ calidæ quantum sufficiat, prima die dabis, sequenti die folia quin-
que cum granis quinque, similiter ut supra, tertia die folia V II. cum granis V II. similiter ut supra; sed
infirmo ex calda aqua dabis, mirabiliter tussim quamuis molestam, & uetustam sedabis.

Ad diutinam
tussim, quæ nunquam desinit, & satis molesta est, medicamen facies sic. laticis — I. piperis — I. croci — I.
myrræ — I. marrubij tursi succi quartarium, ficus siccas tres, mellis optimi quod satis esse estimaueris.
coques, hæc pariter miscebis, & coteres, ac sic ieiuno triduo continuo coctileia singula dabis, miraberis re-
medium; sed si necesse fuerit, intermissis diebus iterum, ac sæpius dabis; hoc etiam phthysicos sanat. Ad
tussim ex perfrictione collectam, medicamen hoc utile est. aceti optimi heminam, aquæ heminam, hyssopi
V I. tandiu coques, donec ad medietatem decoquantur. tum heminam mellis boni despumati adijcies,
& lento igne decoques, ut spissescat; ante tamen quam mel adijcias, supra scripta colare debes, inde terna
coctileia ieiunus, & post coenam accipies. Ad tussim remedium utile. resinam terebinthinam, & mel
despumatum pari pondere permixta cum oïo tenuiter decocto, debebis ieiunus haurire.

Pulegium siccum ad mensuram cyathi, & nasturtij tantundem in puluerem tenuissimum redige, &
mellis optimi adijce quod sufficiat, ac decoque, & mane, ac uespere coctileia inde singula accipe, miro ad-
uersus tussim quamuis molestam, remedio uteris. Ad tussim nocturnam, & stomachi confirmatio-
nem, remedium probatissimum sic. caricas tres pinguißimas Africanas prima nocte accipies assatas super
carbones, ita ut singulis caricis inferas piperis grana nouena testæ, & pulegij quod non fuerit in fumo, ali-
quantulum; sed caricas sic assare debes, ne comburantur penitus, sed ut resoluantur; & ea hora qua te in le-
cto posueris, tum eas accipe, & obserua ne quidquam postea loquaris, aut quemquam appelles, antequam
obdormias; hoc obseruans per tres noctes facies. Ad tussim præsentantum remedium sic. radices rumi
cis minutæ, eiusque per campum se sternit, & mora fert paruula, colliges sine ferro, & earum P. III. in
aque s/ X X. lento igne usque ad tertia decoques. deinde radicibus separatim, ponderabis aquam, & quan-
tum separata aqua pensauerit, tantum mellis optimi despumati admiscere debebis, & rursus utrunque
mixtum tandiu decoques, donec mellis spissitudinem habeat. deinde admiscebis piperis optimi triti
quantum estimas posse sufficere, ut sine molestia accipiat, atque ex eo medicamine mane, & sero terna
coctileia sumes.

Marrubij fasciculum bonum in aquæ congio ad medias decoque, & ex ea
aqua adiecto mellis aliquantulo, ieiunus quotidie singulos cyathos, donec tussire desinas, bibe. omne
genus tussis efficaciter curabis.

Foeniculi radicem uiridem nitidam in pila lignea contunde, atque
eius succum ieiunus cum uino uetere per dies continuos nouem in limine stans bibe, ualidissime aduersum

tussim quamlibet molestam tibi proderit. itidem proderit & pulvis ex eadem radice sicca factus, similiter potus. Porri contusi succus expressus cum oleo decoctus & epotus, plurimum tussientibus prestat. Verbenæ herba arefacta tussa atque cribrata tenuissimi pulveris colearia quinque maiora maioribus, minoribus pro ætate minora, sed sinceri ex uini aminei ueteris cyathis totidem, per dies quinque potanda dabis, febricitantibus ex aqua dari oportebit, mirè tussientibus proderit. Scillæ interioris me-

dullæ teneræ contrita succum cum mellis pari mensura decoque, & inde etiam si minimum, quantum summus digitus recipere possit, ieiunus quotidie mane gustaueris, tussis molestia mirè carebis. Tussis molestia cito liberabere, si obseruaueris remedium tale. piperis albi grana III. baccharum lauri grana III. in unum contunde, & adiectis aquæ calidæ cyathis duobus, ieiunus bibe. deinde piperis grana V. & lauri baccas V. ex aquæ ut supra cyathis duobus bibe, deinde VII. & VII. ex aquæ duobus, deinde IX. & IX. ex aquæ duobus. & si tam molesta tussis fuerit, ut non statim desinat, iterum deminuendo similiter facies, ut IX. & IX. & deinde VII. & VII. V. & V. III. & III. cum aquæ calidæ binis cyathis bibas. Cupressi baccæ numero impares quàm minutissime trita & ex uino uetere ieiuno potui data, tussim potentissime leniunt. eiusdem tenera cauliculi a ieiuno commanducata, ita ut succus transglutiat, mirè sanant tussientem, si id adiectis semper impari numero cauliculis per triduum fiat.

Myrræ, styracis, opij, croci, pares mensuras conterito, & de contritis ac permixtis speciebus globulos ex aqua cicerculi magnitudine facito, ac prius quàm dormitum eat, tussienti tria catapota deuoranda, id est transglutienda dato; super quæ tres aquæ calidæ cyathos potandos adijcito. hoc remedio nocturna tussi laborantem cito liberabis. Ventricle gallinacei membranulam, qua foras aqualiculi continentur, arefactam terito diligenter, & cum uino potui dato, humidam tussim sedabis. Tussim quamuis grauem maiorum natu intra quinque dies, paruulorum etiam intra triduum sanat, qui sulphuris triti quantum tribus digitis capere potest, in oïo semicocto forbili per triduum ieiuno, aut per quinque dies dederit.

Hyoscyami — I. sulphuris semunciam, fellis terræ — I. piperis — I. gentianæ — I. opij — I. marrubij — I. mellis despumati quantum sufficiat, supra dictis speciebus tritis cribratisque miscibus, ac leuiter decoques; inde si quis tussi grauiter confictabitur, pastillum ad magnitudinem fabæ ieiunus mane hauriat, & in noctem cum calda aqua alium pastillum bibat, bonum ualde & utile remedium experietur. Scillæ bulbum unum purgatum tribus semioribus in aqua decoques, & ex eo quod fuerit tenerrimum, fumes — III. panacis & iris illyricæ, drachmas quaternas, ammoniaci — I. hæc omnia diligenter teres. sed scillam seorsum conficabis, tum omnia confundes, & mellis optimi despumati ad colligendum in unum medicamen, quod sufficiat, mittes, atque inde laboranti per colear bis uel ter diebus singulis dabis; intra dies VII. etiam sanguinem excreantem & uetustæ tussis molestia liberabis, dum aut deorsum purgatur, aut per uomitū pituitæ interius collectæ humor effunditur. Folia ulmi quæ orientem spectant, cum piperis granis totidem, sed impari numero trita, & cū salerno uino a ieiuno sumpta, etiam puulentas tussis potenter emendant. Salis quantum intra palmam tenere potest, qui tussis in potionem ceruise aut curmi mittat & calidum bibat cum dormitum uadit, neque postea loquatur, sed tacitus somnum capiat, cito sanabitur si hoc uel triduo fecerit. Millefolium tritum ex aceto potum tussientibus atque etiam stomacho ruptis & sanguinem excreantibus prodest, similiter prodest quicquid folium tritum, atque ex aqua potui datum. Quinque ouorum incoctorum uitelli cum uini ueteris aut nulli cyathis tribus permixti, & calide per triduum poti, excreationes cruentas emendant.

Nuces pineæ inanes contusæ in ollâ mittuntur, & quot fuerint nuces, tot hyoscyami uncie & aquæ sextarij adiunguntur; hæc ad medias decoquuntur, atque inde ad tussis remedium etiam phthifico bibenda ieiuno quotidie potio, etiam ex uino, si non erunt febres, salubriter dabitur. Si de tussi stomachum quis aut latera dolebit, herbæ uertonice fasciculum cum suis radicibus in olla noua decoquat, cū aquæ lixiuæ & duobus, donec ad tertias consummantur, atque inde dimidium cyathum frigidum cum dolore urgebitur, bibat. Vetricam, nepetam, pulegium, equali mensura cum uini & duobus & salis pusillo, ad heminam decoques, atque inde laboranti tussi, & doloribus stomachi cyathos singulos ieiuno, ut per colear paulatim infundas, per triduum dabis. Si quem tussis intolerabilis uexat, de lupi icore arido uel exusto quantum uoluerit, conterat, adijciatque uinum, mel, & aquam tepidam, atque inde ad diem cyathum ieiunus bibat, intra paucos dies mirè sanabitur. Inuenta casu in uia portio de cribro, impari numero foraminum collo inligata, tussi & suspirio remedio est.

Ad tussim nimiam, & ueterem, remedium sic. marrubij fici P. III. in ollam nouam fistilem mittes, & aquæ fontanæ & XVIII. & decoques ad tertias, deinde ipsam aquam colabis, & in rudem ollam alteram mittes, atque addes illic mellis optimi & I. piperis triti semunciam, & iterum ad tertias decoques, ut spissum fiat, deinde diligenter in uase uitreo repones, atque ex eo ieiunus terna colearia quotidie fumes. eque prodest marrubij uiridis succus cum mellis despumati pari mensura decoctus, & colear pleno mane sumptus & uesperè. Herba argemonia contrita, & ex uino uetere diluta, potui data, uicè tussientibus prodest, tamè, ut dixi, qui remediandus est ieiunus accipiat. Betæ radix pipere adiecto conteritur, & ex eo ad piperis magnitudinem catapota fiunt, inde bina ieiuno data deuorantur, donec tussis uirium consenescat. Fabæ solide granum infusum in aqua, adeoque inflatum, ut plus humoris nequeat haurire, subito deuoratum, tussim mirè tollit.

Lotium humanum uetus adiecto croco, ut odor eius occulatur, exhaustum, ueteres tussis, & eos qui crassa pituita uexantur, emendat. Si cui salua resiliens tussim mouerit, aliquis ei in frontem sufflet, statim definit. Ex ouo duro interius quod est, passo intritum, adiectis aquæ calidæ cyathis duobus, si antequam cubitum

Ad tussim nimiam, & ueterem, remedium sic. marrubij fici P. III. in ollam nouam fistilem mittes, & aquæ fontanæ & XVIII. & decoques ad tertias, deinde ipsam aquam colabis, & in rudem ollam alteram mittes, atque addes illic mellis optimi & I. piperis triti semunciam, & iterum ad tertias decoques, ut spissum fiat, deinde diligenter in uase uitreo repones, atque ex eo ieiunus terna colearia quotidie fumes. eque prodest marrubij uiridis succus cum mellis despumati pari mensura decoctus, & colear pleno mane sumptus & uesperè. Herba argemonia contrita, & ex uino uetere diluta, potui data, uicè tussientibus prodest, tamè, ut dixi, qui remediandus est ieiunus accipiat. Betæ radix pipere adiecto conteritur, & ex eo ad piperis magnitudinem catapota fiunt, inde bina ieiuno data deuorantur, donec tussis uirium consenescat. Fabæ solide granum infusum in aqua, adeoque inflatum, ut plus humoris nequeat haurire, subito deuoratum, tussim mirè tollit.

Lotium humanum uetus adiecto croco, ut odor eius occulatur, exhaustum, ueteres tussis, & eos qui crassa pituita uexantur, emendat. Si cui salua resiliens tussim mouerit, aliquis ei in frontem sufflet, statim definit. Ex ouo duro interius quod est, passo intritum, adiectis aquæ calidæ cyathis duobus, si antequam cubitum

Ad tussim nimiam, & ueterem, remedium sic. marrubij fici P. III. in ollam nouam fistilem mittes, & aquæ fontanæ & XVIII. & decoques ad tertias, deinde ipsam aquam colabis, & in rudem ollam alteram mittes, atque addes illic mellis optimi & I. piperis triti semunciam, & iterum ad tertias decoques, ut spissum fiat, deinde diligenter in uase uitreo repones, atque ex eo ieiunus terna colearia quotidie fumes. eque prodest marrubij uiridis succus cum mellis despumati pari mensura decoctus, & colear pleno mane sumptus & uesperè. Herba argemonia contrita, & ex uino uetere diluta, potui data, uicè tussientibus prodest, tamè, ut dixi, qui remediandus est ieiunus accipiat. Betæ radix pipere adiecto conteritur, & ex eo ad piperis magnitudinem catapota fiunt, inde bina ieiuno data deuorantur, donec tussis uirium consenescat. Fabæ solide granum infusum in aqua, adeoque inflatum, ut plus humoris nequeat haurire, subito deuoratum, tussim mirè tollit.

Lotium humanum uetus adiecto croco, ut odor eius occulatur, exhaustum, ueteres tussis, & eos qui crassa pituita uexantur, emendat. Si cui salua resiliens tussim mouerit, aliquis ei in frontem sufflet, statim definit. Ex ouo duro interius quod est, passo intritum, adiectis aquæ calidæ cyathis duobus, si antequam cubitum

cubitus eas biberis, quietiorem a' tussi maiorem partem noctis habebis, & eius potionis assiduitate sanabere. Faba fresa tu sumentibus in qua allium coctum fuerit, maxime prodest, uel ex melle in cibo sumpta, efficaciter remedium praestat. sed & purulentas excreationes cohibet & sanat.

Ficus sicca tres cum hyssopi modico, & paruo rutae fasciculo, & quartario foenograeci purgati, cum aqua nitida sextario propensa in olla rudi ad medias decoquuntur, & colantur, inde tres potiones per triduum tussi nimia laborantibus dantur, mirum remedium est.

Seuim ouium decoctum, & cum uino austero depotum, tussi medetur.

Sandaracha quoque cum resina terebinthina ex ovo forbiti sumpta, tussim remediatur. Verronica pollinis drach. II. in passi cretici cyathis duobus permixta aqua calida, utiliter aduersum tussim bibuntur.

Palmare remedium ad tussim sic. foeniculi fici triti IIX . anethi similiter IIX . opij hispani II . hanc iuncta ex melle optimo temperabis, & ex eo nucis auellanae magnitudine cum aqua calida mane ieiuno, uel etiam digesto ad uesperam dabis.

Valde bonum & utile ad tussim qualem libet, hoc remedium est; apij seminis IIII . hyosciami II . anethi IIII . opij II . mellis quod ad colligendas, & glutinandas species supra dictas sufficiat, cum in puluerem fuerint redactae.

Tussi & cruditati medetur hoc medicamen. costi — III . cinnami — II . piperis V . item piperis longi V . opij II . croci — I . mellis quod satis ad hanc trita temperanda, & catapotia facienda, quae cum calida aqua & mane, & sero, sed interiectis uicibus dari oportet, quod similiter, & de supra scripto medicamine fieri debet.

Aquam in qua rutam, & hyssopum, & rosam siccam, decoxeris, uino immisce, & ita bibendam ieiuno offer tussienti, cito subuenies.

In ouum sorbile mastiche puluerem mittes; sed opus est, ut mox coagitatum statim sorbeas, ne dilatione fiat crassa; quo exhausto, facile tussim sedabis, si id saepius feceris.

Fabae grana quinquaginta tosta in furno, piperis totidem stundes & cribrabis, & pulegij tantundem mensuram, quantum fabae est, in puluerem rediges, ac simul melle consparges, & coques in olla rudi atque agitabis, ne comburatur. postea de tepescato medicamine per septem dies singula coctlearia, siue mane, siue sero, tussi laborantibus dabis, cito subuenies.

Herba centaurea trita ex uino dulci bibitur, mire prodest etiam ijs qui sanguinolentum, aut purulentum extrussunt, quos phthysicos dicunt.

Vuam passam enudeabis ad ponderis librae sextantem, & diligenter teres; adicies sinapis optimae separatim triti librae sextantem, ac deinde adiecto aceto scillite, cum mellis modico teres, & miscebis, ita ut eam spissitudinem habeat, ut pastilluli fieri possint, non tamen grandes, inde qui phthysi & diutina tussi laborat, singulos cum calida aqua ieiunus mane, & similiter dormitum uadens ad uesperam sumat.

Cerui pulmones cum suis gurgulionibus, uirgulitentos in fumo, donec arescant, suspende, & ex ijs aliquid coctum tritumque diligenter adiecto melle, edignatis modo phthysico dato, quem sanari citissime uoles.

Lacerta uiridis uia immissa in uas fictile nouum, & cum uini I decocta ad cyathum unum, incredibiliter phthysico prodest, si ex uino eo mane ieiunus bibat coctleari unum.

Qui phthysi laborabit, laet tritum in aqua tepida ieiunus quotidie bibat, potenter remediabitur.

Cancros marinos impari numero tritas adiecto melle atque adipe asnerina remissa, & quis ponderibus, uniuersa permixta, unum corpus facies, atque equaliter in duodecim partes diuides, & in cibo, aut in potione laboranti phthysico dabis, mire proderit.

Oua incocta duo in calice diffundes, & deijce olei optimi II . & axungiae uetustissimae in trulla ad calidam remissa II . & coagitato, ac permixtum phthysico tepidum quotidie da bibendum, donec sanetur, ualde proderit.

Qui phthysi adficiuntur, maritima loca uitare debent, atque illic maxime, ubi pix conficitur, commorari, ibique coctlearum carne cum uino excoctarum assidue uesci.

Picem praecoquam, siue quam uiscosam uocant, & rubricam scythicam, quam alij pissasphaltum uocant, cum seui ceruini remissa cyatho uno, & lactis bubuli, uel ouilli pari mensura, si quis iam periclitanti phthysico in potu, uel in cibo quotidie dederit, mire ei subueniet.

Musculis deglutitis, & cum oleo, ac sale assatus, pleumonitis, uel empyicis cibo datus, mire succurrit; eos quoque qui purulenta excreant celerrime sanat.

Marrubij uiridis fasciculum, & ambrosiae fasciculum, & abrotani fasciculum, mitte in ollam semodiam nouam, & uini I decoque ad sextarium, tum exprime herbas, & cola, & adijce in ollam mellis optimi sextarium, & postea decoque ad crassitudinem mellis; ex eo uteris ieiunus quotidie plena ligula ad sanguinis reiectionem sedandam, & ad stomachum confirmandum.

Butyrum nitidum, & tantundem mellis optimi despumati coquito, donec color rufus sit, & in pyxide cornea reconde, atque inde mane ieiuno singula coctlearia dato, qui pulmonis exulcerati uitio foetidum olet, uel purulentum, & foetidum excreat.

Axungiae suillae uetustae unciae tres, ex uini uetustissimi cotyla una decoctae, potui phthysicis datur, potenter remediatur.

Anethi fici ueteris puluerem, & resinae pityinae puluerem, cum adipe uetere asnerino, aut gallinaceo, edendum mane ieiuno empyico coctlearia tria, & uespere tantundem dabis, mire subuenies.

Ad eos, qui sanguinem excreant, remedium efficax sic. turis masculi diligenter triti, drach. II. ammoniaci unam, cum aceti hemina simul co-temperabis, ita ut bibi possit, & laboranti ieiuno hzmoptoico dabis.

Si quis purulentum tussit, ouum crudum cum pari mensura succi de porro sectiuo expressi, tantundemque optimi mellis permixtum, calefactum ieiunus sorbeat.

Ad excreationem cruentam remedium sic. coctae elixatae tenuntur, & ex aqua calida a' ieiuno bibuntur; nec non ad idem coctae inloae ex aqua marina coquuntur, & deuorantur.

Phthysicis & empyicis prodest aqua, in qua cydonaea mala cocta fuerint, assidue propinata. ipsa etiam si incocta maducentur, iuuent.

Spongiae africanae exustae cinis cum succo porri sectiuo haustus, empyicos sanat.

Rafani cocti cibo sumpti, sanguinolentas excreationes celeriter emendant.

Gummi optimum in ore solutum, & deglutitum, summo empyicis remedio est.

Ruborum in quibus mora nascun-

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

Ad hanc aquam calidam, si quis ieiunus bibat, mire prodest.

tur cauliculi teneri tunduntur, ex ijs succus exprimitur, qui in sole ad crassitudinem mellis spissatur agnatus; hic haustus sanguinolentam excretionem efficacissime cludit. eorundem ruborum cauliculi teneri ex uino austero discocti, eduntur. idque uinum etiam merum potatum, sanguinolenta excreantibus prodest. Coagulum ceruinum, siue leporinum, siue hedinum, in potione solutum bibitur utiliter ab empyicis, uel hæmoptoicis. ceruini quoque cornus exusti cinis in potione datus, similiter medetur.

guis, uel hædinus sanguis recens cum pari mensura aceti discoctus, sanguinem excreantibus prodest, si per coctile adfidue degusterur. Glutinum quo charta glutinatur, calidum, in modum sorbitionis hauritur, uel ex aqua calida sanguinem excreantibus datur. Nuclei amygdalarum, triticum, amydon, & men-

sa, trita in qualibet potione utiliter ab hæmoptoicis, uel empyicis hauriuntur. Semen salicis tritum, & ex uino austero sumptum, sanguinem rursus sinit, & uitium potenter emendat. Hederæ bac-

ca, quæ sunt luteæ, impari numero trita, & ex aqua tepida pota, phthificos sanant. Herba uettonica, folia in umbra arefacta, & tinsa cribrataque reponito, atque inde laboranti uulso, uictoriati argentei pondus ex passo bibendum sæpe præbeto. quidam quo potentius herba huius auxilium facerent, adiecto melle, cribratum puluerem comprehenderunt, atque inde sabæ magnitudine dederunt laborantibus, phthi-

ficis, uulsi, & reumaticis, eosque qui etiã purulenta excreabant, incolumitati solidæ reddiderunt. Ad phthificos remedium, & præsens, & maximum, nam etiã uita dubios sanat, & quibus spes superesse nulla uideatur, sequi saluam, uel spumam cum aqua calida bibendam per triduum dabis, etiam quem tussi intoleranda, & diutina laborare uideris; hoc remedio liberabis, ægrum quidem sine cunctatione sanabis, sed equum

mors subita consequitur. Oua cruda duo in calicem uerguntur, eò adijciuntur olei optimi — V. ga- ri floris — V. passii cretici — V. cumque hæc in calicem conieceris, axungia uetustissima — V. in uase, igne dissolues, eundemque liquorem calidum cæteris rebus adijcies, omniaque pariter super aquam feruentem remittes, & calida phthificis bibenda præbebis. Herba senecionis uiridis contusa, & ex-

pressa succus ad mensuram cyathi unius per dies singulos potui datus, phthificis miro remedio est, si inter rectis diebus, uel septies propinetur. Ruta tenera contrita cum ramusculis suis, & expressa succus, cum aliquantulo bitumine, ex uino uetere calido, phthificis celeriter, similiter, & empyicis in potu medetur. Antidotum phthificis incomparabile, sic. piperis albi 3 III. myrtæ 3 I. opopanax 3 I. turis

masculi 3 I. opij 3 I. croci fuculi 3 I. zingiberis 3 II. laseris 3 I. rutæ sicce 3 II. abrotani 3 II. narcissi 3 II. uettonicæ 3 II. marrubij 3 II. pulegij 3 III. mellis despumati optimi 3 I. uini aminci quartarium, papaueris triti 3 I. ex quocunque liquore hoc phthificis propinatum, ualde prodesse memoratur, ita ut de contritis diligenter mixtisque speciebus, cataportia fiant magnitudine sabæ, quæ aut integra haurienda, aut liquefacta dentur, & mane & uespera. Trochiscus dielectus præstantissimus, ad hæmo-

ptoicos, id est sanguinem, uel excreantes, uel uomentes, uel eos qui maxime cum tussi sanguinem iactant, huius confectio sic. croci 3 X V. succini 3 X V. massiches chire 3 X V. iris illyricæ 3 X V. opij 3 II. S. psyllij, quod est semen nigrum, minutum, pulicibus simile — II. S. hoc semen coques in hemina

aquæ, donec densa fiat, quemadmodum de lini semine, quam colabis postea, & reliqua omnia trita ex hac aqua colliges, & formabis trochiscos habentes maximos 3 III. S. alios 3 III. S. minimos usque ad 3 I. S. Ita ergo facies ut pro ætate unusquisque, & pro corporis firmitate accipere possit. Ad eos

qui sanguisugæ inscui deuorant, cimicum in carbonibus positorum fumus remedio est, si ore hianti, & cibibus apertis excipiat; eijci enim, & expelli deuoratas sanguisugas hac ratione, certissimum est. In eo aceto, in quo prius ferrum feruens sit extinctum, butyrum missum, & calefactum paulatim, si absorbe-

tur, eijciat de stomacho sanguisugas. Ad stridorem pectoris deponendum, sinapis optimi triti cyathos duos, & mellis optimi despumati cyathum miscebis, & ieiunus die calido, aut in loco tepido gargarizabis, & siues patenti ore humorem decurrere. Ne media doleant, luna septima decima semper alij incocti

terna grana purgata transgluti, mire proderit. Corallium tritum ex aqua potui datum, reiectionem sanguinis reprimat. cui rei, & castaneæ medentur, si coctæ quam plurimæ manducentur. Ad tussim, Vindiciani medici remedium, singulare. sulphur uiuum teres, & inuolues de axungia porci uetustissima, &

& dabis ut transglutiat tres pilulas prima die, secunda duas, tertia unā. tales autem pilulæ erunt, ut facile transuolari possint; hoc remedium etiam equis tussientibus prodest. Ad tussim remedium efficax, herba quæ gallicè calliomarcus, latine equi ungula uocatur, collecta luna uetere liduna die iouis, siccata pri-

us, in ollam nouam mittitur cum prunis ardentibus, quæ intra ollam mitti debent; superficies sanæ eius argilla diligenter claudi debet, & calamus inferi, per quem humor, uel fumus caloris hauriatur intra os, donec

arteriam omnem, & stomachum penetret. Compositio ad tussim. mellis despumati P. I. anethi seminis — III. piperis — I. hæc diligentissime trita miscentur melli, ut cum usus exegerit, bis in die terna coctilearia qui tussi laborabit accipiat. Compositio edigmatij ad pulmonem corruptum reparan-

dum. marrubij fasciculum unum, hyssopi fasciculum I. glycyrrizæ — III. iris illyricæ — III. inulæ — I. I. nuces pineas resinofas V. aquæ 8 / V I. mellis P. V. omnia hæc in aquam nitidam infundes, ita ut ad tertiās coquantur, hoc est, ut simul uniuerfa ad trisextium ueniant, posteaquàm addideris supra scriptū mellis pondus, ut ad mellis ueniant densitatem, de quibus colatis, & in uitro cōditis, terna mane coctilearia, qui supra dicta ualetudine laborabit, accipiet. Descriptio edigmatij ad pulmonem cor-

ruptum. herba gladiatoritiæ succus, lilij siluatici succus, marrubij succus, equis mensuris parabitur. deinde quantum de tribus speciebus fuerit succi, tantum mellis mittetur, ita ut postea in sextarium huius per-

mijctionis tria coctilearia olei uiridis mittantur, quod tandiu postea coquetur, quādiu medicamen- suram

11

[illegible]

Ad Insipitum, Symp.

[illegible]

clarea duo cum duobus cyathis aceti calidi. Aliud medicamentum strumis, & fuspisio efficax, facit autem, & ad lumborum diuturnum dolorem, & ad paralyfin, & ad hydropicos, & ad lienofos, conficitur fic. broniz, id est albæ uitis radices, * XII. iris illyricæ * XII. ammoniaci guttæ * XII. asparagi radicis * VI. scillæ bulbi crudi tenerum ex interiore parte * XII. tragacanthi * VI. ijs mellis miscetur quod sufficiat, sed prius contusis diligenter, & tritis, donec ceroti habeant temperaturam. inde cum opus est datur ieiuno * I. cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

ganum cum croco tritum, potatumque cum uino, suspiriosis prodest. Hyssopum quoque aridum co-
tusum, & cretum, ex aqua, aut uino, aut aceto, aut melle datum, aut decoctum cum aliquo supra dictorum
liquorum, suspiriosis medetur. Marrubium aridum tritum cum mellis coëulario sumptum, uel succus
eius potus, æquè suspiriosis remedio erit. Chamedrys extenuata trita, & pota, prodest.

niatica confusa, & ex melle cocleario sumpta, fufpiriosos curat. rutæ quoque atque herbæ blattariæ succus per fe datus, aut radices earum incoctæ aqua, & potui datæ, fimiliter profunt. nec non, & capparis radices idem præftant, fi ut fuprà scriptum eft, accipiantur. Refina terebinthina deuoratur ad magnitudi-

humidis locis nascitur, unius fruticis folia trita cum cyatho aquæ data, suspiriosis plurimum profunt. uino
ubi oportet suspiriosos in quo centaureæ, absinthij, origani, & tragorigani, & hylopi, & thymi, & pulegij,
& hujus fasciculi retrahi fuerint decocti. Cupressi pilule trite notæ ex uino faciantur.

ad suspirium, sed & ad iocineris, & pectoris, & vulvę dolorem, si forminis dentur, folia autem eiusdem cum ruta trita, & pota, pectoris tollunt dolorem. similiter cortex, & radix cupressi decocta ad eadem profunt; sed faciunt, & ad phalangiorum morsum, si extrinsecus imponantur emplastri more composita. Acetum ex folijs bulbi fructu misceatur.

Acetum ex scilla bulbo factum, mirifice prodest suspiriosis; similiter acetum ex thymo, origano, pulegioque confectum prodest, si addidue degustetur. utiles sunt inter initia quamvis molesta, suspiriosis sorbitiones de porro capitato facite, & ex urtica atque nasturtij semine. perungi autem eos oportet rebus calefacientibus certe pyretro cum oleo decocto. gestationes quoque pervigilantibus.

letum suspendatur illis myrtus remedio erit. + Ad suspiriosos remedium salutare; spumâ de ore mule collige, & in calicem mitte, atque ex aqua calida, siue uiro, seu foemine, quæ hanc molestiam patitur, continuò da bibendam, homo statim sanabitur, sed mula morietur. Ad suspiriosos sanandos fel urinum aqua diluere bibi.

aqua dilutum, bibendum optime datur, intra paucos enim dies potenter medetur. Ad ſuſpirioſos re-

Lebington Comp.

mirum. ? Galatio per myrtifera
ff. an.

Herba salutaris.

Ad sanguis eruptionem.

Symphiti radice, ad me acetum
polygami succus, plantaginis, acaciae
cretae, saminis, hypocythidis, balau-
stij, tragacanthae, cretae, saminis, a-
rabici, q. d. symphi, gummi, resinae, albae
mirtis, amygdali, cretae, passulae
siccis, succis, gummi, resinae, uiridis
me, resinae, passulae.

Symphiti radice, ad me acetum
polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

polygami, d. herba, f. d.

medium potens. herbae salutaris fasciculum, & ficorum africanorum aridorum selibram, ex aquae fluitantis heminis tribus decoquito ad heminam, eamque potui dato per triduum.

Ad sanguinis eruptionem siue ex arteria, siue ex pulmone, uel pectore, benefacit symphyti radix, quam quidam inulam rusticam, quidam alium gallicum uocant, lota hac aqua frigida, & rasa cultello churneo, uel osleo: datur sextans librae ex aqua, aut eo amplius, uel quantum potuerit debet manducare, & deuorare, cui opus est; neque enim amara est.

oportet autem eo die acetum non gustet, quod interdum per se solum magnifice solet prodesse. sed huius radice effectum resoluit, si cum ea datur. Benefacit ad arteriae eruptionem, polygami succus cyathorum duum, aut trium per triduum datus. & plantaginis tritz eodem modo datus succus, plurimum prodest. cretae quoque samiae denarius unus, sumptus ex aquae frigidae, rigore detracto, cyathis tribus, ualidissime iuuat. herbae etiam polygami, quae, ut opinor, tinaria uocatur, fasciculus, quantus manu comprehendi possit, in tribus heminis aquae decoctus ad tertias, recte medetur eruptioni sanguinis ex arterijs, si quis inde laboranti cyathos tres ieiuno per triduum dederit. oportet autem sentienti uulnus interius, loco ipso sed a foris spongiam cum aqua frigida recenti imponere, uel ex aceto acris, sed frequenter mutare, ne concalescit noceat; & uetate artus constringi, quod plerique medicorum faciunt, ignorantes quia incitatur sanguinis eruptio musculorum compressione. quandoquidem omnis constrictio in utranque partem exprimit uenam.

Faciunt, & composita medicamenta ad sanguinis eruptionem, quorum hoc est praecipuum: acaciae succi uncia, hypocythidos, qui est succus rosae siluaticae, quam caninam quidam uocant, uncia. Balau-
stij, qui est flos mali granati, quo coriarij utuntur, uncia, opij semuncia. Balau-
stij contunditur, & cribatur, uel succu in mortario teritur; cetera pridie macerata in aqua comiscuntur diligenter, & pastilli inde finguntur quidam maiores, quidam ad denarij semissem, dantur resoluti iuxta aetatem, uel uirtutem infirmi ex aqua frigida cyathis tribus, aut duobus. hic pastillus benefacit, & ad dysentericos, & ad torminosos. Alter pastillus ad sanguinis eruptionem mirifice faciens, accipit haec: tragacanthi * IX. samiae cretae * VII. rutae ponticae * IX. glycyrrizae succi * V. symphyti succi * VII. gummi * IIII. hypocythidos succi * VII. furis * V. aluminis liquidi * V. opij * V. amyli * VI. myrrae * V. croci * VII. plantaginis succi * III. & passimyonij quod satis erit; tritis diligenter supra scriptis speciebus miscebitur. fient pastilli ad denarios singulos, & ad semisses, qui pro aetate, aut uiribus infirmi ex aqua tepida cyathis tribus ieiuno dabuntur.

Ad reiectionem sanguinis ex ore manantis symphyti radix in uino decocta salubriter bibitur. ligustri quoque succum ieiuno per triduum dato, statim subuenies: quae res, & torminosis, & dysentericis est salubris.

Si ex quocunque corporis loco sanguis per abundantiam nimiam exuberet, & fluat, herbae fabinae succus quantus uidebitur, siue uiridis, siue sicca contrita, ex uino picato uetere optimo, ieiuno per triduum dabitur; sanabit haec potio etiam in uita discrimine constitutum. facit autem, & ad colicos, & ad dysentericos, quibus tamen decocta datur.

Qui subito sanguinis uomitu laborat, corallium contusum, & in puluerem redactum, ex potionis mixta calida bibat.

Ad uomitum nimium reprimendum sulphuris uiui pusillum, & ramenti de cornu cerui tantundem, in ouo forbili tritum, & permixtum bibi utile est.

His qui cibum non continent, aloes minimum cum frigida aqua potui datum, plurimum prodest.

Personaceae herbae radix confusa, adiecto modico sale, & uino sparsa, & quotidie recens imposita super tumorem stomachi, uomicas omnes per sudorem emanatio-
nesque occultas potenter expurgat.

Mandragorae drach. hyoscyami tantundem, opoponacis idem, croci siculi tantundem, myrrae atque furis similiter, gummi itidem; omnium specierum pares mensuras tere diligenter, & in puluerem tenuissimum redige, atque ex uino uetere collige, paulo crassius quam spissitudo sit mellis; ex eo medicamento ad mensuram uictoriat, id est dimidium drach. dabis ruptum, & infirmum stomachum habenti in tribus cyathis aquae calidae eunti dormitum; beneficium remedij prima statim portione sentitur, secunda incredibilis profectus est, tertia curatio omnis potentissime explicatur.

Quum incoctum in calicem defunditur, & testa eius succo marrubij impletur, & in ipsam calicem defunditur, & mellis optimi despumati tantundem; omnia haec in se permiscuntur, ac tepesfacta hauriuntur, miro modo uomicas rumpunt, & ad sanitatem laborantem stomachum perducunt.

In ouo forbili cimicem unum contritum ieiunus ignorans qui sorbeat, desinet uomere, hoc saepe expertum est.

Compositio medicaminis ad arteriam sanandam sic. costi * III. spicernardi * III. piperis * III. radice lappae maioris, id est herbae personaceae * III. haec omnia simul teres, & ieiuno in balneo ex uino candido bibenda protinus dabis.

Herbae uettonicae folia arefacta confusa cribrataque profunt suspiriosis, si ex eo puluere coctlearia singula ex aquae calidae cyathis duobus ieiuni interiectis diebus, donec sanentur, biberint.

Aqua quae in arborum lacunis catissque corticibus consistere consuevit, suspirioso potui data, celeriter eum sanabit, atque omni periculo liberabit, si adsidue, uel ipsa pura calida, uel mixta potetur.

Situm quamlibet molestam reprimes, si aquam tepidam cum oleo permixtam biberis, & continuo uomueris, denuoque si necesse fuerit, id facies, quo sitis maxima consenscit.

Gallinacei oui uitellum semicoctum, oleoque permixtum si quis sorbeat, sitire desinet.

Lapidem de aqua fontana sublatum statim sub lingua posito, & illic aliquandiu tene, sitire desines.

Glycyrrizae surculum paruum sub lingua habeto, & saluam quae creuerit, transglutito; quo facto, neque sities, neque os tibi inarescet.

Ad singultus inhibendos, se-
stucam quam bibens in calice acceperis, protinus supercilio sinistro imposito, continuo remedium experieris.

In aquam calidam manus missa, diuque illic retente, singultus crebriores inhibere dicuntur.

Annulus in sinistra manu in medio digito positus, uel ibidem translatus, singultus statim compescit.

Si quis singultiens, aceti scillitici coctlearium plenum acceperit, statim singultus definit; idem praestat, & aquae

fatis

Mira, si occa
Ad iugales miteret.
Siqua d' calice apertis fons
impofita.
Mors non p' i caldam.
Et non l'as ne m' odio d' iro m'as,
L' f' m' f' r' e.
L' cag' / c' illitij coel' l' r' e.
Al' fidus ap' f' r' e. g' g' e.
S' p' i' r' i' t' u' r' e.
S' t' r' o' n' f' a' m' e' n' t' u'.

Ad vapores, rursus, & ex
Tingens, uetus, in. radice
brahica, ueni nigra, aut ruri
stigmata p'stincta, angustis
focis uenis.

Exiguation ad phyl.
 Jns, tunc. est. h. p.
 am, tunc. est. h. p.
 tunc, h. p. mel.

1. Судья
 2. Судья
 3. Судья
 4. Судья
 5. Судья
 6. Судья
 7. Судья
 8. Судья
 9. Судья
 10. Судья
 11. Судья
 12. Судья
 13. Судья
 14. Судья
 15. Судья
 16. Судья
 17. Судья
 18. Судья
 19. Судья
 20. Судья
 21. Судья
 22. Судья
 23. Судья
 24. Судья
 25. Судья
 26. Судья
 27. Судья
 28. Судья
 29. Судья
 30. Судья
 31. Судья
 32. Судья
 33. Судья
 34. Судья
 35. Судья
 36. Судья
 37. Судья
 38. Судья
 39. Судья
 40. Судья
 41. Судья
 42. Судья
 43. Судья
 44. Судья
 45. Судья
 46. Судья
 47. Судья
 48. Судья
 49. Судья
 50. Судья
 51. Судья
 52. Судья
 53. Судья
 54. Судья
 55. Судья
 56. Судья
 57. Судья
 58. Судья
 59. Судья
 60. Судья
 61. Судья
 62. Судья
 63. Судья
 64. Судья
 65. Судья
 66. Судья
 67. Судья
 68. Судья
 69. Судья
 70. Судья
 71. Судья
 72. Судья
 73. Судья
 74. Судья
 75. Судья
 76. Судья
 77. Судья
 78. Судья
 79. Судья
 80. Судья
 81. Судья
 82. Судья
 83. Судья
 84. Судья
 85. Судья
 86. Судья
 87. Судья
 88. Судья
 89. Судья
 90. Судья
 91. Судья
 92. Судья
 93. Судья
 94. Судья
 95. Судья
 96. Судья
 97. Судья
 98. Судья
 99. Судья
 100. Судья

Ad. clare humerum, nec
certum, certum.

[illegible]

oleum gummi vi.
 spississimum, dactylis carminis
 inf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. +
 R. oleum gummi vi.
inf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

S
a,
;
S
i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

Sandy sp.

caulonia porphyrocarpa
de rindia.

afalla fuentey. *ff*
Galea bo

Cap. XVIII.

[illegible]

dufo tetro odore, præstabis. Caro uitulina recens cum aceto cocta, madidaque alis imposita, foetore hirci terribilissimum tollit. Myrra sicca tunsa adfidue alas confrica, uirium foetoris mire emendabis. Nitro ex aqua diluto, uel alumine uino remisso utere quàm sæpius ad alarum fortentium emendationem. Ad paronychiam, & suppurationes unguiculorum glandem tritam cum sapone adpone; ibiscum quoque cum axungia, & pane trito impone. Vt exulsi ungues citò resurgant, quinquefolium cum adipe qualibet tritum imponitur; oleastri quoque folia commanducata recentibus unguum uulneribus rectè imponuntur. Paronychiz, stercus ex auriculis impone, & linteolum super alliga, mirabere remedium. Ad idem, uiam passam euuleatam cum ture trito subactam, sicut cerotum linteolo indutam imponi oportet. De paronychia parietem continges, & rursus digitum ducens dices ter, pu pu pu, nunquam ego te uideam per parietem reperi. Ad digitorum, & articulorum subluuium, uel suppurationem sedandam, atramentum scriptorum ex aceto tempera, & de pinnula inline digitum, uel articulum dolentem; lucernæ quoque fungum contere, & impone paronychiz, uel digito contuso. Ad cubiti uitiu, uel dolorem, spuma argenti trita cum oleo rosaceo, emplastri modo utiliter admouetur.

Ad lichenem, siue mentagram, uel impetiginem, & ad elephantiasin, & lepram, & exanthemata, & maculas, & liuores, tumoresq; de facie abolendos, & ad genas scabras, & cicatrices malarum purgandas, & ad lentiginis, & stigmata delenda, uerrucasq; tollendas, remedia rationabilia, & physica diuersa de experimentis. Cap. CLXIX.

Ad lichenem siue mentagram, quod uitium neglectum, solet per totam faciem, & per totum corpus serpere, & plures homines inquinare. nam Soranus medicus quondam ducentis hominibus hoc morbo laborantibus curandis in Aquitania se locauit. huic ergo ualitudini maxime medentur cantharides tritz, & inlitz cum succo uiræ amineæ, & cum seuo ouis, uel capræ, sed prius facie lora, & nitro diligenter curata medicamen imponitur.

Adeps uituli marini imposita mentagræ plurimum prodest. Ficulni caules teneri in aceto excocti, & triti, & inliti, mentagræ medentur. Idem præstat ibisci radix cum lupino, & aceto ad tertias cocta, & adposita. Flos uisci cum calce subactus, & adpositus mentagræ, ualde est utilis. Ad impetiginis detergendas farinam æri mixtam, cum aceto frequenter inducito. Olei myrtini uncias VI. olei chinini, aut mastichini uncias quatuor, lithargyri uncias III. psimythij uncias duas, cum uino uetere simul teres, & oleum statim postea mites, & diligenter permiscebis, & sic uteris ad impetiginis abolendas.

Ad impetiginis detergendas lapathi radices cum aceto coques ad tertias, & in eo iure iterum oryzam discoques, & sic ad perducendum corpus uteris. Cucumeris siluatici radices ad tertias discoques, easque decoctas teres diligenter, & addes lithargyrum, ac sulphur æquali mensura, & ceræ parum, atque inde locum quæ impetigo ceperit, perfricabis. Ad scabidam impetiginem, scillam albam sumito, & bene contundito, eaque impetiginem inlinito, & adficcatam aceto acri mixto sale eluito, deinde spuma argenti contusa, & rosa liquida perungito. & cum adficcatum fuerit medicamentum, rursus ut supra diximus, aceto salso abluito, atque iterum eadem ratione scillam tritam inlinito; idque remedium frequenter iterato, donec ad sanitatem perducas.

Picis liquidæ optimæ acetabulo uni, adijce farinam ordeaceam, & nitrum, & apium tritum, & sulphur æquis ponderibus, ac superfunde acetæ albi acerrimi acetabula duo, & in patina decoque simul; ac postea calidum medicamen linteo inducito, & sic corpori adponito, non solum impetiginem hoc remedio, sed & lepram sedabis, & scabiem. Impetiginem quamuis inueteratam citò abolebis, si sæcula uini qua tinctores utuntur, cum aqua permixta locum perunxeris, ita ut dum quinquaginta numeras illic esse permittas, & cōtinuò desstringas. nam si diutius fuerit, altius uis eius infidet, & ulcus grande faciet.

Glutinum taurinum aceto remissum, adiecto sulfure uiuo leni igne decoctum, ita ut ad mellis crassitudinem perducatur, fursuloque ficulno dum coquitur agitatum, ac bis per diem impositum impetiginis quas græci agrias uocant, potentissime sanat. Formiculas, quæ herculaneæ nominantur, contritas, modico sale adiecto, impetigini adpone, miraberis remediū, nam celeriter expurgant. Impetiginis, & lepras hæc compositio potentissime extirpat, turis masculi, nitri, argenti spumæ, sulphuris, equa pondera, cum aceto acri teruntur, & pinnula imponuntur, siccatumque medicamen eluitur, & rursus inlinitur, adfidue elutum atque siccatum.

Si locum, quem impetigo adludit, aut circumscribas, postea eum omnino non adpetet. Loco, quem mentagra obsederit, finum murinum tritum ex aceto oportet imponi, uel eiusdem muris exulsi cinerem cum oleo adponi salubre est. Aduersum elephantiasin, quod malum plerumque a facie auspicator, primumque oritur quasi lenticulis uarijs, & inæqualibus, cute alba alibi crassa, alibi tenui, plerisque locis dura, & quasi scabida, & ad postremum sic increfcit, ut ossibus caro adstricta, tumescensque primum digitis, atque articulis indurefcit. hic morbus peculiariter ægyptiorum populis notus est, nec solum in uulgis extremum, sed etiam in reges ipsos frequenter inrephit. unde aduersus hoc malum folia ipsis in balneo repleta humano sanguine parabantur. mustelæ igitur exulsi cinis, & eiusdem belluæ id est elephantis sanguis immixtus, & inlitis huiusmodi corporibus medetur.

Nitrum cōtritum, & ex melle, & lacte bubulo impositum, elephantiosis prodest. Radix asparagi decocta in aceto, & trita, elephantiosis rationabiliter imponitur. Mentastri folia commanducata, uel contrita adposita, elephantiosis medentur; cedro quoque tabes illa adfidue peruncta sanatur. Fel ursinum

Ad lichenem siue mentagram, quod uitium neglectum, solet per totam faciem, & per totum corpus serpere, & plures homines inquinare. nam Soranus medicus quondam ducentis hominibus hoc morbo laborantibus curandis in Aquitania se locauit. huic ergo ualitudini maxime medentur cantharides tritz, & inlitz cum succo uiræ amineæ, & cum seuo ouis, uel capræ, sed prius facie lora, & nitro diligenter curata medicamen imponitur.

Adeps uituli marini imposita mentagræ plurimum prodest. Ficulni caules teneri in aceto excocti, & triti, & inliti, mentagræ medentur. Idem præstat ibisci radix cum lupino, & aceto ad tertias cocta, & adposita. Flos uisci cum calce subactus, & adpositus mentagræ, ualde est utilis. Ad impetiginis detergendas farinam æri mixtam, cum aceto frequenter inducito. Olei myrtini uncias VI. olei chinini, aut mastichini uncias quatuor, lithargyri uncias III. psimythij uncias duas, cum uino uetere simul teres, & oleum statim postea mites, & diligenter permiscebis, & sic uteris ad impetiginis abolendas.

Ad impetiginis detergendas lapathi radices cum aceto coques ad tertias, & in eo iure iterum oryzam discoques, & sic ad perducendum corpus uteris. Cucumeris siluatici radices ad tertias discoques, easque decoctas teres diligenter, & addes lithargyrum, ac sulphur æquali mensura, & ceræ parum, atque inde locum quæ impetigo ceperit, perfricabis. Ad scabidam impetiginem, scillam albam sumito, & bene contundito, eaque impetiginem inlinito, & adficcatam aceto acri mixto sale eluito, deinde spuma argenti contusa, & rosa liquida perungito. & cum adficcatum fuerit medicamentum, rursus ut supra diximus, aceto salso abluito, atque iterum eadem ratione scillam tritam inlinito; idque remedium frequenter iterato, donec ad sanitatem perducas.

Picis liquidæ optimæ acetabulo uni, adijce farinam ordeaceam, & nitrum, & apium tritum, & sulphur æquis ponderibus, ac superfunde acetæ albi acerrimi acetabula duo, & in patina decoque simul; ac postea calidum medicamen linteo inducito, & sic corpori adponito, non solum impetiginem hoc remedio, sed & lepram sedabis, & scabiem. Impetiginem quamuis inueteratam citò abolebis, si sæcula uini qua tinctores utuntur, cum aqua permixta locum perunxeris, ita ut dum quinquaginta numeras illic esse permittas, & cōtinuò desstringas. nam si diutius fuerit, altius uis eius infidet, & ulcus grande faciet.

hoc medicamentum ad eos, quorum musculi maxillares cum maximo dolore tenfi sunt, adeo ut aperire os nullo modo possint. tetanon hoc uitium Græci dicunt.

Item facit ad depravatam faciem in utramlibet partem, cynicon spasmon hoc iidem appellant genus morbi; præcipue uero ad pectoris laterisque dolores prodest, ex qualibet causa factos, siue latenti, siue manifesta, aut ex casu aliquo, aut supra vires, & supra modum ponderis portati, uel ex contusione, quæ frequenter gladiatoribus accidere in præfustionibus solet.

Nec minus eorum maxime sanitati conuenit, qui arbore, alta delapsi sunt, uel scalis deuoluti, aut excussimetheda, uel curriculo tracti. Sed ijs, id est ex manifesta causa uexatis, cum aceti cyathis tribus, uel quatuor, danda erit antidotus. ijs uero qui ex occulta causa laborant, ex aqua mulsa proderit data.

Præterea neruorum tensionibus, & contractionibus, atque doloribus omnibus mirifice conuenit. Quamobrem facit, & ad tremulos, & ad sideratione tentatos utralibet; una enim cum contractione, altera cum remissione neruorum conspicitur.

Paralyfim hoc utrunque uitium Græci appellant. ad quod etiam cum correpti sunt, prodest ex aqua mulsa cyathis tribus quatuorue datum, ad pondus denarij, unius, aut uictoriati, admixto castorei denarij semisse, prodest, & ad articulare morbum, quem arthritim Græci appellant, & ad spinæ totius lumborum que dolorem, ex aqua mulsa datum iuxta vires cuiusque.

Item ad podagram benefacit; nam & in præsentia detractione doloris releuat, & in futurum, omni molestia liberat. dimidio enim celerius sanantur, qui acceperunt hoc medicamentum, quam prius solebant sanari. quid dicam, quemadmodum prodest ad duritias mammarum muliebrium, quæ cum dolore magno solent nasci, quasque nullum aliud medicamentum releuat; nam has, & ad præsens admodum curat, & in perpetuum ex toto interdum sanat; quas quidem causas plerique medicorum insanabiles adfirmant. carcinoma enim, & cacoëthes hæc uitia sequuntur. sed ego honestas foeminas quasdam sapissime hoc medicamento adfirmo sanatas. illud uero supra omnium opinionem est, quod stomachicis euidenter conuenit, cum sit uirosissimum amarissimumque medicamentum, & stomachus ne aduersum leuia quidem, & simplicia medicamenta aptus sit.

Sed disposuimus in huiusmodi rebus potentioris usus rationem, qui expertus enim quisque intelliget, stomacho quoque hoc medicamentum eximie prodesse. Remediat enim eos, quibus frequenter inacescit cibus, & eos qui stomachi inflationibus urgentur, uel doloribus uexantur assidue, & uel nauseant, uel nimia salua abundant, uel inedia cōsumuntur, stomachumque ita solum habent, ut ex eo uarios liquores subinde reijciant, consentiente capite, ut nullum genus cibi continere possint.

Item ad bilem atram generantes, quos melancholicos uocant, benefacit. oportet autem non continetibus cibos, secundum uomitum protinus oleo perunctis, & diutius presse fricatis dari medicamentum denarium unum ex aqua cyathis tribus. deinde artus eorum constringere, & interdum olfactarijs reficere, & commanducatione oliuarum contritum, earumque rerum quæ stomachum constringere solent, subere. hos recubantesque alere; deinde ubi deiecerint, solutis uinculis rursum perungere, & fricare totum corpus, atque ita uarietate ciborum, & perunctionis, stomachum proritare, ita ut reficiantur halica ex mulso, aut malorum cydoneorum succo, uel ex granis punicis facto, aut si quos magis delectabit, frigida posca, secundum quæ sumpta, & hapala proderunt oua, & intubi cocti, uel non cocti ex aceto dati.

Itemque lactuce, & caules haplofiles ex posca decocti, aut ungula porcina excocta, & madida: uulua quoque, & murices, & pelorides plurimum iuuant; & pomorum præcipue sorba, & mala orbiculata, & pira scauriana, crustumina, signinaque in olla reposita. item profunt uix ex olla sumptæ. Hæc enim, & huiusmodi, quæ sunt ijs similia, confirmant stomachum; quibus escis, & in sequentibus diebus uti oportet, paulatim ad consuetudinem progredientes, donec omni molestia liberentur.

Est & illud stomachi uitium, quod cum siccitate, & ardore eius, & siti inrequiebili, & ut ita dicam, inextinguibili nascitur. eccausin hoc Græci uocant, ab eo quod exsiccet omnem stomachi humorem. scimus quosdam uix aqua bibisse, nec sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse; ad hoc denarius unus, uel pondus uictoriati, datum ex aqua frigida cyathis tribus, ita prodest, ut facile abstinere a potu diebus proximis possint.

Lienosis uero ex posca, & iocineris duritiem diutinam habentibus, ex aqua mulsa datum satis conuenit. Nec minus hydropicis, quibus datur eadem ratione. Sed ijs per complures dies oportebit in ptisanæ cremore sine ullo alio liquore dari. prodest cōpositio hæc, & coto inflato, & cæteris intestinis. futuras quoque, uel iam factas uomicas iisdem partibus, aut discutit, aut celerius aperit.

Item menstrua mouet mulieribus quæ difficulter purgantur. dandum autem erit ijs medicamentum ex aqua in qua decoquatur herba quæ artemisia dicitur, aut quæ dictamnus appellatur.

Etiā ad papulas, & facium ignem, uel quam zonam uocant, benefacit data ex aqua mulsa, detracto prius sanguine, si res postulauerit. quod, & in omnibus alijs uitijs supra dictis faciendum est. omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse comperta habemus, quia adiuta antidotos faciliores habebit effectus.

Recipit dam appellant, stochadis singulorum denarios denos, opopanax, sagapeni, petroselini, terræ mali, pipenis albi, singulorum denarios quinos, cinnami, nardispicæ, myrræ, folij, croci, singulorum denarios quaternos; in unum omnia diligenter ponderata contunduntur, & cribantur, præter opopanaxem, & sagapenum, & myrrā. hæc enim mortario teri debent, adiecto melle tenui, id est, quā liquidissimo. deinde cæteris permiscantur; quæ & ipsa recipere debent tantum mellis, quantum satis erit ad comprehendenda, & con-

tinenda ea, uel conglutinanda. reponitur medicamentum uase uitreo sub signaculo; datur, ut supra diximus; & quemadmodum diximus, cum summa obseruatione pro cuiusque rei causis, uel mensuris, uel necessitatibus, est prorsus sacrum, ut auctor nominis huius appellauit.

Si quando autem efficaciore uouerimus uti, propter difficultatem naturalem uitiorum, aut causarum diuturnitatem, ut si dandum sit firiofis, aut comitiali morbo correptis, uel lumborum perpetuum dolorem habentibus, podagrae uel cruratis, cucurbitae siluestris adijciemus ad supra dicta pondera denarios decem, & opopanax, atque sagapeni denarios quinos, quamobrem utraque parata debent esse medicamenta, ut, cum opus fuerit, usus utriusque in promptu sit illud sane praeter ceteris mihi credas uelim, dum in alijs rebus ipse uim eius experiris, hoc medicamento non solum non noceri stomachum, uerum etiam refici, & confirmari supra omnium opinionem. Medicamentum, quod proprie aduersus solutionem stomachi facit, & fluorem eiusdem; maxime uero cum infirmi nihil cibi retinere possunt, & quidquid datum est, reijciunt. recipit haec, mastiches candidae unciam, tragachanti albi unciam, apollinaris herbae radices unciam unam. contunditur tragacanthum cum radice, postea mastiche trita adijcitur, & reponitur medicamentum in uitreo uase. dantur, cum opus est, coctaria bina, aut prout oportuerit, plus minusue, secundum uomitum factum ex aquae frigidae cyathis tribus.

Ad stomachi dolorem, & inflationem remedium, sic. palmarum denarios XXX. anesi * IIII. croci * II. git * II. asari * II. myrti nigrae baccarum * IIII. iuniperi baccas enucleatas numero uiginti. contunduntur seorsum omnia, & in unum commiscuntur. deinde fiunt pastilli, alij ad mensuram denarii, alij ad pondus uictoriati. dantur ieiunis ex aquae cyathis tribus, aut ex protropo musto, quod est passigenus.

Medicamentum siccum ad stomachi inflationem, & dolorem, & incediam, mouet, & urinam. Ideo facit, & ad hydropicos, & iecur durum habentes, & ad auriginem: quam quidam regium, quidam arquatam morbum uocant. refertur in Musam Antonium. recipit autem haec; aloes denarios V. croci, cinnami, nardi syriacae spicae, asari, xybobalsami, mastiches chie, singulorum denarios senos; dantur coctaria bina, uel terna, ex aquae cyathis tribus.

Potio Cosmiana ad omnem internum dolorem; sed facit mirifice ad stomachi dolores, & ad tussicos, & phthificos, sanguine, & pus reijcipientes, & ad iocineris uitia, atque pulmonis, & ad lateris dolorem, nec minus ad torminosos, & conuulsam, aut ruptam aliquam partem interiorum, & ad destillationes, & ad eos qui somnum nullo modo capere possunt. facit, & ad hydropicos, ficit enim mirifice eos. componitur sic. dauci seminis denarium unum, alteri seminis denarium I. turis denarium I. A. S. myrtae denarium unum, croci denarium I. A. S. fiunt pastilli ad denarii semissem. dantur etiam febricitantibus, & sine febre, potissimum pleuriticis, & peripleumoniacis ex aquae mulsae dilutae cyathis duobus, phthificis ex posca. Ad conuulsa autem, & rupta ex melle, & aceto. ceteris ex aqua calida, uel frigida. facit hoc medicamentum etiam ad eos, quibus stomachus inacescit.

Antidotus, qua utitur Cosmus ad omnia interna uitia, quae supra scripta sunt, nec non, & ad omnes serpentum noxios morsus. Recipit haec; glycyrrizae denarios VIII. S. & tertias uictoriati, uel duas partes, opij denarios septem, & tertias partes uictoriati, uel duas, castorei denarios VI. & uictoriati duas tertias uel partes, piperis longi denarios quinque, & uictoriati partem tertiam, piperis albi denarios quinque, & uictoriati duas tertias uel partes, nardi syriacae denarios VI. S. dauci seminis denarios VI. malobathri denarios V. S. cassiae nigrae denarios quinque, & uictoriati semissem, turis denarios V. fil denarios V. & uictoriati duas tertias uel partes, rosae caninae succi denarios sex, acori denarios duos, sagapeni * II. balsami seminis * II. scordij * V. & uictoriati duas tertias uel partes, myrtae * VI. croci * VI. & duas uictoriati tertias uel partes, styracis * II. S. cinnami * VII. & uictoriati duas tertias uel partes, zingiberis * VII. & uictoriati duas tertias uel partes. phu * VII. petroselinii * XIII. & duas tertias uel uictoriati ponderis partes, foeniculi seminis * IIII. saluinae * IIII. rutae siluaticae * II. agarii succi * II. gentianae * IIII. iris illyricae * V. anesi * III. thlaspi seminis * VI. & uictoriati tertiam partem. rosae foliorum * IIII. misyos * V. gummis acathini * II. cardamomi * IIII. schoni floris * IIII. & uictoriati duas tertias uel partes, opopanax * VI. & uictoriati duas partes, & sextante, resinae terebinthinae * VI. & duas tertias uel uictoriati partes, in uino chio, uel falerno bono odorato, omnia contusa cribrataque consperguntur, & pastilli inde fiunt diuersi ponderis, uel mensurae quanta aethiana, & quanta faba aegyptia est, qui dari debent, non febricitantibus ex mulso, infirmis ex aqua calide cyathis tribus.

Pulegium tritum, uel in aqua maceratum, adiecto aceti paululo, & potum, nauisam stomachi sedat. Thymbra trita cum melle sumpta pituitam concretam in pectore, & stomachi collectiones extenuat. marubium quoque tritum, uel succus eius cum melle epotus, stomachi dolorem protinus tollit.

Scordij succus ad mensuram denarii potus, morsus stomachi tollit; datur enim sine febre languentibus ex mulso, febricitantibus uero ex aqua mulsae.

Polion herba, quae a quibusdam libanotis appellatur, trita, uel succus eius cum melle tenui, id est modico potus, morsui uentris, & stomachicis prodest.

Centaureae tenuis succus, quantum cicer, ex aqua datus, stomachicis prodest. Origanum quoque tritum, morsus stomachi sedat, potum ex aqua tepida; extrahit enim concretos liquores.

Profunt etiam quaedam in aqua macerata stomacho, ut pira, mala cydonia, palmae cariotae thebaicae, mespila, capreoli de uite, rosae folia, granorum punici mali succis. benefacit etiam succus malorum cydoneorum per se coctario sumptus, uel cum alphita, aut alica, aut trago, aut oriza.

Solutum autem stomachum, & omnia reijcientem, initio quidem curari oportet extra, id est forinsecus, imposita ei fertula campana cocta ex uino uetere, aut ex aqua mulsae, uel myrteo oleo trita, cum aceto, & myrta

Profunt etiam quaedam in aqua macerata stomacho, ut pira, mala cydonia, palmae cariotae thebaicae, mespila, capreoli de uite, rosae folia, granorum punici mali succis. benefacit etiam succus malorum cydoneorum per se coctario sumptus, uel cum alphita, aut alica, aut trago, aut oriza.

Solutum autem stomachum, & omnia reijcientem, initio quidem curari oportet extra, id est forinsecus, imposita ei fertula campana cocta ex uino uetere, aut ex aqua mulsae, uel myrteo oleo trita, cum aceto, & myrta

Profunt etiam quaedam in aqua macerata stomacho, ut pira, mala cydonia, palmae cariotae thebaicae, mespila, capreoli de uite, rosae folia, granorum punici mali succis. benefacit etiam succus malorum cydoneorum per se coctario sumptus, uel cum alphita, aut alica, aut trago, aut oriza.

Solutum autem stomachum, & omnia reijcientem, initio quidem curari oportet extra, id est forinsecus, imposita ei fertula campana cocta ex uino uetere, aut ex aqua mulsae, uel myrteo oleo trita, cum aceto, & myrta

Profunt etiam quaedam in aqua macerata stomacho, ut pira, mala cydonia, palmae cariotae thebaicae, mespila, capreoli de uite, rosae folia, granorum punici mali succis. benefacit etiam succus malorum cydoneorum per se coctario sumptus, uel cum alphita, aut alica, aut trago, aut oriza.

Solutum autem stomachum, & omnia reijcientem, initio quidem curari oportet extra, id est forinsecus, imposita ei fertula campana cocta ex uino uetere, aut ex aqua mulsae, uel myrteo oleo trita, cum aceto, & myrta

myrra. nec minus lanam succidam. uel spongiam aceto intinctam. & expressam adponi oportet. faciunt bene. & folia uitis trita. & mala cydonia trita. & palmula trita. & emplastri more cum ceroto ex myrteo oleo facto imposita. & folia tenera rubi. uel lentisci. uel portulacae. aut aizoi. cum polenta. ex aqua frigida consparsa. imposita profunt. fricandae autem erunt hae difficultates stomachi. nec minus scapulae oleo uere. uel aliquolibet calefactorio unguento. Cibos uero dari oportet huiusmodi. polentam cum passo protropo. uel cum uino salerno dulci. uel faustiano. atque alio eiusdem generis. Item lenticulam cum beta. uel oriza. incoctis illic malis cydoneis. aut palmulis thebaicis. aut baccis myrti. uel folijs. aut granis mali punici. aut lentisci folijs teneris. aut rubi. admixto illic aliquo supra dicti generis uino. panis autem huiusmodi difficultatibus prodest summum fermetatus. edulia quoque profunt hae. intubi. lactuca ex aceto. brassica. siser. coctae bullientis frustella. ungellae. turdi. perdices. turtures. attagene. palumbi. cancri. locustae. lolligines. sepiar. muli. murices. purpurae. pectunculi.

Ad resolutum stomachum dari oportet protinus cum reiecerit. panem ex aqua frigida. uel ex posca. & si ne hoc quidem continuerit. statim dare debes lentem. & betam coctam. uel alicam. uel oua hapala. uel ungellam discoctam. uel coctas elixas. aut murices. & aquam frigidam. sed si nihil supra dictorum continuerit. dandus erit uini austeri meri cyathus. & ex interuallo bis terue rursus idem faciendum erit.

Vinis quoque utendum est satis stomacho utilibus. aut ex baccis myrti factis. aut ex malis cydoneis pressis. aut ex iuniperis. uel hyssopo condito. uel origano. uel ex marrubio. uel ex ruta siluatica. uel ex herba lucernaria. quam graeci phlomon uocant. uel ex scordio. uel ex centaurea. uel ex lycio. uel absinthio. uel ex terebintho. uel ex lentisco. uel ex prunis syriacis. uel ex malo granato.

Ad inflationem stomachi. & uentris dolores. dandum est huiusmodi medicamentum; piperis denarios quatuor. castorei * I. opij * II. myrrae V. petroselinii * III. anesi * III. nardi syriacae * I. contunduntur. & cribrantur omnia. & permiscuntur. inde datur. & ante noctem. & in noctem coctearium. uel plus. pro cuiusque uiribus. cum cyatho aquae calidae. & mellis quantum satis uidebitur. haec potio somnum concoliat. concoctiones doloresque omnes sedat. praecipue autem prodest mulieri quae colo uexatur. & uiris eodem modo laborantibus conuenit.

Item ad tumores praecordiorum etiam in febribus. & ad tussim. & ad lateris dolorem. & ad conuulsa. uel rupta interiora. & ad urinae difficultatem data plurimum iuuat. Cataplasma hoc stomacho imponere non alienum erit. mali cydonei ex farina cocti. id est illic inuoluti denarios V. I. carotatum pulpae subactae * III. cere * VII. croci * II. absinthij * II. olei masticis. aut myrti * III. uino conspergitur crocum. arida tunduntur. cera liquatur. & simul omnia commiscuntur. atque ita adponuntur mane in lecto stomacho laboranti.

Hoc quoque cataplasma stomacho utilissimum est. palmarum interiores partes * III. croci * III. hypocyssidos * I. S. mali cydonei cocti. ut superius dixi. * VI. absinthij succi * III. floris mali granati * I. S. feces uini chij * V. I. cere * XII. olei myrtini * XII. chameleae eiusque similia folia habet oliuae. ex aquae coctae * V. I. mirificae enim prodest stomacho. praecipue succus eiusdem. similiter impositus ad conuulsa. & rupta conuenientissimum est. Hiera ad stomachum confirmandum; mouet interdum uentrem. interdum urinam; conficitur sic. aloes * V. xylobalsami. acori. croci. nardi syriacae. mastiches chie. singulorum denarios senos. malobathri * I. teruntur quam diligentissime seorsum omnia. ac deinde mixta in unum reponuntur. Cum opus est dantur inde coctearia quibusdam duo. quibusdam tria. ex aquae cyathis sex. uel mixtis cum uini cyathis tribus. uel ex quolibet alio liquore. prout conueniet stomacho. eiusdem mensurae dabitur.

Pertice cosmiana. hoc medicamentum ad stomachi uiria. & ad coctionem ualde utile est. accipit haec. petroselinii denarios VII. phu denarios III. piperis albi * XIX. inule * VI. nucum iuglandium animatarum * VI. nucum pinearum animatarum * XII. amij * VIII. ligustici * XII. zingiberis * VIII. carei * XII. apij seminis * XII. anesi * VII. cardamomi * VIII. acori * VI. dauci seminis * VIII. coriandri seminis * XII. feniculi seminis * VI. facit bene haec compositio. cum habeat in se nihil tetri medicamenti. ad inflationem stomachi. & cruditates. & acidas ructationes. & ad uentris dolorem. & urinae difficultatem. & ad conuulsa intrinsecus. & rupta omnia. & ad horrores. mouet etiam menstrua mulierum cum difficulter purgantur.

Item detrahatur si qua ex partu. aut abortu intrinsecus nocua subsisterint. datur omnino sine metu. & ieiunis. & ante coenae tempus. & post coenam ad mensuram denarii unius. uel duorum. ex aquae cyathis tribus. & si plus ponderis quislibet sumplerit. non laedetur. praegnanti non est dandum hoc medicamentum. nec febricitanti. Antidoron philonianum. ad omnes internos dolores. quod ad tensiones stomachi. & emphysematosum praecipue facit. colicis quoque prodest. quibus in dolore ex aqua frigida datur. ceteris ex calida. cum oxymelute dari debet. tussim sedat. tertianas mirifice tollit. ante momentum suspicionis datum. omnibus autem ad modum sabae dandum erit. constat ex ijs. croci * X V. pyretri semunciam. euforbij semunciam. spicernardi semunciam. piperis albi uncias duas semis. hyoscyami — II S. opij * III. melior erit. si addas petroselinii * III. dauci cretici * III. colligitur melle attico. & in uase uitreo sub signaculo reponitur. Stomacho laboranti coctae profunt. si in aqua ferueant. & sic carbonibus torrantur. atque ita ex cenogaro sumantur impari numero. Stomachum feumatizantem. & dolentem. & languentem. & dissolutum. primum mansio lucida. & non nimium frigida. nec satis calida bene accipit. tu cataplasma fieri debet de folijs uitii. uel si uineae folia non fuerint. de rumicis. siue rubi folijs. uel de ea summitate rubi. quae satis tenera est. hoc diligenter teritur cum dactylis quinque minutatim carptis. in aceto diu maceratis.

Epithematio autem hoc post cataplasma uti oportet, quod fieri debet de plantagine ea, quæ arnogiōs. sos dicitur, cum aceto trita. cibus autem uti debet cui medendum est austeris, & stypticis.

Cataplasma fit stomacho laboranti ex pomis cydoneis optimè percōctis, quæ poma manibus subiguntur. deinde rosa sicca teritur, & cribello medicinali cribratur, tum aceti optimi quātum sufficiat, adijcitur, & simul omnia permiscuntur, factumque cataplasma stomacho calidum adponitur.

Portulaca, hoc est alium gallicum, coquitur diligentissime, & coctum bene, edētur ex aceto ab eo, qui stomachum dolebit, uel uitiosum habebit, citō ei proderit.

Cuminum teres, & uino mixtum dabis bibendum ieiuno si non febricitabit; si febricitabit, ex aqua tritum dabis, continuo emendabis stomachi dolorem.

Nardum, & mastiche, & semen apij cum bacca lauri, & absinthij semine, æquis portionibus conteruntur; puluis hic super stomachum aspersus mire eum reficit.

Absinthij uiridis manipulum, in caccabō nouo fictili cum aquæ hemina decoques ad tertias, & in ipsam potionem mittes mastiches modicum, & piperis triti grana septem, uel nouem, & sic mane ieiuno bibendum dabis, continuo sentiet stomachi laborantis medelam.

Ad stomachi carbunculum reprimendum daſtyli in uino austero macerantur, & admixto pomo cydoneo cocto, & rosa, & mastiche, & aloë, & oleo rosaceo, stomacho adponuntur, ita ut cataplasma inde exactissimum fiat. præterea semper ante cibum infirmus stomacho debet accipere mellis attici coſlearia duo, uel tria pariter in uino austero decocti, quod duplum sit quàm mel; uel pro uino austero, succus rosarum permixtus detur. siccatur enim stomachum, & recreat dissolutum, & tardè cibum conficientem confirmat.

Mellis libra una, sinapis toſti, ac poſt diligenter triti unciz duæ, pariter coquantur, ex eo plenum coſcleare ieiuno, qui stomachi dolore laborauerit, datur.

Ad stomachum nauſeantem, & aceſcentem, coriandri seminis triti ℥ III . & lactucæ albæ seminis triti coſcleare unum; si hæc aqua permixta ieiunus accipiat, prodest.

Stomachum conroborat herba absinthij decocta cum uino austero, atque ita subinde pota, si febres non erunt; quod si inquietudo fuerit, cum aqua coqui, & dari debet; mirum est.

Ad solitaneos stomachi dolores, malagma sic compones; ſcenigræci cyathum, lini seminis cyathum, iſſici purgati libram unam, aquæ ℥ IX . olei ℥ III . ſpumæ argenti libram unam, ceræ ruſſæ P. I. S. hæc omnia in unum concorporabis, & decoques, & cum malagma feceris, in pannum induces, & stomacho appones, & circa uiscera, tam diu habebis, & tam adſidue adpones, donec dolor abſcedat.

Ad stomachum ſaſtidentem eſcam, & reuomentem, roſæ medium, quod semen portat, id est ipsum florem croceum, contundes, & aluminis ſciſſi, cyperi, bdellæ, absinthij ſuccum, meliloti, roſæ ſiccæ, acaciæ, iris illyricæ, olei nardini, ceræ, opobalfami; pares menſuras harum omnium ſpecierum conteres in mortariō marmoreo, & stomacho epithematium mirificum ſuperpones, ad ignem, ut eſt conſuetudo, compositum.

Epithematium optimum ad stomachum reparandum; mastiches uncias VI . aloes — III . ſtyracis — II . ceræ P. I. nardi — VI . hæc pariter miſcebis, & epithematium ſubtile facies, quo multis horis, certe hyeme per totum diem, uti poteris.

Ad dolorem stomachi, uettonicæ radice ſciſſicula in olla decoques ex aqua, eandemque ollam ſub diuo habeto opertam; cum stomachus dolore uexabitur, uſque ad tertias eandem aquam excoque, & inde cyathum unum bibendum ieiunus ad diem ſume.

Vrticam ſemen habentem in ſummo deme, ac diligenter laua, & ex ea ſorbtionem facito bene conditam ſine pipere; ſuauiſſimè accipieris ad stomachum reficiendum.

Lactucæ nigre ſemen, quod ipsum ualde nigrum eſt in pila lignea tunſum, cum melle ſubige, atque permiſce, & inde quotidie ieiunus ſume coſcleare plenum, bene stomacho laborantem accipies.

Ad dolores stomachi ueteres, & ad stomachum fatigatum facies oxyporij ſic, piperis ſeorſum teres ſemunciam, & bulbos XI . incoctos ſeparatim nimium diligenter teres, & utrumque miſcebis, tum adijcies mellis optimi deſpumati ℥ I . & ita in olla noua coques ad tertias, & ſumes ieiunus diurna coſlearia ſingula bina, uel terna tandiu, donec corrigas stomachum laborantem.

Butyri libram decoque, quouſque inde pars ſexta decedat. tum cum eo ſerpyllum coque, & ſi patietur stomachus tuus, ieiunus illud fortiter manducabis; ſin autem ſaſtidium erit, pulſtem facies, & tum in ea mixtum manducabis.

Sal tritum ex mulſo ieiunus contra dolorem stomachi qui biberit, remediabitur. uenter quoque oſſiſſragi arefactus, & potioni aſperſus, plurimum prodeſt.

Stomacho exulcerato, cicatricem hoc medicamentum inducet; aloes ℥ VIII . miſyos ſcripula VIII . ſuris ſcripula VIII . tunſa cribrataque, hæc melle optimo comprehendes. ſi plenius, uel ualidius facere uolueris hoc medicamentum, myrrham, & anethum ex tertio adijcies, & dimidium coſcleare cum potione mulſi ieiunus accipies.

Stomachi dolorem concitatiffimè ſedant, absinthij unciz tres, rutæ unciz II . ex aqua ad dimidias coctæ & ieiuno ad menſuram potionis bonæ potui datæ.

Marrubij uiridis ſciſſicula decoques ex aceti ſextarijs tribus, uſque ad heminam: tum exprimes marrubium, & adijcies deſpumati mellis quartarium, & iterum decoques, quouſque ad craſſitudinem coeat; inde coſcleare unum contra dolorem stomachi ieiunus accipies.

Herbæ uerbenæ tunſæ, & cribratæ pulueris coſlearia quinque, laboranti stomachi dolore dabis ieiuno per triduum, in tribus optimi uini cyathis. cæteris, prout uires erunt, dato, febricitantibus ſane ex aqua calida dare debes. ſed ſi quis exulceratum stomachum habuerit, caprinum lac coctum frequenter bibat.

Rutæ ſemen cum ſulphure uiuo, minore menſura adieſto aceto conterito, atque ieiunus mane guſtato, optimè aduerſum dolorem stomachi accipieris.

Repentinum stomachi dolorem, tres cepuri longi purgati, & ſinguli cum melle ſumpti ſtatim ſanant, necnon

necnon, & terræ malum comestum, dolores stomachi celeriter castigat.

Solutione stomachi infirmitatemque confirmat oui semicocti vitellus, & gallæ pars dimidia trita, si ante duas horas, quàm cibus sumatur, mixta hæc cum uino hauriantur, sed uetere, & tepesfacto. Rancorem stomachi temperat caro uaccina ex uini, & aceti æqua portione discocta, & cibo sumpta.

Inflationem stomachi sedant, marathri, id est foeniculi, & apij radices, in uino albo odorato uetere infusæ; de quo si ieiunus quis cyathos duos potet, cum calidæ aquæ cyatho mixtos, optime accipietur. rursum quoque hortensis paululum cibo sumptum, uel in portione dilutum, atque epotum, inflationes stomachi compescit.

Inflatione stomachi potentissime discutit, sinus uituli recens ex uino potui datus; hoc & dolores eius ex frigore aut cruditate obortos mirabiliter mulcet. Remedium physicum magnum aduersum dolorem stomachi, in lamina argentea scribes, & dices; arimatho, aufer dolores stomachi illi, quæ peperit illa. eandem laminam lana ouis uiuæ inuolutam, collo de licio suspendes, & id agens, dices, aufer mihi, uel illi stomachi dolorem arimatho.

Dolorem, & inflationem stomachi sanat iecur lupi, prius aqua coctum, mox arefactum, & tritum, potio nique inspersum. Fastidium stomachi releuat papauer siluestre, quod gallice calocatanos dicitur, tritum, & ex lacte caprino potui datum. Epithema optimum ad stomachum reficiendum, mihi quæ expertissimum, conficitur sic. mastiches, rursus, nardispica, aloës, absinthij, singulas uncias. styracis — I I. S. croci — I I. S. ceræ, & medullæ ceruinæ, singulas libras. styracem, & crocum pridie macera uino ueteri infusum, & sic diligenter tere; medullam, & ceram remitte igni, cætera tunsa cribrataque simul misce, & ce roto superinfunde, & in panniculo utere ad stomachum duabus, uel tribus horis; & si durius uidebitur quam esse debet, oleum nardinum, aut gleucinum adijce, ut mollescat. Hyssopum coctum cum oxymellite ieiunus, uel post cœnam, qui per coctare quotidie accipiet, facilius conficiet cibum.

Radicem foeniculi in uini cyathum radito, & priusquam cœnes, uel cum dormitum ibis, potui sumito, quo factio melius digeres. Laseric ueri modicum, ex aquæ frigidæ cyatho dilutum, dormitum iturus bibe, digestorium mirum experieris.

Mellis attici libram unam, uettonicæ trita — I I I. in unum permisce, & pone, ut conserueat; quod cum refrigerauerit, facies pastillos nucis auellanz magnitudine, & post cœnam singulos hauries; quo facto apprime quoslibet concoques cibos.

Item aliud embamma digestorium optimum, & utilissimū, sic. ligustici drach. I I I. gingeris drach. I. petroselinij drach. I. piperis drach. I. epithymi drach. I. & laseric scrupulum dimidium; tunsa hæc, ac diligenter cribrata misceto cum passo; hoc facit, & ad eos, qui cibum tenere non possunt, eumque uomitibus reiectant; mox ergo ubi cibum sumpserint, dato pastillum ad modum nucis auellanz de medicamine supra scripto, & ad præsens eos abstine potu, cito remediabis.

Epithematum uehementissimum ad cibum conficiendum, sic. zingiberis ex aceto macerati P. I. auripigmenti P. I. feculæ P. I. calcis uiuæ drach. I I. sinopidis ponticæ P. I. lixiuæ 8. I. trita hæc in ollam nouam mittes, & feruere facies simul, donec mellis crassitudinem habeant, & cum opus fuerit, inducta pan no calida uisceribus adpones. Cum ibis dormitum zingiberis modicum sub lingua teneto, & ex posca calida manus laua, optime digeres.

Vrticæ — I I I. tris calydoniæ — I I I. schoeni — I I I. cypri — I I I. magmatis — I I I. petroselinij — I I I. inulæ — I I. piperis albi — I I. melle colliges hæc omnia trita, & uteris oxyporio optimo ad digerendum, unde etiam cœnatus parum accipies.

Cum te in lecto posueris, uentrem tuum perficans dices ter, lupus ibat per uiam, per semitam, cruda uo- rabat, liquida bibebat. physicum hoc ad digerendum de experimento satis utile.

Pulegium, & nastur- tium ex aqua simul decoctum, mane bibe, emendabis, uel discuties cruditatem. Quercus uiridis folia, cum salis spuma contrita, & potui data, remediunt cruditatem. Acorum ponticum tritum ex aqua calida, potum mensura cyathi unius, ieiuni stomachum reficit cruditate depulsa.

Lis, qui nec potu uiuantur, nec cibo, & stomachi ructus amarus patiuntur, centauream, id est fel terræ contritam ad mensuram denarij argentei ex aquæ calidæ cyathis tribus bibendam ieiunis per triduum da- bis, statim discutietur infirmitas. Succum absinthij, quem Græci chyloni absinthiu uocant, auellanz magnitudine, in aquæ calidæ quartario bibendum da ieiuno, componetur stomachus, & adpetentiam cibo- rum habebit, quisquis patietur ex infirmitate fastidium.

Oxyporium mirum neronianum æstiuum, & hyemale, si ei cum uolueris, piperis aliquid adieceris, quod fastidium stomachi marcoremque deterget, conficitur sic.

In musti recentis, & dulcis congium ex uuis albis facti, atque in ollam grandem missi, adduntur cydonea V. non purgata, toridem mala punica, additur, & sorborum maturorum sextarius, & rhus syriaci sextarius, croci scrupulus. hæc coquuntur, usque ad crassitudinem mellis. postea diligenter co- lantur, repositum medicamen seruatur in uetro signatum, sed omnino diligenter colatum, ut excrementa omnia separentur, inde datur ieiuno ligula plena grandis. hoc est oxyporium, quo Nero utebatur ad dige- stionem, quod Marcellus medicus egregius ostendit, quod & nos usu probauimus.

Nam & stoma- chum mire componit, & humores siccat, excrementa quoque illa data dysentericis, mirabili efficacia pro- sunt.

Ostifragi uenter madefactus adpositusque iis ad stomachum, qui cibos non conficiunt, utilissi- mus est, uel etiam si tantum manu teneatur, plurimū iuuat. Oxyporiū dionyfianum ad digestionē, & ad rigore stomachi, & ad confirmationē aqualiculi, conficitur sic. cydoneonum incoctorum tunforumque succi 8. I. mellis despumati 8. I. aceti optimi 8. I. hæc in unū permixta, uase duplici decoquuntur, donec soli- datas ad unū sextariū redigatur; additur pulueris petroselinij — I. cymini semuncia, & bene cōtempera-

tum medicamen uasculo vitreo conditur sub signaculo, atque inde coëleare plenum a' ieiuno accipitur. Oxyporium olympianum polyetes ad digestionem parandam, accipit hæc. piperis — I. S. zingiberis — I. S. in puluerem redacta & creta hæc, dum ad digestionem temperanda erunt, ex melle dabis. Oxyporium pancharianum ad digestionem, quod & aqualiculi corruptelas uel aciditates. cōsumit & sto machum marcentem recreat, tertianam etiam cum uino & calida sub hora datum, mirè tollit; conficitur sic. piperis uncias quatuor, Θ III. feseleos — I. zingiberis — I. S. ameos — I. Θ VI. anesi uncias duas, libyfici — I. S. iuniperi hispani — I. Θ VII. ita ut iuniperum ablutum purgetur sublato se mine, & sic teratur. hæc omnia in puluerem redacta reponuntur in doliolo vitreo signato, ligula plena ex mulla aqua datur ieiuno. Ad cruditatem, quæ nauſeam facit, remedium sic. uetronice drachma una, in oxymelitis cyathis tribus mixta potui datur. ius quoque pulli, uel ubi coctus fuerit, cruditati opi tulatur, si in primo prandio forbeat. Ad digestionem parandam, iuniperi baccarum enucleatarū, & zingiberis, & petroselinum macedonicum, & piperis uncias singulas, mellis libram unam, quæ sunt sicca, tum des uel teres & cribrabis diligenter: postea mel coctum, id est despumatum admiscebis, & uteris medica mine & ieiunus, & post cœnam, per coëleare accepto quanta sit magnitudo auellanz maioris. Ad stomachi dolorem in impetu cohibendum, pomorum cydoneorum cutem tolles, atque inde uncias qua tuor, & pulegij unciam unam, piperis unciam unam, zingiberis uncias tres, alij gallici uncias tres, mellis se libram, aceti quod sufficiat, adijcies, & diligenter trita omnia permiscebis, atque inde coëleare plenum da bis, etiam cibato. Antidotum acharistum multiplex, mirum. facit ad eos qui escam non digerunt, & qui malè ructant, & ad stomachi dolorem, & ad lateris, & uesicæ, & renum molestias, & ad omnia quæ in terius causas malè ualeitudinis habent, id est ad scorum, ad febrem quotidianam, & tertianam, & quartanā, ad sanguinem tuscentes, ad suspensivos, ad dysentericos & ad colicos, & ad hepaticos, & ad nimiam uigiliā, & ad strophum, & ad intestinorum dolorem. morsum etiam serpentis curat, ter ad diem uulnere imposi tum, uel potui datum. confectio hæc est: cinnamomi — I. myrræ — I I. piperis — I. casborci semun ciam, galbani — I. styracis — I. casfæ fistulæ semunciam, piperis longi — I. costi — I. opij semun ciam, spicznardi Θ . croci Θ . mellis atticci 8. I. omnia ista tundes diligenter, & cernes bene, & in puluere mollissimum redacta mensurabis, præter opium & galbanum. galbanum in olla noua excoques, ita ut ter bulliat super prunas: opium autem cum uino uetere teres, & permiscebis diligenter, & tum cetera o mnia simul permiscebis diu, & diligenter agitata recondes sub signaculo, in pyxide buxæ, aut in doliolo uitreo, & dabis cui uolueris, ad modum auellanz, cum mellis coëlearibus tribus, uel quatuor. & postea da bis potionem calidæ aquæ, & cum dederis, accipies mercedis quodcūque: multi enim qui cito curati sunt, ingrati extiterunt, propter quod ipsum antidotum acharistum appellatur, id est sine gratia. Oxypo rium, quod dicitur chymation, facit ad calculos, & ad renium dolorem, & ad inflationem stomachi, phleg maticis quoque prædest, & halycis, sed & tortiones & hæmorrhoidas curat, & quæ in ano nascuntur. restrin git & mēstrua nimia, & hepaticos & spleniticos, & tusficos solitaneos curat, & cadiuis prædest: accipit hæc Inulæ — I. forniculi seminis uncias tres, piperis nigri uncias I I. tundes hæc separatim & cribrabis be ne, & conficies uel permiscebis melle semicocto, & dabis nucis pōticæ magnitudine cum aqua calida. quidam hoc in oxymelite soluunt, quidam in uino mixto accipiunt, alij consuerunt coëleario accipere purū ad lapides eijciendos. Descriptio panni rustici facientis ad uiscerum curationem sic. olei P. I. axun gis ueteris P. I. butyri P. I. herbæ sabine P. I. barbæ iouis P. I. tandiu hæc decoques, quandiu herbæ areſcant, postea colantur, & additur ceræ libra, resinæ P. I. farinæ de pulegio P. I. pulueris de bacca laui P. I. de fumo ouillo unde ouibus in lana hæserit P. I. hæc omnia in unum corpus rediguntur & permisce tur, & inde pannus inducitur, & quotiens uolueris reparatus stomacho adponitur. Dia tessaron, quod febrem sedat, & uiscera componit. accipit hæc, olei coëlearia tria, aceti coëlearia tria, mellis boni despuma ti coëlearia tria, uini ueteris boni coëlearia tria, hæc tandiu decoquuntur, quandiu omnia ad tria coëlearia redigantur, & ita linteo inducta stomacho superponuntur, uel ieiuno tepida per coëleare datur. facit hoc medicamen ad omnes stomachi molestias. Ad dolorem stomachi, uel tumorem, uel uiscerum infirmi tatem, remedium sic. succi ex absinthio 8. I. aceti optimi 8. I. olei mollis 8. I. ceræ ponticæ libram unā, medullæ ceruinæ — I I I. hæc lento igne decoques usque ad mensuram sextarij: exinde linteum den sum tinghes, & maturè in lecto uisceribus adpones, utendum in horam I I. Confectio oxymelis dia scillii, ad stomachi causas sic. scillæ libram comminues de hastula lignea acuta minutissimis partibus, & su perfundes illic aquæ nitidæ fontanz 8. I I I. ac die tota & nocte coopertum uas in quod hæc miseris, esse permittes: alia die in olla rudi cum ipsa scilla deferuere facies lento igni usque ad sextariū aquæ, tum lin teo nitido exprimes scillam ipsam, ut sextarius ille defluat, adijcies huic sextario aceti optimi sextarium, & mellis optimi despumati P. I I. rursum in eadem olla feruere usque ad sextariū. tum recondes in am pulla nitida, & signatum habebis, & cum imparationem stomachi senseris, coëlearia singula plane repe facta ieiunus accipies. Ad stomachi dolorem remedium physicum sic. in lapide iaspide exculpe dra conem radiatum, ut habeat septem radios, & claude auro, & utere in collo. Epithematium ad stomachum confirmandum sic; aloes — I I I. turis masculi — I I. mastiches albæ semunciam, styracis — I I. croci I. S. meliloti semunciam, ceræ ponticæ uel etiā rufæ — I I I. nardi — V I. ius absinthij pontici — I. hæc omnia separatim tunſa & cribrata miscentur & coquuntur, & inducuntur in panno atque maturè stomacho adponuntur. Ad digestionem parandam, quisquis sollicitus erit acorum ieiunus commanducet, & iactet; radicem quoque amaram & inlotam ieiunus commanducet. Nec non

Nec non anethi semen etiam uiridis manducatum inuat. nam & somnum conciliat, & digestionem parat. Cōpositio medicaminis subfragi, quod facit ad digestionem, & uitia stomachi, siue aqualiculi. accipit hęc, petroselinū macedonici — II. apij seminis — I. feseleos — V. piperis — V. nepetę montanę — III. pulegij sicci quod in fumo non fuerit — IIII. thymi sicci — libystici etiam seminis — I. I. inulę radice tunzē, atque cribratę — zingiberis — ex ijs omnibus tunlis, atque cribratis puluerem molissimum facies: adijcies deinde mellis optimi despumati quantum putaueris mitti oportere, id est ut prope liquidę ac temperatę colligi possint species suprà scriptę, & sic recondes in uase uitreo, & cum uolueris ieiunus, cum tamen te digestum senseris, singula coëlearia non plenissima matutinis horis accipies.

Confectio epithematij, quod stomachi uetustas causas emendat, & ad digestionem confirmat; accipit hęc: seuum taurinum, ceram, medullam ceruinam, axungiam ueterem, resinam terebinthinam, horum pondera singula æqualia, & mellis uncias tres, mastiches uncias tres, suthul miscabis; quę liquanda fuerint, liquabis igni.

Et quę tundenda, in puluerem tenuissimum rediges; & confectum medicamen linteo tenso induces, & stomacho, uel uisceribus adpones; quod tamen ante momentum prandij detrahi conuenit.

Aliud Epithematium, quod ad easdem stomachi causas efficaciter prodest, sic. styracis uncias duas, aloes uncias duas, petroselini — I. cerę libram I. nardi libram I. mastiches uncias I. resinę frictę pondo S. resinę terebinthinę uncias duas, quę liquida erunt, & quę tundenda, similiter ut suprà scriptis speciebus facies; & similiter medicamen usque ad horam prandij uteris.

Item aliud epithematium, quod arete dicitur, quod facit ad uetustas causas stomachi, accipit hęc. cardamomi unciam unam, libani unciam unā, cerę unciam. V. I. resinę uncias quatuor, styracis uncias duas, olei cyprini unciam unam, uini ueteris heminam, cardamomum, & libanum semotē tundendum, & cribrandum, styrax uino infundendus, & reliqua quę remittenda sunt, lento igne soluenda, & tum simul omnia permiscenda; quod epithema similiter linteo, aut phoenicio inducendum, & sic ad uiscera adponendum. & in horam prandij, si non fatigauerit, habendum; ita tamen, ut aduerso pectore cuiuslibet pueri tepesactum ponatur. Intyba decocta in cibo sumpta, aut eorum aqua pota, stomachum purgant.

Herbam uettonicam mense Augusto lectam cum semine, & radicibus suis, sed sine ferro erutam, arefactam diligenter, & excussam, ne terram habeat, contundes, & cribrabis, ac pulueris eius tenuissimi cyathos duos, cum aquę sextarijs sex in olla noua ad tertias decoques, ollamque ipsam opertam sub diuo repositam habebis; ex qua si quando stomachi ardore concitabuntur, coëlearia duo, aut tria laboranti glutienda dabis, mire subuenies.

Herbę uettonicę fasciculum, herbę nepetę, ac pulegij uirgulas singulas, & salis paululum, cum uini ueteris heminis tribus in olla rudi usque ad heminam decoques, & ieiuno stomachico manē coëlearia singula, aut eo amplius dabis.

Quotiens stomachi morsus sentire coeperis, glycyrrizę succum de furculo eius trahito, aut ipsam sub linguam ad magnitudinem cicerculi habeto, nec dolorem stomachi, nec sitim senties.

Lac bubulum tepidum incoctum, subinde sumptum, exulceratum quoque stomachum sanabit. Coëlea cruda deuorata, ita ut dentibus non tangatur, stomachum curat, certē languentem si per triduum sic sumatur, emendat.

Coëleas sed ueras africanas conditas ex sale, & paulo olei coctas, sed non purgatas, qui ieiunus ternas, aut quinas quotidie, & frequenter sumpserit, rarissimo stomachi dolore uexabitur. certē si carbonibus toste sumantur, melius profunt. Si quis cymini triti ex melle ternas coëlearia quotidie ieiunus accipiat, stomachi dolore mire carebit.

Stomacho remedium optimum de experimento tale est. petroselini uncias tres, salis uncias duas, nardi spicę unciam, amomi uncias duas, hyssopi — II. uettonicę uncias duas. hęc omnia in cucumam fictilem nouam mittes, quę sit sextariorum nouem, eamque aqua supplebis, & obturabis, ut modicum spiramenti relinquant, & decoques ad tertias, ac denuo aqua supplebis, & rursus ad tertias decoques. tunc adijcies mellis optimi despumati quartarium, & tertia uice ad medias decoques, ac postea in uasculo uitreo, aut fictili recondes sub signaculo, atque ex eo aduersum stomachi laborem terna coëlearia ex aqua calida, si febres erunt, aut ex condito ieiunus, si non erunt, sumes.

Ne stomachus perfrigescat, unctio saluberrima hęc est. foliorum lauri, & baccarum, foeno gręci, samfuci, cupressi, roris marini, uncias singulas contundes, & in uini ueteris sextarijs V. per triduum macerabis, quarto die olei boni sextarios tres adijcies, & in olla nudi ad prunas non acres, ita decoques, donec uinum consumatur; tunc colabis, & excrementa, uel sordes abijcies, & rursus ollam cum medicamine ad tenues prunas repones, eięque addes cerę nitidę libram, resinę terebinthinę purgatę selibram. hęc omnia permixta, & coagitata, ad modum ceroti recondes. & cū opus fuerit, non solum ad stomachi, sed etiam ad neruorum, & musculorum perfrictionem uteris saluberrimo unguento.

Antidotum Hadriani, quo utebatur Cæsar Augustus; quę potio dat omni corpori fortitudinem; quisquis enim ea usus fuerit, nec stomachi, nec iocineris, nec splenis, nec cordis, nec lateris, aut pulmonis, aut coxarum dolores patietur, sed nec tussim, nec perfrictiones, nec spasmos, nec coli dolores sentiet, nec dysentericus, nec hydropicus, nec suspiriosus, aut cholericus erit. facit etiam hoc remedium contra omnes humores noxios, & omnia uenena, uel maleficia in cibo, aut in potionibus data. compositio ergo eius est talis. foeniculi seminis, cymini, gummis thebaici, phu, pulegij, origani, piperis albi, herbę fabinę, petroselini, cedri seminis, chamedropis, cassię bonę, iouis barbę, rapę seminis, nardostachyos, iunci seminis, euforbij, echyos radice, hoc est capsellę, cyperi, pyrethri, trifolij seminis, quo mulieres utuntur in capite, amomi, serpylli sicci, gentianę, aristolochię longę, rutę agrestis seminis, omnium suprà scriptarum specierum uncias singulas. Item rutę radiculam, quę facit ad porcorum incommoda, agni radicem, hociamfani siue agrimonię radicem, dracontę

radicem, quæ radix est quasi costum, & beneolet, acori radicem. harum specierum singulas semuncias adpendes, & omnia, uel infra, uel supra scripta diligenter tunfa, & cribrata, in puluerem tenuissimū rediges, ac postea cum melle attico, quantum ad spissitudinem sufficiat, permiscebis, atque ex eo, cum opus fuerit, quanta auellanz est magnitudo, ieiuno dare debebis.

Confectio aceti dialcilliu, ad digestionem, & stomachi uitia sic. scillam fumes, & inde tolles durissimam quæque, & proijcies, deinde omnia tenerrima concides minutè, ut habeant libram semis, eamque crudam conijcies in aceti congiū unum acerrimi; & cum diu macerata fuerit, & combiberit, tolles scillam, & exprimes, idque acetum percolabis, & in uas bene picatum repones, eiusque aceti ieiunus mane si sorbeas singula, uel bina coſlearia, stomachum curabis. & quod ad oris olidi ualitudinem attinet, hoc medicamento odor malus emendabitur; & si in naso polypus fuerit, hoc aceto gargarizato eijcitur. quod quidem acetum, & ad claritatem oculorum, & ad auditum aurium optimum est, si assidue gargarizetur; ad uocē quoque, & ad suspirium, & ad splenem, optimum remedium est, si quis autem inde ad diem sorbeat, uel dimidium cyathum, colorem optimum habebit, & facilius suspirabit, & cibum melius conficiet.

Nam si quis multum comederit, & non coxerit, & cibus ei in stomacho inacuerit, sorbeat de hoc medicamento, continuo desinet crudus esse, ut scias uerò quantam uim habeat, etiam caducis datum prodest.

Nam si uel duos cyathos caduius inde sorbeat, & currat passus milleducenos quinquaginta ieiunus, mire remediabitur, si uel tertio, aut quarto die id acceperit. quod si quis erit in accipiendo quotidie patiens, penitus carebit hoc morbo. hoc medicamen, & uentos eijcet, & uenas purgat. Nam is morbus ex uentorum multitudine mouetur. frigeſcit enim corpus de imparatione, & nauſeam facit, & uomitus mouet.

Si quis ergo hoc sumat, omnem escam, & potionem bene concoquet, & nulla res ei nocebit. ac si uoles hoc emamine phthiſim sedare, adde uini dulcis paululū, & sic dato mixtum sorbere ieiuno. si quis sanguinem exereabit, hoc medicamine accepto, facile eijcet omne moleſtiam, & uenæ ei purgabuntur; quodque ad pulmones, & arterias corruptas attinet, per uomitum sanabitur, si hoc medicamento utatur assidue. & si quæ aqua intercutis tenebit, id est si hydropicus erit, sanabitur; faciliusque curabitur, si recens morbus fuerit.

nam per urinam illam cito digeret, & quod ad splenem attinet, extenuabitur. oportet ergo prius uidere, unde quis morbus ueniat. si a splene erit, uenter soluetur, aut crura turgebunt. dari itaque oportebit mane ieiuno duos cyathos, certe, uel unum cyathum, si satis infirmus erit dato. quod si ab iecore erit morbus, mellis cyathum, aut passi commiſcēs cum cyatho eius aceti, idque per dies aliquot dabis; primum nanque sudoribus uehementissimis, postea etiam urina multa purgabitur, deinde cibum, & potionem libentissime fumer, omniaque cito concoquet.

Ad stomachi dolorem arcendum, cymas sinapis uiridis ex aqua diligenter coques in olla noua, easque conditas oleo, & liquamine manducabis; sane obserua, ut paululum salis mittas, dum coquuntur, propter Bromum. Mel, rutam, cyminum, piper, simul tere, & utere pro oxygano ad inhibendum stomachi dolorem.

Papauer nostrate cū lacte suo simul decoques in aqua, & ipsam aquam diligenter colatam, stomachico cum melle attico potui dabis. Iris tunſæ heminam, cyperi tunſi heminam, in uini aminæi sextarium infundes, ut una nocte macerentur, deinde addes refinæ terebinthinæ — I X. ceræ — I I I. quas cum olei cyprini ſelibra liquefacies; deinde simul omnia miscebis, & manibus subiges, atque malagmatis more stomacho laboranti adpones.

Ceram, adipem anserinam, & butyrum in se decoque, & in panno tenui stomacho calidum adpone, confestim dolori stomachi subuenias.

Peucedani radicem contritam ex uino qui frequenter biberit, nec stomachi dolorem, nec pulmonis inflationem patietur.

Item ad stomachi dolorem, perfici folia uiridia teres, & cum axungia uetere purgata subiges, atque in panno ad stomachum pones. idem præstat mentastrum, quod supra ripas nascitur similiter impositum.

Oxiporium cydonite, quod facit ad stomachum, & tussim, empneumatosis quoque soluit, & digestionē citissimam præstat; conficitur sic. cydonea matura purgabis de foris, & deintus, & pensabis ad pondo tria, coquesque ex mulſo in olla rudi; & cum fuerint cocta, eijcies de olla in catinum, uel mortarium, separabis deinde succum illum, quem excocta dimiserint; postea remittes cydonea ipsa in ollā, & tunc addes ibi acetum pondo duo, mellis optimi pondo tria, mali granati expressi sextarium unum; coques postea lento igni, donec unum corpus fiat, & habeat mellis spissitudinem; postea autem refundes illud in mortarium, & teres diutissime, donec omnis duritia dissoluatur. & dum teris, summatim adijcies semunciam zingiberis, & piperis triti — I I. petroselini — I. & simul iterū discoques; ac postea miscebis mulſam, ubi cocta fuerint cydonea, atque ita in uasculo uitreo recondes, & cum opus fuerit per coſleare ieiunus accipies.

Stomachi, & capitis dolores, tussim quoque, lōgasque ægritudines curat, & dyſentericis medetur, leptopyrexias sanat, dolori etiam faucium, & synanchæ succurrit; tale medicamen. piperis albi — I. S. mellis attici — I. S. afari — I. uettonicæ, saxifragæ, cassiæ fistulæ, pondus ut supra. hæc omnia trita cum despumato melle miscebis, & dabis coſleariū grāde plenū ex cōdito mixtū, febricitanti uerò ex aqua calida. Antidotū multiplex ad multa remedia, recipit hæc. croci scrupulos X V. piperis albi — II. S. amomi semunciam, piperis semunciam, dauci cretici semunciam, folij malabathri, nardo stachyos, cassiæ, apij seminis, euforbij, rutæ seminis, petroselini, rosæ siccæ, opij, singulas semuncias, opobalsami — V I. mellis boni P. I L cinnami — C. si non fuerit cinnamum, mittes cassiæ fistulæ duplum pro eo; & hæc omnia tunfa cribrabis cribello tenui, & sic miscebis, opium cum melle, & mitte in mortarium, & diligentissime teres, donec unum corpus fiat; ac sic omnia permixta mittes in doliolum uitreum. cum opus fuerit, ex hoc colicis fabæ ægyptiacæ magnitudine cum aquæ frigidæ cyathis tribus potui dabis; Iocinerosis, qui iecur grauitè dolebunt, cū uino mulſo dabis,

dabis, ut supra scriptum est: epilepticis, quos caducos dicunt, dabis ut supra. pleuriticis cum aqua mulsæ dabis cyathis tribus: Stomachum dolentibus, cum posca cyathis tribus: dysentericis, qui persoluto

entre sunt, cum aqua frigida dabis: periodicis febribus qui laborant, id est accessionibus diurnis, & nocturnis, cum aqua calida dabis: quibus dentes dolent, & quibus sanguis de gingivis defluit, cum posca frigida, aut cum uino dabis, ita ut resolutum in ore teneant: splenicis ex posca dabis: Paralyticis ex aqua calida: præcordia dolentibus, itidē ex aqua calida: tortiones uentris qui patiuntur, ex aqua calida dabis: moriunculas leues qui patiuntur, ex aqua calida dabis: Secundas etiam mulieribus, quæ ex partu, uel ex abortu remanserint, discutiet, si ex succo foenograci coctū, uel ex mulsā, bibendum detur: Apostemata etiam

& omnia intrinsecus collecta expurgat, ex mulsā datum, uel ex foeni graci succo: Sicca uerò tussi laborantibus, ex melle solo dabis: Ad uiam stillantem ex mulsā gargarizandum dabis: ijs uerò qui fungos uenenatos comederint, cum oxymellis cyathis tribus dabis: Venenum si quis biberit, ex succo

prilanz resolutum accipiat. In omnibus sane passionibus triduo continuo dabis. si necesse fuerit, iterum alio triduo dabis: omnibus sane quantum fabæ ægyptiæ granum est, dabis. Confectio potionis ad omnem sanitatem utilis, & ad stomachi confirmationem, accipit hæc: lauri baccarum purgatarū unciam unam, myrræ — I. gentianæ — I. aristolochiæ rotundæ — I. puluerem tenuissimū ex ijs speciebus separatim rursus facies, & postea permiscebis, & repones: & cum uti uolueris, coctileare unum cum

potione calidæ aquæ ieiunus accipies, & interpositis diebus cum uolueris, iterum accipies. Primo uere tamen incipies hac potione uti, & deinde quomodo uolueris, per tempora triduo continuo uteris. Antidotum quod facit ad omnes dolores internos, & ad stomachum confirmandum, recipit hæc: apij seminis ꝑ XXI. anethi seminis ꝑ IX. castorei ꝑ VI. piperis ꝑ III. opij ꝑ III. myrræ ꝑ III. hæc omnia separatim tundes, & ex melle optimo temperabis, & cum uolueris dare potionem, in modum fabæ globulos facies, & dabis ex condito, siue uino uetere, sed si febricitauerint, ex calida aqua. hæc confectio dicitur athanasia, facit ad lateris, & ad coli, præcipue ad stomachi dolorem. Lini seminis, & foenograci, & foeniculi farinæ, singuli sextarij cum aqua mulsā decocti, & in panno stomacho laboranti, & uisceribus duris adpositi, plurimum prosunt. Ad eos, quos subito linguit animus, & quibus mens alienatur, aut uertigo est, coctile cum suis testis tritz incoctæ, ita dantur per dies quinque, ut prima die coctile una, cum passi cyatho potanda detur: alia die duæ, cum duobus cyathis, tertia die tres, cum tribus cyathis, quarta die duæ, cum duobus cyathis, quinta die una cum cyatho uno. Potio efficacissima stomachi remedio, sic: apij seminis drach. VI. petroselini drach. III. spicæ nardi drach. III. myrræ drach. III. piperis longi drach. V. contrita uniuersa hæc diligenter in unū miscentur, deinde adijcitur mellis optimi despumati quod satis sit, atque in uase uitreo mixta seruantur. inde cum opus fuerit, post balneum drach. III. aut etiam minus, si infirmior erit qui accepturus est, ex aqua calida, uel ex mulso, in potione dabuntur.

Porri capitati excocti in cibo sumpti cum aceto, plurimum prosunt stomacho laboranti. Vrticæ semen coctum iuuat stomachum, si cum pane manducetur, & cum iure suo. cydonea quoque incocta, in melle semata, ieiuno data plurimum prosunt. Thalassomeli quod inuicidissime & inflationes deponit, & uentrē purgat, sine stomachi uexatione. est enim, & odore, & sapore gratissimo, quod hoc modo fieri debet: aqua marina ex alto, id est de profundo, uel aqua cælestis cum sale mixta, pari mensuræ mellis optimi despumati permiscetur, & seruatur in uase fictili: & cum opus fuerit, tepefacta potui datur. Purgatorium efficax, quod nec stomachum uexat, nec caput grauatur, & bilem deducit. lactis caprini sextarium, salis ammoniaci — II. mellis optimi — I. in unum omnia diu cōtrita, & permixta ieiuno potui dantur. sed post potionem diu inambulare debet, ut ipsa potio melius motu corporis proficiat. Sambuci liber inter corticem, & furculum rasus, & tritus, adque nucis iuglandis magnitudinem ex aqua, uel mulso potus, miro modo detrahit bilem, ac stomachum releuat.

Vettonicæ herbæ folia in umbra arefacta contunde, & cribra, atque ex eo puluere paululum, & mellis decocti cyathum unum permisce: atque inde post coenam ad magnitudinem ciceris transglutendum dabis ei, qui cibum euomit statim, & non potest continere.

Radice ficulneam uini ueteris cyatho uni in rade, & priusquam coenes, uel cubitū eas bibito, si uitio stomachi laborabis. Laferis ueri modicum ex aquæ frigidæ cyathis quatuor dilue, & dormitum iturus bibe, ut cibum bene concoquas: aut eius radicem gustato dormitum uadens, idem tibi præstabit. Ro-

rem marinum ieiunus commanducet, aut in aqua calida excoctum bibat, qui crudiratem patietur, statim remediabitur.

Compositio potionis ad dolorem stomachi, siue ad nauſeam reprimendam, sic: herbæ mandragoræ, quæ nascitur in locis montanis, succus expressus ad ponderis scripulum dimidium, potatus quæ ex aqua calida, uel ex mulsā, nauſeam expellit, abundantiam phlegmatis purgat, sedatque dolorē stomachi, & fastidium discutit. ultra hoc autem pondus ne dederis, quia nullius stomachus uim eius poterit sustinere.

Pulegium cum oxymelite decoctum, ad mensuram hemina tepefactum ieiuno, & digesto dabis bibendum, non solum stomachum reficies, sed etiam si circa cor aliquid erit uitij, eadem potione sanabitur.

Ad stomachum componendum uteris remedio tali satis commodo. rutam, apium, anethū, cyminum, æquis portionibus coques cum uini ueteris sextarijs duobus, postea addes olei amari 8. I. & iterum coques, uel aliquandiu combullire permittes, atque inde cum utcumque resederit seruor, per globum lanæ fuscæ stomacho quod sufficiat infundes, ita ut postea densus lanæ floccus supra stomachum iacentis ponatur: Post horam quā hoc feceris de nardo tepido stomachum perfricabis, & de fabano molli leuiter detergebis, deinde infirmum deambulare facies. Confectio epithematij, quod stoma-

chi uetustas causas emendat, & ad digestionem confirmat. ceram, seuum taurinum, medullam ceruinam,

etiam si circa cor aliquid erit uitij, eadem potione sanabitur.

Ad stomachum componendum uteris remedio tali satis commodo. rutam, apium, anethū, cyminum, æquis portionibus coques cum uini ueteris sextarijs duobus, postea addes olei amari 8. I. & iterum coques, uel aliquandiu combullire permittes, atque inde cum utcumque resederit seruor, per globum lanæ fuscæ stomacho quod sufficiat infundes, ita ut postea densus lanæ floccus supra stomachum iacentis ponatur: Post horam quā hoc feceris de nardo tepido stomachum perfricabis, & de fabano molli leuiter detergebis, deinde infirmum deambulare facies. Confectio epithematij, quod stoma-

chi uetustas causas emendat, & ad digestionem confirmat. ceram, seuum taurinum, medullam ceruinam,

etiam si circa cor aliquid erit uitij, eadem potione sanabitur.

Ad stomachum componendum uteris remedio tali satis commodo. rutam, apium, anethū, cyminum, æquis portionibus coques cum uini ueteris sextarijs duobus, postea addes olei amari 8. I. & iterum coques, uel aliquandiu combullire permittes, atque inde cum utcumque resederit seruor, per globum lanæ fuscæ stomacho quod sufficiat infundes, ita ut postea densus lanæ floccus supra stomachum iacentis ponatur: Post horam quā hoc feceris de nardo tepido stomachum perfricabis, & de fabano molli leuiter detergebis, deinde infirmum deambulare facies. Confectio epithematij, quod stoma-

chi uetustas causas emendat, & ad digestionem confirmat. ceram, seuum taurinum, medullam ceruinam,

etiam si circa cor aliquid erit uitij, eadem potione sanabitur.

Ad stomachum componendum uteris remedio tali satis commodo. rutam, apium, anethū, cyminum, æquis portionibus coques cum uini ueteris sextarijs duobus, postea addes olei amari 8. I. & iterum coques, uel aliquandiu combullire permittes, atque inde cum utcumque resederit seruor, per globum lanæ fuscæ stomacho quod sufficiat infundes, ita ut postea densus lanæ floccus supra stomachum iacentis ponatur: Post horam quā hoc feceris de nardo tepido stomachum perfricabis, & de fabano molli leuiter detergebis, deinde infirmum deambulare facies. Confectio epithematij, quod stoma-

chi uetustas causas emendat, & ad digestionem confirmat. ceram, seuum taurinum, medullam ceruinam,

etiam si circa cor aliquid erit uitij, eadem potione sanabitur.

axungiam ueterem, resinam terebinthinam, horum pondera singula æqualia mittes, deinde adijcies mellis — IIII. mastiches uncias tres, quæ liquanda fuerint liquabis, & quæ tundenda, tundes: & sic confectum medicamen in linteo adponetur stomacho, quod ante momentum prandij subtrahi conuenit. Item aliud epithema, quod efficaciter prodest stomacho, & uisceribus. storacis — I I. aloes — I I. petroselinæ — I. ceræ libram unam, nardi P. I. mastiches — I I. resinæ frictæ P. S. resinæ terebinthinæ — II. quæ liquanda sunt, liquabis, & quæ tundenda, tundes, & permiscebis, & sic confectum medicamen similiter linteo inductum stomacho adpones. Ad confirmandum stomachum, uel conseruandum, si quis infirmus habet de quartanæ labore, epithematium tenue, axungie porcine, butyri, resinæ frictæ, herbæ sabine, ceræ rufæ libras singulas, cerussæ — I I I. ceræ ponticæ — I I I. hæc omnia seorsum parata miscebis, & simul decoques, & sic uteris. Descriptio polyarchij ad stomachum post diutinas febrium molestias componendum. cassiæ — I. rosæ siccæ — I. cyperi — I. cardamomi — I. nardostachyos — I. nardi celtici — I. malabathri — I. iris illyricæ — I. cenanthes — I. mastiches chiæ — I. croci — I. amomi — I. meliloti — I. absinthij — I. costi — I. guttæ ammoniaci — I. aloes — I. furis — I. myrræ — I. bdellij drach. V I I I. styracis drach. X. in uino infusæ, xylobalsami drach. I I I I. schœnianthus drach. I I I I. resinæ terebinthinæ drach. X L V I I I. nardomyri drach. L X I I I I. ex quo cerotum facies adiectis olei rosei drach. L X V I. ceræ ponticæ drach. C X X V I I I. opobalsami drach. X V I. hæc omnia tunsa cribrata, & cætera uino optimo madefacta, simul in mortario colliges, ex quibus trochisci, uel madgalia fient. ceroto uero facto, uel puluis supra scriptus, uel ramenta miscentur.

Cordis dolori, & corco, & præcordijs, remedia rationabilia diuersa de experimentis.

Cap. XXI.

Præcordiorum dolorē catuli lactentes admoti uisceribus humanis, transferre in se adferuntur, idque exenteratis perfusisque uino deprehenditur uitiatu eorū uisceribus. Ad corcum, carmen in lamella stagnæa scribes, & ad collum suspendes hæc; ante uerò etiam cane. corcu nec megito cantorem. utos utos utos, præparabo tibi uinum leue, libidinem discede anonnita. In nomine dei Iacob, in nomine dei fabaoth. Item ad id aliud carmen; corce corcedo, stagnæ, pastores te inuenerunt, sine manibus collegerunt, sine foco coxerunt, sine dentibus comederunt. Tres uirgines in medio mari mensam marmoream positā habebant. duæ torquebant, & una retorquebat; quomodo hoc nunquā factum est, sic nunquā sciat illa gaisæia corci dolorem. Ad cordis dolorem, uel ad eos qui lumbricis in corde uexantur. aquam maluæ cum melle pari mensura permixtam tepidam ieiuni bibant. Ad cordis dolorem, herbæ erythrodani, id est caulis purpurei, hoc est marini, uel sisymbriæ succum, ad plenitudinem conchule oblongæ, quam Græci telynefi, alij chemam macram uocant, cum aqua calida prope noctem dormitum uadens bibat. Pinus uiridis aciculæ contritæ, ex uino optimo potui datæ, cordis dolorem sedant, ita ut qui potionem acceperit pinguibus escis abstineat. Dolorem cordis leuat cymini æthiopici com-manducati succus frequenter transmissus. Aduersum cordis pulsus, uel dolorem, mirum remedium quod in lamella stagnæa scribes, & phylacterium de styrace subfumigabis, & in collo ex licio suspendes, ita proderit, ut stupeas. Ad dolorem præcordiorum cataplasma egregium. lini seminis sextarium unum, foeniculi seminis sextarium unum ex aqua multa decoques, & in panno calido præcordijs sæpius applicabis, mirè proderit. Cerotum ualde efficax ad cordis dolorem, ceræ selibram, olei cyprini selibram, absinthij pontici selibram, absinthium tundes, ceram remittes, & permiscebis, ac pro ceroto uteris. Qui præcordiorum ardore uexantur, si etiam febres, & lumbricos habeant, hoc remedio sanabuntur. ouum crudum suminitè apertum exinanies, idque implebis oleo uiridi, & defundes, & lotio uirginis pueri implebis, & defundes; tum adijcies parum mellis, & in unum cum oui ipsius interioribus permiscebis, & potandum ieiuno dabis. hoc & stercus uetustissimum, & lumbricos noxios pellit, & febrem acutissimam releuat. Bulbi excocti triti in liti, tumorem præcordiorum, & uentris emolliunt. Item proficies, si ocimum triueris, & eo præcordia spissius inleueris. Foeniculi farina cum pari mensura mellis decocta, ceroti modo, panno inlinitur, & calens tumori præcordiorum imponitur. Malagma ad præcordiorum tensionem, & uentris, ac stomachi duritiem diutinam cum dolore, quod & iecori, & lieniprodest, conficitur sic. ceræ P. I. guttæ ammoniaci P. I. iris illyricæ denarios X X I I. opopanax denarios X X. anesi denarios X X V. fenogræci seminis X X V. resinæ terebinthinæ P. I. adipis suille ueteris P. I. aceti acris 3, I. mellis P. I I. mel cum aceto permiscendum est, atque illic arida omnia die, & nocte maceranda sunt: Terebinthinam uerò, & ceram, & adipem liquefactam in unum cæteris admiscere oportet, & deinde manibus diutissime subige, donec sine offensione malagma temperatissimū fiat. Ad cordis pulsus, siue salissationem, succinū uerum mittes in aqua feruentem, & illic esse patieris, atque inde per triduum laboranti singulos cyathos repfectos, si nimium erit frigus dabis bibendos, hoc remedium & hominibus, & animalibus prodest.

Ad hepatis siue iecoris uitia omnia, & molestias uniuersas, remedia rationabilia, & physica diuersa, de experimentis.

Cap. XXII.

Putæ siluestris manipulo, in ollam nouam coniecto decocto quæ ex tribus heminis aquæ ad heminā, adijcies mellis librā, rursusque feruefacies; ex eo per triduum ieiuno potum dabis iocineris dolore nimio laboranti.

laboranti. Hircinus sanguis adhuc calens supra prunas excoctus, & cibari datus ieiuno, iocineroso mederi traditur. Viueria tosta, porcelli lactentis modo inassata, & cibo data ieiuno, mire iocineroso succurrit. Hepatice experta sic. piper album & mastichen equis portionibus tundes & cribrabis, rursusque in mortario teres, atque ita oleo hispano optimo temperabis, ut sit spissum. inde catapotia facies magnitudine ciceris, atque in sole siccabis, ut durecant. tunc in pyxide recondes, & ex his unam pilulam ieiuno in ovo forbili dabis, adijciesque parum salis, sed per triduum dabis. Tumori iocineris adprimere medetur hoc remedium. inulæ radices uncias tres, quæ Græce dicitur helenium, decoques ad medias in aquæ sextarijs tribus, atque heminam ex ea ieiuno in dolore bibendam dabis, idque per triduum facies. Ad ueteres iocineris dolores, portio optima sic. nardispicæ V III . croci II . myrræ III . cassiæ V III . schoeni V III . omnia trita & cribrata, melle optimo comprehendes, & dabis ieiuno in potione III . ex aquæ mulsæ cyathis III . quousque uitium extirpes. Ad tumorem iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic. petroselinum, costi, chamæpitrys, æqua pondera tundes, cribrabis & dabis ieiuno, hepatico duo coëlearia cum aqua mulsæ. Melanthium id est git, quantum coëleare recipitur, cōtere, & da cum uino tepido dulci bibendum ieiuno, hepatico. Nimum laudatum iocinerosis remedium, sic. picem duram conterere, & ex ea da potandum ieiuno, hepatico coëleare unum cum uino austero. In lamina stagnæa scribe. Ite *epum*, & desuper nomen eius iocinerosi, cui mederi uoles, scribe: laminam uero licio ligatam collo eius suspendes, mundusque id facito. Absinthij florem, cassiam, crocum, nardispicam, assarum, schoeni florem, folium, mastichen, xylobalsamum, amomum, cinnamomum, ad drachmas septenas, aloes indicæ drachmas V I . tundes & cribrabis singula separatim, eademque miscebis, atque inde coëlearia bina ieiuno, hepatico cum mulsæ aqua tepida aut uino uetere austero per triduum dabis; quod remedium & ad digestionem, & ad crapulam deponendam facit. Antidotum ad hepaticos sic. pelecini seminis, eupatorij, iocineris lupini, picis brutæ, costi, fœnogreci, piperis: paria hæc tundes, cribrabis, & melle comprehendes, atque inde catapotia ad ciceris magnitudinem ex aqua calida dabis. Antidotum philonium ad iocineris & ad omnium uiscerum intrinsecus dolorem sic. croci drach. V . pyretri drach. I . piperis albi drach. XX . hyoscyami drach. XX . euforbij drach. I . nardi indicæ drach. I . opij drach. X . quæ sunt sicca, tunduntur; cetera in mortario conteruntur, & permixta melle comprehenduntur. Hæc portio his modis ieiunis danda est: coeliacis & colicis, qui sine febre erunt, ex aqua frigida; febriculentis ex aqua, in qua anethum ad tertias decoctum fuerit. in declinatione uero febris, ad magnitudinem auellanz spleneticis ex aqua cum appare decocta cyathis tribus, magnitudine qua supra hepaticis dimidium auellanz modum, febriculentis ex hydromellis cyatho, uel ex aqua mulsæ, in qua anethum cum furculis suis fuerit decoctum. orthopnoicis, magnitudine auellanz remissa in aceti scillitici coëlearibus quatuor, ex aquæ calidæ cyathis quatuor. ad spasmodum & cordis dolorem uel tremorem, ex aquæ mulsæ cyatho magnitudine auellanz: Ad lateris dolorem, ex aqua mulsæ magnitudine auellanz, contra noctem dabitur. ad singultus & quibus frigus etiam estate infederit, ex aqua mulsæ, modo auellanz. phthisicis ex succo ptisanæ, uel ex mulsæ cyathis tribus, modo auellanz. dysentericis ex posca cyathis duobus, modo ciceris arietini. Auriginosis ex aquæ mulsæ cyathis duobus, auellanz duplum. dysuriæ & calculo ex aquæ cyathis tribus, in qua tres manipuli apij fuerint decocti, magnitudine auellanz. Potio ad hepatis utilissima; præterea hæc, ipsa compertum & præsentaneum remedium est, etiam ad lateris dolorem. accipit hæc. piperis — I . costi — I . lupini sicci amari — I . hæc omnia sicca tinsa, cribrata, mixta simul repones; cū opus fuerit, unum coëleare plenum, uel si uires infirmiores sunt, rasum id est rudatum, cum uino austero, ieiuno, hepatico per dies tres uel quinque continuos dabis: ita ut in eo latere complicatus aliquandiu iaceat, & cooperiat se fagis: & cū coeperit sudare, leuet se & deambulet diu. Item expertum atque utile ad hepatis remedium, de folijs fici aridis, id est siccatis sub umbra & arefactis, tritis cribratisque; de quo puluere cum condito ad mensuram tria coëlearia accipiet hepaticus ieiunus, & in eo latere diutule iacebit, deinde ambulabit; & per triduum continuum hoc medicamen accipiet, similiter obseruans. Prodest mirifice hæc compositio ad tumorem & dolorem cum duritia iocineris & lienis: item ad renium dolorem benefacit: nam & colorem corporis restituit, qui propter uitia supradictarum partium corrumpitur, pallidusque conspicitur prodest hoc idem medicamentum, etiam ad aquæ mutationes, id est ad hydropem. conficitur sic. croci X . nardi X . cassiæ II . costi I . S. schoeni X . cinnami X . myrræ stactæ X . mellis optimi XXV . datur ieiuno quanta faba est ægyptia, ex mulsæ cyathis III . Remedium efficax ad iocineris duritiam ueterem, quod & hydropicos, & lienosos, & arquatos, & quibus opus est moueri urinam, potentissime sanat. muliebribus quoque causis prodest; nam & ex partu residua purgat, & matris tumentibus prodest. perducit illud, id est potari, ex mulso uino oportet; conficitur sic. aneli IX . dauci III . petroselinum idem, iuniperi idem, filis idem, tragacanthi I . S. panacis radices VIII . iris, myrræ, costi, amomi, singulorum denarios senos, cinnami III . cassiæ VI . smyrnij, quod est semen holeris atri VII . nardi syriacæ III . acori VII . balsami seminis VI . opij V . enuimoliti I . scillæ costæ I . uini chij aut lesbij quod satis erit. pastilli ex his in puluerem redactis, sunt denariorum duum uel trium, & dantur cum opus est ex mulso ieiuno & digesto. Antidotus, quæ zopyre dicitur, facit non solum ad iocineris, sed & ad lateris, & ad pectoris, & ad uesicæ dolores & ad tussim ueterem, & ad hydropicos, & arquatos, & lienosos, & ad eos qui mala medicamenta sumpserint, quæ siue postea data, siue ante pota fuerint, per hoc remedium non nocebunt; conficitur sic. myrræ VII . S. nardi syriacæ V . S. croci I . S. schoeni II . cassiæ III . cinnami VI .

ad hep. tumore. a. d. i. r. r.

ad hep. tumore. a. d. i. r. r.

Tuta, mel, aqua, sanguis iocineris, piperis, costi, mastichen, xylobalsamum, amomum, cinnamomum, ad drachmas septenas, aloes indicæ drachmas VI. tundes & cribrabis singula separatim, eademque miscebis, atque inde coëlearia bina ieiuno, hepatico cum mulsæ aqua tepida aut uino uetere austero per triduum dabis; quod remedium & ad digestionem, & ad crapulam deponendam facit.

Ad tumorem iocineris

Ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

Ad iocineris & ad dyspnoeam, remedium sic.

LIBER

piperis albi * I. piperis longi * I. turis * I. scordij * III. polij * III. rosæ aridæ * III. rapæ seminis * III. anatis sanguinis recentis * III. eiusdem aridi sanguinis * III. melle misce-
tur contusa & cribrata omnia, donec habeat ipsius mellis temperaturam; inde plenum coëquare datur; sed
a serpente percussis, aut morsis, ex uino, ceteris ex mulso uel aqua dari oportet. Malagma ad omne

uiscerum dolorem, præcipue ad iocineris stricturas, conficitur sic. nardi celtice id est saluince * X I. iuris
* VIII. meliloti, quod a nobis sertula campana dicitur * XXV. cyperi * VIII. ammoniaci
rhymiamatis, & styracis * VIII. cardamomi * VII. croci idem. omnia supra dicta contusa &
cribrata, uno die & nocte in uino uetere macerantur, præter ammoniacum, hoc enim aceto dilui oportet.
post hæc, ceræ P. I I. resinæ frictæ P. I. olei rosei P. I I. uel tria, ut sufficiens uisum fuerit addentur, lique-
fiunt quæ liquefieri debent, & refrigerata atque rasa ceteris miscentur, atque unum corpus ita fit, ut dili-
gentissime subigantur. hoc & ad præcordiorum tensionem benefacit, & ad uescicæ dolorem. Attali

regis medicamentum, quod facit præcipue ad iocineris uiria, & ad auriginem, & ad aquam intercutem, &
ad lienosos, & ad præcordiorum inflationem, & ad pectoris dolorem, & ad eos qui colorem luridum ha-
bent; conficitur sic. croci * X. nardi indicij * II. casisæ * II. myrræ * I. cinnami * I. schoeni
floris * I. costi — I. hæc scorsum contunduntur & cribrantur, deinde ex singulis eorum. supradictis
pondera sumuntur, & in unum melle mixta colliguntur, atque in pyxide argentea reponuntur. inde da-
tur, cum opus est fabæ ægyptiæ magnitudo cū mulsi cyathis tribus, si sine febre fuerint, qui sumpturi sunt;
si febricitabunt, ex aqua multa dabitur. prodest etiam calculosis hæc compositio, sed ad omnes causas ie-
iunis & maxime digestis opportune dari debet. Ad dolorem iocineris, physicum remedium, sic. calcu-
lus siue lapillus, qui a calculoso fuerit eiectus, super iecur dolentis alligatus, statim proderit. Glycia

potæ & uentrem laxabit, & iocineri proderit, & digestionem stomachi opitulabitur; quam glyceam sic fa-
cies. aceri 8. I. mellis P. I I. aloes — III. fœniculi radices P. I I. quas sublata cortice diligenter sicca-
bis, & tundes, atque una nocte in aceto macerabis. postera uero die excoques ad medias & colabis; tunc
admiscebis mel & coques sufficienter; atque ab igne sublatum refrigerabis ut tepescat; postea aloem teres,
& miscebis; præterea apij uiridis pugnum plenum, & tantundem rutæ uiridis addes. hæc omnia ad spissi-
tudinem mellis cocta colabis & refrigerabis, atque inde coëlearia terna cum aqua calida ieiuno & digesto
per triduum dabis. Item ad iocineris dolorem, remedium sic. lupinum, absinthium, costum, fœnum
græcum, sed quod tostum sit, pari pondere hæc sicca tundes, & cribro medicinali cribrabis. unde ieiuno co-
ëquare propensum ex aqua calida per triduum dabis; quod intermissis aliquot diebus, rursus per triduum
similiter bibendum dabis. memento tamen ut fœnumgræcum diligenter torreatur, ut bene tundi possit,
& omnia obseruet, quæ infra scripta sunt, qui remedium accepturus erit. Iecur lupi sublatum luna

decrecente, in fumo ponitur, & cum siccatum est, teritur, inde particula trita miscetur pulueri equis por-
tionibus facto de fœnogræco, lupino, & absinthio & costo, ita ut ex eo, quod in se totum permixtum fue-
rit, mensura coëlearis cumulari detur ad diem non febricitanti ex uino mixto, si febricitabit, ex aqua: ita ut
per triduum, hoc medicamen ieiunus accipiat, & porrecto brachio in dextro latere uel semihora iaceat.
inde diutissime deambulet, & tardissime cibum sumat; & obseruet, ut illo triduo purissimus & digestissi-
mus sit, & frigidam non bibat, neque falsum aliquid aut dulce manducet. Violas agrestes siue silue-
stres conteres, & succum earum cum pari pondere mellis decoques, & ex eo coëlearia terna ieiuno ad diē
iecoritico dabis. ad lateris autem dolorem, si ex icoris causa fuerit, thymi scripulos duos, & aquæ quarta-
rium dimidium ieiunus bibet. Compositio medicaminis ad iecur, quod diatessaron dicitur: costi —

I. fœnogræci — I. inulæ radices — I. fœniculi radices — I. hæc omnia separatim diligenter tundes &
cribrabis, & delicatissimum puluerem mensurabis, & postea permiscebis; sed in sole omnia bene siccato,
antequam contundas, & in una portione coëquare plenum mitte. sano ex uino, febricitanti ex aqua cali-
da, uel ex multa aqua, ut uentrem soluat, potui ieiuno per triduum dabis, ita ut accepta portione in dextro
latere aliquandiu iaceat, & postea diu deambulet, & digestissimus cibos sumat. hoc remedio scitote nihil
esse præstantius, etiam si fœminis, sed non prægnantibus, detur. De medio osse sepiæ, quod est molle,
puluerem facies, & in mixtione conditi optimi iecoritico ieiuno per triduum dabis, ita ut in dextro late-
re aliquandiu iaceat cum acceperit, & postea diutissime deambulet. Ad iocineris dolorem, remedium
sic. intyborum succi hemina, aquæ cyathos tres miscebis simul, & calidum dabis, donec rotum triduo
perbibatur. quod si ex ipso dolore, cui medendum est, turgidus & indigestus fuerit, porrum capitatum
incoctum manducet. Gentianam ex passo decoques, & ieiuno iecoritico per triduum bibendam da-
bis. Piperis albi grana X L. salicis folia ad hanc mensuram, ut fasciculus inter digitos duos & pollicem

teneatur, cucumeris quoque quantum tribus digitis tollere potueris, contere in unum, & per triduum iec-
oritico ieiuno da ex aqua calida bibendum. Costi semunciam, aloes epatidis — I. mastiches gra-
norum — II. eupatorii — I. piperis — II. amomi semunciam, rhapontici semunciam. aloen & ma-
stichen simul teres & cribrabis bene. reliquas species in pila tundes, & cribrabis bene, & omnes postea in
unum confundes, & repones diligenter in pyxide qualicunque. cum uolueris potionem dare iecoris ui-
tio laboranti, in olla uel caccabo rudi, sed excocto, quartarium fœnogræci decoques. primam aquam fun-
des, cum feruere coeperit, & aliam fundes, cum feruebit. tertiam coques ad tertias, & repones uas, in quo
ad tertias decoxeris fœnumgræcum, cum succo & humore suo, & inde potionem in calicem mittes, & ad-
des de puluere suprascripto coëquare plenum. & quādo accipit is, cui medendum erit, digestus & ieiunus

accipiat, & acceptam potionem bene digerat; ita ut cū biberit, tenso brachio dextro iaceat in ipso latere,
& hoc

& hoc per triduum similiter faciat. hec potio iecoriticis etiam ueteres mire sanat.

centaurea ex uino decocta, ac potui ieiunis data, mirifice auxiliatur.

Epaticis herba

Herbz uettonicz in umbra

arefacte puluis, ex aqua calida cyathis duobus, ieiuno iecoritico potui datus, magnifice prodest.

Potio saluberrima ad epaticos, a Procliano medico ostensa. Ficatum lupi integrum folijs lauri inuolues, & ita ad solem uel ad ignem siccabis, & siccatum diligenter sublati folijs in puluerem rediges: quem puluerem in uasculo nitido seruabis, atque ex eo coctlearia duo, cum piperis granis decem tritis, adiecto melle optimo despumato quantum sufficiat, cum caroeni cyatho, in portione ieiuno dabis, quam prius ferro candenti calefacies, & diligenter in mortario permiscebis, sedenti que in lecto dabis; ita ut accepta portione, contractis genibus hora integra in dextro latere iaceat, & postea uel una hora deambulet.

Herbz uerbenae folstitio lecte puluis, in coctlearibus quinque cum uini aminei cyathis tribus, ieiuno potui datus mirifice prodest; sed pro etate aut uiribus uniuscuiusque, portionem dabis.

Asini iecur tritum, cum petroselino & nucibus iuglandibus purgatis ac melle inlitis, in cibo datum epatico ieiuno, mirabile est.

Procliani medici remedium de experimento, ad epatis suppurationes, & ulcera & apostemata, sic. sagapeni uncias II. myrrae troglodytidis uncias III. cardamomi uncias VI. castorei uncias III. piperis albi uncias duas; aut si album non fuerit, duplum de nigro mittes, opij optimi uncias II. hzc omnia trita & cribrata per impubes pueros, aqua pluuiali miscebis, & facies trochiscos de binis drachmis. qui trochisci in umbra, non in sole siccantur. uiris uel senioribus integros, pueris uel minoribus dimidios trochiscos, infusos in aqua calida dabis, id est non febricitanti, cum uini aulteri meri cyatho uno, infirmo autem ex aqua calida dabitur. sed quibus medendum erit, nihil pingue manducant, non oleum, non carnem, sed de lenticula farina pulstem, cum oxymelle coctam, admixto anetho & pulegio manducant, & postea, postea quam excreare uel sitire coeperint, tepida accipiant, & sensim bibant.

Qui palmulas dactylos ex aceto frequenter manducauerit, iocineris dolore carebit. De lupi praeda, id est, de reliquijs ueruecis, aut caprae, aut cuiuslibet animantis, quam comederit, carnem, uel pellem, uel os, collige & serua: & quando aliquis iecur doluerit, inde cum tange, continuo sanabitur.

Origanum in aqua decoque ad tertias, & postea mitte mellis quod sufficiat, atque iterum decoque diligenter ut bulliat, & inde da epatico ieiuno quod satis sit assidue bibendum, ualde subuenies.

Lacertam uiridem prende, & de acuta parte cannae iecur ei tolle, & in phoenicio uel panno naturaliter nigro alliga, atque ad dextram partem lateris, aut brachij laboranti, epatico suspende. sed uiuam lacertam dimitte, & dicito ei. ecce dimitto te uiuam: uide ut ego quemcumque hinc tetigero, epar non doleat.

Ad duritiam iocineris molliendam, & quamlibet ueterem dolorem sedandum, benefacit cunila arida, quam satureiam quidam uocant, in puluerem redacta denarius unus, ex mulsi cyathis duobus, si non febricitabit, uel toridem calida aqua, si febriculentus erit, assidue datus.

Ad iecoris dolorem, potio salubris conficitur sic. piperis — I. eupatorii — I. costi — III. bacani — II. scenigræci — I. S. omnia hzc trita & creta seruabis, & cum usus exegerit, dabis in uini portione coctleari plenum ieiuno, ita ut in dextro latere tenso brachio iaceat cum acceperit.

Epithematum ad iecur sanandum, sic. gutta ammoniaci P. II. cera tantundem, olei rosei tantundem, croci — I. gutta ammoniaci cum bono aceto teritur, donec bene trita sit, & glutinosa fiat; crocum si siccum est, tritum & cribratum, gutta ammoniaci admiscetur, & diu teritur; si humidum est, in aceto madefactum, primum separatim, deinde cum gutta ammoniaci teritur. quibus tritis, cerotum de roseo oleo & cera punica factum refrigeratum admiscetur, & tam diu teritur uel subigitur, donec unum corpus fiat, ut magdalia inde formentur, quæ stomacho, phoenicio induta imponantur.

Ad lienis siue splenis uitia omnia, & molestias uniuersas, remedia rationabilia & physica diuersa de experimentis

Cap. XXXII.

Ad lienosos benefacit tamarici longe a mari collecti, arefacti & contusi pulueris denarius unus, aut pondus uictoriatum datum ex aqua ieiunis uel ex posca.

Prodest lienosis inula arida campana con-

tusa & cribrata, mensura denarii unius, ex uini ueteris mixti cyathis quatuor, ieiunis data.

Potio ad lienosos sic. balani quo unguentarij utuntur, denarios duos, caparis radices * I. hederæ nigrae baccarum denarios duos, periclymeni, quam syluæ matrem uocamus * S. galbani denarij S. cardami nigri, id est nasturcij seminis * I. S. piperis nigri * I. scillæ costæ * II. hzc omnia colliguntur ex melle, fiunt globuli parui, dantur denarij duo uel unus, pro etate, aut infirmitate, ex oxymelle uel ex aceto mixto, in cyathis quatuor aut tribus. eadem potio benefacit ad hydropicos ex aqua mulsa data, nam urinam mouet plurimum, per quam purgantur.

Lienosos sanat, extra cutem impositum, sinapi aceto pridie maceratum & tritum, adiecta lenticula ex aceto cocta. oportet autem a parte lienis impositum medicamentum tam diu illic esse, donec dolorem pati non possint, qui utuntur. postea solio calido demittantur; ubi plures eos contineant, dum desinit senior; alioqui exilient ad primum feruorem; maior enim in cute fit dolor, calda tactis. postea ceroto rosaceo eos perungi oportebit.

Aliud lienosis remedium, eadem ratione impositum. sinapis cyathos duos, git cyathos duos, nasturcij cyathos IIII. myrobalani corticis cyathos IIII. piperis cyathos II. sinapi pridie aceto acri maceratum, deinde tritum, cōtusis cæteris permiscetur, pannoque inlitum medicamentum imponitur, fasciaque

longissima alligatur, uel pluribus in unum commissis, quo tardius soluitur. hoc efficacissimum remedium est, & multorum annorum lienosis, omnes causas tollit, atque duritiam; sed post hoc, si quæ reliquæ man-

ferint, ammoniaco tollendæ erunt frequenter illic inlito. Infantibus lienosis dari oportebit aquam calidam, in qua candens ferrum dimittatur; uel lac caprinum semicoctum, si capræ tantummodo hedera pascantur. proderit ijs, & sinapi siccum contusum ceroto tenui mixtum, extra cutem impositum, ut fascia diligenter ligetur.

Malagma ad lienosos, & ad iocineris tumorem, sic ammoniaci guttæ pondo I. ceræ P. I. rosæ pondo I. ammoniaci ex aceto teritur, mixto crocomagmate, quantum colorare possit. ammoniacum itaque teritur, quousque leue fiat, & mellis crassi habeat ipsitudinem. postea cera liquefacta, & rosæ adiicitur, ac prius mortario bene, & pistillo comixta, manu utraque subigitur. facit hoc malagma, & ad luxum, & ad capitis dolorem, fronti superpositum.

Malagma ad lienosos, sic. myrobalani P. I. aphronitri X X X. capparidis radicis X X V. cardamomi X X V. ammoniaci guttæ denar. X X X. ceræ P. I. irini olei P. S. cera irino soluitur, quibus ammoniacum aceto dilutum miscetur; postea arida quæ sunt, cribrata admiscuntur, & sic diu in mortario teruntur. deinde manibus bene subiguntur.

Medicamentum Iunij Crispi, quod appellatur ambrosia. hoc ex mulso datum lienosis præcipuum præstat auxilium, phthificis quoque, & ijs qui difficulter ex imbecillitate longa reficiuntur, & qui mali sunt coloris, nec non ad alia multa uitia satis utile est; recipit hæc. croci optimi X I. cinnami, nardi, costi, cassiæ, myrræ, schœni floris, singulorum X singulos. ijs contusis, & cribratis, mellis attici admiscetur quod satis sit. inde datur ex calida aqua ad supra dicta omnia uitia, quantum fabæ nostratis modus est.

Lienosis prodest hyacinthi seminis denarius dimidius potus ex aceto, & melle, polion herba, uel tamarici folia, aut eiusdem semen, aut cortex, uel herba, quam nos utrum, Græci isatida uocant, qua insectores utuntur, similiter pota, plurimū prodest.

Ammoniaco denarius dimidius, piperis grana quinque, rubi teneri cauliculi tres; hæc in unū trita miscuntur, & dantur omnia ieiuno lienoso una potione, ex aceti semimixti cyatho uno; miræ aduersum dolorem, & duritiam lienis prodest.

Capparidis radicis, uel corticis, scillæ bulbii aridi ex interiore parte, radicis quoque panacis, singulorum denarii deni, contusi, & cribrati, aceto & melle consparguntur: fiunt pastilli denariorum singulorum, dantur lienosis ex aceto, & melle. quidam addiderunt ijs, piperis, & uitis albæ radicis denarios decem, tritos. facit hoc medicamentum ijs additis, & ad hydro picos, & ad suspiriosos; est hoc utile de experimento.

Imponenda sunt lienosis, & maxime ijs, quorum nimium duri, & tumidi sunt lienes, medicamenta huiusmodi; sinapis, & pyretri, paria pondera ex aceto trita, chartæque inlita, quæ horis tribus habeant. deinde cum dolorem intolerabilem ferre non poterint, deducendi sunt in balneum, & ibi in solium calidum dimittendi, & fouendi, præcipue ijs locis, in quibus medicamentum habuerunt impositum; sed a fortioribus retinendi sunt in solio, exiliunt enim subinde, & si gurgere conantur, non sustinentes feruorem.

a solio uero, unguendi sunt oleo, & tergendis; tum cerotum ex rosâ imponendum locis perustis; quæ in sequentibus diebus, si satis exusta fuerint, curari debent.

Pinguis fici aridæ contusæ denarios X X V. capparidis radicis siue corticis denarios quinque, aphronitri denarios quatuor, hyssopi fasciculum. contusa hæc, melle temperantur, donec ceroti habeant temperaturam, deinde inlita linteolo, super lienem ponuntur, & duabus, uel amplius horis illic habentur. deinde is qui curatur, ad balneum ducitur, & in solio calido aliquandiu fouetur.

Malagma lienosis utile, sic. ceræ libram unam, ammoniaci guttæ denarios decem, lapidis assij floris, id est cineris denarios uiginti quinque, balani quo unguentarij utuntur, denarios X V I. bdellæ denarios X V I. croci denarios I I I. resinæ pitynæ X X I I. olei laurini sextarium dimidium. aceti P. I I I I. hoc genere componitur hoc quod niliacum malagma dicitur. arida ex aceto tam diu teruntur, donec leuia facta habeant mellis ipsitudinem; quæ ad ignem soluenda sunt, cum oleo, & adipe liquefacta in mortarium super trita infunduntur: deinde uniuersa permixta cum refrigerata fuerint, manibus subiguntur.

Ad lienes qui non ab infæstia, sed postea induruerunt, malagma sic. myrobalani, panacis, pyretri pondo singula, balsami seminis X. sinapis P. I. ijs tritis aceto acris miscetur, & diu permixtio ista subigitur. cumque ex ea malagma factum fuerit, rubrica coloratur, & imponitur; atque tribus horis habetur. post hoc, in balneum homo ducitur, & solio diu fouetur.

Quod æris florem tritum bene cum sinapi, aut etiam solium, mittes in acetum, simulque in bucculari decoques: ita ut aliquandiu illic bulliant, & ad similitudinem puliculæ spissentur. postea in uaccinam uescicam calida ea transferes, ita ut duobus digitis liquori huius uescicæ maior sit, tum spleni faris calidum medicamen adpones, ligabis fascia, tertia die solues, mirabili gratulaberis remedio.

Guttæ ammoniaci in acetum scilliticum infundes: post biduum ita teres, ut in panno possit induci; quo facto spleni adpones, & fascia diligenter ligabis, & uteris tamdiu, donec per se consumatur, & sine balneo abstergeatur.

Ad splenis dolorem, expertissimum remedium, sic. cardamomi, pyretri, sinapis, turis masculi, aphronitri, equalia pondera de singulis speciebus contundes, & coques in aceto scillitico, & in unum miscebis, locumque, cui medicamen adpones, frequentius detergebis, & adpositum manet medicamentum in horam septimam esse patieris. postea eum, cui medebere, ad balneas ire præcipies, atque in calida diu foueri facies.

Ad splenem remedium mirum, sic. picis duræ optimæ trite I. & costi triti I I. permiscebis, & ex eo singulas portiones ex uino uetere mane ieiuno per triduum dabis, ita ut in sinistro latere qui accipit diu iaceat.

Ad splenis dolorem, remedium efficax, sic. gallas de quibus encaustum fit, quantas uolueris, pone super carbones uiuos, & exures non nimie, ita ut puluerem de ijs, in quo sit aliquis sapor gallarum, facere possis. de quo puluere optimè trito, coctileare plenum mittes in potionem uini uetustissimi, & potetur.

Ebuli contusi succum coclearia tria ex uini ueteris cyathis tribus per triduum da lienoso

da lienoso bibendum, ita ut ebulum semper secum habeat qui remedium accipit, nec terra ipsum ebulum ferumue tangat. Cornum bouis combures ex ea parte, qua capiti adhæret, & in puluerem tenuissimum redige, atque ex eo puluere coctearia duo, cum aquæ calidæ cyathis tribus, & paululo aceti, ieiuno splenitico per triduum da bibendum. Cataplasma ad splenem, quod Ianuarius medicus ostendit, sic. pyretri — III. myrobalani — III. grani sinapis — III. cardamomi — III. urticæ seminis — III. piperis — III. hæc omnia teres, & cribrabis diligenter, & cum aceto scillitico permiscebis, ut unum corpus facias; atque inde cataplasma in panno denso supra splenem impones; sed prius locum ipsum, cui medicamen impositurus es, ex nitro aqua remisso lauiabis, ita ut spuma, uel pinguedo nitri illic adhæreat. Cataplasma ad splenem de experimento, sic. allium purgabis, & ante diem in acetum acerrimum infundes mature, cum positurus eris, teres cum ipso aceto, uel de aceto sublatum, ita ut spissum sit sicut cataplasma, & tepidum supra splenem adpones, & fascia conligabis, & uteris, usque ad horas prandij. hoc si triduo continuo usus fueris, mirum remedium experieris; sed patientia opus est aduersum uim medicaminis; quod plus proderit, si postea balineis utaris, & in solio calido diu fouearis. Herba cyclaminis, quæ orbicularis appellatur radix suspensa collo, ita ut contra lienem dolentem sit alligata, efficaciter medetur. Porri primum sicut succus expressus, & aceto pari mensura immixtus, absorptusque a lienoso sæpius prodest. Chamepitys cum oxymelle, & absinthio paribus mensuris decocta, & potui data, utiliter lienosis occurrit. Herba salutaris, id est spina alba, qua Christus coronatus est, quæ uelut uiam habet, lienem leniter in eodem loco perfricata sanabit. Equi lingua arefacta, & ad leuitatem trita, atque ex uino potui data, protinus utilitatem suam sedato lienis dolore manifestat. Stercus mulinum cum oxymelle lienosis potui datum, dolores efficaciter tollit. Hircinus splen calidus, id est statim ubi de pecude sublatu fuerit, super lienem hominis impositus, & alligatus mire dolorem intra paucos dies auferet, si postea ad fumum suspendatur, ut illic arefcat. Hædinus uero lien similiter, ut hircinus super splenem infantis adpositus, & tumores, & dolorem eius emendabit. A lano lienem uituli quanti uoluerit, emes, eumque medium exsecabis, seruatis integris eius lateribus, ut undique contineatur; atque eum, qui dolet splenem in balineum duces, & per mediam scissuram illius lienis a capite corpus eius omne summittes, ita ut usque ad pedes lien decidat. postmodum ipsum lienem in fumo suspendes, atque areferi facies. quo facto cum tumoribus etiam dolores lienis, is cui medeberis sedari sentiet, omni que molestia cito liberabitur. Ebuli radicem, quam sine ferro euellas aridam, contusam, & pollinis modo cribratam repones; inde coctearia tria ex uini cyathis tribus in limine stans contra orientem per triduum bibito ieiunus, sed omnino obserua, ne ebulus ferro contingatur, aut ne ipse dum remedium accipis, ferrum tecum habeas. Ebuli baccas per maturas exprime, atque ex eo succo uiro tria coctearia ad diem da bibenda, mulieri duo; quo sumpto deiciet per uentrem instar sanguinis. tum interiecto triduo rursum dabis, & per hæc interualla repetes, dando potionem donec perlanes. si propter amaritudinem solum succum haurire non potuerit, tantundem uini, aut oxymellis augebis. Aceti scillitici cyathum unum, mellisatici III. uettonicz tunzæ cribratz tres, in unum miscebis, & adicies aquam calidam, & dabis ieiuno per triduum splenitico potionem. Lorium eius, qui splenem dolet, quotiens urinam fecerit, collige, & cinerem de foco cribratum in unum subige, & panno inductum super splenem imposito, & una hora calidum habere per mitte, maximo eum periculo liberabis, si sæpius id feceris. Alij purgati capita tria, adipis porcine minimum uetustæ P.I. simul conteres, & panno induces, & supra dolorem lienis impones, & fascia conligabis. Conij id est cicutæ radicis P. unum, adipis uetustæ hircinæ P.I. alij purgati P.I. olei cedrini P.I. simul teres, & genus malagmatis facies, & supra splenem alligabis, nec ante quartum diem solues; certissimam scies hanc esse medicinam. Optimum spleni remedium tale est. gentianæ tunzæ, coctearium dimidium, fellis terræ tunzæ coctearia tria, foeniculi tunsi coctearia unum, & dimidium bibes ex picato mero, uel nigro austero tepesfacto, ita ut diligenter supra scriptæ species cribratz in pollinem redigantur, & sic misceantur. Rubiam herbam, qua insectores utuntur, tunfam ex picato, uel austero, uel nigro uino, aut ex posca dabis bibendam ieiuno splenitico. amplitudine nucis auellanz, confestim proderit. Laudabile splenitico remedium sic. hieram botanen, quæ uerbena appellatur, contunde cum axungia uetere, & inducta in panno albo mundo impone splenitico; dolore sedato uidebis sanguineum locum in quo dolor fuerit. Solea piscis spleni imponitur, uel torpedo, uel rhombus, sed impositus rursum uiuus in mare mittatur, mire prodest. Qui quotidie ieiunus serum caprinum, sed earum capellarum quæ hedera pascentur, biberit, splene consumpto erit. Sarmentorum cinis aceti cyathis duobus aspersus, rectissime lienoso ieiuno ex aqua repida datur bibendus. Caninus splen recens supra splenem hominis imponitur, dicente eo qui adponit, remedium se spleni facere; postea splen intra parietem dormitorij cubiculi testorio, id est capsella inclusus, reponitur, & desuper ter nouies signatur. Splen uiuenti camilo exemptus, ciboque, sed coctus, splenitico datus ignoranti, liberat eum quamuis grauius laborantem. Sedant lienis dolorem radices uiolez luteæ, si ex aceto, spleni uice emplastri adponantur. Tamaricis radicem, uel folia trita ex aceto bibat, qui de splene laborat, cuius usum si experiri uolueris da porco edendam per dies nouem; cum eum occides sine splene inuenies. Lacerta uiridis uiua in ostio splenitici ante cubiculum eius suspenditur, ita ut procedens, & rediens eam semper manu sinistra, & capite contingat, quo facto mire ad sanitatem proficiet. Herba urceolarem in aqua decoctam da lienoso cum oleo & liquamine manducandam, mire subuenies. Sisybrium, absinthium, nepetam, marrubium, æquali mensura aceto macerata tertio, & melle mixta, sed cum polenta hordei modica, impone lienem emplastri

dicamen adhibetur, propter molestiam sudoris, ne humectatum infirmius fiat. ipso tamen die, quo confectum fuerit, statim debet adponi, quo efficacius proficit. Ad splenem, remedium efficacius die iouis lidu-
na finistrum pedem nudum in caprisco ponet, qui dolores splenis patitur, & corticem quantum pes eius
preliserit incidet, eamque tribus horis de fascia ad splenem positam constringet, sublatam inde fumario su-
spendet, neque unquam, aut ipse remouebit, aut permittet ab aliquo tolli. Ad splenem, remedium
subitum, atque subtile, tres caricas in aceto optimo uespere infunde, & mane ieiunus eas accipe, & hoc tri-
dum facito. post hoc ferri ex causa ad hoc facti massulam, ter ardentem extingue ex potionibus absinthiati,
& bibe, atque hoc per triduum facito. Ad splenis dolorem, cuminum quantum tribus digitis possis
comprehendere, cum uino tritum, ieiuno laboranti dabis bibendum.

*Pleuritidis, & laterum doloribus, remedia physica, & rationabilia diuersa, de exper-
imentis. Cap. XXXIII.*

Malagma ad lateris, & pectoris dolorem, & quicquid molestum ex perfrictione colligitur, bene enim
calfacit, & ideo ad omnem dolorem prodest; conficitur sic. samuici contusi semuncia, iris contusa idem, cyperi co-
tusi idem, resinae terebinthinae P. S. ceræ P. I. olei cyprini P. S. uini ammoniaci s. I. in hoc, quod arida sunt, cotusa
macerantur uno die, & nocte, tum in oleo, cera, & resina liquefunt ad ignem. deinde superfunduntur uino,
& pigmentis maceratis, & miscentur, ac manibus diu subiguntur. hoc post dies triginta efficacius prodest,
initio enim humidum ualde est, & uix inlitum manet. Malagma ad contusionem lateris, idem facit,
& ad suspectas uomicas, aut iam factas; aperit præterea iocineris, & præcordiorum duritiam, & ad dolorem
eorum uere conuenit. proderit etiam omni loco dolenti impositum, conficitur sic. cyperi, ammoniacæ gutte,
cardamomi, bdellæ, suris, resinae terebinthinae, singulorum — binas, fusi, & bdella macerantur pridie infu-
sa uini ueteris sextario, cætera contunduntur. deinde ceræ P. I. & olei cyprini s. I. cum terebinthina lique-
funt, cæterisque miscentur, & diu manibus subiguntur. quidam adiungunt myrræ — I. croci — I. cinna-
mi — I. Compositio hæc mirifica, non solum lateris, uerum interaneorum dolores minuit. herbarum
gentianæ drach. X. iris illyricæ drach. XLV. myrræ drach. X. piperis drach. XII. separatim om-
nia in puluerem redacta misceto, atque adijce his mellis optimi despumati, quod satis uidebitur, & ad ma-
gnitudinem nucis auellanæ cum aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Herba, quæ iris appellatur,
maximè si siluestris erit, inligata lateri dolorem eius protinus tollit. Herba uerbena solstitio collecta
arefacta, & contusa puluis in codearibus quinque, robusto, & ualido ex uini ammoniaci, & ueteris cyathis
tribus, febricitanti ex aqua calida potui datus, mirè dolori lateris medetur. Herba gentianæ, & sagape-
ni drach. singulæ contrite, & cum aquæ calidæ cyathis tribus potui datæ, dolorem lateris sedant, si in latus,
quod dolet post curationem infirmus diu iacuerit. In lapide Iaspide phrygia aerizusa si nota infra
scripta insculpta fuerit, id est sss. & collo dolentis latus fuerit suspensus, mirè proderit. Herba uetto-
nice foliorum in umbra arefacta, tum sibi cribratæque ꝑ I. ex uini, aut mulsi cyathis duobus potui sano,
febriculento ex aqua mulsa dantur, confestim dolorem lateris emendant. Apri steris aridum, con-
tritum, & potioni inspersum, dolores lateris sanat, mira potentia. Codec exemptæ testa sua, & cum
ptisana coctæ, lateris doloribus medentur, melius si humorem ptisanæ ipsius sorbendum dederis, ipsas quo-
que codeas contusas uelut malagma, supra dolentem locum lateris imponi satis utile est. Verbasci
radicem, & rutæ cõiculum, & albi piperis grana I. X. in unum contrita, ex aquæ calidæ cyathis duobus po-
tui dabis ei qui lateris dolore uexabitur. Marrubium ex aqua tritum, salubriter bibitur aduersum la-
teris dolorem. coriandri quoque semen tundes, uel teres, & cribrabis, & cum melle coques, donec spissum
fit, inde manè, & serò codearia terna dabis pleuritico bibenda. Sulphur uiuum, & picem cedriã pari
pondere simul permisces, & pro malagmate dolori lateris adpones.

*Lumborum & coxarum doloribus, & torpori, siue ischiadici, remedia physica & rationabilia diuersa
de experimentis. Cap. XXXV.*

Ad lumborum dolorem, curatio optima hæc; cucurbitæ siluestris floccorum, aut seminis * IIII.
pyretri * III. myrræ * II. in puluerem rediges; ex quo fiunt pastilli ad mensuram denariorum bi-
norum, uel singulorum, dantur ex passi cyathis tribus, mixtis aquæ pluuiæ cyathis sex; sed his quibus
hoc remedium dandum est, alius acri clysmo manè detrahenda est. Ad lumborum dolorem, & paraly-
ticos, antidotos hiera medici Pacij Antiochi, quæ melius omni medicamento facit, sed & ad paralysem mi-
nifice hoc acopum facit, quo oportet infirmum in sole diu fricari, aut foco flamma præcalescente, recipit hæc,
olei sabini denarios sex, cucumeris siluatici radicis recentis * XV. hæc radix in magnitudine iuglandis
nucis cõcisa, uase fictili nouo ex oleo coquitur, donec succum omnem remittat, & quasi arida sit. post hoc
radix abijcitur, & per linteum, aut colum transmissio oleo, adijcitur, dum calet, ceræ ponticæ in frusta reda-
ctæ P. I. olei cyprini P. I. olei irini P. I. olei laurini P. I. olei ueteris P. I. piperis albi contusi, & per
tenuissimū cribrū transmissi * II. pyretri cõtusi, & per idem cribrū traieci * I. hæc in unum miscentur,
reponitur medicamentum uase fictili, facit præter remedium lumborum, & ad omnem dolorem corporis, &

neruorum, muliebria quoque loca durissima mollit, cum diu alijs medicamentis nihil profectum est, hoc prodest.

Malagma, quod proprie facit ad lumborum dolorem. picis liquidæ 8. I. I. olei ueteris 8. I. re linz terebinthinæ P. I. ceræ P. II. mannæ P. beſſis, aphronitri P. triens. coquitur pix cum oleo, donec ſpiſſa fiat. poſt hoc, adiſcitur reſina. deinde cera, & ſecundum hanc, ex interuallo manna; ubi emplaſtri ha- bebbit figuram medicamentum, tollitur ab igne, & cum tepeſcere cœperit, aphronitrum aſpergetur ſenſim, ne ſuperfundatur, quod in caccabo eſt.

Malagma ad omnem dolorem ueterem ex qualibet cauſa fa- ctum, præcipue ad lumborum dolorem, ſic. bdellz * I. I. ſtyracis * V. æſyphi * I. I. ammoniaci * V. piperis albi * I. I. turis * V. baccarum lauri P. I. terebinthinæ * V. I. opopanax * I. I. ad- piſtaurini * V. I. medullæ ceruinæ * V. propolis P. S. olei ueteris P. I. ceræ P. II. turis pol ſinis P. I. oleum, cera, reſina, propolis, liqueſcunt. deinde turis pollinis pondus ſuperius dictum adiſcitur, & cœtera minutatim, uel in unum contuſa, poſtea decoquuntur ſimul omnia; opopanax ſane oleo dilui prius oportet.

Medicamentum, quod facit ad omnes membroꝝ dolores, quod anodynon appellatur. fa- cit autem præcipue ad lumborum dolores; conficitur ſic. myrræ denarios octo, croci denarios ſeptem, opo- panacis itidem, ſtyracis denarios duos, alterci ſeminis * V. opij * V. I. mandragoræ radicis, uel etiam corticis * I. piperis albi * I. conſparguntur trita, & cribrata hæc omnia ex aqua pluuiali, ſunt paſſili uiſtoriatum tertiæ partis, dantur ieiuno ex aquæ cyatho uno, & ex paſſi cyatho uno.

Malagma ad co- xæ dolorem; maſſiches chiz P. S. abrotani ſucci 8. S. turis P. S. ſalis ammoniaci P. S. ariſtoloſchiz rotundæ P. I. I. ariſtoloſchiz digitalis P. I. I. ſpumæ argenti P. I. propoleos P. I. coris creticæ P. I. S. reſinæ pity- næ P. I. S. olei ueteris P. I. I. I. olei laurini P. I. I. I. galbani P. I. I. I. lepidos cyprij P. S. ceræ P. I. S. ſinapis alexandrinæ 8. I. I. I. aceti 8. I. I. I. omnia hæc tunſa, quæ tundenda ſunt, & remiſſa, quæ liquefacienda ſunt,

ſimul excoquuntur, & poſtea tam diu manibus ſubiguntur, donec denſum malagma fiat. Iſchiadicis codez crudæ trita in uino ammineo, ex pipere potz mire proſunt.

Pellem lupi aluminatam, per dies ſex lumbis dolentibus impone, ſtatim ſubuenies.

Lumborum, & ueſicæ cruciatibus laboranti prodeſt in balineis, & loco calido, dum illic eſt, urinâ ege- rere.

Lana ſuccida, nitro, ſulphure, oleo, aceto, pice liquida, feruentibus hiſ, tinſta, & quàm calidiſſime ſuſtinere poſſit, bis in die appoſita, prodeſt lumborum dolori.

Remedium mirum aduerſum iſchia-

dem, uel arthritim, herba eſt, uel fruteſtum, quod maxime circa ſepes uinearum naſcitur, latine cytiſus dic- tur; uirgultis eſt ſubortis, uel curuis, folijs oblongis bene uirentibus floribus concluſis, oblongis, albis, uel etiam galbinceis, bene olentibus, id eſt mellito odore, fruteſtum ipſum ſemper uirens eſtate, atque hyeme;

colligitur die iouis luna uetere, liduna ante prandium, & datur ei cui remedio futura eſt, ieiuno ante pran-

dium trita, ita ut non ſuccus tantum eius, ſed & folia quomodo trita fuerint, uel flores eius ſi fuerint, ſic

dentur ex meri uini ueteris, ſiue etiam nouelli quartario grandi. ſed qui accipiet, ſtans accipiat, & contra

orientem hibet; & cum a dextra parte potionem acceperit, ad ſiniſtrâ, retro ue non reſpiciat, & reddat cali-

cem ei, qui dederit potionem. hoc per triduû faciet; ſed qui daturus erit potionem, una hora, uel uno die, ſeſſâ

herbâ ſimul contemperare debet, unde ſint tres potiones, ita ut a nullo alio, quàm ab eo, qui daturus eſt, her-

ba illa, uel potio, & ab eo qui accepturus eſt, tangatur. hæc qui bene obſeruauerit, mirû remediû inueniet.

Ad coxæ ſubitum ſtuporem, uel dolorem; aphronitri — I. ſinapis — I. piperis ſemunciam, teres, &

trita miſcebis, ut puluerem facias, & in balneo locum, de quo quereris, perfricabis.

Remedium ad iſchia-

dem ſic. colliges herbam, quæ dicitur britanniæ, die iouis uetere luna, & liduna, ſiccabis, & repones, qua

hyeme non apparet. nam, & uiridis prodeſt. teres hanc cum tribus granis ſalis, & cum piperis granis quom-

que, aut ſeptem; addes, & plenum grâde cocleare mellis, & uini potionem bonam, & ſi uolueris, modicum

calidæ aquæ adiſcies, & ſic bibendum dabis. ſed hanc herbam ter, dum teres, & antequam colligas, præcanta

re debes ſic. terram teneo; herbam lego, in nomine Chriſti, proſit ad quod te colligo. medicinalibus dignis

eam ſine ferro præcides, uel auelles.

Ad iſchiadem de experimento remedium ſic. radix bugl-

lonis, ſine ferro colligitur, uel eruitur palo acuto. hæc tunditur in pila, uel teritur in mortario, & ſuccus

eius exprimitur, ita ut in ſucco eo ſit uel quartarius. deinde grana piperis X X V. teruntur, & mellis li-

bra adiſcitur, ac uini ueteris ſextarius. hæc omnia cum ſucco ſuprà ſcripto ad modum conditi permiscen-

tur, & laboranti in balneo cum iam prope laſſus fuerit, per triduum potanda in caldaria tribus potioni-

bis dantur, mire proderit.

Deſcriptio ceroti chalaſtici, quod facit ad omnes totius corporis dolores, præcipue ad contuſiones mem-

brorum, & neruorum infirmitates, & ad ſtomachi dolorem. inſigne eſt certe in primis ad lumborum, & re-

nium dolores. conficitur uetere luna, & liduna, a menſe Martio in quodlibet tempus æſtiuum. recipit hæc

phlomi librâ, herbæ ſabine P. I. barbæ iouis P. I. baccæ lauri P. I. has ſpecies tunſas coques in olei ſecunda-

rij boni libris I I I. poſtea colatis omnibus, mittes in oleû ipſum, rutę ſiccę — V. I. pulegij ſiccę — III.

ſymphoniacę ſuccû — V. I. haſtulę regię ſuccû — V. I. uerbenę ſuccû — V. I. iſci ſuccû — VIII.

ſœnogreçi ſuccû — VIII. lini ſeminis triti — VIII. maluę erraticę ſuccû — VIII. hæc omnia miſce-

bis cû ſuperioribus ſuccis, & decoques ad tertias, ita ut mittas caricas ſicus I I I. quę tãdiu coquãtur, do-

nec nigreſcât. poſtea addes axûgię ueteris P. II. ſeu ceruini P. I. butyri loti P. I. medullę ceruinę P. I. ſeu

bubuli P. I. cerę — VI. reſinę friſcę — VI. hæc cû cœteris herbis remittes, & cû hiſ q̄ ſuprà ſcripta ſunt,

omnibus pmiscebis, & repones in uafiſ ſicililibus, aut in ligneis, aut corneis, & cû uolueris, tepeſacto ueteri

côtra omnes dolores, ut ſuprà ſcriptû eſt. Iſchiadicis, & lumborû doloribus, porri ſectiui triti ſuccus ex

preſſus cû uini hemina ieiuno potui datus efficaciter medetur. eque prodeſt, & apij ſuccus ſimiliter datus

Herba

Herba chamædrys contusa, & cum melle potui per triduum data, confestim medetur lumborum, & coxarum dolori. herba quoque senecio in cibo sumpta, coxarum, & lumborum dolores certissime sanat.

Adipe urfina dolentes coxas perficit, continuo sanabis.

Qui testiculum leporinum coctum ieiunus comederit, cito coxarum dolore releuabitur.

Radices ex integro tritæ cum pane remollito miscentur, atque inde cataplasma factum, coxatum, uel lumborum, etiam renum dolori imponitur, statim prodest.

Incredibile, & unicum remedium ischiadicis, & arthriticis hoc est, quo & ipse Ausonius medicus sanatus est, & multos, ita iacentes, ut mouere se sine cruciatu nequirent, intra quinque dies stare, ambulare autem intra septem dies fecit, conficitur sic. simum ibi cum luna septimadecima colliges, quanquam, & alia luna uetere collectum, simili efficacia prodest, dummodo medicamen septimadecima luna componatur.

ex eo ergo simo, quantum unius manus pugno pleno potueris comprehendere, dummodo impar sit numerus pilularum, in mortarium mittes, atque adicies piperis grana XXXV. diligentissime trita. tunc addes mellis optimi heminam, & uini ueterni optimi 8. I. I. & contritis prius pilulis uniuersa miscebis, & repones in uasculo uitreo, ut cum fuerit opus, paratum habeas medicamentum ad subueniendum. sed ut maior sit medicaminis efficacia, luna septimadecima illud facere debebis, & cum daturus fueris remedium, a die iouis incipe, & per dies septem continuos dato, ita ut qui remediandus est, stans in scabello contra orientem bibat. quæ potio, si ita ut scriptum est, data & obseruata fuerit, etiam si omnibus articulis, & coxa infirmus contractusque fuerit, & immobilis, ac desperatus iacuerit, necesse est, ut septima die ambulet.

Ischiadico remedium efficacissimum sic. castorei semunciam, pyretri, nitri, euforbij, adarces, uncias singulas olei cyprini libram. quæ tundenda erunt, siccata tundes, & cribabis, & sic oleo cyprino miscebis, & decoques, atque eo medicamine sic uteris, ut ischiadicum iacentem in sole diutissime perfices in coxa, quam dolet, deinde ad balneum ducas, & cum sudauerit, diutissime compellas in tosta calcaria commorari.

Ad coxarum, & ad lumborum dolores, herba chamæpitys contrita, ex uino potui data, plurimum prodest.

Cucurbitæ semine contrito in ficulneo uasculo, adiecto oleo, & aceto, coxæ, & lumbi perficati, potenter sanantur, sicut experimenta docuerunt.

Serpylly aridi contusi, & in puluerem redacti scriptos tres, adiecto modico melle permisce, & ex eo tres globulos æquali pondere facito, atque ex ijs singulos cum multis cyathis repesctus binis, ieiuno per triduum dato, incredibiliter lumborum dolori medebere, quod si illo triduo non penitus, qui laborat, fuerit absolutus, iterum per aliud triduum dabis.

Radix asparagi trita, & ex uino potui data, lumborum, & coxarum dolori mire medetur.

Nudei amygdalarum triti, & ex aceto poti, lumbis medentur.

Nasturcium cum farina permixtum, & ex aceto calido, lumbis medetur, si impositum fuerit.

Gladioli radix contusa, cum sulphure uiuio, & adipe urfina, lumbis imposita plurimum prodest.

Remedium coxendicis mirum de experimento sic. musceræ nouem tritæ ex uini quartario, super scabellum, uel sellam laboranti potui dantur, ita ut pede uno, quem dolet, stans ad orientem uersus potionem bibat, & cum biberit saltu desiliat, & ter uno pede saliat, atque hoc per triduum faciat, confestim remedio gratulabitur.

Malagma ischiadicis mirum sic. styracis uncias II. picis P. II. ceræ P. I. guttæ ammoniacæ — VI. resinæ terebinthinæ — VI. galbani — II. manne turis — II. omnia quæ tundenda sunt in puluerem rediges, & admiscebis ijs, quæ igni remittenda sunt, & desuper aceri quantum sufficiat medicamento, dum excoquitur mittes, & cum opus fuerit, calido uteris.

Ad ischiadem remedium dictatum a Iusto medico, sic. herbam argemoniam, & herbam uerbenam, & lapathium, & bugillonis radicem æquis portionibus, uel ponderibus mittes in pilam, & tundes, & cum tunsæ bene fuerint, addes uini candidi 8. III. & manibus agitabis cum ipso uino diutissime, postea omnia mittes in linteum spissum, & expressa colabis, atque ijs quæ colata fuerint, desuper addes uini aliquantulum, & piperis grana triginta trita. postmodum ex hoc medicamine quartarium calefactum ieiuno laboranti in balneo dum in solio, est per triduum dabis bibendum.

Ad ischiadem physicum remedium. testudinis aquaticæ crus præcide, & phœnicio inuolutum, ex ea parte, qua quis ischiadem patitur, adpone, potenter remediabitur.

Gir quantum tribus digitis tolli potest sumptum, tritumque, & passi cyathis duobus aspersum, adiectis aquæ calidæ cyathis totidem epotum, maxime prodest lumborum dolori.

Fel terræ tritum ex uetustissimo uino bibere dabis ieiuno, supra lumen stanti uno pede, qui coxam dolebit, sed non in uitro hanc potionem bibat.

Præsens remedium ad coxæ dolorem sic. artemisiæ aridam tundes, cribabis, & ex uino dabis bibere ieiuno, continuo emendabitur uitium.

Herbæ pteridis, id est filiculæ, quæ ratis gallicæ dicitur, quæque in fago sæpe nascitur, radices tunsæ in potionem ieiuno dantur cum uino, coxarum doloribus laboranti.

Hederam, & herbam sabinam æquis portionibus tritam, ex uino austero ad modum auellanæ dari ischiadico ieiuno oportet per triduum. eadem potio etiam aliud malum coxendicis purgat.

Trixago herba feruentia, cum aqua, ac triduo potui data, ischiadicum mirifice sanat.

Crocodilus terrenus præcis summus partibus, egestusque intera neis, ex iure coctus, cubatui datus, magnū ischiadicis præstat auxilium.

Fimus aprugnis uino remissus, repesctus colatusque, & duorum cyathorum mensura potui datus, ischiadicis saluberrime medetur.

Rubiam, qua pelles inficiuntur, quotidie bibere ischiadicis utile est, & in balneo feruenti lauari.

Geniæ ramum plurimis diebus in aceto maceratur, deinde tunduntur, & exprimuntur, ex eo succo cyathus unus ad diem ischiadico, quousque sanatur, offertur.

Fimum bubulum feruentem, quem in cinere ardenti calcificeris, coxarum dolori imposito, plurimum prodest.

Vermis terrenus exfoditur, & in ligneo cauco ponitur, si fieri potest fisso, & ferro alligato. tunc aqua perfunditur, rursusque eodē loco, unde prolatus est, defoditur, aqua uero, in qua dilutus est, in eodem poculo bibitur ab ischiadico ob insigne remedium.

Ad ischiadem remedium sic. herba pentaphyllos, folijs fragorum simillima, iouis die collecta, & cum vino trita, in balneo in folio data potui, hac ualitudine laborantes cito remediabit. Ad ischiadem remedium sic. cera rubea, & stercois canis, quod est album, hoc siccatum in sole, & in modum farinae cribratū, cum fuerit contusum, lento igni ceræ remissæ admiscetur per partes, & olei parum, tantum ut mollius id efficiatur medicamen; sed antea tamen colocynthide, & centauryo curetur, cui medendum est, ut si nō profecerit, curationem iterum adhibeas.

Renum, & uesticæ doloribus, & causis uniuersis, & calculo, & dysuria, id est urina difficultatibus, & stranguria, nec non, & submeulis, remedia physica, & rationabilia
diuersa, de experimentis. Cap. LXX. XLV. I.

Ad renium tumorem, aut exulcerationem, etiam si sanguinolentam urinam quis faciat, hoc remedium sanabitur. rosæ aridæ foliorum, papaueris nigri seminis, nucleorum pineorum, paria pondera, contunduntur seorsum, & in unum miscentur. inde datur quantum nux juglandis, ex passi cyathis duobus, & aquæ cyathis tribus. Alia ad renium dolorem potio, quæ etiam quasi harenam sabulosam interdum detrahit, accipit hæc. apij seminis, petroselini, anisi, singulorum * senos denos, dauci seminis * IIII. schoeni denarios VI. croci * XXII. mellis quantum satis uidebitur. hinc datur quantum lupinis ex melis ligulis duabus, & aquæ cyathis quatuor. Ad renium tumorem, & dolorem remedium efficax, quod facit, & ad iocineris, & lienis tumorem, & ad hydropicos, & ad eos, qui mali coloris propter hæc uita sunt, accipit hæc. croci * X. nardi indicæ * II. costi * II. schoeni * I. cinnami * I. myrtæ statæ * I. mellis optimi * XXV. datur quantum fabæ magnitudo est ægyptiæ, ex mulsi cyatho mixti cum aquæ cyathis duobus, sed febricitantibus ex aquæ mulsi cyathis tribus dari debet.

Ad tumorem, & dolorem, & exulcerationem uesticæ bene facit aqua pota, in qua ferrum candens dimissum est. hoc tractum est ab aquis calidis, quæ sunt in Tuscia ferratæ, quæ mirifice remediunt uesticæ uitia, unde appellantur uesticariæ, qui locus quondam fuit Milonis Bruchi prætoris, hominis optimi, ad quinquagesimum ab urbe lapidem. Ad tumorem, & dolorem uesticæ, & ad eos, qui difficulter urinam reddunt sic. alterci seminis, maluæ seminis, cucumeris edulis seminis purgati, singulorum denarios senos, amygdalorum dulcium purgatorum, nucleorum pineorum purgatorum, singulorum * ternos, opij * I. croci * V. passo contusa hæc omnia consparguntur, datur hoc medicamentum ad mensuram denarii unius, ex passi cyathis duobus, & aquæ tepidæ totidem. Ad uesticam exulceratam remedium sic. nucleorum pineorum purgatorum * I. cucumeris edulis seminis purgati cyathum, anesi cyathum, papaueris nigri * II. croci * II. palmas cariotas XXX. has macerari oportet passi s. duobus, atque cōteri, deinde ijs adijci cetera, ex eo dari nudis juglandis magnitudinem ex passi cyathis tribus.

Ad sanguinem per urinam cum dolore reddentes aluminis fuffi * I. tragacanthi * I. tragacanthæ pridie aqua maceratum, alumini terro admisceri oportet, deinde fieri pastillos, ad denarii semissem, uel tertia detracta, datur ex passi cyathis tribus. Ad calculosos optimum remedium est scolopendros, quā nos saxifragam appellamus, huius contusæ * I. ex aquæ cyathis tribus, per dies XXX. datur. eodem modo data hierobotane prodest, quam nos uerbenacam dicimus. Multos cum admiratione effectus, audiuius narrantes, Casilini nasci in lapidicinis bestiolas adhaerentes saxi quasi uerruculas; has datas tritas ex aquæ cyathis tribus, findere, & per urinam extrahere lapides de uestica.

Ad calculosos remedium utile sic. cucumeris seminis, dauci, anesi, apij, petroselini, myrtæ, singulorum denarios ternos, callicæ daphnitis, cinnami, nardi, singulorum * singulos. trita hæc omnia aqua colliguntur, fiunt pastilli lupini magnitudine, dantur ieiuno ex aquæ cyathis ternis per dies quadraginta. hoc medicamentum tunditur, uel componitur in pila lignea, & pilo ligneo. qui contundit annulum ferreum non habeat, hanc enim substitutionem adiecit Ambrosius medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse. detrahare autem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidum quasi harenam. Ad calculosos, lienosos, hydropicos, medicamentum efficax, quod & urinam detrahit, & lapides in uestica extenuat, conficitur sic. eryngij, pyretri, saluicæ, saxifragæ, singulorum denarios denos, polij, folij, aristolochiæ, singulorum * quinos, oxymyrfinæ, quæ scopa regia uocatur, succi heminam. hæc omnia contusa, & cribrata colliguntur ex aqua, fiunt pastilli singulorum denariorum; datur lienosis ex aceto, & mellis cyathis tribus; calculosis ex passo mixto, quantum manus capit aut testa auriculæ marinæ. quod medicamentum datur per dies XLV. cuius beneficio in harenam soluiuntur lapides in uestica reperti; hydropicis autem ex mulsi mixti cyathis tribus dandum est.

Contra calculum, & alias difficultates uesticæ, lapillum qui in gallinæ uestica, aut in palumbi uentriculo inuenitur, conteri, & aspergi, potioni prodest. Itē membrana uentriculi eius trita. finus quoque columbinus in faba sumptus. item glebula de nido hirundinum diluta ex aqua, pota prodest. Ad renium dolorem confectio medicaminis sic. resinæ colophonice — I. galbani — I. opopanacis — I. ceræ — VI. seui — VI. axungie ueteris P.I. rutæ — III. bacce lauri — III. herbe sabine — III. olei quantum opus fuerit, seminis urticæ — III. ista omnia simul coquuntur, & collantur, & circa renes in pellicula alutaciæ adponuntur. Ad urinae difficultatē, murino fimo summitatē ueretri, uel imū uentrē inlini prodest. Ad calculū expertissimū remediū sic. asparagi radices, & saxifragæ, lappæ radicē, apij radices, ebuli radices, allij capita tria, folia salicis, petroselini macedonici modicū. hæc omnia conteres, & miscebis, & ex passo bibenda per triduum dabis. si passum non fuerit, ex mulso, uel condito bibat,

to bibat; sed si non febricitabit cui medendum est.

Ad calculum, & urinæ difficultatē. passinacæ hoc

est holeris, quod manducatur summitatem, id est corticem eius teres, uino picato permiscebis, & bibendū ieiuno dabis.

Modicum de succino lapide, & cyperum, & piper cōtundes, & coques, & coctileare unū plenum ieiuno dabis, qui urinæ difficultate, uel calculi dolore torquebitur.

Renibus medetur alumi gallicum, cuius radix trita diligenter, & in uino decocta bibitur. interdum etiam, ita decoquitur, ut spissum emplastri more renibus superponatur.

Renes leporis crudos, si quis poterit, glutiat. sin minus, coctos transmittat, ita ut dentibus eos non contingat, citō remediabitur. radix quoque asparagi ex uino trita, & pota, prodest renium dolori.

Ibisci libram unam, stercoris ouilli recentis P. II. axungiz ueteris P. II. hæc omnia contrita pariter miscebis, & in lana succida renibus adpones emplastri modo, statim proderit.

Ad uessicæ dolorem, & ad eos, qui urinam uix faciunt, remedium sic. seminis petroselini cyath. III. scenogreci cyath. III. tosta hæc cōtundes, addito myrræ modico, & piperis granis; I X. uini cyath. II. omnia in unum conteres, & miscebis, & in balneo calido bibendam portionem dabis, mirū est.

Ad urinæ difficultatem, & calculum, lotium caprinum, sed montanum tepidum potari oportet, admixtō uino cum aqua, ob fastidium. cymīnū quoque africanum, quod summitate trium digitorū potueris prendere, ex uino mixto calidum bibatur.

Ad urinæ difficultatem, uirticæ quantum duabus manibus amplecti potueris, fasciculum, cum uini congio decoctum, ad duos sextarios rediges, & manē bibendum ieiuno per triduum dabis.

Herbæ mercurialis ex aqua decoctæ ius, adiecta myrra tritum, uessicæ, lumborum que doloribus subuenit, si a ieiuno potetur ad fidue.

Ad dyfuriā, id est urinæ difficultatem, & calculum, echinos tere cum aculeis suis, & ex multa aqua frequenter accipito. ad calculum autem, rubi radices sine ferro colliges, lotasque diligenter in olla noua coques, & ex eo quod decoxerit cum uino, si non febricitabit, ex aqua, si incommodabitur, bibendum dabis.

Cancris testam diligenter teres, & uino subduli miscebis, & colatam portionem dabis bibendam ei, qui calculi molestia laborabit.

Herbæ millefoliæ — II. & eius quæ herba sacra dicitur, tantundem teres, & coques ex aqua, & ex melle, atque ita bibendā dabis, urinæ difficultate, & calculo laboranti.

Menfe nouembri ante idus easdem semen fraxini colliges, & in tepido furno siccabis, die postera siccatum tundes, & cribrabis, & repones, & ex eo dabis calculo — I. ad diem cum uino uetere bibendam ligulam unam.

Ad renium dolorem, remedium sic, apij seminis — I. foeniculi seminis — I. piperis, semunciam. ex ijs bene tritum, & cribratum puluerem facies, & habebis paratum. & cum opus fuerit, coctileare plenum in calida aqua bibat ieiunus, qui dolore renium laborabit.

Ad lapides, de uessica eiiciendos, remedium singulare. hircum segregatum, uel clausum septē diebus lauro pasces, & postmodum a puero impubi occidi facies, & sanguinem eius excipies munditer, ex eo dabis laboranti in uini cyatho scripulos tres. at uero, ut eius rei experimentum capias, lapillos fluuiales in uessicam mittes, in qua sanguis exceptus fuerit; nam in uessica excipi debet, & signatam reponere. intra dies septem solutos penitus inuenies.

Antidotorum ad renium dolorem, sic. foeniculi semen recens, petroselini, dauci, zingiberis integri, piperis nigri, porri capitati semen, folia malabathri, grana piperis albi. omnia hæc æquis ponderibus tundes, & cribrabis, & miscebis cum melle attico, & ex eo pilulam, ad modum auellanz, ex aqua calida ieiuno dabis.

Ad renium dolorem, unguetum satis efficax, sic. castorei — I. euphorbij semunciam, pulegij — I. S. ceræ — III. satyrij — III. olei amari — VI. cyperi semunciam, myrræ — I. resinæ terebinthinæ semunciam, piperis — I. S. olei laurini — VI. opobalsami — I. hæc omnia sicca tundes, & cribrabis, & miscebis, & decoques, & liquido medicamine uteris in balneo, & perunges renes, coxas, & super pectinē, omnis dolor cito desinet.

Trochiscus ad reniū dolorē, & uessicæ dolorem, ac uulnera, & ad eos qui urinam sanguineam faciunt, uel purulentā, accipit hæc. opij drach. III. de nucleis pineis ex caldatis & purgatis drach. III. croci drach. III. amygdalæ dulcis ex caldatis, & purgatis drach. III. auellanz purgata, & ex caldatis drach. III. cucumeris seminis purgati drach. XII. hyofcyami albi seminis cyath. III. apij seminis cyath. III. foeniculi seminis cyath. III. lapatij seminis drach. I. hæc omnia primū separatim teres, & permiscebis cū passo cretico. tū ex eo facies trochiscos habentes drach. singulas, & dabis bibendos singulos, cū aquæ mulæ calidæ cyathis binis. utile est hoc medicamen, etiam si per ueretrum infundatur.

Confectio conditi nephritici, quod facit ad dolorē reniū, si aliquo casu uexati fuerint, & ad uessicæ purgationē, & ex ea calculos, uel fabulones eiiciendos, sic. herbæ uettoniæ — I. herbæ saxifragæ — I. herbæ quæ appellatur græcè ἀσάρον, semunciam, seminis dauci semunciam, seminis petroselini macedonici unciam, croci — I. spicæ nardi — I. piperis — I. uini candidi optimi ueteris sextarios sex, mellis despumari optimi s. I. quod hoc modo despumabitur, ut mittatur in ollam, & accipiat uini parum de supra scripta mensura, & cum coeperit bullire, spuma omnis coctileari paulatim tollatur. herbæ autem omnes in pila tunduntur, similiter, & crocum. sed separatim omnia, & cribello tenuissimo cernuntur, nec nō, & piper teritur. quæ omnia creta simul in mortarium mittuntur, & paulatim uino adiecto diligenter teruntur. quæ cum trita fuerint, adiicietur; & mel, & uinum totum supra scriptum, & diligenter permiscebitur. postea condetur in uasculo cannarum; cum autem fuerit necessarium remedium, portionem in pisinno calice calda mixtam ieiuno dabis bibendam, ita ut accepta potione uestetur.

Ad calculum, remedium efficax sic. nuclei pinei grana purgata X X X. palmulas purgatas infusas X V. tragacanthi X V I. mali granati dulcis succum X V I I. croci X I I. myrræ X I I. hæc uniuersa con-

tusa, & soluta, in se miscentur, & ex ijs, qui calculo laborat, manē ieiunus accipiet coctilear unum, ita ut non manducet, usque ad horas prandij tardioris.

Ad renium dolorem remedium utilissimum sic. cucumē ueri semē in testā pones, super carbones uiuos, ita ut temperatē exuratur, neque nimis, neque parum,

q iij

& ex eo Θ XII. & maluz feminis scrupul. X VI. & amygdalæ amaræ purgatæ Θ XXXVI. hæc separatim tunsa cum in tenuissimum puluerem redacta fuerint, simul misceto, & ex eo cum hepfematis, id est sapæ cyatho, coctileare I. de mane ieiuno dabis bibendum. Ad renium dolorem, herbæ uettoniæ

tritæ pondus denariorum duorum, sano ex mulso, febricitanti ex aqua calida, bibendum dato.

Chama pitys ex uino trita, atque ita pota, plurimum prodest renium dolori. Baccarum cupressi uinum contritarum succus colatus, cum uino potui datus, mire renium dolori medetur, ita ut si necesse fuerit, per alios nouem dies adaucto numero baccarum, & iterum, si ita opus fuerit, per alios nouem dies deminuto numero detur, quousque ad unam baccam potio numerusque descendat; sed interposito uno die, debet esse commutatio potionis de maiore ad minorem modum.

Lanam succidam pice liquida in line, & umbilico impone, statim renum dolor sedabitur. Artemisia herba est, quam gallicè bricum appellant, hanc ubi nascatur, require, & inuentam, manè, ante solis ortum, sinistra manu extrahes, & ex canudos renes præcinges. quo facto, singulari, & præsentaneo remedio uteris. Pice liquida pollices, tam pedum, quam manuum ab unguibus, usque ad prima articularum initia inlines, & chartam superpones, intra triduum, ita sanabere lumborum dolore, ut per singulas noctes detrimenta doloris intelligas.

Qui renium dolore uexabitur, in charta rudi scribat characteres infra scriptos, & auro, uel cupro includat, & circa renes alliget, miro remedio utetur, $\kappa\alpha\pi\rho\beta\epsilon\mu\alpha\delta$.

Passi cretici cyathos tres, lactis caprini itidem, seminis cucumeris triginta tria, optime trita simul una potione, qui biberit, absoluetur renium dolore.

Molliginem ex uino optimo bibat, qui renium dolore uexabitur, confestim sanus erit. succum quoque radices amaræ cum melle mixtum bibat ieiunus, uel ex uino austero, statim remediabitur.

Artemisiam tundes, & cum adipe suilla, aut qualibet uetere subiges, & panno inductam, pro malagmate renibus impones. Mulier quæ geminos peperit, renes dolentes supercalcet, continuo sanabit.

Remedium unicum, & quod citissime renium dolores cum admiratione per sanat, sic. bitumen super carbones uiuos pones, & sago grandi ad modum cauez eos operies; atque illic interius, nudum, qui renium dolore uexabitur, supra ipsos carbones federe præcipies, ut fumus ille corpus eius omne circumeat, hoc si necesse fuerit, & ter facies, ut peritus sanetur.

Radix asparagi trita, & cum uino pota, renium dolorem optime tollit. Ocymi succus in mali granati corticem fusus, & potus, plurimum renibus prodest.

Fel herinacei cum uespertilionis cerebro, & canino lacte renibus impositum, mirum prodest. Adeps anferinus cum eiusdem cerebro, & butyro, & alumine, & æsypo impositus, ad ceroti modum, efficaciter renibus prodest.

Stercus columbinum tritum cum ordeï farina, & adipe suilla, & ouorū albo simul permixtum, & coctum, emplastri more rectissime renibus imponitur. In capitibus piscium, id est mugilum, aut mullorum, spina inuenitur cani similis. hæc renibus adposita, uel alligata, miro remedio est.

Plantago ex melle trita, & imposita, renibus statim prodest. Oua sepiarum in cibo sumpta, urinam mouent, & renium grauedinem tollunt. Inula trita, & cum uini cyathis tribus per triduum pota, plurimum prodest renibus separandis.

Axungie ueteris felibram, olei ueteris felibram, samisci felibram, rutæ fasciculum una decoques, & lanam ibi succidam tingues, ac renibus superimpones, mire subuenies.

Ad uesticæ dolores, & stranguriam, cardui semen ex uini sextarijs duobus, usque ad heminam decoctum, & expressum, atque colatum, potuique ieiuno datum, plurimum prodest.

Plantæ rutaceæ, & nepetæ radices, baccæque lauri, in uase fictili cooperto diligenter coctæ, ne uis medicamenti emanet, potui dantur, ita ut prius expressæ coletur, mirabiliter uesticæ doloribus profunt.

Herbæ quæ græce sisymbrium dicitur, tritæ succus expressus, & sano ex uino, febricitanti ex aqua potui datus, minimè ad uesticæ dolores remedium est. Foeniculum cum radicibus suis decoctum, & potui sumptum, efficaciter uesticæ doloribus prodest.

Glycyrrizæ commanducatæ succus deuoratus, uel transmissus, urinam efficaciter prouocat. Trifolium minimum cum pipere, & pulegio quātum satis uidebitur, tritum, & cum uino potui datum, uesticam renesque purgabit.

Herbæ uerbenæ contritæ succus expressus, adiectis uini cyathis tribus, potui datus, admirabiliter continuo urinae difficultatibus proderit.

Herba quæ gramen dicitur, nodorum XXVII. ex uino ad medias decocta, & expressa, atque colata, potuique strangurioso ex uini cyatho uno mixta data, adeo potenter succurrit, ut ubi sine tormento urinam facere coeperit, dari non oporteat, sed febricitanti ex aqua sola dabitur.

Si quis uitio uesticæ, aut stranguriæ laborans, lignum tamariscum ardens, lorio suo extinxerit, desinet ultra cruciari.

Cupressi folia tenera ex aquæ sextarijs quatuor ad sextarium decocta, & expressa, atque colata, cum uino potui data, stranguriam celeriter emendant.

Hederæ nigrae baccas V. aut VII. aut undecim, prout ætas ægri uiresque patientur, cōtritas, ex aqua multa sumptas, mire prodesse manifestum est, etiam si sanguinolentam urinam stranguriosus faciet, ex qua tantummodo calida eas potare debeat.

Auis ossifragæ uentriculus salitrus, ut seruari possit, aut exustus, & in puluerem redactus, cum uini potione datus, urinam efficaciter prouocat.

Muli impetigines in utroque crure super genua nascuntur, & ueluti cutis arida modo inhzrent; has incende, & stranguriosum diuaticatum desuper pone, ita ut suffumigationem illam expansis uestibus tegat, ne quæ odor, aut fumus emanet, efficacissime incommodi eius uitio carebit.

Asini renes arefacti, atque exusti tritique, id est in puluerem tenuissimum redacti, & ex mēsurā conchile unius, cum uini meri cyathis duobus strangurioso, potui dati efficaciter medentur.

Verris siluatici lorium cū sua uestica in fumo suspensum, & adseruatū, stranguriosis cū potione mixtū potui datū, efficacissime prodest.

Pili caprini combusti tritique, & in potione dati, stranguriosos potenter emendant. Pedum

Pedula agnorum decoctorum ius potui sumptum, stranguriolis plurimum prodest. Herinacei caro optime decocta, atque in cibo sumpta, stranguriolis mire subuenit, & cito naturalem urinæ cursum relaxat. Codez crudæ contritæ cum testis suis, & ex passo per dies septem, aut ut plurimum nouem potui datæ, efficaciter dysuriæ profunt. Amyli semunciam terito, atque addito ouum recens, & eius oui testam ter passo impleto, idque poculum diu agitarum, & feruifacium, strangurioso reuerso a balneis dato, omni cum dolore, ac difficultate celeriter absolues. Cicer arietinum in aqua decoquito cum sale, eamque strangurioso ad binos cyathos bibendam dato, efficaciter iuueris. Fimus palumbinus in forbitione sumptus ex faba facta, admirabile stranguriolis præsentat auxilium. Turturum fimus ex mulso coctus, & ceroti modo uentri, ac renibus laborantis impositus, efficaciter prodest. Mentæ bene tritæ codearia duo ex aqua calida ieiuno per triduum dabis, continuo uessicam releuabis, urinamque laxabis. Pulegij fasciculum in olla noua ex uino uetere, ad tertias decoques, & exprimes, atque cola- bis, & ex uino ieiuno strangurioso portiones singulas per triduum dabis. Lapillus qui inuenitur in scorpionis marini cauda, tritus utiliter bibitur cum uino, a strangurioso. Vngularum aprugnarum exultarum cinis portioni inspersus, plurimum urinæ difficultates iuuat. Leporis cerebrum in uino utiliter bibitur, eiusque testiculi rosti salubriter manducantur, ab eo qui uessicæ molestijs laborat. Anserum siuestrum linguæ assatæ, efficaciter sumuntur in cibo a calculosis. Cymini — I. rutæ — I. piperis semunciam teres diligenter, & codeare plenum in meri ueteris potionem mittes, & aquæ, quod sufficiat adijcies: postea ferro candenti sæpius immerso calefacies, & ieiuno bibendum dabis, efficacissime subuenies stranguria laboranti. Spongia ex rubo rosario agresti sumpta, & aqua frigida donec madescat, macerata, ac deinde trita, & ex aqua per triduum potui data, efficaciter calculosos emendat. Piscis scorpio assatus in cibo sumptus, optime calculoso proderit. Codez inanes, id est sine carne sua, casu inuentæ contusæ, & in puluerem tenuissimum redactæ, in portione calculosis datæ medentur. Vngulæ equinæ scobem, uel exustæ cinerem, si calculosis in potionem acceperit, cito sanabitur. Herba saxifraga si ex oleo, & liquamine manducetur, intra triduum calculos soluet. Calculosis expertus adfirmat incredibiliter succurri remedio tali, si hircum, melius si agrestem, melius si anniculum, & si mense Augusto claudas loco sicco per triduum, ut ei solas laurus edendas sumministres, & aquæ nihil accipiat; ad postremum tertio die, id est aut iouis, aut solis occidas. melius autem erit, si castus purusque fuerit, & qui occidit, & qui accipiet remedium. exsecto igitur gutture eius sanguis excipitur, utilius si ab inuestibus puens excipitur, comburitur in uase fictili, usque ad cinerem, uas autem in quo torrebatur coopertum, & inlitum gypso in furnum mittetur. quod cum uapori exemeris, in puluerem conteres, nec non, & polypum marinum identidem, ut dixi exustum, in puluerem rediges. confectio autem uniuersi medicaminis hæc est. sanguinis huius hirci — III. piperis albi — I. polypi exusti cineris — III. thymi — I. pulegij — I. apij, seminis olusatæ — I. hæc omnia separatim trita, & ad leuissimum puluerem redacta commisces, & dabis infirmo; melius si die solis, aut iouis codearis mensurâ in meri portione, aut cuiuscunque dulcis poculi. providere autem debes, ut digesto, ac ieiuno potio detur, & rursum, ut eadem portione bene digesta, cibos accipiat; & eo melius erit, si hanc portione cum condito, post balneum in sabanis, adhuc constitutus acceperit. Supra omnia efficax aliud ex eo facies medicamentum sic. sanguis hircinus ea observatione, qua supra excipitur, in patella ferrea cadente, ut aduri possit, & stringi continuo ipse sanguis, ita ut postea in puluerem redigatur, uel certe continuis aliquot diebus, ad solem ipsum sanguinem pones, ita ut rore iam decusso, post horâ secundâ ponas, & ante nonâ colligas. posteaquâ, ita fuerit siccatus sanguis, ut nullum humorem habeat, colliges eiusdem crustulas, & teres, atque ex eo leuissimum puluerem rediges. deinde accipies herbam tribolum, cuius herbæ ipsum tribolum, hoc est semen spinosum projicies, ipsam autem herbam lectâ de locis maritimis siccabis, tundes, & in puluerem rediges. confectio autem medicaminis totius hæc est. herbæ triboli — II. piperis — II. petroselini macedonici — II. folij fertulam, id est coronam, siue sphaeram unam. hæc omnia separatim trita, & ad leuissimum puluerem redacta, cum sanguine hircino miscebis, & dabis infirmo die solis, aut iouis codearis mensuram, in meri portione, aut cuiuscunque dulcis liquoris. providere autem debes, ut digesto ieiunoque potio detur. quam cum acceperit qui calculum patitur, mox lapides solutos omnes per urinam emittet. ut uero ammireris sanguinis hircini uirtutem, adamas lapis inuictus, qui neque igni, neque ferro uincitur, si sanguine hircino perfusus fuerit, mox soluetur. Ad uessicæ dolorem, & urinæ difficultatem, herbam gladiolum diligenter fodi to, ut omnem radicem eius palo ligneo eruas, cuius radicis corticem diligenter nitidatam siccabis optime, & teres, atque cribrabis, ut in puluerem tenuissimum redigas, atque ex eo codearia tria mittes in mortarium, & piperis albi grana nouem trita, & myrtæ optime tritæ pusillum, & uini optimi a. I. I. atque hæc omnia in unum permiscebis, & conteres, ac laboranti in balneo, id est cum in piscinam descenderit, dabis bibendam portione, & monebis, ut se post balneum calidissime tractet. hoc medicamine, seu uir, seu mulier, seu puer, seu puella, potentissime sanabitur. Codeam gradem unam uiuam prendes, & eius carnem eximes, ac solam teres in mortario, & cum aceti acris codearibus tribus dabis bibendam, atque hoc per triduum facies. deinde intermisso triduo, nisi statim expulerit calculum, similiter remedium, & si necesse fuerit, sæpius dabis. Filicis radicem, asparagi spongiæ apij radicem, & petroselinum simul diligenter teres, & ieiuno calculoso, cum uino dabis bibendum. Violæ erraticæ rusticæ radices, & apij, & uiolæ coronariæ semen, una contrita, & ex aqua calida a balneo continuo potui oblata, dolores uessicæ cito abigunt.

Lapis ex uestica hominis, qualibet curatione sublatus, si teratur, & ex uini cyathis tribus, calculoso potui detur, lapides uesticæ humanæ innatos, efficaciter dissoluere creditur. Cime ex foraminibus utrorum confectus, dolorem uesticæ protinus tollit. Vescica apri recte aduersum uesticæ dolores in cibo sumitur, ita ut mulier foemina, uir masculi sumat. Nasturtium tritum cum uino dulci, cibario dabis, uesticæ radio laboranti, per triduum potui, sed satis spissum poculum detur. Vescicam relecta coliculi cocti aqua triduo a ieiuno iugiter pota. Ad uesticæ uitia curanda, myrtæ semunciam bene tritam cum mulsi ueteris cyathis tribus, dabis per triduum ieiuno exeunti statim a balineo, ita ut dum fabanis operitur, singulos in diem cyathos bibat. Si in uestica aliquid molestiæ fuerit, nitri florem, uel si flos non fuerit, ipsum nitrum conteres, & cum aqua in qua coliculi cocti fuerint, uinoque picato, uel austero rubello durissimo dabis bibendum per triduum, uel diutius, si ita opus fuerit, magnificentissime proderit. Prima luce puer uirgo, rorem de folijs caulium excussum, in noua olla excipiat, non minus sextarios quatuor, eo adijcies mellis quartarium, & foenigræci bene mundati, & loti quartarium, & zingiberis uncias tres, atque ita decoques horis tribus, & inde bibendum dabis mane ieiuno calculoso quartarium tepentem. hæc potio per triduum sumpta mensura quartarij, & uesticam, & renunculos, & intestina uniuersis sordibus purgat. Piperis grana lxx. eiusdem ponderis sulphur, trita simul in uino uetere dabis bibenda ieiuno calculoso, solet statim perniciem demouere; si tamen ultra dolor manserit, iterum dabis finilem potionem. Pellem leporis recentem in olla munda, uel tegula, ita cum lana sua combures, ut in tenuissimum puluerem redigere possis, quem cribratum, in uase nitido seruabis. inde cum opus fuerit, tria coctlearia in portione dabis bibenda; quæ res, siue calculos, siue uesticæ dolores continuo cõpescit. sed multo potentius erit remedium, si leporem uiuum in olla noua claudas, & gypso omnia spiramenta uasis obstruas, & in furno, usque ad fauillam tenuissimam cremes, tritamque, & cribratam recondas, atque inde certas mensuras in portione uini offeras calculosis, & qui sanguinem mingunt, mirè eos sanabis. Cimolique cretæ tunsæ 8. III. & farinæ, ordeaceæ 8. III. ex aqua coques, & in saccos tres lineos mittes, coque somento uicissim mutato, ut bene caleat, calculosos, seu uesticæ dolore laborantes ter in die uaporabis, potenter subuonies. Item aliud ad eos certissimum remedium. pruna quæ in sepibus nascuntur colliges, & eorum nucleos tolles, & seruabis ad præsidium, & cum opus erit, in pila tundes quam optime, & cribrabis quam minutissime, atque inde ex picato, siue austero, ac duro uino dabis ieiuno bibenda in portione diurna coctlearia tria. Hoc uero medicamen non solum uesticam curat, sed etiam uulnera intrinsecus latentia, & uomicas per sanat; conficitur sic. cucumæ sextariorum nouem rudis aqua impletur, & ad dimidias coquitur; tum adijciuntur in eam spongiarum asparagorum uncia quatuor, apij radicum tantundem, saluicæ lotæ diligenter uncia duæ, cassiæ fistulæ semuncia, amomi ʒ V III. petroselinij dimidium quartarium, iris illyricæ uncia una, mastichæ chiz uncia duæ. deinde aqua cucumam supplebis, & de gypso præclaudes, ut tamen modicum spiramenti relinquant, atque ita coquens claudes cucumam, ne medicamen exiliat, & ad medias decoques, ac recondes in ea. cum opus fuerit, dabis ex eo cum portione uini, quantum sufficiat ad bonam mixturam, sed & ieiuno, & dormitum eunti dabis. Petroselinij heminam, apij seminis tantundem, in cucuma fictili noua prius imbuta ex aqua decoques ad tertias, ita ut occlusa sit cucuma, ne medicamen ebulliat. postea aquam colabis, & addito melle, iterum ad tertias decoques; inde ieiuno calculoso potionem per triduum dabis. Calculos potio hæc assidue sumpta cum passo, uel condito non sinit gigni, eosque con crescentes confringit, & per urinam harenæ modo promit; conficitur sic. calaminthe, id est nepetæ — II. filis pictorij, piperis, succini, saxifragæ, petroselinij, cyperi, zingiberis, — singulas, tundes, & cribrabis, & coctlearium plenum cum uini mixta, & calida portione ieiuno bibendum dabis. Ad calculum remedium mirum sic. hederam quæ in quercu nata fuerit, uulnerabis cupro, & permittes humorem, qui inde manauerit, indurari in modum gummi. postea sublatus condito resolues, & admiscebis, & bibes quotiens usus exegerit. Herba phyllalidis baccas ternas per triduum glutiat, qui uesticæ calculo dolebit. Herba britannicæ radices contundes, & terna scripula ex aqua calida calculoso ieiuno potui per triduum dabis. eiusdem herbae succum expressum in duplici uase decoques, ita ut succi eius naturalis sextarius fiat, quem cum mellis despumati hemina miscebis, & postea in se decoques. & cum colorem mutauerit, refrigerabis, atque inde coctlearium unum ex aqua calida, si uehementer febricitabit, calculoso potui dabis, statim etiam febris extinguetur; si uero sine febre erit, ex uino eam potionem debet accipere. Ad renium dolorem, emplastrum utile sic. axungie ueteris P. I. I. farinæ ʒ. I. olei P. I. ceræ se libram. ijs liquefactis adijcies sulfuris cõtriti selibram, nitri cõtriti, & cribrati selibram. omnia permiscebis & concoques, atque inde renes confricabis, uel more emplastri adpones. Herbam sabnam in mortario teres, & cum axungia uetere subiges, & sic renibus adpones. Ad urinæ incontinentiam, remedium sic. foeniculi radicem, & ramusculum erui contunde, & ex uino uetere da bibendum, cõtinuo remediabis. Urinam continet, lac caninum, & adeps eius cum alumine datus, ita ut sit fabæ magnitudine globulus qui datur. Cinis coctlearum africanarum exustarum si potetur, urinæ incontinentiam sedat. Anserum trium linguas inassatas, si quis edierit, urinæ profluuium non patietur. Vescica uerrina cocta, uel uista, comedenda, aut bibenda efficaciter datur ei qui urinam suam non potest continere. Leporis rebellum ex uino potum, urinæ incontinentiam refrenat. eiusdem testiculi torrefacti, & ex uino poti, par remedium submeiulis præstant. Vngues aprugni exusti tritique in portione sumpti, efficaciter submeiulis profunt. Qui urinam tenere non poterit, capræ uesticam comburat, & cinerem eius ex aqua cum uini portione bibat. Verrini genitalis uisti cinerem bibere debent ex uino, qui urinam continere non

re non possunt.

In cubili canis urinam faciat, qui urinam non potest continere, dicatque dum facit, ne incubili suo urinam, ut canis faciat.

Vrinæ propriæ quantumcunque ignorant submeulo efficeretur offertur, uel res quas comminuerit in potione exprimuntur, aut ibidem diluuntur, & ita ei inscio ipsa potio propinatur.

Vitrum teres diligenter, & cum pice cedria miscebis, atque ita chartam uirginem inlines, & renibus adpones, quo medicamine diebus septem iugiter usus, sanus firmiter eris.

Ad reniculorum dolorem obseruabis, ut post balneum poscam calidam bibas per plures dies, & quotiens dolore interpellatus fueris, idem facies.

Conditum ad reniculorum dolorem, uel ad calculum, sic. saxifragæ — I. uertonice — I. petroselinii — I. apij seminis — I. rutæ feminis XVII piperis — II. uini optimi s. XII . mellis optimi P. V. tundes omnia, atque cribabis, & conditum cum exegerit necessitas facies, eo que ubi reniculorum dolor, aut molestia calculi fuerit, uteris.

Saxifragam herbam, petroselinum macedonicum, piper, mel, uinum, ex ijs omnibus conditum facies, & laboranti calculoso per singulas septimanas potionem iouis die dabis, conficienda autem potio die iouis luna uetere erit.

Ad calculum potio salubris, conficitur sic. semen apij, libystici, foeniculi, anethi, & quis mensuris tritum miscetur, & herbæ saxifragæ grana V. cumini grana tria, piperis grana V. uerbenæ folia tria, & falis permotum adijcitur.

ex omnibus autem seminibus supra scriptis æqualiter quantum tribus digitis, id est pollice, & ab eodem tertio, & quarto leuari potest, mittitur, dein teruntur omnia diligenter: postea adijcitur careni optimi potio grandis, ad hanc sane potionem miscendam, radices asparagorum, & apij, & anethi, & foeniculi lotæ diligentissime in sextarios aquæ nitidæ mittuntur, ita ut radices ipsæ tegantur aqua, atque in olla rudi coquantur ad tertias.

ex ipsa aqua, sed calida miscenda potio careni, & accipienda per triduum. sufficiunt autem duo huius aquæ sextarij ad tres careni masculas potiones. sed si necessitas præsentis doloris exegerit, per triduum continuum dabuntur.

si uero quis timeat tantummodo dolores supra scriptos, aut aliquando pertulerit, accipiet etiam sanus hoc modo uetere luna tres tantum tribus mensibus singulas potiones, & iugiter contra hunc morbum erit tutus, & sanus.

Coliaci, & dysenterici, & torminosi, & ad intestina rupta, & interni morborum, atque incontinentiam stercoreis, remedia physica, & rationabilia diuersa, de experientia mentis. Cap. XXVII.

Pastillus ad coeliacos, & torminosos optime faciens. acaciæ, balaustij, id est mali granati, quod cytinum uocatur, germen antequam florescat, hypocystidos, opij, singulorum denarios quinos, alterci, cretæ famiæ, singulorum denarios senos. ijs bene tunsis, & cretis, ex uino myrteo fiunt pastilli denariorum singulorum, aut semissium, ut iuxta ætatem, aut ualitudinem dentur. dantur autem ieiunis, sine febre ex uino myrtei, aut signini cyatho uno, cum duobus aquæ mixto; febricitantibus uero, ex aquæ cyathis tribus. hoc etiam per clysterium immittitur, quotiens desurrexerint torminosi; quibus, & si grauius afflicti sunt, statim prodest.

Ad coeliacos, id est qui subite, & multa defundunt, & ad aluum citatam, & ad leuia interdum tormina, medicamentum potens sic. sorborum aridorum contusorum s. II. rhus syriacæ quo coci utuntur, s. II. mala granata recentia X. mala cydonæa matura X. hæc utraque coquuntur in sapa, facta ex musti adhuc in dolio feruentis sextarijs XXXV . quousque ad sextarios duodecim decoquantur, & donec malorum coria percoquantur, & sint madida. deinde ita teruntur hæc fictili mortario, ut grana omnia comminuantur; postea rhus, & sorba arida admiscuntur tunsæ, & cribata curiose, & cum sapa, quæ est resida, temperantur.

omnibus ergo in unum bene coactis reponitur medicamentum in uitreo uase; dantur inde ieiunis ligulæ duæ, uel tres, sine ullius rei admixtione.

Pastillus ad torminosos efficacior, conficitur sic. acaciæ XIII . croci II . gallæ VIII . hypocystidos XIII . lycij XIII . myrtæ XIII . rhus quo coci utuntur, nardi syriaci spicæ, aloes, singulorum denarios binos, anesi, gummis, singulorum X ternos, piperis nigri II . teruntur hæc diligenter, & ex succo rubi cauliculorum, uel ex uino Signino collyria formantur, ritu eorum quæ ad oculos fiunt; cum tamē ita fuerit leuis confectio, ut in ungue nulla appareat asperitudo.

inguntur autem alia denariorum singulorum, alia semissium, quæ iniiciantur; sed rectius ad hanc mensuram pastilli dabuntur, ita ut unus ieiuno ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt; ex uino signino, si sincere corpus fuerit, detur.

hoc efficax medicamentum est, si cætera quæ in huiusmodi causis, curationi, uel cibati sunt necessaria, obseruatione, & opportunitate congrua fiant.

Pastillus qui clysterio immittitur, torminosis per annum, cum olida, & sanguinolenta deijciunt, id est cum intestina eorum cancer occupauit, quo quasi cauterio tunc tantummodo uti oportet, alioqui nocet.

Ideo quæ a quibusdam ignorantibus usurpatus accusatur quasi nociuus; recipit autē hæc chartæ combustæ cineris XXX . calcis uiuæ XXIII . arsenici, quod est auri pigmentum XII . sandaracæ VI . hæc trita, uino consparguntur, in quo rosa, & lenticula prius coquantur, ut possint fieri pastilli X duum, aut unius. cum opus est, teritur unus pastillus, & immittitur per aquam, ut supra scriptum est, decoctam cum rosa, & lenticula si febres erunt; sin minus, ex uino eadem decocta utilia erunt.

facit bene, & myrti fasciculus cum oleastri, uel oliuæ ramulis utroque modo, prout res exegerit incoctus. potio autem cum immixtum fuerit supradictum medicamentum, hæc conuenit. in noctem in aqua catapotia datur, quæ fiunt sic. myrtæ II . lycij II . turis I . opij I . aloes II . acaciæ XIII . myrti baccarum nigrarum VI . ouorum ex aceto coctorum uitellos II . hæc trita uino Surrentino consparguntur, & fiunt pastilli X singulorum; dantur febricitantibus ex aquæ cyathis tribus; sine

febre, ex musti furrentini cyathis duobus.

Ad uentris dolorem, & inflationem intestinorum, & praecordiorum dolores, & ad conuulsa, & rupta interanea, & ad urinę difficultatem, remedium sic panacis * IIII. piperis * IIII. dauci cretici radices, uel seminis * VI. sulphuris uiui * S. opij duas tertias uel partes uictoriati ponderis. castorei * S. myrrę * III. hæc trita, & cribrata uino consparguntur, & ex ijs fiunt pastilli magnitudinis lupini, dantur cum res postulat, ex aceto, & melle in unum mixto cyathis tribus. ad uitium autem mulierum, quo correptę suffocantur, quod greci hysterice pniga appellant, ex aqua mulsa dari oportet, & quantum nux auellana est, detrahit enim urinam copiosam.

Medicamentum, quod dodecatheon appellatur, mouet urinam, facit & ad eos qui reficiendi sunt post grauem inbecillitatem, facit & ad auriginem habentes, & ad iocineris, & renium dolorem, & ad lienosos, & ad hydropicos, & difficulter urinam reddentes: crapulam quoque non patitur, uino nigro potum, subsistere. praedest stomachicis, & mulieribus a uulua laborantibus, & ad omnia uenena, & ad serpentium morsus, atque ictus, & ad interius conuulsa satis utile est, conficitur sic. myrrę denarios duos, cassiæ corticis * II. iris * I. S. apij seminis * II. & tertiam uictoriati, aconiti * I. uiaz passæ sine granis denarios sex. hæc omnia uino aruisio contusa cribrataque consparguntur, dein ex ijs fiunt pastilli * singulorum, quamuis auctor dicat se pastillis usum, etiam ad denarij semissem cum uini supra dicti cyatho.

Medicamentum mirum ad coeliacos, & ex cruditate grauedines doloresque cuiuslibet partis in corpore sustinentes. nec minus ad oculorum facit, & renium dolorem arcendum, & ad scabiem uesciæ, & ad iocineris duritiam, exsiccat enim corpus: prodest, & ad arteriam, denique in omnibus laborantibus adiunxit, & concoctiones, & urinā mouet, conficitur sic. Nardi syriacę, croci, myrrę, cassiæ, costi, cinnami, castorei, schœni floris, piperis albi, piperis longi, galbani, resinæ terebinthinæ, styraçis, opij, singulorum denarios quater-nos, alterci seminis, anisi, apij seminis, singulorum denarios quinos, tragacanthi denarios sex, mellis, uini salerni, uel similis huius sextarios singulos. hæc omnia contunduntur, & cribrantur, donec mollissimam tenuitatem accipiant, tum in patellam fictilem nouam mel infunditur tepescitum molli pruna. dein uinum instillatur, macerato prius in co tragacantho, uicissimque ceteræ species insparguntur tum simul mouetur medicamentum, & omnia omnibus permiscuntur. cum autem crocinum colorem habuerit medicamentum, transfunditur in mortarium marmoreum, & ibi pistillo bene subactum reponitur in pyxide cornea; cum opus est, datur ad supra dicta, cum uini cyathis tribus, admixto aceto, atque melle, prout uisum fuerit.

Ad eadem remedium efficax, quod conficitur sic. myrrę * quatuor, croci & panacis denarios ternos, alterci * V. anisi * II. apij seminis * V. opij * II. papaueris capitati, & satiz * V. gallę syriacę immaturę denarios V. I. mori ex rubo immaturi aridi * IIII. rosę aridę * VI. Balaustij * III. rosę caninæ succi * III. rhus syriacę * V. palmarum purgatarum * XX. quæ coquuntur ex aquę cisterninæ sextarijs tribus, donec relinquatur sextarius unus. deinde ipsæ palmæ exprimuntur pressio, aut coctæ, ex succo eodem, atque aqua modica fiunt de supra scriptis speciebus in puluerem redactis, pastilli ad * semissem, dantur similiter, ut prius medicamentum dari oportere præcepimus. Prodest torminosis plātaginis succus, uel rubi, uel lentisci, uel rhus syriaci, uel herbę millefolij, uel terebinthi, omnium ad * semissem potus cum uino, uel aqua.

Benefacit torminosis rumicis semen quantum ligula capit tritum ex uini austeri cyathis quatuor, uel aquę totidem, in tempore potum. Glandes quercinę tres, aut quatuor, uel eiusdem folia, uel liber eius coctus ex aqua, quæ uel sola, uel cum uino torminosis potui data plurimum prodest. Ceratitidos, quam herbam uiolam marinam appellamus, radices trium digitorum magnitudine incoctę uino austero, torminosos iuuant; si illud uinum admixta leuiter aquę calidę potione potetur. Herbę britanice radix, uel folia incoctæ, uel aqua in qua tamarici folia, & semen incoctum fuerit, torminoso potanda detur, etiam cum admixtione uini austeri.

Plantago cocta ante alium cibum data ex aceto plurimo, & exiguo sale, atque oleo, torminosis plurimum prodest. Plantaginis aridę semen tritum ex partibus duabus, & papaueris capita arida trita ex parte tertia, oportet per cribrum tenuiter foratum trajici, ex eoque puluere dari torminoso sigillatę magnę mensurę, interdum plus aut minus, cum uini ueteris mixti non nimium, id est cyathis tribus. hoc medicamentum ante somnū utiliter etiam ad uesperam datur.

Prodest torminosis huiusmodi sorbitio; halicę hemina percoquitur cum cerę, & rutę * I. admiscetur sane ijs, & malum granatum, atque ita simul coquuntur in aqua. post hoc, exprimuntur omnia, & coagitantur diu; ac si opus fuerit, adijcitur alica cocta, ut in modum pulvis sit. lactis quoque bubuli, aut cuiuslibet denarius I. admiscetur, & sic sorbetur. si autem mādycare panis more illud uolueris, addes illic oua incoctā tria, & polentę uitiidę delicatę quantum satis erit, ut panis fieri ex eo possit; qui etiam frigidus comestus plurimum prodest.

Medicamentum ad torminosos huiusmodi satis utile est. croci * I. & duę partes uictoriati, nardi * II. acacię * III. gallę * III. aloes uictoriati pars tertia, lycij * I. opij * S. tragacanthi * S. & tertia eius, suris * I. & uictoriati partes duę, myrrę * duo, piperis * S. teruntur, & cribrantur hæc diligenter, atque ex uino fiunt pastilli lupini magnitudinis, dantur cum tribus cyathis liquoris cuiuslibet, tam diu quousque conueniat, ut tormina uniuersa sedentur.

Immitti torminosis per clysterem oportet uinum ex piris syriacis factum cum succo plantaginis; mirificę enim facit hoc remedium, & multis experimentum dedit. Palmarum numero uiginti pulpe, iunci radices * X. gallę immaturę * X. myrrę * V. tunduntur, & miscentur uniuersa, atque ex omnibus fiunt ex uino pastilli numero triginta; dantur similiter, ut prædicta medicamenta ex quolibet liquore.

Balaustij * V. opij denarios duos, gallę immaturę pilularum denarios II. tamarici seminis * II. turis * IIII. rhus syriaci * quatuor, uinaceorum tostorum * V. hinc pilulam ad duum

ad duum denariorum pondus, cum portione ex uini nigri cyathis tribus, totidemque aquæ calidæ mixta torminoso dari oportet. Si torminosi, uel cœliaci, propter frequentes desurrectiones, uiribus deficientur, dandæ erunt eis forbitiones ex cremore farris, uel ex ptisana factæ, modo per se solæ, modo cum rosa unguentaria mixtæ; uel ius gallinæ pinguis excoctæ cum butyro; uel lac caprinum, aut ouillum tepidum per se, uel etiam decoctum cum butyro, & lenticula similiter facta, prodest. imponenda uero sunt tormino si farigaris a stomacho, usque ad inguina unguenta, quæ spissant cutem, ea quibus unguentarij utuntur.

Medicamentum, quod per anum iniicitur torminosi, sic. calcis uiuæ, sandaracæ, auri pigmenti, singulorum paria pondera; teruntur una omnia ex aqua, uel succo plantaginis, donec possint coire; tunc pastilli fiunt; cum opus sunt, teruntur, & iniiciuntur, ad cuiusque uires, ut plurimum * IIII. aut minimum * I. cum hemina, uel ut plurimum cum cyathis I X. aquæ cum myrtis decoctæ, uel cum rosæ folijs, uel lentisco. medicamento sane hoc uti oportet, non inter initia torminosi, sed cum malignitas uitij apparuerit; & si non eodem die, quo primum adhibetur, profuerit, etiam sequenti fieri oportebit. si quis autem morbus intestinorum, cum immixtum erit medicamentum, aut cum redit, insequitur, infundatur statim per clysterum lenticulæ decoctæ aqua, uel surfures, sedabitur confestim dolor, cum eas deiecerit torminosus, post iniectionem sane detur cibus. Aliud medicamentum, quod mirifice prodest torminosi, siue febrem habuerint, seu sine febre fuerint. plantaginis succi hemina frigida, uel tepida immittitur per clysterem in anum, uel per se sola, uel cum uino ex piris syriacis facta. hoc medicamentum, etiam si æger cibum horrescit, restituit ei cupiditatem manducandi; facit uero sitim intolerabilem, sed moderate bibendum.

Pastillus ad torminosos efficax, conficitur sic. acaciæ * I. mali granati corticis * VIII. gallæ syriacæ immaturæ * V. opij * V. myrti baccarum nigrarum * VII. rhus quo coriarij utuntur * VIII. uel eiusdem succi * VI. alterci seminis * VIII. turis * VIII. rhus syriaci * VIII. hæc omnia animantur, præter acaciæ, opium, & contunduntur seorsum, & in unum miscentur, uinoque omnia myrtino consparguntur, atque in pyxide fictili reponuntur. si quis uolet pastillos facere, adjiciet gummis * V. dabitur ex hoc medicamento, ieiuno torminoso * I. ex aqua, uel ex uino mixto myrteo. idem medicamentum immittitur per clysterem ad mensuram iuxta uires cuiusque. Vinis uti oportet torminosos ex myrto, & piris syriacis, ex malis cydoneis, & terebintho, ex rhus coriario, ex glande quercina, ex lapathio, ex populi fructu, ex rubo, ex hypocistide. quæ omnia decoquantur seorsum cum uino Surrentino, aut Signino; portioni uero admiscetur aqua cisternina decoctæ, & sub diuo posita. Prodest torminosi lac potum, in quod lapides feruentes sæpius, uel ferrum candens dimissum fuerit, si tamen non febricitabunt.

Cibi profunt torminosi huiusmodi, panis fermentatus durus, pultes diuersæ, lenticula aceto condita, brasiuca, plantago, intyba, mala cydonea, uiz ex ollis, palmæ ex litore, caprea, palumbi, anates, menula, turdi, grues, muli, oligines, polypii assati. Torminosi sunt extra cutem imponenda hæc. lana succida ex aceto, uel rosaceo, uel malino oleo admixto. item plantago, apium, millefolium, intybum, lentiscum: per se trita hæc, uel admixto uino austero, quod magis adstringant, adponuntur; postea cerotum ex oleo myrtino, uel malino, id est habente corticem mali punici, adponitur, cui & galla syriaca, & acacia admiscuntur.

Torminosi, primis temporibus constringendis succi utiles sunt, ut plantaginis, acaciæ, mali granati corticis, hypocistidos, millefolij, intybi, lentisci, rubi, per se tantum, uel cum uino ex piris syriacis facta, mixti. medium autem cursum habentibus torminosi, quod tempus græci *ἐκπύον* uocant, oportebit infundere per clysterem rosam, uel oleum myrteum cum cerussa cedente porro impetu molestiæ, uel difficultatis, quod tempus græci *παρεκκίνη* uocant, conuenit lenticula, ptisana, cum adipe caprino cocta. inueteratis uero torminibus profunt, quæ uehementius spissant, & a putore, atque ab alienatione corporis uindicant, ut ea quæ ex calce, charta uista, & auri pigmento componuntur, & possunt inherere purgatis ulceribus, quo tempore redire oportet ad priora omnia edenda præterquam ad lentem, & ptisanam. ducunt enim cicatricem, sed præcipue cerussa, admixto uino. emplastra uero, quæ extra cutem cicatricem ducunt, soluta ad ignem cum oleo myrtino adponenda sunt.

Dysentericos recreat pulmo pecudis, id est onis, decoctus cum lini semine, ita ut & caro manducetur, & aqua illa potetur. Trochiscus asclepiadeus præstantissimus ad uentris fluxum, & dysenteriam, quam nullus alius, sã facile stringit, quam hic, conficitur sic. apij seminis semunciam, hyoscyami semunciam, anesi $\textcircled{\text{V}}$ I. opij. $\textcircled{\text{III}}$ hypocistidos $\textcircled{\text{III}}$. croci $\textcircled{\text{III}}$. myrtæ trochodytidis $\textcircled{\text{III}}$. colliges hæc cum aqua, aut cum uino myrteo, id est in quo myrti baccæ coctæ fuerint; hoc ipsum medicamentum uentri adpositum, ita ut ceroto myrtino colligatur, epithema dysentericis aptissimum est.

Tormina patientibus multi uentrem uiuentis anatis adponunt, adfirmantes transire morbum ad anatem, eamque mori. quod si uespertilionis sanguine uentrem oblinas torminosi, in omne tempus dolore releuabis.

Si in aqua frigida dysentericus pedes, usque ad genicula ponat, sed si non febricitabit, & de uino austero portionem calidissimam bibat, cito sanabitur. Confectio medicaminis miri aduersum dysenteriam testam locustæ, id est illam spinosam, uel auleatam, quæ est iuxta caput, comburentide, & postea teres, ut in tenuissimum puluerem redigas; & sic ei qui uentris fluxu, uel rasura laborabit, ex uino uetere, si non febricitabit; aut si inæqualis erit, ex calida aqua dabis, ita ut de singulis locustis testas singulas integras exustas per triduum bibat, mire sanabitur.

Mellis heminam, uini ueteris sextarium, piperis grana ducenta, teres diligenter, & conditum ex ijs tribus speciebus facies; & ieiuno dysenterico mæmeralem calicem calidum plenum dabis, statim proderit; sed si necesse fuerit, ex eo condito ipsum plenum mæmeralem per triduum dabis. Lactis caprini statim mulsi grandi portioni, additur de coagulo hedinæ frustum quantum auellana grandis est, quod digitis, medicinali, & pollice sublatum, uel missum, iisdem

digitis contemperatur, & datur laboranti dysenterico, dum adhuc calet lac, antequam coagulo stringatur per triduum. hæc potio ieiuno dabitur contra orientem bibenda. Succinum de ceraſo ſiluatica exu-

res, & de teſta oſtrei æquẽ facies, paribusque menſuris puluerẽ tritum, cum melite, aut cū uino auſtero can- Ouum recentiſſimum aperies, & in ipſum

denti ferro calefacto, bibendum dysenterico dabis, mire proderit. Rhun marinum, ſiue rhun orienta-

calicem uacuabis, ac teſtam eius implebis melle optimo deſpumato, nec non oleo uiridi bono, & in ipſum calicem defundes, ac ſimul omnia permiscebis, & diu agitabis, ac poſtea in calida aqua ipſum calicem tepe-

facies. & ſic dabis dysenterico, cui medendum erit, mire proderit. lem, quod eſt minutum robium ſimile lenticulæ, quantum tribus digitis prendere potueris, mittes in mor-

tarium, & teres cum uino. & poſtea in aliud uacuſculum mittes calidam, atque ibi tepefacies, & ſic dabis dy-

ſenterico bibendum, ſtatim remediabitur; ſed per triduum continuum hoc remedium, & poſtea quotiens fuerit neceſſarium, dabis.

Vitrum teres diligenter, & cribrabis, & maſtiches grana teres, atque æquis menſuris permiscebis, & ex ijs ſingula cœlearia dysenterico in uino cocto, per triduum, uel quotiens opus fuerit, dabis, miraberis remedium experimentis probatum.

Ad dyſenteriam, remedium efficaciſſimũ ſic. roſe ſiluaticæ baccas oblongas, rubicundas, maturas, impari numero, uel ſeptem, uel I X. uel X I. tritas diligenter dabis laboranti dyſenterico, ad potionis modum cum melite ſtyptico, uel uino uetere, ſi non fe-

bricitabit, uel cum aqua ſi febricitabit, & ſi neceſſe fuerit, per triduum dabis; mirum experiẽris remedium. Ad dyſentericos, mirum remedium, quod uentrẽ, & purgat, & ſtringit ſic. gypſi peregrini triti — I. ſpec-

ularis combuſti triti — I. de teſtis oſtrearum combuſtarum — I. hæc omnia poſteaquã trita fuerint & mixta, toller inde, qui dabit remedium tribus digitis prioribus cum pollice, quantum ſemel capere po-

tuerit, & in potione uini ueteris puri, ſi non febricitabit, dyſenterico dabit; quod ſi inæqualis fuerit, in ca- lida aquæ potione accipiet.

Fimum cæballinum combures, & cinerem ſimi ipſum cum uino uetere miſcebis, & conteres, & ſic dabis dyſenterico bibendum ſine aqua, ſi non febricitabit. Aluminis ſoſſi

III. cum aceti cœlearibus tribus miſcebis, & teres, & colabis, & tepidum, cum aquæ duplo, dyſen- rico dabis bibendum.

Pumicem mollem, ſpongiam de qualibet roſa unam, gallam unam ſemis, corti- cis ſiccæ de malo granato ſcripulos III. piperis grana X L I X. diligentiffimẽ teres, & cum uino uetere permiscebis, & paſtillos æquales inde facies, ut cū opus fuerit, ſinguli in uini ueteris hemina ſoluti dyſen-

terico per triduum dentur, ita ut ipſa potio ferro duro caleſcat, inſigne remedium citò experietur. Leporis uentriculum, cū fimo ſuo, uino uetere lauabis, ita ut ſordes ipſæ ibi ſint, & miſceantur; aut ſi in

uentriculo non inueneris, pilulas de fimo ipſius impares numero tritas, cum uino uetere, dyſenterico da- bis bibendas.

Ad uentris fluxum, maſtichen albam teres, & in potionem mixtam mittes, & calefacies bene ipſam potionem in aqua calida, & bibendam per triduum dabis.

Herbam plantaginẽ colliges ac teres, & ſuccum eius cum uini ueteris potione, ſi non febricitabit, dyſenterico per triduum dabis.

Ad uentris fluxum, uel ad dyſentericos iam deſperatos remedium ſic. uermem unde coccum tingitur te- res, & cum uino uetere optimo potionem mixtam, & calidam per triduum dabis.

Ad dyſenteriam, ſiue torminoſos, & qui deiectionem nimiam patiuntur, ſic. ouorum uitellos coctos, ſiue incoctos, uinũ agre ſtem acidam, & gallas, pari menſura tere, ac miſce, & bibendum medicamen repens trade.

Frumenti toſſi grana impari numero, ſimiliter hordei, & piſcæ, cum mellis deſpumati hemina miſce, & tere, & dyſen- terico per uncias ſingulas diebus ſingulis dato.

Côliculos ex aceto coctos, alijs ſpicas quatuor purga- tas, oua incocta duo, ſimul contere, & adijce uini ueteris heminam, & feruefactum medicamen dyſenterico da bibendum.

Ficum duplicem, & palmam pinguiffimam, cum uini ueteris hemina, ad tertias deco- que, & piperis albi triti uiginti grana admiſce, & tepidum dyſenterico potui dato.

Veſtem oui deli- catam interiorem ſiccata contere, uino miſce, & cola, & ex aqua calida dyſenterico da bibendam.

Lac caprinum feruens, adiecto polentæ quãtum ſatis ſit, cū fuerit quaſi tenuis pulicula, dabis, cui ſupra bibendum.

Coagulum leporinum ex uino dilutum tepidum dyſenterico dabis bibendum; de quo coagulo ſi ſingulos ſcripulos in ſingulis ouis ſorbilibus ieiuno per triduum dederis, mire ſubuenies.

Vini ueteris feces, & iocineris caprini fruſtum ſufficiens in ollam nudam mitte, & facito, ut bulliat; atque inde ieiuno cœliaco ſufficienter da bibere.

Bulbus africanus rubicundus cõtritus, adiecto uino, quod ferro duro candenti caleſcat, potui datus, cœliacis medetur.

Palumbum ferũ ex paſſo concoque, atque inde potiones ſingulas cœliaco per triduum da bibendas.

Ad cœliacos, herba plantago, & lentifcus ſeparatim ex aqua coquuntur; poſtea in unum permisceantur, & tunc adiecto aceto cū pane, in cibo ſum- me profunt.

Herbæ uettonicæ in umbra arefactæ, tunſe cribratæque puluis cum uino potus, cœliacis plurimum prodeſt.

Mali granati cortex ſiccata tuaditur, & cribratur, & puluis ex eo miſcetur cum ouorum uitellis tribus, diuque in morem panis ſubigitur, ac fricatur, atque inde panis formatus in foco co- quitur, & ſic commanducatur. qui ſi propter nimiam auſteritatem offenderit, cum lenticula, ſine oleo co- cta, adiecto acerrimo aceto a ieiuno manducari debet; quod eo plus proderit, quo propenſius fuerit man- ducatum.

Herbæ quinque foliæ radix in umbra arefacta, contuſa que, & ex uino polentæ uice pota, mire cœliaco ſuccurrit. ſed febricitanti ex aqua calida da bibendum.

Capræ ſiluaticæ iecur carbonibus inaffatum, & per ſe ſumptum, cœliacos remediatur idemque arefactum, & tritum, & cum uino potui datum, certiffimẽ auxiliabitur.

Cafeus ficus trãſmarinus uetuiſtus, adiecto ſili gallico, & ſorbis aridis, diligen- ter omnibus tritis, & cum uini ueteris cyathis duobus potui datus, cœliacos mire fanat.

Vituli adeps ex ſœmina ſublata, cum aquæ cotylis tribus decocta, & ſorbitionis more ſumpta, cœliaco plurimum pro- deſt.

Cœliaco, & ei qui ciectionibus, uel doloribus acutis alui uarijs uexabitur, potenter ſuccurrit, ſi muliebre

muliebre lac quam plurimum ieiuno potui dederis, donec perfanetur. Hædinum coagulum magnitudine fabæ in uino myrteo remissum, & ieiuno coeliaco potui datum, efficaciter prodest. Membra na, quæ est in uentriculo gallinæ siccata, & trita, & cum uino austero, coeliaco ieiuno potui data medetur, ita ut ipsa gallina prius, uel biduo abstineatur a cibo; & qui potionem accepturus est ante diem frugi sit, & non coenet.

Oua in aceto cum testis suis macerata, & alio die in patella infusa ibique tosta, coeliacis in cibo data plurimum profunt. Pulicula fit ex alica prius tosta quam accipiat aqua, infusa uero aqua, cæra remissa illic mittitur, & dum excoquet coagitur, & a coeliaco calida sorbetur. Galla com-

magenta comburitur, & cinis eius extinguitur uino, contritusque uentri coeliaci inlinitur, statim subuenit. Flos hederæ tribus digitis sumptus, diligenter tritus, & ex uino austero, coeliaco potui datus medetur. Seuum ouillum decoctum in uino austero, & calidum potui coeliaco datum, manifesto remedio erit.

Laridi ueteris pinguis — I I I. mellis boni despumati tantundem, uini ueteris austeri cyathos III. ouorum coctionum uitellos tres, in unum permisce, simulque tam diu teres, donec ad crassitudinem mellis adducas, deinde in pyxidem condes, atque ex ea, cum opus fuerit, coeliaco nucis auellanz magnitudine ex uino, si sine febre erit, si febricitabit, ex aqua calida dabis, mire celeriterque subuenies. Oua decoquuntur ex aceto, donec indurescant, & uitelli eorum tosti cum pipere esui coeliaco dantur, cito medentur.

Cæsus ouillus uetustus in cibo sumptus, uel rasus, & cum uino potus, coeliaco medetur. Codæcum testis suis contritus duz, & oua cruda I I. & passi cyat. I I. aquæ cyat. I I I. simul permixta omnia, ac diu coagitata, & in uase fictili calefacta, ad modum potionis coeliaco data medentur.

Serpentis exuiriæ cum rosaceo decoquuntur in uase stagneo, & postea trita, uentri coeliaci utiliter inlinuntur. Ad omnes epiphoras uentris, caseum uaccinum mollem calidum imponi oportet, quo tempore dysentericis portiones ferro candenti calefactas dari conuenit.

Glus taurina aqua calida resoluta, coeliaci uentris inflatione utiliter imponitur. Grauiissimum uentris uitium est ileos, cui maximum remedium est, discerpti uespertilionis sanguis inlitus uentri.

Frequentissime euenit, ut ex qualibet causa subitus dolor uentris exstat, sed qui talum leporis secum habuerit, huiusmodi casum, id est subitum dolorem uentris nunquam incurrit.

Dysentericis medetur aqua in qua pilulæ cupressi decoctæ fuerint, cum uino austero epota. Aqua in qua lauri folia fuerint decocta, potui sumpta, intestinorum doloribus medetur.

Ad profluuium, & incontinentiam uentris, remedium sic. malua circumfossa ferro, quod ex utraque parte acutam aciem habeat, & præcisa a superiore ad inferiorem partem, id est, usque ad radicem, deinde radix eius inuoluta panno rubro, portata ab eo, cui remedio opus est, profluuium uentris eius inhibebit.

Betæ combustæ, & in puluerem redactæ, atque subactæ cum aceto, & a pectore laborantis inguinum tenus inlita, ualidissime adstringunt profluuium deiectionemque uentris.

Ros marinum cum creta molli tritum, & cum aceto modico, uentri impositum alui profluuium sistit. Rubi spinæ radices, & coliculi teneri cum uino amineo austero ad tertias decoquuntur, atque ex eo uino cyathus ad diem ieiuno uentris profluuium laboranti potui datus, optime medebitur.

Herba oxylapathos cum semine suo arida contrita, & ex uino calido pota, magnum incontinentiæ uentris præstat remedium. Pruni siluatici baccas corticemque, ac radicem eius arboris in unum ex uino ad tertias decoques, atque ex eo singulos cyathos ad diem deiectionis tardio laboranti ieiuno potui dabis.

Iris illyrica, id est macedonica, quæ fuerit grauiissimi ponderis, contundatur, & in puluerem cribratum tenuissimumque redigatur, atque ex eo mensura acetabuli unius dimidiati cum passi cotyla una permisceatur, & coagitetur, atque inde coctare unum coeliaco manè ieiuno detur, ita ut, & a cæna abstineatur, mirifice proderit.

Si quis tortiones subito pati coeperit de uentris nimietate, pedes suos in aqua calidissima quam diutissime teneat, statim sanabitur.

Sanguinem caprinum si polentæ fursuribus, adiecta resina miscueris, atque emplastri modo, ano uentrique adposueris, pondus omne, & libidinem deiectionis efficaciter reprimes.

Iecur uerrinū recens combustum contritumque ad summam leuitatem, cum uino, sed sine sale, potui datum, efficaciter supprimit nimiam deiectionem.

Leporis sanguis recens defusus, & cum polenta coctus, & datus dysenterico, illico uentris profluuium sistit. Hircinus sanguis exceptus, & coagulatus, ac super carbones affatus, in cibo datus, mirabiliter profluuium uentris emendat.

Ceruini cornus de ipsis radicibus, quæ capiti hærent, scobes lima tenuissimè factis, & ad drachmæ mensuram cum uini austeri cyathos datus, sistet nimios uentris fluores, si uel triduo iugiter bibatur.

Panis antiquus ex lacte caprino decoctus, & more sorbitionis, uentris fluxu laboranti bis ad diem datus, cito succurret.

Aqua in qua cortices fabæ ad tertias decoctæ fuerint, si bibatur, plurimum coeliaco proderit. Folia ficti arefacta sole, deinde combusta, & in cinerem redacta, atque ex uino austero potui data, uentris fluxum efficaciter sedant.

Medulla uaccina cum farina tenui subacta, & uelut excoctus panis cibari data, mire dysentericum sanat, maxime, si & caseus bubulus recens manducetur.

Adipem caprinum de renibus sublatum, misce cum polentæ fursuribus, atque adijce illic cyminum, & anethum, & acetum, æquis portionibus, atque ex aqua decoque, & colatum, sorbitionis more, dysenterico dato sumendum, mire celeriterque subuenies.

Lac ouillum, quod candentibus glareæ lapidibus in ipsum lac demersis excoquatur, dysenterico potui cum ipsis lapidibus datum mire prodest, ita tamen, ut prius de ipso lacte serum omne tollatur.

Iecur hircinum missum in ollam nouam cum uini austeri cotylis sex, ad tertias decoctum, sed dum excoquitur, punctum, ut humor eius cum uino permisceatur, postea dysenterico potui datum efficaciter prodest.

Dysenterico, & torminoso, & ei qui iam corruptum sanguinem egerit, saluberrimum medicamentum est tale. alij spicæ quatuor, & oua duo incocta, in unum teruntur, ijsque additur uini ue-

teris sextarius, & coquitur ad tertias; inde ieiunus quàm plurimum potest si biberit, efficacissimè intra tri-
duum sanatur. Spondogus, est lanugo quædam, quæ in rosa siluatica solet nasci; eam tritam cum ui-
no austero, desperatis iam dysentericis potui dedi, mirantibusque compluribus, sæpissimè de abrupto pe-
riculo liberaui. Torminosus maluz græcæ albæ radix trita, potuique ex mero, uel per se sola data, re-
medio est. Farinz hemina, ouorum uitelli tres, piperis grana uiginti, contrita in unum miscentur, &
subiguntur; panis ex ijs formatur, & in foco coquitur, torminosus esui datus plurimum prodest.

Millefolium contritum, si quis torminosus ex aqua frigida, prout uirtus, aut ætas eius se habebit, bibe-
rit, celeriter sanabitur. Lotos unde tibiz fiunt, in scobem secta, uel rasa, atque ex eo puluere coctaria
tria cum aceto scillitico torminoso ieiuno in potione data, mirificè profunt. Torminibus maximò
remedio est lactuca, si decocta cum cynino trito, & oleo manducetur. Sal tritum, sinapi tritum, ouum
crudum, in unum uas mittuntur, & testa oui ipsius oleo uiridi repletur, & in ipsum uas defunditur, simi-
liter; & mellis despumati, & uini austeri singulæ testæ ouorum plenæ funduntur, & simul uniuersa cocta
ri diutissimè permiscentur, & tepefacta torminoso bibenda dantur, celerrimè profunt.

Ruta cum
hyssopo in aqua ad tertias decoquitur, atque eadem aqua in potione uini a torminoso salubriter mixta
potatur. Malum punicum in olla gypsata clausum, in furno combures, & postea diligenter teres,
atque in puluerem tenuissimum rediges; quem repones, & paratum habebis; & cum opus fuerit, ad sub-
tas tortiones cum uini potione detur, prodest continuo. Si quacunque causa tortiones quis pati co-
perit, mellis optimi libram decoquat ad tertias, eique addat uini cyathos tres, & aquæ anethanz cyathos
tres, & coagitatam, ac tepefactam hanc potionem ieiunus bibat, continuo sanabitur. Fabam integrâ
frictam calidam in acetum acerrimum mittat, & madefactam torminosus manducet, citò sanus erit.

Ad profluuium, & incontinentiam uentris, remedium sic. Spongiam quæ in pruno siluestri, uel in spi-
na, aut in rosa siluestri nascitur colliges, & suprà batilum torrebis, & diligenter teres, atque in calicem mite-
tes, ac desuper ouum incoctum defundes, & bene permiscebis. deinde super batilum candentem defundes,
& coques, ac laboranti coeliaco quasi ouum tortum manducandum dabis. Baccæ oliuarum in uino
tritæ, coeliacis rectè propinantur. portulaca quoque ex aqua feruescens, & polenta aspersa conditur, inde
offæ complures si edantur a dysenterico, plurimum iuuabitur. Vngula porcina combusta ad cine-
rem, & trita, postera die ex uino hausta, mirabiliter dysenterico prodest. Cinis cribratus aceto com-
mixtus, uentri, & renibus calidissimè inlitus, certissimè uentris abundantiam stringit. Rana uiua, si
uentri torminosi adponatur, in eam uitium confestim transire dicitur. Torminosus saluberrime aqua
marina per clysterem infundetur, si molestia diutina fuerit. Fimus columbinus tritus ex melle uentri
inlitus, alui incontinentiam stringit.

Iuniperi baccæ tritæ ex uino nigro potui datæ, comprimunt
alui nimietatem. Caput caprinum cum pilis suis contusum, atque discoctum ciboque sumptum, rupta
interius intestina dicitur glutinare. Pilos leporinos adiecto melle comprehendes, atque inde globulos
paruulos facies. hi singuli sæpius glutiti, intestina quamuis perniciosè rupta, certa coniunctione conue-
niunt. Verbasci radicis corticem detrahito, eiusque contritæ succum per linteolum expressum, ex
aqua, aut uino bibendum dato, omnia interiora uitia, quæ ex frigore, aut labore, aut pectoris lumborumue
dolore nascuntur, mira efficacia sanabis. Serpyllum ad pondus uictoriati argentei tritum bene ualen-
ti ex uino, febriculento ex aqua potui datum, omnes uentris dolores sedat. Humanum lotium uentris
adiecto croci modico, ut odore eius occulteretur, ignorant potui datum, quamlibet ueteres in uisceribus la-
tentes morbos sanabit; uomitu enim irritato, & eiectionibus concitatis, omne uitium ualenter expurgat.
Vt explorari possit ex latentibus morbis, qui sit ille, qui uexat infirmum, comprehendique qualitas morbi,
& pars uiscerum possit, catulus tæte canis lactens die, ac nocte cum eo qui laborat, accumbat. is postea se-
cus inspicitur, translatusque in eo morbus, haud difficile notatur; ita tamen, ut æger ei lac de suo ore fre-
quenter infundat. eum tamen catulum, cum fuerit exsectus, obrui oportet. nec ab re est, si triduo idem ca-
tulus uiuens cum ægro maneat. uitium enim ægri transire in eum, usque adeo certum est, ut moriatur ca-
tulus, hominemque morbis latentibus releuet. Ad dysentericos solitaneos, cocteam plenam cum testa
sua uiuam teres; ad cuius pondus infra scripta trita miscebis, id est casei ueteris quantum est coctæ dimi-
dium, oui medullam in aceto coctam, panem candidum uetustum, uel tostum; uel quod est melius, nauis-
cum, rutam, piper ex uino, quod cum prius ferro candenti calefeceris potui sine aqua ministrabis; sed &
baccas myrteas adijcies. hæc omnia conteres, & in potione uini ueteris ieiuno dabis. Ad eos qui san-
guinem per intestinum iactant, uel per corruptum corpus inferius effundunt, remedium sic. herbæ urticæ
masculæ summitates teneras colliges, & contundes, succumque eius expressum per triduum ministrabis bi-
bendum. si autem cum aqua frigida, aut aceto acerrimo, aut posca frigida, id ius mixtum dederis, quamuis
desperatos de supra scripta infirmitate protinus liberabis. Lac caprinum ex coagulo temperabis, &
dum tepet antequam penitus constringatur, dysenterico bibendum dabis, citò remediabitur. Reme-
dium ad tortiones, phasianum uiuum in uino necabis, dabisque ex eo uino bibere ei, qui patitur tortiones,
confestim remediabitur. Confectio cydonitis, ad dysentericos, & coeliacos, sic. oleum in uase duplici
coques; quod dum in igni est, & feruet, operitur alio uase, in quo cydonea diuisa ponuntur. oleum tam diu
calebit igne subiecto, quam diu poma superposita excoquantur, tum oleum solum seruabitur, quod supra
dictis infirmis ad perunctionem, & escam utile erit. cydonea quoque ipsa esui dentur coeliacis, ac dysente-
ricis. Iniectio ad dysenteriam, amyli uncias tres, & lactis caprini cocti pro modo quantum uisum fue-
rit, adijcies, & ita iniectionem facies. Sui hircini uncias duas, olei uiridis sextarium dimidium, hæc
simul

simul in duplici uase remissa, & calefacta iniicies.

Epithematium ad uentrem stringendum, sic. floris uuarum uncias duas, rosæ sicæ unciam unam, masticis unc. I. aloes unc. I. gallæ unciam unam, aluminis scissi unciam unam, acaciæ unciam unam, ceræ P. I. myrtini olei P. I. picis uncias tres. de his omnibus tunsis embratis, atque permixtis, magdalia facies, quæ in panno denso, aut phœnicio induces, & sic uteris ad uentrem.

Item aliud epithematium ad uentrem restringendum, sic. florem uuæ omphacum, rosæ florem, aloen, gallas, alumen scissum, acaciam, mali granati florem, balaustrum, mastichen, æquis ponderibus teres, & uini myrtini, quantum ad coniungendum puluerem sufficiat, admiscebis. dactylorum quoque carnes purgatas, & uino infusas subiges, & cerotum myrtinum facies, ac sic omnia permiscebis, & magdalia facies, quibus ita uteris, ut supra scriptum est.

Lumbrici, & tinea, & intractabili causis, id est tenebris, & ad rosas ueneris, & strophum, uel intestinis ruptis, eorumque doloribus, remedia physica, & rationabilia diuersa, de experimentis. Cap. XXVII.

Verum remedium ad tineas necandas, & eiiciendas. per triduum allium quam plurimum edat, qui hac molestia laborabit, & betaceos, & caseum mollem manducet. post hoc autem filicis macedonicæ aridæ contusæ cribratæ denarios VII. cum melle quantum ipse uoluerit, sumat: & post horas quatuor, dentur ei aloes, & scammoniz singulorum denariorum semisses, ex aquæ mulsæ cyathis quatuor; cum uero corperit desurgere, aqua calida ei supponatur, qua postea elui, & foueri debet.

Ad lumbricos depellendos satis commodè facit santonica herba, quæ absinthium dicitur, si uel uiridis cum aqua ad tertias cocta potetur, uel sicca trita ex melle manducetur. cornus quoque ceruini limati lima lignaria scobis quantum quatuor uel quinque coclearia sint, ex aqua in qua decoctus fuerit ipse scobes potus ad cyathos III. mirifice facit. rapi etiam seminis cyathus, ex passi cyathis tribus pridie maceratus, deinde tritus & datus, aqua exigua adiecta, infinitum medetur.

Tenesmos, est irritatio ultimæ partis directi intestini, in quo uicio sæpius libet desurgere sine causa. proderit ergo ad hoc uitium depellendum, quotiens desurrexerit quis, ut uino austero mixto cum aqua calida se foueat.

Verbenz & myrti & oliuæ ramulis iunctis, ita ut duæ partes myrti sint, simulque decoctis, uti conuenit aqua frequentius ad subluendum. quinetia penicillum tinctum eo liquore, & non nimis expressum atque ano adpositum proderit. uel eodem modo globulus staminis adpositus iuuat, diutius enim uaporem continet. perungendus autem anus erit spicillo, lyco patarico, uel indico, ex calido uino.

Collyrium hoc iniiciendum, quod & ad omnem deiectionem, & tormina bene facit, conficitur sic. acaciæ, & mali granati corticis usui singulorum denarios quater nos, hypocistidos & rhus, quo corarij utuntur, & opij singulorum denarios senos, omphacij X. III. S. croci denarios quatuor, teruntur hæc omnia & cribrantur diligenter: postea uino austero colliguntur. uel temperantur, & fiunt collyria magnitudine nucleorum pineorum. & cum opus fuerit, ano iniiciuntur.

Ad lumbricos profunt huiusmodi compositiones. serpylli denarij quatuor, triti in cremore lenticulæ, quantum sint cyathi duo dati; uel ipsa sola per se lenticula, si quis eam aceto infusam coctam comederit.

Serpylli triti, denarij nouem, absinthij denarij duo, clematitidos denarij unus, & duæ tertiarie partes uictoriat, nitri denarij septem, lupini farinæ denarij septem, salis denarij quatuor, terræ mali denarij quatuor, sic aridæ denarij quatuor. hæc omnia colliguntur uino austero, atque ex ijs finguntur globuli fabæ magnitudine, ex quibus dantur ieiuno, aut post coenam octo uel nouem, cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

Compositio, quæ facit ad tineas & lumbricos eruendos, sic. serpylli X. I. coriandri denarij semis, samisuci denarij semis, nitri denarij semis. cucurbitæ siluaticæ interioris, sed quod est sine semine, in puluerem redactæ denarij semis, mali punici immaturi, & adhuc obstricti, siue corticis eius triti denarij semis, rutæ tertiam partem & sextam uictoriat ponderis. melle colliguntur hæc omnia, dantur ex his globuli septem, quantum fabæ Aegyptiacæ magnitudo est, uel cum aqua calida, uel ex uino si sinceritas erit, & ieiuno & post coenam.

Ad lumbricos necandos, remedium mirum sic. seriphij X. III. cucurbitæ siluestris interiora trita denarij duos, lupinorū farinæ X. VII. ex aqua fiunt globuli fabæ magnitudinis, dantur robustæ ætatis septem, pueris, terni uel quini, cū mulsæ aqua.

Ad tineas necandas remedium compositum sic. filicis radices aridæ, nasturtij seminis X. septenos, coriandri seminis X. V. nitri X. II. hæc omnia trita dantur ieiuno cum aquæ mulsæ hemina.

Mali punici succus radices, uel foliorum eiusdem aqua decoctus, potuique cum sale datus, tineas necat.

Marrubij & absinthij & lupinorum paria pondera in aqua mulsæ cocta, ieiuno bis aut ter potui data, aduersum tineas & lumbricos plurimum profunt.

Farina lupinorum decocta ex aqua, & more cataplasmatibus uentri imposita, lumbricos uel tineas necat.

Ad lumbricos & tineas eiiciendas remedium potens sic. erui, filiculæ radices purgatas ad uncias singulas, seorsum tundes bene in pila lignea: deinde adijcies inulæ radices X. VII. ammoniaci unciam, & coriandri seminis manum plenam, & euforbij X. III. has omnes species seorsum conteres bene usque ad summam leuitatem, & si uiridis fuerit radix filiculæ, quando illam tundes succum eius exprimes, & ipsum admiscebis. facies pilulas magnitudine ea, qua ano iniici possunt, ipsasque factas infundes in ceruicis nouæ sextarij duobus & mellis cyatho: quod si in ea prouincia faciendum fuerit hoc medicamentum, in qua cerossa non est, ex aqua dabis in qua myrtus cocta sit ad sextarios duos, aut cum sapore mixtæ sextarij duobus, atque ex eo temperabis potionem & dabis bibendam: intra horas quatuor deijciat oportet uermiculos uel tineas. ante triduum sane iubebis eum cibari allio & pane per se, & tantummodo poscam bibere.

Inflationibus intestinorum prodest, uel serpyllum potum ex uino nigro; uel cuminum siluaticum tritum ex uino nigro; uel aqua pota apiastrum, quod graeci erotion uocant, per se data; uel succus eius uino mixtus; uel origani radices cotusae ad \times I. ex uino datae; uel ruta trita ex aquae cyat. IIII. pota, uel eiusdem decocta radix cum aceto, & melle data; uel pulegium similiter potum; uel filique syriacae folia; uel roris marini aqua decocta; uel petroselinum ex uino tritum datum; uel origani decocti aqua; uel anesum tritum quantum tribus digitis comprehendi potest; prodest etiam uinum cum uino, aut aceto datum; tollit enim protinus inflationem, & dolorem intestinorum; uel lauri folia trita, uel eiusdem baccarum, aut flos ex uino potus; aut panacis radix ex uino pota. sed panaces non solum intestinorum dolores, uerum etiam choleram sanat. prodest ex uino, uel aceto feruenti, apij semen tritum datum ieiuno; uel terrae mali \times I. tritus potus ex uino uetere; uel hyssopi, aut origani uirgulae V. cum uini hemina feruifacit, & ieiuno potui dat. Fomentum, quod prodest intestinorum doloribus sic. acetum, aut aquam in qua ruta incocta fuerit, calidam uentri, & umbilico impones. discutit enim confestim, & sedat dolores. Carmen ad rosus, siue hominum, siue animalium diuersorum sic. palmam tuam pones contra dolentis uentrem, & haec ter nouies dices. stolpus a caelo cecidit; hunc morbum pastores inuenerunt, sine manibus collegerunt, sine igni coxerunt, sine dentibus comederunt. Ad lumbricos egerendos, felle caprino madefactam lanam umbilico adpone. idem facit; & fel taurinum, sic adpositum; nec non brassicae semen tritum ex uino, uel aqua, ita oportebit adponi. Ad lumbricos, & tineas coliculis ex aqua coctis origanum admiscebis, ac ieiuno bibendos in die tres cyathos dabis. Ad uentris rosus remedium sic. piperis albi unciam unam, cymini saccati — I. ruta folia uiridia — I. nitri Θ III. euforbij permodicum. haec omnia melle, & aceto pariter permixta in pilulas, ad modum fabae rediges, & bibendas paulatim cum opus fuerit ieiuno ex uino mixto dabis. Si uentriculus peruersatus fuerit alicui, aquam bibat unde pedes lauerit suos; & de lana ouis, quae a lupo occisa fuerit, ad uentrem suum alliget. de herba quoque, quae muris auricula dicitur, nouem folia tollat, & cum piperis granis nouem terat, & ex aqua bibat per triduum. Talus quoque leporis uentriculo subligatus, dolorem eius excludit. Lenticulae hemina in aceto madefacta, & cibo potuique data ieiuno, extinctos lumbricos eximit. Malua cum sinapi cocta, & in calice posita, ac sorbitionis modo saepius gustata, succurrit molestiis lumbricorum. Granorum de malis punicis dulcium acidorumque succus expressus, passo eiusdem mensurae immiscetur potionesque duae de permixto fiunt, & una ante coenam datur, alia post coenam, postera die tertiae uel lumbricos, uel tineas potenter expellit. Stercus caprinum aridum tritum adiecto melle potui datum ex aqua calida, mire producit tineas. Ceruini cornus combusti cinis tritus ex aqua potus, tineas potenter expellit. Raphanus ex aqua ad tertias decoquitur, eaque uino mixta, ad extirpandas tineas utiliter bibitur. Radix inulae in uino decoquitur; deinde succus eius exprimitur, potuique datur ad tineas enecandas. sed ea radix posteaquam eruta est, terram non debet attingere. Allium in cenomelite coctum, & uoratum, proderit lumbricis uel tineis necandis. aqua quoque, in qua lupini decocti fuerint, addita ruta, & pipere trito, potui data medetur. Acini siue corymbi hederarum, tres contriti in oxymelite utiliter aduersum tineas bibuntur, aut uentri inlinuntur. Absinthij sicci santonici combusti cyathum unum, cornu ceruini combusti cyathum unum, apij seminis triti cyathum unum miscebis, & ieiuno, qui tineas lumbricosque patietur, ex aqua calida potui dabis moderatam mensuram iuxta aetatem sumentis. Ad lumbricos eiciendos remedium mirum sic.atureiz fascem bonum cum aquae 8. IIII. mittes in uas amplum, & diligenter claudes. postera die colabis, & adde pteridis tunsa, & aloes tunsa diligenter drachmas binas, & mellis despumati, quod sufficiat. inde iunioribus iuxta aetatem dabis, senioribus plusculum, & adicies colophoniz drach. I. ita ut qui remedium sumunt, carne abstineant, per illos dies, & allium manducant. Coriandrum uiride, uel eius semine decoques in aqua, in qua lupinos prius coxeris; & cum inde aduersum tineas, uel lumbricos ieiunus sumpseris potionem, uestaberis, aut deambulabis. Nastureij seminis colearia quatuor, & filicis, quae in arbore nascitur P. I. agarici — IIII. iuniperi — IIII. coriandri seminis 8. I. ex radice syriaca P. I. cornu ceruini usti — IIII. nitri alexandrini — IIII. scammoniz — IIII. tithymalli P. I. haec omnia tundes, & cribrabis, miscebis, & reposta habebis. & cum opus fuerit, dabis tinearum, uel lumbricorum molestia laborantibus in portione posce gelide, iuxta aetatem; sed digestissimi ab omni esca hoc remedium accipere debebunt. Acori tunsi, eruce seminis, coriandri sicci seminis, cardamomi colearia quaternaria, iuniperi uncias tres, absinthij santonici P. I. hyssopi uncias sex, cornu ceruini usti uncias I. dictamni P. I. filicis quae in arbore nascitur sicce P. I. omnia haec tunsa cribrataque miscebis, & recondes, & cum opus fuerit, pastillos facies fabae magnitudine, & dabis ei qui laborat molestia lumbricorum, ut edat in sicco, etiam sicca, abstentus tamen pridie, ita ut sit digestissimus cum hoc remedium sumit. Ad lumbricos eiciendos, remedium sic. aristolochiae longe cotusae Θ III. cum aquae cyathis duobus ieiuno bibendos per triduum dabis. nucleos quoque de persico amaros, ieiunus edere debet, qui lumbricis uexabitur. Ad uentris dolorem remedium efficax sic. sordes de cardine ostij tolle digitis duobus pollice, & medicinali, & super umbilicum laborantis adpone. Baccas lauri tres cum herbae uince colearibus tribus pariter contundes, & adicies uiui calidi cyathis tribus, & colatum bibendum dabis ei qui uentris dolore uexabitur. Corrigia canina medius cingatur, qui dolebit uentrem, statim remediabitur. Contra uentris dolorem argemoniae herbae radicem palo ligneo effodito, eamque tritam ex aqua bibendam dato. Lichnum ardentem umbilico superpone, & desuper cucurbitam medicinalem, aut calicem oblongum, si cucurbita non fuerit, admoueto, & paulisper contineto, confestim dolorem uentris auertes. Pulegium

gium manducatum, & ad umbilicum positum, atque illic alligatum, ne cadat, dolorem omnem ventris continuo discutit. Anethi seminis paululum contritum ex aqua potum, internos ventris sedat dolores. Nitrum aceti cyathis duobus liquefactum, & potum, dolorem intestinorum potenter auertit. Quotiens dolor, & contractio intestinorum ventris orietur, uespertilionis sanguinem uentre manu perficato, & ad præfens subuenies, & in totum annum medebere. Piperis grana L X X X. contrita, & ex aqua pota, mire tollunt ventris dolorem. Si cui in uia, aut in loco aliquo difficili subitus dolor ventris, aut intestinorum fuerit, lotio suo degustato continuo sanabitur. Si quis talum leporis secum habuerit, immunis a dolore ventris, & periculo huiusmodi perpetuo permanebit. Ad intestina rupta, leporinum sterces, atque etiam pili, uel lana eius de subuentili cum melle decocta, ad magnitudinem fabæ glutienda frequenter data, quamuis perniciose ruptis intestinis, celeriter medetur; ita ut etiam tenuiora, quæ fuerint disrupta glutinet; sed assidue hoc medicamine utendum est, donec periculum omnino tollatur.

Ad colum, & ileon remedia diuersa.

Cap. XXIX.

Colo, & omnibus intestinorum doloribus, & tam hominibus, quam iumentis ex hac re laborantibus, efficacissime subuenit, uis galenita, quæ gallicæ Alauda dicitur, siue ipsa assata in cibo sumatur, siue cum plumis suis combusta, redigatur in cinerem, atque ex eo diligentissime trito terna coclearia ex aqua calida potui per triduum dentur. Vnicum est intestinum osisfragi mire naturæ, quod omnia deuorata citissime conficit, huius pars extrema colligitur, & reponitur, & cum opus fuerit, uentri laborantis alligatur, remedium miro omnes intestinorum dolores citissime sedat. Lupi sterces, dummodo non in terra inuentum, sed supra sultem, aut supra astutas, aut supra iuncum, colliges, & seruabis, & cum opus fuerit, laboranti colico alligabis ad brachium, uel ad collum in osse, aut in capro, aut in auro clausum, licioque suspensum, sed prius ex ipso stercore pusillum ignoꝛanti ex aqua calida bibendum dabis, mire celeriterque subuenies. Quum recens crudum summitter aperitum defundes, & eius testâ oleo uiridi implebis, & defundes, mellisque tantundem defundes, similiter lotio pueri implebis, & defundes, tû diligenter omnia permiscebis, & in aqua calida tepescies, ac ieiuno bibenda dabis. hæc potio non solum sterces uetustum, quod dolores intestinorum facit, uerum etiam lumbricos eiiciet, & ardores præcordiorum febresque sedabit. Eruce semunciam conteres, & ei qui lumbricos patietur, ex uino uetere candido, ieiuno, & digestissimo bibendam dabis, satis proderit. Ad interaneos morbos, serpylli pondus uictoriati argentei contritum, & ex uino potui datum, febricitanti autem ex mulsa aqua tepida, internos dolores uentris potenter emendat. Verbasci radices corticem detrahito, & contundito, ac succum eius per linteum exprimito, eumque ex aqua mulsa, aut uino bibendum dato, omnia interaneorum uicia, quæ ex frigore, aut labore, aut indigerie erunt, mirifice sanabis. Lotium humanum uetus, adiecto paululo croco, quod odorem eius emendet, ignoꝛanti potui datum, quamuis ueteres, & latentes interaneos morbos, & uomitu, & deiectionibus concitatis, potentissime sanabit. Laborantibus tenesmo, id est qui de perfictione assidue sedere cupiunt, & nihil deiciunt, lac bubulum decoctum frequenter potum, maxime prodest. Holus discoctum, cum sale plurimum sumptum, aduersum tenesmum iuuat. ostrea quoque ex mulso, & pipere cocta utiliter accipiuntur. Potio asperso plurimum pipere, sub nocte calidissime sumpta, summo remedio aduersum tenesmum esse consuevit. Senectus anguis cum oleo rosaceo decocta in uase stagnæo, atque inlita uentri, si tamen illic non sit exulceratio, tenesmo remedio est. Ius piscium marinarum in patina cum lactucis coctorum, utiliter aduersum tenesmum sorbetur. Aqua marina ex alto hauritur, & seruatur in uetustatem, ac postea cum uino austero bibitur. deinde raphani manducantur, ut sit uomitus facilius, qui tenesmi causas effundat. Herbe ðetionice folia in umbra arefacta, & tunsa cribrataque, ad scrupulum l. ex aqua calide cyathis duobus pota, optime profunt absque his quibus ex cruditate intestina torquentur. Herba, quæ pycmon dicitur, trita ex passo, uel mulso, uel caræno epota, intestinorum tortiones sedat. Ad coli inflationem bene fit cumini siluatici semen per se, ut est, datum, quantum coclearia tria in aqua calidæ cyathis quatuor. Colice mirifica Iulij Bassi, cito leuat, dein tollit inflationes coli, & omnis partis corporis facit, & ad stomachi imbecillitates, & ad intestinorum alioqui dolorem, quem græci strophum appellant, ex aqua hyssopu, aut rutam incoctam habente. Item benefacit ad sanguinem, & ex interiore parte, non enim patitur latescere, nec intus uulnus conuerti, sed & cito supprimit sanguinem, & uulnus cogit coire. dandum autem his medicamentum ex aqua polium coctum habente, aut rutam. Prodest & torminosi, & coeliacis, datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente, quam Græci gnaphalida dicunt, aut etiam forbis incoctis, aut syriaca filiqua. Lienosis datur ex mulso, uel passo, aqua ammixta, eodem modo dandum est, & eis qui sanguinem per urinam, uel alium reddunt; nec minus etiam mulieribus, quæ fluore sanguinolento infestantur, quem Rhun erythron Græci dicunt, uel quæ ex partu abortiue residuos uulua dolores habent, & in totum, quibus supprimendus est fluor, aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda. recipit autem hæc, spicæ nardi, costi, piperis albi, piperis nigri, piperis longi, myrræ, opij, apollinaris radices, cinnamomi, asari, acori, thuris, brassicæ seminis, castorei, singulorum denarios duodecim; opepanacis denarios decem, stœchadis, dauci, ameos, singulorum denarios X V I I I. silis cretici denarios uiginti quatuor; melle artico hæc excipiuntur, ac miscentur. Datur non plus quam denarij pondus, aut uictoriati. ceteris prout cuiusque uires postulabunt, dummodo infra hoc pondus, ex aqua calide cyathis tribus in no-

item secundum coenam.

Hæc potio etiam febricitantibus tuto datur, uerum coeliacis in ipso dolore

prodest. uitreo uase sub signaculo, ut moris est, seruatur.

Ad coli dolorem faciunt quidem mirifice

quæ superius posita sunt, sed cætera medicamenta in alijs uirijs dolore leuant in præsentia, hoc uero quod

dicturus sum, supra hominis spem conditionemque est. ideo primo tempore ne fidem quidem habet, po-

stera a nullo satis digne laudari potest. nam & in præsentia dolorem tollit, & in futurum remediatur, ne eū

unquam repetat. Raro enim quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamento, uexatus

est. quamobrem, si quando repetierit iterum dolor, dandæ erunt per triduum, & tunc portiones, eodem

modo, quo prima data fuit. Interdum uero, & tertio in dolore, eodem genere portiones dabuntur;

quod raro quidem accidet, ut post primam potionem dolor redeat. sed si admonente causa, iterum atque

iterum data fuerit, in futurum quoque ita remediabit, ut ne suspicio quidem ulla huic uitio relinquatur. si

quando tamen repetierit hoc malum, frigus ex multitudine cibi præcedit, granitatemque quandā, & cor-

porem eius loci, id est coli, sed sine ullo dolore sentiendum infert, plane ut tum intelligant, quanto malo

caruerint, qui illa molestia liberantur. hoc medicamento primum muliercula quædam ex Aphrica ueni-

ens multos Romæ remediavit. postea nos per magnam curam compositione eius accepta, id est pretio da-

to ei quod desiderauerat, qui uenditabat, aliquot non humiles, neque ignotos sanauimus, quorum nomi-

na superuacuum est referre. constat autem medicamentum ex his rebus. cerui cornua sumuntur dum te-

nera sunt, & quasi in tabulas, uel partes breues, & tenues diuisa in olla fictili componuntur, operculoque

superposito, & argilla undique circumdata fornace, aut furno uruntur, donec in cinerem candidissimum re-

digantur, atque ita trita in uase uitreo mundo reponuntur. cum dolorem coli habebit aliquis, ante diem

abstinebitur, quam poturus est medicamentum, ab omni cibo; atque ita postera die digestus, atque ieiunus

accipiet ex hoc puluere cornuum exustorum colearia tria cumulata, satis ampla; quibus misceri debent

piperis albi grana I X. trita, & myrræ exiguum, quod odorem tantummodo præstare possit. hæc in unum

commixta in mortario diligenter agitantur, ac teruntur. deinde cochlea uera Aphrica, id est inde allata

sumitur, quam maculosissimam, & niua si fieri potest, in alio mortario cum sua testa contunditur, atque ita

teritur, donec nullum uestigium, aut asperitudo appareat testularum. postea uini falerni non saccati cy-

thus adijcitur, & nihilominus rursus teritur, magis enim tunc apparebunt asperitudines, si quæ resederint,

quibus leuatis, iterum adijciuntur duo cyathi eiusdem uini; atque ita cum priore compositione bene ad-

miscentur; postea transfunduntur, quæ sunt in mortario, in calicem nouum; qui calix super aliud uas po-

nitur, ad carbones, & assidue mouetur coleario liquor, ne quid subsidat, aut peruratur. ubi bene incalue-

rit adijciuntur in eundem calicem, de his quæ supra scripta sunt, colearia tria, & rursus permouetur uni-

uersa permixtio. cum autem calore sufficienti temperata erit potio, dabitur epotanda uersus orientem; sta-

tim dolor, sine dubitatione, cessabit. sed ut penitus aboleatur, dari potionem similiter oportebit per infe-

quens biduum; sed quibus hoc remedium dabitur, cibum in prandio tantummodo, aut de tempore in cœ-

na exiguum capient, quo facile conficiant, ne crudi eam fument. postea uero in consuetudinem uictus sui

remittentur; oportebit autem remediatis nō intemperanter in futurum uinum bibere. Tamen si enim

a coli dolore tuti fuerint, metuere nihilominus debent, ne alia parte corporis æque adficiantur ob intem-

perantiam, ob quam utique colo fuerant antè uexati.

Antidotus Cosmiana, quæ facit mire ad colum, eadem mouet urinam, & prodest omni aduersæ ualera-

dini, sanat & inflationes periculosas omnium, uel plurimorum intestinorum, quem morbum Græci ileon

appellant, facit & ad hydropicos; conficitur sic. sorborum seminaturosum denarios decem, marrubij succi

denarios X I I I. centaureæ tenuis succi * X I I I. scilicet succi denarios X I I I. mandragoræ succi

denarios V I. hastulæ regię succi denarios sex, opij denarios quatuor, laseris cyrenaici denarium I. polij

succi * V I. opopanis * I I I. rosę caninæ succi * I I I. galbani * I I I. castorei * I I I. resine

agari * I I I. sagapeni * X. gummi * I I I. artemisiæ succi * I I I. cicutę succi * I I I. resine

terebinthinę * I I I. millefolij succi * I I I. trifolij succi * octo, uitis albę succi * V I. plantagi-

nis succi * I I. bdellæ * I I I. dracontę radices * I I I. terre mali * X. rhus syriacę * V I. acori

& asari * quinos, uel senos, meliloti * V I. inulæ radices * V I. glycyriçę * V I. erucę radices * V I.

panacis * V I. cyperi * I I I. stœchados * V I. iuniperi * octo, abrotani * I I I. chamæ

typri * I I I. hyssopi * I I I. pulegi * I I I. petroselin * I I I. holus atrii * I I I. dauci * V I.

apij seminis * V I. pastinacę seminis * V I. foeniculi seminis * V I. arrotelli seminis * V I. alteri

seminis * V I. urticę seminis * V I. radices in cœna, quę manducatur, seminis * X. balsami seminis

* I I I. cachrys seminis * I I I. erui albi farine * I I I. piperis albi * V I. piperis longi * V I.

caroi * V I. rutę siluaticę seminis * I I I. baccarū lauri * V I. amomi * I I I. malobathri * V I. myrrę

* V I. turis * V I. cassię * V I. nardi syriacę * X. croci * X I I. schoeni floris * V I. saluicę

* V I. costi * V I. iris illyricę * V I. cinnami * V I. olei magdalini * X. opobalsami * V I.

I I I. tunduntur, & cribrantur, quę in puluerem redigenda sunt; remittuntur diligenter, quę mollienda

sunt omnia. datur potio nucis auellanę magnitudine ex mulso, febricitantibus uero ex aqua calida. ad au-

riginem quoque, & ad serpentium morsus hoc antidotum satis utile est.

Colice Bassi mirifica, quę prodest, sine sopitione, eadem uentris sanat uitia omnia, facit & ad difficile spi-

rationem, & ad internos dolores; conficitur sic. mandragorę radices, siue corticis * V I. rhus syriacę * V I.

V I. cinnami denarios sex, acori denarios sex, brassicę seminis * V I. costi * V I. iridis * V I.

piperis longi denarios V I. piperis albi denarios V I. cicutę succi denarios X I I. opopanis * V I.

S. stœchadis

S. stochadis denarios I X. dauci cretici denarios I X. mei ✕ I X. Phœbus adijciebat, ut auctor remedij huius refert, myrræ ✕ V I. opij denarios V I. asari denarios nouem, castorei denarios I X. confusa hæc & cribrata miscentur, & ex melle colliguntur diligentissime uniuersa, atque ex eo medicamento quantū nux auellana est, datur cum cyathis tribus aquæ calidæ, sed post cibum, ieiuno enim non oportet dari.

Coli dolorem auertes, si de lacertarum caudis summitates tuleris & auro incluseris, & ligaueris circa umbilicum, aut de resle uentrem circumcinxeris, de qua quis laqueo uitam finierit.

Colum sanat, cū pinnis upupa exusta, & ex uino cinis eius potui datus. hirundinum etiam sterus, in cibo, uel in potu sumptum, tribuit colo sanitatem.

Hoc antidotum, siue oxyporium, quod buphagos dicitur, facit ad coli inflationes, & ad digestionem; unde mane ieiunus accipies catapotia tria magnitudine grani piperis. cōficitur sic. Nepetæ uncias tres. pulegij ueteris uncias tres, libyfici seminis uncias quatuor, peti oselini unc. I. apij seminis — I. S. thymi unciam unam. piperis unc. sex, mellis optimi non despumati, quod sufficiat ad con-

corporandas, & temperandas species adijciatur, & in dolio uitreo condetur, sub signaculo habendum, sicut usquequaque haberi debent uniuersa medicamina. Ad ileon, uel colum, baccas lauri octo concides, & coques in uini subdulcis cyathis tribus, & calefactum ex eo poculum ieiuno bibendum dabis. Cro-

ti III. myrræ III. opij I. singula quæque teres separatim, & postea simul parata in aqua miscebis, atque in modum fabæ pastillos factos in anum iniicies, mire colo remediando proderit.

Satureiæ surculos decem tolles tribus digitis, conteres, & uino ammineo sincero mixtos colo laboranti dabis bibendos; sincerum qui biberit experietur remedium.

Publij pastillus colicus; apij seminis heminam, foeniculi seminis quartarium, piperis grana X X V I I. satueriæ floris, uel seminis quartarium; omnia hæc diligenter teres, & cribrabis, & cum pipere bene trito permiscebis. deinde in mortario omnia pariter cum uino uetere, quantum diligentius teres, & facies pastillos quindecim, quos siccabis; cū siccati fuerint, singulos pastillos coli dolore laboranti dabis solutos in ternis cyath. uini ueteris calidi. sed bene eos solues, ut totum ebibi possit; pastilli autem paris ponderis esse debent.

Salicis foliorum drachmā cum piperis granis uigintiuno, ex uino diligenter teres, & triduo tres portiones ex eo bibendas dabis coli dolore confecto.

Herbæ uettonicæ pollinis III. ex aquæ calidæ cyathis tribus colico ieiuno bibendos per triduum dabis.

Plantaginem, quæ sine lanugine fuerit, confusam cum sale adposito ad umbilicum colici, mire proderit.

Annulus de auro, texta tunica fit exusta, cui insculpitur uice gemmæ piscis, aut delphini, sic ut holochrysus fit, & habeat in ambitu rotunditatis utriusque, id est, & interius, & exterius græcis literis scriptum. *ὁδὸς καλὴ καὶ κίον καλὸν πότιον*. obseruandum autem erit, ut si in latere sinistro dolor fuerit, in manu sinistra habeatur annulus, aut in dextra, si dextrum latus dolebit. luna autem de-

crecente, die iouis, primum in usum habendus erit annulus. Ad coli dolorem requies finum lupi, & ossa quæ ibidem inueneris, contundes, & puluerem ex his facies, & in aqua frigida ieiuno bibendum dabis.

Ad coli dolorem, X I I. Kalend. April. uiolas manē colligi facies, & teri in mortario diligenter, postea in mortarium ipsum mittes uini ueteris portiones V I I. & cum temperaueris cum uiolis, a die super scripto portiones per septem dies continuos dabis; sed cautus esse debes in uiolis colligendis, quia pleræque sunt noxiæ.

Ad coli dolorem, scribere debes in lamina aurea de graphio aureo infra scriptos characteres luna prima uigesima, & laminā ipsam mittere intra tubulum aureum, & desuper operire, uel inuoluere tubulum ipsum pelle caprina, & caprina corrigia ligare in pede dextro, si dextra pars corporis colo laborabit, aut in sinistra, si ibi causa fuerit, habere debet. sed dum utitur quis hoc præligamine abstinet uenere, & ne mulierem, aut prægnantem contingat, aut sepulchrum ingrediatur, omnino seruare debet. ad ipsum autem coli dolorem penitus euitandum, ut sinistrum pedem semper prius calciet, obserua-

L ✕ M e R I A

L ✕ M e R I A

L ✕ M e R I A

Leponi stercoreis pilulas septē tere, & cum dulci uino colico per triduum da bibendum.

Ad coli dolores, mentastri folia, quantū tribus digitis adprehendere potueris, tolles, & his adijcies foeniculi seminis codearia duo; hæc in unū quāminutissime teres, postmodū addes uini ueteris optimi cyat. I I I. & tū calefactam potionē quantū digitus pati possit, ieiuno bibendā dabis, continuo uentos emittet, & deiectionem faciet. hac ergo portione, si quis triduo usus fuerit, quamuis graues coli dolores euadet.

Gallinam per totū diem a cibo abstineto; dein postero die cum eā occideris, crura eius cum sale, & oleo inassato, & ieiuno colico, qui se pridie cibo abstinerit, manducanda dato, minifice profueris.

Corydalis auis, id est quæ alauda uocatur, quæ animos hominū dulcedine uocis oblectat, cū sua pluma in uase fictili gypsato in turno posito, ita conbuitur, ut teri possit. contrite autem tenuissimus puluis reponitur, & cū opus fuerit, ex eo codearia I I. uel tria cum aqua calida per triduum, aut quatrimum dantur; incredibile hoc colicis remedium, quod adeo prodest, ut omnia medicamina meritō superare uideatur.

Stercus caprinum recens in aqua remissum colatumque cū mulsi cotylis tribus, & piperis contriti granis L X. in tres portiones diuisum per triduum datur. ita ut prius corpus eius colici cui potio danda est acopo perugatur, ut perfrictiones omnes coactio sudore discedant, mirō remedio sanabitur.

Succinum tundes, & ex eius farina duo codearia cū aqua nō nimium feruenti bibenda colico ieiuno per triduum dabis, efficaciter proderunt. Sanguinē angusticū rubello uino duplici mensura coniunges, & ex aqua tepida mixtū colico ieiuno dabis bibendū; sed sub dolore dari oportet. nam & præsens remedium feret, & in futurum morbo huiusmodi liberabit.

LIBER

Si aduersus colum uiro remedio opus erit, de ariete, quē lupus occiderit, fasciolam puer impubis faciat, & inde uirum ad corpus adingat. si uero mulieri medendum erit, similiter de oue, quā lupus occiderit, puel-
la uirgo cingulum faciat, & mulierem circa corpus accingat, efficaciter prodest.

Lepori uiuo talum abstrahes pilosque eius de furo uentre tolles, atque ipsum uiuū dimittes, de illis pilis uel lana filum ualidum facies, & ex eo talum leporis conligabis, corpusque laborantis præcinges, miro re-
medio subuenies. efficacius tamen erit remedium, ita ut incredibile sit, si casu os ipsum, id est talum leporis in stercore lupi inueniens, quod ita custodire debes, ne aut terram tangat, aut a muliere contingatur, sed nec filum illud de lana leporis factum debet mulier ulla contingere. hoc autem remedium cum uni pro-
fuerit, ad alios translatum cum uolueris, & quotiens uolueris proderit. filum quoque, quod ex lana, uel pi-
lis quos de uentre leporis tuleris, solus purus, & nitidus facies. quod si ita uentri laboratis subligaueris plu-
rimum proderit, ut sublata lana leporem uiuum dimittas, & dicas ei, dum dimittis eum, fuge fuge lepulcu-
le, & tecum aufer coli dolorem. Euphorbij drachmam rediges in tenuissimū puluerem, & ex eo par-
tes duas facies, unam cum uno semicosto, ieiuno colico dabis. alteram tertio die similiter facies, mire ac sine
repetitione emendabis coli dolorem.

Compositio colice primaria, nardi folia, spicæ nardi indici, amomi, piperis albi, costi, papaueris, lentis sy-
riacæ, uncias singulas, myrræ, zingiberis, asari pontici, semuncias singulas in puluerem rediges, & cum melle
optimo despumato, quantum sufficiat, permiscebis, & ieiuno colico, quod satis sit dabis. Compositio
colices, ex libro Philonidis, quæ etiam Tiberio Cæsari componebatur, graues, & inueteratos dolores mi-
gans. mihi quoque experimentis notissima, accipit hæc. apij seminis heminam, anethi tenuiter arefacti
semunciam, castorei semunciam, nardi spicæ semunciam, opij semunciam, croci semunciam, piperis longi
semunciam, piperis nigri semunciam, petroselini semunciam. apium pridie macerabis, & teres, cætera tun-
des, & cribrabis, & mixta cum apio in mortario diligentissime conteres, & melle despumato optimo com-
prehendes, atque in uase uitreo condes. cum opus fuerit, dabis denarios singulos, ex aquæ calidæ cyathis
tribus. Ad coli dolorem, steracis bubulum recens exprime per linteam mundum, & succum eius in
qualibet potione colico da bibendum, statim subuenies; quod remedium efficacissimum esse multa experi-
menta docuerunt. Papauer ex aqua mulsa decoctum dabis colico ieiuno bibendum, confestim sub-
uenies.

Inter experta subnotatum est hoc colicis mirum remedium, sic. fici sicæ unciam unam, iris
illyricæ unciam unam, uettonicæ unciam unam, in ollam nouam mittes, cum bisextio aquæ, & cum supra
scriptis, ad dimidias coques, & inde heminam dabis ieiuno colico potandam. Herba, quæ millefoliū
appellatur, trita ex uino austero nigro utiliter colicis bibenda datur. + Herbam nepetam dextra manu
colliges, in quantum sufficere posse credideris, eamque ad leuitatem conteres, & cum uino dulci, ac uetere,
uel lybicensi, colico ieiuno per triduum dabis. sed uini modus sit quartarius, facillime proderit. Ful-
ginis bene tritæ, & cribratæ ternos denarios per triduum ex aqua calida ieiuno colico potui dabis.

Lacertum uiridem quem Græci σαύρον uocant, capies, perque eius oculos acum cupream cum lycio quam
longo uolueris, traicies, perforatisque oculis, cum ibidem loci ubi ceperas, dimittes, ac tum filum præcin-
tabis, dicens, trebio, potnia, relapaho; hoc ter dicens, filum munditer recondes, cumque dolor colici aliu-
ius urgebit, præcinges eum totum supra umbilicum, & ter dices carmen supra scriptum. Præsentia-
neum colicis remedium sic. oua putidissima in sole ponito, ut perficentur; cum aruerint, conteres, & mi-
nutissime percribrabis, & ad præsidium in dolio uitreo condes. cumque in aliquo auspicabitur coli do-
lor, in hemina aquæ calidæ dabis bibenda coëlearia tria.

Costum, & piper pari pondere tundito, & Costum, & piper pari pondere tundito, &
cribrato, inde scripulum unum ex aqua colico da bibendum. Steracis murinum ex quocunque liquo
re, ignorantia colico, ne horrescat, bibendum dabis, mirum est. Subpositoria colica inuicta. myrræ un-
cias tres, croci siculi uncias duas, piperis albi — I I. opij hispani — I I. hæc omnia tundes, uel conteres,
& pilulas facies magnitudine fabæ solidæ, & tres subpones. habebis sane curam ut æger dormiat, & ne uo-
mat, uomitus enim concitare consuevit. Ad coli dolorem remedium physicum sic. steracis omnis mon-
tanæ mense Septembri, deficiente luna, pridie incluse mane excipies, & sole durabis atque in puluerem re-
diges, & habebis in uase uitreo, siue stagnæo. cum usus exegerit, coëleare plenum colico ex aqua calida si se-
bricitauerit, si sincerus erit, cum uino per triduum dabis. + Ovis agnū, quē primū pariet, manu excipies,
ita ut terrā non tangat, & de fronte eiusdem agni lanam tolles, sed & de ipsa oue, & uerris qui coitum cum
scrofa faciet, semen eadem lana excipies, ita ut terram non tangat, & includes lanam cum semine uerris in
lupino aureo, uel tubulo, & alligatū in brachio, uel medijs partibus corporis, colico suspendes. + De no-
uem coloribus, ita ut ibi album, uel nigrum non sit, facies ex singulis singula fila, & omnia in se adunata,
acu argentea per oculos catuli nouelli qui nondum uidet, traicies, ita ut per anum eius exeant. tum ipsa
fila in se cōnata torquebis, & pro cingulo ad corpus medijs partibus uteris. catulum sane uiuum conse-
sum in flumen proijcies. Ad colum remedium physicum sic. canem de sterquilinio; aut de aliquo for-
dido loco iacentem expellat, & fuget, qui patietur coli dolores, & statim illic mingat, ilico remediabitur.

Iniectio ad coli empneumatosis sic. olei anethini uncias sex, butyri exsalati — I I I. nardi — I I. hæc
permixta, & calida per clysterem infunduntur. + Ad colum sanandū remedia infra scripta de Prosdo-
chi medici remedijs electis. lotium ichneumonis cum lacte uacæ nigre dabis in impetu coli potandum,
continuo subuenies. Iniectio ad colum sic. colocynthidas duas, & rutæ, & scæno-græci, &
baccarum lauri quantum satis existimaueris, in aqua coques diu, & addes mellis parum, & ita in-
cies colo laborantem. Olei rutacei heminam, asphalti iudaici uncias quatuor, castorei uncias
quatuor,

quatuor terens permiscebis, & sic inijcies colicum. Atque ita inijcies, statim sedabitur coli dolor.

& capparis succum, aut rhammi, & mellis tantundem miscebis, & dabis plenum ex eo coëscare, aut nocte, aut satis mane, colico potandum.

Iniectio ad colum sic. butyri coëscat unum, cedrix coëscat unum, opij quanta Erui sit magnitudo, olei P. unum, in quo baccæ lauri X V. tunfæ, & cymini quantum manu capias, cum speciebus supra scriptis infusis, & diligentissime tritis coquantur; ex eo, qui laborat coli uitio, inijciatur, ita ut prius caldā aquam bibat.

Confectio iniectionis ad colum sic. opij drach. VI. castorei drach. IIII. myrræ troglodytidis drach. I. croci drach. I. nitri drach. I. euforbij drach. I. rutæ filvestris drach. I. mellis quantum denseri omnia possint. quibus permixtis, trochiscos diligentissimos factos servabis, & cum necessitas fuerit inijciendi, adjicies olei anethini uncias sex, butyri exsoluti — IIII. nardi — III. his omnibus de trochiscis quorum descriptio superius continetur, adjicies quantum fabæ granum est, in aqua modica solutum, & ita hac deiectione diligenter uteris.

Ad ventrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis. Cap. XXX.

Quoniam interdum res postulat, & per aluum detrahare materiam omnis humoris, siue hydrops, siue diutina lippitudinis, secundum sanguinis quidem detractionem, quæ, & scabiem, & ignem sacrum, & papulas habentibus subuenitur; nam maxime phlebotomo huiusmodi circa cutem summam uitia innata sedantur, itaque non tam alienum iudicauimus horum quoque genera exponere; sed prius dicemus, quæ aluum mediocriter molliant, & quæ sunt ad hoc simplicia remedia molliat ergo aluum herba mercurialis leuibus holeribus quàm plurima mixta. Item molliat aluum, nitri * semissis, mixtus cum resina terebinthina, & auellanz nucis magnitudine denoratus. Caules quoque quinque, uel sex, cum salis granis totidem, & apij semine paribus mensuris decocti, in uino non austero, molliendo uentre plurimū pro sunt, si & ipsi manducantur, & ius illud bibatur, ante cibum. ut inter prandium, & coenam aluum leniter molliat.

Ouilli lactis sextario, si quis adijciat cni purgati denarios quatuor, & discozum, ita ebibat, molliet uentrem. Quidam tribus heminis uini adijciunt aloes denarij semissem, & ita totum per partes aqua mixtum bibunt, ut molliant uentrem. soluit autem utiliter aluum ipsa aloë per se uictoriati denarii pondere, ex aquæ cyathis tribus, uel frigida, uel calida epotata.

Purgat optime uentrem chamaelea herba, quæ folia similia oliuæ habet; quorum quinque, uel sex dari oportet trita ex aquæ mulsæ cyathis quatuor frigida, si aduersus erit, cui remedio opus est; sin minus calida, adiecto salis coëscario; detrahit enim largiter bilem.

Purgat bene aluum filicis radix lota, & rasa, atque in minimas particulas concisa, ad semunciam aceto aspersa, deinde cocta, ut solet holus coqui, & ita cum panis uncia consumpta.

Purgat bene hæc compositio uentrem. aloes denarij semissis, colophoniz denarij semissis; unā teruntur hæc adijciatur mellis quod satis sit ad colligenda ea. datur ex aquæ calida, uel frigida cyathis quatuor. hoc medicamentum stomachum non corrumpit.

Globuli mirifice purgantes uentrem, qui ut sumuntur, ita integri deiiciuntur, nec lædunt stomachum, conficiuntur sic. colophoniz denarij quatuor, bdellæ denarij duo, gummi denarij duo. hæc trita lactucæ succo colliguntur, & finguntur pilulæ magnitudine fabæ, dantur a tribus pilulis, usque ad septem, prout cuiusque uires patientur.

Globuli qui etiam coenatis dantur, & efficiunt manē uentris deiectionem quantum satis sit, sic. colophoniz denarios tres aloes, & tragacanthi binos, hoc pridie aqua maceratur, postero die ceteris admiscetur. sunt inde globuli fabæ magnitudine, dantur a tribus, usque ad septem. profunt plurimum uentri, & stomachum nullo modo uexant.

Cucurbita siluatica trita, quam Græci colocynthida uocant, detrahit per uentrem, & pituitam, & bilem luridam, nonnunquam, & atram deorsum uersus uocat, si cum mulsæ aqua detur.

Item cucumeris anguini radix, & eius quem edimus, detrahit bilem. sed anguini radices cortex eandem uim quam ueratrum habet; nisi quia paulò remissior est, & multò magis uiribus caret quàm cucumeris quem edimus. Anguini ergo cucumeris dari oportet denarios V. S. ex aqua mulsæ. detrahit enim pituitosa, & biliosa. cucumeris quem edimus radices dari oportet denarios quatuor, similiter uel sparti seminis tantundem: similiter, & iridis radices datæ profunt.

Ire thapsie radices pituita, & bilem detrahunt; nec minus epithymon; præstant hoc melius, quod attrita & aciora deducunt; & herba urceolaris quæ appellatur, detrahit biliosa, & aquatiora. nam cunila, quæ græci onitum uocant, detrahit aquatiora per uomitum. aquam uerò solam deducit mori lacryma, uel radix incocta potui data.

Iris calefacit, soluit, purgat, concoquit, ulceris quoque interni duritias molliat, & uentris striduras mouet.

Irinum oleū per clysterē immisum pituitosa, & aquata, & purulenta, & atra deducit. polion uerò, biliosa, & atra, oleo chamæmelino mixto per fellas deducit. scammoniz succus solā detrahit bilē; datur ex aqua ad denarij semissem, & tertias eius, cū salis * V. sed stomacho infirmo non conuenit.

Elaterion purgat sursum per uomitum, aquam uerò deorsum, & pituitam, & bilem omnis generis deducit. plus autem eius quàm uictoriati tertiam partem non oportet dari. cyclaminos uerò detrahit per fellas pituitam, & aquā. hippophaes detrahit pituitam, & liquores aquatos; datur eius drachma cum aqua

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

Ad uentrem resoluendum, & omnes difficultates, nec non, & ad cholera præveniendam, vel inhibendam, salis, & poriones, & cacapotis cathartica, diuersa de experimentis.

mulsa; eiusdem quoque lachryma uictoriati ponderis data ex aqua mulsa, bilem purgat. nam radix tantum aquam deducit. Centaurei tenuis succus quantum nux auellana recipit, potus ex aqua mulsa, uentre soluit.

Item herba ipsius trita denarij III. ex sale, & exiguo aceto dati cum aqua cyathis VI. biles deducunt. meconidos quoque herba succus cyathis duobus datus, detrahit bilem. cucurbita domestica succus cyathorum tritum cum uini albi calefacti hemina datus, & olei semuncia, detrahit pituitam, & bilem; sed oportet quibus hoc purgatorium datur, ut postea quam plurimum deambulent.

Damasci radix detrahit sursum deorsumque pituita, atque bilem, & ex uino, & aqua mulsa data. sed si per fellas aliquis magis uoluerit purgari, succumumat; si sursum uersus, radices eius accipiat.

Veratri nigri radices semissis, & eius tertia portio pota ex uino passo, per fellas detrahit bilem. ueratri uero succus albi ad mensuram denarij unius potus ex passo, detrahit pituitam, & per uomitum, & per fellas.

Chamelea, quae dicitur restis oliuae, aquam detrahit. calfacit enim plurimum; eadem prodest hydropicis, & elephantia habentibus, si quis eius seminis grana numero uiginti dederit ex aqua mulsa. eiusdem folia tenera trita, & in globulos redacta, aqua mouent, si quis ea per anum iniecerit; prosunt enim, & ad duritias uentris laxandas, & ad morbos interaneos depellendos.

Purgatio uentris, quae facit ad lumborum dolores, & ad omnium febrium molestias depellendas, accipit haec scammoniz * VIII. ueratri nigri, anesi, aphronitri, nardi syriacae, cassiae, cinnami, singulorum denarios binos. dantur haec trita, & mixta cum aqua mulsa hemina; datur interdum uel ex aceto, uel ex melle, uel ex aqua sola. abigit etiam conceptum foeminae praegnantibus datum.

Purgatio uentris altera, sic scammoniz * XII. ueratri nigri * XVI. croci * V. myrrae * VII. cinnami * VII. panacis * VIII. piperis * V. aphronitri * VI. trita haec, & in puluere redacta melle consparguntur; datur ex his * I. S. ex aqua frigida, uel calida cyathis tribus.

Ad uentrem laxandum cucurbitae siluaticae interaneorum, scammoniz, aphronitri, paria pondera in unum teri oportet, atque inde dari globulos tres fabae magnitudine ex calida aqua. conuenit autem aqua colligi, uel conspergi hoc medicamentum.

Aliud remedium ad uentris purgationem sic. quae passae exemptis granis contusa * IIII. anesi * VIII. elateni, id est cucumeris in partes diuisi loti, & siccati * VII. ueratri nigri * XVI. cunilae seminis purgati interiora * XII. haec in puluerem redacta colliguntur, & ex aqua dantur quantum fabae trita grana sunt, superque acetum cum melle mixtum bibitur.

Item alia uentris purgatio eiusdem effectus, accipit haec scammoniz * V. ueratri nigri * VIII. cucurbitae siluestris interiora * VIII. aphronitri * VIII. iridis * VIII. nardi syriacae * V. S. & uictoriati partem tertiam, myrrae idem ponderis. puluis ex his factus, melle colligitur, dantur ex medicamento hoc globuli quantum fabae magnitudo est ad denarios quatuor, uel quinque, quibus deuoratis, acetum melle mixtum super dandum est.

Ad omnem molestantiam febrium, & ad lateris dolorem cum febris; item ad lumborum dolorem molestantem, & aduersus liquores glutinosos, & spissos per uentrem digerendos, recte dabitur hoc medicamentum, sic cucurbitae siluaticae interiores partes aridas, quae quasi pluma sunt * VI. croci, ac panacis denarios senos, marrubij succi * VIII. glycyrrizae * IIII. piperis albi VI. piperis longi * VI. stoechados * VI. schoeni floris * IIII. malobathri * III. passo colliguntur trita haec omnia, dantur ex his denarij singuli cum aquae calidae cyathis binis, uel ternis.

Soluunt uentre superposita haec cucumeres siluaticos maturos arefieri oportet: deinde contusos felle taurino conspergi, atque emplastri modo infini alute aut linteolo spisso ad magnitudinem digitorum quatuor ut umbilico tantum superponas. quod statim tollendum erit ubi uentrem mouerit.

Et hoc medicamentum eiusdem rei gratia umbilico superponi oportet, aut lateri, quod recipit haec cucurbitae siluaticae interiora, quae quasi flocci sunt, aluminis liquidi, characis tithymali, lathyridis herbe, laseris cyrenaici, paria pondera trita felle taurino collecta, lateri uel umbilico cum cucumeris siluatici maturi succo, eodem modo quo supra scriptum remedium, superponuntur.

Hiera ad resolutum stomachum, & reiectum quodcunque sumplerit, conficitur sic aloes nigrae * V. mastiches * IIII. cinnami, schoeni floris, malobathri, nardi syriacae, croci, asari, xylobal sami, singulorum denarios senos. haec trita, uel confusa, melle consparguntur, & ita reponuntur, & cum opus est ad modum fabae cyroxy melle dantur.

Purgatio, qua Cosmus medicus, frequenter usus est, quae hiera minor dicitur, facit ad omnia quae supra scripta sunt, conficitur sic scammoniz denarij uictoriati ponderis partem unam, ueratri nigri * I. panacis * S. ex melle consparguntur haec trita, datur ex his quantum nux auellana est ex aqua mulsa cyathis quatuor. globuli quoque supradicta magnitudine siccis, de hoc medicamento duo tresue dantur ieiuno, uel post coenam uorandi.

Turundis ad soluendum uentrem uti oportet eiusmodi. fici aridae, pulegij, absinthij, aloes, nitri, fellis taurini arefacti ex interiore parte, horum paria pondera melle bene percocto colligi oportet, & fingi turundos, qui per anum immittantur.

Item turundi ad uentrem laxandum sic cucurbitae siluaticae floccorum interiorum * V. nitri nigri usti * V. fici pinguis pulpe * IIII. mulsa P. I. coquuntur haec omnia ex mulso diligenter, & postea fiunt turundi, quibus, & absinthij aliquid admiscetur, atque ita ut supra dictum est, ano iniiciuntur.

Herbae peduncularae * IIII. farinae ex lolio * IIII. cum felle taurino liquido, & melle percocto miscentur paria pondera, & fiunt turundi qui similiter ad laxandum uentre ano iniiciuntur.

Succus hastulae regiae admixtus farinae ex tritico, deinde subactus in panis modum, & coctus in furno, atque esui datus, purgat bene uentrem.

Epithymi * VII. salis * V. in aqua mulsa, si potu dederis, pituitam, & bilem omnem per uentrem detrahes.

Agaricum detrahit per uentrem spissum, & corruptum humorem. cuius ut plurimum dantur denarij duo, cum salis * II. potandi ex mulsa cyathis V. munime hoc remedium stomachum laxat, omnemque purgat humorem, neque sanguinem

nem corrumpit; nec si quæ partes interius tument, exulcerat, nec ut etiam adiuuat. prodest, & iocineris tu morbus, & quos græci *περιπνευμονιὸς* appellant. Cucumeris, quo uescimur, seminis cyathus tritus, & cum melle tritus, in unum mixta hæc soluunt.

Aqua mulsæ ex melle crudo, pota, uentrem mouet, extenuat glutinosi, lieni prodest: eadem intestinis præstat remedium, & uenis, quæ sunt in proximo, circa intestina, medetur, liquores etiâ qui pulmonum insidunt, & difficile excreantur, depellit. sed stomacho aptius est, met aceto mixtum, minus enim inflat, efficacior est tamen humoribus aqua mulsæ, magis enim extenuat liquores, & iucundius sumitur.

Abinthium potum mouet bilem maxime iocineri insidentem, coctum quidem cum aqua sumi debet. nâ, & per uentrem, cruditatem omnem deducit, & stomacho opitulatur, & sanguinem spargit, cuius summa potio est * VI. cum salis * III. mellis cyathus uno, & aquæ sextario. sed si magis aliquis alium citare uoluerit, salis * VII. admiscere debet.

Dantur bene ad soluendum uentrem potiones, uel polenta cum aqua, in qua satureia, aut pulegium, aut thymum, aut herba mercurialis incocta fuerit, sed & hæc. ita in tribus sextariis aquæ decoquuntur, donec ad sextarium perducatur. ad inflationem uero stomachi, saluincam in aqua decoqui oportet, & exiguum acetum adijci, atque ita potui dari.

Hyssopum uentri mouendo uehementius est, quam absinthium, datur autem similiter decoctum, atque eadem mensura; prodest etiam his, quibus in pectore liquores glutinosi subsistunt, qui & spirandi difficultatem, & stridorem stomachi faciunt. item his prodest, qui in toto corpore uidentur liquores concretos habere.

Althæam cum herbæ mercurialis folijs, aut semine coctum, uel cum ruta, & absinthio coctum, magis mouet uentrem; liquores autem omnes, adiectis duabus radiculis ueratri nigri, etiam in febris datum, deducit per uentrem, uel sursum uersus per vomitum purgat.

Embamma, quo uenter soluitur, sic. scammoniz denarium unum, zingiberis denarium unum, piperis denarium unum, nitri denarium unum; hæc contusa, & cribrata reponuntur: inde cum opus est sumitur coctæare plenum, & adijcitur embamma factum ex garo, & aceto, mensura cyathi dimidij. ex hoc lactucam, aut uulnam comedere ieiunum oportet, sed sen

sum non mitterim. cum quis per uentrem purgatus fuerit, etiam uomat in balneo medicamentum. quo relecto, domum reuersus, cibum sufficienter, & uinumumat.

Vinis uti oportet ad intestinorum dolores factis ex ruta, & pulegio, apio, origano, aneso, dauco, thymo, hyssopo, panace, dictamno, anetho.

Sambuci semen tritum cum uino datum, & uentrem mouet, & prodest intestinorum doloribus. chamædropis quoque semen ex uino datum, similiter prodest. nec non, & chamæpitris trita ex uino pota, idem præstat. etiam semen balsami potum ex uino iuuat uentrem; calefacit enim uiscera, & extenuat, ac discutit inflationes. prodest, & ad hoc nasturcium potum ex uino. nam,

& calefacit, & mollit uiscera, & urinam mouet. prodest, & intestinorum doloribus, & inflationibus, & spiritum reprimat, & rupta componit.

Ad uentrem soluendum, herbam polypodium teres, & in ptisanâ ieiuno sorbendam dabis, statim soluetur qui acceperit.

Ad suppressionem uentris, nitri, & cumini certum quid æquo pondere ex oleo concorporabis, atque inde ad magnitudinem fabæ grani maioris in anum inijcies.

Ad uentrem eliciendum, alumen ad magnitudinem fabæ resolues, & ano inijcies statim omnem duritiem laxabit.

Ad uentris stricturas soluendas, betaceum concides minutatim cum terræ modico, quod ei dum auellitur, adhæserit, & in ollam conijcies, & adijcies liquaminis optimi, & olei optimi, & uini quantum æstimaueris necessarium, & cooper tam ollam super carbones pones. quod cum lento igni fuerit percoctum, nitri unciam unam, uel duas minutatim super sparges, & tum succum illum de olla, uel ius cum uino miscebis, & bibes.

Ut uenter facilis sit, nitri perlucidi, staphisagriz, betæ, mellis cocti modiciam; hæc permiscebis, atque in modum collyrij rotundi interius in anum inijcies.

Confectio salis cathartici sic. scammoniz uncias tres, zingiberis uncias tres, petroselinii uncias tres, salis ammoniaci uncias quatuor, mastiches uncias duas, piperis albi — I. ita ut scammoniam coquas, ut minus lædat. coques enim sic. mittes in pastam, & deinde mittes in furnum, ut cum ea coquatur, & aliquantulum plus mittes, ut cum cocta fuerit, ad pondus supra scriptum ueniat; & cum refrigerit, tolles, & sic omnia teres, & miscebis, & ad quod uolueris, manducandum in conuiuio pro quibuscunque salibus uteris.

Confectio catapotij; scammoniz — I. aloes epaticæ — II. bdellæ — V. I. euphorbij — III. hæc omnia in puluerem rediges, & postea de caulibus non plantatis succum facies, & sic commisceas, & facies pastil los pusillos, & siccabis, deuorandosque post coenam, uel manè ieiuno dabis.

Confectio salis cathartici, quâ Marcellus ostendit, sic. salis duri, & assati P. I. — II. salis ammoniaci P. I. — III. piperis albi — III. zingiberis — III. inulæ seminis — II. ameos — III. hyssopi cretici — III. laseris radicis — III. thymi — III. folij — III. apij seminis — III. anesi — III. petroselinii macedonici — III. origani — quatuor, nasturcij seminis — tres. hæc omnia tunsa, cribrata, atque in puluerem tenuissimum redacta, & in unum commixta, repones in uase uitreo, & inde quotiens aliquid sumes seu bi bes, quasi pro alijs salibus, uteris; emendantur his uitia hæc, indigeries, phlegma frigidum, quod de cerebro descendit in stomachum, ad omnes humores super patantes stomacho, qui de felle rufo concitantur.

Ad dolorem quoque faucium facit, & caliginem detergit, & omnes humores in uisceribus contractos: sanat, & iecur, & splenem, & tussim curat, & eos qui uix anhelant, reficit: curat, & colum, & morbum articulare compescit. digestorium mirificum est. febres quotidianas temperat, febres acutas compescit, id est hemitriticas, quartanas comprimit. mira in omnibus est eius commoditas.

Liquamen catharticum quomodo confici debeat. zingiberis ℥ III. petroselin ℥ tres, piperis ℥ tres, laferis ℥ tres. scamoniz ℥ unum, liquaminis 8. I. hæc omnia permiscebis, & sic uteris. Ad uentris facilitatem betas recentes de horto cum sale coque, & earum aquam cum uino calidam bibe, & ipas ex oleo manduca. carnis etiam porcine recentis P. tria, cum aqua 8. V. & cum sale coque ad tertias, & bibe tepidum ius cum uino.

Ad cholera proijciendam herbæ, quæ græcè dicitur χαμαίρις, syriacè uerò pityforisis, folia nouem mitte in aquam calidam, & bibe, omnem cholera per os proijcies. radicem herbæ ipsius percuties ferro, & non amplius quàm duas guttas excipies in aqua calida, & bibes. omnem cholera per uentrem proijcies. sed caue ne plus succi huius accipias, ne laxaris: nã & os si nimius sit, male accipit.

Confectio absinthiati, ad cholera, & phlegmata proijcienda, & ad uentrem laxandum, sic. nardostachios ℥ VI. schœnoanthus ℥ II. costi ℥ octo, malthiches personatæ ℥ quatuor, absinthij herbæ ℥ unum, croci ℥ II. folij ℥ VI. uini ueteris Italicos 8. quinque, mellis optimi 8. unum, & semis.

Item alia confectio absinthiati cathartici, uini ueteris 8. quatuor, rosæ siccæ ℥ II. cassiæ ℥ III. schœnoanthus ℥ II. folij ℥ II. amomi ℥ II. costi ℥ II. malthiches ℥ II. herbæ absinthij siliquam unam, croci siliquas quatuor, aloes epatitidos siliquas quatuor, mellis optimi 8. I. hæc omnia separatim trita, & in puluerem delicatam redacta simul miscebis, & sic excoques lento igne, ne ferueat, & uteris cum uolueris.

Ad bilem reprimendam raphanum ex pipere, & lini semine, si quis ieiunus manducauerit, fortissimi bilem expressam inhiabit. Fumum utuli recentem, si quis ex uino potui dederit his, quos græci χαλκρονες uocant, manifesto periculo liberabit.

Lenticulam lauato diligenter ex aqua munda, deinde cum aqua nitida feruere finito paulatim, & postea ipsam aquam colato, & dato cholericis bibendam, mirè proderit. Absinthij uiridis — IIII. salis marini — I. simul teres, & sextario feruentis aquæ perfundes, & tenui linteo colabis, atque ipsam aquam laboranti da bibendam.

Herba mercenialis pro certo bilem potentissime protrahit, si ea cocta, uice holeris uescaris, eiusque aquam in qua cocta fuerit, adiecto melle potaueris. hoc etiam ægris sine difficultate succurrit. sanis eadem aqua cum condito, si ita malint, optime datur.

Ad cholera reprimendam, pulegium commanducatum super umbilicum impositum obligatumque, suppressere cholera, & intempestiuos, & continuos uomitus mire constat.

Si de cholera autè tanta concitatio uomitus est, ut contineri non possit, hedysmi, aut erucæ ramulos tres, aut quatuor cum mali granati succo contritos absorbendos dato, continuo sedabitur.

Vinum myrteum sorbendum dato, protinus uomitum comprimes. lauri baccas aliquot contritas ex uino potui datas succurrere cholera laborantibus constat.

Mororum de rubis succus epotus efficaciter prodest cholericis reprimendis. caules quantum maiores discosti, & ex aceto sumpti, similiter medentur.

Cydonea bene matura non cocta, in cibo accepta, similiter profunt. baccæ itidem aqua folij tritæ, cum uino potui datur, cito subueniunt.

Ad aluum concitandum, Aizoon herba, quæ Latine sedum appellatur, ex uino contrita potaque plurimum prodest.

Herbæ uettonicæ in umbra arefactæ folia contusa, & in puluerem redacta, ad pondus denariorum trium ex hydromelitis cyathis nouem bibenda per triduum data, uentrem sine molestia continuo mouent.

Brassicæ tenerimæ contritæ succum expressum, si quis ad sex cotylarum mensuram adiectis uini cyathis tribus ieiunus biberit, ita ut pridie non coenat, & bene digestus sit, mirifice, ac sine ullo tædio, aluum concitata purgabitur.

Orbicularis herbæ quam græcè κωνία uocant, si quis expresso succo anum perunxerit, mira celeritate experietur alui solutionem.

Ut purgatione uentris relecto corpore, satubriter ætatem agas, alium hoc genere concitabis. gladioli radicem longitudine, ac plenitudine digiti pollicis, si foeminæ remedium dandum erit; si uiro ad crassitudinem duorum digitorum, & longitudinem unius, dabis derasam, & lotam contritamque ualentissimè, adiectis aquæ cyathis quatuor, aut quinque, quam potionem colatam, admixto paululo mellis, calefactam potui dabis.

Herbæ britannicæ succus perse solus, pro uniuscuiusque uiribus, potui sumptus, sine periculo purgat. quò ualidius autem purgari uolueris, hoc amplius sumes, ita ut mensuram sextarii non excedas.

Lauriculi teneri, id est cymæ lauri, cum nepeta adiecto sale contriti, & cum aquæ tepidæ hemina in potione sumpti, concitant aluum, pituitamque, & lumbricos celeriter eiciunt.

Sambuci coliculi teneri decocti cum oleo, & garo manducati, uentrem continuo soluunt.

Aluminis liquidi paululum solutionem uentris adfirmant tali remedio se esse purgatos; mellis acetabulum, & salis triti tantundem, cum aceti sextario uno feruefaciunt, atque ita nocte sub diuino cælo sereno uas leuiter opertum relinquunt, & mane, cum pridie corna abstinuerint, cum aqua, quantum sufficiat, minutatim bibunt; quo facto, nò solum uentris, sed etiam atræ bilis, ac rufæ tædio absoluuntur.

Serum de lacte bubulo, adiecto melle, & sale quantum satis sit, potui sumptum, morantem aluum impellit.

Serum de lacte equino potui datum, facile, & sine periculo uentrem molliter purgat.

Alinum lactum melle potui datum, uentrem facile, & sine periculo soluit.

Salis marini triti, & mellis optimi despumati, & aceti scillitici semina singulas in unum miscebis, & teres, & aquæ mundæ frigide quartarium adijcies, & coagitabis, & ieiunus calefactum leniter bibes: tum deambulabis, atque inter deambulandum, calidam aquam paulatim quotiens ui sum fuerit, sumes; potenter hoc remedio uentrem morantem bilesque purgabis.

Malagma purgatorium ad paruulos, si ob infirmitatem potionem purgatoriam bibere, aut sustinere non possunt.

Lupinos crudos siccos in ollam nouam missos, in furno torrebis, siccatosque ac tufos, uel molitos, cum felle tauino, uel nitulino miscebis, & subiges, & pro malagmate ad inum uentrem ab umbilico deorsum uersus impones.

Nam si super umbilicū imposueris, stercus omne sursum uocabit; impositum autem deorsum

deorsum uersus, & bilem detrahet, & pituitam deducet. Sales cathartici sine stomachi iniuria, ut nec intestina doleant, accipiuntur, seu in prandio cum esca, seu in coena: Si autem ieiunus uolueris, cum mulso accipies coctile plenum; componuntur sic. Salis ammoniaci unciam unam, zingiberis sicci unciam unam, laseris radicis unciam unam, scamoniæ unciam unam, piperis unciam unam, foeniculi seminis unciam unam, teres omnia, & cribrabis, sane cum uolueris, ut uehementius moueat, coctilearia duo accipiat qui alij difficultate torquebuntur.

Ad ani uitia, & fistulas podici, & hemorrhoidas, remedia physica rationabilia diuersa, de experimentis.

Cap. XXXI.

Lipara ad intertrigines, & exasperationem, & tumorem ani, mirifica sic. Spumæ argenteæ P. II. cerussæ P. II. turis pollinis P. II. aluminis fissi P. I. adipis suillæ eneruatæ curatæ P. I. I. uini auferi ueteris. I. S. rosæ I. S. olei uindis pondo semis. teritur spuma, & cerussa, alumen ex uino diluitur. deinde adijcitur, sus in puluerem redactum. & cum primum hæc leuia bene fuerint, oleum, & uinū, & adipem diquesfactam cum rosa supra scripta misceri oportet. Lipara rufa, facit ad fissuras ani, quas Græci dicunt, eadem ad omnes eiusdem partis exulcerationes, & uitia diutina bene facit, accipit hæc. Spumæ argenteæ denarios X V I. misyos usti denarios V I. resinæ terebinthinæ * XII. ceræ * V I. cerussæ denarios X V I. chalcitidis ustæ * V I. olei myrti P. I. omnia diligenter teruntur cum olei pondere dimidio. tum reliquum oleum, & cera, & terebinthina liquefacta, mortario superfunduntur, & concorporantur, atque ita in dolulo uitreo reponuntur. Ad condylomata ani facit bene elateriū ficerum, quod est succus cucumeris siluatici, compositus in rationem pastilli, aceto dilutus, & ita appositus, item propolis per se subacta, & more emplastri imposita, plurimum prodest. Facit bene hoc medicamentum ani uitijs sic. resinæ terebinthinæ denarios V I. ceræ idem, in unum hæc coquuntur, quantum oportet, & adijciuntur his gagatis lapidis triti denarij quatuor. multi, & iridis contusæ, ac uino mixtæ, & subactæ manibus, uel ut farina, aliquid addiderint.

Hoc quoque medicamentum mirifice prodest ani uitijs, constat ex his. aluminis melini denarios duos, chalcitidis denarium unum, seculæ denarium unum, teruntur hæc omnia diligenter, permixtaque cū opus est uino, aut aceto diluta adponuntur. Hemorrhoidas sic curari oportet. primum, ut prodeant totæ; quod ut fiat, anus hoc medicamento perungitur. centaurei succi denarios duos; hæc herba latinæ fel terræ dictur, & ubique in agris nascitur. est autem tenuis, multorum ramorum in rectum surgentium; habet floribus pedunculariæ * I. mellis quantum ad comprehendenda ea satis erit. his peruncto ano, aut lana trita interius trusa, cum defecerit quis ad sellam, & apparuerint totæ hemorrhoides, supra scripto medicamento rursus bene tangendæ sunt undique, præcipue radices earum, quas baseis dicunt, de spicilli latitudine inlinendæ sunt, subinde imponente medico cumulatè medicamentum, & ad crustatè imprimente, donec bene combibant. totum enim in eo est, ut ab omni parte saturentur. est autem hoc medicamentum sic. chalcitidis ustæ denarios quatuor, æris floris usti denarios quatuor, misyos usti denarios tres, æris squame denarios duos, diphrygis denarios duos, soreos usti denarios duos, auri pigmenti * II. hæc teruntur diligenter, atque in tenuissimum puluerem rediguntur, & sicca, ut dixi, hemorrhoidibus imprimuntur undique. post hoc tenue simplex rasum linteolum imponi oportet, & super hoc panem autopyrum ex aqua maceratum, & tritum, rosa illic pro oleo adiecta. hoc medicamento sine magno labore circa septimum diē cadere coguntur hemorrhoides. oportet autem bis die panem imponi, nonnunquam, & in noctem, si circa eas tensionem senseris; quarto die auriscalpio auerso, quam partem Græci uocant, sensum tentare, ac mouere eas, quod celerius excidant. hoc medicamentum omnem carnem ex omni parte corporis exulceratam, & excrecentem, sine magno morfu tollit. Pulueris pancratiani confectio ad rhagadia, uel exochadia sic. aluminis rotundi ustilati, & ficcati uncias tres, aluminis fissi uncias tres, nitri usti * V I. æris floris * V I. omnia hæc permixta, & trita seruabis; cum utendum fuerit, cum aceto acri inlines exochadia, uel rhagadia, sed assidue, ut intra quartum diem sanentur. Ad ani uitia, & tumores, & uulnera compositio sic. resinæ terebinthinæ * X X V I I. uisci scrupula XII. cadmix * X I I. spumæ argenti * I X. cerussæ * I X. misyos * I X. herbæ arnoglossæ * I I I. olei ueteris librā. hæc uniuersa cōteres, & miscebis, & per dies quantos oportuerit, ad locū doloris adpones. Ani uitia omnia optime, & citissime curat oleū bombycinū uerū, si assidue inde tangantur, ita ut intra triduum, uel quatrimum rhagadia, & exochadia stirpitis tollat, si assidue ponatur. Nucleos de dactylo combures, & conteres quā minutissime, & de puluere eorum loco ani exulcerato, siue uulneribus eius, & fistulis frequenter impones.

Herbam polypodium teres, & sic in ptisanam mittes, & sorbebis ieiunus, hoc & soluet uentrem, & anum molliuementem. Ad rhagadia in ano nascentia. spumæ argenti — I. olei rosæ — I. permiscebis, & assidue adpones. Plantaginis folia, & radices, & herbam centenodiā, & rubi summitatem, & mespila, & cydonea, & nuces gallas, & de salice frondes quæ tenerime fuerint, cum atramento futorigo, ex aqua coques simul uniuersa, adiecta quarta parte aceti, & colabis diligenter, atque inde fouebis eas partes, unde hemorrhoides fluunt. Rubi summitatem colliges, & mala siluestria, rubum autem in mortario teres, & siluestrium pomorum succum exprimes, & pariter miscebis, ac fomentum inde factum calidum hemorrhoidibus adpones. Chartam diligenter exures, & cinerem eius, siue fuliginem siccam ad fluentem

hæmorrhoidis uenam, tam diu adpones, donec stringatur. ⁺ Ad ficos qui in locis uerecundioribus nascuntur, de orbita rotæ collige calios lapides non prægrandes neque paruos, & pone in foco, ut bene candescant, & lotio infantis eos extingue, postea de ipso lotio locum adfidue laua, ita ut frequenter mutes, & lapides, & lotium infantis, tantum proderit ut sectione, & ferro opus non sit. Extalem prominentem uino lauare prius, deinde cedro ungi, & pollice propelli introrsum oportet. Ani uitijs omnibus plantaginis radix decrescente luna die saturni, occidente sole collecta, uel sumpta, & pellicula, uel panno phoenicio obuoluta, ac licio ligata, & lumbis circumdata, continuo sanitatem præstabit. Sertulam campanam ex uino, aut passo coctam terito, & adposito ad anum, eo que uino in quo sertulam coxeris, & prius, & postea anum foueto, celeriter sanabis. Caro ani superuacua, sine dolore consumetur, si araneorum fila adpones, quæ in uineis inueniuntur. Cedria qua librarij utuntur, si anum ficosum, & ad sectionem spectantem frequenter uino calido prius elutum, spicillo perunxeris, atque ita quieueris, mirabiliter carnem superuacua consumes, sed ad sanitatem lenioribus medicamentis postea perduces. Extalem nimis prominentem reprimat gallinaceus uitellus, si coctus integer ab ipso ægro illic calidus adfidue continetur. Ad fistulas uulnere in ano, uel quæ nascuntur in locis uerecundioribus terræ mali radix contrusa, & fistulæ inserta, aut in puluerem redacta, & cum uino uetere inspersa, ita prodest, ut celeriter expurgetur, solidetur, & ad omnem sanitatem perducatur, sine qua, nec medici huiusmodi causas curare possunt. Ithy mali contusi succum ex uino super fistulam uulneris exprimito, deinde fomentum huiusmodi alligato, id est marrubium in cinere calido subcoquito, & adiecta uetustissima axungia diu subigito, & linteum inlitum calidissimum fistulæ adponito, & ter, aut quater in die feruens medicamen renouato, mirifice proderit. Os humanum contusum, & in puluerem tenuissimum redactum, cum melle inlitum, etiam duratissimas ani, & antiquas fistulas sanat, si per triduum continuum adponatur. Ad nates, uel podicem fistulosum, olei optimi sextarium, lithargyrii selibram, æruginis libram, stiris masculi nigri selibram, refinæ libram, mellis sextarii unius quadrantem, aceti 8. I. I. hæc omnia in olla rudi simul decoques, & more emplastrum induces. Ad hæmorrhoidas, eosque qui sanguinem deiciunt, porri succus expressus, ieiuno potui datus, hæmorrhoidas continuo definire facit. Adeps cygni hæmorrhoidas comprimit, si aut potui detur, aut loca inde tangantur. Symphyti radix, quæ herba gallice halus dicitur, aut commandatur, aut usta, & trita in portione datur, aduersum hæmorrhoidas nimium profluentes. Spongiam marinam exures, & in cinerem rediges, & cribabis, & inde coctare plenum in quacunque portione dabis ei, qui hæmorrhoidum nimietate uexatur. Ruborum cauliculi teneri tunduntur, expressusque ex his succus in calidissimo sole ponitur, ut usque ad crassitudinem mellis spissescat; hic haustus efficacissime hæmorrhoidum sanguinem sistit. Coagulum ceruinum deglutitum, sanguinem ex intimis profluentem facile stringit, idem facit, & coagulum leporis. Luna XII. hora nona antequam exeant, uel erumpant mori arboris folia, oculos tres tolles, digitis medicinali, & pollice manus sinistrae, & in oculis singulis dices, absi, apsa, phereos, mittesque in cotum galaticum, & in phoenicio lino conchyliatæ purpuræ conligabis, & dices, tollo te hinc tota hæmorrhoida, absi, paphar. & nudum cum cui remedio opus est, præligamine illo cinges. Ani uitia, & condylomata felle caprino peruncta sanari certissime constat. Malicorium cum uino optimo, usque ad duos cyathos decoctum, pariterque contritum, & malagmatis modo impositum, potenter ani condylomata per sanat. Butyrum, & adeps anserina, & oleum rosaceum permixta pulcherrime profunt ani uitijs. Sanguis caprinus cum polenta impositus, ani uitium omne per sanat. Rhagadas canini capitis usi cinis aspersus adiungit, & stercoris albi canini, betæque cinis insertus, similiter opitulatur. Iris illyricæ cinis cum melle subactus, utiliter imponitur ani uitijs, si ipsa iris in furno diligenter uratur. Adeps anserinus cum eiusdem cerebro, & cæsyro, & alumine subigitur, & imponitur ani omnibus causis. Carnes ex capitibus mugilum, siue mullorum decoctæ, & cum melle subactæ, atque impositæ, uitijs ani plurimum profunt. Oleum uetus, & picem, & pollicem triticeam decoque, & ano exulcerato calens medicamen impone. Radix rubi in uino, usque ad tertias coquitur, eo que uino ani uitia, & difficultates fouentur. Ad ulcera in ano facta, chartæ combustæ, sed enarum eius drach. I. auripigmenti drach. I. lepidos drach. I. simul coteres, & melle comprehensis utens emplastrum modo. Ad eos quibus intestinum improbe prominet, remedium sic. ebulli succo turpitudinem circumline, cito remediabis. Porrigines ani extirpat tale medicamen. picis, refinæ, ceræ, butyri, seui caprini, argenti spumæ, singulorum paria pondera remitte, & simul contempera, atque ita inline. Ad syringium, uel ani uitia, lauabis locum uino uetere, & teres testam ostrei, & sordes intra pulvinum uentrem repertas contundes, & cochleam uacuam, & cucurbitam ustulatam teres diligenter, mixta que omnia cum in puluerem tenuissimum redegeris, uulneri adpones, mox uitium omne sanabis. Item ad ani uitia prominentia, quæ reuocari non possunt: Rubi ubi mora nascuntur, caules teneri, & buxi folia, & cortex mali granati, uel ipsa poma eius, & cortex roboris arboris, unde coria conficiuntur, in testa supra prunas ponuntur, & intra uas, ubi offertur, fumantia constituuntur, ut supra sedeat infirmus, conclusus diligenter, ne fumus foras exeat. quo facto, cum conatu anum eidem fumo offerat. in recenti tedio hoc remedium ter factum subueniet, in uetere uero tedio, sepius fieri oportet. Ad idem, quod & libidines offerendi, & conatus reprimet. ceparum rotundarum, uel etiam aliarum folia, aut cortices ficcas, & picem duram, simul carbonibus incendes, & uase, ut superius dictum est, concluso sedebis, & conatus dabis, ut fumus, & uapor ano suscipiatur, præfens experieris remedium. Compositio ceroti ad uitia ani sic. spumæ argenti — II. cretæ cimolice — II. ceræ punice — II. cerussæ — I. I. quæ omnia ad summam leuitatem

leuitatem teruntur, tum in uase argenteo. cera cum oleo roseo remittitur, sic reliqua confunduntur.

Compositio ad ani uitia sic. cicidos, lepidos, chalcanti, schistes, hæc trita mensuris paribus, melli despumato mixta ad usum huiusmodi seruabuntur.

Ad syringium, remedium efficax. oliuæ medullam cum semine auenæ æquis portionibus teres, & puluerem ipsum aqua cælesti consperges, faciesque ex eo colligat quæ fistulæ anni in se possint, quæ per triduum iniecta fistulas in profundo positas foras producent, ut postea possint medicamine leniore sanari.

Intestinum extremum quibus prominet, & excedet, quod tens procefferit, totiens uino calido, in quo herba uerbena cocta fuerit, admixto tenui lixiuo lauari oportebit. prodest, & illud pice liquida perunguere, & sic introrsum repelli; benefacit adhuc, & cinis ex sarmento factus, atque cribratus fuscusque inspersus. alumen quoque fissum tritum, eidem loco impositum, plurimum prodest.

Paniculis, & inguinibus, & intertriginibus, remedia physica, & rationalia diuersa, de experimentis.

Cap. XXXII.

Malagma quod discutit strumas, parotidas, paniculas, quas Græci phygethlon uocant, omnes quoque futuras suppuraciones dispergit, factas uero aperit: facit, & ad dolorem articulamentorum omnium, & iunthurarum, præcipue ad lumborum dolorem, atque inflationem stomachi, uel coli, conficitur sic. picis hispaniæ, aproniti, resinæ pityniæ, ceræ, lauri baccarum, singulorum denarios XXXV. adipis taurini * XV. ammoniacæ guttæ * XV. iris * XV. galbani * XV. piperis albi * V. quæ debent liquefieri, dissoluantur igne, & oleo exiguo diluuntur. cætera tunsa, & cribrata bene, asperguntur tepenti medicamento, quod diu agitando miscetur, deinde manibus subigitur, ut malagma exactissimum fiat.

Malagma ad omnem dolorem corporis, sed præcipue panicularum, & omnium articulamentorum, facit & ad podagram, eadem discutit uomicas, aut aperit: pectoris quoque concoctioni, & causis interaneis prodest, & lumborum doloribus, accipit hæc. ceræ * VIII. ammoniacæ guttæ * X. bdellæ * X. iris * VI. galbani * III. terebinthinæ * V. contunduntur pilo, ordine quo scripta sunt omnia. deinde cyprino oleo, quod in imo subsidere solet, colliguntur, uel permiscuntur. cera in aquam feruentem in minimas partes confusa prius dimittitur, ut illic mollescat, deinde subacta manibus in pilum coniicitur cum cæteris speciebus, atque illic diu malaxatur.

Paniculas aperit seuum pecudis cum sale tosto positum, item lacertæ cinis, uel ipsa diuisa adposita. item coctæ contusæ, uel cinis earum cera admixtus adpositus, & simus columbinus cum farina inlitus prodest. Inguinum tumorem, coctæ minutæ tritæ cum melle inlitæ sedant.

Ad inguen, frustum ueteris spongiæ ad pedem alligabis, & radicem alteri sinistra manu digitis medicinalibus fumes, & alligabis in alio pede. & de cucurbita sicca longa circum facies, & immisso licio circa pedem ligabis.

Panicula ne ad sectionem ueniat, remedium sic. gypsum aqua calida bene consperge, donec in se coeat, & spissetur, & sic impone supra paniculam. deinde chartam super alliga. quæ res, & aperit eam, & sanat. postea utere malagmate molli, ut cito, & bene cicatricet.

Ad intertrigines exalfectas, & dolentes, remedium de experimento sic. in mortario plumbeo de pistillo plumbeo, mistum oleum rosaceum, & uitellum oui, tam diu teres, ut spissetur, ita ut de eodem plumbo, dum teritur, pars aliqua misceatur, & cum fuerit spissum, ut emplastrum in linteolo tenero induces, & loco trito intertrigini adpones. hoc remedio per triduum donec locus exulceratus sanetur, uteris.

Aduersum inguinum paniculas, remedium sic. nasturcium cum pice impositum, paniculas discutit. maturis uero, aut maturefcentibus paniculis tale medicamentum adhibebis, id est lenticulam, & lauri baccas ex terio iuxta mensuram lenticulæ decoques in aqua, & diligentissime manibus subiges, & cum lana calidum fomentum adpones, quod cito, ac uehementer, & dolorem discutiet, & humores noxios purgabit.

Eruum uetus in farinam mollissimam redactum, & cum melle impositum, paniculis medetur. Mirabile hoc medicamentum paniculis sanandis sic. hyoscyami foliorum uiridium, P. I. resinæ pityniæ. P. II. ceræ P. II. adipis porcine sine sale P. I. galbani P. II. omnia hæc tunsa, uel remissa in unum corpus rediges, & emplastri modo adpones.

Calcem uiuam, alij capita duo, uitellos coctos, uel incoctos ouorum tritum, simul omnia permixta, & emplastri more adposita, omnem tumorem, & dolorem panicularum dispergunt, & sedant.

Galbanum solum inter principia doloris paniculæ adpositum plurimum prodest. Foeniculi farina ex multa aqua decocta, addita axungia adposita, dolorem inguinum sedat. simus hircinus cum melle decoctus, adpositus, paniculis sanitatem congruam præstat.

Creta cimolia trita, & cum aceto superinducta, cohibet panicularum tumorem. Siue incipientem paniculam comprimere opus sit, siue concoctam dissolui, præstabit utilissimum remedium cinis muricum, uel purpurarum exustarum cum oleo uetere impositus, uel superductus.

Lupini ex aceto cocti, & subacti, & pro emplastro adpositi, causam panicularum maturant, & minuunt dolorem. Ficus aphricana uetusta ex uino decocta, tunsa, uel trita, utiliter paniculis adponitur.

Ne inguen ex ulcere aliquo, aut uulnere intumescat, surculum anethi in cingulo aut in fascia habeto ligatum in sparto, uel quocunque uinculo, quo holus aut obsonium fuerit innexum; septem nodos facies, & per singulos neciens nominabis singulas anus uiduas, & singulas seras, & in crure, uel brachio, cuius pars uulnerata fuerit, alligabis.

quæ si prius facias antequam nascantur inguina, omnem inguinum, uel glandularum molestiam prohibebis, si postea, dolorem tumoremque sedabis.

Surculum quoque ex myrto terra tactum, si quis gerat, ab inguinibus tutus erit. Inguinibus potenter medebere si de licio septem nodos facias, & ad singulos uiduas nomines, & supra 12-

lum eius pedis alliges, in cuius parte erunt inguina: Si ab equitando vexata fuerint inguina, aut intertrigines dolebunt, spuma equi fricentur, statim remediabuntur. Stercus suillum cum oleo perfricui, & in testa calefactum, & inguinibus impositum, plurimum prodest. Pollex eius pedis, in quo inguina erunt, cum proximo digito ligatus, mire medetur. Si quis ab equitando, aut ambulando, inguina habuerit, scribat in charta *xvrtos*, & ad femur sibi alliget, cito sanabitur. Ad condylomata inguinum, uel quatuorlibet partium, malicorium cum uini optimi sextario, ad cyathos duos decoctum, & cum eodem uino tritum, atque ut malagma impositum, condylomata facta perfanat. Medullam canis ex uino uetere subige, & emplastri modo impone condylomatis, potenter ea sanabis. Argimonia trita, & adipi anserina admixta impositaque condylomatis medetur. Oleum uetus cum polenta decoques, & calidissimum condylomatis impones. Folia rubi contrita, & cum ceroto rosaceo imposita, sanant omnia condylomata. Adeps anseris cum cerussa, & oleo rosaceo, & cera pontica in unum cerotum modo composita, & imposita, utiliter condylomatis medetur. Mus araneus, qui cum in orbitam inciderit moritur, ustus in cinerem redactus, & cum adipe anserina permixtus, condylomatis infrius, mirum remedium adfert. Ad intertrigines sanandas, libystici folijs commanducatis succum exceptum, si in loco adposueris, cum morfu quidem, sed continuo sanabis. Gallæ contusæ in uino coctæ, atque impositæ, intertrigini plurimum profunt. Calciamento quo uti soles, locum inguinum laborantem, si perfricaueris, confestim intertrigines tolles. Axungiam peruetere liquefactam, & cerussam bene tam permisce, donec acopi crassitudinem habeat, atque inde intertrigines perfrica, efficaciam remedij celebritatemque mirabere; nam hoc medicamen etiam rhagadas efficaciter sanat. Cretam argentariam, cum uino uetere tritam impones tritis intertriginibus, optime accipieris. Oleo uetere, & aqua calida quia permixta adfidue inguina foue, continuo subuenies intertriginibus attritis. Si exulceratio intertriginum erit, spumam argenti ex uino conteres, eique puluerem pinei corticis tursi miscebis, & locum inlines. Ad inguina, & apostemata, remedium sic equinus sanguis maxime admissarij equi frequenter inlitus, huiusmodi molestias sanat. ungulæ quoque eius combustæ cinis cum oleo adpositus, idem perstat. Codex uiuæ contritæ cum myrrâ, & impositæ inguinibus, efficaci auxilio subueniunt; sed reliquendæ sunt loco, cui adpositæ fuerint, tam diu, donec sponte decendant; quod fiet cum perlanauerint. Arietis quam pinguislima lana, plena suis sordibus combusta, & in puluerem redacta, prodest plurimum, si eo cinere ex aqua locum inguinum perfricaueris. Bestiolæ multipedes, quæ in locis humidis, & sordidis nascuntur, quæque contactæ, pilulam de se faciunt, contritæ, adiecta tertia parte resinæ terebinthinæ emplastri modo adpositæ, collectiones incipientes, quas Græci apostemata uocant, adeo sanant, ut tenacissime emplastrum hæreat, donec perfanent. Lotio suillo locum inguinum dolentem adfidue perungue, aut cum eo lanam succidam adpone, statim medebere. Muliebres capilli combusti, & contriti, atque inliti cum uino, aut cum aceto, inguinibus medentur. Menstruis muliebribus inguina dolentia, uel tumentia, si contingantur, statim sanari creduntur. Talus bubulus combustus tritusque adiecto melle, inlitus inguinibus dolentibus, uel tumentibus prodest. Inguina tumida, & dolentia sanabis, si ipso uetere denudato, id est reducta pellicula, adfidue ea contigeris, uel perfricaueris. Apostemata, ut remolliantur, aut si mollia fuerint, ut dispargantur, facies medicamentum tale, quo nihil potentius est. herbæ marrubij folia uiridia contundes, aut si uiridia non fuerint, inuoluta folijs malug, uel personæ sub cinere calido coques; deinde panem candidum infusum uino ueteri addes, & axungiam miscebis, & tundes de ligno in lignea pilas, sed obseruabis, ut panis infusus, & axungie partes singulæ sint, herbæ uero partes duæ, quod emplastri more, manet, & sero locis necessarijs impones. Inguinibus mirabile exhibet remedium, ex gallinacea ala ossiculum extremum, coctæ terebratum, nodisque septem licio ligatum, atque ita brachio, uel cruri eius partis, quæ inguina habet, suspensum. Lipara ad intertrigines sic contrita, spumæ argenti, medullæ ceruinæ, seu ceruini, libras singulas, ouorū octo album, uini boni *q. iiii.* suris pollinis unc. quatuor, rosæ campanæ P. unum, aluminis semunciam, cerussam, & spumam tundes, & tera remittes, & in mortario terendo uniuersa miscebis. Porriginem intertriginum interficies hoc medicamine; picis, resinæ, ceræ, butyri, seu caprini, spumæ argenti, uncijis singulis in unum permixtis, si utaris adfidue.

Ceparia, & uetere, siue uerendis uirilibus, & testiculis dolentibus, uel pendentibus, & herniosis, siue uiris, siue infantibus, & rebis ueneris, & eunuchis sine ferro faciendis, remedia physica, & rationabilia diuersa de experientia. Cap. XXXIII.

Ad testiculi tumores, cupressi baccæ ex uino coctæ conueniunt; & faba quasi conglobata, cum multo cumino coctæ, & adposita more cataplasmatum. nec non, & uua passa cum cumino contusa, & tepens adposita, plurimum prodest. ad uetere uero tumorem, lentem ex aqua coctam, & tritam imponi utilissimum est. Si ulcus in pene sordidum fuerit, aut cancer illud tentauerit, uel iam occupauerit, androni pastilli triti ex uino impositi benefaciunt. Omne ulcus in omni parte corporis sordidum (quod tū intelligi potest) cum candicat, & quasi crustam perductam albam habet, purgat mel per se adpositum, uel iris arida contrita, & cum melle eadem ratione, & terræ mali, & panacis radix adposita, purgat sordida ulcera, uel in uerendis, uel quoquo loci fuerint. Mirifice hoc medicamentum purgat ulcera quælibet, etiam si cancer

tentauerit; est autem lene, conficitur sic. auri pigmenti denarios V L. zris squamæ * III. elaterij * I. chartæ combustæ cineris * III. ex his tritis, cum opus est coctearia tria, rosæ cyatho permiscuntur, & linteola carpta in eo ringuntur, atque ita ulceri superponuntur. hoc medicamentum cito, & sine ullo morbo expurgat sordidissima ulcera, ac sanat. Testibus qui descenderint spumam coctearum inlitam meri certum est, si inde tangantur. Venerem conciliant passeris in cibo sumpti, uel oua eorum. item gallinaceus testis dexter in arietina pelle collo subligatus mirè prodest. item stellionis cinis in linteo obvolutus, sinistra manu portatus, uenerem stimulat, translatus inhibet. Qui in uenerem infirmior erit, testiculos millonis ex aqua fontana, quæ perennis est, cum melle decoctos edat ieiunus per triduum, statim remediabitur. Ut in uenerem cum uolueris sis paratus, remedium tale facies. lacerti appellantur, siue stelliones, qui per parietem repunt, curti sunt, quique græcè ascalabotæ uocantur. hi quatuor infunduntur in acetum acce triduo, uel quatrinduo, quousque putrescant, hoc teres in mortario, & adiunges galbani

abrotani * XII. castorei * XII. sulphuris uiui * XII. refinæ terebinthinæ * XII. croci * XII. euzomi, quæ appellatur herba mentiola, succi * VI. mentæ succi uiridis * VI. staphisagriæ * VI. iris illyricæ * VI. aluminis scissi * VI. myrræ * III. seminis herbæ symphoniacæ siccæ * III. hæc omnia separatim trita, simul miscebis, & iterum simul teres. inde emplastrum facies, uel pittaciū, & pones in dextri pedis pollice, cum uti uolueris uenere, & cum cessare uolueris ad sinistri pedis pollicem transferes. Ad capriam, satureiæ siccæ florem collige, & puluerem inde facito, & melilotum combure, & puluerem inde facito. similiter de cydoneo sicco combusto, etiam de eo, qui in arbore solet siccus remanere, puluerem facito, & cribello medicinali omnem puluerem cerne, & permisce, & cum uino uetere calefacto locum in line, etiam linteo illic adposito tege, ita tamen, ut duæ partes sint de satureia, & singulæ de meliloto, & cydoneo. sed quotiens medicamen pones, uino uetere calido prius locum elue.

Myrram in puluerem delicatissimum redige, & ad locum capriæ adsiue cum uino uetere pone, mirè remediabis. Ad infantum testiculos uitiosos, uel tumentes, remedium efficax sic. Araneam quæ per filum suum se summittit, quando sursum uersus currit rape, & cum aqua calida tritam continuo da infanti bibendam. Ad abundantiam seminis præparandam, erucam decoctam bibat, quotiens quisque inopia seminis se laborare perspexerit, uel potius adsiue incoctam manducet. Ad ueretri curam, auri pigmentum, & aloen æquis ponderibus, tritum, & in puluerem redactum miscebis, & utas cum uino uetere, ita ut prius ueretrum uino uetere eluas, & sic medicamine conspergas. Ad ueretri dolorem, capream, & mel pari pondere in pultario fœbili coque, & bis ad diem impone. sed antè uino uetere locum, qui curandus est, eluas.

Folia myrti ieiunus commanduca, & in ulcera ueretri expue, statim proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

sa hæc, atque cribrata miscentur, & cum aquæ pluuialis 8. IIII. ad medias decoquuntur; ex eo quotidie testes tumentes inliti, citissime reprimuntur. Contusis, & compressis testibus cito subuenies, si cicuta folia trita cum pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias, & per triduum ponas, & manè ac uespera renoues. Baccæ cupressi contusæ cum axungia uetere subactæ, & tanquam malagma impositæ, herniosos etiam ad ultos, & antiquos potenter iuuant. Ad ueretri dolorem tumoremque, remedium sic. betam de qua semen, decoque ex aqua, atque ea adsiue ueretrum per triduum foue, & tumor sedabitur, & uirū omne reducta pellicula sanabitur. Succo herbæ uettonicæ tepido uino mixto, ueretrum adsiue foue, uel ipsam tritam adpone. Portulacæ succus tubo laboranti per dysterium immixtus, mirè prodest. ipsa etiam trita superimposita iuuabit, & quia cito arefcit, plusculum succi eius expressum debet ad necessitudinem huiusmodi reseruari. Puluis tenuissimus de myrti folijs arefactis ulceri ueretri inspersus celerrimè prodest. Nucleos pineos minutos purgatos numero XXX. adiecto pauxillo croci simul tritos, si quis ex passi cyatho quotidie per dies IX. continuos bibat, mirè penis uirio celeriterque sanabitur. Erucam purgatam, molitum, & in farinam tenuissimam redactū, adiecto

proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

sa hæc, atque cribrata miscentur, & cum aquæ pluuialis 8. IIII. ad medias decoquuntur; ex eo quotidie testes tumentes inliti, citissime reprimuntur. Contusis, & compressis testibus cito subuenies, si cicuta folia trita cum pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias, & per triduum ponas, & manè ac uespera renoues. Baccæ cupressi contusæ cum axungia uetere subactæ, & tanquam malagma impositæ, herniosos etiam ad ultos, & antiquos potenter iuuant. Ad ueretri dolorem tumoremque, remedium sic. betam de qua semen, decoque ex aqua, atque ea adsiue ueretrum per triduum foue, & tumor sedabitur, & uirū omne reducta pellicula sanabitur. Succo herbæ uettonicæ tepido uino mixto, ueretrum adsiue foue, uel ipsam tritam adpone. Portulacæ succus tubo laboranti per dysterium immixtus, mirè prodest. ipsa etiam trita superimposita iuuabit, & quia cito arefcit, plusculum succi eius expressum debet ad necessitudinem huiusmodi reseruari. Puluis tenuissimus de myrti folijs arefactis ulceri ueretri inspersus celerrimè prodest. Nucleos pineos minutos purgatos numero XXX. adiecto pauxillo croci simul tritos, si quis ex passi cyatho quotidie per dies IX. continuos bibat, mirè penis uirio celeriterque sanabitur. Erucam purgatam, molitum, & in farinam tenuissimam redactū, adiecto

proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

sa hæc, atque cribrata miscentur, & cum aquæ pluuialis 8. IIII. ad medias decoquuntur; ex eo quotidie testes tumentes inliti, citissime reprimuntur. Contusis, & compressis testibus cito subuenies, si cicuta folia trita cum pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias, & per triduum ponas, & manè ac uespera renoues. Baccæ cupressi contusæ cum axungia uetere subactæ, & tanquam malagma impositæ, herniosos etiam ad ultos, & antiquos potenter iuuant. Ad ueretri dolorem tumoremque, remedium sic. betam de qua semen, decoque ex aqua, atque ea adsiue ueretrum per triduum foue, & tumor sedabitur, & uirū omne reducta pellicula sanabitur. Succo herbæ uettonicæ tepido uino mixto, ueretrum adsiue foue, uel ipsam tritam adpone. Portulacæ succus tubo laboranti per dysterium immixtus, mirè prodest. ipsa etiam trita superimposita iuuabit, & quia cito arefcit, plusculum succi eius expressum debet ad necessitudinem huiusmodi reseruari. Puluis tenuissimus de myrti folijs arefactis ulceri ueretri inspersus celerrimè prodest. Nucleos pineos minutos purgatos numero XXX. adiecto pauxillo croci simul tritos, si quis ex passi cyatho quotidie per dies IX. continuos bibat, mirè penis uirio celeriterque sanabitur. Erucam purgatam, molitum, & in farinam tenuissimam redactū, adiecto

proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

sa hæc, atque cribrata miscentur, & cum aquæ pluuialis 8. IIII. ad medias decoquuntur; ex eo quotidie testes tumentes inliti, citissime reprimuntur. Contusis, & compressis testibus cito subuenies, si cicuta folia trita cum pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias, & per triduum ponas, & manè ac uespera renoues. Baccæ cupressi contusæ cum axungia uetere subactæ, & tanquam malagma impositæ, herniosos etiam ad ultos, & antiquos potenter iuuant. Ad ueretri dolorem tumoremque, remedium sic. betam de qua semen, decoque ex aqua, atque ea adsiue ueretrum per triduum foue, & tumor sedabitur, & uirū omne reducta pellicula sanabitur. Succo herbæ uettonicæ tepido uino mixto, ueretrum adsiue foue, uel ipsam tritam adpone. Portulacæ succus tubo laboranti per dysterium immixtus, mirè prodest. ipsa etiam trita superimposita iuuabit, & quia cito arefcit, plusculum succi eius expressum debet ad necessitudinem huiusmodi reseruari. Puluis tenuissimus de myrti folijs arefactis ulceri ueretri inspersus celerrimè prodest. Nucleos pineos minutos purgatos numero XXX. adiecto pauxillo croci simul tritos, si quis ex passi cyatho quotidie per dies IX. continuos bibat, mirè penis uirio celeriterque sanabitur. Erucam purgatam, molitum, & in farinam tenuissimam redactū, adiecto

proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

sa hæc, atque cribrata miscentur, & cum aquæ pluuialis 8. IIII. ad medias decoquuntur; ex eo quotidie testes tumentes inliti, citissime reprimuntur. Contusis, & compressis testibus cito subuenies, si cicuta folia trita cum pauculo aceti inducas, ita ut medicamen glutinosum facias, & per triduum ponas, & manè ac uespera renoues. Baccæ cupressi contusæ cum axungia uetere subactæ, & tanquam malagma impositæ, herniosos etiam ad ultos, & antiquos potenter iuuant. Ad ueretri dolorem tumoremque, remedium sic. betam de qua semen, decoque ex aqua, atque ea adsiue ueretrum per triduum foue, & tumor sedabitur, & uirū omne reducta pellicula sanabitur. Succo herbæ uettonicæ tepido uino mixto, ueretrum adsiue foue, uel ipsam tritam adpone. Portulacæ succus tubo laboranti per dysterium immixtus, mirè prodest. ipsa etiam trita superimposita iuuabit, & quia cito arefcit, plusculum succi eius expressum debet ad necessitudinem huiusmodi reseruari. Puluis tenuissimus de myrti folijs arefactis ulceri ueretri inspersus celerrimè prodest. Nucleos pineos minutos purgatos numero XXX. adiecto pauxillo croci simul tritos, si quis ex passi cyatho quotidie per dies IX. continuos bibat, mirè penis uirio celeriterque sanabitur. Erucam purgatam, molitum, & in farinam tenuissimam redactū, adiecto

proderit. Ad tumores, & dolores testiculorum, brassica incocta cum sale trita impositaque, prodesse affirmatur. pastinacæ filuaticæ radix similiter imposita, eque prodesse dicitur. portulaca quoque trita cum polenta adposita testiculis medetur. ex fimo bubulo panis factus, & exustus in furno, aut in foco, & posita in cinerem redactus, & cum aceto scyllitico subactus, dumque feruet, testiculis adpositus sepiusque mutatus, admirabiliter, & statim prodest. Spongia ex posca acida, & tepida adposita, statim sedabit testiculorum dolores. Adeps uituli, & nitri modicum una permixta, & ceroti modo imposita testiculis, tumores omnes, & dolores persanare dicuntur. Bulbi ex mulso triti, atque inliti dolentibus testiculis medentur. Ruta ramuli tenerissimi triti, & inliti, tumorem testiculorum quamuis maximū sedant. Farina lini seminis cū refinæ, & myrræ pari pondere permixta, & imposita testiculis, dolori, ac tumori eorum subuepit. Testiculi tumentes aqua marina rationabiliter fouentur. Herniosus, ramicosus, hydrocelicusque asparagi duri radices siccatæ, & contusæ, & cribratæ cum aquæ hemina potui sepius datæ, celeriter subueniunt. Pilulas cupressi uirides ex uino uetere ad tertias decoque, & cyathos binos quotidie ieiuno hernioso potui dato, tum folia eiusdem trita testiculis imposito, mirè proderis. nam hoc remedium multis experimentis probatum est. Lapidem ignarium contusum refinæ mixtum pro emplastro impone ramicoso, statim proderit. Si puero tenero ramex descenderit, cerasum nouellam radicibus suis stantem, mediam findito, ita ut per plagam puer trajici possit, ac rursus arbusculam coniunge, & fimo bubulo, alijsque fomentis obline, quò facilius in se, quæ scissa sunt, coeant. quanto autem celerius arbuscula coaluerit, & cicatricem duxerit, tanto citius ramex pueri sanabitur. Testibus nimie crescentibus, cicuta radix trita, & cum oui albo imposita medetur. Cerussæ P. I. turis masculi selibram, tun

turis polline cum uino uetere coctum, tepidum ueretro impositum, & ad opertum, citissime prodest.

Verris cerebrum coctum, & cum melle adpositum, carbunculos in ueretro efficaciter sanat.

caballinus contusus, & in puluerem tenuissimum redactus, ueretro inspersus efficaciter prodest.

Arietini pulmonis, dum in craticula assatur, succus exceptus, myrmecias quæ in ueretro nasci solent, in
tione sua purgat, & discutit.

Canini capitis recentis exusti cinis, ueretri, uel testiculorum rabidis, &
humidis ulceribus inspersus, aut cum aceto adpositus, adeo prodest, ut spodium, & utilitates eius, in huius
curationibus uincat.

Fel caprinum cum melle, ueretri doloribus ulceribusque inlitum prodest.

Caro uaccina recens ueretro imposita, ulcera eius, & epiphoras mirè persanat.

Salfamenta exusta co-
tritaque, & cum melle ueretro imposita, aduersum omnes dolores, & fumigationes singularem efficaciam
præstant.

Anethum siccum uritur, cinisque eius tritus, aut cum uino uetere ueretro inspergitur, aut
cum melle subactus adhibetur.

Lac asininum cum lana succida, ad umbilicum habeat, quotiens quis
in uenerem uoluerit incitari.

Eruce seminis III bulbi rufi III nucleii pinei purgati VI

Spicz nardi III teres singula diligenter, & permiscebis, atque inde globulos facies ad formam nucis
auellane, & cum opus fuerit, singulos liquefactos in caprino lacte potabis, si in uenerem uolueris accendi.

Satureiz creticæ I myrræ I nucleii pinei purgati quartarium. eruce seminis — I scilicet purgatz

— I omnia hæc contrita miscebis, & globulos, ad magnitudinem fabæ facies, & singulos ad diem ieiunus
cum caprino lacte potabis, si uolueris esse salacior.

Pyretii triti pulueris coclearium plenum cum
passo potum, excitat in uenerem inuitiles mares.

Qui potuit, & non potest, ut reparetur in uenerem,
radices cucumeris agrestis concisas minutarim in oleo decoquat, & in uasculo uitreo referuet, & cū opus
fuerit, unquat sibi in balineo interius, & exterius omne ueretrum, sed sapone nō abluat, statim incitabitur.

poterit autem sequentibus diebus, si necesse fuerit, etiam sine lauacro, ueretrum sibi similiter eodem medi
camine perungere. natura genitalis maior, & solidior uidebitur, si de lilij radicibus tunsis cataplasma ei
imponas; quæ nihilominus, & ueneri incendendæ satis utilis est.

Herbæ rebus uenerijs aptæ; rapha-
nus, eruca, asparagus, porri scitiles, uel capitati, ocymum, fœniculum, satureia, pestinaca, cardui. hæc enim da-
tæ etiam mares nasci faciunt. at uerò contrariæ sunt pulegium, apium, ruta, coriandrum, menta, lactuca, na-
sturtium, anethum.

Ad ramicosos, & quibus ueretra, & testiculi dolebunt. medullam panis siccam in
mortario cōteres, deinde oleum in sartagine mittes, & sic medullam panis tritam super oleum mittes,
& paululum friges, calidumque super pectinem dolentis adpones, mirè subuenies.

Fabam tresam in
mulsam aquam infunde, & cum bene permaduerit cōtere, ac dum teres uino asperge, & tanquā malagma
calidum uerendis adpones, statim dolentibus, ac tumetibus testiculis medebere.

Verendi uirilis
clauus, & ulceribus aloë trita utiliter imponitur, cum prius uino eluta fuerint uitia ueretri.

Empla-
strum uiride, quod medici chloran appellant, ex rosaceo remissum in linteolo tenui inlitum, uertris exul-
ceratis utiliter imponitur.

Seuum pecudis a renibus uulsum admixto pumicis cinere, & sale, rectissi-
mè dolentibus, & tumetibus uertris imponitur.

Arietinorum uellerum cinis cum aqua mixtus, &
adpositus, incommotis ueretri repugnat.

Vngulæ mulinæ exustæ cinis salubriter inspergitur uitis
ueretrorum.

Carbunculos de uertris exterminat muricum, uel purpurarum in carbonibus ustarum
cinis cum melle permixtus. idem præstant singulari efficacia salfamenta discocta, & cum melle permixta
tritaque adposita.

Permixto alumine, & myrrâ, fel bubulum ad crassitudinem mellis subactum, &
inlitum, ea quæ uertris serpunt, mira celeritate persanat. supra etiam beta uino cocta rectè imponitur.

Cocleis, quæ nudæ inueniuntur, adiicitur aliquid triti turis, & albi ouorum, atque inde ulcera testiculorū
tumentia, & hydrocelæ puerorum, siue ramices superliniuntur, ut modo glutinis adhærescat; pueri uerò
continentur in lectulo, donec omnis turpitudine reprimatur.

Cyclaminis succum melle lycio æquali-
ter miscebis, & inde pendentes testiculos inlines, optimum fertur esse medicamen.

Vt eunuchum,
sine ferro facias, radices cicutæ ex aceto teres, & inde testiculos spississime inlines. tum linteolum supra li-
gabis, ne excidat medicamen. hoc quantum tenerioribus infantibus feceris, euentu efficaciore proueniet.

Herba est, quæ græce nymphæa, latine claua herculis, gallice baditis appellatur; eius radix contunditur, &
ex aceto edenda datur puero per continuos X. dies, mirandum in modum fiet eunuchus.

Mulierem
quam tu habueris, ut nunquam alius mire possit facies hoc. lacertæ uiridis uiuæ sinistra manu caudam cir-
cūdabis, eamque uiuam dimittes. candam, donec immoriatur, eadem palmā clausam tenebis, & mulierem ue-
renda que eius dum cum ea cois, tange.

Si quem ad usum uenerium infirmum uolueris esse, ubicūque
minxerit, supra lotium eius obicem, id est axedonem ex usu figes.

Vt rebus uenerijs aptus sis, piper-
tritum cum oleo, & melle misce, & cum coire uoles, uerenda tibi inline.

Nocere posse feminis dicitur,
si quis membranā oui balano suo ingerat, & cum femina coeat.

Si quem coire noles fierique cu-
pies in usu uenerio tardio rem, de lucernæ, quæ sponte extinguetur, fungos adhuc uiuētes, in potione eius
extingue, bibendamque in scio trade, confestim eneruabitur.

Si quem uoles per noctem cum femi-
na coire non posse, pistillum coronatum sub lecto illius pone.

Semen lactucæ tritum ex aqua potū,
uigorem coitus eneruat.

Naturæ, siue ueretro nihil remedium efficax sic. si in ueretro summo clauus
natus fuerit, habens callum purulentum, hoc modo curabitur. butyrum, farinam fabæ, & modicum mellis
miscebis, atque in modum cataplasmatidis coques, & in linteolo inlines, & sic ad locum adplicabis; mirum re-
medium experieris.

Veretra, ut auctiora uideantur, panacis radix in uino bono triduo maceratur.
cumque cocundum est, foemori inligatur, reperiata in uino reposita, iisdem uisibus referuatur.

Vt semper sis paratus in uenerem, porri semen tritum, & rutæ semen tritum æquis portionibus misce
cum

cum lacte caprino recenti, & ieiunus adfidue bibe.

Genuum doloribus, & crurum, ac tibiurum ulceribus, & varicibus, & callis pedum, &que clavis, & verrucis, & plantis, & pollicibus, & talis, & articulis, & pernionibus, & ruptis pedibus, & condylomati nernorum, atque articularum, & ad extrahenda, quæ casu calcata fuerint, uel quæ corpori inhaerint, remedia physica, & rationabilia diuersa, de experimentis. Cap. XXXIII.

Genuum dolori muscus ex piscina, uel lacuna, uel stagno collectus, adiecto paululo salis subactus, & impositus prodest. Hederæ nigrae baccarum hemina, ficus aphricanæ P.I. axungia — X. contusa hæc, & cum uino uetere subacta, genibus inlita, potenter dolores eorū abolet. Genua si tumbunt, uel instabilia erūt, aphronitra copiosa in passo cretico confringes, & madefacta comminues. hisque addes lanam succidam, & genibus impositam panno cōteges, & alligabis, & ne succus emanet, pelliculam lanatā superpones.

Ulcerebus crurum, & tibiurum, medetur adeps urfi cum herba rubricata tunsa, cum hæc ergo in unum corpus subacta coierint, imposita uelut emplastrum, conligantur ut diu maneant.

Ulcera tibiurum, quæ intrinsecus serpunt, felle aprugno, cum resina, & cerussa mixto, sine difficultate sanantur.

Ossa ex maxillis apri, uel suis domestici uruntur, ulceraque perniciofa crurum illo cinere asperguntur.

Fimus caprinus in aceto feruesfactus, & subactus imponitur, quo omnia talium ulcera locorum purgantur, & perfanantur, butyro bubulo cum oleo cyprino, aut laurino postmodum addito.

Varices ne nascantur, lacertæ sanguine crura puero ieiunus inlita, in totum carebit hac foeditate. Ad uarices siccandas, seu hircini P.I. saponis P.I. in unū miscebis, & linteolo iulitum medicamen adpones.

Tali aut plantæ, si tumbunt, ut sine ferro sanentur, frondem uineæ uiridem, ac teneram aqua feruenti per fundito, maceratamque conterito, & super positam conligato.

Muscus aquaticus uirens ex oleo tritus impositusque cum linteo, tumorem doloremque plantarum compescit. Limus aquaticus cū oleo subactus, & adpositus, principaliter huiusmodi tumori, ac doloribus prodest.

Fimus aprugnis in aceto decoctus, & cum melle subactus impositusque plantis, uel talis, mitigat eorum dolores. Pernionibus, & ruptis pedibus pulmo arietinus impositus, omni asperitate leuigata molestiam tollit.

Cancer marini ex oleo impositi, pernionibus utiliter profunt, ita ut foueantur aqua, in qua crum disco-

sum est. Glirium, uel soricum, uel uermium terrenorum cinis ex oleo impositus, pernionibus medetur. Godearum, quæ nudæ inueniuntur exustarum cinis, omnem exulcerationem pedum sanat.

Agninus pulmo, uel arietinus uritur, & cinis eius cum oleo imponitur, uel ipse crudus admotus, pernionū ulceribus utiliter alligatur. Fimi gallinarum, uel columbini cinis ex oleo impositus, ulcera pedum curat.

Dentes caballini tunsi, ulcera pernionum, si sint tumidi, utiliter curant. Caprini corij cinis ex oleo inlitis perniones primè abolet. testudinis tegumen concrematur, eiusque fauilla ex uino, & oleo temperata, ulceribus pedum utiliter inducitur.

Scilicet bulbi quod interius est, cum oleo deferuet, eoque oleo dolores pernionum perunchi mitescunt. Mora agrestia, dum adhuc rubent antequā ullius generis morum comederis, inter manus confrica, eorumque succo crura, quæ dolere consueuerint, per triduum continge, non modo præsentem molestiam mitigabis, uerum etiam in reliquum tempus eo uitio carebis.

Alumine ex aceto perunchi perniones sanantur. brassica quoque trita adpositaque pernionibus medetur. Folium, costum, alumen liquidum, alumen scissum, pari pondere in unum cō-

tere, & uino ueteri mixta, ulceribus, siue rupturis hiantibus interdigijs adfidue impone, potenter medebere. Interdigijs sanat cera in oleo cyprino remissa, & imposita.

Pulmo ceruinus impositus, & sæpe renouatus ex calciamento laesos pedes, sine dolore perfanat. Leporinus quoque pulmo multo efficacius, ut supra impositus, curat.

Ad ea, quæ calcata erunt, & ea quæ corpori inhaerint extrahenda, leporis coagulum cum malua tritum impositumque potenter opitulabitur. Spongia, uel lana lotio madefacta adpositaque, sine dolore, quæ corpori inhaerint, eximit. si stirpis aliqua inhaerit, lacertæ per medium scissam, ei loco apponito, celeritè educetur, uel capita lacertarum contusa impositaque similiter profunt.

Si echini aculei pedibus inhaerint, aut alicui corporis parti, in lotio humano calenti pedem diu tene, facile excutientur.

Obseruabis, ut quodcumque de corpore fuerit eiectum, licito alligatum candelabro suspendas; aut uncta oleo lanula inuolutum in uentrali gestes, dolorem non patieris.

Mus degluptus, & per medium exsectus appositusque, omnis loci de quo fuerit aliquid educum. Mus degluptus, & per medium exsectus appositusque, om-

nia quæ inhaerint corpori, facile producit. Crustæ, uel ossa sepiarum comburuntur, cinisque earum impositus, educit, quæcumque corpori inhaerint.

Allium elixum cum pice impositum, arundines extrahit corpori adfixas. Filicis radix trita, arundinem extrahit, rursum arundinis radix tunsa impositaque, filicem, quæ corpori inhaerit, celeritè extrahit.

Aquifolij radix contrita impositaque, his quæ corpori adhæserint, potenter medetur. Blattæ, id est bestiolæ, adstrictis tumentibusque de iniuria pedibus, & talis, tritæ atque impositæ, omnia quæ inhaerint corpori, potenter expellunt.

Radix filuestris cucumeris cum farina lini seminis imposita, ualde prodest eiiciendis his, quæ corpori inhaerint. Vitis radix cum sale trita, atque adposita producit quæcumque hæserint, aut calcata fuerint.

Cuiuscunque animalis coagulum, maxime leporis, cum pari pondere turis, uel uisci impositum, permanere in corpore, quæ calcata sunt, non finit.

Argimonia herbam teres, & loco, cui aliquid hæserit, superpositam conligabis, confestim proderit. hoc expertum esse, legi. Terræ malum cum melle teres,

& impones ad omnia quaecunque calcata extrahi uolueris, hoc satis utile experieris. Nepeta contrita, uel rubi folia, nam idem praestant, imposita loco, cui aliquid inhaerent, potenter medentur, si desuper ex hordeacea farina massula nimis salsa, & calens adponatur. Lardum coctum cum pingui suo, adpositumque, potenter omnia expellit, quae corpori inhaerint, si illic alligetur. Clauis pedum callisque, & uerrucis haec remedia utilia sunt. Nam plerisque nomine clauellorum, perniciēs articulis increfcent, quae obdurata, callo quodam rigescit, incredibilesque exhibet ambulandi difficultates. haec molestia prout hac medela extirpatur. auro feruenti circuitus eorum urendo designatur. quod potius est, cum dolore maximo, ad momentum ferre, quam inueterato etiam carcinomatis morbo noxam perpetue debilitatis incurrere. Vrina muli, uel mulz, uel asini cum suo luto inlita, & clauos abolet, & callis medetur. Fimus ouium impositus, uel lacertae iecur, aut sanguis in lanula adplicitus, uel ipsa lacerta exacta adposita, clauorum intra triduum perseverantiam tollit. Fimur columbinum ex aceto coctum, & in modum malagmatis subactum, atque adpositum, ad omnia supra scripta utilissimum esse constat. Fimus apri, uel suis domestici recens impositus, & post tertium diem solutus, efficaciter clauos uerrucas, & callos aufert. Si supra callum alica ex posca cocta per triduum utaris, sine difficultate sanabere; etiam si uirina canis uirginis cum suo luto imposita callos uerrucasque consumit, tamdiu tamen inalligata, quamdiu eas excutiat. Tribus fabae granis clauum tangito, eaque in stercore defodito, ne renasci possint, quanto maturius computruerint, tanto celerius clauos sponte decidere miraberis. Clauos qui in articulis supererescunt, dolores exhibere consueuerunt, incidi, uel radi ad uiuum oportet, prout quis pati potuerit, atque de lupinis crudis prius decoctis farinam factam subigere cum melle, & emplastrum more superponere. Subraso clauo calcem uiuam uisco subactam impone, & linteolum superalliga, cito medebere. Auri pigmentum tritum, & resinam terebinthinam liquefacta, ad similitudinem ceroti impone, clauellis prius derasis, mire proderit. Vrticae radix, medulla caprifici, & flos chalcitidis, pari pondere conteruntur. haec simul mixta loco clauelli superpones, & alligabis, die tertia solues. statim deciderit, uel si adhuc remanserit, iterato impone, & triduo illic medicamentum esse patieris. Cum porcus iugulabitur, is qui uerrucas habebit, sanguinem eius subiecta ea corporis parte suscipiat, dum adhuc calidus exierit, & mox ubi siccatus fuerit, statim abluat: citum remedium experietur. Mulier sane remedium de scrofa sanguine faciat. Stercus columbinum, uel solum, uel cum ouo tritum, dolentibus articulis inlatum prodest. Felle ursino perfricti articuli, dolore releuantur. Ut frigora, & pruinas facile sustineant, nec adurantur articuli, terrae malo contuso cum axungia uetere perungantur. Pampini uicium triti admixta hordeacea farina, articulorum morbis medentur. Aquifolium cum fure, & sale, & oleo subactum impositumque, medetur articulis. Incussos articulos araneorum telae cum oleo impositae, saluberrime sanant. Fracturis articulorum cinis ex femoribus pecudum factus, & cum cera mixtus, mire medetur. Inuicem potionem ad ischiadicis, & arthriticis facientem, in titulo superiore de ischiadicis plenissime scripsimus, sed quoniam, tam diuinus eius effectus est, iterum putavi, ne quis arthriticis remedia requirens huius ignoracione fallatur. Fimus ergo ibicis in silua, uel in monte colligitur, si fieri potest, luna XVI. sin res urgebit, quocunque die colligitur. sane septimadecima luna medicamentum fieri oportet, quod sic facies. Fimur eius quantum pugno pleno tolli poterit, dummodo pilulae impari numero sint, conteres ualidissime ad summam leuitatem, tum piperis grana XXV. addes, & mellis heminam, & diu teres. dehinc uini ueteris adicies 8. I I I. & conditi more miscebis potionem. sane qui accepturus est, ex die iouis diebus septem continuis accipiat, etiam si omnibus ossium compaginibus adfectus, & contractus iacebit, intra dies septem, ita sanabitur, ut nunquam paribus doloribus implicetur. Condylomatis articulorum, & neruorum, fertula campana ex passo, & cretico decocta, cumque oui duro uitello, & cum uinz passe nucleis tritis mixta, medetur, ita ut malagmatis modo imposita superligetur. Acopum ualde utile, & certum remedijs articulorum, atque neruorum, sic medullae ceruinae, adipis ueteris, butyri, seu ceruini, resinae frictae, picis cedriae, picis laguncularis, ceruae, singulorum — ternas in aere uase remittes lento igni, diuque agitabis, ut coquantur. Tum percolato medicamine, ut res ternas remittes, & permiscebis, & postea in mortario simul conteres, & sic uteris ad articulorum, & neruorum confirmationem. Argemoniam ex uino austero coques, & teres, adrosans interdum eodem uino herbam, tum fomenti modo calidam condylomatibus articulorum, uel quibuscunque alijs superpones, & ne decadat, alligabis. Serpyllum aequum cum uino austero coctum, pari diligentia articulis impones, potentius remedium experieris. Si condyloma intolerabilem dolorem faciet, medullam panis ex uino austero subigito, & imposito, cum summa efficacia proderit. Argemonia trita cum adipe permixta, summam medellam condylomatibus exhibet articulorum. Spumam argenti, & cerussam simul ex uino conteres aequis portionibus, & impones condylomatis, si uulnus fecerit, sulphuris uiui unciam adicies. Si quando non exulceratas eminentias tollere sine ferro uoluerimus, ut uerrucas, neuos, clauos, aliasque eius generis molestias, hoc medicamento utemur; calcis uiuae denarios VI. seculz coctae denarios III. nitrī usti denarios III. haec teri oportet, & lixiuo colligi de cinere caprifici facto, uel de samentis, donec leue sit, & passū fiat temperamentum. deinde adijci debet rubricae aliquid, aut atramenti, quod possit colorari; quae simul mixta, in patella sicili coqui oportet, ad mellis spissitudinem, atque ita pyxide cornea reponi. melius sane est recens hoc medicamentum; cuius usus talis est, id ipsum, quod delinatum erit sine ferro tolli, id ipso spicillo de hoc medicamine oblinetur, & cum satis niger locus, cui imponitur, & quasi perustus uiuus

uifus fuerit, tum oportebit non poni medicamentum, immo etiam abstergeri, & panem ex aqua, & rosa confectum, & tritum imponi. hoc & strumas sanat antequam suppurentur. oportet autem cum hoc medicamentum crustam fecerit in strumis, nullum aliud adhiberi. Cum uero aliqua pars talium locorum suppurerit, & rimidus fuerit, qui id patitur sectionis, tum uisco quam plurimo medicamen colligi, & congloba- ri, atque ita adponi oportebit in aluta in tantum spatium circumfecta, quantum modus ulceris fuerit. ea sane parte ponetur, qua aptum erit ulcus aperiri. hoc ego medicamento saepe diutinos dolores etiam pe- ctoris, & lateris, & lumborum sustuli, cum ad nullum aliud malagma dolor cederet. exulcerata enim parte cuiusque dolentis loci, cum humoribus postea uirium omne sublatum est. Varices curat adeps galli- naceus cum crepa trita impositus, uel perductus adfudue. Articulis luxatis seuum pecudis cuiuscunque cum cinere de capillo muliebri facto medetur. Frumenti grana I X in tegula candenti combures, & in cinerem rediges, & cymini quod duobus digitis pollice, & medicinali tenere potueris, similiter urendum in candenti tegula pones, & de terra quod tribus digitis tenere potueris, addes: nec non & laseris modicum, quod inter duos digitos teneas, adijcies, idque pariter conteres, & uino conglutinabis, & ad clauum adpo- nes, id etiam furunculis utile est. De simo pulli gallinacei, quod rubrum fuerit, colliges, & adpones cla- uellis, atque inde eos saepius lines, uehementer medebitur. Ad uarices fugandas remedium sic hederæ ra- dicem tolles, cum fuerit luna in aquario, & circunda eas, citò medebere. hederæ baccas tres, quæ per parietem repit, pedi in quo sunt uarices, alligato, uel radicem eius circundato. Rapa ex aqua salsa decoques, & superpones pernionibus iam erumpentibus, medellam utilem experieris. Spinam ex pede, uel qua- cunque corporis parte, si altius adacta fuerit, sine dolore extrahes, cum arundinis radicem adposueris, in mor- tario lapideo cotusam, & adiecto melle subactam, donec ad crassitudinem ceroti redigatur, & linteo spisso inlita adponatur, in quo frequenter spina ipsa eiecta inuenitur. Marrubium contritum admixto sale modico impositum, æque proficere constat ad extrahenda ea quæ corpori inhaerent. Herbam urti- cam, siue uiridem, siue siccam contritam, adiecto quolibet coagulo adpones, cuilibet inhaerit, confestim miraberis celeritatem medellæ. Stercus aprugnum ex uino subactum, & emplastri more impositum, quidquid inhaerit corpori, celeriter extrahit, & sanat. Butyro, & medulla ceruina, & felle taurino cum oleo cyprino, aut laurino perfricta genua sanantur. Talorum tumoribus, & doloribus, musculus ma- rianus tritus ex oleo uetere, impositus medetur. Malandrie, & frigore adustis pedibus prodest cuiusli- bet pecudis seuum cum alumine tritum, uel excoctum, & ceroti modo impositum. Attritu calciamen- torum factos clauos, emendat ueteris soleæ exustæ cinis cum oleo impositus. Vlceribus omnibus pedum in qualibet parte, adeps ursina addito alumine medetur. Ei qui patitur uarices, seui hircini se- libram, & adipis de capone libram, simul permisce, & in linteo die iouis ceroti more adpone, potenter subuenies. Stercus aprugnum tunsum cribratumque, & cum melle deteriore coctum, & subactum, ar- ticulis impositum medetur. Ranas contritas, aut uentres earum scissos pro malagmate articulis im- punito, efficaciter quoscunque dolores eorum sedabis. Vitulinum simum recentem articulis laboranti- bus inlines, statim subuenies. Ad uerrucas, & clauellos pedum, remedium efficax sic. raporum semen quantum tribus digitis adprehendi potest, adiecto lasere contritum, & impositum, atque inligatum, clauel- lum etiam morticinum excutit, & per sanat. Sardas, uel falsamentum sine osse exustum, & confrictum adpone uaricibus, statim prodest. Verrucas minores congestas, quas græci myrmecidas uocant, ut ab- stergeas hoc facito, nocte cum uideris stellam quasi præcipitem, se ad aliam partem transferentem, eodem momento locum, in quo uerrucæ erunt, quacunque re uolueris, deterge, protinus omnes excident, quod si manu tua nuda id feceris, continuo ad eam transibunt. Ad uarices, qui suffunduntur, & claudi non possunt, lanuginem de papyro adpone, continuo clauduntur, id est illam lanuginem, quæ uiridi papyro in summitate est, quasi paniculæ eminentis. Lapillum quemlibet inuolutum hederæ folio ad uerrucam admo- ueto, ita ut eam tangat lapillus, atque ita celebri loco abijcito, ut ab aliquo inuentus colligatur, miro modo ad illum qui collegerit, uerrucæ transferuntur; & ideo quot fuerint uerrucæ, tot lapillis tangi de- bent. Vrticam nouellam cum aceto acri tere, aut exustam lomenti more adpone uaricibus. Ad pollicem contusum nucem iuglandem cute interiore mundabis, & cribrabis, & cum modico mellis adpo- nes, continuo sanabis. Clauellis, & callis qui in pedibus molesti sunt, sanguis lacertæ uiridis cum flocco impositus, mirè medetur. Lumbrici terreni triti cum oleo impositi, profunt clauellis penitus eru- endis. Faba in aceto, & laser missa, & tumefacta, si clauellis alligetur, mire proderit. Salicis ramorum primorum, uel summorum cortices exuruntur, earum cinis cum aqua impositus clauellis, confestim mede- tur. Beta cum melle, & cum ficu arida contusa, atque imposita, medetur articulis. Ad spinam quæ corpori etiam si in profundo haerit, auellendam, remedium efficax sic. florem cineris, id est summitatem fauillæ colliges nitidissime, & cum axungia contusa miscebis, atque ad locum in quo spina haerit, leuiter alligabis. statim aut spinam ipsam extrahit, aut ita ad summitatem cutis educet, ut facile possit auelli.

Neruorum uitiis, ac doloribus omnibus, & arthritidi, ac paralyfi, & doloribus medullarum,
remedia physica, & rationalia diuersa, de experientia
mentis. Cap. XXXV.

Nervis, & arthritidi adeps uulturina cum felle eiusdem, & cum axungia uetere, ac melle malagmatis more adposita medetur. Nervorum nodis capitis uiperini exusti cinis cum oleo cyprino adpositus, plurimum prodest.

Tremulis, & quibus nervi infirmi sunt, utile est holera cum aqua tantummodo decocta cum pane tritu-
ducare, & oleo castorino in balneo adfidue perungi. Ranam rubetam & adipis urinae — III. cum

olei ueteris sextarijs tribus in olla rudi ad medias decoquito, deinde colato. hæc unctio frequenter adhibi-
ta, non solum nervos confirmat, sed & paralyfin repellit, & reprimat. Malagma etiã ad podagrã, &

arthritim, & ad omnem dolorem, & tensionem nervorũ sic ammoniacæ guttæ P.I. ceræ P.I. axungiz uete-
ris P.S. olei ueteris P.II. olei cedrini P.I. rosacei, aut irini olei P.I. croci — I. assij lapidis — I. myrræ —

I. aphronitri semunciam in patella noua liquefiat axungia, & cera cum oleo uetere soluat, postea oleũ
myrtinum, & rosaceum, & cedrinum, & ammoniacum tritum admiscetur, & runc subducitur flamma ne
effruescat medicamentum; secundum quæ adijcitur crocum tritum ex aceto, deinde myrra trita aspergi-
tur, ultimum nitrum, & assius lapis additur, & sic compositum medicamentum reponitur in pyxide.

Acopum ad perfrictionem, lassitudinem, & dolorem tensionemque nervorum, quod hyeme adhibitu non
patitur perfrigescere quamlibet partem membrorum; hoc Augusta Liuia utebatur; accipit hæc. Samu-
floris 8. I. roris marini foliorum 8. I. foenograci P.I. uini falerni congiũ, olei uenafrani P. V. præter oleũ

omnia triduo in iuno macerari oportebit, quarto die oleum admisceri, & coqui in pruna non aci medica-
mentum, donec uinum consumatur; postea percolari per linteũ duplex, oleoque adhuc calenti, ceræ pon-
ticæ P.S. adijci conuenit. reponitur medicamentum fictili, uel stagneo uase. usui est lenta manu perducũ

omnibus membris. Acopum ad nervorum causas, quod per uindemiam componitur, antequã mustũ
deferuescat sic. musti recentis congius V. & olei uenafrani P.I. in his macerantur species, quæ infra scriptæ
sunt, contusæ, & percibratæ grandioribus foraminibus cribri, id est iris illyricæ * XL. cyperi * XL.

foenograci * XL. piperis nigri * XL. xylobalami * XL. calami odorati, quo unguentarij utuntur,
* LXXX. schoeni * LXXX. saluicæ * LXXX. sertulæ campanæ * XIII. cassiæ nigre *
XXIII. cardamomi * XXI. styracis * XXVIII. costi * XXIII. myrræ minnæ * XXI.

cassie daphnitis XIII. spicæ nardi * XL. hæc cum musto, & oleo macerantur in uase stagneo, aut fi-
ctili posita per dies XXX. oportet autem uas bene clausum, & alligatum bis in die solui, & permisceri o-
mnia. deinde rursus operiri, & signari, ne vires euanescent. post XXX dies colantur macerata. de quibus

quasi oleũ purum excipitur, quod reponitur fictili uase. facit ad omne uitium, & dolorem corporis, & ner-
uorum uniuersas molestias. Acopum ad perfrictionem, & lassitudinem, & nervorum dolorem, quod

odori grauioris est. nã illud superius boni odori est. accipit hæc. ammoniaci guttæ * XV. galbani *
III. resinæ terebinthinæ * VI. ceræ * XXV. mellis P.II. olei ueteris 8. I. ægypti — I. medullæ cer-
uinæ — I. opopanacis * VI. quidam hoc non adijciunt. cerã, oleum, & terebinthinã liquefieri opor-
tet; deinde cætera adijci; nouissimum ammoniacum addi tritum curiosè. hoc qui perunctus fuerit, etiam a

serpente tutus erit. Acopũ quo fere semper Liuia Augusta, & Antonia usæ sunt. facit ad perfrictio-
nes, & arthritim, & nervorum omnium dolores, cuius perunctio non patitur perfrigescere artus, & refrige-
ratos calefacit. componitur hyeme hoc modo. adipis de porca sterili P.III. uel etiam anserinæ adipis idẽ

ponderis, quã aqua frigida bene lauari, atque in nouũ uasculũ conijci oportet; cui adijci debent, uini uete-
ris odorati 8. III. & species infra scriptæ non nimis contusæ. ponderis huius: xylocinnami — I. cardamo-
mi — I. cyperi — I. schoeni — III. rosæ aridæ foliorũ — I. sertulæ cãpanæ corollas X. hæc omnia infer

uestiunt super carbones, deinde refrigerata eodem caccabo reponuntur; posteroque die iterũ inferuunt
recondunturque eodem modo. tertio die rursus calefiunt, & colantur per linteũ, uel ex iunco facto de in-
dustria colo. uinũ rursus, atque adipis, quod superest in aliud nouũ uas conijcitur. deinde ubi congelauerit

se adeps, oportebit fundũ caccabi perforari, & uinũ omne emitti, atque in priorem caccabũ adipem eandẽ
conijci, & uini eiusdẽ recentis eandẽ mensuram adijci, speciesque non nimis contusas neque percibratas
has infundi, nardi syriaci — I. saluicæ — I. amomi — I. cassiæ — I. myrræ — II. cinnamĩ — II. rosæ

aridæ foliorũ — II. deinde mane semel, & in nocte semel mixtum hoc inferuifieri debet, idem & postero
die fieri oportebit. tertia die cum feruescãta fuerint omnia, percolanda erunt, & transferenda in caccabum
priorem pertusum. sed antè diligenter, & spissè foramen eius obturandum erit, atque ubi congelauerit se

adeps, extrahendum obturaculum erit, & spissamentum remouendum, ut uinum omne effluere possit.
quod cum defluerit, adeps, uel medicamentum quod resederit uase stagneo uno, uel pluribus diligenter
opertis, & adplumbatis reponetur. harum compositionum si qua fides est, & ipse ego utilia remedia sem-

per expertus sum, & alios idem sensisse confirmo. nam & illud adijcio, nequaquam huic acopo comparari
posse alia medicamina, quæ in similibus causis plerique amicorum meorum, quibus æque, ac mihi credo,
egregia se expertos cum iureiurando adfirmauerunt. Illud autem meminisse oportet medicaminum peri-

tos, uel studiosos, nonnunquam eadem medicamina in iisdem uitijs corporis, uel similibus infirmitatibus
interdum melius deteriusue respondere, propter corporum inæqualitatem, aut differentiam ætatum, aut
opportunitatem temporum, uel locorum; sed adfirmo prosperos euentus si quando opus fuerit adhiberi,

has compositiones semper habituras. Chalæticum olympianum cerotarum insigne, ad nervorum dolores, & tumores; quod idem ad rhaga-
dia, & ad pustulas utile est, cõficitur sic. turis — II. mastiches — II. spumæ argenti — II. cerussæ — II.

molybdene — II. olei rosei P.I. ceræ albæ — III. adipis anserinæ — II. medullæ ceruinæ — II. succũ la-
ctucarũ quantũ sufficiat. ita ut ex supra scriptis quæ teri necesse est, cũ succo ipso bene terantur, & postea
supermittantur unguenta, id est oleum cera, & adeps anseris, & medulla ceruina. & sic confectũ medicamẽ

in pyxide stagnẽ, aut in uasculo plumbeo reponatur. similiter in contractione nervorum caro pa-
lumbina

lumbina sumpta in cibo prodest. Ad morbum articulare sic. piperis grana IX. iuniperi grana IX. foeniculi semunciam, mellis cyathum I. ex uini portione hæc cum omnia bene triueris, & permiscueris, in folio balnei calido bibenda dabis.

Confectio medicaminis, quod facit ad omnes dolores, & ad omnes tumores, nemorum, & membrorum omnium, uel conlisiones, siue feruore, siue frigore fuerint excitatæ. præcipue autem facit ad faucium tumorem, & dolorem qui græcè dicitur paristhmia, conficitur sic. seu taurini, sed ueri P. unum seu ueruecini recentis — III. seu hircini recentis — V. I. porcine axungie recentis P. I. ceræ nitide P. I. refinæ nitide P. I. seu uel adipem uniuscuiusque generis purgatâ, & tunc tam ad supra scriptum pondus adpendes, & sic in caccabum mittes, tunc adijcies cerâ, & resinâ; quæ cū fuerint simul lento igne liquefactæ, colabis ea, & in uas, quod uolueris, defundes, atque uteris cū opus fuerit. Ad dolorem medullarum remedium sic. olei cyprini P. II. medullæ ceruinæ — V. I. butyri uaccini — III. seu taurini — III. adipis anserini — III. ceræ ponticæ — VI. bdellæ — III. œsypi — III. de his omnibus speciebus tuncis excoctis purgatis unum corpus facies, & pro ceroto uteris.

Ad paralyfin, & neruorum dolores, herbam urceolarem madidam in pultariū nouū mittes, & ad prunas, donec se remittat, excoques. tunc in mortarium conijcies, & adiecto lomento, & aceto quantum satis sit, diutissime conteres, & pro malagmate locis dolentibus adpones.

Herba britannice uiridis cū radicibus suis cōtusa, & expressa, atque ex uini cyathis duobus uel tribus potui sumpta, neruorū quibuslibet doloribus potēter medetur, quantum experientia docuerunt.

Herba uettonica trita, & imposita, neruos etiā præcisos cōiungit, & glutinat. Myrti folia uiridia admixto modico sale, & aceto contusa, neruorū poplitumque doloribus profiunt, si his adidue perficiuntur.

De tribus cumulis terre, quos talpæ faciunt, ter sinistra manu, quod adprehenderis, tolles, hoc est nouæ pugnos plenos, & aceto addito temperabis, & subiges, atque eo malagmate, cū opus fuerit, efficaciter uteris.

Medulla de spina hyenæ admixto fellē eius, & oleo uetere ad temperiē, & lenitudinem acopi decocta, neruorū uitia omnia doloresque, auctore Democrito, per sanat.

Stercus capri num cū aceto coctū, & subactū, atque ad crassitudinem mellis impositū, articuloꝝ contractiones relaxat, & tremulis prodest.

In locis humidis, & sordidis sub lapidibus inueniuntur bestiole multipedes, quæ contactæ contrahuntur, & rotundantur; ex his X. XI. contritæ cū optimo melle, & ex aqua potui per fistulam datæ paralyticis medentur. ideo autem per fistulā potandæ sunt, ne dentibus noceant; quos si contrigerint nigrificant.

Vermes terrenos, aut exustos, aut siccatos, contere cum axungia uetere, & adijce herbā fenecionē, & cacumina buxi tenera, & tus masculum, contraque hæc simul permisce, & emplastri more adpone neruis præcis, uel uexatis, confestim eos reparabis; quod remediū barbū etiam, & iumentis similiter prodest.

Remedium ad arthritin, & omnium membrorum, & neruorum dolores sic. ibisci P. II. herbæ fabinæ P. I. S. notiz P. III. hæc omnia mittes in uini styptici s. I. S. postea adijcies cimini — VI. axungie ueteris P. III. olei mollis s. III. tum simul omnia in olla rudi excoques, tādū ut herbæ illæ, ita molles fiant, ut digito solui possint. quæ exprimes per linteū diligenter, ut succus earū cū reliquis speciebus supra scriptis similiter expressis, omnis coletur, & emānet: postea adijcies ibi species infra scriptas tuncas, & diligenter cribratas, id est adarces — III. euforbij — III. castorei — III. piperis — III. mastiches — III. seu taurini P. I. seu capri P. I. refinæ frictæ — VII. balsami — III. opobalsami — III. uini s. VIII. œsypi ollaris — III. medullæ ceruinæ — III. refinæ terebinthinæ P. I. permixta hæc omnia tādū decoques, donec ita omne uinum excoquatur, ut uix sextarius remaneat.

postea adijcies ceræ rufæ — VI. & dum feruet, coagitabis, & sublatum de foco medicamē diutissime dum refrigeretur agitabis; & cū unum corpus eius feceris, in doliolū uitreū, aut pyxidem stagnēā recondes; & cū opus fuerit, parum medicaminis loco, qui curandus erit, impones; sed diu perfricabis, ac postea linteo inuolues, ne indumenta inquinentur, quod remediū post balneū, neruis relaxatis conuenientius fiet. sed cui medendū erit liquami ne, & porcina abstinere debet.

Decamyri calefactorij confectio, ad neruos confirmandos, & recreandos, post iniuriā frigoris, aut aliquā uexationē sic. euforbij — I. pyrethri — I. myrtæ — I. amomi — I. folij — I. piperis — I. styrachis — VIII. ceræ — VIII. nardi scrupulos octo, opobalsami — VIII. de his omnibus tuncis cribratis remissis que facies unam confectionem, quam in pyxidem ligneam, aut corneam recondes; & cū opus fuerit, uteris.

Item ad eadem acopum de speciebus nouem facies sic. mastiches — VI. styrachis — VI. nardi & dictamni tantundem, olei uiridis — XX. olei phyllini — XX. olei myrtini — X. ceræ — IX. opobalsami — VI. hæc similiter ut supra scripta conficies, & recondes, & similiter lenta, & calida manu perfricans, ad placandos, ac reparandos neruos, uteris.

Stirpes brassicæ cum radicibus suis comburito, earumque cinerem aceto conspargito, & adiecta uetere axungia subigito, id malagma impositum, neruos ualentissime solidat.

Quercini ligni combusti cinerem qui uino, & oleo diluerit, doloresque neruorum ea unctiōe perficiet, summa celeritate sanabitur.

Stercus capri num melle mixtum impositumque, suppuratos neruos expurgabit, & ad sanitatem usque perducit.

Si in cubitis, aut articulis, aut quacumque corporis parte neruorum contractio dolores exhibebit, lumbicos tres terrenos cum melle tritos malagmatis modo impone, omnem dolorem mollito rigore sedabis.

Pannum muliebre id est, menstruale oleo madefactum excoque: deinde exprime, & ceram illi oleo sufficientem addes, ut cerotum facias, quo arthriticum, uel paralyticum utiliter perunges.

Confectio acopi ad reficiendos confirmandosque neruos, sic. thapsiz — I. adarces — I. S. canchryos unciam I. S. euforbij — I. S. uuz syluaticæ succi — III. I. pyrethri — quatuor, refinæ terebinthinæ — V. I. ceræ rufæ — VII. I. olei cyprini — III. I. piperis uncias quatuor, sinapis — II. hæc omnia separatim tuncas, & cribrata in unum miscebis, & lento igne diutissime decoques, & semper agitabis.

deinde refrigerata in pyxidem ligneam, aut corneam recondes.

Compositio emplastri, quod appellatur smilion, facit ad omnes neruorum contractiones relaxandas, & ad quaslibet contusiones placandas, doloresque sedandos; conficitur sic. resinæ frictæ — V I. butyri exsoluti uncias V I. ceræ uncias sex, nitri in puluerem subtilissimum redacti uncias sex; quæ supra notata sunt, lento igni in caccabo fictili soluntur; quæ cum fuerint soluta, superposito carbonibus caccabo, paulatim nitrum, quod in puluerem redactum fuerit, supermittitur, & agitabitur. obseruandum sane, ne feruorem grandem ducat, aut bulliat, ac totum superfundatur, & pereat, quod si ualidius hoc medicamentum facere uolueris, supradictis speciebus admiscebis resinæ terebinthinæ uncias quatuor, galbani uncias I I I. soluendum galbanum manibus calidis, sicut solet cera molli, & in supra dictis speciebus mittendum, cum fuerint solutæ, atque permixtæ. tum demum omnia diu agitabis, ut medicamentum sicut cerotum subtilissimum fiat; quo postea uelut emplastro ad supra dictas causas potenter uteris.

Compositio dia piffelæ ad neruos rigentes, & offensos placandos, & ad uiscera mollienda, conficitur sic. picis liquidæ pondo I I. ceræ pondo I. pulueris fœnigræci uncias tres, pulueris cymini uncias tres, bacæ lauri pulueris uncias tres, salis sicci triti uncias tres. pix liquida remittetur, & colabitur, addita deinde cera, lento igne soluetur. sic omnia, quæ pulueris sunt mixta mittentur, & coagitabuntur, & coquentur. quo medicamine refrigerato uti cōueniet pro malagmate, uel emplastro, ad ea quæ supra scripta sunt.

Ad podagram calidam, & frigidam, & chiragram, remedia physica, & rationabilia diuersa, de experimentis.

Cap. XXXVI.

Podagram lenit cœsypum cum lacte mulieris, & cum cerussa adpositum. fimus quoque bubulus recens calidus; & pulmones pecudis calidi recentes; & fel arietis cum seuo suo; & fimus gallinarum recens adpositus plurimum iuuat; necnon, & coctæ aphricanæ cum sua carne combustæ, cinisque earum ex uino inlitus medetur.

Cerotum aduersum pedum dolores hoc modo facies. olei pondo I I. medullæ ceruinæ uncias sex, resinæ frictæ uncias sex, butyri unciam unam; hæc pariter in caccabo soluntur, & colantur: postea adicies lini seminis heminam, fœnigræci heminam, quæ ita pariter concoques, ut spissum sit. deinde colabis, & de ipso colato, ita densum temperabis, donec emplastrum facias.

Remedium paregoricum, ad podagram sic. cupressi baccas uirides, quot uolueris, decoque ex aqua marina, donec molles fiant: deinde contunde in pila, & subinde aquam adsparge, & manibus subige, ut itaquam malagma sit; inde inter initia doloris impone, statim mitigabitur dolor.

Malagma efficacissimum ad podagram sic. carnis agninx P. V I. caprinæ P. V I. bubulæ masculinx pondo sex, picis liquidæ P. V. uel etiam V I. nitri P. V I I I. baccarum iuniperi pondo sex, ceræ P. decem; hæc omnia concerpe, contunde, coque, & cum liquidum fuerit medicamen, adijce cæpam, & subinde permisce; & deinde galbanum mitte, quantum æstimaueris sufficere posse, & subinde agita. quæ cum bene liquefacta, & commixta fuerint, adijces sulphur, & nitrum, & baccas lauri contusas; deinde cum bene permixtum, & concorporatum uideris medicamen, ab igne remouebis, & mittes in pilam ligneam, atque illic tamdiu battues, donec sit subactissimum; & cum ex eo malagma facere uolueris, oleo manus perunges, & ita inductum linteum denso, uel phoenicio pedibus adpones.

Malagma siue acopum ad podagram efficacissimum, quod mense Augusto fieri debet; resinæ frictæ pondo tria, ceræ P. V I. olei ueteris P. octo galbani uncias quatuor, opij uncias quatuor, opopanax uncias quatuor, zruginis uncias sex, guttæ ammoniacæ uncias quatuor, adipis leoninx uncias quatuor, adipis leopardinx uncias quatuor, adipis taxoninx uncias I I I. adipis ansetinx uncias tres, seui taurini P. I. radices maluæ cirtacæ uncias I I I. radices cicutæ uncias quatuor, radices ibisci uncias quatuor, radices cucumeris agrestis, quem ficyon agrion dicunt, uncias quatuor, radices cucurbitæ domesticæ uncias quatuor. infundes radices omnes supra scriptas in aquam luna duodecima, excoques luna quindecima, ita ut ad tertias excoquas, & de excoctis succi expressi pondo duo, uel duos sextarios facies. opopanax, & opium infundes in uinum, guttam uero ammoniacam, & galbanum tundes, & deinde simul omnia permixta, lento igne decoques, ac facies quasi cerotum, & uteris hoc modo, ut inlinas linteum delicatissimum, quod sine ruga amplectatur pedem. deinde fasciola leuiter inuolues, ad hoc tantum, ne cum pedes in lecto moueris linteolum replicetur, & medicamen inlitum decidat. nam si arctius strinxeris nerui offenduntur. hoc ergo medicamen, & in accentu placat dolores, & in declinatione confirmat sanitatem.

Herba uerbasci, quæ minoribus folijs est summitates tenere, ac folia trita imposita, intra paucas horas adeo sedabunt podagræ molestiam, ut qui usus fuerit, etiam ambulare possit.

Incipientem podagram discutiet betarum exustarum cinis leuissimus admixto sanguine bubulo subactus, & impositus.

Veronica cum aqua ad tertias decocta, ac potui data, ipsaque cum decoxerit trita, atque adposita, podagræ plurimum medetur.

Herba fenecio, quæ in tegulis nascitur, cum sale trita, uice malagmatis imposita, podagricis prodest.

Malagma potentissimum ad podagram, ad fracturas, ad tumores, ad condilomata, etiam ad renium dolorem, si illic imponatur, quod fieri oportet speciebus infra scriptis sic. asphalti pondo unum, ceræ pondo unum, resinæ colofonix pondo unum, picis brutæ pondo unum, chalcitidis pondo unum, spumæ argenti sescunciam, cerussæ sescunciam, aluminis rotundi sescunciam, aluminis scissi sescunciam, misyos sescunciam, gallæ sescunciam, opij seminis sescunciam, opopanax sescunciam, aloes sescunciam, myrræ sescunciam, turis masculini sescunciam, herbe mandragoræ — I. S. aceti quod

quod sufficiat. quæ tundenda fuerint, tundes, & cernes; quæ liquefacienda, ad ignem resolues, & colata in unum permiscebis, & leui napore ignis tenuiter decoques, & aceto paulatim consperges. deinde facies trochiscos, qui habeant singuli — binas: quos cum usuf exegerit, leui igne resolues, & sic pedibus malagmatis more impones.

Remedium præsentaneum ad podagram, & neruorum, & lateris, & renium, & lumborum dolores, & ad strumas, & ad parotidas, & paniculas sic. pumicem marinum, baccas lauri, æruginem, æquo pondere contundes, & teres cum pipere, & sale, quantum æstimâris posse sufficere, adijcies; & picis dure, & olei, & mellis aliquantum, & simul omnia usque ad spissitudinem decoques, & colata, cum oleo syriaco subiges, & pro malagmate, cum opus fuerit, uteris.

Compositio mithridatica ad podagram, & neruorum dolores, & contractiones sic. ceræ unciam unam, medullæ ceruinæ drachmam I. adipis ursinæ drachmam I. cinnami drachmam I. piperis nigri drachmam I. myrræ drachmam I. rosæ aridæ drachmam I. iris, pistæ drachmam I. adipis anserinæ drachmam I. adipis gallinacæ drachmam I. ammoniaci drachmam I. cassiæ rufæ drachmam I. turis masculi drachmam I. guttæ ammoniaci drachmam I. herbæ monoci drachmam I. rutæ filuaticæ drachmam I. peucedani drachmam I. laphronitri drach. I. croci drachmam I. turis pollinis drachmam I. staphis agriæ drach. I. castorei drach. I. nucis amaræ drach. I. quaterni drach. I. resinæ terebinthinæ drachmam I. celsi drachmam unam. quæ tundenda erunt, tundes, & cribrabis: quæ remittenda erunt, lento igne liquefacies, & colata miscebis, & emplastri more, cum opus erit, uteris.

Fomentum ad podagram sic. fabæ nigre integræ sextarium moles, & in farinam rediges cum corticibus suis, de lapide sarcophago unciam I. tundes, & cribrabis, & ex aqua tepida permiscebis, atque in pannum inductum impones pedibus, & alligabis.

Remediū ad podagrā, quo pro acopo utendū est sic. seui hircini selibrā, ceræ selibrā, picis selibrā, furis masculi uncias II. I. adipis ursinæ — III. olei ueteris uncias tres, olei irini unc. III. salis ammoniaci — III. axungie ueteris selibrā, medullæ ceruinæ — III. medullæ taurinæ — III. adipis anserinæ — III. lentis, cuius supra aquam natæ — III. aceti s. II. hæc omnia diligenter lento igne liquefacta, & colata recondes, & cum opus fuerit, uteris.

Ad podagram, & neruorum dolores, & parotidas, & mammarum duritiem, quam & mulieres, & uiri pati solent, remedium sic. picis hibericæ P. I. salis heminam, foenigræ farinæ heminam, iris — III. ceræ selibrā, picem prius coques, ut remittatur: deinde singulas res adijcies, & coques, & postmodum colabis, & tanquam malagmate, cum opus fuerit, uteris.

Potio ad podagram, & neruorum dolores, quam pridie non cœnanti per duos continuos menses ieiuno ad nucis auellanæ magnitudinem ex duobus cyathis aquæ calidæ dabis, componitur sic. petroselinæ drach. II. centaurei drach. II. marubij drach. I. scordij drach. I. tundes hæc, & cribrabis, & in puluerem tenuissimū redacta, despumato melle colliges, ut spissum sit medicamentum, & recondes.

Ad podagram, subitum, & facile remedium sic. alumen, acetum, lotium humanum uetus, æquis mensuris permisce, atque adde ceræ P. I. opij — I. lactis canini unc. I. rosæ siccæ unciam I. opium, & lac, & rosam teres in mortario, ceram uero liquefacies, & simul omnia permiscebis, atque inde pedes inlines, & folia betæ, aut lactucæ desuper alligabis.

Ad podagræ subitum dolorem, remedium sic. calcem denuo coques, & teres, adijciesque celsipum, & rosam tritam, & de permixtis pedes perungues.

Phlomi uncias tres, rumicis uncias tres, ibisci uncias tres, cyclaminis uncias tres, myrræ tunse unc. I. phlomy moles, & dices quamdiu moles, summū cœlum, ima terra, medium medicamentum. deinde simul omnia cocta colabis, & ex his pedes cum opus fuerit, perfricabis.

Ad podagram remedium de experimento sic. spermatice drachmas quatuor, lini seminis drach. quatuor, erucæ seminis drach. quatuor, schoeni drach. II. castorei drach. I. I. myrræ drach. I. I. nardi spicæ drachmas I. I. gummis ethiopicæ drachmam I. I. salis drachmam I. I. piperis longi drachmam unam, nucleorum pineorum drach. V. I. I. saturei drach. nouem, hæc omnia tinsa cribrata, & in puluerem tenuissimū redacta, tritaque, in unum permiscebis, & ex eo drachmam unam, ad diem ieiuno in potione ex uini cyatho temperata dabis.

Sambuci folia cum primum procedunt, ad libram colliges, & teres, plantaginis quoque radicem ad libram colliges, & contundes, & axungie ueteris libram purgabis, & contundes, & postea simul omnia subiges, atque inde pedes inlines, & caulis folium superpones, cōfessum præsens remedium, ad sedandam podagram experiere.

Fimum ciconiarum, sed de nido ipso dum ciconiæ pullos habent, sumes, & cum axungia uetustissima permiscebis, & conteres, atque emplastri modo pedibus adpones, efficaciter podagram sanabis.

Ad podagram, & ad omnes pedum, uel manuum, & aliorum membrorum dolores ex perfrictione releuandos, bene facit hoc remedium sic. foenogræci s. I. lini seminis s. I. ibisci contusas radices quinque; hæc ante diem infundes in aquæ s. IX. deinde post diem decoques, usque ad tertias, postea colabis, & succum omnem colliges, atque adijcies ei olei P. IX. & succi laurini, id est, de folijs, uel de baccis teneris lauri expressi s. I. deinde iteratō decoques pariter, quousque omnis succus supra scriptus consumatur, & olei tantummodo summa residat; quod iteratō colatur, & adduntur in eo oleo quod super fuerit, laricis — IX. terebinthinæ uncie IIII. balsami — II. ita ut prius, hæc in uase duplici ad ignem lentissimum resoluantur, & sic permisceantur, & diutissime coagitentur; atque in usuf supra scriptos necessarios ad perficiendū referuentur.

Ad primos podagræ impetus molliendos. Atiariz herbæ partes duas contundes, & butyri unam partem permiscebis, & conteres, atque ita pro unguento, uel emplastro uteris.

Vlmi cortex contusus diutissime, & cum aqua marina usque adeo subactus, ut malagmati similis sit, pro emplastro adpositus, sedat podagræ dolores.

Viuo lepore pes amputatus, & alligatus ad podagram, uel eius pedis partibus, quæ dolebunt, plurimum prodest.

Vituli marini, aut quod melius est hyzæ pelle facta calciamenti, si quis in quotidiano usu habuerit, efficaciter podagræ morbo carebit. Pueri impubis detonsi super pedes dolentis capilli, atque illic aliquandiu compositi, compescunt dolorem: probatum remedium est, felle caprino non manu, sed pinna pedes perunctos, confestim dolore releuari. Foeniculi farina ex hydromelite decocta, & imposita, chiragræ medetur. Podagram ut sanare difficile est, sic incipienti inter initia occurrere promptum est.

Nam inter initia eius cum dolores asperrimi sunt, si quis uena aduersa in brachio pungatur, non modo præsentem dolore releuabitur, sed etiam in posterum perpetuo liberabitur.

Vtiliter in dolore perunguntur pedes oleo, in quo diu decocta sint intestina ranarum. ranæ quoque rubetæ exustæ cinis, cum sambuci coliculis teneris tritis, & seuo hircino uetere permixto, & decocto pariterque imposito prodest. Folia cupressi contrita, cum panis mollis partibus duabus, & axungia uetere subacta, medentur doloribus podagræ.

Semen genestæ tunsum, & cum axungia subactum, doloribus geniculorum potenter adhibetur. pinna inlitis, podagricis prodest. Hedera contrita, & cum oriza, ac melle decocta, atque in unum permixta, & denuo trita, podagræ, & chiragræ, & nervorum offensionibus medetur imposita.

Vitica trita cum sanguine miluino, aut palumborum permixta, atque ex eo pedes inliti, efficaciter sanantur. Mirificum podagræ remedium, nec impendio sumptuosum, sic cupressi pilulæ duodecim, pastinacæ, quam minimæ totidem decoquantur cum turis tunsi uncis tribus, cum olei sextario, & aquæ hemina, & axungie ueteris uncis V. I. & ceræ tantundem; quæ inspissata, & conglutinata panno, inlita pedibus adponuntur.

Ad podagram cum ferore, & tumore rubicundo, quam calidam uocant, hæc faciunt primis diebus adhibita. herba urceolaris per se, & caseus mollis recens per se impositus, postea herba, cui salis pusillum admiscere oportebit. Item bene facit apium uiride per se, uel cum polenta adpositum. Nec minus utilis est portulaca, atque plantago. Spongia quoque rhodia, uel aphricana mollis ex aqua frigida adposita iuuat. lanam etiam succidam rosa, & uino infectam poni conuenit. subinde autem hæc omnia mutari oportet priusquam calefiant. Prodest, & lomentum fabæ molitæ cum suis ualguis factum, aceto ac melle dilutum, atque ita impositum; educit enim sanguinem, & dolorem leuat. Belle faciunt, & mala citrea quàm maxima quinque cocta ex aceti sextarijs tribus, donec madida fiant; quibus tritis adiicitur aluminis fissi uncia una, myrræ uncia una; atque ita malagmatis more feruenti podagræ imponuntur. Benefacit, & aloe aceto diluta, & per pinnulam pedibus inducta. opium quoque lacte muliebri dilutum, & similiter inlitum iuuat.

Mirificè hoc cataplasma podagræ cuiuslibet superpositum medetur; tollit enim triduo dolorem, lomenti more compositum sic. foeniculi seminis cyathi duo, musci de stagno cyathi duo, polentæ tenuis cyathi duo; commiscuntur hæc in unum, contusa, trita, atque molita. deinde consparguntur aqua pluuiali, & ita temperantur, ne durum sit medicamentum, ne uel sit aquatum nimis. quod impositum, protinus leuat, id est intra triduum tollit dolorem. constat autem eum qui hoc medicamine ter in mense inter denos dies usus fuerit, in nocte non laboraturum podagræ dolore. Ad frigidam podagram, quæ sine tumore est, conficitur cataplasma sic. ciceris nigri moliti sextarius coquitur ex aqua, & diligenter teritur; cui adiicitur axungie pauxillum, & dum calet medicamentum pedibus imponitur.

Foenogræci seminis, & hordei farinæ binos sextarios cribratos in unum miscebis, & decoques ex aqua, atque addes olei, quod sufficiat, ac subinde calidum cataplasma pedibus adpones. bene facit, & ibisci radix ex aqua mulla cocta, & imposita. sambucum quoque cum axungia, & brassicæ cinis cum axungia impositus plurimum iuuat. ubi autem impetus cessauerit, & in hoc, & in priore genere podagræ, calida aqua marina diu fouendi sunt pedes; uel si hæc non erit, aqua pura feruenti, sale adiecto foueantur. post hoc, malagmate uti oportet, quod ad parotidas scriptum est; tollit enim citò reliquias podagræ per sudores, & in futurum confirmat nervos, nec patitur facile uitari.

Ad utramlibet podagram remedium sic. Torpedinem uiuam nigram cum admonuerit dolor, subijci pedibus oportet in litore non sicco, sed quod adluit mare, & tamdiu premi, donec sentiat torpor per totum pedem, & tibiam usque ad genua. hoc & in præsentem tollit dolorem, & in futurum remediatur. hoc modo Anteros Cæsaris libertus supra fidem remediatus est. Malagma Narcissianum ad utramque podagram, egregium. ceræ pondo I. I. refinæ pondo V. olei ueteris pondo V. S. olei syriaci pondo I. S. aphronitri in pastillis pondo I. cardamomi puri pondo unum, iris illyricæ pondo unum, piculæ pondo unum, agarici pondo unum, fœnogræci pondo I. centaurei pondo I. apollinaris pondo I. alterci P. I. coque liquanda, quæ sunt tundenda in puluerem redacta miscebis, atque ex his pastillos facies, & in capsula repones, quibus diebus uiginti iugiter uteris.

Malagma quod & ad podagram, & ad omnem collectionem bene facit, accipit hæc. ammoniaci uncias V. galbani unc. II. picis duræ P. V. refinæ terebinthinæ P. II. olei ueteris P. I. S. axungie uetustæ P. III. ceræ P. V. sulphuris uiui pondo V. hæc omnia decoques in patella fictili, uel cacabo ampliore. sulphur tamen, & ammoniacum extra teres, & sic immiscebis cum decoquere coeperis; sed agita bis instant, ne subsident in fundo, quæ in puluerem redacta mittuntur. Confessio medicaminis, quod appellatur hygia, facit ad chiragicos, ad arthritim, ad ilij dolorem, ad uentris molestias, ad nervorum contractionem, & ad omnes dolores, qui sunt in corpore, conficitur XII. Kalend. Iul. non interest quo die, uel luna, uel malina, dummodo supra scriptus dies obseruetur, quo medicamen fiat sic. olei P. XXV. sed optimi, uel

ad podagræ morbo carebit. Pueri impubis detonsi super pedes dolentis capilli, atque illic aliquandiu compositi, compescunt dolorem: probatum remedium est, felle caprino non manu, sed pinna pedes perunctos, confestim dolore releuari. Foeniculi farina ex hydromelite decocta, & imposita, chiragræ medetur. Podagram ut sanare difficile est, sic incipienti inter initia occurrere promptum est. Nam inter initia eius cum dolores asperrimi sunt, si quis uena aduersa in brachio pungatur, non modo præsentem dolore releuabitur, sed etiam in posterum perpetuo liberabitur.

Vtiliter in dolore perunguntur pedes oleo, in quo diu decocta sint intestina ranarum. ranæ quoque rubetæ exustæ cinis, cum sambuci coliculis teneris tritis, & seuo hircino uetere permixto, & decocto pariterque imposito prodest. Folia cupressi contrita, cum panis mollis partibus duabus, & axungia uetere subacta, medentur doloribus podagræ. Semen genestæ tunsum, & cum axungia subactum, doloribus geniculorum potenter adhibetur. pinna inlitis, podagricis prodest. Hedera contrita, & cum oriza, ac melle decocta, atque in unum permixta, & denuo trita, podagræ, & chiragræ, & nervorum offensionibus medetur imposita.

Vitica trita cum sanguine miluino, aut palumborum permixta, atque ex eo pedes inliti, efficaciter sanantur. Mirificum podagræ remedium, nec impendio sumptuosum, sic cupressi pilulæ duodecim, pastinacæ, quam minimæ totidem decoquantur cum turis tunsi uncis tribus, cum olei sextario, & aquæ hemina, & axungie ueteris uncis V. I. & ceræ tantundem; quæ inspissata, & conglutinata panno, inlita pedibus adponuntur.

Ad podagram cum ferore, & tumore rubicundo, quam calidam uocant, hæc faciunt primis diebus adhibita. herba urceolaris per se, & caseus mollis recens per se impositus, postea herba, cui salis pusillum admiscere oportebit. Item bene facit apium uiride per se, uel cum polenta adpositum. Nec minus utilis est portulaca, atque plantago. Spongia quoque rhodia, uel aphricana mollis ex aqua frigida adposita iuuat. lanam etiam succidam rosa, & uino infectam poni conuenit. subinde autem hæc omnia mutari oportet priusquam calefiant. Prodest, & lomentum fabæ molitæ cum suis ualguis factum, aceto ac melle dilutum, atque ita impositum; educit enim sanguinem, & dolorem leuat. Belle faciunt, & mala citrea quàm maxima quinque cocta ex aceti sextarijs tribus, donec madida fiant; quibus tritis adiicitur aluminis fissi uncia una, myrræ uncia una; atque ita malagmatis more feruenti podagræ imponuntur. Benefacit, & aloe aceto diluta, & per pinnulam pedibus inducta. opium quoque lacte muliebri dilutum, & similiter inlitum iuuat.

Mirificè hoc cataplasma podagræ cuiuslibet superpositum medetur; tollit enim triduo dolorem, lomenti more compositum sic. foeniculi seminis cyathi duo, musci de stagno cyathi duo, polentæ tenuis cyathi duo; commiscuntur hæc in unum, contusa, trita, atque molita. deinde consparguntur aqua pluuiali, & ita temperantur, ne durum sit medicamentum, ne uel sit aquatum nimis. quod impositum, protinus leuat, id est intra triduum tollit dolorem. constat autem eum qui hoc medicamine ter in mense inter denos dies usus fuerit, in nocte non laboraturum podagræ dolore. Ad frigidam podagram, quæ sine tumore est, conficitur cataplasma sic. ciceris nigri moliti sextarius coquitur ex aqua, & diligenter teritur; cui adiicitur axungie pauxillum, & dum calet medicamentum pedibus imponitur.

ni optimi pondo XX V. quantum bonum fuerit uinum, tantum melius erit medicamentum. serpylli campestres fasciculos X. tam grandes quam manus uiri recipere potest; sed supra scripta die colligi debet serpyllum, ut statim recens cum supradictis liquoribus coquatur; quod oportet tamdiu coqui, quo usque ad olei mensuram liquor omnis ueniat. cum refriguerit, colatur diligenter; & ubi nitidum fuerit, addes resine pitynz pondo tria, opopanax libram semis, galbani libram semis, ceræ rufæ libram semis, styracis libram, opobalsami — V L. hæc omnia confundes in isto oleo: styracē sane pones in balneo, & ibi solues, atque in mortario teres, & remittes omnia in uas æreum, ibique pones ad focum species supra scriptas; quæ tam diu coquantur, quam diu soluantur bene. deinde de resina puluerem facias, & asperges medicamini, dum adhuc coquitur; quo, malagmatis loco, cum opus fuerit, uteris.

Cerotum ad chiragram, & parotidas, cerussa terenda in mortario diligentissime: deinde oleum paulatim supermittendum; & cum simul trita fuerint omnia, mittenda in caccabum, uel trullam, ut ferueant; & dum coquuntur, sine intermissione agitando. sed cum densum esse coeperit medicamen ad speciem ceroti, tum ammoniacum tritum diligenter supermittendum, coquendaque simul omnia horis sex, lento igne, ne adurantur, & sine cessatione, dum coquantur agitando; cum uideris omnia bene mixta, defunde in aquam frigidam, & manibus subige, uel perfrica, & sic repones; & cum usus exegerit, alutæ inline, & sic adpone locis necessarijs.

Remedium ad podagram, uel maxime ad arthritim sic. aceti optimi quantum uolueris; quod melius erit, si ex uino styptico fuerit; telas araneæ, quæ in cupresso inueniuntur, buxi summitates tenerrimas. hæc in olla noua coquenda sunt diutissime; ex quo aceto posca temperanda paulo acrior quam ad bibendum; ex qua posca, uel calefacta, uel frigida prout causa postulauerit, lauanda membra, hoc est arthra, uel iuncturæ, quæ dolent, & deorsum, id est cum humeros, uel cubita laueris, ad manus summas, uel ad pedes summos destringendū deducendumque medicamen. postea uero quam hac posca laueris membra, quæ lauare necesse est, adpones herbam, quæ in aqua iugis decursu nascitur, quam Latine berulam, Græce cardaminem uocant. hæc diligenter purgatur, & teneritudo eius tunditur, & ita uel tepida, uel frigida, prout salubrius est, dolenti in modū cataplasmatis adponitur, & die bis, aut ter, uel quotiens ficari coeperit, mutanda erit. quæ si ruborem fecerit, tunc magis profuisse intelligitur. adhibendum dehinc parygrum cerotum infra scriptum sic. cerussæ, spumæ argenti, ceræ punice, olei rosei, olei mollis, lachrymas ouorum. horum omnium pondera, quæ placuerit miscebis; modus enim non est definitus. cera primum in oleo molli ferueat tam diu, donec stringatur, postea puluerem supra scriptarum specierum super addes. deinde oleum roscum, uel lachrymas ouorum admiscebis, atque ita bene agitata, & mixta omnia subcoquantur igni, quod medicamen repositum, cum necesse erit in linteo inlitum, membris dolentibus adponetur.

Farinæ triticæ 8. unum, amyli uncias septem, ceræ uncias septem, olei rosacei æstate; hyeme autem olei communis 8. I. Italicum. sane ut passio ipsa, uel calidius, uel frigidius medicamentum poscit fieri, ita facias. farinam ante diem infusam in aqua 8. Italicum concoques admodum glutis. postea amyllum separatim tritum in mortario, & ceram remissam in oleo supermittes, & simul omnia diligenter teres; & cum opus fuerit, adpones in linteo podagræ cuilibet. Galbani semunciam, opopanax uncias duas, castorei uncias II. ceræ P. I. I. olei laurini uncias II. olei communis P. I. olei ueteris rancidi P. I. aphronitri candidi pilulas duodecim, medullæ ceruinæ pondo unum, butyri P. I. clauos caligares de sterculinio collectos de dextra caliga V I I I. de sinistra septem, in singulis linteolis alligato, sic in æneum mitte. deinde ita cum supra scriptis decoque, ut emplastrum densum facias, pedibus cum uolueris, adponendum. opopanax sane cum liquaueris, galbanum postea liquabis. dehinc omnia reliqua cum coxeris, colabis, & sic de permixtis omnibus emplastrum facies, miraberis remedium podagræ, quia palmare est.

Ad impetum podagræ, remedium, quod Artemisius Dianio ostendit sic. croci denarios duos, pulueris aliani id est, de lapide magnesio, qui in uenalibus difficile inuenitur, unciam unā, sed si hic non sit, pro puluere aphronitri — I. mittes, & ouorum quatuor lachrymam, non medullam. hæc trita, & mixta componuntur in modum ceroti, quo superlinuntur pedes de pinnola. Farinam de meliloto in lotio humano, & axungia uetere concoque, eamque panno inline, & mox ubi dolor auspicabitur, pedibus impone, pro certo statim eum mulcebit hoc remedium. Axungia P. tria: resinæ terebinthinæ P. I. picis liquidæ P. I. ceræ communis P. I. sulphuris uiui P. I. rutæ uiridis 3 I I I. schoeni — II. bdellæ recentis — II. cum omnia remittenda remiseris, & cætera miscueris, nouissime sulfur tunsum adicies, & omnia iuxta ignem exagitata miscebis. hæc compositio præsidio seruata quamuis acrem impetum podagræ orientis exstinguit.

Olei cyprini modium in æneum conijcies, cumque primum feruebit mittes in illud uulpem masculum uiuum, & tamdiu coques, donec corpus eius furculo facillime transforetur; tunc oleum percolabis, & adicies in id samifici, saluincæ, cyperi, cardamomi, singularū rerū selibras, euforbij — I I I. I. adarces P. I. resinæ P. III. ceræ ponticæ P. II. hoc cerotum mire podagræ lenit. Vermiculos terrestres in aceto per noctem manere curabis, ut se omni sorde purgent, manē eos siccabis, & ex his — IX. in libram axungia mittes, & diutissime conteres, ut unū corpus efficias, & pro ceroto uteris ad sedandos pedū quālibet molestos dolores. Medius lapis lacte muliebri dilutus, & pellicula lupina coligatus portatusque, & in presenti, & deinceps in futurum tempus podagræ certissime submouebit. Columbinæ pinna maxime primū nascentes uste cū urtica, atque impositæ, podagræ dolores leuant. Terrestres lumbrici ad mensuram acetabuli in mellis cotyla contriti, & impositi pedibus qui prius oleo rosaceo uncti fuerint, ac tertio die soluti, & statim rursus impositi, & confestim dolorem leniunt, & in posterum tollunt.

Vulpem ex aqua coquito, donec mollescat, & ex aqua percolata pedes assidue foueto; quo facto doloribus facile careri hoc remedio quidam frequenter experti sunt. Lenticula, quæ in aqua nascitur,

quàm tenerrima confusa, & antequam cubitum eat, ei qui dolet pedes, imposita, deinde interposito tempore sublata; & herba cuculus trita in reliquam partem noctis imposita, mirè dolores podagræ sedat.

Farina frumenti ex aceto cocta, dolorem podagræ statim sedat imposita; sed lenius medicamen erit adiecto melle non multo.

Pampini uitium triti, & impositi, tumorem pedum mirabiliter exsiccant. cinis quoque uitium cum axungia uetere subactus, & impositus, idem præstat. nec non, & ad hoc sal ammoniacus cum pari mensura picis, & ceræ coctus imponitur.

Plantago cum axungia subacta, & imposita, lenit pedum dolores. limus quoque aquaticus cum oleo subactus plurimum prodest.

Adeps urina cum seuo taurino, & cera pari pondere decoquuntur, eoque ceroto podagra contacta lenitur, nec non & radix cucumeris erratici ex aceto cocta, & podagræ imposita succurrit.

Potio, quæ si anno integro fuerit potata, podagra liberat laborantes, componitur sic. chamædryos P. I. centaurei uncias tres, aristolochiz rotundæ uncias tres, stochados uncias tres, agarici — I. cyperi seminis — III. S. aloes — III. S. hæc pondera singularum rerum tunsa, & cribrata, adpendi oportet, & mellis atticæ libras V. I. comprehendi.

Sumitur autem hæc potio a ieiuno, & maxime digesto; mensura eius, est argentei scrupuli pondus. bibitur ex tribus cyathis aquæ calidæ; & si non continuati dies fuerint in accipienda potione, anni tamen spatium in dierum numero suppleatur.

Fel apri cum seuo quolibet positum, optime placat podagram in præsens. Carmen idioticum, quod lenire podagram dicitur, sic. In manus tuas exspues antequam a lecto terram manè contingas, & a summis talis, & plantis, usque ad summos digitos, manus duces, & dices. fuge fuge podagra, & omnis neruorū dolor de pedibus meis, & omnibus membris meis, aut si alij præcantas, dices illius, quem peperit illa, uenenū ueneno iungitur, salua ieiuna uinci non potest. ter dices hæc, & ad singulas plantas tuas, uel illius cui medebere spues.

Remedium ad podagrā sic. lanæ succidæ nō lotæ P. I. uini ueteris, uel aminie 8. II. olei omphacini 8. I. aphronitri cōmunis P. I. lanā infundes in uinū per tridū, dehinc exprimes lanā uehementer, & admiscebis uino, quod expresseris aphronitrū tritū, pedes, & oleum, & sic miscebis omnia, & in uas uitreum mittes, & seruabis.

Cum autem opus fuerit medicamen, panem infundes in uinum uetus, uel aminieū; qui cum bene mollitus fuerit, exprimendus erit, & terendus in mortario ac dum teritur, supermittendum medicamentū, quod in ampulla est, ita ut ad densitatem cataplasmati redigatur; addenda, & olei rosei coctæria duo. sic inducendum medicamentum in linteum, & ad ponendum locis dolentibus. superposito uero linteo, salubre esse auctor remedij huius adfirmat, si uel ipsa lana, quæ expressa est, uel alia succida supra cataplasma hoc ponatur, & leuiter obligetur.

Confectio emplastri, quod rex Ptolemæus inuenisse dicitur, accipit hæc; seui taurini remissi colatique, atque in pastillos coacti P. V. resinæ frixæ P. V. medullæ ceruinæ — V. I. succi mentæ — I. I. succi mentastri — I. I. succi forniculi — I. I. succi marrubij — I. I. succi hyoscyami — I. I. succi plantaginis maioris — I. I. succi lapathi — I. I. specularis cocti, & quàm minutissime triti P. I. quibus in ordine præparatis, seuum, & medulla lento igni in uasculo æneo remittentur: tum resina comminuta, atque trita sensim in seuum supermittetur, ut simul liquefacta permiscere se possint: deinde in mortarium marmoreum diligenter colata mutabuntur; quæ adhuc tepentia diligentissime conterentur: quæ cum densari ceperint, dum adhuc calida erunt, ita ut calor sustineri manibus possit, succos supra scriptarum herbarum superfundes, & iterum diligentissime teres; & priusquā penitus definat calor, præparatum de speculari puluerem mittes:

Itaque omnia simul mixta, & diutissime trita, atque ad summam leuitatem redacta, in uitreo uasculo reponentur. hoc emplastrum utile his rebus ad podagram, & neruorū dolores, contractionesque, ad luxa, uel fracta, ad pustulas omnes, ad duricies omnes, præcipue ad mammarum uitia, ad carcinomata, ad glandulas, ad uulnera omnia quolibet modo impressa, uel uetusta, uel recentia, ad lumborum, & ilij dolorem, ad scapularum dolorem, ad phthisicos, ita ut emplastrum hoc inducant, & calidam aquam multam bibant. ad dentium dolorem, ad gingiuarum carcinomata, ad capitis, & oculorum dolores, ita ut emplastrum dolentibus oculis superponatur. ad membrorū dolores contusionesque, ad omnia omnino, præcipue ad podagram, & ad neruorū offensiones placandas, res saluberrima est.

Descriptio acopi, quod diacissu dicitur, accipit hæc. baccas lauri uirides C. cupressi C. I. X. herbæ sabinz P. I. roris marini P. I. for nigrici 8. I. hæc omnia diligentissime tunsa, atque trita, infundes in aquæ pluuialis 8. I. I. I. & olei P. I. X. atque illic triduo commaceranda esse patieris: tum lento, ne adurantur, igni, tam diu coquantur, quousque mensura aquæ, quæ missa fuerit, excoquatur; tum omnia colabuntur, atque his adijcientur hedere communis siccæ — I. I. I. I. diligenter tunsa cribratæque; nec non, & resinæ assiosæ P. III. ceræ pondo II. permixtis omnibus, atque igne liquefactis medicamentum paratum in uitreo doliolo reponetur; ex quo, si quæ doluerint corporis partes, perunget, & confricet, sanitati citò restituentur; mulieribus etiam cum cessauerint tempora, si aut ad lumbos, aut ad imum uentrem ponatur, menstrua statim prouocabuntur; necnon, & calculos mouet, si ex eo ilium, aut uenter imus fricetur; podagræ quoque prodest, si uel mane, uel nocte pedes ex hoc medicamine perfricentur.

Descriptio ceroti, siue emplastri podagræ, & articulis, & neruis, & multis rebus infra scriptis satis utilis, sic. seui taurini P. III. resinæ frixæ P. I. I. specularis exusti P. I. I. ceræ ponticæ P. I. I. olei mollis P. I. S. succi marrubij — I. I. succi plantaginis — I. I. succi uerbenæ — I. I. succi mentæ — I. I. succi symphoniacæ uncias duas, succi phlomi — I. I. quæ herba longa, & lata & mollia, & lanosa folia habet, & thyrsus longum lanosum facit; quæ græce dicitur hermu rados. seuum, uel cera, uel resina separatim lentissimo igne soluantur colanturque, & in caccabo postea cum supra scriptis

pris speciebus miscentur; deinde simul decoquuntur; postea additur oleum, & iterum modicum fernorem ducit. deinde remoto ab igni caccabo, mittitur pulvis specularis exusti, & diutissime agitur. Tum medicamen adhuc pseudo calidum diffunditur in mortarium, & illic diutissime manibus subigitur. atque inde in pyxide, aut in doliolo vitreo reponitur, quod medicamentum ad omnes collectiones, & glandulas & parotidas, & strumas, & ad omnes tumores, & ad omnes pustulas, & ad omnia vulnera sananda potentissimum est; nec non, & ad stomachi, & viscerum vitia, & ad lateris, & renium, & lumborum, & coxarum dolores efficacissimum est. Nervis quoque placandis, & luxaturis, & fracturis solidandis utilissimum est.



Vod natum Phœbus docuit, quod Chiron Achillem,

Quod didicere olim Podalirius, atque Machaon.

A genitore suo, qui quondam uersus in anguem,

Templa Palatinæ subiit sublimia Romæ.

Quod Couis docuit senior, quodque Abdera suavit.

Quod logos, aut methodos simplexque empirica pangit,

Hoc liber iste tenet, diuerso e dogmate sumptum.

Namque salutiferas disponit pagina curas.

Istic repperies per nomina, perque medelas,

Descriptas species, & pondera mensurarum

Congrua, quæ sapiens sumes moderamine certo.

Ne fallare uide, neu quæ sunt parta salutis,

Vertat in exitium non solers cura medentis.

Sume igitur medicos, pro tempore, proque labore,

Aetatisque habitu, summa ratione paratos.

Gramine seu malis agro præstare medelam;

Carmine seu potius, namque est res certa salutis

Carmen, ab occultis tribuens miracula uerbis.

Quæ curis hominum phylicorum inuenta parant,

Quæque suis natura bonis terraque marique

Edidit illa suis alitrix simul atque creatrix

Footibus omnigenis, quos parturit; ergo salubres

Suggestit impensas ponto, & tellure creatas,

Angue, fera, pecude, & fruge, alite, murice, pisce,

Lacte, mero, pomis, lymphis, sale, melle, & oliuo,

Succis, unguinibus, radis, pice, sulfure, cera,

Polline, farre, fabis, lino, scobe, uellere, cornu,

Baccis, & balanis, lignis, carbone, fauilla,

Floribus, & varijs herbis, holere atque metallis,

Sandice, & creta, plumbyto, pumice, gypso,

Cadmia, chalciti, chalcantio, chalcō, & adusto,

Cassitero molli, lepide cypria, atque atramento.

Prome etiam, seu tunde prius seu contere gyro,

Quod uiride hortus habet, uel quod carnaria ficcum,

Allia, serpyllumque herbas, thymbramque salubrem,

Brassicaque, & raphanos, ac longis intyba fibris,

Et mentam, & sinapi, coriandrum, prototomumque

Erucam, atque apium, maluam, betamque salubrem,

Rutamque, & nasturcum, & amara absinthia misce,

Pulegiumque potens, necnon, & lene cuminum.

Palinula nec defint Idumes, nec priua Damasci.

Quæ cum multiplici contriueris orbe terendo,

In patinis excocta dabis, aut grandibus ollis:

Verum adoperta coques, ne fumida iura saporem

Corruptum reddant, quæ mox fastidiat æger.

Adde, & aromaticas species, quas mittit Eous,

Vel quæ iudaicis fragrant bene condita capsis;

Tus, costum, folium, myrram, styracem, crocomagma,

Aspalathum, gallam, elleborum, nigrumque bitumen,

Et nardum, & casias, & amoma, & cinnama rara,

Balsama, peucedanum, spicam, crocum, atque bedellam.

Irim, castoreum, scillamque, opium, panaceam,

Resinam, lepidum, euforbium, git, atque pyretum,

Zingiber, & calidum, mordax piper, & lafer algens,

psuedocaidum.

77016, sui doliola vitrea

77016, sui doliola vitrea

1071 summa, u
totius atq; ex omni
tu genere collata

De matris ad on
morbor, fci
tunc

Call melle, ne fra
quod debuit esse

medicorum delect

Remedium a plantis
uel a carmine &
tione petitur.

Carminis suis magna
occulta

Inuenta p'lysi

Nat'p' beneficia.

Atinia med' f'ora

& exempla

ordo preparand

Cari in decoque
fumus inquinat

Aromati regio

Agaricumque, asarumque potens, aloë, aconitum,
Galbana, sandaracum, samsum, plicum, alumen,
Acaciam, propolimque, & adarchen, cnicon, acanthum,
Andrachnen, acoronque, opopanax, pompholygemque,
Cyperum, iadanum, sagapenonque, & tragacanthum,
Scammoniam, cypen, malabathron, ammoniacon.
Denique repperies istuc, quod lucis in ortu,
Indus, Arabs, Seres, Persis diuesque Sabæus,
Vicini sub sole legunt, quod præbet Orontes,
Eximium ignoto mittit quod Nilus ab ortu,
Decerptum folijs, ramo, cute, cortice, uirga:
Quodque ab Idumæis uetum seplasia uendunt;
Et quidquid confert medicis salagea cataplys.
Hæc quicumque leges poteris discernere tecum,
Agnosce magis, siue exercenda rearis.
Quilque tamen nostrum hoc studium dignabere, quæso,
Prestes iudicium purum, mentemque benignam.
Sic tua perpetuo uegetentur membra uigore,
Et peragas placidam per multa decennia uitam.
Sic non incuses ualidam placitamque senectam:
Nec tibi sit medicis opus unquam, nec tibi casus,
Aut morbus pariant ullum quandoque dolorem:
Sed procul a curis, & sano corpore uiuas;
Quotque hic sunt uerius, tot agant tua tempora lanos.

Marcelli de medicamentis libri finis.

Subter ipsius epistolam colligitur
Gefnero Lorenthius

Verg. Marcellus, d. urdianensis, medicus, ipse (opini) quæ
commentariis illustrauit, & hoc syntagma, uelut
laus, maxime & prima ab Empiricis mutaturus, & e vulgo plerumque
superstitiosa, uana, ridicula, notulis & circulatoribus, uocibus & uerbis
sepe barbaris & atrox, rursus uel eadem digna; omniaque
confuse, sine ordine uelut in acervum congestæ. n. pro quo, uelut, plus uolui
tatis, an laboris perceperim, uix satis scio. hoc tamen scio, plurima magno cu
fructu legisse & didicisse. Et quidem, quod in alijs, uelut multa uisiosa corrigi,
elimari, obiter illustrari, distingi, reuocari, & uelut in tuam classem reduci; quo
facilius ad manum omnia ueniant, & quando futurus poterit; & si ita uidebitur,
supra nouis emendatione prodeant.

ic. Marcellus medicus perlegi.

Subter ipsius epistolam colligitur
Gefnero Lorenthius

SCRIBONIVS LARGVS CAIO IVLIO
CALISTO SVO S.

cuiuslibet liberasse ægrum . Quamobrem spernendi sunt, qui medicinam spoliare tentant usu medicamen-
torum, non a medicis, sed a potentia, effectuque medicamentorum ita adpellatam. Probandi autem, qui
omni modo succurrere periclitantibus student . Ego certe aliquoties magnum scientiæ consecutus sum
titulum ex usu prospere datorum medicamentorum , multosque ex eadem causa non mediocrem gloriâ
tulisse memini. Est enim hæc pars medicinæ ut maxime necessaria, ita certe antiquissima, & ob hoc primū
celebrata, atque illustrata. Siquidem uerum est, antiquos herbis, ac radicibus earum, corporis uitia curasse:
quia etiam tunc genus mortalium inter iniria non facile se ferro committebat . Quod etiam nunc plerique
faciunt, ne dicam omnes: & nisi magna compulsi necessitate, speque ipsius salutis, non patiuntur sibi
fieri, quæ sane uix sunt toleranda. Cur ergo aliqui excludant medicinam, & usum medicamentorum, non
inuenio, nisi ut detegant imprudentiam suam . Siue enim nullum experimentum eius generis remediō
habent, merito accusandi sunt, quod tam negligentes in tam necessaria parte fuerint: siue experti quidem
sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt. Qui crimine inuidentiæ flagrat, quod
malum cum omnibus animantibus inuisum esse debet, tum præcipue medicis; in quibus nisi plenus mise-
ricordiæ, & humanitatis animus est, secundum ipsius professionis uoluntatem, omnibus dijs, & hominibus
inuisi esse debent. Idcirco ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicinæ le-
gitime est obligatus; sed persequetur eos, cum res postulauerit, ut miles, & ciuis bonus omnimodo: Quia
medicina non fortuna, neque personis homines æstimat, uerum æqualiter omnibus implorantibus auxi-
lia sua succursuram se pollicetur, nullique unquam nocituram proficitur . Hippocrates conditor nostræ
professionis, initia disciplinæ ab iureiurando tradidit: in quo sanctum est, ne prægnanti quidem medica-
mentum, quo conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur a quoquam medico; longe præformans
animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nephas existimauerit, spem dubiam hominis ledere, quan-
to scelestius perfecte iam nato nocere iudicabit? Magni ergo æstimauit nomen decusque medicinæ con-
seruare, pio sanctoque animo quenque secundum ipsius propositum se gerentem. Scientia enim sanandi,
non nocendi est medicina. Quæ nisi omni parte sua plene incumbat in auxilia laborantium, non præstat
quam pollicetur hominibus misericordiam. Desinant ergo qui prodesse adficiis, aut nolunt, aut nō pos-
sunt, aliosque deterrent, negando ægris auxilia, quæ per uim medicamentorum frequenter exhibentur.
Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibus, ratione, aptoque
tempore datis, tentat prodesse languentibus. Deinde, si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum
decurrit uim. Potentiora enim hæc & efficaciora, quam cibus. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt diffi-
cultates aduersæ ualitudinis, tunc coacta, ad sectionem, uel ultimò ad unctionem devenit . At Asclepiades
maximus auctor medicinæ, negauit ægris danda medicamenta: Quidam enim hoc mendacio etiam pro ar-
gumento utuntur. Poteram tamen (si uerum id esset) dicere: Viderit Asclepiades quid senserit; forsan
non omnino in hanc partem animum intendit. Homo fuit, parum feliciter se in hoc negotio gessit. Non
deterreo persona, cum rem tam manifeste prodesse uideam. Nunc uerò cum tam impudenter communi-
cantur de eo, quid possum ultra dicere; nisi genere quodam, parricidium, ac sacrilegium eos committere, qui
hæc dicunt? Ille enim febricitantibus, uitijque præcipitibus correptis, quæ ὀφθαλμοὶ Græci dicunt, negauit
medicamenta danda, quia cibo uinoque apte interdum dato, remediari tutius eos existimauit . Cæterum
in libro qui πρὸς τὸν Πλάτωνα, id est, præparationum inscribitur, contendit, ultimæ sortis esse medicum, qui nō
ad singula quæque uitia binas ternasue compositiones, & expertas, protinus paratas habeat . Vides ergo
quàm non placeat Asclepiadi usus medicamentorum? cui nisi plura quæ ad quodque genus uitij medica-
menta composita habeat, non uidetur dignus professione medicinæ. Sed ista licentiâ, nomine tantummo-
dò medicorum, propter quorundam negligentiam, latius processit. Rarò enim aliquis prius quam se suosque
tradat medico, diligenter de eo iudicat: cum interim nemo ne imaginem quidem suam committat pingen-

SCRIBONII LARGI AD C. IUL. CAL. EPIST.

dam, nisi probato prius artifice per quædam experimenta, atque ita electo. Habent itaque omnes pondera atque mensuras exactas, ne quid erroris in rebus non necessarijs accidat: uidelicet, quia sunt quidam, qui pluris omnia, quam seiplos æstimant. Itaque sublata est studendi cuique necessitas; & non solum antiquos auctores, per quos consummatur professio, quidam ignorant, sed etiam cōminisci falsa de his audent. Vbi enim delectus non est personarum, sed eodem numero malus bonusque habetur; quod sine labore potest contingere, idemque dignitatis utilitatisque præstare uidetur posse, unusquisque id magis sequitur. Sicut quisque uolet, faciet medicinam. Quosdā enim à peruerso proposito nemo potest mouere; & sane omnibus permittit liberum arbitrium magnitudo professionis. Multos itaque animaduertimus, unius partis laudandæ scientia, medici plenum nomen cōsecutos. Hos uerò ab initio rectam uiam secuti, nihil prius totius artis perceptione, quæ homini permittitur, iudicauimus: Quia ex hac omnia commoda nos consecuturos existimabamus: non medijsfidijs, tam ducti pecuniæ, aut gloriæ cupiditate, quam ipsius artis scientia. Magnū enim, & supra hominis naturam duximus, posse aliquem tueri, & recuperare suā, & uniuscuiusque bonam ualitudinem. Itaque ut cæteris partibus disciplinæ, ita huic quoque, quæ per medicamenta uirtutem suam exhibet, curiosè institimus: eò magis quod percipiebamus indies ex usu, profectus eius: quos interdum supra fidem, atque opinionem plurimorū exhibebamus. Sed quid ultra opus est probare, necessarium usum esse medicamentorum? præcipue tibi, qui, quia percepisti utilitatem eorum, idcirco à me compositiones quasdam petijsti. Ego autem memor humanitatis tuæ candorisque animi tui, quem omnibus quidem hominibus plene, mihi autem etiam peculiariter præstas, non solum quas desiderasti, uerum etiam si quas aliās expertas in præsentī habui, in hunc librum contuli. Cupio enim medijsfidijs, qua possum, tu in me tam persequeranti beneuolentiæ respondere, adiutus omni tempore a te, præcipue uero his diebus. Vt primum enim potuisti, non es passus cessare tuæ erga me pietatis officium, tradendo scripta mea latina medicinalia, Deo nostro Cæsari: quorum potestatem tibi feceram, ut ipse prior legeres, simpliciterque indicares mihi, quid sentiret: plurimū enim iudicio tuo tribuo. Tu porro candidissimo animo, & erga me beneuolentissimo, diligentiam meam sub tanti nominis editione, non uerbis, sed re probasti: periculumque non minus tui iudicij, quam ego styli, propter me adisti, quo tempore diuinis manibus, laudando consecrasti. Fateor itaque libenter, unicas me tibi gratias agere, quod & prius quam rogareris, cōsummasti amicissimō adfectu uota mea: quod contigit mihi fauore plenissimo tuo, maturiorem percipere studij huius mei fructum, ac uoluptatem. Ignoscas autem si pauca uisæ tibi fuerint compositiones, & non ad omnia uitia scriptæ. Sumus enim (ut scis) peregrè, nec sequitur nos nisi necessarius admodum numerus libellorum. Postea tamē, si & tibi uidebitur, ad singula quæque uitia plures compositiones colligemus. Oportet enim copiam quoque earum selectam habere: Quoniam reuera quædam quibusdam magis, & non omnes omnibus conueniunt, propter differētiā scilicet corporum. Quarū initium à capite faciemus (summū enim & primum locum hoc obtinet) dantes operam, ut simplicia primò ponamus. Interdum enim hæc efficaciora sunt, quam ex pluribus composita medicamenta. Erit autem nota denarij unius pro græca drachmā; equè enim in libra X denarij octogintaquatuor apud nos, quot drachmæ apud Græcos incurrunt. Primum ergo ad quæ uitia compositiones exquisitæ, & aptæ sint, subiecimus, & numeris notauimus, quò facilius quod quæretur, inueniatur. Deinde medicamentorum, quibus compositiones constant, nomina, & pondera uitij subiuuimus.

Ex artis, deinde perceptione, omnia commoda consequi licet, non tam ducti pecuniæ, aut gloriæ cupiditate, quam ipsius artis scientia.

Scripta latina medicinalia. Deus Cæsar. Ad mania quæ corp. uitia, plures compositiones apte sunt: quia quædam quibusdam magis, & non omnes omnibus conueniunt, propter differētiā corporum.

Denarius, pro drachma Græca. Nota. X denarij octogintaquatuor apud nos, quot drachmæ apud Græcos incurrunt.

Admonitio.

Admonitio. a. pat. oblin. (p. d. paulus de. fr. m. h. m. i. a. u. l. p. r. o. p. o. s. i. t. u. m. q. u. o. m. e. n. t. i. a. p. a. g. 86.

AD CAPITIS DOLOREM.

COMPOSITIO



AD capitis dolorem, etiam in febre, primis diebus benefacit serpylli pon. quadrans, rosæ ariz. dz pon. quadrans. Hæc incoquantur duobus sextariis aceti acerrimi, donec ad dimidias perducantur. Inde sumitur cyathus, & in duobus rosæ commiscetur, frequenterque ex eo curatur caput, ubi enim concaluit, quod infusum est, nisi aliud recens adijciatur, nocet. II.

Item prodest eodem modo ruta per se, uel cum hederæ baccis decocta. Polygonium quoque, & menta multis profuit, ea ratione decocta, & infusa capiti dolenti. sphondylium, & agni semen, & platani pilulæ similiter aceto incoctæ, rosæ quæ folia residuo aceto commixta. III.

Cum autem pluribus diebus permanserit dolor, tum omnium supradictorum oportet uncias singulas sumere, iisque admiscere lauri baccarum, castorei, nucum amararum, pulegij, sampluci foliorum, singulorum uncias, & aceti sextarios tres decoquere ad dimidias. Eodẽ modo rosa admixta, non tamen frequenter, caput curare. IIII.

Ad omnem capitis dolorem efficaciter prodest, crocomagmatis pondo sextans, aluminis fissi, uel galiz P. uncia. Hæc terere ex aceto, & rosâ uicibus adiecta oportet, usquedum mellis habeat spissitudinem, inde frontem, & utraque tempora oblinere. V.

Ad capitis dolorem, cum inueterauerit, benefacit hæc compositio: Myrthæ * P. I. cypri * P. I. amygdalorum amarorum * P. II. rutæ uiridis * P. III. sphondylii * P. I. panacis * P. I. laurus baccarum * P. III. serpylli * P. II. castorei * P. I. Teruntur hæc omnia aceto, & fiunt pastilli, cum opus est, diluuntur aceto, & rosâ, in mellis spissitudinem, atque ita frons, & tempora illinuntur. VI.

Oportet uero permanente capitis dolore, materiam quoque detrahere ex eo per nares, uel os. Quæ res etiâ auriculæ, uel dentibus dolentibus prodest. Nec minus quibus subitæ uertigines obuerfantur, quos Græci dicunt. Item comitiali morbo correptos, & caligine impeditos ex magna parte leuat. VII.

Debet autem ij omnes pridie abstinere, & superioribus diebus aquam potare. Per nares ergo purgatur caput ijs rebus infusis per cornu, quod rhinenchites uocatur: Hederæ succo per se, uel betæ succo, cû exiguo flore æris, uel cyclamini succo mixto lacte, aut aqua pari mensura. VIII.

Bene detrahit e' naribus liquorem, & hæc compositio. Salis, nitri, mellis, aceti, olei ueteris, singulorum * P. binum, cyclamini succi, quam herbam pediculariam, quod pediculos necat, quidam appellant, singulorum * P. I. Hæc in unum mixta, naribus per cornu infunduntur, uel pinna longiore nares interius perficiantur. Cum satis uisum fuerit fluxisse, ut reprimatur, aqua frigida nares diutius abluere pura oportet, uel ea, in qua pridie erocum adiectum maceratum fuerit. IX.

Sed si per os magis detrahare materiam uisum fuerit, quia non sine tormento per nares ea dedutere tur, suadebimus pyrethi radiculam commanducare, atque subinde hiantem pati fluere saliuam: uel uiuam passam cum piperis albi granis totidem dabimus commanducandam, & expuendam: quæ enim, & hæc deducunt pituitam. Benefacit & sinapi ex aceto tritum, & non excastratum, gargarizatum trium cyathorum mensura, admixto mellis P. quadrante: detrahit enim largiter pituitam. X.

Prodest cum diu caput dolet, adtondere ad cutem, & radere, & diutius siccum ad relaxationem cutis fricare, & aqua calida fouere pura, uel laurum incoctam habente. Quo tempore etiam sternutamentum concitare non alienum erit medicamento, quod ex his rebus componitur: Veratri albi, castorei, struthij, quod est radix lanaria, piperis albi, singulorum * P. I. hæc confusa tenuiter forato cribro transmittuntur: cum opus fuerit, per pinnam, uel calamum scriptorium naribus sufflentur, uel specillo tincto in aquâ, & excusso, tacta naribus iniiciantur. Proritat sternutamentum etiam per se confusum, & eadem ratione iniectum ueratrum album. Nigrum, siccum, & aridum sternutationem statim inuitat. XI.

Capitis dolorem quemuis ueterem, & intolerabilem protinus tollit, & imperpetuum remediatur torpede uiua nigra, imposita eo loco, qui in dolore est, donec desinat dolor, & obstupeſcat ea pars: quod cû primum senserit, remoueatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. Plures autem parandæ sunt eius generis torpedines: quia nonnunquam uix ad duas, tresue respondet curatio, id est, torpor, quod signum est remediationis.

Ad comitalem morbum. XII.

AD comitalem morbum, quem Græci *ἐπιληψία* uocant, herbam quam iidem *παρανύκτωρ*, nos nerualem appellamus, oportet ieiunium quamplurimum uiridem comesse, a prima luna ad tricesimam. Hæc eadem herba ebrio data copiosa, in crapula uinum discutit, mentemque restituit. XIII.

Item hinnulei cerui coagulum intra nouem dies exceptum, benefacit ad morbum comitalem. Inteligitur autem dierum numerus ex eo, quod iacent aures simul eorum primis temporibus, a nono enim die subriguntur. Oportet ergo sumere tunc coagulum, & arefacere, quo neque Sol, neque Luna accedit, atque inde dare pueris uicæ magnitudinis globulum, ex aquæ caldæ cyathis duobus: maioribus uero natu fabæ solidæ magnitudine, ex aquæ caldæ cyathis tribus per dies triginta. Donentur autem aquæ puræ supra medicamentum cyathi duo, aut tres. Hoc remedium qui monstrauit, dixit ad rem pertinere, occidi

Ad cap. ad. ore,

serpylli, rosæ ariz. dz pon. quadrans. Hæc incoquantur duobus sextariis aceti acerrimi, donec ad dimidias perducantur. Inde sumitur cyathus, & in duobus rosæ commiscetur, frequenterque ex eo curatur caput, ubi enim concaluit, quod infusum est, nisi aliud recens adijciatur, nocet.

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

Ad cap. ad. ore,

hinnulum ciltro, quo gladiator iugulatus sit.

Constat inter plures, & crocodili testiculum * P. I. aut uictoriati, per dies triginta ex aqua cyathis tribus sumptum, multos remediassse.

Ad recentem comitiale morbum cito proficit, ad ueterem tardius, tymi albi * P. III. ex acci cyathis tribus, & mellis boni pondo uncia, ut dilutum ieiunus bibat per dies quadragintaquinque. Sed si biberit, citatus ambulet milia passum minime duum.

Scio Romæ quendam honestam matronam aliquot comitali morbo, liberalisse hoc medicamento: eborez scobis hemina, mellis Attici pondo libra; hæc in unum miscentur: Postea adijcitur, si puer fuerit, qui laborat, testudinis masculæ, palumbi masculi, uirorumque ferorum, id est, nuper captorum sanguis, quantum fluxerit, dum uiua utraque animalia dimittantur. Sin autem puella fuerit, foeminei generis animalia sint, & eodem modo capta, sanguine effuso emittantur. Oportet autem clauum Cyprij æris acutum demittere in iugulum testudinis, & palumbi uenas, quæ sub alis sunt, ære acuto incidere. Hoc medicamentum ligneo uase seruatum reponitur: Cum opus fuerit, datur ex eo, lunâ decrescente, per continuos dies triginta, primum cochlearia tria, deinde quinque, deinde septem, deinde nouem, summum undecim, & rursus nouem, deinde septem, deinde quinque, postea tria; & iterum augetur, minuiturque numerus cochleariorum, donec dies triginta antedicti consumantur. Postea oportebit scobis eborez heminam per duos menses consumere uitio correptum, accipientem ex ea terna cochlearia in die, ex aqua cyathis tribus. Hoc medicamento qui utitur, neque uinum, neque suillam gustet. Præterea habeat in brachio uerua ebo rea. Nam sunt, & qui sanguinem ex uena sua missum bibant; aut de caluaria defuncti terna cochlearia sumant per dies triginta.

Item ex iecinore gladiatoris iugulari particulam aliquam nouies datam consumant. Quæque eiusdem generis sunt, extra medicinæ professionem cadunt, quamuis profuisse quibusdam uisa sunt.

Illud tamen non oportet ignorare, sanari hoc uirium cum cognitum est, aliquibus, uiros facilius mulieribus remediari; pueros, uel uirgines liberari post complexum, & deuirginationem.

Collyria composita leuia.

XIX.

AD conturbationes, & epiphoras oculorum, scio multa collyria, tametsi tardè, magnos tamen effectus habere. Sed nulli collyriorum tantum tribuo, quantum lycio. Indico uero per se. Hoc enim inter initia, si quis hoc collyrio inungatur, protinus, id est, eodem die, & dolore præsentis, & futuro tumore liberabitur. Superuacuum est autem nunc laudes eius referre; in alijs enim expertus, intelliges simplicis rei uix credendos effectus.

Oportet uero minime quater, quinquiesue ex interuallo inungere, deinde cum combiberint oculi ad singulas inunctiones, eaque quæ poterint sustinere calidissima, spongijs expressis uaporare eos diutius, eodemque die in balnea ducere; ita ut cum cætero corpore, caput quoque, & facies calida immergatur, & foueatur; uinoque uti ut quisque assuetus est. Postero die, si qua uestigia epiphoræ remanserint, inungere collyrio aliquo acriore aquato sub uespere, & rursus in balneum deducere, & uinum dare eodem modo.

Fere enim uno die tollit epiphoram, & præcipue incipientem, neque adhuc alio medicamento tactam. Sed si ea uis fuerit epiphoræ, ut non cedat uno die, spectare oportebit, donec impetus sedetur, & ita in balneum deducere, cæteraque facere quæ præcepimus. Idem hoc medicamentum etiam supra perunctum, tardius quidem, sed eosdem effectus præstat, maxime in teneris corporibus, ut mulierum, & puerorum, quorum oculi, nullius medicamenti uim sustinent; triduo enim, aut plerumque quadriduo tollit dolorem, admodum qui infusione, & aquæ calidæ uapore.

Item compositorum collyriorum hoc maxime probo ad recentes epiphoras, & conturbationes oculorum, tumoresque, & dolores: Aloes Indicæ * P. III. croci * P. II. opij * P. I. gummis * P. III. plantaginis succi cyathos tres. Terere oportet per se crocū diligenter, deinde cætera admiscere, pridie macerata succi plantaginis cyatho, atque ita reliquis duobus cyathis admixtis, cum spissata fuerint, fingere collyria. Vtrunque autem genus medicamenti eximie prodesse iudico, proprietate quidem quadam, sed præcipue, quod nullam in se asperitudinem habet, ut pleraque quibus fere inunguntur homines. Nam quæ ex cadmia, aut ære usto, eiusdemque generis pigmentis componuntur, quamuis curiose terantur, naturam suam tamen amittere non possunt. Nunquam enim, ut succus diluuntur; sed cum in summam subtilitatem deduci non possunt, perseverantia tamen terentiū, corpora quasi puluerulenta necesse est maneant. Quorum uero partes uelut configunt, certe exterius pungunt foramina prima, & tuniculam oculi, atque in initijs interdum non tam molestam futuram concitant epiphoram.

Quod nomine etiam quidem Diaglaucium dicitur, probo in initijs. Nam & hoc genere quodam ex eadem materia constat, nec ullam asperitudinem habet, quando sic componitur: croci * P. V. sarcocollæ * P. X. glaucci succi * P. XX. tragacanthi * P. V. opij * P. V. Et hoc enim ego adijcio, & ita melius respondet, scilicet opium, & in hoc, & in omni collyrio, medicamentoque. Verum adijcere oportet, quod ex lacte ipso syluatici papaueris capitum fit, non ex succo foliorum eius, ut pigmentarij infutores; eius rei compendij causa faciunt. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Ante omnia, crocum aqua pluuiatili, deinde adijcitur sarcocolla, glaucium, opium, tragacanthum, prius omnia seorsum macerata non multa eius generis aqua, ut quæ primum, id est (si pos-

test fieri) eadem die fingantur collyria; solet enim diu neglectum mortario inarescere. His uti primis diebus collyrijs, non ceteris auxilijs prout res postulat, abstinendo dico sanguinis detractione, meliusque ceteris proficere adfirmo.

Cum uero pluribus quis diebus uexatus fuerit epiphora cum perseverantia tumoris, & pituita ipso colore oculorum glutinosior uisa fuerit (quod fere sexto septimoque die accidere solet) tum proderunt & ea quorum genus superius improbaui, composita ex rebus metallicis. Facilius enim iam patiuntur oculi (si modo exulcerati non fuerint) iniuriam. Quorum præcipue hoc mihi placet, quod a colore oculi dicitur. Accipit autem hæc, æris usti * P. XII. cadmiz usti * P. XII. stibij costi * P. XII. acacie chylismatis * P. VI. aloes * P. III. opij * P. II. croci * P. III. castorei uictoriati P. myrrhæ, licij, idem scilicet ponderis, commis * P. XVIII. aqua pluuiatili, quæ sunt durata, diuturnetur, donec leuissima fiant, postea cetera alio mortario singula trita admiscuntur; dum tollendum est, commi adijciuntur. Hoc quidem etiam in initijs utuntur, cum ovi aquato liquore per se uel cum collyrio, quod a cinereo colore, *αἰνέριον* appellatur.

Collyrium spodiaceum a quibusdam cinereum dicitur; componitur autem ex his, cadmiz, botrytidos usti super testam, donec incandescat, & uino falerno extinctæ * P. XL. cretæ famæ, quam uocant altera * P. LXXX. stibij costi * P. XX. opij * P. X. commis Alexandrini * P. X. Teruntur hæc omnia aqua pluuiatili, commi ultimum adijciuntur; ante hoc, cum cetera leuia sunt facta, opium miscetur maceratum pridie aqua. Facit hoc per se etiam initio, cum tenuis abundansque fuit lachryma, & pusculæ molestæ sunt, aut cum prima tunica oculi exesa est, aliaue exulcerata. Cum purum uleus est, diluitur fere ovi albore, quod est tenuissimum.

Ad sordida hulcera oculorum, crustasque habentia, quas *εἰρηπας* uocant, item carbunculos, quos *καρβυκκῆ* dicunt, facit bene, & per se mel Atticum pyxide Cyprij æris conditum, & repositum mensibus duobus, nec minus; quanto enim diutius remanet, efficacius fit.

Sed præcipue hoc collyrium, quod quidam Athenippum, quidam Diaphmyrnes, quidam *ἰνιδες* uocant, quia boni odoris est. Sed præcipue hoc, quod etiam ad pustulas, papulasque, & suppuraciones oculorum facit, & ad cicatrices non ueteres, & ad palpebrarum recentem, aut in corporibus tenuioribus asperitudinem. Oportet autem eo ad sordida hulcera diluto cum ovi albo, id est, aquatissimo uti, deinde cum lachrymæ fluere desierint, cinereo superinungere. Item ad pustulas ex ouo tritum facit. Ad papulas uero, & ad dolores cum rubore, & distentione oculi sicca, cum lacte muliebri, & ex aqua. Aut ad cicatrices recentes extenuandas, & palpebrarum asperitudinem tollendam, subiecto scilicet specillo, aut inuersa palpebra, si quis eo utatur. Componitur autem ex his; Pompholygis lotæ * P. VIII. æris usti * P. VIII. croci * P. III. myrrhæ * P. III. nardi * P. sex semis, & uictoriati, lapidis hæmatitis * P. II. & uictoriati, piperis albi grana decem, opij * P. I. aut uictoriati, commis * P. X. teritur uino Chio.

Collyrium Psittacium a colore ita dictum, facit ad epiphoras, quæ cum tenui, & acri lachryma consistunt. Item ad uestiones, & solutas cicatrices, & uastum tumorem, quæ quia a loco interdum uidetur propellere oculum, *πρόπτερον* uocant, cū ovi albo quod est tenue. Sed præcipue facit, cum quasi sanguine suffusi sunt oculi, & ob id nullum nisi tenuissimum collyrium patiuntur; recipit autem hæc, Croci * P. III. cadmiz * P. III. stibis * P. III. opij * P. II. commis * P. I. amyli, & recentis, & dulcissimi * P. III. Eodem modo, quæ scripta sunt, in mortario debent teri ex aqua pluuiatili. Amylum autem cū iam fingendum erit collyrium, adijcietur. Interdum & hoc superinungatur, qui prius Athenippo curati sunt. His fere collyrijs tenuibus omnia quæ circa oculos cum tumore, & dolore fiunt, remediatur.

Collyria acris.

XXVIIII.

Acrioribus autem ijs ad cicatrices extenuandas, & palpebras asperas, quod quia ex quatuor rebus ut quadriga equis constat, & celeres effectus habet, *ἄγρια* dicitur. Recipit autem hæc, æris usti * P. III. thuris arboris corticis * P. III. ammoniaci guttæ * P. III. commis * Pond. III. Teruntur ex aqua pluuiatili.

Hoc etiam superinfunditur, ad puerorum epiphoras, & qui non sufferunt inunctionem, facit, ut huiusmodi medicamenta, quæ *μειγνύμενα* uocant. Croci siculi pondo uncia, commis pondo uncia; hæc aqua teruntur, fiunt collyria.

Est & hoc medicamentum satis efficax, quo ita oportet palpebras perungere, ne quid intra oculum fluat. Recipit autem hæc, Croci siculi * P. III. crocomagmatis * P. XII. thuris * P. III. aluminis rotundi * P. VI. opij * P. I. myrrhæ * P. II. commis * P. III. Vino falerno teruntur; cum leuia facta sunt, & crassitudinem habent mellis spissi, adijciuntur passi cretici P. sextans, reponitur pyxide stagnæ, si passum adiectionem non erit, collyrium erit.

Benefacit & hoc medicamentum, quo Augustus usus est, & recipit hæc, Aluminis fissi * P. XL. thuris candidi * P. X. aloes * P. XV. croci * P. XV. opij * P. II. gallæ * P. X. rosæ foliorum aridorum * P. X. plantaginis succi, uel seminis * P. X. Vino falerno teruntur; cum leuia facta sunt, & spissitudinem mellis habent. Adijciuntur passi sextarius, aut hemina, aut rursus commiscetur. Reponitur uale stagnæ, uel argenteo.

Collyrium psoricum ad caliginem, & ad asperitudinem oculorum, siccamque perturbationem sine

tumore, quam *σφοδρα* appellant. Facit hoc collyrium bene, quod *ψορικον* dicitur. Habet autem hæc
Crocī * pond. XII. *ψορι* * P. XXIII. *ψιμμιθij* * P. III. opij idem, piperis albi idem, cōm
* pond. VI. aqua pluuiali commiscetur, teruntur. XXXIII

Stratitonicum collyrium ad asperitudinem, & caliginem. Recipit autem hæc, *ψιμμιθij* * P. VI.
piperis albi * P. I. omphacij * P. I. cadmiz * P. III. opobalsami * P. II. opij * P. I. cōm
* P. II. teruntur aqua pluuiali. Collyrium hoc melius superiori ad caliginem facit. XXXIII

Stacton, quod uocant, ad eadem. Fere autem mulieribus prodest. Habet hæc, cadmiz * P. XII. si
bis * P. VI. piperis albi P. II. *μυσis* usti donec puniceum fiat * P. II. *αργινis* rafe * P. I. & uictor-
riati, *αρι* floris idem, cōm * P. V. aqua pluuiali teritur. XXXV

Collyrium acre ad extenuandas cicatrices, & quamuis ueteres, caliginemque, & asperitudinem ocu-
lorum, quod semel inunctum, plurium dierum effectum præstat. Oportet autem eo aquato, uti; diu enim
tenet ammoniaci guttz P. libram, *αργινis* pon. libram, cōm P. quadrantem, pluuiali aqua teritur en-
go, postea cætera adiunguntur macerata aqua. XXXVI

Collyrium quod proprie facit ad asperitudinem palpebrarum, & callositatem. Oportet subijcere
specillum, aut inuertere palpebram, *αρι* usti * P. XXIII. *αργινis* * pond. VI. croci * P. X. myr-
rhæ * P. I. nardi spicæ * pond. I. cassiæ rufæ fistularum uictoriati pond. piperis albi grana. XLV.
cōm * pond. nouem, uino Chio teruntur. XXXVII

Medicamentum liquidum ad palpebrarum ueterissimam asperitudinem, & excrecentem carnem,
quam uocant. Item callum durissimum; Hygram appellant, quia est liquidum medicamentum, car-
nem ex palpebris tollit sine magno dolore. Recipit hæc, Myrrhæ, thuris, croci, singulorum * pond. III.
μυσis * pond. III. chalcis * P. VI. Hæc teruntur diligenter aceto acri; ubi leuia facta sunt, & ha-
bent spissitudinem passim, miscetur eis mellis atticī P. libra. Deinde in patella *αρι* cyprij super carbones po-
sita inferuescit, donec mellis habeat non nimium liquidam spissitudinem; atque ita reponitur pyxide *αρι*
Cyprij. Cum opus fuerit, inuertitur palpebra, deinde hoc medicamento suffricatur curiose ad delachryma-
tionem, id est ubi defecit mordere medicamē. Rursus inuertere oportet palpebram, atque ita pollice im-
presso mēbranas innatantes abducere, quæ facie subsecuntur. Post hæc cinereo ex aqua inungendi erunt
crassiore. Hoc inunctum, multorum annorum callos, & asperitudines palpebrarum desperatas à quibusdā
oculariorum paucis diebus tollit. XXXVIII

Hygra ad suffusiones oculorum, quas Græci *σφοδρα* dicunt, medicamentum liquidum. Foeniculi
succī * P. III. opobalsami * pond. III. mellis atticī * pond. III. olei ueteris * P. III. hyzæ felis
* pond. I. euforbij * P. I. Hoc, oleo diluitur, & ita cōmiscetur cæteris. Aquato, uti oportebit hoc me-
dicamento, est enim acerrimum, & undique humores trahit. Quamobrem non sunt inungendi, qui capitis
dolorem, aut grauitatem habent. Item ante biduum, aut triduum, ut aquam bibant, quos destinauerimus
eo ungere. Quanquam melius facient etiam si perseveranter aquam potauerint; uitio enim molestissimo
facilius inter initia carebunt. Non præterit me; habere te prudentes ocularios, quibus si nomina dixeris
collyriorum in hoc libro scriptorum, contendant forsā se quoque habere eadem composita; sed si ponde-
ra, aut effectus comparare uoles, longè diuersos inuenies. Ego enim ipse eodem nomine multa composita
non posse, & alios eadem habere; nam & ipse ab alijs accepi, sed raro. Scio quosdam ocularios simplici-
ter tradentes compositiones, meque multum elaborasse, ut ueras, & incorruptas acciperem, cōscius sum mihi.
Neque illud rursus dico, nouas & non aliquibus notas in hoc libro congesturum compositiones, uerum
etiam quasdam diuulgatas, & (ut ita dicam) publicatas. Eiusmodi enim, quia efficaces sunt, etiam pluribus
in notitiam ueniunt. XLIX

Ad aurium dolorem. *σφοδρα* XXXIX

Ad auriculæ, & tumorem, & dolorem sine ulcere prodest herbæ urceolaris, aut cucurbitæ ramento
rum succus tepens per strigilem in foramen auris dolentis infusus. Item bestiolæ multorum pedum (quæ
tactz conduplicant se in orbem pilulæ rotundissimæ similem, κατωδίου οὖν aut πολυπόδας Græci hoc
genus animalium uocant) oleo domestico complures inferuefactæ uase ferreo, benefaciunt. Prodest & gli-
ris pinguis, & gallinæ adeps, & medulla bubula, liquefactæ, tepensque infusa. XL

Sed præcipue picis flos, quod *πικρὸν* appellant, cum oleo communi mixtum, ita ut tertia pars sit
olei. Nam & dolores sedat, & fere non patitur suppurationem fieri. Et si facta fuerit, eadem res per sanat.
Ad summam, ego ipse diu uexatus ab aure, cum multis frustra usus essem medicamentis, ab hoc sum per sa-
natus, & alios complures sanauī. Florem picis autem appello, quod excipitur dum ea coquitur, lana super-
posita eius uapori. Hoc etiam grauitatem odoris protinus tollit. XLI

Item benefacit hoc medicamentum ad tumorem, & exulcerationem aurium; aceti acris sextarij duo,
incoquantur mala granata, quibus corarij utuntur, quia semper ualida sunt, nec unquam maturescunt,
quod *σφοδρα* Græci dicunt, donec madida fiant. Tunc hæc adijciuntur, & admiscuntur: Aluminis fissi uncia,
acaciæ succi pond. quadrans. Reponitur medicamentum ampulla uitrea. Cum opus est, ad tumorem qui-
dem calidum per strigilem infunditur, deinde foramen summum lana succida tegitur. Ad ulcus autem fri-
gidum, per eiusdem generis lanam, & auriscalpium inijcitur. XLII

Si caro

SI caro excreuerit in foramine auris, compescitur sine dolore aut ferro hoc pastillo: Aluminis fissi pon. triens, zruginis pon. triens, misyos usti pon. triens, rubricæ sinopidis pon. triens, comis pon. sextas. Tenentur priora ex aceto acri, donec quasi cum collyrium componitur, scilicet fiant. Vltimum comi adijcitur: & fiunt pastilli, qui ad omnia hucera faciunt, aqua diluti, cum aut compescenda sint, aut cicatricem debeant ducere. Sed a quationibus oportet uti, cum cicatrix est cludenda. Benefaciunt & ad exulceratas nares qualibet ex causa, & grauiter olentes.

Ad parotidas.

XLIII.

AD parotidas conuenit noctuæ cerebellum butyro mixtum: discutit enim fere eas sine dolore & molestia. Oportet autem aqua marina feruenti; nouis spongijs demissis, & per linteum intortum utrisque expressis uaporare parotidem, atque ita oblinere hoc medicamento, superque tegere lana sulphurata totam maxillam.

XLIII.

ITEM bene discutit parotidas iris Illyrica contusa, cocta ex passo, more farinae hordeaceæ, calda bis ter uel imposita.

XLV.

Discutit & hoc medicamentum parotidas, antequam suppurauerunt: Spumæ argentæ pon. II. cerossæ P. libra, salis ammoniaci pon. libra, eris floris pon. dodrans, aceri sextarius, olei ueteris sextarii duo & dimidium. Spumam & cerussam, salem per se & cum aceto terere oportet mortario, deinde oleo admixto traicere in cacabum amplum, ne extra fundatur, & efferuescat: efferuescit enim ualde. Cū hæc super ignem posita habuerint emplastri temperaturam mollis, deponere oportebit cacabum: cum ferue- re defierit, paulatim aspergere eris florem, & mouere spatha medicamentum, ne extra fundatur: & rur- sus coquere, donec habeat emplastri spissitudinem strichi.

Ad sanguinis eruptionem de naribus.

XLVI.

Erumpit e naribus sanguis, qui cum abundanter fluxit, nisi celerius supprimatur, periculū adfert. Proderit ergo aqua frigida uel postea subinde aspergere totam faciem, uel spōgia refrigerare, acetum acre insundere in aurem, cuius e regione sanguis fluit: aut in utranque, si ex utraque sanguis emanauerit: gypso totam faciem cum fronte, & maxime nares crasse oblinire prodest: & caput frigida aqua copio- se, superposito aliquo regumento; perfundere; uel cucurbitam occipitio adfigere. Inijcere autem in- tus nares aut nares oportebit cochleæ uiuæ carnem per se, aut cum thuris polline tritam: uel herbam quæ, quia multa est, & ubique nascitur, *nosyony* appellatur. Idem trita facit & *auripigxoy* herba eodem genere. Proderit & spongiæ particulam præfectam, apte foripe ad amplitudinem & patorem narium figuratam inijcere paulo prolius ex aceto per se. Interdum aspergenda ei galla erit, uel chalcitis curiole trita, uel utraque in unum æquis ponderibus mixta: melius enim facit.

XLVII.

ITEM bene supprimit & hoc medicamentum: Mali corticis quo coriarij utuntur, P. quadrans, aluminis ægyptij P. sextans, chalcitis P. uncia. Hoc eritum per succidam lanam aspersum medicamentum inijcere oportebit. Facit autem etiam ad omnem ex qualibet corporis parte, seu uulneris sanguinisque eruptionem: quoniam interdum ita (ut diximus) minus curati, præfoeati uidentur. Et maxime cum utraque obstrata spisse necessario sunt foramina narium, quæ spirandi facultas eripitur, non alienum est scire qua ratione utrunque præstari possit, ut neque spiratio interpelletur, neque remedium efficacissimū (quod per oppilationem narium efficitur) excludatur. Oportet ergo sumere pinnam anseris quam maxi- mam, uel calami scriptorij fistulam modicè plenam: deinde aptare ad longitudinem nasi, atque ita præci- dere utraque parte, ut perforata sit, inuolueræque ex fasciola tenui linteæ quasi inserta explorare circuitum eius, donec cum uideatur pator narium cuneatione quadam recipere posse fistulam, atque ita ut est circū- uolutam mergere aceto acri & inijcere, interdum per se, uel asperso super acetiū utro libuerit ante di- storum medicamentorum. Hoc autem remedio magis uti, cum per utrasque nares sanguis abundauit.

Ad hucera in naribus.

XLVIII.

AD hucera in naribus, plumbi stercus, quod scoriam dicunt, ex uino & murteo oleo uicibus adie- cto terere oportet, donec spissum fiat, & ita per pinnam nares obreguntur.

XLIX.

FACIT & hoc medicamentum bene: Pompholygis * P. III. cerussæ * P. XII. hyssopi * P. III. Vino salerno & rosa uicibus adiecta teritur, donec mellis habeat temperaturam.

Ad polypos.

L.

AD grauem odorem narium, & *Quæ* Græci hoc uitium uocant: zruginis pond. quadrantem, aut squamæ zris P. quadrantem, aut utranque rerum ponderis sescuncie in mellis despumati. P. libra deco- quere oportebit, & eo uti liquido per pinnam.

LI.

AD polypos, misy ustum, chalcitis usta, zris flos, ustum sori, zris squama tusa, cribrata (si eo medica- mento per pinnam sæpius nares tactæ, eiusmodi uitia attenuata, quotidie emendantur: cum sint à cere- bro paribus ponderibus, sicca benefaciunt.

LII.

SED quia plerumque uexantur nares grauedine, quæ tumore earum efficitur, non alienum est te eius quoque remedia scire. Prodest igitur quies unius diei, & ab omni re abstinentia. Perungendæ nares erunt bitumine liquido, aut myrrha tactæ, uel pice liquida. Postero die pastillus iste nocte super- cibum dandus est: & si opus fuerit, per triduum continuum eodem tempore. recipit autem hæc: Apij feminis P. trientem, anesi P. quadrantem, alterci feminis, quod *uoræmoy* dicitur P. trientem, opij P. uncia. Fiunt pastilli ponderis uictoriat: alijs parte tertia detracta dantur cum aquæ cyathis tribus. Faciunt au- tem & ad oculorum epiphoras, & stomachi nauſeam, & deiectionum, & ad omnem fluxum.

Ad dentium dolorem.

LIII.

AD dentium dolorem quamuis plurimi dicant forcipes remedium esse, multa tamen citra hanc necessitatem scio profuisse. Itaque cum etiam exesus est aliqua ex parte, tum non suadeo protinus tollendum, sed excidendum scalpro medicinali qua cauatus est, quod sine ullo fit dolore: reliqua enim solida pars eius, & speciem, & usum dentis præstabit. Sed cum dolor urgebit, uariè sedandus est, partim collutione quorundam, partim commanducatione, nonnunquam suffusione, aut impositione aliquorum. Prodest colluere os frequenter radice herbæ quinquefoliæ incoctæ in uino. Item herba urceolar, & cui pressi baccis aqua incoctis. Alterci quoque radix, aut eiusdem semen linteolo spisso illigatum, & aqua sæpius inferuëfactum, denti subinde adpositum. Item leuat æquè dolorem dentium, portulaca, commanducata ab ea parte, qua non dolebunt: ut succus traiectus contineatur pusillo diutius, & solani succus tepens benefacit gargarizatus.

LIIII.

S V F F I R E autem oportet ore aperto alterci semine carbonibus asperso, subinde os colluere aqua calida: interdum enim quasi uermiculi quidam eijciuntur. Leuat dolorè & bitumen suffitū. **LV.**

I T E M commanducare proderit herbam rhododaphnen, & saluam dolentibus traicere, ac pusillo diutius continere, & ita hiantem pati saluam decurrere. Item mentastrum, uel radicem, quæ herba, similia folia cymbalis habet, nasciturque fere in parietibus humidis. Pyrethri quoque radix commanducata, multorum leuauit dolorem. Nec minus, alumen fissum linteolo spisso circumdatum, & ita dolenti pressum, diutius continere prodest.

LVI.

Imponere ipsi uerò denti toti oportet hoc medicamentum, quasi emplastrum: Peucedani succi * pon. III. opopanacis * pon. I. thuris * pon. duum, uiaz passæ sine granis * I. Hæc per se contundi iubebis, deinde cætera seorsum trita commisceri in unum. Vbi fuerit dolor, auriscalpium lana molli inuoluitur, deinde tingitur seruentissimo oleo, atque ita denti primum, deinde proximis gingiuis superponitur bis ter uel, donec hebetescat ex aliqua parte dolor: post hoc, medicamento dens cooperitur. Si repetierit, aut permanserit nihilominus aliquis dolor, super medicamentum auriscalpium cum lana ex oleo candenti eodem modo imponere sæpius oportebit, id est, donec dolor tollatur.

LVII.

S E D si quando mouentur dentes ex perfictione, confirmandi erunt plurima gargarizatione laetis asinini, aut uini Marfici ad tertias decocti, in quo lapathi radices coniici debebunt, ut unâ decoquantur. Stringit etiam dentes alumen, quo infectores utuntur ex melle Attico, ita ut duæ partes sint mellis, tertia aluminis. Hæc misceri oportet mortario, deinde patella fictili seruefacere ut spissentur: atque ita recondere quolibet uase æreo, donec hoc medicamentum primo austerè, & nimis perstringere dentes, postea remissius uidebitur.

LVIII.

I T E M proderit moris dentibus hoc medicamentum. Aceti acerrimi sextarius unus semis, cedriæ uerz ne habeat picis aliquam mixturam hemina, aluminis fissi pond. triens. Teritur alumen cum aceto, miscetur deinde cedriæ, & unâ omnia uase æreo coquuntur, tæda pingui mota, donec in mellis spissitudinem temperati medicamentum redigatur. Hoc medicamento si quis ter in mense dentes fricuerit, dolorem eorum non experietur.

Dentificij compositiones.

LIX.

Dentificij: quod splendidos facit dentes, & confirmat: Farinæ hordeaceæ sextarium conspergere oportet aceto cum melle mixto, & subigere diutius: atque ita in globulos diuidere sex. Quibus dilatatis, admisceri salis fossitij semunciam, deinde furno coquere, donec in carbonem redigantur; tunc tere oportebit eos globulos, & admiscere spicæ nardi quod satis uidebitur.

LX.

AD dolorem faciendum hoc Octauia Augusti soror usa est: ad dentium dolorem, & confirmationem benefacit radices dulcis cortex sole arefacta, & contusa, cribrata. Item uitrum candidum, quod simile crystallo est, diligenter tritum admixta spica. Utuntur plerique etiam huiusmodi dentificio: herbæ urceolarem legunt cum iam in semine est, quam plurimam cum radice: deinde lotam uno die siccant: postmodum recentis muria dura macerant: tertio die expressam, olla noua componunt, subinde salis fossitij quæ si tabulata interponunt: atque ita percoquunt fornace balneariorum, donec in carbonem redigantur. Postea trita ad tertias, admiscunt spicæ nardi quod satis est. Hoc cum eo quod candidos facit dentes, tum etiam confirmat; Augustam constat usam. Nam Messalina dei nostri Cæsaris hoc utitur; cornorum cui uistorum in ollam nouam ad cinerem redactorum sextario uno, mastiches chiz pondo uncia, salis ammoniaci pondo sescuncia.

Ad fluorem gingiuarum.

LXI.

SOLENT gingiuæ quorundam, fluore infestari, quas pregnantas uocant. Profunt eis lentisci folia arida contusa, & cribrata perforato cribro: facit & cinis eiusdem lentisci foliorum ex aqua eiusdem decocti. Compositum autem hoc medicamentum prodest, quod & ad omnia hulcera quæ in ore sunt, utile est, ætenuè à Græcis appellatur. recipit hæc: Aluminis fissi * P. IIII. myrrhæ * P. I. croci * P. II. cypri, id est, iunci radices * P. II. gallæ * P. I. rosæ lutei floris * P. I. sandaracæ * P. III. His omnibus rebus tunis cretis, arido medicamento uti oportet per pinnam, etiam ad parodontes, & epodontes, id est, ubi extransuerso gingiua suppurauit: aut tonsillarum tumorem magnum, ut digito pressius fricentur; uel ubi super extremum molarem increuerit gingiua.

Ad cancerum in ore.

E S T & molestum interdum cum cancer os corripit; quod iniitijs neglectum, breui spatio reponis mortis

mortis causa est. Oportet ergo, cum primum uisum fuerit, antequam latius serpat, faucesque occupet, misy usto quamplurimo cum melle uti sepius: deinde colluere aqua oleastri decocti subinde, aut corticis mali granati.

Medicamentum Andronis prodest in omni parte corporis facto cancro. recipit autem hæc: Mali granati corticis * pon. X. terræ mali * pon. IX. aloes * pon. III. myrrhæ * pon. II. gallæ * P. VIII. aluminis fissi * pon. III. æris floris * pon. duum. Teruntur & cribrantur sicca curiosè: deinde admiscetur passum creticum, dum habeat spissitudinem mellis: cum opus est, uino austero sumendum medicamentum est: uitro reponitur, diluitur. Facit hoc medicamentum ad carbunculos, & ad ignem sacrum, & ad zonam, quam Græci *ἐγνῆρα* dicunt.

Ad faucium uicq; tumorem.

AD faucium uicq; tumorem stomatice hæc fere utuntur, quia nullam aspritudinem habet, & satis efficax est. Uuæ amineæ acerbæ cum primum granum incipit perducere, succi sextarios quatuor, mellis attici sextarium commisceto in unum, atque in creto uase coquito, subinde mouens, donec mellis spissitudinem habeat.

ALTERA eiusdem utor stomatice, cum diutius uexatæ partes antedictæ sunt. Aluminis fissi * pon. duum, gallæ contusæ * pond. duum, omphaci aridi * pondo I. croci * pon. I. passii cretici sextarius unus. Hoc decoquitur uasò fictili ad dimidias, & ita cætera diligenter trita admiscuntur. Vtrūque autem medicamentum stanneo reponendum est: uase.

Ad suppurationem faucium.

VBI uero suppuratio faucium suspecta est, diutius permanente earum tumore, & interdum febris non sine horrore intercurrentibus, oportebit gargarizare quidem aqua mulsa crebrius, furfuribus si lignis decocta, uel passo ad dimidias decocto bene calido, uti, ore & faucibus diutius contineatur; uel ea aqua, in qua ficus arida pinguis erit decocta: perungere autem fauces hoc medicamento, quàm tactus sustinere poterit, pusillo pressius: Mellis optimi heminam, resinæ terebinthinæ * pon. duum, rosæ cyathos duos, resinam cum rosa in duplici uase, uti solent unguentarij, liquefacere oportet: deinde admiscere ei mel, & coquere, donec spissum fiat medicamentum. Hoc etiam, cum eruperit suppuratio, uti oportet: expurgat enim & explet idem.

Ad anginam.

AD anginam prodest & sanguinis detractio, cucurbitarum admissio, cæteraque auxilia quibus medici efficacius utuntur. Medicamenta autem simplicia quidem hæc faciunt: laser cyrenaicum, si poterit inueniri: sin minus, syriacum aqua dilutum, crassius per pinnam faucibus adhibitum. Item euforbium aqua dilutum.

Compositorum autem medicamentorum hæc sunt apta: Fellis taurini, salis, aceti, mellis, olei ueteris, æquas partes in unum miscere oportet: & cum opus fuerit, pinna perficere fauces diutius.

ITEM benefacit git frictum * pond. duum, pyrethri * pond. I. sagapeni uictoriati pondus; melle miscetur hæc in unum trita.

FACIT bene & hoc medicamentum: Fellis taurini * P. II. elaterij, q est succus cucumeris syluatici * P. I. cachryos animati * P. I. tritum melle admixto reponitur. Cum opus est, dilutū aqua tepida sumetur, & fauces perunguntur; cogunturque inde plurimum deuorare. Solut enim uentrem, & ita uehementissime prodest. Item hoc medicamentum uehementissime prodest; multos enim à summo discrimine mortis liberauit: Benefacit hirundinum pullorū cineris pōdo quadrās, hyssopi P. VI. nitri P. uncia piperis P. semuncia, laseris P. semancia: his tritis, cretis, mellis attici quod satis erit, admiscetur. Et hoc aut cæteris medicamentis sepius fauces, & pressius fricare oportet. Multis & hoc profuit medicamentum, quod est sine dubio, efficacius & uehementius: costi, apij, anesi, schoeni, cassiæ rufæ, singulorū * P. binū, git * P. I. amomi uictoriati P. unius, Zee, quod est semen * P. II. aluminis fissi semuncia, gallæ mediæ magnitudinis, numero V. croci * P. II. crocomagmatis uictoriati pond. myrrhæ uictoriati P. Aristolochiæ creticæ * P. III. cinnami * P. III. hirundinum syluestrium pullorū cineris P. uncia, nardi spiciæ uictoriati pondo. Hæc omnia siue contrusa, siue creta diligenter melle attico despumato comprehendantur: Cum autem opus fuerit, adijciatur quod satis erit eiusdem mellis. Hoc Augusta semper compositum habuit.

Ad uicq; tumorem & dolorem.

VVA M. supprimit diu iacentem sal ammoniacum, galla contusa, æquis ponderibus. Eadem ratione aluminis fissi * P. III. piperis albi * P. I. quibus in unum mixtis, cochleario ter tacta resilit. Itē herbæ cyclamini succo per cochlearium ter die tacta, ac per triduum, non solum resilit ac fit minima, sed etiam raro ualde molestat. Item ad uicq; tumorem & tonsillarum ficcum & efficax medicamentum: gallæ tusæ P. uncia, æris flos pond. semuncia, menarum sine ouis quæ sunt, salarum capita decem. Hæc comburuntur, & ita cæteris admiscuntur cineribus, & postea nihilominus in unum diutius teruntur. Oportet autem digito humido tangere medicamentum, & sic uiam ab imo rectam diutius suppressere fursum uersum. Item aliud efficacius ad uiam diu iacentem, cyperi siccata bene P. quadrans, myrrhæ S. croci siccati ante S. sandaracæ * pond. I. aluminis fissi S. æris uisti S. Hæc omnia intunduntur, cribrantur, ac digito melle mixto medicamentum sumitur, & ita uia leuatur, ac tonsillæ pressius fricantur per triduum: aut si uoles, digito mundo sine melle curabis.

hoc. ie. Composita autem rē ad tumorem
arterie maxime pro uoc. papaueris &
traga. ad h. 104. m.

SCRIBONI LARGI

Ad tumorem & raucitatem arterie; & uocis abscissionem.

AD arteriam exasperatam simplicia quidem hæc faciunt: commis alexandrina, uel tragacanthum per se sub lingua retentum. compositio autem hæc est.

Deest compositio

AD tumorem arterie; papaueris syluatici iam maturi, uiridis tamen adhuc, capita quamplurima uase fictili coniunguntur, aquaque superfunduntur, ut supernatet duobus tribusue digitis. Hæc ubi tri- duo macerata fuerint, eodem uase coquuntur, donec demadescant; postea exprimuntur capita, om- nisque aque percolatę prius diligenter mensura capitur; ad cuius modum, mellis attici quarta pars mi- scetur: deinde per duplex uas coquitur, donec mellis habeat spissitudinem. Hoc medicamentum ad ar- terie tumorem, & ad tussim facit.

ALTE RA arteriace ad fluorem & raucitatem arterie: Item ex ea ad tussim, & abscissum fo- num uocis. Tragacanthi * P. VI. commis alexandrinę * P. V. myrrhę * P. I. thuris * P. II. cro- ci * P. I. piperis albi grana XX. cariotarum recentium trium pulpas medias, detracta exteriore cute, in- terioribusque uenis, uel uux passę nouę & incorruptę, purgatis interioribus granis, P. VIII. commis & tragacanthum passo cretico uno die & una nocte macerari oportet, & postero die pila & pilo mundo contundere, & cetera trita mortario curiose admiscere. Inde dare fabę magnitudinem, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumo- rem arterie facit. Seruandum autem puxide buxę.

Arteriace, qua melior non est, refertur autem ab Asclepiade nostro; facit ad omnia superius dicta efficacius, & quidquid in arteria uitij est. constat ex his: myrrhę optime pinguis * P. XXIII. traga- canthi cãdidi * P. XXVIII. glycyrrhizę radicis * P. XVIII. resinę terebinthinę uerę * P. XV. III. tragacanthum sicut est, contundere, & per cribrũ tenuibus foraminibus eicere oportet. Deinde myr- rham tritam seorsum admiscere, & rursus utraque in unum diu terere, atque ita in pilam conijcere, & ibi cum concaluerint, icu pili terebinthinam paulatim miscere, donec omnium unitas fiat. Postea glycy- rhizã contusam & cribratam, mortarioque nihilominus tritam, sensim aspergere oportet. Vbi hæc be- ne mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabę. Fit enim durissima hæc arteriace, & hoc ipso præcedit ceteras: quia linguę subiecta, non facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

Ad suspirium

AD suspirium faciunt bene inter simplicia quidem acetum scillites, quod uocant, cochleario ter quaterue sumptum in die. Prodest & ipsa scilla, argilla circumdata, & furno cocta, purgatis exterioribus putaminibus, & quod tenerrimum est eius, mellis duabus partibus attici admixtum & tritũ bene cochlea- rio, semel in die bisue sumptum profuit multis. Pulmo uulpis in olla fictili ad cinerem redactus, & datus mensura cochleariorum trium, cum aquę calidę cyathis tribus. Item pulmo cerui eodem modo factus & datus.

Prodest & hoc medicamentum euidenter: Aluminis fissi P. * VI. opij P. * I. aqua exigua opi- um diluitur: miscetur alumini antę trito: sũt globuli ciceris amplitudinis: dantur ieiuno ante cibum qua- terni aut quini. Hoc medicamentum & ad sanguinis eruptionem ex interioribus partibus facit, & ad ue- terem tussim, & ad phthysicos, uel alios qui purulenta excreant.

HOC quoque medicamentum ad suspirium satis commodę proficit. Sulphuris uiui P. * I. ni- tri pon. * .seibra, abrotani quod tribus digitis comprehendi possit. Hæc cõtunduntur, & teruntur cu- riosę: Cum opus est, dantur ex his cochlearia duo cum duobus cyathis aceti calidi ieiuno.

ALI VD medicamentum ad suspirium, efficax ualde: Facit autem & ad lumborum diutinu do- lorem, & ad paralyfin, & hydropicos, lienofos. Bryonię, id est, albę uitis radicis pon. * XII. iris Illyricę pon. * XII. ammoniaci guttę pon. * XII. asparagi radicis P. * VI. scyllę bulbi crudi ex interiore parte, pon. * XII. tragacanthi pon. * VI. mel miscetur contusis & tritis, donec cerę mollis habeat te- peraturam: Inde cum opus est, datur pond. * I. cum aqua mulsa, cyathis tribus uel quatuor.

Ad strumas & omnem duritiem in corporis quolibet loco.

AD strumas bene facit radix cucumeris syluatici cocta ex aqua mulsa & trita, atque ita imposita. Item ebiscum eodem modo factum. Sed melius marini lepores oleo uetere necati faciunt, in plumbea puxide clusi, quam diebus quadraginta diligenter alligatã oportet habere: Postea ex ea, pinna oblinen- dę sunt strumę, superque eas pellic lanata non nimium tonsa, tegendi gratiã, imponenda est. Præcipere autem oportet, ne quis hoc medicamento manus inquinat: aut inquinatas, prius quàm lauerit, ad os re- ferat.

AD strumas & ad duritięs mammarum mirifice facit, antequam suppurent, & post suppurationem nihilominus hoc medicamentum. Olei ueteris pon. duo, spumę argenteę pon. libra, gallę fyriceę pond. triens, mannę thuris pon. uncia, galbani pon. uncia. Cum oleo coquitur spuma, donec cerati spissi habeat temperamentum, deinde admiscetur ei galla, & secundum hanc manna: cum emplastri habet spissitudi- nem, tollitur ab igne medicamentum: & cum desinet feruere, paulatim galbanum miscetur: per minutas parteis linitur aluta, cum opus est. Hoc medicamentum soluitur tertio quartoue die, si non suppura- rint strumę: sed si apertę fuerint, hyeme alternis, estate quotidie.

Malagma ad strumam & omnem duritiem mirificum: Idem ad mammarum muliebrium duritiã, & ad

& ad paniculas, & ad tubera, & cetera quę subito adnascuntur. Recipit hæc: Resinę terebinthinę P. dua, cerę pond. semissem, propolis, quam quidam ceram sacram uocant, pond. fescunciam, galbani pond. sextantem, olei ueteris pond. scilicet. Hęc omnia oleo ad ignem liquefacere oportet, & postea miscere uisci de quercu pondo quadrantem, ammoniaci guttę pond. quadrantem, ebisci radice aridę pond. quadrantem, cypri radice, quem nos gladiolum appellamus, pond. sextantem, ferulę pond. trientē, aphrōnitri pond. quadrantem, alij lapidis florum pond. quadrantem, opopanacis pond. sextantem. Hęc omnia ordine quo scripta sunt, cribrata, in cacabum coniunguntur: opopanax oleo diluitur. Vbi temperatum est medicamentum, manibus subigitur: linitur, cum opus est, aluta.

Ad sanguinis eruptionem.

LXXXIII

Ad sanguinis eruptionem, siue ex arterijs, siue à pulmone, uel pectore ea fuerit, benefacit symphyti radix, quam quidam Inulam rusticam uocant, quidam autem Alum gallicum dicunt, lota aqua frigida, & rasa cultello eburneo uel osseo, pond. sextantis, aut plus, id est, quantum poterit manducare & deuorare: neque enim amara est. Oportet autem eodem die acetum non gustare, quod interdum per se magni fide solet prodesse: sed huius radice effectum resoluit. Item benefacit polygonij succus cyathorum duorum aut trium per triduum repetitus. Et plantaginis & solani eodem modo succus prodest: & cretę facinę P. * I. sumptum ex aquę frigide rigore detracto cyathis tribus. Prodest & herbe quam πολιδν uocant, nos ut opinor, tinariam, fasciculus, quātum manu comprehendi potest, in tribus heminis aquę decoctus, & ad tertias redactus, si quis inde cyathos tres dederit per triduum.

LXXXIII

Oportet autem extra sentienti uulnus, eo loco spongiam ex aqua recenti imponere, uel ex aceto ac frequenter mutare, ne concalescā noccat. Et uetare artus, constringere, quod plerique medicorum faciunt, ignorantes quod incitatur sanguinis eruptio musculorum compressione. Quandoquidem omnis constrictio in utranque partem exigit æque subiectam materiam: sicut utrem si quis medium latitudo constrinxerit, animaduertet in utranque partem excludere subiectum liquorem. Et si super foratus casu fuerit, incitatione ei aculabitur quod in eo erit. Eadem ergo ratione cum sanguis eruptus est, qui constringunt uel magna artus exprimentes, sanguinem uenis subiectum cogunt magis erumpi per uulnus. Huius rei argumentum est, si quis super laqueum percusserit uenam in brachio, quę est animalis, animaduertet æque incitari sanguinem ex ea parte, quā ex inferiore loco, cum percussa est uena. Et hoc per se quidem si non uiderant medici, merito essent culpandi, quod negligentes in anticipi casu hominum essent: Cum præsertim Asclepiades etiam pluribus usus sit argumentis in hac re: neque ei quifquam contradixit. quis enim aduersus ueritatem hifcere potest? Proinde magis sunt custodiendi qui pollicentur salutis custodiam uniuscuiusque se facturos. Tam inertes autem & negligentes necessaria quidem ad conseruandam uitam humanam, quę per aliorum laborem reperta sunt, studeant scire. Merito itaque manifeste quidam iugulantur genere quodam incitata eruptione sanguinis ab eiusmodi hominum imprudentia. Et, o bone deus, hi sunt ipsi, qui imputant suam culpam medicamentis quasi nihil proficientibus. Sed ad propositum reuertemur.

LXXXV

Faciunt enim composita medicamenta ad sanguinis eruptionem, quorum & hoc est: Acacię succi P. unciz: & punicę, qui est succus rosę syluaticę, quam caninam quidam uocant, pond. unciz: balaustrij, quod est flos mali granati, quo coriarij utuntur, pond. unciz: opij pond. semunciz. Balaustrium contunditur, siccatur, sicco mortario teritur. Cetera pridie macerata in aqua commiscuntur, & diligenter pastilli finguntur. Quidam P. * I. quidam uictoriati denarij dantur ad ætatem cuiusque, ex aquę frigide remisse cyathis trib. aut duob. Atque ille qdē pastillus, bñfacit ad dysentericos, i. torminosos. LXXXVI.

ALTER pastillus ad sanguinis eruptionem mirifice faciens. Tragacanthi P. * IX. samiz cretę P. * VII. cerę pōticę P. * IX. glycyrrhizę succi (est autem radix dulcis) P. * V. Symphyti succi P. * XII. Cōmis P. * III. & punicę succi P. * VII. thuris P. * V. aluminis liqđi P. * II. opij P. * V. amyli P. * VI. myrrhę P. * V. croci P. * VII. plantaginis succi P. * III. passi meconij qđ satis erit, miscabitur, fiūt pastilli. Alij P. * I. alij uictoriati dabūtur ex aq̄ tepētis cyathis duob. & di-

Ad tussim ueterem, & destillationes, & suspensia & inflationes, cum dura habent præcordia, (midio)

& lienosos, & phthisicos. LXXXVII

Catapotiū, id est, medicamentum quod nō diluitur, sed ita ut est, deuoratur; ad tussim q̄ cum fluore est. Croci P. unciz, myrrhę P. sextantis, opij P. quadrantis. Contunditur crocum, percribratur, confusę myrrhę opium admiscetur aqua exigua dilutum. Postea adiicitur crocum: & cū in unum bene mixta sunt, finguntur pilulę erui magnitudinis. Dantur in nocte ternę uel quaternę. LXXXVIII.

Catapotiū alterum ad tussim aridā. Myrrhę, piperis, castorei, galbani, storacis, opij, singulorū idem ponderis. Castoreum & piper contunduntur & cribrantur: Deinde myrrhę antē tritę ceteris confusę æque admiscetur. Vbi oīum unitas mortario facta est, melle despumato medicamentum cōprehenditur: deinde formantur pilulę uiciz magnitudinis. Dantur ternę uel quaternę in noctem. LXXXIX.

Aliud catapotium ad tussim ueterē, suspensium, & phthisi tentatos, lienē, & iecur durū habētes. Idē inflationē tollit, & purgat mulierē, si qua ex partu substiterunt. Styracis P. * VI. myrrhę P. * II. & uictoriati, opopanacis P. * II. iris Illyricę P. * II. galbani P. * II. resinę terebinthinę P. * V. alteri di seminis P. * I. nitri P. * I. piperis albi P. * I. opij P. * I. Irim, altercum, piper cōtundere oportet & cribrare, nitrum mortario terere, & cetera pilo commiscere, & postea hæc eis adijcere, atque facere catapotia magnitudinis fabę: Inde terna uel quaterna in noctem dare ad inflationes in ipsa distentione

t iij

cum aqua calidæ cyathis tribus.

Pastillus ad tussim, defillationem pectoris, pulmones, ad epiphoras oculorum, uelice dolorem, qui cum fluore consistit, ubi sepius & non sine cruciatu urinam faciunt. Item ad eos qui sanguinem reijciunt, aut per urinam reddunt. Ad deiectionem, tormina, grauedinem, choleram, stomachi crebram nauseam cum uomitu, sine febre: Et quidquid reprimere & ficcare oportet, optime compefcit. Præterea facit ad omnis partis corporis dolorem, præterea capitis. Quinetiam si quando aliquis hoc fuerit inunctus. Alij uicio non erit dandum hoc medicamentum. Cum autem ad omnia, quæ supra dixi, manifeste proficit, tum præcipue ad initia phthisim habentes benefacit: Multos enim eripuit ex magno periculo interdum, bis ter uel datus hic pastillus: recipit hæc: Myrrhæ troglodytis P. ✕ V I. croci P. ✕ V. opij P. ✕ IIII. thuris P. ✕ V. alterci albi seminis P. ✕ IIII. apollinaris herbæ radices corticis P. ✕ IIII. Contunditur hic cortex per se, & cribratur tenui cribro: deinde crocum, postea altercum, myrrha, thus, quibus miscetur opium pridie aqua maceratum: subinde aqua exiguum adijcitur, donec fingi pastilli possint Pond. ✕ uictoriati. Alij tertia huius ponderis detracta, dantur in noctem ex aqua cyathis tribus. Somnum faciunt, dolorem sedant, ut superius dixi. Oportet autem ex eo etiam catapotia facere: quidam enim facilius ea, quam potionem sumunt, uerum non multum interest.

AD eadem remissior quidem pastillus, sed non contemnendus, croci, myrrhæ, alterci, opij, pondera paria contusa miscentur, despumato attico melle fiunt pastilli eiusdem ponderis. Dantur ad ætatem eius tres in nocte: licet & hinc catapotia facere, propter eandem causam, sed tunc aqua, non mel adijcitur.

Pastillus ad tussim & sanguinem reijcientes, & stomachum solutum habentes, facit & ad deiectionem, & uelice dolorem. Apij semen P. ✕ VI. alterci seminis P. ✕ XII. anethi P. ✕ XII. opij P. ✕ VI. croci P. ✕ III. rosæ foliorum arefactorum in umbra P. ✕ XII. myrrhæ P. ✕ XII. Semina, & crocum, & folia rosæ contunduntur, cribrantur, myrrha teritur: opium aqua maceratur: omnia in unum miscentur aqua adiecta: fiunt pastilli uictoriati pond. alijs tertia parte detracta. Dantur ad stomachum imbecillum habentes, & sanguinem reijcientes, ex aqua frigida cyathis duobus, ceteris ex calida totidem cyathis.

Pastillus ex odoribus benefacit ad omnem dolorem: Proprie autem ad tussim: Item pectoris defillationem, & oculorum epiphoras: Facit & ad suspirium, & ad lateris dolorem, & ad phthisicos: & uelice, renibusque laborantes, uel sanguinem ad urinam reddentes cum dolore. Casiz, cinnami, croci, singulorum P. ✕ III. alterci seminis, apollinaris herbæ radices, singulorum P. ✕ IIII. piperis P. ✕ II. opij P. ✕ IIII. thuris pond. ✕ III. nardi spicæ P. ✕ II. Vino falerno. contusa & trita utraque ut debent, consperguntur: fiunt pastilli uictoriati pond. Et alijs parte tertia detracta. Dantur in noctem, prout uires sunt, cum aqua calidæ cyathis duobus aut tribus.

Medicamentum, quod per cochlearium deuoratur, benefacit ad tussim aridam, & eos qui difficulter glutinosa excreant, & præfocari uidentur interdum. Sed præcipue ijs qui lateris dolorem cum febre sentiunt, quos Græci πλυστηριος uocant: Liberat enim eos ab omni periculo. Hoc medicamentum Apulei Celsi fuit, præceptoris Valentis & nostri, & nunquam ulli seu uio compositionem eius dedit, quod magnam opinionem ex ea traxerat. Est autem hæc, quæ componitur tribus rebus his: Piperis nigri electi & ponderosi granis duobus, myrrhæ troglodytidos P. ✕ II. mellis attici despumati libra. Piper contunditur diligenter & cribratur, myrrha teritur mortario curiose: & postea utraque in unum miscentur: deinde mel adijcitur. Dantur cochlearia quina uel sena. Pleuriticis etiam plura sepius, & cum intervallo dare oportet: & maxime cum tussunt, aut præfocari uidentur, & difficulter spirant, siue noctu siue interdiu. Protinus enim excreant ea quæ obstant transitui spiritus, & tussire desinunt.

ALTERVM medicamentum ad tussim aridam. Nasturcij animati seminis pond. uncia, alterci seminis pond. uncia, opij pond. uncia, myrrhæ pond. uncia, croci pond. semuncia, sulphuris uini P. semuncia, piperis albi pond. quadrans. Melle colligitur medicamentum. Datur fabæ ægyptiæ magnitudinis ex cyathis aqua tribus in noctem. Facit autem hoc medicamentum ad lateris dolorem, & ad stomachi inflationem, grauedinem, coeliacos, qui subito uniuersa deijciunt. Prodest & dolentibus superpositum & circumdatum denti: & si exesus est, in cauernam eius infertur. Tollit præterea horrores febres præcedentes: tum, cum hæc circuitum certum habet, datum ante horam, diutius corpore perfricato ex oleo calido. Prodest & illis qui sine horrore circuitibus febrium uexantur. Quamobrem hæc compositio dicitur.

ALIVD ad tussim aridam, & glutinosa excreantes. Purgat etiam interaneas uomicas, suppurationes, lini seminis, urticæ seminis, nasturcij seminis, iris Illyricæ radices, aqua pondera misceri oportet, & cum melle despumato, quantum satis sit: & frequenter oportet cochleario dare.

Antidotos hystera Pacchij Antiochi ad uniuersa corporis uitia, maxime lateris, & ad podagram.

AD lateris dolorem, siue cum febre, siue sine febre fuerit, compositio mirifica, non ignorata quidem ab antiquioribus, propter effectus, sed præcipue à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catenensis usu illustrata. Fecit enim magnos questus ex ea propter crebros successus in uitijs difficillimis. Sed ne hic quidem ulli, se uiuo, compositionem dedit. Post mortem autem eius, Tiberio Cæsari per libellum scriptum, ad eum, & bibliothecis publicis posita, uenit in manus nostras; quam antea nullo modo extrahere

trahere potuimus: Quamuis omnia fecerimus, ut sciremus quæ esset. Ipse enim clusus componebat, nec ulli suorum committebat: plura enim quam recipit, ipsemet contrundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hanc postea nos sciuimus, quæ ut sanæ & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia, & cum quibus, & quemadmodum data proficeret. Etenim non ignota, pòderibus tamen antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt, non utique conueniunt ad antiquas. Interdum enim earum quædam plures etiam numero accipiunt, atque ideo non idem præstant, cum interim hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat.

XCVIII.

FACIT hoc uero medicamentum non solum ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia efficaciter. Quamobrem semper habeo id compositum. Percutram autem quam breuissime, ad quæ uitia, & qualiter datum prodest, ut etiã in libello eius scriptum est, & ego magna ex parte iã expertus sum.

XCIX.

SANAT ergo morbo comitiali correptos, quos *ἐπιληπτικούς* Græci uocant; furiosos, quos *μανιμένους* dicunt. Item sanat quibus subitis tenebris obscurantur oculi cum uertigine, *σκιόματικούς* hos Græci appellant: Nec minus diutino correptos capitis dolore, quem *κεφαλαίαν* appellant. Prodest data P. * II. ex aquæ mulse cyathis quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequenter quidem corripuntur, post binas ternas uel accessiones danda erit antidotos Hycera: hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas, ut existimo. Vnam, ne eius nomen uerum dicendo, ostenderet quæ esset. Dicitur enim à quibusdam *ἡ*, quia amara est: à quibusdam *κ*, quia *καλὰ* dicitur. Alteram, quò magis sub tanta specie nominis commendaret medicamentum. Sed si ex longo intervallo accessionebus uexabuntur, in remissione dolorum sæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certe minuitur quotidie impetus uitiorum & sedatur, interuallaque maiora accipit; & hoc ipso opportuniore sunt ad ueratri positionem, qua maxime hæc uitia tolluntur. Dye autem his oportet secundum purgationem (his enim aut ter spumosa & glutinosa deiciunt) ptisanæ cremorem, olera lenia ex urtica & lapathio malua facta, torpedine interdum admixta & cum exiguo pane, aquamque potui.

C.

FACIT bene hæc compositio ad suspirium, & ad uocis abscessionem, & subitas præfocationes ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab incubone deludi. Vique eò tamen uexantur, ut interdum uitæ periculum adeant (est enim uitium non contemnendum) utique in processu ætate. Quibus dandum erit medicamentum, proximo die eius noctis, qua correpti sunt, cum interuallum à somno fecerint, & quod satis est ambulauerint; ex aquæ hyssopum aut marrubium incostum habentis cyathis quatuor uel quinque, * P. I. uel unius & uictoriati, prout res postulauerit. Deinde post horas

CI.

FACIT & hoc medicamentum ad eos, quorum musculi maxillares cum maximo dolore tensi sunt, adeo ut aperire os nullo modo possint, *τεταρσέν* hoc uitium Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in utramlibet partem, *κυνίον* hoc idem appellant genus morbi. Præcipue uero ad pectoris, & lateris dolores prodest ex qualibet causa factos, siue larentes & occulta, siue manifesta: ut ex ictu, casu, conatu aliquo supra uires, uel ponderis, supra modum portatione, uel contusione, quæ frequenter gladiatoribus accidere solet in luctationibus, & eorum maxime faucibus. Nec minus arbore alta, delapsis, uel scalis deuolutis, excussis à rheda uel curriculo, atque ita tractis. Sed his id est manifesta causa, uexatis, cum aceti cyathis tribus quatuor uel danda erit antidotos. Illis uero, qui ex occulta causa laborant, ex aqua mulla proderit. Præterea neruorum tensionibus mirifice còuenit. Quamobrem facit & ad tremulos, & syderatione tentatos utralibet: una enim ex contractione, altera cum remissione neruorum conspiciuntur, *τεταρσέν* hoc utrunque uitium Græci appellant. Ad quod etiam, cum correpti sunt, prodest ex aquæ mulse cyathis tribus quatuor uel datum medicamentum. * P. I. uel unius & uictoriati, admixto pondere uictoriati castorei. Prodest & ad articulare morbum, quem *ἀρθρίαν* uocant, ad spinam, & totius lumborumque dolorem: ex aqua mulla datur ad uires cuiusque. Item ad podagram benefacit: nã & in præsentia detractione ipsa leuat, & in futurum omni molestia liberat. Dimidio enim celerius sanatur, qui acceperunt medicamentum, quam prius solebant.

CII.

QVID dicam? duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, quas nullum medicamentum leuat, quemadmodum ex toto in perpetuum interdum sanat, quas plerique medicorum insanabiles adfirmat, *μαρμαρίσματα*, & *μαστόδες* appellantur. Poteram nominare honestas foeminas, quas aut ille, aut ego hoc medicamento sanauimus: nisi crederem fidem te habere nobis, alioquin sipse tibi iam dixissem.

CIII.

ILLUD uero supra omnium opinionem est, quod ad stomachicos euidenter conuenit, cum sit uirosissimum medicamentum aduersus stomachum, ne ad lenia quidem, & simplicia medicamenta apte dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi rebus potentior usus ratione est: expertus enim unusquisque intelligit stomacho quoque hoc medicamentum eximie prodesse.

CIII.

Remediat enim eos, quibus frequenter inæscit cibus, & eos qui assidue inflationibus urgentur, uel dolore eius uexantur, aut assidue nauſeant, aut saliva abundat, uel inedia consumuntur, stomachumque ita solum habent, ut ex eo uarios liquores subinde respiciant, consentiente capite, ut nullum genus cibi continere possint. Item ad bilem atram generantes, quos *μελαυχολικούς* appellant, benefacit. Oportet autem non continenter cibos, secundum uomitum, protinus oleo perunctis, & diutius presse frictis, dare medicamentum. * pondo I. ex aquæ cyathis tribus; deinde artus constringere, & interdum olfactarijs reficere, & còmanducatione oliuarum contusarum, earumque rerum, quæ stomachum

t. iiii

constringere solent, interim subrectos recubantes, deinde cum deiecerint, solutis uinculis rursus perungere, & fricare totum corpus. Atque ita uarietate apta ciborum stomachum proritare, ut halica ex mulo, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundum quæ, apata oia proderunt, & intubi costi uel crudi ex aceto: Item lactuca caules cum folijs ex posca decocti, conchula marina, purpura, murices, pelorides, uolua pomorum, sorba, mala orbiculata, scandina, pyra, crustumina, signina, olla reposita, item uix ex olla: Hæc enim & huiusmodi quæ sunt, confirmant stomachum; quibus & in sequentibus diebus uti oportebit, paulatim ad consuetudinem progredientem, donec prope omni molestia ægri liberentur.

C V.
EST stomachi uitium, quod cum siccitate & ardore eius, & irrequiebili (ut ita dicam) & inextinguibili siti consistit. Græci uocant, ab eo quod exiccat omnem stomachi humorem. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neque ideo sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse. Ad hoc P. I. uel uictoriati datum ex aquæ cyathis duobus frigidæ, ita prodest, ut facile abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis uero ex posca, & iocinerosis duritiam habentibus diutinam, ex aqua multa satis conuenit. Nec minus hydropicis, quibus datur eadem ratione. Sed his per complures dies oportebit præferre cremorem sine ullo liquore dari.

C VI.
Prodest compositio hæc & colo inflato, & cæteris intestinis. Futuras quoque uel iam factas uomicas iisdem partibus aut discutit, aut celerius aperit. Item menstrua mouet mulieribus, quæ difficulter purgantur. Dandum autem erit his ex aqua medicamentum. In aqua decoquitur herba, quæ artemisia dicitur, aut quam *diakrasmos* appellant. Etiam ad papulas & sacrum ignem, uel quam zonam uocant, benefacit ex aqua multa, detracto prius sanguine, si res postulauerit: ut & in alijs omnibus superius dictis faciendum est. Omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus: quia facilius adiuta antidotos adiunabit, & effectus exhibebit. Recipit autem hæc: Stœcados, marrubij, & asæ, quæ herba similia quercus folia habet, agarici, cucurbitulæ syluestris, quam *nonacanthus* appellant, singulorum P. X. opopanacis, sagapeni, petroselinij, terræ mali, piperis albi, singulorum P. V. cinnami, nardi spicz, myrrhæ folij, croci, singulorum P. IIII. in unum omnia ponderata contunduntur, & cribrantur: Præterea opopauaces & sagapenum: hæc enim mortario teruntur, adiecto melle tenui, id est, quamliquidissimo: deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis, quantum satis erit ad comprehendenda & continenda ea. Reponitur medicamentum uase uitreo. Datur ut supra diximus, ad cuiusque uires, & est prorsus sacrum, ut auctor huius nominis appellat.

C VII.
SI quando autem efficaciore eo uoluerimus uti, propter difficultatem naturalem uitiorum, aut diuturnitatem, ut in furiosis aut comitiali morbo correptis, uel lumborum perpetuum dolorem habentibus, podagra correptis uastibus, cucurbitulæ syluestris adijcimus ad superius dicta pondera, P. XX. opopanacis atque sagapeni, singulorum P. trium. Quamobrem utraque parata debent esse medicamenta: ut cum opus fuerit, usus alterutrius in promptu sit. Illud utique credas interim uelim mihi, dum in alijs expertus persuadeam, hoc medicamentum non solum non nocere stomacho, uerum etiam reficere & confirmare eum supra omnem opinionem.

C VIII.
Ad stomachi dolorem & inflationem, & cætera uitia interius. Medicamentum quod proprie aduersus solutionem stomachi facit & fluorem eiusdem: maxime uero cum nihil cibi retinere possunt, sed quidquid datum est, reijciunt. Mastiches chiz candidæ pondo libra, tragacanthi albi pondo libra, apollinaris herbæ radices uncia: Contunditur tragacanthum cum radice: postea mastiche adijcitur. Reponitur in uitreo uase. Dantur cum opus est, cochlearia tria, secundum uomitum per se factum ex aquæ frigide cyathis tribus.

C IX.
Ad stomachi dolorem & inflationem. **C X.**
Palmarum P. XL. anethi P. IIII. croci P. duum, git P. duum, & asari P. duum, murti nigre baccarum P. IIII. iuniperi grana numero uiginti. Contunduntur seorsum omnia, & in unum miscentur: deinde fiunt pastilli P. I. alijs uictoriati: Dantur ieiunio ex aquæ cyathis quatuor, aut ex cretico musto, quod est passij genus.

Medicamentum siccum ad stomachi inflationem, & dolorem, & inedia: Mollit urinâ: ideoque facit & ad hydropicos, & iecur durum habentis, & ruginem, quam quidam regium; quidam arquatum morbum uocant. Refertur in Musam Antonium. Recipit autem hæc: Aloës P. assis, trientem; croci, cinnami, nardi syriacæ spicz, asari, xylobalsami, mastiches chiz, singulorum P. VI. Tunditur, & uero reponitur. Dantur cochlearia duo uel tria ex aquæ cyathis tribus.

C X.
Compositio quæ superius defuerat, hic ex Galeno de compositione medicamento: tum iuxta rationem, eisdem Scribonij Largi, sic restituta est à Io: Ruellio.

A L T E R A Scribonij Largi, quæ quod sub lingua teneatur, *ὑπογλωττῆς* appellata, facit ad abscessionem uocis: Radicis dulcis P. VII. myrrhæ P. XXXIII. terebinthine P. XXXII. tragacanthæ P. XXXVIII. singula sicca seorsum tundito & cernito, resinaque in pilam coniecta exopto: Vbi in unitatem coierunt, in formulas digerito, quæ ægyptiæ fabæ magnitudinem æquent, & in umbra siccatæ: cumque usus poscet, unam aut alteram sub linguam tenendam dato, ut illiquefcens deuoretur. Medicamentum oportet, cum res exiget, celeriter effingere; siquidem confectum exicari solet: quapropter in promptu terere conuenit medicamenta cum in pastillos coges.

Hæc Galenus ex Scribonij Largi sententia: tum iuxta rationem, eisdem Scribonij Largi, sic restituta est à Io: Ruellio. Ad coeliacos

Ad coeliacos, & torminosos, & uentris diuturnum dolorem.

CXI.

Coeliacus, qui subito & multa deijciunt.

AD coeliacos, id est, qui subito & multa deijciunt: Item & ad aluum citatam, & interdum lenia tormina: Sorborum aridorum centusorum sextarius unus, rhus syriaci coquuntur sextarii duo, mala lagranata recentia decem, item mala cydonia decem. Hæc utraque coniunguntur in sapam factam ex musti adhuc in dolio feruentis sextariis triginta sex, ad duodecim sextarios decoctam, donec malorum coria perequantur, ut sint madida. Deinde teruntur hæc fictili mortario, ut grana comminuantur; quibus deinde cydonia admiscuntur, & æque teruntur; Postea rursus & sorba arida admiscuntur cribrata curiose sapæ quæ residua est; & omnibus in unum bene coactis. Reponitur medicamentum in uitreo uase. Dantur autem inde ieiunis in diem ligulæ binæ uel ternæ per se. Sin autem grauior morbus infedit, hic datur.

CXII.

Pastillus ad coeliacos & torminosos optimè faciens: Balaustrij hypocythidos pridie aqua macerati. P. sextans, alterci seminis, cretæ samiz, singulorum P. uncia; uino myrrite adiecto, fiunt pastilli. P. uni us, aut uictoriati. Dantur ieiuno sine febre ex uino myrrite, aut signo, cyatho uno cum duobus aquæ mixto: febricitantibus, ex aquæ cyathis tribus. Hoc etiam, incitata libidine ipsius morbi, pastillus, siue plures diluti aqua calida, uino, oleo, per clysterem immittitur; statim somnus consequitur, quoties defurxerint torminosi, qui grauius afflicti sunt, & utique prodest.

CXIII.

Alius pastillus ad torminosos efficacior.

Agaciz. P. quatuor, croci. P. duum, gallæ. P. VIII. hypocythidis. P. III. lycij. P. III. myrrhæ. P. III. rûs, quo coqui utuntur, nardi spicæ syriacæ, aloes, singulorum. P. duum, anesi, commis, singulorum. P. quatuor, piperis nigri. P. duum. Tunduntur, teruntur, cribrantur ex succo cauliculorum rubi, uel ex uino signino collisij tritura: Cum fuerint hæc lenia, aut ungui nula pateat aspritudo, singuntur pastilli. P. I. alijs P. uictoriati. Datur unus ieiuno ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt: ex uino signino, si sincere corpus erit. Hoc efficax est medicamentum; & si cætera quæ debent, sentiente eius ualitudine, recte adhibita fuerint, utique sanant.

CXIII.

Pastillus item, qui clysterio immittitur torminosis per anum, cum sordida, & sanguinolenta eijciunt, id est, cum intestina eorum cancer occupauit, quo quasi cauterio tunc tantummodo uti oportet, alioqui nocet. Ideoque à quibusdam ignorantibus, eius usus accusatur, quasi nocuus. Recipit autem hæc: Chartæ combustæ cineris. P. XXX calcis uiuæ. P. XXIII. *apocynum*, quod est auripigmentum, P. XII. sandaracæ. P. sex. Hæc trita, uino consperguntur, in quo rosa & lentes prius incoquantur, ut possint fieri pastilli. P. duum aut unius. Cū opus est, teritur unus pastillus, & immittitur per aquam decoctam, rosam & lentem habentem, si febricitabunt: sin minus, ex uino eadem incocta habente, facit & murti fasciculus cum oleastri uel oliuæ ramulis, utrorumque modo, prout res exegerit, incoctus.

CXV.

POTIO autem, id est pastillus, cum immixtus fuerit medicamentum, sic conuenit in noctem, Myrrhæ. P. duum, lycij. P. III. thuris. P. I. opij. P. duum, aloes. P. duum, acaciz. P. III. murti, baccarum nigrarum. P. XVI. ouorum ex aceto coctorum uitelli duo. Hæc trita uino Surrentino consperguntur, & fiunt pastilli. P. I. Dantur febricitantibus ex aquæ cyathis quatuor, per mixti Surrentini uini cyathis duobus.

CXVI.

AD deor, quod uitium, est inflatio tenuium intestinorum, facit bene galbani P. uictoriati, deuoratur in pilulas diuisum duas uel tres: Mouet & ructum, & interdum deijcit uentum deorsum, atque ita prodest.

CXVII.

AD idem uitium mirifice prodest hoc medicamentum; Facit autem ad lateris dolorem, & ad omnem partem corporis; dauci seminis, panacis radices, castorei, paria pondera, rutæ syluaticæ dimidium; tritis uel contusis mel decoctum adijcere oportet: Inde dare P. I. aut uictoriati ex aquæ caldæ cyathis tribus.

CXVIII.

FACIT & ad huiusmodi per anum immixtum scenum græcum: id aqua bene coquere oportet, atque inde sumere heminam. Item in oleo domestico incoquere rutam quamplurimam, & hinc caldā heminam adijcere priori aquæ; quibus utrisque admiscere aphronitri triti fescunciam, et ita per clysteria caldā immittere. Hoc ego iam stercus per os deijcientem (quod si non mortiferum est) sanauit unguentum cuiusdam seruum. Est autem uitium *deor* periculosissimum, & ideo inter præcipua refertur. Quamobrem non utique cum magna fiducia ad hoc genus uitij aggredi debemus.

Ad coli dolorem etiam uerustum compositionum genera experia, quæ in totum persanant.

CXIX.

AD coli inflationem benefacit cumini syluatici semen per se, ut est datum, quantum cochlearia tria in aquæ caldæ cyathis quatuor.

CXX.

NAM Cassij medici colicæ bonâ multis nota propter effectus, uera hæc est, ut ab eius seruo Atimeto accepi, legato Tiberij Cesaris: quia is eam solitus erat ei componere. Apij seminis P. selibram, anesi P. quadrantem, castorei P. sextantem, myrrhæ P. quadrantem, spicæ nardi Indicæ P. sextantem, opij P. quadrantem, croci P. fescunciam, piperis longi P. sextantem, piperis nigri P. sextantem, semunciam, petroselinij P. sextantem, schoeni P. fescunciam. Hæc omnia contusa, cribrata, melle Attico decocta miscuntur: Datur ex hoc medicamento, quantum nux abellana media patet, ex aquæ cyathis tribus calidæ; In ipsis doloribus statim prodest. Item medicamentum cerati ex malabathro facit ex duabus partibus & cere unius mixtum, & extra impositum in uentrem totum: Præterea benefacit & ad stomachi inflatio-

nem, & ad suspirium, & ad iocineris dolorem, tussim, destillationem.

Colice mirifica Iulij Bassi, cito leuat: deinde tollit inflationes coli & omnis partis corporis. Facit & ad stomachi imbecillitates, & ad intestinorum aliqui dolorem, quem Græci *σφοδρ* appellant, ex aqua hyssopum, aut rutam decoctam habente. Item benefacit ad sanguinem, & ex interiore parte. Nō enim patitur late fieri nec intus uulnus conuerti: sed cito supprimit sanguinem, & uulnus cogit coire. Dandum autem his medicamentum ex aqua, *πολιον* coctum habente, aut rutam. Prodest & torminosis, & coeliacis, datum ex aqua centunculum herbam incoctam habente, quam Græci *μαραξιδ* dicunt, uel forba, uel siliquam syriacam. Lienosis datur ex mulso uel passo aquæ mixtis. Eodem modo dandum est & eis, qui sanguinem per urinam uel aluum reddunt. Nec minus etiam mulieribus, quæ fluore sanguinolento infestantur, quod *ῥοιὸν ἐνδοῦν* Græci dicunt, uel ex partu abortiuæ, quæ residuos uuluz dolores habent: & in totum, quibus supprimendus est fluor, aut ex aliqua parte corporis inflatio tollenda. Recipit autem hæc: Spicz nardi, costi, piperis albi, piperis nigri, piperis longi, myrrhæ, opij, apollinaris radices, & cinnami, asari, acori, thuris, brassicæ seminis, castorei, singulorum * P. XII. opopanax * P. X. stoechadis, dauci, amij, singulorum * P. XVIII. fefelis cretici * P. XXIII. mel atticum miscetur. datur non plus quàm * P. aut uictoriati. Ceterum prout cuiusque uires postulabunt, dummodo infra hoc pondus, ex aquæ caldæ cyathis tribus in noctem secundum cœnam. Hæc potio etiam febricitantibus tuto datur: sed coeliacis in ipso dolore prodest. Vitreo uase seruatur.

AD coli dolorem faciunt quidē mirificæ quæ superius posita sunt: sed cetera medicamenta in alijs uitijs dolorem leuant in præsentia, hoc uerò quod dicturus sum, supra hominis spem conditionemque est. Ideo primo tempore ne fidem quidem habet, postea à nullo satis dignè laudari potest. Nam & in præsentia dolorem tollit, & in futurum remediatur, ne eum unquam repetat. Raro enim quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamento, uexatus est. Quamobrem, si quando repetierit iterum dolor, dandæ erunt per triduum & tunc portiones, eodem modo quo primæ datæ fuerint. Interdum & tertio in dolore, eodem genere portiones dabuntur: quod accidit post hanc, utique in futurum quoque remediatur, ita ut ne suspicio quidem ulla relinquatur uitij; Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi præcesserint, gravitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt, plane ut intelligant, quasi quanto malo caruerint. Hoc medicamento muliercula quædam Romæ ex Africa multos remediavit. Postea nos per magnam curam compositionem accepimus, id est, pretio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Constat autem medicamentum ex his rebus: Cœui cornua sumuntur, dum tenera sunt, quasi in tales breuicis diuisa, olla fictili componuntur, operculoque superposito, ex argilla undique circumdata, fornace ununtur, donec in cinerem candidissimam redigantur: atque ita in uase uitreo mundo reponuntur. Cum dolorem habet aliquis, pridie quàm poturus est medicamentum, debet abstinere ab omni re: atque ita postero die sumuntur ex cornibus cochlearia tria cumulat, satis ampla: quibus miscetur piperis albi grana nouem trita, & myrrhæ exiguum, quod odorem tantummodo præstare possit. Hæc cum in unum commixta sunt mortario diligenter, cochlea uerò africana, id est, inde adlata sumitur, quàm potest amplissima, & uiuamortario cum sua testa confunditur, atque ut est teritur, donec nullum uestigium appareat restulari. Postea uini falerni non saccati cyathus adijcitur, & nihilominus rursus teritur. Magis enim tunc apparent residendæ amplitudines, si quæ reliquæ sunt: quibus leuatis, iterum adijciuntur cyathi duo eiusdem uini, atque ita prioribus bene admiscetur: transfunditurque cum his, quæ sunt in mortario, calice nouo, & supra carbones imponitur, mouente aliquo cochleario liquorem, ne quid subsidat, & peruratur. At ubi bene incaluerit, inijciuntur in eundem calicem quæ supra dixi cochlearia tria, & permouentur. Cum autem calore temperata, & potio datur abducenda, statim dolorem leuat. Hoc facere oportebit per insequens biduum, capientem cibi in prandio, aut alio tempore exiguum, quod facile conficiatur, ne crudusumat medicamentum. Post ea in consuetudine uictus sui, qui colo infestabatur, dimittatur. Oportet tamen non indifferenter remediatis in futurum uiuere: tamen si enim à coli dolore tuti sint, metuere nihilominus debent, ne alia parte corporis eque adficiantur, ad intemperantiam coli, antequam remediati erunt.

Ad tumorem, dolorem iocineris & duritiem.

AD tumorem & dolorem iocineris, item ad duritiem, facit bene lupi iecur primum in aqua feruenti dimissum, atque ita arefactum. Quantum uictoriorum P. trium, ex aquæ caldæ cyathis tribus per aliquot dies dabis.

Item benefacit ad duritiem iocineris ueterem, cum illæ aride, quam satureiam quidam uocant, cōtuse, * P. unius, uel uictoriati, cum mulsi cyathis duobus & totidem aquæ.

Proficit mirificæ hæc compositio ad tumorem, & ad dolorem cum duritia iocineris & lienis. Itē ad renium dolorē benefacit. Nam colorem corporis restituit, qui propter uitia dictarum partium corrumpitur, pallidusque conspicitur. Prodest hoc item medicamentum etiam ad aquæ mutationes: croci * P. X. nardi * P. duum, casiz * P. duum, costi * P. I. schœni * P. I. cinnami * P. I. myrrhæ statz * P. I. mellis optimi * P. XXXV. Datur quantum faba ægyptia, in mulsi mulsi cyathis quatuor. Vitreo uase seruatur.

AD iocineris duritiā ueterem, hydro picos, lienosos, arquatos, & quibus opus est urina: Itē ex partu residua mulieri purgat, & uuluz dolorem tollit sic; Anesi * P. VII. dauci * P. III. petroselinai, item

ni, item iuniperi, item filis, tragacanthi, pon. selibra, panacis * P. VIII. iris, myrrhæ, colli. amomi, singu-
lorum * P. VI. cinnam. * P. III. casia * P. III. smyrnij, quod est semen olusatris * P. VIII. nardi
syriaci * P. III. acon. * P. X. balsami seminis * P. VI. opij * P. V. erui moliti sextarij bes, scyllæ
coctæ pondo triens, uini hij aut lesbij quod satis erit. Pastilli fiunt * P. duum.

Ad auruginem.

CXXVII.

AD auruginem, quod uirium arguatum quidam uocant, caprez montanz stercus arefactum &
tritum, adiecta mica myrrhæ, ex uini meri cyathis tribus - si febricitabunt, ex aquæ totidem. Item ru-
micis radices tres aquæ tribus heminis incoctæ, donec sextarius relinquatur; inde cyathi quatuor per tri-
duum dantur.

Ad lienos ueteres & novos impubium puerorum.

CXXVIII.

Lienosis benefacit tamaricum longe à mari collectum, & arefactum, & contusum * P. unius aut
uictoriati, datum ex aqua, uel ex posca. Prodest & inula arida campana eodem modo contusa & cri-
brata, ex uini mixti cyathis quatuor * P. I. data. Mirifice facit & ammoniacæ guttæ * P. uictoriati,
cū cauliculis tribus rubi ex aceto datū per dies quinque. Tollit enim ex toto duritiā. CXXIX.

POTIO ad lienos; balani, qua unguentarij utuntur, * P. duum, colli * P. I. capparis radices
* P. I. hederæ nigræ baccarum * P. duum, quam syluæ matrem uocamus, * P. uictoriati,
galbani * P. VIII. cardami nigri, id est, nasturcij seminis * P. duum, & uictoriati, piperis nigri * P. I.
scyllæ coctæ * P. XII. Hæc omnia colliguntur scylla, fiunt globuli. Dantur * P. duum uel unius, ex
melle & aceto mixtis cyathis quatuor aut tribus. Eadem facit ad hydropicos bene, ex aqua multa urinā
mouet. CXXX.

Lienosis sanat extra impositus sinapis sextarius unus detritus, adiecto sextario uno lentis aceto co-
ctæ. Oportet autem impositum esse medicamentum, donec dolorem pari non possint: postea folio cal-
do dimittantur, ut plures eos contineant, dum desinat dolor; alioquin exilient: maior enim fit dolor calda
tactis; postea ceratum ex rosa imponere oportebit. CXXXI.

ALIVD eadem ratione impositum melius facit. Sinapis sextarius, git cyathi duo, nasturcij cy-
athi quatuor, myrobalani corticis cyathi quatuor, piperis cyathi duo; sinapi aceto. acri pridie maceratum;
deinde tritum, contusum, cæteris miscetur: in pannō inlitum medicamentum imponitur, fascia quā
longissima alligatur, plurimum in unum commissa, quō tardius soluat. Hoc est efficacissimum, & mul-
torum annorum tollit duritiā. Sed post hoc, si quæ reliquæ remanserint, ammoniaco tollendæ erunt
& rubo. CXXXII.

Inflatus lienosis dare oportebit aquam, in qua candens ferrum demissum, uel lac caprinum, capta
tantummodo hedera pasta. Proderit & his sinapis ficca, contusa, cerato mixta; extra impositum & gyp-
sum aqua conspersum, & acetum, in quo tamaricum decoctum fuerit, uesica abditum, & ita extra im-
positum.

Ad hydropicos.

CXXXIII.

AD hydropicos, cum iam distenti sunt propter aquæ multitudinem (initio enim alia uia prodest)
benefaciunt chamælez, quæ herba est simillima oliuæ, folia quinque uel sex, etiam si arida fuerint, data
ex aquæ mulsæ cyathis tribus, salis coctario adiecto. largiter enim aquam ducit. Item squamæ eris, quā
Græci uocant, pondo uictoriati, data cum apij seminis pari pondere ex aquæ mulsæ cyathis qua-
tuor: plurimum autem aquæ deijcit. Datur & radices succus ex uini cyathis tribus mixtis. Oportet ue-
ro secundum purgationem, spongijs nouis totum uentrem ex aceto & sale eiusdem mensuræ diluto et in-
feruifacito imponere: & constringere extra inflata longa; cibosque assæ carnis dare, cum pane azymo, fri-
cantem totum corpus sale, oleo paribus mensuris, uini meraci quod satis erit dantem. CXXXIII.

Benefacit ad hydropicos hæc cōpositio, & maxime in initijs, quorū sufflatū corpus est, inobdura quæ
Græci uocant; uitis albæ radices P. XX. cocci cnidij * P. III. scyllæ bulbi cocti detracta exteriore parte,
* P. X. myrrhæ * P. VIII. cymini cyathis tribus, anesi cyathis tribus, uini salerni sextarijs duobus, pas-
si sextario uno. Præter myrrham, omnia contusa, non cribrata, macerantur passo & uino, nocte & die:
post die colatur liquor, cui myrrha trita admiscetur; à quo cyathus datū à balneo alternis diebus, singu-
lis adiectis cyathis, donec profectus intelligatur. Oportet autem his diebus dare eis cibos assæ carnis agre-
stis, aut uolucrum, aut uinum austerum meraculum.

Aluum mollientia.

CXXXV.

Quoniam interdum res postulat & per aluum detrabi materiam, ut diutius lippientibus, secundū
sanguinis detractionem, scabiem, ignem sacrum, papulas habentibus, & alia eiusmodi circa cutem summā;
non alienum iudicauimus, horum quoque genus exponere. Sed prius exponemus quæ aluum mediocri-
ter molliunt, simplicia quæ sunt. Molli ergo aluum herba mercurialis lenibus oleribus quamplurima
mixta: item nitri uictoriati pondus, cum refinæ terebinthinæ auellanae nucis magnitudine deuoratur; ca-
lices quoque eis incrustentur, additis quinque uel sex salis farrisque granis, apij seminis paribus mensu-
ris: & is qui uinum non austerum præbiberit, quantum possit ante cibum, & inter prandium, uel coenā,
belle aluum molli. Item ouij lactis sextario fiquis adijciat cnici purgati * P. III. Molli & uentrē
quidem tribus heminis uini, ut aloes uictoriati pondo; uel idem pondus duobus tribus uel sextarijs uini,
& ita totum per partes aqua mixtum bibunt. Videretur autem uinum uetustius, uentremque cū eo satis
molli. Facit autem aloë per se uictoriati uel * P. ex aquæ cyathis tribus frigida uel calida per-

P.V.R.G.A Tergo belle chamælea, quæ herba oliuæ folia similia habet: quorum quinque uel sex dare oportet, trita ex aquæ mulsæ cyathis IIII. frigide, si aduetus erit: si minus, calidæ, adiecto cochleario. **Detrahit enim aquam largiter.** Biles purgat & filicis radix lota & rasa, atque in minimas particulas cõfusa, quantũ placet, aceto aspersa, condito, ut solet, ita cũ **P. quadratæ** consumpta. **CXXXVII.** **B.E.N.E** purgat & hæc compositio: Aloes uictoriati pondus, colofoniæ uictoriati pondus: una teruntur, adijcitur mellis, quod satis est ad colligenda ea. **Datur ex aquæ calidæ uel frigidæ cyathis quatuor.** Hoc medicamentum stomachum non corrumpit.

Globuli mirifice purgantes: qui ut sumuntur, ita integri deijciuntur, nec ledunt stomachum.

Colofoniæ * **P.VIII.** bdellij * **P. duum,** commis * **P. unius.** Hæc trita, succo lactucæ colliguntur, & finguntur pilule, fabæ magnitudinis. **Dantur paribus pilulis usque ad septem, prout uniuscuiusque uires patiuntur.**

Globuli qui etiam cœnatis dantur, & efficiunt manẽ deijci quod satis sit.

Colofoniæ * **P. III.** aloes * **P. IIII.** tragacanthi * **P. duum.** Hæc pridie aqua maceratur, postero die ceteris admiscetur: fiunt inde globuli fabæ magnitudinis. **Datur a tribus usque ad septẽ, prout cuiusque uires patiuntur.** Stomachum nullo modo uexant.

Ad tineas & lumbricos necandos.

A.D. tineas necandas, eiiciendas, per triduum allium plurimum edat, & ueteratum caseum molle, secundum hoc filicis Macedonicæ contusæ, aridæ & cribratæ * **P. VIII.** cum melle, quantum ipse uoluerit, consumat. Post horas quatuor, detur ei aloes & scamonis, singulorũ uictoriati **P. ex aquæ mulsæ cyathis quatuor:** cum coeperit defurgere, aqua calida supponatur. Licet & sine oleo, pfidie incœnato dare utraque medicamenta.

A.D. lumbricos satis commodè facit & sanonica herba, quæ nunc uiget, & cornum ceruinum lima tum lignaria, quantum quatuor uel quinque cochlearia ex aquæ mixtorum decoctorum cyathis tribus, pridie maceratum, deinde tritum, & datum, aqua exigua adiecta.

Ad prolapsionem & libidinem nimiam, defurgendi extremi intestini.

Teneosmos, est irritatio ultimæ partis directi intestini, in quo ultimo sæpius libet defurgere sine causa. Proderit ad hoc, quoties defurrexerit, uino austerissimo & aqua calida fouere, uel uerbis & murti & oliuæ ramulis, factis ita, ut duæ partes murti sint. **Quin etiam penicillum intinctum, & non nimis expressum, ex alterutro eorum ano expositum proderit habere;** uel eodem modo glomus staminis albi: diutius enim uaporem continet. **Perungendus erit anus specillo lycio, patarico, uel indico.** Vel hoc collyrium iniiciendum, quod ad omnem deiectionem, & tormina benefacit: **Acaciæ, mali granati corticis usti, singulorum** * **P. IIII.** hypocythidis, rhois, quo coriarij utuntur, opij, singulorum pondo sena, omphacij pondo quatuor & uictoriati, croci * **P. IIII.** uino austero colliguntur: **fiunt collyria magnitudinis nucleorum pineorum.**

Ad renium tumorem & exulcerationem, etiam si sanguilentiam urinam faciant.

A.D. renium tumorem, & exulcerationem, etiam si sanguilentiam urinam faciant, rosæ aridæ foliorum, papaueris nigri seminis, nucleorum pineorum paria pondera, contunduntur seorsum, & in unum miscentur; inde datur, quantũ nucis iuglandis, ex passu cyathis duobus, & aquæ cyathis tribus.

A.L.I.A ad renium dolorem potio, quæ etiam quasi areniam sabulosam detrahit. Apij seminis, petroselini, anesi, singulorum * **P. XVI.** dauci seminis * **P. IIII.** schoeni * **P. VI.** croci * **P. triginta** duum; mellis quod satis uidebitur. **Dantur quantum lupinus, ex mellis ligula, & aquæ cyathis IIII.** **Ad renium tumorem & dolorem, facit eadẽ, & ad iecinoris, & ad lienis tumorem;** ad eos qui mali coloris propter hæc sunt uitia: item aquæ mutationes. **Croci** * **P. X.** nardi indici * **P. duum,** casis * **P. II.** colli * **P. I.** cumami * **P. unius,** myrrhæ stactes * **P. unius,** mellis optimi * **P. uiginti** quinque. **Dantur quantũ fabæ ægyptiæ, ex mulsi cyatho, mixto aquæ duobus, uel mulsæ aquæ cyathis tribus.**

S.I. cui autem lapis in renibus innatus fuerit, & urinam non facit, medicamentum his rebus fieri debet: **Petroselini** **P. — anesi** **P. — dauci seminis** **P. Z. git** **P. — cinnami** **P. Z. schoeni** **P. Z. croci** **P. V.** apij seminis **P. V. VI.** Hæc omnia tusa, creta, melle atrico despumato **P. II. Z.** colliguntur, & medicamentum uitro condunt.

A.D. tumorem & dolorem uesicæ, & exulcerationem benefacit aqua, in qua ferrum candens demissum est. Hoc ego traxi ab aquis caldis quæ sunt in Tuscia ferratæ, & mirifice remediunt uesicæ uitia. **Appellantur itaque uesicariæ; quondam Milonis Gracchi prætorij hominis optimi ad quinquagesimum lapidem reddentis.**

A.D. tumorem & dolorem uesicæ, & ad eos qui difficulter urinam reddunt: Alterci seminis, apij seminis, maluæ seminis, cucumeris edulis seminis purgati, singulorum * **P. VI.** amygdalorum dulcium purgatorum, nucleorum pineorum purgatorum, singulorũ * **P. III.** opij * **P. I.** croci * **P. unius** & uictoriati; passo contusa consperguntur. **Datur hoc medicamentum** * **P. I.** ex passu cyathis duobus, & aquæ totidem.

A.D. uesicam exulceratam, nucleorum amygdalorum uictoriati pondus, cucumeris edulis seminis purgati cyathus unus, anesi cyathus, papaueris nigri * **P. IIII.** croci * **P. unius,** palmas cariotas **p. rugin** ta. **Has**

ta. Has macerari oportet in passu sextarium unum, atque conterere: his adijcere cætera: ex eodem dare nu-
cis inglandis magnitudinem ex passu cyathis tribus.

CXLIX.

AD sanguinem cum dolore per urinam reddentes: Aluminis fissi pondo uncia, tragacanthi pon-
do sextans. Tragacanthum ex alumine trito cogitur in pastillos uictoriati pondo; hinc uicæ magnitu-
dine detractum datur ex passu cyathis tribus.

Ad calculos experia.

CL.

AD initia uetusta ue comprimenda, & emendanda, benefacit ad calculos herba *σκολοπένδρον*,
quam nos calcifragam appellamus, bellefacit contusa * P. I. ex aquæ cyathis tribus per dies triginta; eo-
dem modo *ἱερὴ βοτάνη*, quam nos uettonicam dicimus. Item eodem genere datur tantū; licet autē aqua
earum decocta uti quotidie ieiunum * P. unius, cum aquæ cyathis tribus.

CLI.

* M V L T O S cum admiratione effectus audiui narrantes, Cai Iuli nasci in lapidicinis b- as ad-
hærentes saxis quasi uerrucas: has quinque ex aquæ cyathis tribus suffundere, & per urinam trahere la-
pides, certum est.

CLII.

Ad calculos, cucumeris feminis, dauci, anesi, apij, petroselinij, myrrhæ, singulorum * P. trium &
uictoriati, casæ, daphnidis, cinnami, nardi, singulorum * P. unius; aqua colliguntur fiunt pastilli lupini
magnitudinis. Ex aqua dantur cyathis tribus per dies quadraginta. Hoc medicamentum cum compo-
nitur, pilum ligneum sit, qui confunditur, anulum ferreum non habeat. Hanc enim superstitionem adie-
cit Ambrosius, medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse. Detrahre au-
tem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidum quasi arenam.

CLIII.

AD calculos, lienosos, hydropicos, urinam detrahit, lapidem extenuat: Eryngij, pyrethri, saliu-
cæ, calcifragæ, singulorum * P. XXV. ebulli, aristolochiæ, singulorum * P. oxymyrfinæ, quæ scopa regia
uocatur, succo. hæc omnia contusa ligno, colliguntur, fiunt pastilli * P. I. Dantur autem ex aceti & mel-
lis cyathis tribus. Calculosis illecebre quantum manus capit, aut auriculæ murinæ idem, aut betonicæ tā-
tundem: earum quælibet herba ex aquæ tribus heminis ad tertias decoquitur, inde sumuntur cyathi tres, &
eodem adijciuntur uini cyathi duo, & nitri uictoriati pondo, atque his dilutum medicamentum datur P. I.
per dies XLV. In arenam soluit lapidem, & hydropicis ex mulsi mixti cyathis tribus dandum est.

Ad lumborum dolorem diuinum, & paralyfin.

CLIII.

AD lumborum dolorē, cucurbitæ syluestris floccorum, aut feminis * P. duum, brathys * P. I.
salis * P. I. Fiunt catapotia melle decocto adiecto. Valentibus tota datur compositio, imbecillioribus
autem dimidia. Sed mane per clysterem alius ducenda, ouorum albis temperatum.

CLV.

AD lumborum dolorem & paralyticos, cucurbitæ syluestris * P. III. pyrethri * P. III. myr-
rhæ * P. duum uel unius. Dantur ex passu cyathis tribus: licet hinc catapotia fieri, dum idem ponder-
is deuoretur. Sed & his alius acii clyfimo manē trahenda est.

CLVI.

AD lumborum dolorem & paralyticos, antidotos Hiera Pacchij Antiochi melius omni medicamē-
to facit. Sed ad paralyfin mirificè hoc acopum facit, quod oportet in sole diu fricare, aut loco flamma præ-
calfacto; olei fabini * P. XXV. cucumeris syluatici recentis radicis * P. XV. Hæc radix magnitudi-
ne nucis inglandis concisa, uasē fictili nouo ex oleo coquitur, donec succum omnem remittat, & quasi ari-
da sit: post hoc adijcitur per linteum uel colum transmissio oleo, in quo adijcitur, dum calet, ceræ ponticæ
in frusta redactæ pondo libra, olei laurini pondo libra, olei cyprini pondo libra, olei lilij P. libra, olei uete-
ris P. duo, piperis albi cōtusi, & per cribrum tenuissimum transmissi * P. as. pyrethri contusi, & per idē
cribrum transmissi * P. unius. Hæc in unum miscentur, reponuntur uasē fictili. Facit præterea ad
lumborum, & ad omnem dolorem corporis, & præcipue neruorum. Muliebres locos durissimos mol-
lit, cum diu alijs medicamentis nihil profectum est.

CLVII.

AD lumborum dolorem malagma quod propriè facit: Picis liquidæ sextarios duos, olei ueteris sex-
tarium unum, resinæ terebinthinæ sextarium unum, ceræ P. libræ & trientem, magmatis P. bessem, aphro-
nitri P. trientem. Coquitur pix cum oleo, donec spissa fiat: & postea adijcitur ei resina, deinde cera, &
secundum hanc ex interuallo magma. Vbi habet emplastri figuram medicamentum, tollitur ab igne,
cum tepere coeperit, & aphronitrum aspergitur sensim, ne superfundatur quod in cacabo est.

Ad podagram.

CLXIII.

AD podagram caldam cum feruore, & timore rubicundo, quam caldam uocant, benefacit primis
diebus herba urceolaris, item caseus mollis recens per se, postea herbæ salis pusillum admiscere oportet.
Item facit apium uiride per se & cum polenta. Nec minus solanum, portulaca, plantago, spongia uel
rhodia, uel africana mollis ex aqua frigida, lana succida ex rosa & uino. Subinde autem hæc omnia mu-
tare oportet prius, quàm excalescant. Prodest & omentum caprinum. Item faba mōlita cum suis ual-
uulis ex aceto cum melle diluto conspersa & imposita; ducit enim sanguinem, & dolorem leuat. Benefa-
ciunt & mala citria quàm maximè cocta, ex aceti sextarijs tribus, donec madida fiant: quibus tritis adijci-
tur aluminis fissi P. uncia, myrrhæ P. sextans. Benefacit & aloë aceto diluta, & per pinnam pedibus in-
ducta. Item opium lacte muliebri dilutum. Mirificè uero hoc facit cataplasma, id est, superpositum medi-
camentum: *ἡ τοῦ*

CLIX.

TOLLIT enim triduo dolorem lomenti hemina, feniculi feminis cyathi duo, polētæ tenuis cya-
thi duo. Commiscentur hæc in unum contusa, mōlita, trita, deinde consperguntur aqua pluuia: & ita
temperantur, ne durum sit medicamentum, aut aquatum nimis: Impositum protinus leuat, triduo tol-

lit dolorem. Hoc constat, si quis ter in mense inter denos dies usus fuerit, in nocte non laboratu-
rum.

CLX.
AD frigidam podagram, quæ sine tumore & rubore consistit, cataplasma: Piperis nigri moliti he-
mina, foeniculi seminis contusi hemina. Coquuntur ex aqua: utraque ubi temperata sunt, adijcitur axun-
gia suilla: & dum calet panno spisso indueto medicamentum imponitur. Benefacit ad idem genus & lini
seminis, & foeni græci seminis, farinæ ordeaceæ, singulorum bini sextarii, cribrati in unum commiscuntur:
inde coquere oportet quod satis erit ex aqua & oleo: subinde calidum cataplasma etiam imponere. Ad
hos benefacit & hybisci radix ex aqua multa cocta & imposita. Item sabucum cum axungia uetere tri-
tum & impositum. Adiectus & brassicæ cinis cum axungia, uel semen caulium. Vbi autem impetus
cessauerit, & in hoc, & in priore genere podagræ, calda aqua marina diu fouēdi sunt: uel, si hæc non erit,
aque pure feruenti salem adijcito. post epiphemate uti oportet, quod ad parotidas scriptum est: Tollit
enim cito reliquias per sudores, & in futurum confirmat nervos, nec patitur facile uitari.

CLXI.
SCIO quendam hoc quasi acopo medicum usum in noctem, nec postea tentatum podagra, cū an-
te diu esset uexatus. Lanam succidam pondo libra, uini ueteris sextario diu lauabat: deinde expressam
reijciebat: uino autem residuo adijciebat aphronitri usti pondo sextantem, olei ueteris P. libram: repo-
nebat in oleario fictili: utebatur, ut superius dixi, in nocte. Multis profuit ad corpus in duplici calceo
pellem caninam habere.

CLXII.
A Dutramlibet podagram, torpedinem nigram uiuam cum accesserit dolor, subiicere pedibus opor-
tet, stantibus in littore non sicco, sed quod alluit mare, donec sentiat torpere pedem totum & tibiam
usque ad genua. Hoc & in præsentī tollit dolorem, & in futurum remediat. Hoc Anthero Tiberij li-
bertus supra hæreditates remediatus est.

Genera medicamentorum, & demonstrationes serpentum ictus, morsusq.

CLXIII.
V T sis tutus, etiam si quando rus secesseris, ponam theriacarum compositiones, id est ad serpen-
tum morsus, atque ictus medicamenta. Sed prius quæ cognita habui remedia, ne cui serpentes nocent,
dicam. Habere ergo incinctum oportet peucedanum, uel cerui cum captus est, in oculi angulo, qui est
ad nares uersus, quæ inueniuntur sordes uirosi odoris; has Siciliæ uenatores diligenter colligunt, & habet
in cincto, propter antedictam causam. Item præstat & hiera botane, & trifolium acutum, quod Græci
Græci appellant: nascitur & hoc Siciliæ plurimum, nam in Italiæ regionibus nusquam eam uidi herbam
frin Lunæ portum Britanniam peteremus cum deo nostro Cæsare, plurimum super circumdatos mon-
tes. Est autem folijs, & specie, & numero similis communi trifolio: nisi quod huius pleniora sunt, & quæ
si lanuginem quandam super se habent, & in extrema parte uelut aculeum eminentem. Sed huius fru-
tex duorum pedum interdum, aut etiam amplior conspicitur, & odorem grauem emittit; quorum nihil
circa patens trifolium inuenitur. Sed utrasque superius dictas herbas, quas cum inueneris, pridie notare
oportet, & circumscribere sinistra aure fruges aliquas ponentem, atque postero die ante solis ortum, sinis-
tra manu uellere ita illigatas habere.

CLXIII.
I N Africa, aut sicubi scorpiones sunt noxij, stellionem aridum incinctum oportet habere.

Theriace prima.

CLXV.
Theriace facit ad omnium serpentum morsus, & ictus, & adflatus: Mirifice eadem prodest & ad
contusiones, & ad conuulsiones interiorum partium laterisque ex qualibet causa, & pectoris dolores.
Vitis albæ radices pondo octo, trifolij acuti seminis, quod & ipsum in extremo aculeum habet, uel eius-
dem radices trepodo, panacis P. IIII. terre mali * P. V. roris mariu radices * P. IIII. laferis * P. IIII.
gingiberis * P. IIII. rutæ syluaticæ * P. sex, cumini thebaici * P. III. myrrhæ * P. III. cumini z-
thiopici * P. V. castorei * P. III. eryngij radices * P. III. serpylli * P. III. erui albi seminis moliti
* P. XII. Chio uino consperguntur confusa ac trita: sunt pastilli * P. unius, aut uictoriati. Dantur
ex uino mero uetere, uel ex mixto, uel aqua: quæ si non fuerint, per se commandandus erit pastillus
& deuorandus.

Theriace secunda.

CLXVI.
A L T E R pastillus, ad eadem facit: Cinnami * P. IIII. serpylli * P. IIII. staphisagria quæ her-
bam pediculariam quidam uocant, quod pediculos necat, à quibus hoc nomen trahit, seminis * P. IIII.
& uictoriati, piperis albi * P. VI. peucedani lactis * P. VIII. & uictoriati, glycyfida nigra seminis,
quam pronium Græcorum quidam appellant, * P. unius & uictoriati, terre mali * P. trium, nasturij
seminis * P. IIII. cächryos * P. duum & uictoriati, castorei * P. duum, saluicæ * P. quinque.

Hæc nonnulla desunt compositiones: Theriace tertia ad aspidem, Theriace ad uiperæ morsum proprie, Antidotus
Zopyri, & media pars antidoti mithridatij; quorum aliqua hæc ex Galeno secundo antidotorum
restituuntur à Ioan. Ruellio.

Alteræ Theriace, etiam ad aspidem.

CLXVII.
Antidotus altera ad aspidis morsum, siue præsumpta siue post data: gentianæ * P. IIII. trifolij,
* P. IIII. seminis eiusdem * P. duum, polij * P. IIII. mali terræ * P. duum, peucedani radices, gal-
bani, singulorum * P. duum, petroselinij * P. IIII. rutæ syluaticæ * P. trium, pyrethri * P. unius,
herbæ pediculariæ, quam uocant *scapula ægyptij*, tantundem, maceris * P. III. uitis albæ radices * P. duum,
piperis

CLXVIII.

Non residues:

CLXIX.

CLXX.

0.11.94 - 2000/01/01

compositioni, quæ est apud Galenum citato loco, consentiunt.

मोक्षद्वयः ॥

CLXX XI.

CLXXII

CLXXIII

NARDI syriacę, croci, myrrhę, costi, casiz, cinnami, schoeni, piperis albi, piperis longi, castorei, galbani, refinę terebinthinę, opij, singulorum * P. III. alterci albi * P. II. anefi * P. I. apij feminis, tragacanthi, singulorum * P. sex, mellis attici sextarium unum, vini falerni unciam. In hoc maceratur tra

gacanthum & opium pridie: postero die confusi ceteris, miscentur in melle galbanum & resina, fusa patella super carbones imposita, resoluuntur: deinde arida asperguntur: & si opus est, adijcitur mel: & in cerati teneri spissitudinem habeant, & rursus patella super ignem imponitur: mouenturque quæ sunt in ea, spatha fraxinea. Coquitur medicamentum, donec crocinum habeat colorem: ultima quæ sunt uino macerata adijciuntur: uase uitreo antidotus reponitur. Datur fabæ egyptiæ magnitudine ex aqua. Facit autem etiam ad stomachi omne uitium, & præcipue quod cum fluore consistit: Facit & ad oculorum epiphoras, & ad tormina, & ad coli inflationem, iecinoris, pectoris dolorem, tussienteis, aduersus mala medicamenta omnia, serpentium morsus uel ictus. Oportet autem locum morsum à rabioso cane, uel à serpente, diu tenere in exulceratione: neque pati cicatricem ducere, ut uirtus illa pertahatur. **CLXXIIII.**

Extra itaque ea sunt imponenda, quæ etiam sana corpora exulcerant, ut allium, lepidium, chelidonium, batrachium, sinapis, scylla, cepa cum aceto. Optime facit & per se caprifici liber per se contritus & impositus hulceri. Item laser per se.

Compositio emplastri.

Emplastrum antidotum, sed multo magis emplastri huius uis facit, quo Augusta propter huiusmodi casus habuit compositum, & multis profuit. Accepimus à Triphone præceptore nostro. Iris Illiriæ * P. V. castorei Pontici * P. V. caprificus lactis aridi * P. V. canis nigri adipis * P. VIII. eiusdem sanguinis * P. X. resine terebinthine * P. VIII. leporis coaguli * P. III. salis ammoniaci * P. duum, laseris syrenaci * P. duum, aut syriaci * P. III. cere ponticæ * P. XXXVI. Olei ueteris cyathi duo, aceti scillitis cyathi tres. Arida ex aceto teruntur: quæ liquefieri possunt, oleo ad ignem si quæfacto miscentur, mortario tritis & temperatis, in mellis spissitudinem. Vitreo reponitur. **CLXXV.**

Antidotus Cassij.

Antidotus Cassij medici, facit aduersus toxicum potum. Eadem si quis uenenato telo percussus est. Præterea ad omnis serpentis morsus aut ictus. Præcipue ad canis rabiosi morsus, bis die sumpta * P. unius ex aqua mulsæ. Facit ad pectoris & lateris dolorem, & tussim, & omnia interanea, inflatione, alioque dolore, aut quouis correpta. Nardi spicz syriacæ * P. III. costi * P. III. cinnami, gentianæ, cabæ, myrrhæ, singulorum * P. trium, croci * P. trium, uuez passæ purgatæ * P. duum, schoeni * P. duum, opobalsami * P. duum, myrsis, dauci, singulorum * P. duum, cumini æthiopici * P. duum, acori * P. III. & uictoriati, asari * P. unius & uictoriati, petroselinæ * P. unius & uictoriati, piperis longi * P. I. & uictoriati, piperis albi * P. unius & uictoriati, phu pontici seminis * P. trium, rapæ seminis * P. III. nardi folia * P. III. scillæ uictoriati * P. podus, foeniculi seminis * P. III. mellis attici quod satis erit, ad uenenum & ad serpentes, ex uino: ad ceteros dolores interaneorum, ex aqua. **CLXXVI.**

Antidotus Marciani medici.

Antidotus Marciani medici, cui quia nihil deest, & dicitur græce, id est perfecta. Facit ad omnia hæc uitia, ad quæ superiores antidoti omnes. Hoc Augusto Cæsari componebatur. Cinnami * P. VIII. amomi * P. VI. calicæ nigræ * P. XXV. croci * P. XVI. schoeni * P. V. thuris * P. V. piperis albi * P. duo, myrrhæ * P. X. piperis longi * P. X. nardi indicæ * P. X. S. nardi celticæ * P. XVI. rosæ aridæ * P. VI. costi albi * P. duum, opobalsami * P. III. laseris crenaci uictoriati, pondus, uel syriaci * P. I. stœcados * P. sex, gentianæ * P. V. trifolij acuti radices * P. III. uel emulsæ seminis * P. trium, scordij * pond. X. polij * pond. V. asari * pond. duum, acori * pond. III. phu * P. III. misy * pond. duum, distamni * P. XII. ammoniaci guttæ * P. trium, agarici * pond. duum semis; balsami seminis grana p. XX. petroselinæ * P. VI. & uictoriati, rutæ syluaticæ * P. trium semis, foeniculi seminis * pond. trium semis, dauci cretici * pond. III. anesi * pond. duum, cumini æthiopici * pond. duum, rapæ seminis * pond. V. & uictoriati, napi syluatici seminis * pond. trium, anatis foemine recentis * pond. II. anatis masculi sanguinis aridi * pond. III. hœdi masculi sanguinis aridi * pond. III. testudinis marinæ sanguinis aridi * pond. VI. S. anferis masculi sanguinis aridi * pond. III. mellis attici quod satis erit. Facit ad omnia. Hæc ego composita habeo. **CLXXVII.**

Quoniam antidotos, quas optimas sciuimus, posui in facientibus ad omne malum uitium: aliud medicamentum etiam ex multis rebus, simplicia quoque medicamenta, & propria remedia monstravi. Interdum enim hæc melius aduersus quædam, quam antidotos faciunt. Trademus autem singulorum malorum medicamentorum epotorum signa, quod facilius intelligatur, quid quisque sumpserit, & quæ ratione adiuuari debeat. **CLXXVIII.**

Ad cicutam.

Cicutam ergo potam, caligo, mentisque alienatio, & artuum gelatio insequitur, ultimoque præcantur qui eam sumpserunt, nihilque sentiunt. Adiuuari autem debent in initijs uino mero subinde quamplurimo caldo, & per se, & cum pipere, & cum styrace potu. Atqui maxime prodest lac aluminum datum: si minus, uaccinum, aut quodlibet. Oportet autem & aluum acri clustere ducere, eorum, & extra super uentrem imponere farinam hordeaceam, uel triticeam costam ex uino caldam. **CLXXIX.**

Ad opium.

OPIVM potum, quod quidam meconium uocant, ab odoris grauitate intelligitur: papaueris enim uiridis, cuius succus est, qualitatem representat. Facit autem capitis grauitatem, gelationem & liuorem artuum, sudoresque frigidos manare. Præterea spirationem impedit, mentem soporat, sensusque abalienat. Adiuuari porro debent, qui biberunt, aqua cum oleo in uinum admixtis, sepius datis, & frequenter

quenter reiectus per pinnam aut lorum uomitorium. Prodest & uini cyathus, & passus, & olei cyathus eadem ratione datus. Item uinum & acetum pari mensura datum ex aqua mulsa cum rosa eius mensuræ, ita ut ista subinde cogantur reijcere. Præterea caput rosa & aceto sine intermissione curetur, eorumque pedes adfidere fricentur manibus siccis, aut linteo aspro inuolutis. Prodest & sinapi ex aceto tritum, circumdatum pedibus cruribusque, & a somni tempore prohibere ne obdormiantur.

Ad altercum.

CLXXXI.

ALTERCUM, quod Græci *υοσκιμον* uocant, qui biberunt, caput graue uenisque distentum habent, mente abalienantur cum quadam uerborum altercatione, inde enim hoc nomen herba trahit altercum: postea sopiuntur, & omni sensu carent, iuucentibus membris eorum. Adiuuantur autem lacte potio asino quamplurimo, uel quolibet alio recenti per se, uel decocto. Sed ij prius aqua mulsa sepius pota cogantur per pinnam reijcere. Opio lassi similiter curentur.

Ad gypsum.

CLXXXII.

GYPSEO potio, stomachus, uenterque dolore nato urgetur, frigidus sudor subsequitur, oculi sanguinenti conspiciuntur, urina alba redditur, concrefcit in aliqua parte uentris quod potum est, & tactu, quasi saxum percipitur. Adiuuari autem debent, qui his malis uexantur, lixiuio e' sarmentorum cinere facto quamplurimo potio. Item aqua thymum, aut origanum decoctum habente.

Ad strumam argenti.

CLXXXIII.

SPVMA argentea potio, quam Græci *κιδάργυρον* dicunt, uentris infert grauitatem, inflammatione, postea dolorem cum urinae difficili exitu procedente tempore, coloris quidem quasi plumbei sunt: præcipue hæc deformitas circa faciem deprehenditur. Suppurant autem plurimæ partes eorum. Adiuuantur secundum reiectione, aqua mulsa, acrique curatione, pipere, myrrha, apij semine, pondere pari in unum mixtis, ex eoque medicameto, * P. unius dare cum uini cyathis tribus quatuorue quotidie potis.

Ad cerussam.

CLXXXIV.

CERVSSA, quam Græci *ψιμυδιον* uocant, qui biberunt, facile deprehenduntur, linguam enim albam habent, commissurasque dentium albicantes. Præterea nausant, reijciunt potio medicamento, caligant, magis magisque uertigine quadam urgentur. Postea spiritus uia intercluditur, & præfocantur. Adiuuatur autem post uomitum ab oleo, uel ab aqua mulsa, cremore ptisanæ calido largiore accepto, sed bene uncto. Item lacte cum melle potio. Facit & malua discocta, concisa, sale & oleo pipereque condita, & pro forbitione data per se, uel cum urtica, herbaque mercuriali. Profunt & nucleorum persicorum interiora ex uino trita atque potio quâ plurima. Item lixiuia calda ex cinere sarmentorum facta.

Ad coriandrum.

CLXXXV.

Coriandrum datum apparet quidem ab odore spirationis totiusque corporis. Redolet enim & hoc herbam, ut infectum. Intelligitur autem ex gustu. Facit porro raucitatem, & mentem mouet. Adiuuari autem debent, qui biberunt, ex uino merò atque plurimo, uel aqua marina, uel muria dura potio. Item ouis anserinis forbilibus plurimum salis habentibus, uel iure gallinaceo, agnino uel quâpinguissimo, & falsissimo per se potio.

Ad leporem marinum.

CLXXXVI.

LEPORIS marini gustus non ab similibus illotis piscibus, aut etiam putentibus: qui sumperunt autem, stomacho uesticaque adficiuntur, ita ut urinam quidem difficulter, & cum dolore, purpureique coloris reddant. Stomacho item tento & dolenti sunt, auersoque ab omni esca, præcipue pisce. Nausant præterea & subinde reijciunt spumosa, interdum biliosa aut sanguinea, & maxime cum simulauit, aut nominauit aliquis piscem. In somnis litoris pulsi fluctus uidentur subinde audire. Oculi eorum exulcerantur, genæ inflantur. Coloris mali, & ueluti plumbei sunt, minutatimque per tabem quasi phthisici consumantur. Adiuuari autem debent hoc malo circumuenti, lacte muliebri, uel equino, uel uaccino, aut asinino quamplurimò quotidie per se, aut cum melle sumpto. Prodest & malua forbitio bene uncta & falsa. Item profunt malorum punicorum grana adfidue data. Benefacit & pix cedria, si quis inde bina, terna uel cochlearia eius sumperit per se, uel ex passis cyathis duobus tribusue. Item benefacit iuniperi trita quamplurimo cum passo, aut per se data.

Ad salamandram.

CLXXXVII.

SALAMANDRA quibus data est, lingua exasperatur, corpus inualidum fit: præter hoc, torpet rigoribus quibusdam, & liuoribus quasi maculis uariatur. Adiuuari autem debent, quibus impacta est, melle quamplurimo per se, uel cum resina ex pinu, cuius etiam tenera folia cum herba, quam Græci *χεματισαν* appellant, decocta ex aqua mulsa profunt. Item lini seminis farina ex aqua mulsa sumpta quamplurimò bene adiuuat.

Ad aconitum.

CLXXXVIII.

ACONITI gustus est auster atque subamarus. Potum autem, protinus facit corpus graue & displicens. Mordet autem stomachum, & cor adficit: itaque sudor euestigio insequitur multus & frigidus, maxime circa oculos & frontem apparet. Inflantur intestina, & uenti plurimum emittunt, qui biberunt, capitisque dolorem habent cum uertigine quadam adfidue quidem, sed præcipue cum se e lectulo leuare conantur. Proprium est autem huius mali medicamento, protinus liuidos articulos & artus facere. Sed adiuuantur facile qui id sumperunt, ruta quamplurima potio cum uino: item iure gallinæ

pinguis uel bubule. Prodest & his uinum chamæpithyn decoctam in se habens, item acetum melle mixtum, in quo ferri sterus, quod *oricapla* Græci uocant, ustum, prius inferuescat sapius, & ita detur. Item proficit abrorani pondo sextans ex uino datum; & origani pondo sextans eodem modo datum. Precipue autem adiuuabit, si quis coagulum leporis, hinuli, & porci in unum miscuerit, & dederit ex uini hemina aut cyathis tribus. * P. I. uel uictoriati pondus.

Ad cantharidas.

CLXXXIX.

Cantharides gustum & odorem similem pici e cedro facte habent. Pote stomachi dolorem, morusque excitant, precipue uesice. Quamobrem qui biberunt eas, difficulter urinam & cum sanguine reddunt, exulcerata scilicet uesica: preterea animo subinde linquntur deficiuntque. Adiuuatur autem cum sepius reiecerunt, passo cum oleo poto uel omni lacte: sed debent plurimum eius sumere. Item profunt eis nuclei pini per se sumpti, uel ex aqua mulla, aut ex passo triti & dati. Item cucumeris semē purgatum, & lini semen ex passo datum. Adiuuat bene & ius pingue agninum, uel ex bubula factum, & farina triticea pulvis more cocta, plurimum anserini adipis habente. Prodest & famie crete. * P. III. cum passi cyathis quatuor mixtisque aqua datum. Item oleum irinum ex ruta tritum & potum.

Ad buprestis.

CXC.

Buprestis gustus est nitri similis. Facit autem tumorem stomachique infinitum dolorem, & inflat totum corpus in speciem hydropici. Adiuuantur aqua ficis aride decocte, & ipsa ficu plurimum sumpta. Item passo plurimum & lacte muliebri, & iure suillo pingui accepto, & nitri. * pon. III. & aquæ hemina dato, & ceteris que supra ad cantharidas scripta sunt.

Ad dorycnion.

CXCI.

Dorycnion, gustum quidem habet lactis: potum uero, singultus crebros facit, & uomitus frequenter concitat. Reijciunt autem ab stomacho ramenta, que etiam simillima torminosis, subindeque animo deficiuntur. Adiuuari autem debet lesi eo, lacte asinino, equino, bubulo, conchilijs omnibus crudis, atque decoctis.

Ad ixiam.

CXCII.

IXIA, quam quidam chamaeleonta uocant, odorem habet, cum sumitur, ocymi: pota autem, lingue tumorem facit. Mentem abalienat, uentremque & omnes naturales exitus supprimit. Adiuuantur autem lesi ab ea, absinthio. poto cum uino. Item castorei. * pon. II. dato ex uino cyathis quatuor, & ruta fruticibus quinque uel sex. Facit bene & chamælea. * pon. trium, ex uini cyathis tribus aqua mixtis; nec minus radix laseris ex uino data. Tragoriganum eodem modo datum.

Ad ephemerum.

CXCIII.

Ephemerum potum, protinus quidem totum os priuare facit, uelut scylla tactum, postea etiam adurit, quasi pipere manducato; secundum hæc quoque stomachum mordendo exulcerat: atque qui id biberint, primum ab ore sanguinem expuunt, deinde ex stomacho cruorem reijciunt, postea per fellas & iam abundantius eundem deijciunt. Adiuuabuntur autem lesi ab eo, polygonij succo quamplurimo per se poto, uel arido trito pondo libræ, dato cum aqua. Pramacerantur autem mala cydonia aut uitis ca preoli, aut myrri bace, aut eiusdem folia.

Ad toxicum.

CXCIII.

Toxicum, cuius sit gustus, haud facile quis dixerit. Verum cum potum est, eueffigia ciet dolorem omnium interaneorum infinitum, & uelut telo trajectorum, concitatque mentis furorem, cogitque exululare, & palpitare lingua similiter decollatorum caputibus: nihil enim potest intelligi, ex uoce eorum. Adiuuantur autem qui id biberunt, rosa pota, aut oleo irino, coactique frequentius reijcere. Item aluo acri clysmo sepius ducta, postea passo, lacte, & antidoto mithridatio.

Ad pharicum.

CXCV.

Pharicum & ipsum dicitur ex copluribus componi, gustumque habere nardi. Potum autem, facit spasmus, cito exanimat. Adiuuantur uero lesi ab eo, saluincia id est, nardo syluestri quamplurima ex uino sepius data. Item olusatris radice aut semine ex uino dato, Benefacit & hoc medicamentum: galbani puri. * pon. duum, myrrhe. * pon. unius cum passi cyathis quatuor datum. * pon. I. & hoc etiam ad omne medicamentum facit.

Ad tauri sanguinem.

CXCVI.

TAVRI sanguinis potum quamuis quis, difficile celauerit, hunc tamen uestigia cruoris relicta inter dentium commissuras produnt. Nauseant autem & prefocantur, qui biberunt, cum gelatur. Sed adiuuantur aceto calido sepius poto & injecto per se, uel cum nitro laseris uel radice.

Ad lac potum.

CXCVII.

LAC potum & gelatum, odore spirationis (si non confitebitur qui laborat) cognoscetur: prefocantur autem & hoc homines. Adiuuari autem debent, qui ab ea laborant, menta quamplurima sepius sumpta. Item coagulo agnino, leporino, porcino, uictoriati ponderē ex aqua bis ter ue dato. Prodest & laseris radix cum posca, & alius acri clysmo ducta.

Ad fungos.

CXCVIII.

FVNGIS uenenatis cum quis laborat, primum nauseat, nec quidquam magnopere reijcit: postea stomachum uentrisque & precordiorum infinitos habet dolores; manant sudores frigidi per artus, qui & ipsi gelatur celerrime, nisi cito succurratur. Adiuuantur autem radice ea, quā nos edimus, acri quamplurima.

plurima per se, uel cum sale manducata: eiusque semine, si ipsa non fuerit, poto ex uino. Item ruta ex aceto trita & pota proficit. Nec minus lixiua cineris ex sarmentis pota. Adiuuat & nitrum aceto dilutum & datum: eodemque modo æris flos datus, & mel cum aceto dilutum quamplurimum deuoratum. Oportet autem & oleo ante multo poto cogere eos reijcere, quantumcunque potuerint, & eodem calido subinde artus perunctos expressius fricare.

Ad irudinem.

CXCIX.

Irudinem, quam quidam sanguisugam uocant, deuorata, & adherentē faucibus, eoque ipso molestiam, titillationemque quandam præstantem, excutere oportebit aceto quamplurimo epoto per se, uel cum sale, aut nitro, aut lasere. Idem faciunt & niuis glebulæ quamplurimum deuorate.

Medicamentorum malorum non nocet nomen, aut figurarum notitia, sed ponderis scientia: hanc porro medicus nec querere, nec nosse debet, nisi dijs, hominibusque inuisus merito esse uult, & contra ius, fasque professionis egredi. Illas autem figuras, dico, & nomina necesse est ei scire, ut & ipse deuilet, ne per ignorantiam aliquam fumat, & alijs idem præcipere possit: hoc enim proprium est Medicinæ, & illud execratissimi pharmacopolæ contrariò oppositi uirtuti eius, ut & in cæteris artibus animaduertitur: nulla enim est, quæ non habeat aduersantē sibi sua specie similitudinis malignā professionē.

Ad suspicionem mali medicamenti.

CCC.

Quoties autem suspicio mali medicamenti accepta fuerit, primum assumere oportet quæ nauſeam faciunt, uel oleum per se, uel cum aqua, & reijcere: deinde ea quæ uentrem molliunt, tanquam lac, albius pingue & salum, chamæleam non cessantem iniicere clystere. Postea remedia propria ad singula quoque & antidotos sumere.

Implicitas Medicinæ partes inter se & ita connexas esse constat, ut nullo modo diduci sine totius professionis detrimento possint. Ex eo intelligitur, quod neque chirurgia sine diætetica, neque hæc, siue chirurgia, id est, sine ea parte, quæ medicamentorum utilium usum habet, perfici possunt: sed aliæ ab alijs adiuuantur, & quasi consummantur. Itaque quauis ex magna parte ad diæteticos pertinentes compositiones iam exhibuerimus, tamen quasi claudicat & uacillat hic liber, nisi eas quoque compositiones, quæ ad chirurgos pertinent, posuerimus, quarum initium ex emplastris faciemus.

Emplastrum Triphonis.

CCCI.

Emplastrum chirurgi Triphonis subuiriæ: quod facit, cum uulnus ita actum est, ut os lædatur, uel frangatur, præcipue caluariæ. *νεφελον* ideo à Græcis dicitur. Idem si os scabrum, aut putre uetustate uitij factum est, expurgat & educit, quantum eius alienum est. Facit præterea ad canis morsum, & ad huius recens molle. Squamæ cyprij * pon. XII. thuris * pond. VI. ammoniacæ guttæ * P. VI. refinæ pituiæ, id est, ex picea arbore * P. X. S. refinæ terebinthinæ * P. VI. adipis uituli pon. quadrans, ceræ pond. triens, olei pond. semuncia, aceti cyathus unus & dimidius: acetum intritum consumatur ad omnia, quæ teri debeant, dum leuia habuerint mellis spissitudinem: cera, & utraque resina cum adipe purgato & oleo liqueſcant, & incoquantur, donec habeant spissi cerati temperaturam. feruentia superfunduntur rebus, quæ sunt in mortario minutatim, & pistillo subinde, dum calet, & permiscebuntur. Atque ita dum definit feruere, emplastrum manibus subigitur: & redactum in rotundas ampliores, quas magdalidas dicunt, reponetur.

Emplastrum Megetis chirurgi.

CCII.

Emplastrum Megetis chirurgi subuiriæ, ad eadem facit, componitur similiter. accipit hæc: Squamæ æris cyprij * P. XXV. ammoniaci guttæ * P. XXV. terræ mali, quod *ἀριστολόγιον* Græci dicunt * P. XX. iris * P. XX. aluminis fissi * P. XX. myrrhæ * P. XXII. refinæ terebinthinæ * P. III. pituiæ refinæ * P. III. adipis taurini * P. III. ceræ * P. III. olei ueteris sextarium unū, aceti acris sextarios III. Componitur hoc medicamentum cum Caniculæ sydus oritur, teritur in sole, donec acetum omne cōsumatur. In quibusdam hoc emplastrum efficacius, in quibusdam superius positum inuenitur.

Emplastrum uiride Triphonis chirurgi.

CCIII.

Emplastrum uiride Triphonis, facit ad uulnera recentia, quo utebatur etiam in gladiatoribus, coloris boni: *ὑγρον* ideo etiam appellabat. Recipit hæc: æris uisti P. sextantem, aluminis rotundi P. sextantē, salis ammoniaci pon. sextantem, thuris pollinis P. sextantem, æruginis rasæ P. trientem. Hæcteruntur ex aceto aliquot diebus, postea ceræ P. duo, refinæ frictæ P. duo, cum olei ueteris P. dextante. liquefacta ab igne, mortario superfunduntur, & mixta, manibus subiguntur.

Emplastrum uiride Traſææ chirurgi.

CCIIII.

Emplastrum uiride Traſææ chirurgi ad recentia hucera minus acre: æris uisti * P. XII. salis ammoniaci * pon. IX. Hæc terere aceto per aliquot dies oportet, donec uiridis color appareat, postea adijcere aluminis fissi * pon. VII. Vbi iam omnia leuia facta fuerint, & mellis liquidi temperaturā habuerint, ceræ pon. libra, refinæ frictæ pondo libra, cum olei cyathis quinque liquefacta super ea adijciuntur, & rurſus mortario subiguntur. Refrigeratumque manibus subigitur ac reponitur.

Emplastrum Triphonis chirurgi uiride.

CCV.

Emplastrum uiride Triphonis facit ad recentia uulnera, morsus hominum, sed præcipue ad uetera hucera, quæ nullo modo cicatricem ducunt, & callos eminentes circa se habent. Oportet autem tunc nō linteolo, ut cætera, illinere, sed dilatātū magis manibus in magnitudinē uulneris satis crassum iponere

u ij

superque linteola carpta plurima, deinde spongiam nouam, ex uerbenis, murto, oleaque factis. Constat ex his: æruginis * P.III. squamæ æris * P. sex, thuris pollinis * P. VI. galbani * P.III. aluminis rotundi * P.III. refinæ pituinæ * P. XXV. ceræ * P. XXV. olei P. sextante, terebinthinæ P. selibra; aceti quod satis est. Componitur eodem modo, quo & superius scripta uiridia emplastra sunt.

Emplastrum uiride Gliconis chirurgi.

Emplastrum uiride, quod sui generis, meo iudicio, superat omnia, uocatur Isis. Accipit hæc: æris usti, æris cyprij, æruginis rasæ, salis fossitij, guttæ ammoniaci, thuris masculi, mali terræ rotundi, quæ Græce dicitur, mali terræ fermentorum, quibus unguentarij utuntur (dicitur autem aristo lochia clematidis), aluminis rotundi, singulorum pond. unciam, myrrhæ, galbani, aloës, singulorum pond. sextantem, ceræ pond. trientem, refinæ colophonici P. III. uel duo & bessem, olei sextarium unum. Hæc enim galbano, refinæ, ceræ, & oleo super ignem liquefacta, miscentur mortario, præterea cæteris ex aceti sextario uno. Facit hoc emplastrum ad detectam membranam tegentem cerebrum, de industria à medicis cum terebratu exciditur, quod lædit eam os, uel alioquin detectam, rosa dilutum & impositum. Item facit ad capitis diutinum dolorem, quem κεφαλαλγία Græci appellant, dolenti loco raso superpositum, nec minus dies uiginti. Item facit ad oculorum imminentes epiphoras, superpositum frontibus. Cæteras eodem modo sanguinis eruptiones e naribus adiuuat. Et hulceribus factis eiusdem partis rosa dilutum prodest. Nec minus angina correptis faucibus, extra superpositum, & toto collo. Parotidas initia habentes discutit, suppuratas iungit, si quis emissarium collectionis apto loco, id est, infra sinum, ubi collectio est, fecerit, quod ὑπόχυστι Græci dicunt. Eadem ratione suppurationibus in mammis mulierum futuris, aut factis prodest, iungit omnem partem diuisam, & fibulis arctatam. Præcipue cum intestina prolapsa & reposita sunt, atque sartum uulnus, quod à Græcis dicitur γαστροειχία. Lateris, stomachi, uentris, iecinoris, lienis dolorem sedat. Adiuuat cœliacos, torminosos, uentri toto circumdatum. Item uesciæ tumenti prodest. Eodem modo lumborum dolorem leuat. Ad luxatum omne & eiectum, & repositum articulum benefacit. Et ad podagram, præter quoduis aliud medicamentum, satis conuenit, & huic mirifice prodest. Fistulas rosa dilutum sanat. Ad carbunculos & cancer imponendum est: purgat enim, nec patitur latius serpere: uetera hulcera cicatricem ducere cogit. Punctus neruorum musculorum, qui periculossimi sunt, quos νύμματα Græci dicunt, sine incisione aut diuisione sanat, cyprio oleo dilutum. Ad neruorum uitia omnia acopo melius facit.

Eiusdem nigrum.

CCVII.

Emplastrum nigrum eius, Barbara dicitur, facit ad omne recens uulnus & contusum. hoc plerique in gladiatoribus utuntur. Picis brutiæ * P. centum, refinæ frictæ * P. centum, bituminis iudaici * pond. centum, ceræ * P. centum. Hæc concisa in minima frusta, coquuntur cum olei sextario uno, donec spissentur: quibus depositis ab igne, & definentibus nimis feruere, adjicitur spumæ argenteæ * pond. X. cerussæ * pond. X. æruginis * P. V. Et hæc autem cum aceti hemina terere oportet, & minutatim aspergere, ne effervescat medicamentum. Vbi his adiectis & intermixtis intrepuerit medicamentum, opopanax oleo dilutus exiguo * P. duum adjicietur: deinde refrigeratum manibus, & subactum medicamentum, & in partes diuisum, reponitur. Huic ergo emplastro, cum ita compositum est, dum adhuc modice calet, adjicito thuris pollinis pond. trientem: & mirum, quanto efficacius est, sine dolore atque tumore conseruat uulnera, & celerius sanat.

Emplastrum nigrum Traſææ chirurgi.

CCVIII.

Emplastrum Traſææ chirurgi facit ad omnia recentia uulnera: Proprie autem ad neruorum musculorum punctus, contusiones, luxa: & in totum, tumorem non patitur fieri, articulos incisos iungit. Idem & gladiatorum, & omnium hominum ad periculosa uulnera mirifice facit: sinus ueteres, & fistulas iungit: interius iniectum primum, & postea extra positum. Ceræ P. III. picis brutiæ pond. II. refinæ frictæ pond. III. bituminis faguntini, quod est natura liquidum, P. III. cerussæ, æruginis, chalcitidis, misyis, aluminis fissi, aluminis rotundi, melanterias, quæ creta futoria dicitur, qua ligulæ calceolarum denigrantur, gallæ syriacæ, singulorum pondo libra. Hæc aceto teruntur, donec leuia fiant: quibus mellis habentibus spissitudinem, cera, atque alia quæ igne liquefiunt, bitumenque super ignem solum, superfunduntur his, quæ sunt in mortario: postea medicamentum manibus subigitur, & reponitur uale si cili acetum habente.

Emplastrum nigrum Aristi.

CCIX.

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi facit ad omne recens uulnus mirifice, ad punctus neruorum & ad musculorum. Item ad contusum, luxum, præcipue ad ossa fracta. Sine alligatura enim interdum dimidio celerius sanat ea, & sine dolore seruat: iungit sinum. Habet autem hæc: Spumæ argenteæ * P. ducentorum, aluminis fissi * pond. XXX. picis hispanæ * P. centum, bituminis iudaici * pond. centum, propolis * pond. XXX. æruginis * P. X. ceræ * P. centum, ammoniaci guttæ * pon. XXV. terebinthinæ * pon. L. olei ueteris sextarios quatuor. Olei inferuescit spuma argentea trita curiole: deinde adjicitur bitumen, & ipsum cōtusum & tritum. Vbi hæc cerati mollis habent temperamentum, pix adjicienda est: deinde cera & propolis: postea ammoniacum, à quo, ærugo: ultimum alumen aspergitur. Oportet autem, ubi tumor suspectus est, sanam succidam ex uino sine oleo superponere.

Emplastrum Triphonis.

CCX.

Emplastrum nigrum Triphonis, Basilicon appellatur, facit ad contusa, & canis morsum, & furunculos.

nilos. Idem rosa dilutum explet concava uulnera. Picis brutiæ * pon. XL. refinæ * P. XL. galbani * P. II. olei cyprei * P. sescuncia, cum oleo cōmuni * P. IX. liquet, & coquitur, donec coeat: post hoc refinæ adijcitur: deinde emplastri habens temperamentum, deponitur cacabus, & tepente medicamento galbanum dilatum, ne uno loco subsadat, adijcitur.

Emplastrum Aristi chirurgi.

Emplastrum nigrum, quod *τετραφάρμακον* dicitur, facit ad eadem. Recipit hæc: Cere, picis, refinæ friatæ paria pondera, adipis tauri dimidium, una omnia coquantur, donec emplastrum fiat.

Emplastrum nigrum Dionysi chirurgi.

Emplastrum Dionysi chirurgi, facit ad mediocria uulnera, & in teneris corporibus puerorū. Idem iungit bellæ uulnera, & sine tumore seruat. Spumæ argenteæ * pon. CXX. olei sextarios duos. Hæc super ignem mouentur, donec cerati habeant temperaturam: post hoc adijcitur aluminis * P. XLV. & decoquitur, usque dum rufum medicamentum fiat: post hæc adijcitur refinæ colophonizæ * P. XLV. ceræ * P. XLV. ubi emplastri omnia habuerint spissitudinem, deponitur cacabus, & tepente medicamento, & cum defierit feruere, adijcitur galbanum minutatim dilatum, quò facilius soluiatur, * P. III.

Alterum rubrum medicamentum, quo uenatores utuntur, facit ad canis morsum & omnium quadrupedum: Item & ad offensionem in stirpe, & cætera uulnera mediocria. Spumæ argenteæ pond. V. semis, olei ueteris pon. II. Hæc coquantur, donec coeant: deinde adijcitur eris squamæ pond. uncia, & coquitur, donec colorem rufum sumat: postea adijcitur ceræ pon. triens, refinæ frictæ pon. II. ammoniaci guttæ, deposito paulisper cacabo, pon. quadrans, galbani item diuisi in minimas partes, & rursus reposito ad breue tempus, atque iterum reposito & non seruati, galbani pondo sextans.

Emplastrum coloris incerti, facit ad oia mediocria uulnera, quadrupedum morsus, confusa uel incisa articulamenta, ut sit, cum ad dentem peruenit pugnus. Idem ad funiculos mire facit, & strumas omnemque duritiem discutit, si id quis perseveranter imponat. Item cicatricem ducit diutini hulceris, & in totum ad omnia leuia in quotidianos usus mirificum est: tumorem non patitur fieri, neque pus. Hæret, ut fascia non sit opus. In balineo non excidet. Hoc ipsum est, quod tu desiderasti. Olei ueteris P. quinque, spumæ argenteæ pon. quinque. Hæc coquantur, donec coeant: postea adijcitur his refinæ pituinæ pond. V. Vbi emplastri habet temperamentum, adijcitur propolis inalienatæ, synceræ & bonæ, qualis est attica, pond. selibra; deinde in cacabo deposito, uisci de quercu lecti pon. quadrans: hoc semper habeo compositum.

Emplastrum Euelpisti chirurgi.

Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenera corpora mediocriter lesa & abrafa, quæ æno-
Græci dicunt. Spumæ argenteæ pon. selibra, olei hemina, coquantur dum coeant: deinde adijciuntur ceræ pon. duo, refinæ pituinæ pond. duo.

Emplastrum Epispasticum.

Emplastrum quod aperit & educit pus, uel si quid aliud subest, *ἐπισπαστικόν* dicitur, ceræ P. libra, refinæ terebinthinæ P. libra, nitri rubri pondo libra: hoc teritur ex cinere lixiua, donec leue factum habeat mellis spissitudinem, postea supradicta eum olei cyathis sex liquefiunt ad ignem, quibus adijcitur thuris pollinis selibra, & ita quæ in cacabo sunt, mortario superfunduntur & cōmiscuntur.

Emplastrum album ex sale, *ἀλατῶν* Græci dicunt, facit ad omnem duritiem & diutinum dolorem, & ducit sudores, idem hulcera & callosa renouat, & facilius alijs medicamentis, quæ hoc pollicentur, cogit cicatricem ducere. Salis marini, cerussæ, olei ueteris paria pondera. Coquitur cum oleo cerussa, donec coeant, & postea sal admiscetur.

Emplastrum aliud ex sale, nigrum efficacius, idem ad omnia facit, sed recipit singulorū pon. libram similiter, olei autem ueteris triplex adijcitur.

Emplastrum album ad combusta & pernioles: cerussæ P. libram, olei myrtei P. libram, spumæ argenteæ * P. XXIII. ceræ ponticæ P. libram. Cerussa & spuma argentea coquantur cum oleo, donec coeant: postea adijcitur cera.

Emplastrum album Pacchij Antiochi.

Emplastrum album Pacchij Antiochi, quo uti oportet, cum in mammis mulierum, alio ue quouis loco duritia fuerit, quæ ad onne medicamentum exasperatur, quam Græci *κακὴν* aut *κακὸν* uocāt. Facit autem ad combusta & uetera omnia, quæ non facile cicatricem ducunt: Item ad hulcera ex frigore, uel per se facta: Præcipue uerò ad anisuria difficilia & uetera, rosa dilutum. Cadmiæ botryitis * pond. VIII. pompholygos cypriæ * pon. VII. molybdene lotæ * pon. V. thuris masculi * pond. III. cerussæ * pond. LXX. spumæ argenteæ L. ceræ ponticæ * pond. VIII. refinæ terebinthinæ * pon. VII. olei murtei * pon. centum. Quæ sunt dura, tenentur ex uini ueteris sextario uno, in quo die & nocte macerentur. Alterci albi, iridis, fertulæ campanæ, terræ mali, papaueris syluatici capitū cor-
ficis, singulorum * P. VI. Cum leuia facta fuerint, & mellis spissitudinem habuerint, tunc murteū oleū minutatim in mortario adijciatur: & cum fuerint temperaturæ liparæ, medicamentum conijciatur in nouo sicili cacabo, & coquatur pruna non nimis acri, moueaturque sine requie, ne aduratur: cum emplastri temperaturam habuerit, refinæ cera adijciatur.

CCXXI

u iii

Emplastrum ad combustum mirifice facit: cum multis usus sum nullū magis probo; protinus enim impositum mitigat: postea tollit dolorem, statimque infinita celeritate per sanat. Spumę argenteę pon. felibram, adipis suilli purgati pon. felibram, cerę ponticę pon. felibrā, ouorum assorum vitellos sex, quos terere oportet, & miscere spumę argenteę, & trita: ceram cum adipe liquefacere, deinde pati coire, postea in unum miscere.

Lipara ad intertrigines & exasperationem.

LIPARA ad intertrigines & exasperationem, tumorem ani, mirifica. Spumę argenteę pond. triens, cerussę pon. triens, thuris pollinis pon. triens, aluminis fissi pon. quadrans, adipis suilli curati pon. quadrans, uini austeri ueteris hemina tres, rosę sesquilibra, olei acerbi felibra. Teruntur spuma, cerussa: alumen ex uino, deinde adijcitur thus minutum & cretum: & cum primum hæc leuia paruerint, cum oleamentis, ex uino adipe liquefactum cum rosę pon. quadrante miscere in unum oportet.

Lipara rufa.

LIPARA rufa facit ad fissuras ani diutinas, quas cypriotes dicunt: eadem & eiusdę partis exulcerationes, & uicia diutina benefacit. Spumę argenteę * P. XXXVI. cerussę * pon. VI. chalcitidis ustę * pond. VI. mysios * pond. VI. resinę terebinthinę * pond. XII. cerę * pond. VI. olei murtei sextarios S. II. aquę pond. sextans. Cum aqua teruntur, quę prima posita sunt, & olei pond. dinidio, cum reliquo oleo cera & terebinthina liquefacto mortario superfunduntur.

Ad condylomata.

AD condylomata facit bene elaterium siue cerę: quod est succus cucumeris syluatici, compositus rationeque in pastillos redactus, ex aceto dilutum & perunctum. Item propolis per se subacta & more emplastri imposita.

FACIT bene & resinę terebinthinę * pond. VI. cerę idem in unum cocta igni, quantum possunt gagatis lapidis triti recipere. Multis & iris confusa & ex uino mixta, cocta & posita uelut farina hordeacea, profuit. Facit & andronium medicamentum, quod initio posuimus, ad condylomata uino dilutum bene.

HOC medicamentum mirifice prodest. Aluminis melini * P. centum, chalcitidis * pond. L. scęulę * pond. L. Teritur aceto: cum opus est, uino aut aceto diluitur.

Ad hemorrhoidas.

Hemorrhoidas sic curare oportet medicamento. Perungantur centaurij succo P. duum (Hęc herba latine fel terrę dicitur, & ubique in agris nascitur: Est autem tenuis, multorum ramorum in rectum surgentium, florem habet exiguum purpureum) Absinthij succi * pond. duum, aluminis liquidi * pondo II. herbę pedicularis * pondo duum, mysios * pondo unius, mellis quantum ad comprehendenda ea satis erit. Hoc peruncto interius ano, aut lana tincta & interius trusa, cum defecerint ad fellā, & apparuerint totę medicamento rursus bene tangendę sunt undique: & præcipue radices earum, quibus ducunt, specilli latitudine, subinde hauriente, medico cumulante medicamentum, & adstruente, imprimenteque donec combibant: totum enim in ea est, ut ab omni parte saturantur. Est autem hoc medicamentum: Chalcitidis ustę * pond. III. zris floris usti * pond. III. mysios usti * pond. trium, zris squamę * pond. duum, dysphrygis * pond. duum, soreos usti * pond. duum, auripigmenti * P. duum. Hęc omnia teruntur, & sicca (ut dixi) hemorrhoidibus imprimuntur undique: post hoc tenue, simplex, rarum linteolum imponere oportet, & super hoc panem aut opyron ex aqua maceratum & tritum, rosaceo oleo adiecto. Hoc medicamentum sine magno labore, circa septimum diem cadere cogit hemorrhoidas. Oportet autem bis die panem imponere, nonnunquam in nocte, si circum tensionem senserint aquario, dię auriscalpio auerso, quam partem ueteres Gręci uocant, sensim tentare / mouere ab alienatam oportet, quod celerius excidant hæmorrhoides. Hoc medicamentum oēm carnem, & omni parte corporis exulceratam, & excrecentem, & eminentem, sine magno morfu tollit. CCXXVIII.

SI quando non exulceratas eminentias tollere sine ferro uoluerimus, ut uerrucas, neuos, aliaue eius generis, hoc medicamento utimur. Calcis uiuę pon. sex, scęulę * P. III. uitri usti * P. III. Hęc terere oportet ex cinere lixiua, ex caprifico uel sarmentis, donec leuia, passi habeant temperamentum, deinde adijcere rubricę aut atramenti quod possit colorare ea: deinde patella fictili coquere ad mellis spissitudinem, atque puxide nigri plumbi reponere. Melius autem recens facit, cuius usus est talis: quod destitutum erit tollere, id ipsum specillo oblinetur crassius, ex interuallo penicillo abstergetur: & cū satis nigrum, quali perunctum uisum fuerit, desinere oportebit imponere res, & abstergere, & panem ex aqua imponere & rosa. Hoc & strumas sanat anteq suppurent. Oportet autem, cū hoc medicamentum cum fam fecerit in strumis, nullum aliud medicamentum adhibere, sanz enim ita fiunt. CCXXIX.

CV M uero aliqua pars suppurauerit, & rimidus fuerit ad sectionem, cui id acciderit, uiscum plurimum colligere oportebit: eumque cum cinere lixiui diutius terere, & aluta indutum imponere, ita formata, & in tantum spatium circumsecta, quantum & quale uolumus huius, id est, emissarium uomice fieri, & ea parte scilicet imponemus, quantum necesse erit aperire. Hoc eodem medicamento sepe dolores diutinos pectoris, lateris, lumborum sustuli, cum ad nullum malagma aut auxilium cedebant: exbulle rata enim minima parte cuiusque dolentis loci, humoribus postea uitium ueluti eijciebatur.

Ad eadem uicia.

Melior triphera, hoc enim nomen superius positum, medicamentum appellatur: facit ad omnia quę ferro

ferro debent tolli sine magno dolore. Idem hæmorrhoidas productas medicamento, quod supra positi est, tollit. Vnam nimis iacentem sine periculo per auriscalpium lana inuolutum perunctam, ex parte qua tollenda est, amputat. Oportebit autem postea aqua mullea gargarizare, & lentis atque rosæ aridæ aqua decoctæ. Eadem res & palpebram pilosam remediat, si quis radices aduersus naturam pilorum natas oblinierit, donec locus earum niger fiat. Recipit hæc: æris floris * P. tritum, calcis uiuæ * P. VI. tæpiz radices * P. VI. fæculæ * P. III. nitri * P. II. auripigmenti * pond. duum, fellis taurini * pō. sex. Teruntur ex cinere lixiua, qua culinarij utuntur, donec habeat mellis liquidi temperamentum. Reponitur puxide nigri plumbi. Hæc puxis in ampliorem stagnæam mittitur, habentem cinerem lixiuam usque ad operculum minoris. Oportet autem & hoc medicamentum colorare rubrica uel atramento. Huic medicamento si anatis sanguinis quasi duæ ligulæ adiunctæ fuerint, minus mordebit. CCXXXI.

Quatenus acium & exulcerantium medicamentorum habira est mentio, ponemus quæ stygmata tolluntur in dignis, & in multis. Hæc calamitas ex transuerso accidit, ut dispensatori Sabini Calui naufragio in ergastulo deprehenso, quem Triphon multis delusum, & ne casu quidem literas confusas ullo medicamento habentem, liberauit. Alij candidi spice capitis tritæ, cum cantharidibus uiginti alexandri nis sunt autem uariæ & oblongæ sulphuris uiui * P. I. & uictoriati, chalcitis * pon. as semis, ceræ pond. triens, olei pond. triens; ceram cum tritis cæteris admiscuit & imposuit.

Intestini extremum prolapsio. CCXXXII. Intestinum extremum quibus prolabitur & excidit, quoties prodierit, toties uino calido, uel uerbis, uel cinere lixiua lauari oportet & reponere. Prodest & pice liquida perungere & cedria. Interdum uel Andronio perungere, & sicca reponere. Facit & cinis ex sarmentis cribrata, aspersa, alumen fissum tritum bene, & eodem modo aspersum, atque intestino reposito. CCXXXIII.

Ad testiculi tumorem, cupressus bacce ex uino coctæ conueniunt, ex faba quasi concha, multo cum cumino cocta. Item uua passa cum cumino contusa, in modum malagmatis, melle quantum satis est, admixto. Idem uua passa, nucleata, contusa ac mixta eiusdem mensuræ uel ponderis.

Ad ueretri tumorem & dolorem. CCXXXIII. Ad ueretri tumorem, lens ex aqua cocta, & trita, rosaceo oleo mixta prodest. Si maior tumor erit, mali granati corium ex aqua coctum & tritum, lenticulæ pari pondere admiscere oportet. CCXXXV.

SI ulcus fordidum erit, aut cancer tentauit, aut iam occupauit, Andronios ex uino benefacit. CCXXXVI.

SI cicatrix ducenda. CCXXXVII.

Desideratur. OMNE hulus in omni parte corporis fordidum (id autem est cum candicat, & quasi crustam perductam albam habet) purgat mel per se, iris arida contusa, uel cum melle. Eadem ratione & terræ mali, & panacis radix purgat fordida hulcera. Mirificæ & hoc medicamentum purgat, etiam si cancer tentat, est autem leue: auripigmenti, quod Græci ἀπορροῦν dicunt * pon. VI. æris squamæ * pon. III. elaterij * P. I. chartæ combustæ cinis * pond. III. cum opus est, cochlearia tria rosæ cyatho permiscuntur, inde linteola carpta continguntur, atque ita hulceri superponuntur. Hoc medicamentum cito, & sine ullo morfu expurgat fordidissima hulcera. CCXXXVIII.

OMNE purum hulus & concanum replet Basilice, rosâ diluta, ut superius dixi, propæ autem hoc medicamentum: Medullæ uitulinæ * P. III. adipis anserini * P. duum, butyri * P. duum, medullæ ceniinæ * P. II. ceræ * P. III. terebinthinæ * P. II. mellis * P. fæculæ, rosæ * P. fæculæ, refina cum rosâ liquefit, cui miscuntur calenti mel & cera, cum cera præcalfacta in feruenti aqua cōtunduntur, atque ita superioribus miscuntur. CCXXXIX.

OMNE hulus luxurians & crescens carne compescit chalcitis per se trita, uel æris flos ustus. Bene autem & propriè hoc medicamentum facit, quo Meges utebatur: Calcis uiuæ * P. II. thuris * P. unius, æris squamæ * P. unius.

Triphonis medicamentum. CCXL. Triphon chirurgus carnem eminentem hoc medicamento compescebat: æris floris usti * pond. VI. chalcitis uste * P. III. myris usti * pond. III. æris usti * pond. III. Hoc acre est, & quasi cauterium crustam altam facit: quamobrem cancer non patitur impositum serpere, omnem eruptionem sanguinis ueluti cauterium sistit. Et hoc autem, & quæ diximus, imminuit: Cicatricem quoque ducit, si quisuncto, extracto que specillo, quod ei quasi puluis adhæserit, exiguo oras hulceris tetigerit. Sed propriè cicatricem medicamenta hæc ducunt.

Triphonis ad cicatricem. CCXLI. Emplastrum efficax ad cicatricem ducendam: Spumæ argereæ * P. quinquaginta, myris usti, chalcitis uste, aluminis fissi, cerussæ, singulorum * pon. III. refinæ terebinthinæ * pon. XII. ceræ * pō. V. Cera & refina liquefiunt: deinde cū refrigerunt, raditur: sicca & bñ trita adiiciuntur & cōmiscuntur.

Emplastrum diacadmias. CCXLII. Emplastrum quod necesse est Græci dicunt, quod cicatricem ducit, cadmiæ P. libra, chalcitidis uste pond. libra. Hæc teruntur ex uini falerni heminis tribus, donec liquefacta mellis habeant spissitudinem: postea fit ceratum ex cerâ pon. III. refinæ frictæ pond. III. olei murtei pond. III. Cum refrigeratum est;

raditur, & miscetur his quæ in mortario sunt. Sunt qui liquefacta hæc ipsa dum calent, in mortario superfundunt, & ita subigunt.

Ad papulas & porriginem.

Ad papulas & porriginem.

AD papulas in capite efferuescentes, uel qualibet parte corporis totius porriginem, staphisagria trita, & nitrum decoctum tritum pari mensura, in mixto oleo & uino austero, ante defudationem corporis, ac postea. Item alumen liquidum ex aceto, staphide agria adiecta. Ad epiphoram uero toto corpore efferuescentem medicamentum prodest.

Ad ignem sacrum.

AD ignem sacrum benefacit medicamentum: ruta uiridis P. triens, spumæ argenti P. bes, aceti sextarius unus, olei uiridis sextarius. Cum aceti parte, in spuma & ruta teruntur, donec leuia fiant, postea quod superest aceti, uicibus cum oleo adijcitur.

AD ignem sacrum, coriandrum per se tritum benefacit; est enim res uirosa: uel cum pane eodem modo & menta prodest, & cinis de filice facta, aqua conspersa, oblinita. Item cimolia creta succo solani diluta. Et per se solanum, uel cum pane prodest.

FACIT & ad hoc medicamentum bene: sulphuris uiui, opij, singulorum P. semuncia, spumæ argenteæ pond. uncia, passo miscentur. Item hoc satis prodest, cerussæ * P. VIII. aluminis fissi * pond. trium, thuris * P. trium, croci * pond. duum, sulphuris uiui * P. II. Teruntur hæc solani succo: cum opus est uino diluuntur.

Ad zonam.

AD zonam, quam Græci ζώνη dicunt, faciunt quidem ut supradicta omnia, præcipue acuta uiridis bene trita & imposita. Item hoc medicamentum: cerussæ * P. XXXVIII. aluminis fissi * pond. XII. croci * pond. I. thuris * pond. duum, acaciæ * P. VIII. dyphrygis * P. II. opij * P. II. Ex aqua teritur, & cum opus est, ex eadem dilutum perungitur.

AD idem melius facit, gallæ, aluminis rotundi, chalcitidis, cretæ futoriæ, singulorum * P. II. myrsus, corticis malorum, acaciæ, singulorum * P. III. calcis uiuæ * pond. XVI. Mali cortex in aceti sextario uno decoquitur, donec madida fiat: deinde teritur acacia aceto eodem, macerata nocte & die, admiscetur, & una teritur: Postea cætera adijciuntur, & fiunt pastilli: cum opus est, diluuntur aqua.

AD utrunque autem genus uitij, mirificè medicamentum Andronicum facit.

AD impetigines, uua aminea, quæ sic dicitur, bene facit. Est autem ruberrima, & in uepribus nascitur. qua fricari oportet impetiginem, quoad curetur, & non appareat: hoc autem diebus fit paucis.

Ad suffillationes.

Benefacit huius radices recentis succus, ad suffillationes & liuores perunctus. Scabiem tollit sulphur nigrum oleo mixtum communi, atque in terati spissitudinem redactum. Hoc etiam lepram, & quam Elephantiam dicunt, sanat: & omnia quæ efferuescunt per se, cum inueterauerint.

Ad scabiem.

AD scabiem halica ex aceto macerata, & trita benefacit, exiguo thure adiecto. Item picis liquidæ libra, ceræ * P. semis, sulphuris uiui P. sextans, aluminis fissi * P. unius.

Benefacit oliuæ æthiopice commi, quod Græci ἐλαιὸν αἰθιοπικὸν δακρυον uocant, aceto dilutum. Item salicis libri ex aceto costi, atque ita triti, & impositi, tollunt scabiem. Facit & eiusdem cinis ex aceto ad scabiem. Prodest & farina hordeacea cocta ex posca, si tenerum corpus erit: uel ex aceto, si durum, per dies quatuor aut quinque: deinde ceratum ex rosa adiecta cerussa, imponere oportet, donec cicatrix ducatur.

FACIT bene & hæc compositio: Thuris masculi pond. triens, sulphuris P. uncia, cæparum pond. sextans, rumicis erraticæ radices aceto quoque tritæ P. —. Omnia teruntur: miscetur aceto quod satis erit, id est, dum mellis crassi habeat spissitudinem: Cum opus est, scabiei nitro ex aceto locus fricatur diutius & pressius, deinde hoc medicamentum superlinitur.

ALIA compositio ad idem: Scammonia * P. trium, myrrhæ * P. unius, æris floris * P. unius, astule regie, quam ἀσφόδελον Græci dicunt, radices * P. duum, glutinis taurini * P. II. nitri * P. I. & uictoriati: Teruntur omnia aceto, præter gluten; hoc enim pridie maceratum, cæteris iam tritis miscetur. Cum opus autem est, ante nitro & aceto locus exasperatur, deinde hoc oblinitur.

VT consummetur liber, malagmata, & acopa adijciemus.

Genera malagmatorum ad omnem corporis ualitudinem.

ALAGMA ad ὀφθαλμούς, id est cum cernix reflexa est in posteriorem partem, aut rigida cum intensione oculorum & maxillarum. Facit & ad κωκκὸν αὐτομάτον, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Idem ad omnem tensionem, & contractionem neruorum, & ligationem, ἀκμάων quod Græci uocant. Item ad dolorem omnis partis, quamuis ueterem. Bdellij * P. XVI. opopanacis * P. VIII. galbani * P. VIII. adipis uitulini * P. XVI. piperis grana numero CLX. ammoniaci guttæ * P. octo, cachryos * P. octo, iris * P. XVI. ceræ * P. LV. terebinthinæ * P. L. Arida quæ sunt, cōtunduntur, cribrantur: succū habentia, cum resina subinde admixta cōtunduntur, cera in frusta concisa.

conciſa aqua feruenti demittitur, & ſubacta manibus miſcetur ceteris in pilam. Oportet autem pilum ligneum frequenter cypreo oleo perungere. Hoc malagma cypreo oleo liquefactum acopi uſum preſtat.

CCLVI.

Malagma alterum, ſtomachum, alium, inteſtina ſoluta habentibus & cholericis prodeſt. Conſirmat omnem partem & adſtringit, quę hæc deſiderat. Aluminis fiſſi * pond. ſex, tus ſyriaci * pond. ſex, gallę * pond. ſex, acacię * pond. ſex, cerę * pond. XL. picis Ipanę * pond. XL. olei melini aut roſę * pond. trientem. Acacia uino exiguo macerata teritur: cera & pix oleo alterutro mixta inferueſcunt; quibus temperatis adiſciuntur cribrata ſicca: ijs acacia miſcetur, atque in unū omnia ſubiguntur.

CCLVII.

Malagma peſtoris & lateris dolorem, & quidquid ex perfrictione eſt, bene caſcit. Idem ad omnem dolorem prodeſt. Sanſuci contuſi ſextarius unus, iris contuſę ſextarij XV. cyperi contuſi ſextarius unus, reſinę terebinthinę pondo bes, cerę pondo quadrans, olei cyperi pondo ſelibra; uini aminę ſextarius unus. In uino arida contuſa macerantur una nocte & die: oleo, cera, & reſina liqueſcunt: deinde ſuperfunduntur uino, miſcentur manibus. Hoc medicamentum efficacius eſt ſecundo; poſt dies triginta efficacius prodeſt: initio enim humidum ualde eſt, & uix inlitum remanet.

CCLVIII.

Malagma ad omnem dolorem, præcipue iecinoris. Spice nardi * pond. V. celtice, id eſt, ſaliuncę * pond. X. iris * pond. VIII. melliloti, quod à nobis ſertula campana dicitur * pond. XXV. cyperi * pond. VIII. ammoniaci thymiamatis * pond. VIII. cardamomi * pond. VII. croci * pond. duum, uini ſalerni ſextarius unus. In hoc omnia ſuprà ſcripta contuſa, uno die & nocte macerantur, præter ammoniacum: hoc enim aceto diluere oportet, & quaſi ceratum facere: poſtea cerę pondo duas bes & reſinę friſcę pond. III. roſę P. libra, leuiā ſunt & refrigerata, quę roſę & ceteris miſcentur. Hoc & ad præcordiorum tenſionem benefacit, & ueſicę dolorem.

CCLIX.

Malagma ad lienofos & ad iocineris dolorem. Ammoniaci guttę P. I. cerę pond. I. & ſextans. Ammoniacum ex aceto teritur, admixto crocomagmate, quantum colorare poſſit; ammoniacum quod teritur uſque dum leuefactum mellis craſſi habeat ſpiſſitudinem: poſtea cera liquefacta, roſa adiſcitur, mortario, & bene paſtillo mixta, manibus utraque ſubiguntur. Facit hoc malagma ad luxum, & ad capitis dolorem fronti ſuperpoſitum.

CCLX.

Malagma ad præcordiorum tenſionem, uentris, ſtomachi duritiem cum dolore. Item ad iecur & lienem prodeſt. Cerę * P. quinquaginta, ammoniaci guttę * P. L. iris * P. XXV. panacis * P. XX. aneſi * P. XXV. nitri * P. XXV. adipis taurini * P. XXV. fœni græci ſeminis * P. XXV. reſinę terebinthinę * P. L. aceti acris ſextarius unus, mellis P. triens. Melaceto diluendum eſt, atque arida omnia his maceranda die ac nocte; ceram, terebinthinam, adipem liquefactam, in unum ceteris miſcere oportet, & manibus ſubigere.

Malagma ad lienofos.

CCLXI.

Myrobalani * P. L. aphronitri * P. XXX. capparis radicis * P. XX. cardamomi * P. XXV. ammoniaci guttę * P. XXX. cerę P. ſelibra, irini olei P. ſelibra. Cera irino ſoluitur, quibus ammoniacum aceto dilutum miſcetur, & poſtea arida quę ſunt, commiſcentur.

CCLXII.

Malagma ad omnem dolorem ueterem, & qualibet cauſa factum, præcipue ad lumborum dolorē, qui ante leniter ſcarifiant. Recipit hæc: bdellij P. trientem, ſtyracis P. trientem, hyſſopi P. trientem, ammoniaci P. trientem, piperis albi P. trientem, thuris P. trientem, baccę lauri aridę P. duo, terebinthinę P. trientem, opopanacis P. trientem, adipis taurini P. trientem, medullę ceruinę P. trientem, propolis P. ſelibram, olei ueteris P. libram, cerę P. duo, thuris pollinis P. libram. Oleum, cera, reſina, propolis liqueſcunt: deinde thuris pollinis P. ſuperius dictū adiſcitur, & cætera minutatim, uel in unū contuſa; opopanax oleo diluere oportet.

CCLXIII.

Malagma quod diſcutit ſtrumas, parotidas, panum, quod Græci φυρεθλον uocant. Idem omnē futuram ſuppurationem diſſipat, factam aperit. Facit & ad dolorem articulamentorum, uel cuiuslibet partis: præcipue ad lumborum dolorem, atque inflationem ſtomachi uel coli. Picis hiſpanę, aphronitri, reſinę pituinę, cerę, laurus baccarum, ſingulorum * P. XXXV. adipis taurini * P. XV. ammoniaci guttę * pond. iris Illyricę * pond. XV. galbani * pond. XII. piperis albi * pond. XV. Quę debent liqueſcere, ſoluuntur igne & oleo, cætera contuſa, temperatis aſperguntur: ultimo loco tepente medicamento laurus baccę miſcentur.

CCLXIII.

Malagma ad omnem dolorem corporis articulorum. Facit & ad podagram. Idem diſcutit uomicas aut aperit, præcipue in peſtore & interaneis. Prodeſt & lumborum doloribus. Cerę * P. VIII. ammoniaci * pond. X. bdellij * pond. X. iris * pond. VI. galbani * pond. III. terebinthinę * pond. V. Contunduntur ordine, quo ſcripta ſunt, pilo ligneo, cyprino oleo, quod in uino ſubſidit, perunſto: cera in aquam feruentem in minimas partes conciſa dimittitur, & ſubacta manibus in pilam coniſcitur.

CCLXV.

Malagma item ad contuſionem lateris. Idem facit ad ſuſpectas uomicas aut iam factas. Præterea ad iecinoris, præcordiorum duritiā uel dolorem benefacit. Proderit & in omni loco dolenti impoſitum. Cyperi, ammoniaci guttę, cardamomi, bdellij, thuris, reſinę terebinthinę, ſingulorum pond. bes: thus & bdellium macerantur pridie uini hemina una: cætera contunduntur; cerę pond. libra & triens, & olei cyperi ſextarius unus cum terebinthina liqueſcunt, ceteriſque commiſcentur. Quidam adiſciunt myrrhę partem, croci partem ſextantem, cinnamomi partem ſextantem.

CCLXVI.

SCRIBONII LARGI DE COMPOS. MED. LIB.

Malagma ad luxum, contusum, canis morsum, parotidas, strumas, podagram: Cere pond. duo, resine frictę pond. duo, picis hispanę pond. tria, ammoniaci pon. libra, rhuris pollinis pond. semis, galbani pond. semis, acet. sextarios duos. Ammoniacum tritum cum aceto soluitur igne: deinde resina, cera, pond. IX. adjicitur, & coquitur usque dum spissetur: postea thus admiscetur. Vbi emplastri habuerit temperamentum, medicamentum tepenti galbano adjicitur.

CCLXVII.

Malagma ad podagram, & omnem dolorem & tensionem neruorum, recipit hec: ammoniaci gutte pond. I. cere pond. I. axungie ueteris selibram, olei ueteris pond. trientem, olei cedrini pond. unciam, rose pond. sextantem, cyprini pond. sextantem, croci pond. sextantem, asij lapidis pondo unciam, myrrhę pond. unciam, aphronitri pond. semunciam. Patella noua liquefit axungia, cera cum oleo uetere: quibus adjicitur ammoniacum tritum, & mouetur usque dum soluiatur: postea oleum cyprinum, rosa, & cedria in unum miscentur: & tunc subducitur flamma, ne feruescat medicamentum: secundum quę adjicitur crocum tritum ex aceto, deinde myrrha trita per se aspergitur: ultimum nitrum, & asius lapis foenicio inducitur.

Acopi genera et compositiones.

CCLXVIII.

Acopum ad perfriktionem, lassitudinem, tensionem neruorum. Idem hyeme non patitur perfrigescere artus: hoc Augusta utebatur. Sancti floris sextarium unum, foenigręci sextarium unum, rosę marini foliorum sextarium unum, uini falerni congiū, olei uerisfri sextarios quinque. Pręter oleum omnia in unum triduo macerare oportebit, quarto die oleum adjicere, & coquere in priua non acrimedicamentum, donec uinum consumatur: postea recolare per linteum duplex oleum, cui adhuc calenti cere ponticę bellem miscere. Reponitur medicamentum fictili uel stagnęo uase.

CCLXIX.

Acopum, quod per uindemiam componitur, antequam mustum deferuescit: musti recentis congi quinque, in hoc & olei uerisfri P. L. macerantur: res quę infra scriptę sunt, contusę, & percibratz grandioribus foraminibus cribri. Iris illyricę * P. XL. cyperi * P. XL. foenigręci * P. XL. piperis nigri P. XL. xylobalsami * P. XL. calami odorati quo unguentarij utuntur * P. LXXX. spathę quę unguentarij utuntur * P. LXXX. schoeni * P. LXXX. saliuę * P. LXXX. casie nigre * P. XXIII. cardamomi * P. XXVIII. styracis * P. XXIII. costi * P. XXVIII. myrrhę amineę * P. XXII. casie daphnidis * P. XXIII. fertulę campanę * P. XIII. aspalathi * P. XI. Hęc cum musto & oleo macerantur uase stagnęo aut fictili per diestriginta. Oportet autem uas bene clausum & alligatum diebus his soluere, inuisere omnia: deinde rursus operire & signare, ne uires euanescant: post dies triginta, conijciuntur macerata: deinde oleum purum excipietur, quod reponitur fictili uase: cuius oleaminis uires ad omnem contractionem neruorum tantę sunt, ut sit uix credibile.

CCLXX.

Acopum ad perfriktionem, lassitudinem, neruorum dolorem, grauioris odoris (superiores enim boni sunt odoris) Ammoniaci gutte * P. XV. galbani * P. III. resinę terebinthinę * P. LVI. cere * P. XXVIII. mellis * P. trię, olei ueteris sextarius unus, hyssopi P. uncia, medullę ceruinę pōd. uncia, opopanaxis * pond. VI. Sunt qui hunc non adjiciunt. Ceram, oleum, terebinthinam liquefacere oportet, deinde cętera adjicere, nouissimum ammoniacum tritum curiose. Hoc qui perunctus erit, etiā a serpente tutus erit.

CCLXXI.

Acopum, quo fere, Augusta & Antonia usę sunt, facit ad perfriktiones & neruorum dolorę. Idem perunctum non patitur perfrigescere artus, & refrigeratos calfacit. Componitur hyeme hoc modo: Summere oportet adipis porcine sterilis trepondo, uel anseris adipis idem pondus: deinde aqua frigida bene lauare, atque in nouo uase adjicere uini ueteris congiū unum, aut sextarios tres non nimis contusa pōderis huius. Xylocinnami pond. quadrantem, cardamomi pond. quadrantem, cyperi pond. quadrantem, schoeni pond. quadrantem, rose aridę foliorum pond. unciam, fertulę campanę coronas decem. Hęc omnia inferuescunt super carbones, deinde perfrigerata, eodem cacabo reponuntur: posteroque & tertio die cum inferuescunt, reconduntur, quę eodem modo die rursus recalscunt, & colantur per linteum: uel ex iunco factum de industria colum: uinum atque adeps, quę superest in nouo uase conijcitur: deinde cum gelauerit se adeps, oportebit fundum cacabi perforare, & uinum omne emittere, atque in priorem cacabum adipem eandem conijcere, & uini eiusdem recentis eandem mensuram adjicere, resque non nimis contusas nec cribratas: Nardi syriacę spicę pond. sextantem, saliuę pond. sextantem, amomi pond. quadrantem, casie pond. quadrantem, myrrhę pond. trientem, cumami pond. trientem, rose aridę foliorum pond. sextantem. Deinde semel manę, & in nocte semel inferuescere oportet: idem in postero die cum inferuescunt fuerint, percolanda erunt in cacabum priorem perfulum: sed ante diligenter & spisse obturatum: atque ubi se congelauerit adeps, extrahendum erit spissamentum, quod cum uino omne fluxerit, quod superest adijce. Vase stagnęo uno, uel pluribus, diligenter operto & adplumbato reponitur.

PERORATIO OPERIS.

ARVM compositionum (si qua fides est) ipse composui plurimas, & ad ea quę scripta sunt facienti scio paucas: sed ualde paucas ab amicis, quibus equę ac mihi credo, acceptas adieci: quas cum iureiurando adfirmauerunt sese ipsos expertos esse, ut benefacientes scire ad uirga quę scripta sunt. Illud autem te meminisse oportet, mi Calliste, quod initio dixi, eadem

medicamenta

Nāncelius Lectoris.

P R A E F A T I O.

07 NOV 68 09 21 AM

Qui primi medicinae auctores

This is a detailed illustration of a large, ornate initial letter 'M'. The letter is filled with dense, interlaced penwork or knotwork. A small, stylized figure is visible within the upper right curve of the 'M'. The entire initial is enclosed within a square border decorated with geometric patterns. Above the initial, there are some faint, partially legible markings that appear to be "ca. longc no 1".

Nos uero in hoc opere, magis definitum utimur (licet ab alijs non simus extorres) quippe quia optimus is est modus introducendi : Ceterique breuiter cuncta definit, recteque determinat ,

nihil relinquit, unde quasi enumerare possit. Ne tamē animus lectoris incaute ingre-

diatur, & sequentia operis iudicet, non te lateat quod modum tractatus qui

dam præcedit proœcialis, qui uerè introductorius brevis habet

duse est. Est autem duplex: partim docet qui sumit

artem, partim de arte. Nos Platonem ma

tantes, que sequiamur, uingã-305

Ait enim Plato,

• circa de omnibus que

in tra-

statu innuuntur, eum posse discere, qui peritiam habet earum rerum de quibus queritur.

WARDEN
PRISON

[illegible]

2-100-100

1. *Содержание*
 2. *Введение*
 3. *Глава I. Общие сведения о...*
 4. *Глава II. Описание...*
 5. *Глава III. Результаты...*
 6. *Глава IV. Заключение...*
 7. *Список литературы*
 8. *Приложения*
 9. *Справочные материалы*
 10. *Дополнительные сведения*
 11. *Информационные ресурсы*
 12. *Ссылки на источники*
 13. *Сведения об авторах*
 14. *Сведения о рецензентах*
 15. *Сведения о финансировании*
 16. *Сведения о защите диссертации*
 17. *Сведения о публикации*
 18. *Сведения о распространении*
 19. *Сведения о хранении*
 20. *Сведения о доступности*
 21. *Сведения о безопасности*
 22. *Сведения о конфиденциальности*
 23. *Сведения о защите персональных данных*
 24. *Сведения о защите информации*
 25. *Сведения о защите интеллектуальной собственности*
 26. *Сведения о защите прав потребителей*
 27. *Сведения о защите интересов*
 28. *Сведения о защите окружающей среды*
 29. *Сведения о защите здоровья*
 30. *Сведения о защите жизни*
 31. *Сведения о защите имущества*
 32. *Сведения о защите чести и достоинства*
 33. *Сведения о защите репутации*
 34. *Сведения о защите деловой репутации*
 35. *Сведения о защите коммерческой тайны*
 36. *Сведения о защите ноу-хау*
 37. *Сведения о защите авторских прав*
 38. *Сведения о защите патентов*
 39. *Сведения о защите товарных знаков*
 40. *Сведения о защите外观设计*
 41. *Сведения о защите прав на изобретения*
 42. *Сведения о защите прав на полезные модели*
 43. *Сведения о защите прав на селекционные достижения*
 44. *Сведения о защите прав на сорта растений*
 45. *Сведения о защите прав на породы животных*
 46. *Сведения о защите прав на объекты интеллектуальной собственности*
 47. *Сведения о защите прав на объекты нематериальной культуры*
 48. *Сведения о защите прав на объекты материальной культуры*
 49. *Сведения о защите прав на объекты культурного наследия*
 50. *Сведения о защите прав на объекты историко-культурного наследия*
 51. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 52. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 53. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 54. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 55. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 56. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 57. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 58. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 59. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 60. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 61. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 62. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 63. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 64. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 65. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 66. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 67. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 68. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 69. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 70. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 71. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 72. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 73. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 74. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 75. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 76. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 77. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 78. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 79. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 80. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 81. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 82. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 83. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 84. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 85. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 86. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 87. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 88. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 89. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 90. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 91. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 92. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 93. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 94. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 95. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 96. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 97. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 98. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 99. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*
 100. *Сведения о защите прав на объекты археологического наследия*

344 V Z Z T 2

1. The first of these is the fact that the
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.
 501.
 502.
 503.
 504.
 505.
 506.
 507.
 508.
 509.
 510.
 511.
 512.
 513.
 514.
 515.
 516.
 517.
 518.
 519.
 520.
 521.
 522.
 523.
 524.
 525.
 526.
 527.
 528.
 529.
 530.
 531.
 532.
 533.
 534.
 535.
 536.
 537.
 538.
 539.
 540.
 541.
 542.
 543.
 544.
 545.
 546.
 547.
 548.
 549.
 550.
 551.
 552.
 553.
 554.
 555.
 556.
 557.
 558.
 559.
 560.
 561.
 562.
 563.
 564.
 565.
 566.
 567.
 568.
 569.
 570.
 571.
 572.
 573.
 574.
 575.
 576.
 577.
 578.
 579.
 580.
 581.
 582.
 583.
 584.
 585.
 586.
 587.
 588.
 589.
 590.
 591.
 592.
 593.
 594.
 595.
 596.
 597.
 598.
 599.

gamus. Quapropter & libri eius tripartitam habent doctrinam, & in primis *συντομίαν* positam. Apertissima quippe omnium synoptica est inspectio uel uitiorum probatio, qua dignoscitur, quid in arte existat bonum. Nam quod omnes sanos facere non possumus, minime & hoc uitium arti ascribitur, omnibus quidem auxiliari non datur. Præscientia tamen prædicendi futura, puram fidem tribuit, ut merito credantur nobis ægotantium corpora. Vult enim Hippocrates, & præterita medicos cognoscere, & præsentia scire, & futura prædicere. Nec minus etiam cautissime agendum est. Ne præsumamus eum qui deficit uiribus, quique ad desperationem uenit, secare: uel poteris eis dare potionem aut somnum, aut uentris purgationem. Nec aliqua res agenda est, quæ ad mortis causam ex potionis occasione transferri uideatur. Similiter nec ossa secemus, nec *ἀποσπιν* faciamus, nec aliud quidquam, quod non naturaliter permittitur, pro utilitate fieri posse. Multos enim iniutantes, medicamini uidemus fidem credere, & in mala opinione apud omnium ora uersari, quod dederint quidem potionem somnij causa, uel alterius cuiusque rei: sed ob imperitiam inspectionis, maximum intulerunt periculum, & fidei suæ circa certas partes medicinæ plurimum derogatum est. quoniam mortis euentus non iuxta rationem potionis, sed propter uires defectas contingit. Rectissimum ergo est, huiusmodi homines, qui defecti sunt uiribus, non quidem deferendo, existimare, sed alijs medicinalibus rebus curare, quæ in culpam uenire non possunt, ut & artis humanitas & perseverans medici peritia possit stare. Qui autem uult nostram artem discere optime, is debet uniuscuiusque rei doctrinam & corporum naturam, & singularium partium operationem cognoscere. Qui autem non ita doctus est, sed experientiam tantum sine aliqua ratione exercuerit, & inhonestè artis professionem risui dederit, & sine doctrina rationabili egerit, alienum medicinæ opus adhibere uidetur, quantum ad ipsam artem spectat. Vbi enim ratione dijudicat, necesse est eum ad incommoda pergere, qui sola experientia sui aliqua ratione utitur. Ratio enim breuiter ad utilitatem perducit, & tanquam cæcam imperitiam, id est experientiam ducit. Quemadmodum etiam doctrinam percipimus, dicendum existimo.

De quatuor anni temporibus. Cap. V.

QVATVOR tempora hæc sunt quatuor elementa. Sicut corpus hominis in quatuor partes diuidimus, ita & annirculi erit nobis quadripartita diuisio. Phlegma in capite, sanguis in pectore, cholera rubra in uentre, cholera nigra in uesica: hæc omnia crescunt suis temporibus. Sanguis crescit uerno tempore, hoc est primo uere, cholera rubra in æstate, nigra autem & phlegma in hyeme. Si omnia infra dicta tempore suo adhibueris, incolumis perseverabis, nec medicis indigebis.

De uictus ratione quolibet anni tempore utili, hyemisq; inceptione & fine.

Scimus autem & quando, & qui humores in hominibus crescunt. hyemis tempore ex die VIII. Idus Nouembris usque in VIII. Idus Februarij, phlegma crescit, ex qua nascitur catarrhus, destillatio uiræ, tussis plurima, punctio laterum. Oportet ergo uti calidis & plenioribus cibis, sinapi, apio, eruca, pipere, agrimonia plurima. Confert corporis exercitatio, meracum bibere, raroque lauare, caput sine intermissione purgare; ueneri denique non parcas.

Ver incipit ab VIII. Idus Februarij usque in VIII. Idus Maij. hoc tempore crescit sanguis, & febres & humores dulces. Oportet uti rebus frigidis, amaris, & siccis, & quæ uentrem soluant, minimum ieiunare, assidue laborare, tepidum bibere oportet.

Aestas.

Aestas incipit ab VIII. Idus Maij usque in VIII. Idus Augusti. hoc tempore nutritur cholera rubra, quæ facit febres acutas, causton, synochus tertianus. Utendum ergo rebus frigidis, nimis dulcibus & suauibus, & bene olentibus, quæ facile digestionem admittant; frigidum bibere & aquosum oportet, cum uenere coitum non facere ex toto, quia & uirtus uiri minuitur, & stomachi dolor, ac debilitas & tremor totius accidit corporis; ieiunia minime exequaris.

Autumnus.

Autumnus incipit ab VIII. Idus Augusti usque in VIII. Idus Nouembris. hoc tempore nutritur cholera melina, ex qua nascitur pituita stomachi, typicas facit febres & acutas, nigrum fel augeatur, uenis crassitudo consequitur. Oportet uentrem purgare, & detrahare humores, & uti rebus relaxatorijs, sæpe uomitum prouocare, minime ieiunare, a uenere quoque & frigida abstinere. His omnibus suis temporibus utere, & per totum annum integram salutem transibis sine auxilio medicorum.

De humoribus.

Nunc uideamus de unoquoque humore, ut in humano corpore fieri uel generari habeant, uel qui hominem reddant. Corpus enim rationabiliter ex quatuor constat humoribus, scilicet, sanguine, phlegmate, & utraque cholera, quæ dominantur in suis locis. Sanguinis uirtus est circa cor; cholera rubra dominatur in dextro latere in epate, quod iecur uocamus. Cholera uero nigra in sinistro latere est, scilicet in liene, quod Græcè *σπλην* appellatur. Phlegmatis autem alia pars in capite, alia in stomacho est. Sanguis calidus & humidus est & dulcis. Cholera rubra amara & uiridis & sicca est. Cholera nigra acida & frigida. Phlegma frigidum & humidum, colore milium. Hæc omnia in suis temporibus, ut denotatur superius, crescunt, & dominantur siue per diem uel noctem. Sanguis dominatur ab hora noctis nona usque

na usque in horam diei tertiam. Cholera rubra ab hora diei tertia usque in horam nonam diei. Cholera nigra ab hora diei nona usque in horam tertiam noctis. Phlegma ab hora noctis tertia usque ad horam noctis nonam.

Emunctoria humorum et ætates.

Hi etiam hñt respirationes p singulas corporis partes. Sanguis p nares, Cholera rubra p aures, Cholera nigra p oculos, Phlegma p os & nares. Hi quatuor humores p quatuor dominantur ætates. Phlegma cū parte sanguinis in pueris dominatur usque in annū 14. Exinde cholera rubra dominatur cū parte sanguinis usque in 35. uel 40. dein à quadagesimo quarto uel trigesimo quinto anno maxima pars sanguinis dominatur cum cholera nigra usque ad suam ætatem. Tabes etiam faciunt in unoquoque homine & mores. Sanguis facit pueros moderatos, blandos & formosos. Cholera rubra facit iracundos, acutos; ingeniosos, & leues, macilentos, & multum comedentes, cito digerentes & uentres solubiles. Phlegma facit corpora composita, uigilantes, & intra se cogitantes, canos cito producentes. Cholera nigra facit subdolos, auaros, & perfidos, tristes, somnulosos, inuidiosos, & timidos: qui habent uirtutem calidā, dominantur in superiori parte: qui uerò frigidam in inferiori. Hi uerò quatuor humores pulsi habēt suos. Sanguis facit pulsum plenum & æqualem & humidum. Cholera rubra citatum & tenuem, tardum, & segetem. Cholera nigra tenuiorem, asperum, percutientem. Phlegma facit pulsum minus plenum, humidū & æqualem. Isti humores sine se esse non possunt, sed in omnibus habentur ætatibus. Si unus ex his minuitur aut decrescit, longam facit ægritudinem. Simili modo: si quis augmentare & excedere cœperit, ad longam ægritudinem perducit, si imperitum medicum habuerit, qui non intelligat, ex quo humore fiat ægritudo. Scias autem Meccenas, quod si fuerit per culpam sanguinis ægritudo, succurrere debes frigidis cibis & acidis & siccis, quia sanguis calidus & humidus est & dulcis. Si ex cholera rubra est, da ei frigidum & humidum & dulce, quia cholera rubra, amara & ignea est. Si ex cholera nigra, da ei calidum & humidum & dulce, quia cholera nigra est acris & frigida. Si ex phlegmate nata est ægritudo, da ei assidue dulce & siccum & calidum, quia phlegma frigidum & humidum & falsum est. Et cum hoc factum fuerit, perduces ad propriam sanitatem ægrorum. Si uerò facilius commodis fruamur, & incommoda uitemus, percurrentia uitia in signis naturalibus cognoscamus, cogita quod mortifera emendemus.

Quibus uitij caput obnoxium.

Cap. V. I.

NAM quasi uertigo & tenebræ caput adtentant. Solent etiam illud uarij dolores attingere. Si pericilia prægrauantur, aut tempora pulsibus micant, aut oculi manè lachrymis fluunt, aut caligo impedit uisum, aut sonant aures. Quando ergo aliquid tale sentitur, caput purgare debet, sed leuiter, aliquo grauiore medicamine, origano uidelicet Indico, id est de India, & hyssopo coma in mulla cum melle lentissimo debet infundi. Cumque illa fecerit succum, ex eo ad dimidium heminæ in uino oportet sereno & calido die ieiunium gargarizare & expuere. Qui hæc facere neglexerit, huiusmodi incommodis subiacebit. Grauat auditus, & interiore aurium parte humor erumpit. Fit creber motus & sonitus, inde lipitudines, & diuersa oculorum nittia: inde ulcera & alopecia capitis, & fluensa capillorum. Inde scrophulæ, quas Græci χοιροειδὲς uocant: Inde suffocationes, inde uua stillat, qui morbus plurimos excitat: in deditum dolor & cruciatus.

De pectoris dolore & curatione.

Cap. V. I. I.

SI uerò à pectore incommodum surgit, solet his agnosci indicij. Primum capitis & pectoris sudor existit. Fit quasi crassior & plenior lingua: salua amara & falsa sentitur. Scapulæ & latera grauantur, oscitatur assidue, tremunt interdum brachia & manus. Interpellat etiam sicca tussis. Nocte sentitur, & experit à somno, mens trillis & nubila est post soporem. Algor pectus infestat. Contra hoc ergo tale remedium succurrit. Si quis post cornam plenus, cibum & potum maxime dulcem uomat, ut materiam simul phlegmatis & fellis amittat: sed sic, ut ante raphani radices minutas edat. Idem nasturtium & finapi folia terna atque herbarum rutæ pariter trita sumenda accipiat. Deinde aquam tepidam superbibat, & sic prouocet uomitum. Tunc ille humor noxius, qui uel amarus uel falsus sentitur, reiectus plurimum subleuat. Certe si non potest uomere, Ne stomachus lædatur, ieiunet die tota, & si necesse fuerit, & alia, usque dum humores malos conficiat: quia assidue uomendo, solet stomachus corrumpi. Qui autem ista contempserit, his morbis obnoxius erit, aut melancholicus erit, aut lateris dextri doloribus uexabitur, aut grauedine somni opprimetur.

De uentre.

Cap. V. I. I. I.

HAEC signa præmittit. Venter ipsius torquetur & corruptione ciborum cum potu eiicit escam. Genua deficiunt. Corpus omnè adgrauatur & dolet. Crura torpescunt, & occulta febris grassatur. His ergo significationibus sic oportet occurrere, ut uenter ipse molliatur. Salubre est autem, si lappatij foliorum in aqua decoctorum succus bibatur, uel ipsa ut holus in cibo sæpe sumatur. Nam & mercurialis herba ad eum modum decocta si bibatur, plurimum iuuat. Similiter & cauliculas brassicæ in aqua coctas, ad

ditō melle & sale: & decoctionem eius usque ad heminam unam, utilissimū est bibere ieiuno, temperato cum uino. Qui hoc adhibere cessauerit, aut ciliacū sit, aut uentris resolutione laedetur. Inde dysenteria, inde sciatia, inde podagrici, inde coxx dolor, inde morbus articulorum, inde hæmorrhoides circa anū, quæ ex uentris uitio erumpunt.

De uitijs uesicæ. Cap. IX.

CVM uerò ex uesica imminet morbus, nec minus ipsa solet iisdem nunciari indicijs. nam multa sentitur inflammatio, & frequenter uentris uentus emittitur ruſtatu, color paller atque grauat, urina sordida & liuida, & uix exiit. His cognitis, talis erit medela: Foeniculi & apij radices in uino albo atque odorato madefacies, & ex eodē uino cyathos duos, tantundem aquæ calidæ mifces, & ieiuno potui dabis. Quod si hoc non fecerit, obnoxius erit hydropifi.

Note lapidis in uesica.

Signa eorum qui lapidem in uesica habent. Natura eorum subhumida est, pruriginem patiuntur in ano, & mingere non possunt: nascitur hæc causa infantibus magis, quàm iuuenibus, qui minores lapides mingunt.

Cura.

Sumito petroselini semen, apij semen, betonicæ radicem, saxifragiæ, zinziberis, ellenij radicem, tiliæ, baccas lauri, urticæ maioris, semen alani, radicem spicæ, roris marini, costi hortulani radicem, cardonis radicem, agarum, marthubium album, singulorum drachmam unam: mellis modici. tere omnia, dabisque quādo febricitat, manē & sero in uino.

Meientes furfures.

Sunt præterea qui furfures mingunt, qui per urinam in calice natant. signa hæc si uideris, scias lapides maiores esse in uesica. Natura eorū si fuerit manibus fricata, intus redeunt lapilli, & confricatione in labijs uesicæ fit scabies, & emittunt illos per urinam, uel furfures.

Cura.

Dulcia comedant, & lac caprinum mox multū bibant, si non feбриunt, cāncros fluuiatiles comedāt.

Antidotum ad hæc: semen apij, cuminum, melantij, fiseij, æquo pondere cum lacte, manē, & mel lis cochlearia singula cōmifces omnia calida, dabis manē ieiuno cochlearium unum, olera māducent, maluas, passinacas, asparagos, & porros: tibi uerò loco, oūa sorbilia, & succum hordei cum dulcore & pipere quotidie accipiant, balneisque utantur.

Antidotū ad uesicæ proclutionē exploratissimū. Sume saxifragiæ, spicæ, betonicæ, squinanti, cinna mi, carpobalsami, costi, abſynthij, ciceris, succi liquiritiæ, acori, hyperici, reupōtici, chamæleōtis, petroselini, dauci, ireos, opopanax, ana unciam unam, confice & utere. Item petroselini, saxifragiæ, apij simit bulliat, & sanabitur. Item saxifragiæ, azari, gummi, betonicæ, piperis, ana unciam unam, mellis libram unā, uini quantum res postulat, quæ quidem in balneo bibant.

Curatio doloris uesicæ.

Ad uesicæ dolorem cura talis est: inunge oleum rutaceum per clysteres frequenter egroto in mare. Fœminæ uerò matrix infundenda erit, & extrinsecus pectinem & inguinem ex oleo cyprino calido, & cū lana succida fasciabis. Aliquando admiscebis castoreum, si fortē plus calidum fieri oportet. Item clystere ex decoctione fœnugreci aut radicem maluæ cum oleo mixto & calefacto: & si uesica stricta fuerit, subtili uōmento relaxare & iterum adducere oportet.

Vesicæ uerò patienti calculū, adrianum si dederis cum apozymate, radicem alexandri & seminis ozimi, aut bruciæ, aut plenipugilli cicerum rubeorum, curabitur. Similiter potio iustini, cum uino calido si dederis, facit. Filanthos potio calculos frangit. Mus quoque in uesica lapidem rumpit.

Ad petrā uesicæ, saxifragiæ, grana solis, petroselini, quinquefolij, asparagi, bruciæ, agrimoniz, in uino coquantur, ad tertiam redeant, & postea cola, & adhibe paululum mellis, & gariothlorum uncia unam: da bibere manē tepidum, quasi phialā unam. Sumito item staphisagriæ uel saxifragiæ rapsiæ radicem, asparagi radicem, petroselini, apij, piperis, singulorum unciam unam, grana solis, solidum unum, Alexandri solidum unum, leuistici solidum, manē quantum sufficit, dato.

De his qui mingere nequeunt.

His qui mingere non possunt, oleastri radicem, cinimumque & cepulas terito, & in oleo coquito, ac super pectinem ponito.

Item paritariam tere, & calefacta super pectinem fascia applicata mirifice confert. Pasce item hircū triennem, uel uetustiore, etiā, per nouem dies, aut per mensem ad summum, de aniso, & leuistico & de folijs hederæ ac lauri, uel apio & petroselino, & postea occide in die iouis, luna decurrente, & collige sanguinem eius, & sicca diligenter, ministraque drachmā unā in balneo per triduum, puluerizatum subtilissimè, uel si potes, cum apozymate nardi & cinnamomi, & cicadarum siccatū puluere dato, mirabiliter prodest, & cum omni celeritate lapides frangit & expellit. Hircus uero de quo mihi iā dictum, pascat in cal. Augusti, uel post calendas, uel etiam ante. Item apprehende leporem in die iouis similiter luna decurrente, & occide ipsum, & eius sanguinem collige, & inuolue pellem eius in ipso sanguine, & in furnū mitte,

mitte, uel in alium quempiam locum, ut comburatur, & puluerem delicatissimum confice, & de eo com-
misce cum petroselini puluere, & anisi & leuistici, & utere in balneo cum uino per triduum. & fiat ua-
porarium siccum cum uino, & de molaribus lapidibus.

De abstinencia. Cap. X.

C V M senseris aliquod uitium corporis, statim abstineas à cibo & potu, quousque senseris febrē posse superari: & si necessitas fuerit, usque ad decimum diem semper exiguum & paruum cibum sume. & sumas ouum forbile, & succum de simplicibus & digestibilibus, unumque album ac lene parce non dilutum: & postquam senseris beneficium, postero die balneum ingredieris, & cibo firmo uel potu utaris, ut corrobores stomachum. quarum & obseruationum & refectionum rationem habendam precipimus, ne quid omnino uitij corpori tuo accedat, sed perpetua sanitate stabilis sis totus.

De nomina. Cap. x. I.

QVI frequenter uomunt, semper sani esse solent. Non enim modicum adiutorium sibi natura inuenit. Scimus enim, uomentes non solum cholera, sed & phlegma dolorificum mouendo euomere: unde capitis fit magna releuatio. deinde molem cibi & potus conuenit uomere, ut non plenitudo nascatur, uel corruptela. postea escas dulces sumendas & calidas propter uenas & constrictionem uentris, censet.

De ratione corporis uel uiscerum. Cap. XLI.

N E ignorans quispiam medicus rationem organi uentris uel uiscerum, contraria adhibens homini, mortis terminum ponat, rationem ostendo. Neque enim facile potest quibuslibet causis interaneorum occurrere, nisi loca & signa cognouerit. cuius organi ratio talis est. Pulmo utrasque partes pectoris superiores continet, cooperiens cortices capitibus fimbriarum suarum. Stomachus autem, qui os uentris appellatur, positus est inter utrasque partes hypochondriorum, id est in medio costarum mollium, utrumque partium. Ventriculus est positus sub stomacho inter lienem & iecur. Epar uero latus dextrum tenet, & ex obliquo extenditur ad partem uentris, & cooperit uentriculum: sub se quidem habet inhaerentem uescicam fellis rufi, quod uentriculum cooperit, & cum hoc hepate calefacit. Splen uero positus est sub costis, mollis in parte sinistra: Et ideo nunc dicendae sunt quatuor elementorum rationes, quemadmodum ex supradictis gignantur, uel ubi sedes habeant, & quid cum exuberauerint, faciant, & quemadmodum inter se mutantur: Non solum in uirtute animantium, uerum etiam & in homine; unde quadrifide corporis elementa, hoc est fel, sanguis, humor & phlegma uires acquirant, ex quibus principia omnium causarum gignantur, quibus etiam loci sedes habeant, uel quomodo immutantur. Cuius rei ratio talis est: Ventriculus, est escarum omnium receptor, & totius corporis praerogator; in cuius capacitate cibus & potus mixtus conuenit: & uentriculus escas, quibus pascitur ipse, intercurrentibus uenis, hepaticaeque donat. Partem pinguiorem in phlegma & mysterio artis naturae, cerebello largitur, ex quo uentriculo pars quaedam humoris supra scriptis neruis ac nodis aspergitur, ut possint sua quaeque membra implere officia. Partem tripartitam hepati condonat, ut dixi, secundo calore cum cocta in sanguinem uertitur. Necessae est quod hepar aliter, ac ualeat ex quo cor & uenae sanguine implentur, cum superna tamen quendam humorem, cuius humoris renibus paruus macus conceditur, ne abundans supradictus humor constrictus, renum nodos dissoluat. Pars tamen quae residua fuerit & superflua, hepatis uescicae adiuuante colore, quod fel appellatur, transit ex parte uersus in choleram rufam; ex quibus coloribus operante calore, & nigra cholera nasci permittit, fecisque sorditia ex sanguine & hepate uenientis partem, melancholicum faciunt humorem, partem dimittit spleni. Sed quia sunt homines imperita mente & curiosi qui forsitan dicent: quamuis quotidianarius, seu tertianarius, siue quartanarius faciat liquores, faciat uim ipsam morborum, ut quotidianarius, quotidiano frigore arcetur, uel tertianarius cur intermisso die, siue quartanarius biduo interposito maxime frigore maceratur: Haec itaque supra dicta electionis adieci, stylo conscripti, auctoritate constructus prudentiae medicinae doctorum. Nam non ambigo, quenquam posse scire ex exuberatione phlegmatis quotidianarium: siue melancholia, hoc est atra bile quartanarium confici. Cuius certatio est, & non pene flexae uolubilitatis habens rationem, & non difficilem sapientiam. Tunc ei intellectus sic appareret, ut superior textus exprimit. quotidianus cibus concoctus, primo ex ipsa phlegmate nascitur; & quia in decoquendo cibus non longi temporis spatium est. Ipsa quia causa quotidiani phlegmatis frigore quotidie uexantur. Ergo, ut dixi, ex cibus phlegma nascitur, & phlegmate operante, secundo calore sanguis creatur. Ex quo sanguine, tertio calore instante, cholera rufa gignitur: & inde tertianarius, die interposito, frigore macerentur. Simili ratione ex cibus phlegma, & ex phlegmate sanguis, & ex sanguine fel rufum; ex quo quarto calore decoctum cholera melina nascitur. unde fit, ut biduo interposito, quartanarius uexentur: sed simili ratione; Si curiosius quispiam requisierit, quae ratione omnis typicus prius frigus patitur, quam febrem: quia febres calidae sunt, & res calidae frigora facere non debent. Cum rei talis reddenda est ratio: quia omnia suprascripta elementa non ex suis locis per corpora effunduntur, nisi quia exuberauerint ultra naturam, una quae res abundare, ut ipsa exuberationis causa acrior calor efficitur.

SORANIEPHESEIIN

Cum de loco suo per corpus fuerit effusus, & acius corpus eius obripitans alget, & tam diu pauendo, timendo patitur, quandiu increuerit calor, ex commotione corporis; & omne quod fuerat effusum in caloribus consumitur, quod frigus recidere possit, & sic fit, ut post frigus calor dominetur, sicut su perius dixi de eo, cui quod perdit dies, per diem iterum acquiritur, ut sit aliud quod effundatur. Similiter diem intermissum, uel biduo interpositum tertianarius uel quartanarius, alimentum suum acquirit tarditate acquirendi, sicut superius demonstratum est: hæc ergo ratio diligenter est edicta, quantum arbitror, quæ res frigus facit ante calorem.

De quatuor elementis corporis, & eorum uirtutibus. Cap. X I I I.

N V N C me conuenit dicere, quos morbos inferant superius memorata elementa corporis, id est phlegma, sanguis, humor, & fel. quod non profusione sermonis, sed magistra comprehensione demonstrato. Phlegma quod primo gignitur, frigidam & humidam habens uirtutem, quotidianarius, ut dixi, facit: & interrupto quodam humore, facit pedum tumorem: perpetuitatem corporis seruans, sine ulla collectione; non ut apostematibus euenire solet. huius uero phlegmatis humor uicinumque sibi, epas & stomachum & pulmones facilius lædit, & lateris exiccat dolorem, rheumatismo nato, & capitis scotosin infert, & podagram, & schiam, & dolores capitis commouet, & parotidas nasci permittit. Sanguis uero periculosior in finem, calidiorem & humidior em habens uirtutem. Hic facit synochos phlegmati mixtos, solas uero amicas ingerit mortes, & uite otioz opisthonicos & tetanicos, & emprosthonicos, & apoplexias: paralytim item & plethoricos facit. Cholera rufa calidam & siccam habet uirtutem, & tertianarius, ut dixi, facit, & causon, & synochos, & aciores dolores lateris commouet: uel cum torquet acius, quod phlegma facere nouit. Nam & acredine sua, exulcerando intestina, uel exurendo, dysentericos efficit, & erysipelas incendit, necnon & apostemata nasci permittit. Cholera nigra, quam *μελαγχολία* uocant, id est fecem sanguinis excocti, frigidam & siccam habet uirtutem. hæc facit ictericos, & quartanarios, & uentris periculosam duritiem, & ulcera pascencia, & caneros, & ulcera iuncta cancris. Quæ quidem cholera nigra si per uomitum aut per uentrem fuerit effusa, ex ipsa exulcerationis causa tota, cum facilitate infert mortem. Melancholia autem, id est sanguis excoctus, morbum conciliat regium, uentrisque periculosam duritiem. Phlegma uero choleribus rufis mixtum, hemitritanos facit, quos tacito Galenus quotidianam & tertianam coniunctam dicit. Nam usque adeo manifestum est, ut tertiana ex choleribus rufis oriatur, & quotidiana ex phlegmate. Planetas autem appellant febres, quas non unus sed plurimi humores infestant, & ex ipsa egritudine simili uarietate uexantur: sed omnes, quas superius memorauerim febres, non nisi die critico medicis conuenit nosse, idque etiam clinici, ne per ignorantiam non intelligendo contraria adhibeant, & periculum faciant mortis, seu homini uicto, id est longam ægitudinem conciliant.

De quatuor temporibus siue latitudinibus omnium causarum. Caput X I I I.

SC I R E quoque debet medicus, quatuor esse tempora omnium causarum, maxime febrium: nempe initium, augmentum, status, & declinatio. Quæ si non intellexerit medicus, grauer homines lædit. Scire debet irem medicus, quid in initio, quid in augmento, quid in statu, quid in declinatione debeat agrotanti adhibere, id est in quo tempore curet, in quo cibum uel potum ministret, & in quo ab hisdem abstineat, & quando dormire æger debeat, uel in quo tempore uigilare sciat, & in quali cubiculo jaceat.

De trino uirtutum numero. Cap. X I I I I.

T R I N A itaque ratione continetur homo, atque diuiditur. Virtus nanque animæ quæ regit totum corpus, dicitur Ζωοὶ, ψυχροὶ, & ψυχροὶ. Zoticæ est uirtus uitalis, quæ facit uitam membris uel corpori toto, in corde consistens. Preptice est uirtus quæ partem tribuit membris corporis. Psychice, sedem in capite, id est in cerebro habet, quæ sensum facit, motumque præbet, & intellectum nutrit.

De quinque sensuum claritate. Cap. X V.

N A M quatuor sensus in capite sunt, cum tamen & ipse quintus inde sit, puta uisus, auditus, odoratus, & sapor & tactus. Qui sensus quinque hoc modo probantur: Visus similitudinem, uel colorem omnium, uel cuiuslibet materie proprietatem demonstrat. Auditus sonos, uel uoces cuiuslibet rei intellectui tradit. Odore intelliguntur ea, quæ de odoratu sunt, puta bene oleria, graue oleria, stiptica, austera, pontica, putrida. Sapore intelliguntur amara, dulcia, acia, salsa, ambusta, stiptica, lenia. Tactum intelligimus cuiusque rei molitiem uel duritiem, uel ponderis uel leuitatis uel aspritudinis estimationem docet: quia nequidquam tangimus, nisi scire potuerimus. & quid scimus, nisi quod ante uideamus, uel audierimus, uel gustauerimus? Sed nunc de ista tractasse satis est. Vnde magis ut coepimus, breuiter percurramus, quia multi medicorum hæc ignorant, de symptomatibus: rursus redeamus per omnia, ut inueniamus uniuscuiusque causæ originem. Hæc enim sola ratio poterit tribuere tibi, ut scias congruam uniuscuiusque causæ diligentiam uel curationem.

De conceptu, & seminis coagulatione. Cap. XVII.

NAM concipit mulier natura uolenter uiri semine, & mulieris sanguine, quamuis ipsum uirile semen sanguis sit, unde & maiores nostri hos uere cognatos, consanguineos uocant. Vnde summus quoque auctor Homerus sic ait: Hic nanque tuo semine, id est sanguine gloriosior esse, & scimus quosdam, qui dicunt quod semen sanguineum sit, cum sanguis rufus est, & semen candidum. Certam rationem ostendo; quemadmodum mare colore cyaneo sit, dum est in eo tranquillitas. Si quod illi natura tribuit tempestatis in saxo uel in scopulis collisum, spumam candidam facit, & quemadmodum uinum coloratum, si in calicem coagitatum fuerit, spumam efficit albam: Simili modo & sanguis ad hos suorum membrorum repercussus, spumam facit albam. Necessse est cum uiri semen, & mulieris sanguinem superuenient aut declinant, unaque confluant, formantur in utero, sed temporibus corroborentur. Nam si quoties cum mulieribus coitum facimus, mulieres ipsae conciperent, greges nos infantum sequerentur, id quod Graeci πορναύτης appellabant. Certo autem tempore mulier concipit, aut incipiente sanguine aut deficiente. Sed quidam ait: Ego cum muliere menstrua habente coitum feci, & non concepit in utero: quia maior pars fuit sanguinis, & minor seminis. Deleta est illa minor pars seminis à maiore parte sanguinis. Infantem temporibus componi atque collocari manifestum est, septimo numero, septem spatijs contineri, septimo mense nasci. Septimo anno infanti dentes cadere, & bis septimo pubescere, & nucleantibus mammae semen generare, ter septimo barbam habere, septima die in ægitudine periclitari: Quid aliud, nisi septem stellas, fidera, astra omnia ministrare, sic & infantem in utero materno formari atque componi? Est autem numerus septies multiplicatus, in confirmatione partus.

Qui embryo singulis mensibus sese gerat, & absoluat. Cap. XVII.

RATIONEM & perfectam hominis formam siue figuram hominis, infans in utero accipit, & quadragesimo die, hos ante numeros ut partus edatur, septies multiplicari oportet. Ita ergo quicumque in utero materno figuram hominis accipit, in tricesimo die, septimo in se nascitur, ergo septies duplices sunt dies CCX. qui faciunt menses septem. Si quis autem die quadragesimo figuram hominis acciperit, nono mense intrante decimo nascitur, hoc est, septies quadragenarii faciunt dies CCLXXX. qui faciunt menses nouem, & dies decem. Ita ergo, ut diximus, septimo aut decimo mense qui nati fuerint, uitales erunt: qui autem non impleuerunt numerum, legitimus partus non est. Manifestum est infantem in utero temporibus formari. Intredite prius iactus seminis nostri in utero materno, generat umbilicum, & facit rissum, hoc est congregationem sanguinis. Secundus mensis expressionem corporis facit. Tertius mensis corpori tribuit animam. Quarto mense unguis accipit, & capillos inducit, & mutum facit infantem: ideoque foeminae nausent. Quinto mense induit foetus similitudinem seu patris siue matris, aut adulterum demonstrat. Sexto mense adducit confirmationem neruorum. Septimo mense medullas consolidat. Octauo mense ossa & neruos confirmat. Nonus mensis maturum mouet infantem omnium rerum beneficijs factum ad unguem, de quo tenebris ad lucem producit. Infans autem sic continetur in utero; summa pars capitis clunibus continuatur: genua autem oculis sunt apposita, unde & concaui exeunt, unde & genae dicuntur. Denique aliqui aut dolore, aut pro iniuria ad genua se prosternunt, & statim lacrymae ex oculis mouentur. Quare infans dum tangit terram, uocem dat: eo quod inflectam tangit terram, & tenuis spiritus à luce concutitur. Ergo mulieres quae in nauibus pariunt, mutum pariunt. Cur ergo infans non loquitur, sed uagit aut balbescit? Certa ratio est, quia dentes non habet. dentes enim nostri adiutores sunt linguae organi genus sunt, quorum modulatrix est lingua. Infans enim quandiu dentes non habet, uagit: aut ubi duos uel quatuor dentes habuerit, balbescit, uel mulstat; at ubi impleuerit os, loquitur. Dentes autem nostri dati sunt ad praecidendum uel frangendum omne quod edimus, quorum priorum sunt gemini. Sequentes dicuntur canini: tertio militares, quos nos molares dicimus. Dentes uero nostros quid esse putamus? omnia ossa medullam habent, dentes autem medullam non habent. Omnia ossa confirmantur & curantur, & ad locum suum reuocantur: dentes autem sublati, ad locum suum reuocari non possunt. Sed dentes nostros qui uitiat humor, nequissimus est, quia caput descendit uiscus. Humor ergo capitis cum semel in cutem diffuderit in ea facit phlegmones, & erysipelas, alopecias, parotidas, churadas, uulnera, dolores, ulcera, uertigines oculorum, & aurium feruorem & lippitudinem, naribus polypum, gingivarum inflammationem, dolorem dentium & denudationem, ita ut aliquid calidum & frigidum in ore continere non possit: ita si quis aliquid gustauerit, statim morsus cum sanguine sequitur: quorum passionum curas & diligentiam singulorum in sequenti sigillatim exponam.

Que signa in laborantibus letalia. Cap. XVIII.

AD has uoletudines nullum adhibeant medici remedium, nullum quærant auctorem medicinae, cum hæc signa uiderint. Capitis dolor si fuerit, & tumor in facie subito nascitur sine ullo dolore, & si sinistra manu & in pectore superscriptus fuerit tumor, & si nares sibi affidue scalpēt, uicesimo tertio die morietur. Phrenetico si ambo genua rosea facta fuerint solida cum inflammatione, ipsa die morietur.

SORANI EPHESII IN

Oris uicia si fuerint nata, & buccae in labore fuerint, & in collo uenae sint extensae, & papulae fuerint super ipsas uenas petrubeas, uel albae natae fuerint, uel somnus tardus fuerit, & lauacrum desiderauerit, uel uaporem calidum, quinquagesimo secundo die moritur. Affectio haec infestat illos qui satis calide amant lauare. Vuae cui uicia fuerint, si sub lingua papula apparuerit instar pediculi porcini, & lauacrum sine uaporem desiderauerit, in ipsa passione morietur. Febrientibus acutis si inter duos digitos in manu tumor niger in modum horbilis uisus fuerit, & si dolor erit ab initio aegritudinis, & lauacrum affectauerit, tertio die discedet. Stomachus cui doluerit, & acutis februerit, si in dextero pede pustula ei nascatur acerrima, & nullum desiderium habuerit, uicesimo secundo die morietur. Peripneumoniaco si ungues de pollice manus nigrescant, & in fronte papula sanguinea nata fuerit, & sternutatur frequenter, septimo die morietur. Epar cui doluerit, si in collo eius natae papulae fuerint quatuor iunctae unius coloris, & pollice perdisprinitus fuerit, & urina ueluti sanguinea exierit, intra septem dies morietur. Cholericus quis laborans, si iuxta umbilicum ei natae fuerint tres papulae in modum ciceris, una alba, alia rubea, tertia sublimida, eadem die morietur. Ventris dolore si quis fuerit tortus, & in supercilio eius papula in modum auelanarum colore atro infra cilium, intra quatuor dies morietur. Splenetico si furunculi multi in sinistra manu nati fuerint, & per nares sanguis quasi spumofus fluxerit, duodecimo die morietur. Schizae coxendicis uel dolor si fuerit alicui, si in sinistra parte rubor spissus sit, & sine labore, & olera cocta desiderauerit, uicesimo quinto die morietur. Dysentericus, si post aurem sinistram papula in modum modici nata fuerit, cum si admodum frequente, uicesimo die morietur. Sani ex quacunque causa excreantibus, si maculae ei natae fuerint, sicut solet per omne corpus instar Aegyptiacae fabae, eadem die morietur. Interaneis causis qui laborant, si papula dura in aurem ei nata fuerit albo colore, & uenter abundans fuerit, uicesimo die morietur. Intestinum cadens si cui doluerit, quod medici radicem dicunt, & dexter cubitus ei liuidus fuerit, & uinum satis desiderauerit, quinto die morietur. Vesicae dolor cui fuerit, si sub axilla sinistra papula seu pustula nascitur, & quasi uideatur grauitate dormire, decimo quinto die morietur. Dysuria, hoc est urinae difficultas cum infestari, si in sinistram aurem furunculi in modum lenticulae quamplures nati fuerint, & in ipsa aegritudine oculos sibi fortiter fricauerit, undecimo die morietur. Sanguinem reiicientibus si in gutture eorum ordo laniati fuerint, uel de ore eius salua per mentum descendit, uicesima die morietur. Haemorrhoidas habentes, si in plantis eius pustulae multae nigro colore suffusae suboriantur, uicesimo octauo die morientur. Pustulas habentes & uulnera, aut fistulas, aut anthromata, uel quolibet apostemata, si supra ceruicem, aut supra umbilicum, aut iuxta cor, uel iuxta mamillam papulae in modum lenticulae multae eis natae fuerint, & dulcem cibum desiderauerint, quadragesimo die morientur.

Quam nam singuli menses diuina utiliter exigam. Cap. XIX.

Martius.

Menſe Martio dulcibus utendum eſt. dulcia oportet tum bibere, aciores cibos comedere, aſſum, balneum uiſitare, ſanguinem non minuere, ſolutionem uentris nullam admittre: nam ipſa frigore attenuat.

Aprilis.

Menſe Aprili ſanguinem expedit minuere, potionem ſolutionis accipere, carnes recentes comedere, a radicibus abſtinere, calidum uſurpare, balnea calida uiſitare, dolorem ſtomachi purgare, unguento cataphico uiſitare.

Maius.

Menſe Maio calido conuenit uiſitare, caput purgare, uenam hepaticam incidere, potionem ſolutionis accipere, balneis calidis uiſitare, cataplaſma in capite ponere, turbulentos oculos ſanare, holeribus frigidis non uti, acrumen comedere, & lactucas non tangere.

Iunius.

Menſe Iunio ſingulis diebus mane aquam frigidam bibat, uinum quantum uoluerit, neque cenam, neque medum bibat, lactucis quis uiſitetur.

Iulius.

Menſe Iulio uenere abſtinere oportet, neque ſanguinem minuere, ſaluia & ruta uiſitare, potionem ad ſoluendum non accipere.

Auguſtus.

Menſe Auguſto maluis & caulis abſtine, acria comedito, ceruſiam & medum recens noli bibere.

September.

Menſe Septembri omnia quaecunque accident edito: quia tunc omnis eſca cum tempore ſuo conſecta eſt. buccellas item in lacte inſuſas ieiunus comedito.

October.

Menſe Octobri racenis uti conſert, muſtum bibere: quia & corpori prodeſt & ſolutionem efficit. porris item plurimis utendum eſt.

November.

Menſe Nouembri cinamomum bibere eſt utile, & balneis nullis lauare, caputque nullum comedere: quia tunc ſanguis coagulatus eſt, & de calore humorem mouens: uenam denique hepaticam incidere, & genibus uentofas imponere.

December.

December.

Mense Decembri bonum est studium impendere, uenam capitalem incidere, uentosas imponere, quia in eo tempore omnes humores preparantur: caules noli manducare.

Mense Ianuario tres gluippos de uino ieiunus quotidie bibe, alijs uero potionibus quæ uentrem laxant non utere.

Mense Februario de pollice manus sanguinem minue, purgatorijs utere; sic tamen ut ante accipias ad deponendum, diagridium confectum, & statim calidum intres balneum: & quando omnia membra desudata fuerint, cum aqua calida & uino bibito.

Quoniam pacto in singulos menses potiones preparari conueniat. Cap. XX.

EXPONIMVS atque ordinamus, qualis per unumquemque mensem, & tempus, potio de herbis sit optima homini & salutifera ad bibendum, quæque totum corpus saluum reddit: Caput denique & pectus, & omnia interiora illesa custodit; per omne etiã tempus superfluum opprimit & detergit humorem. Cuius compositio hoc modo conficitur. Mense Martio mittis saluic unciã unã, piperis drachmas treis, cinnami unciã unã, garioflorum drachmas duas & semissem, pyrethri drachmas treis, zinziberis drachmas duas, spicæ unciã unã, mellis despumati phialas treis, uini fortissimi phialas triginta: confice ut mos est, ut præclara & suaui potio sit ad bibendum, & singulis diebus ieiunus bibe uel ante cibum uel post cibum. & multa salus operatur in corpore huius, si in toto mense Martio hæc sedulo peragere non negligis. Cæterum in mense Aprili in hanc potionem absinthium, quoque, & omnia quæ supra memorauimus, immisce. In mense Maio, leuisticum, & omnia ut supra. In mense Iunio, betonicam, & cætera ut supra. In mense Iulio, gamandream cum omnibus quæ mox memorata habentur: In mense Augusto plantaginis radicem & cætera prædicta. In mense Septembri, agrimoniam misce, & reliqua quæ diximus cuncta. In mense Octobri, quinquifolium, &c. In mense Nouembri, millefolium, &c. In mense Decembri, poma de spino albo, &c. In mense Ianuario, saluiam & pulegium, & omnia præfata. In mense Februario, lauri baccas & costum, omniaque cætera ut supra.

Quis, quæque, & quando uena incidenda. Cap. XXI.

IN occipito, propter querelas capitis incidimus usque ad os, mensura quatuor digitorum ab aure. De analogia in ambobus temporibus, propter effusionem nullam. De sublingua duas, propter rheumatinguatum, uel uiria oris, uel dentium. De media fronte, unã incidimus, propter capitis dolorẽ, & alienationem, phrenesimque. De naribus item, propter grauitatem capitis. De collo duas, propter abundantiam humorum in capite, uel in oculis, aut gingiuis. De manibus unã, secus digitum minimũ, propter inflammationem splenis. Super pollicem uenam incidimus, propter inflammationem pulmonis & rissim rheumatizantes. De subtalo pedis duas, propter podagram, & propter affectionem nephreticam, uel propter sciaricam; uel mulieri cuius menstrua non ueniunt, aut non concipiunt. De subdigito pollicis pedum duas, propter indignationem testiculorum. De brachio tres, cephalicam nempe, melon & hepaticam.

De quatuor bitum generibus. Cap. XXII.

CHOLERAE sunt quatuor in homine: fulua, rubea, nigra, pleumatica. Fulua ascendit tempore ueris per stomachum. Rubea ascendit tempore æstatis, & iacet in sinistro latere. Nigra ascendit hyemis tempore per sinistrum latus. Pleumatica ascendit tempore autumnus, & in plemonem in homine. Cholera fulua dulcis curatur apio & fœniculo. Cholera rubea, betonica, agrimonia, centaurea minore emendatur. Cholera nigra, costum, gingiber, & altã cum melle & calido uino, cum herbis hortulanis, aromaticis, & cataplasma in latere sinistro ad stomachum efflagitat.

De alia mensum obseruatione, phlebotomiarum; utili & necessaria. Cap. XXIII.

OPTIMUM est per singulos menses studiosè obseruare, quæ multi auctores scripserunt. Mense Aprili, uena quæ mediana dicitur, de brachio incidenda est, propter thoracem atque pulmonem. Mense Septembri, uena lateris ob pleuresim & hepatis infirmitatem. Mense Nouembri, bonũ est gerfas & circubitulas, quas uulgo uentosas appellat, imponere: quoniã tum omnes humores parati sunt. Mense Decembri, uenam cephalicam incide, propter uitia capitis, & oculorum infusionem. Mense Februario, uenam de pollice: quia tum febricitat terra, & omnia quæ in ea sunt. Reliquis uero mensibus non est tempus & opportunitas phlebotomiarum; nisi fortè uehemens urgeat necessitas. Nã si necessitas fuerit, neque die, neque tempus, neque horã incisionis expedit expectare; nisi à XV. cal. Augusti usque in III. Nonas Septēbris. Istis nanque diebus sanguinem diminuere officit. Oportet autē phlebotomorum

SORANI EPHESII IN ARTEM MEDENDI ISAGOGE.

incisio semper cum cautela fieri, perinde atque Hippocrates quoque docuit. Ait enim: Si medicus esse uolueris, semper time, & non inculpabere. Porro in phlebotomia considerare oportet, ut aliquibus in pondus I L. & semis, aut multum I I L. aliquibus secundum aetatem, secundum uires, secundum mutationem coloris sanguinis fiat. Quod si a principio exierit niger, usque ad rufum sanguis effluat. Quod si spissum fuerit & crassum, usque ad tenuitatem aquosam, neque tamen usque ad λεπδομίαν. Quod si in emissionem sanguinis quis in frigidatur, uel choleram in cerebrum ascendere significat, uel phlegma nimium conclusum esse in stomacho, non habens exitum. Quod si sanguis proprius tollatur, nocet: si alienus tollatur, adiuuat: & si λεπδομία contingat, talem diligentiam adhibe: Hyeme plantas ac facies in calida fouebis, æstate in frigida. Naribus etiam apponendi sunt odores, pulegium aut menta, uel balsamita, persulsoque latere aceto. φλεβοτομία mentem sincerat, memoriam præbet, uescicam purgat, cerebrum excitat, medullam calefacit, auditum aperit, lacrymas stringit, fastidium discutit, stomacho proficit, digestionem inuitat, leuiorem uocem producit, sensum coercet uenire, somnum fugat, anxietatem tollit, proprium sanguinem nutrit, & extraneum eijcit: longiorem quoque uitam ministrat: omnes mali succi collectiones, pestiferas ualutudines, & εἰμύκτην profligat, deponit: dolores, febris sagittas, & uarios morbos prohibet: uenerem excitat, caligines tollit, &c. φλεβοτομία γὰρ oportet his, qui in acutis morbis τῶν ἀνθρώπων laborant, propter capitis læsionem, & oculorum infusionem. Quia quemadmodum nec cœli semper potest esse serenum, nec mare tranquillum: sic & corpora nostra integra semper prosperitate frui non possunt.

De ratione potionis. Cap. XXIII.

QVI uult potionem solutionis accipere, hoc modo id faciat: una die anteaquam eam assumat hora tertia, cibos quam solubiliores poterit, sumat, non ad saturitatem tamen, atque ea die amplius non comedat: bibere autem si uoluerit, amplius non prohibemus. Sequenti uero die potionem in aurora accipiat cum aqua calida tritam, uel cum calido uino tritam, sicut piperatam spissam: aut da ei pilulas cum liganis. Ipsa uero die nec manducet, nec bibat usque dum solutio terminetur. Postquam uero terminata fuerit, manducet, bibat, dormiat, & a frigore caueat. & tertia die post acceptam purgationem, accipiat reconciliationem eundo dormitum absque coena, adriam maiore antheriace. Quarta autem die balneetur. Sexto uero die sanguine minuatur, & usque ad decimum diem, digestilibus cibis utatur, & potionem custodiat, nec in equum ascendat: postea quocunque uoluerit, pergat.

De mensuris & ponderibus. Cap. XXIII.

Μέτρον, id est mensura. Cadus, siue ut Romani uocant, urna, amphoram habet unam, semiamphoras duas: Amphora uero quam metreten plerique dicunt, continet modios treis. Modius habet congius duos. Congius habet senos sextarios xestas'ue. Sextarius capit cotulas binas. Cotula heminam unam habet, & acetabula duo. Hemina habet tripoliōn I L. Tripoliō, unam heminam mediam, hoc est tulcis I L. Tulcis capit libram unam. Libra habet uncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma scrupulos tres. Scrupulus diuiditur in obolos duos. Obolus in siliquas tres. Siliqua habet grana hordei quatuor. Mistron hoc est cochleare. Cochlearium habet auellanam unam. Auellana drachmas duas. Drachma siliquas septem. Solidus habet scrupulos quatuor. Cyathus cuathus'ue, lystra habet quatuor. Nux maior habet drachmas quatuor. Faba Aegyptiaca cōtinet scrupulos duos. Faba Latina habet scrupulum dimidiatum. Faba Græca, scrupulus unus. Scrupulus medius, grana ciceris duo.

SORANI EPHESII ISAGOGES IN ARTEM MEDENDI FINIS.

Nancelius Sestori S.

on tractatus, ut huius Sorani commentarij seu editionis cuiusdam potuerit, in Græca & Latina lingua: metretiden, xestari, &c. arte, aut medicina partem continentis; qui uelut ex Lipp. parissima refert, modo ex alijs partem præteritis authoribus, conspice multa conscripta; quæ scilicet uelut innotuit, misere deperdit, cum multis indicio & estimatione perlegenda. Nos cum multa quidem restituerimus, sed uelut innotuit, cum prope par, uel etiam maior futurus sit labor, quam in corrigendis colligendisq; Sibyllæ folijs, aut membrjs Absjrti in uonâ corpus inueniatis? Vale, & uonib. Nancelius Augustus. 1574.

Incipit C. p. l. i. s. e. c. u. n. d. i. d. e. r. e. V. a. l. e. r. i. a. n. i. : e. u. m. e. c. c. e. l. i. t. a. t. i. o. n. e. b. u. r. d. e. f. e. c. i. t. u. r. n. o. n. e. u. l. d. e. f. e. c. i. t. u. r. S. i. p. a. n. e. , K. e. p. o. i. t.

C. P. L. I. N. T. I. S. E. C. U. N. D. I. D. E. R. E

M. E. D. I. C. A. L. I. B. E. R. P. R. I. M. Y. S.

Capitis ægritudines & medela. Caput I.



APITIS dolor leuatur, si de porri sectiui succo cochlearia duo, & unum mellis permixtum infundatur, uel in nares uel in auriculas. Veteres dolores & uertigines, betæ nigre succo, temporibus illinito, emendantur. In dolore utilissimum est, caput ungi succo intubi cum rosaceo, aut myrtino: aut acetum fronti imponitur, aut ruta ex uino bibitur, & tritæ succis instillatur capiti cum aceto: aut rosacea corona de pulegio, prodest imposita.

Pollinem filiginis admixto oui albo, simul & quiddam salis albi conspargi oportet, fronti que illini, & super fascia pedali alligetur. Anethū uti de horto sublatum est, decoquitur ex oleo, & succo eius dolor unguitur, Serpillum quoque decoctum in aceto, illinitur fronti & temporibus: & si difficilis somnus sit, amygdalino oleo caput perungi oportet. Tempora in dolore alio elixo illiniuntur. Nuculorum Persici farina, cum melle & aceto capiti illinitur. Nuclei item amygdalini triti, fronti utiliter imponuntur, & etiā in febre. Bacce quoque lauri impari numero in oleo cōteritæ, capiti instillātur. Si à sole doleat, cupressi folia cōtrita, cum polenta imponuntur. Hedere folia mollissima queque, trita cū aceto & rosaceo, aduersum omnem dolorem fronti illiniuntur. Herba que in capite statim nascitur collecta in alicuius uestis panno, & lino rufo illigatō, confestim dolorem sedat. Panacis radix in oleo cōteritur, & caput perungitur. Veretrum in rosaceo decoctum & contritum, capiti instillatur. Rucedano ex oleo & aceto trito, hemicraniz inungantur. Ossa de capite uulturis sub collo alligare prodest: Gallinaceus pullus inclusus abstinet nocte & die, sed & is qui languet: Deinde eiusdem gallinacei uel plumæ uel cristæ alligatur collo dolentis: Sarculus etiā ex nido milui puluino subditur, nescienti ægro. Murenarum pellū cinis ex aceto fronti illinitur. Cochleæ matutino se pascēti caput, arundine præciditur, & in linteo licio alligatur, colloque suspenditur. Fracto capiti tela araneā imposita ex oleo & aceto, non recedit, nisi sanet dolorem. Aqua pota quæ superfluit de bouis aut asini potione, remedeatur si ter potetur. Ceruini cornu cinis, illinitus ex aceto & rosaceo, prodest. Ad capitis dolorem, Mentam uiridem & laudanū cum aceto tritum fronti inducito, curat mirifice. Cui caput à dolore findi uidetur, facies succum ex folijs hederæ, & admiscēs oleū & acetum, unge nares, & statim dolor sedabitur. Hederæ nigre succū cum oleo rosaceo & uino mixto tempera, & fronti illini, sanat cito. Aduersus omnes dolores capitis, uel ne à sole doleat, Hederæ folia mollissima trita ex aceto oleo rosaceo fronti illinitur. Hirundinis nidi aqua diluti latum fronti & temporibus illinitum, dolorem capitis sedat. Si ex frigore caput doluerit, herinū oleum aut laurinum cum myrrha calidum capiti illitum, & lana intincta supposita, mire sanat. Mali terræ radicem cōteris, & cōmiscēs cum oleo rosaceo, & ex eo caput & tempora perunges, continuo dolor releuabitur. Mentastri folia in cibo sumpta, & in aqua decocta, & ea potui data, dolorem capitis sedare manifestum est. Os de capite uulturis erutum, & ex uino potui datum, statim dolorem sedat. Ad dolorem capitis & insaniam: Quāquam plurimæ causæ sunt, dolores capitis quæ faciunt: Nam si sol acerrimus caput percusserit, subito mens aufertur, & uelut infans efficitur homo, aliena loquens, & nullum agnoscēs: quod cum uideris, statim eum in obscuro loco collocas, & comprimi facies. Vinum is uel poscam, nec ipse odoretur, nec qui ei ministrat, bibat. Post hæc facies excoqui anethum in aqua, & ex ipsa calida caput ei fouebis septies in die, & ter in nocte: lumen uero, nec diē uideat, nec ignē. At ubi corpit resipiscere, offeres ei lumen lucernæ. Postea oleum rosaceum calidum impones ei in cerebrum cū lana, & ligas ei die ac nocte, sæpiusque mutabis. Cum iam corperit conualescere, tunc cum produces ad lumen, & diluti uinum bibat, sed ante oxymel in aqua calida accipiat, postea rosati; & sic uiuum hoc modo quasi de morte suscitabis hominem. Res enim est saluberrima & experta. Confectio unguentia ad capitis dolorem, siue ad hemicraniam. Euforbij unciam unam teris in mortario, & addis ceræ tres, olei optimi libram unam, facis cerotum lini igne solutum, & inde permiscēs euforbium.

Ad Catarrhum uel abundantiam humorum capitis remedia, & quid sit catarrhus. Cap. II.

OPORTE T, diu permanēte capitis dolore, præcipue sine febre, materiam detrahete per nares, uel per os; quæ res etiā auribus uel dentibus diutius dolentibus prodest. Brassicæ succus naribus infusus, caput purgat, doloremque mitigat. Betæ nigre radices succum minus q̄ dimidiū cochlear, & mellis cochlear mixtum in nares infundis, ita ut palatum transeat, & pituita omnis decurrit: & cum uis cessare, oleum in os accipiat. Trifolium in aqua decoctum, & ea aqua potui data, pituitas extrahet. Sinapis unciam unā, rapæ seminis unciam unam, piperis grana XX. nasturtij seminis, erucæ, origani, & apij seminis tātundem ex aceto & melle colliges, & ex aqua calida per dies septem gargarizabis. Origani item uel hyssopi, & herbam conilam in mellitissimo mulso triduo macerabis, deinde coqui facies, & sereno celo tepidum ieiunus per triduum gargarizabis. Sinapis cochlearia duo excoque, & mulsi cyathum unum admisce, & calefacies, & in ore diutius continebis; tunc aperto ore pituita defluit. Maluz semen & uino nigro contritum, gargarizas tepidum, & pituitam capitis extrahet. Mellis heminam unam, sapē hemi-

nam unam, aceti acerrimi sextarium unum, sinapis unciam unam, hyssopi tussii & cribrati unciam unam, origani tussii & cribrati unciam unam; simul omnia coques, ita ut pinguedinem aquatoris mellis accipiat, & colatum diligenter gargarizabis ad solem, quandiu potes. Hyssopi unciam unam, origani unam, thymi unam, stafilagrie unam, pulchij unam, sapa optimae sextarium unum, aceti heminam unam: omnia infusa, tertia die coques carbonibus lentis, donec unam partem decoquas, & duae remaneant. Hinc quartam partem contra solem hora tertia gargarizas; postea recentem teneas; sic humoris abundantia restringitur, & ieiunus usque ad horam nonam. Cretici hyssopi fasciculum unum, & sarureiz siccae fasciculum unum, mittes in ollam nouam; adde aquae fontanae sextarium unum, & passii cretici unum, decoquesque ad tertias, & calidum gargarizabis, ita ut purgato capite, os mellicrate tepido tertio colluas; ac postea ita facies de aqua fontana. Hyssopi fasciculum & origani fasciculum in sapa optima per triduum macerabis; hoc colatum ut potionem bonam calidam contra solem triduo gargarizabis. Hoc si per singulos menses seruaueris, sanus eris non solum capite, sed etiam pectore & stomacho. Si caput phlegmate uel frigore plenum fuerit aut catarrhus obtinuerit, mittis in ollam rudem sapa sextarios duos, aceti sextarium unum, hyssopi, origani, pulchij, fasciculos singulos, & coques ad tertias, & exinde per triduum coelo sereno tepidum gargarizabis; sed pridie radicem pyrethri contra solem masticis ieiunus usque ad horam diei sextam. Item stafilagrie grana trigintaquinque cum paucis granis masticis comasticabis, & aperto ore omne phlegma capitis proijcies. Betae rubrae radix contusa, linteolo teneri exprimitur, & succus naribus trahitur: mirifice purgat. Hederis succus eris teritur flore; hic naribus infusus acerrime purgat. Sed quia ustulat, oleo rosaceo infundis, & statim lenit. Item stafilagrie unciam unam, pyrethri unam, pulegij unam, origani duas, hyssopi duas, aceti acris sextarios duos, sapa sextarium unum, & omnia pridie infusa aceto & sapa, die alia decoquuntur, donec uirtus herbarum excoquatur: postea colatur, & tantum mel adijcitur, ut acetum temperetur. Alia pinguior, origani unciam unam, hyssopi unam, stafilagrie unam. Thymi semiunciam, iris semiunciam, pyrethri semiunciam, pulegij unciam unam, foeniculi uncias duas, caricas numero quinque, sapa sextarium unum, aceti sextarios duos, sinapis unciam unam. Cum pice uirginea pauca grana masticis tota die mastica, ut phlegma prouoces altera die coelo sereno gargarizabis. Item gargarismus qui conficitur sic. Grana sinapis uncias duas maceras toto die in aceto dulcorato, stafilagrie aciculis triginta, comarum hyssopi uncias duas tolles, & omnia simul teres; addes mellis despumati uncias sex, & conteres cum aceto dulcorato sufficienter; exinde per triduum coelo sereno gargarizabis; uterisque uino modico aquato & dulcibus cibis. Res est saluberrima abstinere & a uino, & a clamore, balneis & uento & frigidis, ita tamen ut post paucos dies uentriget. Purgatorium capitis ad omnes humores deponendos de toto corpore. Hyssopi unciam unam, origani unam, sinapis uncias duas, stafilagrie unam, masticis unam, careni sextarios tres, caricas pingues numero triginta. Aliud ad purgandum caput. Radices betae rubrae de granulis eius succus cochlear unum, olei rosacei miscebis cochlear dimidium, & substinens implebit os suum oleo aut lacte, deinde resupinabitur in scamno contra solem, ita ut caput ei dependeat, atque ad se spiritum retrahat, donec injecta res in nares cerebrum contingat; qui post paululum reueratus inclinato capite sedeat, ut illi humor decurrere ualeat. Aliud purgatorium capitis: Manum plenam hyssopi in aqua sextariis tribus coques ad medietatem. Deinde mittes heminam mellis & aceti cyathum dimidium, hyssopumque auferes, & gargarizabis contra solem coelo sereno. Si plus purgare uolueris, Sinapis puluerem cum oxymelle commisces, & contra solem gargarizabis. Purgatorium capitis tempore aestiuo. De fruti heminam; aceti cyathum, hyssopi comam. Haec omnia pridie infundes, alio die in cacabo nudi feruere facies, & tepidum gargarizabis; & postea de uino ueteri aufero tepidum semel gargarizes, & os laues. Hyeme, Sinapis puluerem cochlear unum, mellis cochlear dimidium, mitte in calicem, & eundem misce calidum; post haec cola, & gargariza tepidum; postea aqua mulsa os laua; & gargariza semel, & ne rauescas, oleo frequenter, post cura & gargariza. Nitrum rubicundum cum aceto acerrimo teres diligenter, & imple totam cutem capitis pridie sero, & ieiunus laua. Si autem uesperis, mane inducito; deinde infusas uel die tertia ptyllanas decoques, ut succus spissus fiat: quibus additis, oua recentia numero sex uel nouem, & commixta simul tepescas in calore balnei; & exinde caput laua. Ferunt unciam tussiam & cribratam, & in linteo subtili ligatam, contra solem naribus admoiebis. In sole fricari cutem balsamo uel pice liquida statim prodest. Itemque pyrethro & costo. Item duabus aequis partibus piperis albi partem dimidiam, stafilagrie drachmam unam, origani drachmas duas, nitri drachmam unam, tundes & cribrabis, commisces & dabis in nares ei, qui patitur, ut ad se ipsum ducat, & statim liberabitur: sed & in ore compresso mirabiliter humor detrahatur. Puluis ad rheum capitis. Salsugine uncias sex, sinonij seminis sex, balaustij duas, gallae alexandrinae quatuor, spicae celticae una, gallae curiauias duas, aphronitri matronalis compositi libram unam. Haec omnia tunde & cribra, & sic utere. Caput uero de aquae rose decoctione laua. Alius puluis ad catarrhum: gallae alexandrinae unciam unam, lini unam, rose siccae unam: haec omnia tundas & cribres, & sic mittas in caput. Cytini uncias duas, syctione duas, galles duas, croci unam, aloes unam, spagni duas, rose siccae sex, balaustij duas: haec tunda & cribrata uteris. Sapa Constantini, nitri rubei assii unciam unam, galles duas, costi tres, celtice, laudani, spicae idice, myrrhe, iris poliaris, myrti siccae folij, croci, acacie, aphronitri, uncinarum, corticum, malogranati ficci, uncias tres, cassiae unam, sapa gallice libras quinque, & uncias duas. Omnium specierum puluis ex aqua lupinorum costorum colligitur, de quo facies pillulas: quas qui uolueris, in uino resolues. Balaustie uncias duas, myrrhe duas, sandarace una, aloes tres, cytini tres, laudani tres, folij tres, costi tres, rose siccae tres, spicae nardi duas, sarco collee duas, sapa gallice libram unam, in uino

stiptico sapa solues : deinde collige quę sunt sicca . facit ad catarrhum & humores exiccandos . Confe-
ctio troisci ad humorem capitis exiccandum . Styrae uncias tres, laudani tres, bdellij tres, myrti tres, fo-
lij tres, enulę tres, acacię quatuor, cannę aromaticę duas, amomi duas, costi duas, gallę de cerro duas, ja-
dany uero & myrrham & styrae infundes in uino ueteri, & teres & admisce alijs speciebus, & factos
troiscos siccabis in umbra & uteris . Et ita ut troiscum in puluerem redigas, & sic inter capillos spargas .
Sapa Cōstantini . Simonij uncias duas, rosę unam, cypri unam & semis, balasti unam, costi unam, cassię
unam, libani duas, oppij unam, amomi unam, folij unam, spicę unam & semis, myrrhę unam, aloes unam
sandaracę semiunciam, agantę Aegyptię duas, sapa gallię libram unam, aqua delupino . Ad catarrhum
das beneficium, myrrhę drachmam unam, stircis drachmas quatuor, teris cum sapa, & facis catapotas ad
magnitudinem erui, & dabis in lecto, secundo siue tertio : & cum acceperit, sorbeat de ipso careno tempe-
rato cochlearia quatuor . Est quidem Catarrhus humor fluens ad nares, ad fauces, ad pulmones, unde ca-
tarrhus dictus est a fluore : Gręci enim hunc fluorem dicunt a quibusdam alijs speciebus & nominibus ca-
tarrhus appellatur . Ad nares factus, Coriza, ad fauces, Branchus, ad pulmones, Phthisis . Ex quibus deprehe-
dimus ad nares factum catarrhum, & grauedinem ad os . Constrictione narium & frontis coniungi fluori
humores tenues, aut crassos, aut uirides cum lternutationibus cōtinuis & odoratis difficili sensu . Ad fau-
ces, ex pruritu quodam fauciu cum titillatione, uoce obscura, aut irata cum sensu pręfocationis, & trans-
uorandi difficultate, cum tussicula . Ad pulmones, cum grauedine thoracis, cum tussicula uehementi, cum
sputis spumosis aut pinguibus aut purulentis .

Cephalalgie remedia .

Cap. I I I .

AD Cephalalgiam, cerebellum uulturis cochlear dimidium ex uino bibat, quod si bibere non patie-
tur, ipsum tritum cum oleo uetustissimo & modico cedrię commixtum : exinde frontem unges, & in na-
res mittes . Si quis autem cedrię odorem non sustinet, balsamum pro ea mittet . Est enim res saluberima
& experimentata . Item ad dolorem māmillarum quę de cancro dolent, cuius signa hæc sunt : Si do-
lor de humero exit, facies linteolum larum digitis quatuor, ut ab humero usque ad māmillam, ubi dolet
pertingat, & induces medicamentum quod conficitur sic : Ammoniacy uncias tres, adipis anseris unam, the-
rebinthinę quatuor, butyri decem, libani duas, olei ueteris decem, succi uetuli seminis decem, addis & ui-
tellos ouorum numero octo, ut cum necesse fuerit, utaris . Quod si necesse fuerit, securę conficies medica-
mentum hoc, quod secamentum non sentiat, strigni unciam unam, succi camizę unam, succi mandrago-
rę unam, croci unam, pollicis unam, torpedinis sanguinis unam, turturis marinz sanguinis unam, ligatum
perdicis cum felle, aut certe de uulture totum insimul cum alijs speciebus facies inductoriu, & uteris quouis
que uelis ut non sentiat, & ita accedis ad curam .

De phthiriasi & porriginis curatione .

Cap. I I I I .

PHTHIRIASI & porriginis, quę plerumque in perniciem solent conuerti, sic succurren-
dum est . Perunguntur bulbis tritis ex uino, item sulphure ex uino, item per se ex cedro illiniuntur, alium
cum aceto & nitro tritum inficitur, farina foeniculi cum uino & nitro porriginem purgant, & furfures
Ex aceto idem præstat radix ueratri in oleo decocta, trita, suffusaque . Hysopum ex oleo tritum, & infusa-
tum, capitis phthiriasi medetur & pruritibus . Oua ex uino & oleo cyprino & cedro elixa, pruritus, sa-
biemque tollunt . Porriginis discutiuntur felle otillo illito cum creta gymolia, donec inarescat . Lendes
& alia capitis tetra animalia quę nocent, lotionē aquę marinz necantur . Item si illinatur fascia terra
cum nitro & oleo, nitrum alumini mixtum, capiti infictum, porriginis tollit . Ad furfures capitis .
Aqua ubi betę fuerint decocta, cum aphronitro caput lauabis : Et sero, cum dormitum uadis, ex earū suc-
co mixto rosaceo, caput perunges . Ad porriginis & furfures . Semen nasturtij cum adipe anseris tritum,
& mixtum, abluat, & furfures capitis eicit . Betę uiridis succo caput quod porriginosum lotum frequen-
ter in balneo, celeriter emendatur . Maluz agrestis, hoc est euisi manipulum in aquę marinz sextarijs sex
ad tertias decoques & uteris . Calchantum, sulphur uiuum, aphronitrum, æquis ponderibus, cum uino
ueteri teris & uteris . Hellebori item albi uncias tres, sulphuris uiui duas, calchanti tres, compone, & uteris .

Ad ulcerā in capite manantia .

Cap. I V .

ULCERA in capite manantia, sanquam proprius morbus, præcipue infantibus nascuntur, sed
& uiros & mulieres si cōperint, grauiter infestant, quę felle taurino efficacissime sanantur . Vitulino
felle cum aceto tepescito illiniuntur . Seuum uisuli cum sale utilissimum est . Testarum muricę uel pur-
purarum cinere ex melle illiniuntur . Alliu cum sua ueste comburitur, cinis que eius ex oleo imponitur .
Menta contrita & apposita siccatur . Oleum amygdalinum cum uino mixtum, expurgat . Galbanum cum
melle illinatur, & folia rubi in quo mora nascuntur, contrita imponuntur . Mysum tritum cum uino in-
lana superponitur . Malua erratica in urina humana trita, ualde desiccatur . Omnia capitis uulnera cum
purgata sint, iucundissime ad cicatrices perducuntur hoc ceroto . Spumę argenti tunz & cribratę libra
una, cerussę optimę libra una teruntur, & cerę albę tantundem ex olei rosati libra una remittuntur, & re-
frigerantur .

frigerantur. Deinde raditur & miscetur cum spuma & cerussa; adijciuntur ouorum quatuor lutea & trita: Resina picturae librae sex, cerae albæ unciae sex in oleo decoquantur, ita ut pistillo misceantur & oco modo perungantur. Ad tineas. Stercus porcinum combures super testam mundissimam, cui trito admisce acerrimum acetum, & facto medicamento lauas prius caput subficientis ex uino, post hæc superlines. quo si usus fueris frequenter, capilli ei ut sano nascuntur. Ad tineas capitis uel imbricatus: nubes rauidas ustulatas cū corticibus distemperas cū aceto, & imponis; similiterque stercus anseris. Ad eos qui caput humidū habent, picis drach. XL. resinae siccae drach. XL. cere drach. XL. striptinæ humidæ drachmas XX. aceti cocle drach. unam. Item cōfectio catarchici piperis denarios decem & octo, scāmoneæ optimæ cādida coctæ unciam unam & semis, amei denarios decem & octo, foeniculi seminis denarios quindecim, apij seminis denarios octo, carei denarios nouem, epithymi denarios octo, agarici denarios nouem; dabis uerò in potione denarios sex; teris species singulas & cribras & colligis in hemina mellis de spumatis. foliis autem potionem istam in calidæ aquæ cochlearibus duobus, & addis cochlear unum liquaminis & aliud aceti, & ita dabis. Reficiat qui accipit, buccellam panis infusam in uino puro. Pessus Liuianus qua utebatur Liuia regina, faciens ad secundas & tumores & duritias & inflationes, & quibus de loco mouetur matrix, & ad omnes passionēs matricis. Adipis anserini uncias quatuor, anethi seminis uncias quatuor, hyssopi & cerodiarum quatuor, galliæ quatuor, adipis leonini quatuor, urfini quatuor, struthionis quatuor, medullæ ceruinæ quatuor, butyri recentis quatuor, sagapeni quatuor, myrrhæ & stactis quatuor, folij quatuor, silini quatuor, cōconidij quatuor, terebinthinæ quatuor, dymini quatuor, mastice quatuor, olei amaracini quatuor. Adipem autem soluens igni lento, ceram admisce & uteris.

De alopecia & eius curatione. Cap. VI.

ALOPECIAE magnam foeditatem afferunt, & propter hanc seruorum pretia diminuuntur: necessarium est eas quoque emendare. Itaque cinere pellium uiperarum sparso celerrime emendantur: Nasturtio cum sinapi trito & imposito, emendat. Cydonia cocta ex uino, & cum cera trita & illita, capillos restituunt: roboris quoque pillule cum adipe urfino trite emendat. Glandes item fagine cinis cum melle & oleo cedrino illinitur. Cinis ungularum mulæ uel muli ex oleo myrtino. Cinis item muricum sparsus. Cinis hermatij recens cum pice liquida. Gallinacei fimus illitus replet. Sandaracæ acce to fluentes capillos contegit. Leporinus cinis cum oleo myrtino. Fel taurinum cum alumine Aegyptio tepesatum illinitur. Adipem anserinum ex melle conteris, & ut supra monstraui, uteris. Epithyma diapysco: seminis foeniculi uncias quatuor, olei ueteris libras quatuor, cerussæ duas, aquæ sextarium unum. ea omnia cum bene trita fuerint, præcipue litargitum, sic mittis in aquam, & omnia simul permisce ut unum corpus perficiatur, & ita mittes in cacabum, ubi oleum miseris, & coques, admoto lento igni, & ita addes in cacabo ceræ albæ libras duas, colophonie libras duas, terebinthinæ duas, coquasque modice & bene permisce. Post hæc supermittis pinicellos debuccellatos, quos conficis ita: buccellati optimi bene cōditi tunfi & cribrati farinæ libras quatuor, commisce cum succo quem conficis sic: zuisi uncias sex, camo mille sicce uncias tres, melliloti uncias duas, foenogreci uncias sex, dactylorum purgatorum pond. II. hæc omnia infundis in uino Siculo siue Adriano siue Sabiniente sextarios sex per dies tres, & ita coques, quousque remaneant sextarij duo. hoc ergo apozyma cōspergi facies buccellati farina, & sic facies ut dixi pinicellos latis & subtilis, ac si nouissime cerodarium resoluas diligentissime, cumque solutum fuerit, refundes in mortario, & diligentissime teres, & sic facies mandalia, & repones. facit hoc hepaticis, spleneticis, & ad duritiam stomachi, & ad febres, & ad pectus contritum, & ad podagram, quæ non nimis calida fuerit.

De capillis denigrandis. Cap. VII.

POTEST uideri superuacuum inter remedia corporis, ponere ea quæ ad decorē pertinent: Sed quosdam pudet aut ipsos rubeos esse, aut in tantum luxuriæ indulgent, ut delicæ eorum inter se dissentiant, uolentium in pueris rufos capillos, in uiris recusantium: quemadmodum ergo denigrentur, demonstribimus: ouum coruinum in æneo uase oleo permiscetur, deinde raso capite in umbra illinitur. Habere autem debet in ore oleum is qui curabitur, donec siccescat ouum, ne ei dentes nigrescant, & quarto die abluatur. Sextarius sanguisugarum in duobus sextarijs aceti diebus XL. maceratur ex oleo tritus, de rasoque capiti in umbra illinitur, dum siccescat, & sicut superius prædiximus, in ore oleum tenendū est. Siliquæ erucæ cum suis folijs & caulibus conterentur, & capiti raso illinientur. Folia cypressi trita ex aceto, efficiunt ut capilli nigri renascantur, sed spodiō peruncti, crispi fiunt. Operæpretium est his qui erubescunt senes esse, succurrere. & si canos suos inficere uolunt, tanquam annos detracturi sint, hoc nomine ætati, uermium terrenorum cinerem adijciunt.

Ad Hemicraniam, & temporum dolorem. Cap. VIII.

AD dolorem hemicranij siue temporum, Laser cum lacte mulieris resolutum, & in altera parte auris, qua dolet, infusum tepesatum, ut in ipsa parte incumbat, & in ea quæ dolet, agitet mandibulam, hemicrani dolori carebit. Minutæ cochleæ tritæ, & fronti illitæ emendant. Cornus quoque ceruini cinis

[illegible]

Ph. anacolinus +? *anacollumatis*?

Urtica urens, an urticaria
+ an urticaria perniciosa!

Line.

1. *It's a shame facing.*
 2. *the bubble, acorn, and sugar,*
 3. *and more, and more and more.*

Bar.

an wipora
an paba

from last anti-vol of
 minima offensae
 media anti-vol offensae

conditj, & ingia remedioru.
Remedioru 2^a m.

...aceto, ad, yamara ad, ro'ca
...concha, ad, yamara ad, ro'ca

[Faint handwritten notes at bottom]

[illegible]

arguing out. —

ad indicem
L. p. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

various parts of the body, and the
various parts of the body, and the

of granulation

Happy Birthday

۱۲۸

Amici e committenti,

فصل في بيان

10

100

1



CORIANDRI succus cum lacte mulieris immixtus, & auriculæ infusus, dolorem mirifice tollit:

lazarisque granum modicum auri inijcies, & cessat. Cardamomi quoque succus auribus instillatus, dolorem aurium & molarium dentium sedat. Ad acutissimos dolores aurium, Spuma argenti & myrrha pariter pondere trita ex aqua, & bene leuigata, facies collyria: & cum uti uolueris, remittes ea in rosa liquida, & tepefacta auribus infundes. Frigido quoque si quis utatur eodem medicamento, idem facit. Porcinum fel porri succo commixtum, tepefactum auribus instillabis. Adeps quoque gallinaceus solutus ad horam, & pedus auri infusus, plurimum prodest. Rutæ etiam succum si immittis, curabitur. Ad dolorem aurium & punctiones, oleum rosaceum cum adipe anseris infunde, & transit. Aqua si in aurem intrauerit, & dolorem exhibet, solus succus coriandri in aurem expressus, sine dubitatione liberat & sanat. Rutæ teneræ succus auriculæ instillatus, sine dubitatione, dolorem liberat: & si maligranati cortice fuerit coctus, melius facit. Foliorum quoque salicis succus cum rosa liquida in putamine mali punici calefactus, & inditus auriculæ, mirè succurrit. Ad aurium uitia & repentina antiquosue dolores. Aqua si ingressa fuerit, & statim sublata, facit impotenter graues causas. Exinde enim uentositas, & abundantia rheumatis in capite, tinnitus quoque aurium: quæ dum non curantur, exinde fiunt surdi. Alijs uulnera in aure nascuntur, alijs foetescunt. Quibus rebus ita succurrendum est. Gummi hederæ cum betæ nigro succo tritum & tepefactum auribus infundis, ita tamen ut & rubi teneri succum misceas, simulque antiquam aquam exiccat, uentositatem & dolorem tollit. Troiscus maxime necessarius ad dolorem auriculæ. Catu uncias tres & semis, stafilagriae unam, coconidij unam, sinapis unam, carei unam, fimi columbini unam, aristolochiæ lōgæ unam, cymini duas, hyo unā, cyprij ozymi semine unam, uetri duas, salis ammoniaci duas, baccæ lauri octo, mannæ thuris sex & semis, iris septem & semis, acetij sextarios sex. Hæc omnia tundis singillatim & cribras, & prius mittas in mortarium puluerem calchum, et irim, & teris cum acetij calice pleno. quæ cum trita fuerint, post dies tres mittas reliquas species cum acetij acerrimi sextarijs duobus, & teris: & cum reficauerint, addis paulatim sextarium, donec compleat sextarios sex, terendo per dies quadraginta in sole: at ubi bene tritum fuerit, facis troiscos: facit autem & ad uulnera. Ita de ipso troisco unciam unam teris in aceto diligentissime, & facis seorsim cerotum sic: Olei rosati uncias sex, ceræ tantundem, refinæ frixæ uncias quatuor, factumque cerotum mittis in mortarium, ac permisces & uteris sic. Ad auri dolorem temperabis aquatius. Si uulnera alicubi fuerint, paululum spissius, ut quasi pro emplastro utaris. Fellis caprini uncias tres, & mellis duas, conteris & in strigili calefacis & infundis & lana obcludas: prodest etiam si intrinsecus cancerauerit auri. Oleum laurinum in strigili ferrea missum & tepefactum, infusumque auribus, omnem dolorem tollit. Canabi succus, & de folijs eius auribus instillatus, uermes natos necat: etiam si animali impresseris, uermes interficit. Liquaminis cochlearia quatuor, & mellis despumati duo, tolles & mittes in calicem mundum, & cinerem cineri calido suppones, atque spumam tolles: & cum tepidum fuerit, auriculæ ad omnes dolores infundes. Si putruerit, aut uermiculos fecerit, fel taurinum ex melle despumatum æquis mensuris mittes in testam rudem, quā suppones carbonibus, ut lento igne ferueat, donec in unum admisceatur. Hocque medicamen in uase uitreo colliges: & cum necesse fuerit, ad curam tepefacies in calice, & mundata aure, ex lana medicamentū infundis. Mentæ quoque succum & mel æquis mensuris commisces, & tepefacies; ex quo biduo aut triduo infundis auriculæ, si senserit curam, bene & optime: sin aliās, addito acetum & modicum aphronitru, & simili modo tepefactum infunde auriculæ. Item ad auri dolorem, siue quæ uermes habet, calamenti permisces cum cedria, & infundis.

Ad dolorem aurium antiquum, foetorem & dolorem. Cap. XI.

PVRGANTVR ea omnia, natura nucleorum. De maioribus ergo nucibus nouellistempore suo plurimas colliges, & in optimo oleo uase uitreo conditas, contra solem macerabis, & de ipso oleo mittes in testam maligranati siccam & excauatam, & deinde coques ad cinerem calidum, sed tepidum auribus infundis, omnia uulnera antiqua & foetorem & dolorem tollit. In excauatum malum granatum mittes mel, & auri pigmentum tritum ex gutta acetij. Cepæ succum cum melle quod in carbonibus calefacies, & auriculæ infundis, mirè sanat. Foliorum porri uirginis succum in aurem mittes, & cum crepuerit uulnus, ipsum cum adipe gallinaceo infundes & sanabitur. Cepæ aphræ succus cum melle bene subacto instillatus, aurículas grauer audientes emendat, dolores sedat, purulentas expurgat, uermes necat, aquam euocat & eiicit. Item rorismarini succus cum oleo rosato & sapone gallico simul resolutus & coctus, tepidusque infusus, uetustissimum surdis & pus extrahit, & auditum facile restituit. Bubulum etiam lac cum felle caprino mixtum infunditur auribus foetentibus atque dolentibus. Ad uulnera aurium quæ intrinsecus nascuntur: In calicem mali granati mittes mellis cochlearia duo, & super cinerem calentem ponis, ut leui calore subbulliat, donec sensim decoctum redigatur in unum: & cum tepefactū fuerit, auriculæ infundis. Confectio thymiamatis. Styraçæ isauricæ libram unam, styraçæ calami libram unam, mallicæ unam, uingellæ Indicæ maioris uncias tres, rosæ uiridis libram unam & semis, amomi unciam unam, squinantij unam, gariofolij tres, carpobalsami semiunciam unam, cassiæ semiunciam, croci unciam unam, laudani tres, bdellij semiunciam, myrrhæ unam, balsami quatuor, & de quatuor uncijis balsa

Ad dol. auris, ely.

Coriandri succus, lac mulieris, cardamomi succus, spuma argenti, myrrha, rosa liquida, fel porci, uiscus porci, adeps gallinaceus, rator, strigili ferrea, capres emulsi, carei seminis, fimi columbini, aristolochiæ lōgæ, cymini, hyo, cyprij ozymi, uetri, sal ammoniaci, baccæ lauri, mannæ thuris, iris, acetij, sextarios sex.

Ad aquam illapsum.

Succus coriandri, mali granati, salis succus, rosa liquida, gume succus, rubi teneri.

Ca. Aqua illapsum damna, & granum, uentositas, abundantia rheumatis, uulnera aurium, foetores, uulnera.

Tro

cancerare. bene & optime.

Ad auri dolorem.

Auribus succus, fel tauri, melle & succus, acetij, aphronitru, calamenti, cedria.

Ex lana medicamentum infundendum.

Ad antiquum auris & foetorem, purulentas.

Oleum coriandri, mali granati, uiscus porci, adeps gallinaceus, rator, strigili ferrea, capres emulsi, carei seminis, fimi columbini, aristolochiæ lōgæ, cymini, hyo, cyprij ozymi, uetri, sal ammoniaci, baccæ lauri, mannæ thuris, iris, acetij, sextarios sex.

porri uirginis, i. non plantati. subbulliat.

uulnera sic passim, pro, uulnera.

Confectio thymiamatis.

Styraçæ isauricæ + styraçæ calami

+ sic? Aliud.
Xerophyllum & foliorum

C. PLINII SECVNDI

mi duas mittes cum puluere, & duas serues ad unguendum passillos; mellis uncias sex, uini quantum sufficit; sextarium unum cum rosa & styrace tundis; xyromiræ folia uncias sex, amomi sex, balsami duas, styracis lauricæ sex, ada semiunciam, gariofoli uncias duas, spicæ nardi tres, rosæ uiridis sex libras: omnia facite in passillos: dū facti fuerint, suffumigabis de styrace & mastice bis in die, uel quinquies, quādiu siccetur.

Ad aurium imbecillitatem, uel surdos, & eos qui minus audiunt.

Cap. X I I.

H E D E R A E succus mundissimus cum uino instillatus, plurimum facit. Ad surdos, allium & cepulas cum adipe anseris colas & infundis. Ad surdos, & qui grauiter audiunt, oua formicarum contrita, surditatem aurium quā uetustissima sic sanabunt. Caprinum quoque fel instillatur grauiter audientibus, & prodest: ac bubulum lac cum felle caprino mixtum, & infusum auriculis grauiter audientibus, restituit auditum. Item parum audientibus utile est acetum gargarizare. Brassicæ item puluis in passo maceratus, & linteolo infusus auribus inijcitur, mireque reddit auditum. Rutæ succus tepidus instillatus. Lactantis fel addito grano salis & mellis uno cochleari calefactum anethi surculo, instillabis in aurem, ita ut mox apertus erit porcellus, antequam tangat ipsum fel, auferatur. Cardamomum idem, nasturtium cum ficu tritum, & auriculæ inditum, eis qui grauiter audiunt, prodest. Bouis fel admixtum urinae capræ & tepidum, auribus instillatum, auditum reddit. Surdis & qui grauiter audiunt, ueneticis fel cum butyro & urina ipsius ieiuni pari portione mixtum, in aurem infundis, & surdos non naturales, quamuis multos annos non audierint, curat, & alia eorum uulnera sanat. Ad surdos multi temporis expertum. Maioris cannæ uiridis folia contundēs, & per linteum exprimis succum, tepidumque auribus infundis per dies septem uel nouem: est enim res saluberrima. Succum corticis ligni nucis tepidum per triduum infundes. Serpentis tunicam in uase nouo exoluis, & super cinerem calidum fricas, ex eo oleo tepidum in aurem mittis. Hoc enim ad grauitatem aurium & dolorem prodest. Brassicæ succus cum uino æquis partibus mixtus, & tepidus instillatus auribus, parum audientibus auditum præstat, & dolorem mitigat. Item succum raphaniceis quibus subito auditus aufertur, & nitri puluerem in aurem & acetum superinfundes. De uino etiam & de oleo rosato posterius à parte capitis ungis, quæ unctio etiā & ad dolorē capitis facit.

De parotidum curatione

Cap. X I I I.

R A R O medici parotidum curationem non deuocant à scalpello, cum reprimi possint: & si res exigat, adaperiri collyrij ratione. Reprimit eas radicum brassicæ cinis cum melle illitus. Lupini ex aceto decocti & triti, discutiant uirium. Cinis cum creta tymolia & resina pari pondere exiccat. Apponitur muricum testarum cinis cum melle, uel conchyliorum ex mulla. Sepiz ossa cum axungia uetere contusa. Lini semen tusum cum melle mixtum mitigat. Ficus sicca & uino cocta & trita adiuuat. Comprimat eas fimus columbinus cum farina hordeacea ex melle. Nocturæ cerebrum uel iecur cum oleo tepidum infunditur auriculæ parotidæ. Multipeda item cum resina parte tertia illinitur. Creta quoque tymolia exiccat, & fimus capræ cum axungia illitus. Plantago cum uetere axungia per sanat. Vrsinus adeps conteritur cum seui taurini pari pondere, & fimus capræ cum axungia illinitur. Caput uiperæ in linteolo inuolutum, & faucibus alligatum, sanat. Mentha uiridis cum polenta trita & imposita collectiones parotidum soluit & mammarum uulnera placat. Ad omne genus collectiones parotidum, lini seminis farina cum melle & oleo cocta, adijcias nitri puluerem, & ligni caprifici cinerem æqualibus portionibus: quod cum agitatū est, in cataplasma imponis, & sanat. Item ceræ uncias sex, butyri quatuor, axungie quatuor, cyprini quatuor, bulborum quatuor, axungiam uero & bulbos simul tundes in pila, & cum cera simul liquefacies, & axungia permiscēs cepis. quod colatum seruabis in uase fictili, & uteris. Parotidibus & strumis floribus caltīs den. tres, alij grana II. cum axungia uetere imponis. Itemque strumas, conuallidum, & faba cocta & imposita discutit. Radix gladiolæ cocta & trita cum sale, & imposita. Et item cucumeris syluatici radix decocta, & cum aqua mulla trita & imposita, prodest. Mense autem Martio & Aprili colligenda est. Item ut strumam omnibus radicibus extractis ad sanitatem certissimam perducās, galbanum super impositum strumæ humorem faciliè discutit. Felle bubulo super strumas imposito, tā potentia discutitur, ut nihil supra sit. Caput uiperæ in linteolo inuolutum, & faucibus alligatum, sanat.

Ad oculorum dolorem, uel si quæ capitis sit.

Cap. X I I I I.

A N T E omnia, si bene fuerit purgatum caput & uenter, oculi nullam possunt inualetudinem sustinere: tamen si indoluerint, uteris cataplasmate hoc quod sine folio, passo cretico infundis. Meliloti semiunciam, dactylos pingues anaparticos numero quinque, & seorsim infundis in passo; opij drachmas duas, croci duas, simul teris & bene commiscēs melilotum & dactylos cocta simul ad carbonēs & trita, mittis etiam olei rosati cochlearia duo, & uitellos ouorum duos. Postea uero quā in unum omnia commiscueris, impones ut supra dixi. Sanè si sic se cauerit, pro tempore soluis cum uitello oui & modico passo, & sic uteris. Facit autem non solum ad dolorem, sed & ad tumorem, & hemiraneum. Ad dolorem & tumorem. Adipem oui assi cum apio & croco & melle tritum superimponitur. Laurus ex uino cocta, dolore & tumorem releuat. Chelidonia in aqua decoquitur, & ex ea oculi dolentes fomentantur. De

Stilus

C. PLINII SECVNDI

doniz, & fœniculi, & abrotani, cochlearia singula tolles, & cū mellis sine fumo stillatiui cochlearibus duo-
bus commiscēs, & exinde penna suffundes mane, & post meridiem, & sero: sed post digestionem, lac mu-
lieris, quæ puerum nutrit, superinfundes, propter acerbiter medicamenti ut refrigeret. Hoc etiam ma-
culas tollit, & impetum rheumaris restringit, & omnia vitia abstergit. Balsamum cum melle stillatiuo
æquis ponderibus misces, & exinde oculis infundis. Fel vulturis cum marribij succo, aut puluere &
melle Attico simul mixtum, cum penna oculis infundes; omnem caliginem oculorum aufert: sed & inci-
pientis suffusionis non patietur. Fel perdicis cum melle Attico inunges; oculos item vulturis in linte-
o subtili ligabis, & tota die oculos absterges, nunquam inualitudinem patientur, & si dolentes oculos sæ-
pe absterferis. Itemque myrrham cum fœnugræco pari pondere in uino teres, ut leue sit quasi collyrium,
& inunges. Quidam enim filiam suam sic curauit: Chelidoniz succum, quæ oculis plurimum suffraga-
tur cum collyrio siue aqua marina inungi oportet. in una unctione sanat, & in aqua decocta dolentes ocu-
li fouentur. Melius si succus eius artemisiz & rutæ succo pari pondere, & melle & balsamo; mira enim fi-
cit. Centauriz minoris succum, adiecto melle æquo pondere, permiscēs & inunges; aciem extenuat, &
ipsa herba in aqua cocta oculi fouentur. Vt caligantibus oculis claritas restituatur, & ne facili hoc pe-
riculum incidat: Centauriz herbæ manipulus in uini sextarijs sex coquitur, ac tritum maceratumque
eximitur, inde quotidie hemina mixto melle ieiuno propinat. Sal frixum tritum, admixto melle Attico
inunges, & caliginem tollit. Ros marini cinis cū eius succo expresso, & melle Attico pari pondere mix-
to inunges, caliginem tollit. Ros item caulium & rutæ collectus & inunctus, caliginem tollit. Testudinis
agrestis sanguine inuncto, caligo tollitur. Leporis fel cum mellis Attici parte una mixtum & sæpius inun-
ctum, caligines abstergit. Mel & succum fœniculi, partes singulas, fel perdicis semiunciam, balsamū ad mē-
suram fellis, mellis & succi: Alij oleum uetustissimum ad mensuram mellis, alij euforbiū modicum mit-
tunt. Postquam mixta fuerint omnia, mittes in mortarium, & teres diligenter, transpones in ampullam,
& suspendes ad solem quadraginta diebus, & tunc inunges frequenter. Ceparum Cypriarum acerrima-
rum succum; uel si Cypriæ non fuerint, Germanarum cum melle Attico æquis ponderibus simul teres &
mittes in ampullam; signabis & in fumo suspendes, & uteris. Item fœnugræcum ut bibi solet, & aquā
mullā medicatē paratā simul misces, addis rosæ quantum sufficit, & fœniculi radices mundas. coques
omnia in olla rudi: & cum fuerit spissum, colabis, & repones in uitreo uase, & uteris, ita ut nec fumum nec
atram contingat. Herbam item uerberenā tusam cum axungia, super oculos noctu ligas, & postero die
tollis, & oculus erit mundus. Item ad caligines & omnia oculorum uitia: Hirundinis pulli plena Luna
in nido suo excantur de acu tyrrina, notanturque, ut cognoscantur, restituta acie: capita eorum uel ip-
si integri in olla noua uini comburantur in cinerem, terunturque in puluerem ex ligno ficulneæ uel te-
rebinthino, cinisque eorum cum felle canis laranis diebus septem, partibus duabus balsami & castorei,
partibus singulis tritis, bene inunctus plurimum facit, miraberisque iam desperatas sanare. Hydra ad ca-
liginem uel albuginem uel uulnera: Gallas Alexandrinas nouas non pertusas octo rudes, & cribabis sub-
tilissime, & postea mittes in mortarium Thebaicum: Adde croci denarium cum dimidio, teres per tri-
dum diligenter, & mittes Attici mellis mundi quantum sufficiat, & repones in dolio, & uteris. Ad cali-
gines oculorum & ad uitia uetustissima, & ad scabritudines & obscuritatem, & ad eos qui iam prope ni-
hil uident, & quibus medicamentorum præsidia nulla inueniri possunt. Hoc remedium expertum uis-
tabis, & efficies ut uideant clarissime sine omni uetusto uitio. Piperis albi denarios duos, croci duos, balsa-
mi duos, fellis uiruli seu uulturis siue pulli pugnacis duos, mellis Attici uncias duas, uini ueteris boni cya-
thostres, succi fœniculi unum, & ita compones. Piper & crocū teres diligentissime, & bene leue sit, dein-
de uinum admiscēs & succum fœniculi per partes dimidias: & quidquid superauerit, iterum fundes. cum
ita feceris, iterum teris bene. deinde si quid uini aut succi superauerit, adijcies & teres diutissime. cumque
totum medicamentum tritum & leuigatum fuerit, ut collyrium, oportet transponi illud in pyxide Cypri-
na, & repositum seruabis. Cumque uolueris uti, ex eo unges, & inuenies esse potentissimum remedium,
quo multi luminibus de obscuritate restituti sunt. Hæc compositio ex commentarijs Cæsaris Augusti de-
scripta est, quæ & libentissime utebatur, & omnibus illam laudabat. Sicut autem acrior esse uideatur, col-
lyrium lene admisceat, & non nocebit. Ad caligines & suffusiones statim pistis, quod est filij à fronte & a
felle diligenter collecto, inunges. Aliud ad caligines: Succum fœniculi, fel perdicum, mel Atticum aut
thyminum æquis ponderibus admiscēs, & postea teris, & ponis in sole diebus quadraginta, & inungis si
non senserint curam. ut fortius facias, fel perdicis mittes ad duas partes, & balsami & olei uetustissimi pa-
rum mittes: quidam & euforbiū mittunt ut fortissimum sit. Quæ omnia supradicta, diligenter teres
& mittes in ampullam, & in solem suspendis & uteris cum uolueris, curat mirabiliter. Caulium rorem
cum mellē despumato mittes pari pondere & inunges, prodest. Aliud. Fœniculi radicem decoques,
ex aqua eius, oculos eius fouebis, celeriter omnes caligines discutit. Coriandrum item uiride tritum cum
lacte mulieris, & mixtum, & super oculum impositum, prodest. Pro certo etiam apium & ocimum cum
uino tritum, auxilium præstat. Item ad oculorum tumorem uel epiphoras concitatas: Rosa uiridi trita
cum aceto in careno infusa, dactilo & oleo rosato & lacryma de ouo, totū simul teres, & in linteolo indu-
cis, & tepidum super oculos imponis. Salem candidum ieiunus si quotidie gustauerit, omnes oculorum
caligines citò tollit. Item qui sanguinem habent, tusam fabam & ciminum & uuam passam, simul trita
impones super oculum, & ligabis per triduum, sanitatem adducunt. Itemque cochleas de cāpo tritas in fi-
mul illinies fronti, statim definit. Ad maculas uel cicatrices oculorum, baccas lauri cum lacte mulieris inu-
ges

Ad caliginem oculorum.

Chelidonia, fœniculi, abrotani,
ac mulieris, balsami, myrrhæ,
fel perdicis, oculi uulturis, uini
aqua marina, succus artemisiz, rutæ,
melle Attico, marribij succo, aut puluere
melle Attico simul mixtum, cum penna oculis
infundes; omnem caliginem oculorum aufert:
sed & incipientis suffusionis non patietur.
Fel perdicis cum melle Attico inunges;
oculos item vulturis in linteolo subtili
ligabis, & tota die oculos absterges,
nunquam inualitudinem patientur, & si
dolentes oculos sæpe absterferis.
Itemque myrrham cum fœnugræco pari
pondere in uino teres, ut leue sit quasi
collyrium, & inunges. Quidam enim
filiam suam sic curauit: Chelidoniz
succum, quæ oculis plurimum suffragatur
cum collyrio siue aqua marina inungi
oportet. in una unctione sanat, & in
aqua decocta dolentes oculi fouentur.
Melius si succus eius artemisiz & rutæ
succo pari pondere, & melle & balsamo;
mira enim facit. Centauriz minoris
succum, adiecto melle æquo pondere,
permiscēs & inunges; aciem extenuat, &
ipsa herba in aqua cocta oculi fouentur.
Vt caligantibus oculis claritas restituatur,
& ne facili hoc periculum incidat:
Centauriz herbæ manipulus in uini
sextarijs sex coquitur, ac tritum
maceratumque eximitur, inde
quotidie hemina mixto melle ieiuno
propinat. Sal frixum tritum, admixto
melle Attico inunges, & caliginem tollit.
Ros marini cinis cū eius succo
expresso, & melle Attico pari pondere
mixto inunges, caliginem tollit. Ros
item caulium & rutæ collectus & inunctus,
caliginem tollit. Testudinis agrestis
sanguine inuncto, caligo tollitur.
Leporis fel cum mellis Attici parte una
mixtum & sæpius inunctum, caligines
abstergit. Mel & succum fœniculi,
partes singulas, fel perdicis semiunciam,
balsamū ad mensuram fellis, mellis &
succi: Alij oleum uetustissimum ad
mensuram mellis, alij euforbiū modicum
mittunt. Postquam mixta fuerint omnia,
mittes in mortarium, & teres diligenter,
transpones in ampullam, & suspendes
ad solem quadraginta diebus, & tunc
inunges frequenter. Ceparum Cypriarum
acerrimarum succum; uel si Cypriæ non
fuerint, Germanarum cum melle Attico
æquis ponderibus simul teres & mittes
in ampullam; signabis & in fumo
suspendes, & uteris. Item fœnugræcum
ut bibi solet, & aquā mullā medicatē
paratā simul misces, addis rosæ quantum
sufficit, & fœniculi radices mundas.
coques omnia in olla rudi: & cum
fuerit spissum, colabis, & repones in
uitreo uase, & uteris, ita ut nec fumum
nec atram contingat. Herbam item
uerberenā tusam cum axungia, super
oculos noctu ligas, & postero die
tollis, & oculus erit mundus. Item ad
caligines & omnia oculorum uitia:
Hirundinis pulli plena Luna in nido
suo excantur de acu tyrrina, notanturque,
ut cognoscantur, restituta acie: capita
eorum uel ipsi integri in olla noua uini
comburantur in cinerem, terunturque
in puluerem ex ligno ficulneæ uel
terebinthino, cinisque eorum cum felle
canis laranis diebus septem, partibus
duabus balsami & castorei, partibus
singulis tritis, bene inunctus plurimum
facit, miraberisque iam desperatas
sanare. Hydra ad caliginem uel albuginem
uel uulnera: Gallas Alexandrinas nouas
non pertusas octo rudes, & cribabis
subtilissime, & postea mittes in mortarium
Thebaicum: Adde croci denarium cum
dimidio, teres per triduum diligenter,
& mittes Attici mellis mundi quantum
sufficiat, & repones in dolio, & uteris.
Ad caligines oculorum & ad uitia
uetustissima, & ad scabritudines &
obscuritatem, & ad eos qui iam prope
nihil uident, & quibus medicamentorum
præsidia nulla inueniri possunt. Hoc
remedium expertum uisitabis, & efficies
ut uideant clarissime sine omni uetusto
uitio. Piperis albi denarios duos, croci
duos, balsami duos, fellis uiruli seu
uulturis siue pulli pugnacis duos, mellis
Attici uncias duas, uini ueteris boni
cyathostres, succi fœniculi unum, & ita
compones. Piper & crocū teres
diligentissime, & bene leue sit, deinde
uinum admiscēs & succum fœniculi per
partes dimidias: & quidquid
superauerit, iterum fundes. cum ita
feceris, iterum teris bene. deinde si
quid uini aut succi superauerit, adijcies
& teres diutissime. cumque totum
medicamentum tritum & leuigatum
fuerit, ut collyrium, oportet transponi
illud in pyxide Cypriana, & repositum
seruabis. Cumque uolueris uti, ex eo
unges, & inuenies esse potentissimum
remedium, quo multi luminibus de
obscuritate restituti sunt. Hæc
compositio ex commentarijs Cæsaris
Augusti descripta est, quæ & libentissime
utebatur, & omnibus illam laudabat.
Sicut autem acrior esse uideatur, collyrium
lene admisceat, & non nocebit. Ad
caligines & suffusiones statim pistis,
quod est filij à fronte & a felle
diligenter collecto, inunges. Aliud ad
caligines: Succum fœniculi, fel perdicum,
mel Atticum aut thyminum æquis
ponderibus admiscēs, & postea teris,
& ponis in sole diebus quadraginta,
& inungis si non senserint curam.
ut fortius facias, fel perdicis mittes
ad duas partes, & balsami & olei
uetustissimi parum mittes: quidam
& euforbiū mittunt ut fortissimum sit.
Quæ omnia supradicta, diligenter teres
& mittes in ampullam, & in solem
suspendis & uteris cum uolueris,
curat mirabiliter. Caulium rorem cum
mellē despumato mittes pari pondere
& inunges, prodest. Aliud. Fœniculi
radicem decoques, ex aqua eius, oculos
eius fouebis, celeriter omnes caligines
discutit. Coriandrum item uiride tritum
cum lacte mulieris, & mixtum, & super
oculum impositum, prodest. Pro certo
etiam apium & ocimum cum uino
tritum, auxilium præstat. Item ad
oculorum tumorem uel epiphoras
concitatas: Rosa uiridi trita cum aceto
in careno infusa, dactilo & oleo rosato
& lacryma de ouo, totū simul teres, &
in linteolo inducis, & tepidum super
oculos imponis. Salem candidum
ieiunus si quotidie gustauerit, omnes
oculorum caligines citò tollit. Item qui
sanguinem habent, tusam fabam &
ciminum & uuam passam, simul trita
impones super oculum, & ligabis per
triduum, sanitatem adducunt. Itemque
cochleas de cāpo tritas in filum illinies
fronti, statim definit. Ad maculas uel
cicatrices oculorum, baccas lauri cum
lacte mulieris inunges.

+ misceatur

mel stillatiuum.

lini foliis & centauria minor,
ad caligantes oculos.

Bon.

Bon.

Aug. Celsus.
tyrrina

+ ad fœni pisar

mi. fol. & iunio.

Ad oculi tumorem & epiphoras.

indis, aceto, caruol, dactylus, alius
Celsus.

Sal candidus quædam ieiunus,
conterit caliginem discutit.

quædam discutit fœni, ciminum,
u. passam, cocleas proci illas,
u. u.

ges septem diebus, & septem intermittis, & iterum inunges, & sanat. Ad leucomata. Foeniculi uiridis denarios quatuor, & betonice tantundem teres & facies collyria, & ex his inunges. Ad percussos oculos si sanguinem fuderint, herbam nepetam commanducatam pones super oculos, & noli alligare, & superius iaceat. Ad oculorum item dolorem. Laurus ex uino decocta, oculis humorem tollit & dolorem omnem emendat. Item ad caligines oculorum: Foeniculi & rose & ruta succum, & mel Atticum, & fel hircinum, mixta inunges. Ad albugines de oculis tollendas: Guttas ammoniaci cum lacte mulieris inunges. Ad lippitudines, betę succum cum alumine modico fronti illinies. Cataplasma ad hæc. Daſtilos teres cum uino & pane molli, & calidum impones. Ad pilos eiciendos, qui in oculis nascuntur. Lotium uituli masculi sepe inducat. Ad hordiolum iuxta oculum natum: Tollas hordeaceam farinam ex mulla consperſam, calidam ueluti cataplasma impones circa oculos. Vt fluores tollas: Cuminum in ore masticatum cum salua impones. Item ad hæc, ostream cõbustam & tritam ex uino ueteri impones. Ad maculas oculorum tollendas. Sepiæ testam diligenter in mortario Thebaico teres, & puluerem ipsius sepius in oculos mittes. Ad caliginem. Balsamum acré sepius inunges, hoc & maculas tollit. Ad caliginem iterum oculorum. Cochleæ uiuæ cremantur, & cinis earum melle mixtus inungitur oculis. Item ad claritatem oculorum. Leporino felle subinde inunges, & caliginem tollit.

Ad aciem oculorum. Cap. XIX.

AQVILAE fel cum myrrha & nitro uncia una, inunges, uisum clarum reddit, etiam ut acutissime uidere se intelligat. Item passerini oui alborẽ cum melle Attico mixtum inunges, clareque uidebis.

Ad leucomata, uel ad cicatricem, uel ad maculas. Cap. XX.

CARDVI agreſtis radicem ante folis ortum palo ligneo effodies, tundes ex ligno in ligno roborẽ: excẽptumque succum & colatum, atque in uase uitreo conditum, inunges. Est enim succus ge-
mini effectus. Primum pelliculas membranz tollit de oculis: deinde curat, ut mireris effectum. Cedria
& porri succus inunctus, leucomata & caligines tollit oculorum. Succum cyperi longioris, & oleastri fo-
liorum, & uerbenæ equis partibus cum melle sine fumo, stillatico misces, & inde oculis infundes. Res est
phyſica, quæ etiam cicatricem oculorum curat, quod si hæc quæ dixi non fuerint inuenta, requies betam
purpuream, nigram uel rubeam: quas si tardius inueneris, plantaginis, betæ uel ex folijs cochlear unum, uer-
benæ foeniculi & abrotani succi tantundem, & mel stillaticum similiter in unum commisces, & exinde co-
fundis tepidum, maculas oculorum mirifice curat. Ideo autem parum scripsimus, ut quæ iuxta phyſici
hominum comprobaueris, plus conficias & reponas. Ad cicatrices & leucomata. Adipem anserinum
reſolues, inunctam cicatricem, & leucomata extenuat, & sanat. Caprinum fel cum uino pari mensura mi-
xtum, & in modum mellis peractum, cicatrices & albugines emendat. Item ad albugines oculorum tol-
lendas. Sepiæ testa melle illita comburitur, & cinis eius collyrij modo tritus proſtybio inungitur, cele-
riter albugines de oculis tollit. Bulbis Aphris tritis buccellaginẽ ex eis spissa cum melle & nitro contri-
tam, in modum collyrij inunges; in triduum albugines tollit. Mirtes oleum & mel modicum super secu-
rim euersam, & teres de core aut aquaria, aut olearia diutissime: cumque fuerint in modum collyrij spissa,
inunges. Caue autem ne securis habeat eruginem. Ad maculas de oculis tollendas. Numos nouos no-
uem numero mittes in uas cyprinum cum uino albo & ueteri, & mundissime cooperies per dies trigin-
ta, addes salis ammoniaci ficci albi puluerati denarios quatuor, ossa sepiæ rasa quatuor, æris floris quatuor,
ſumum pulli albi quatuor, succum rutæ colatę cochlear unum, mellis deſpumati uncias tres: omniaque
in unum commisces, & in ampulla repones, & inde inunges per dies singulos usque ad sanitatem. Ad
maculas eruendas facit betonica, & senecio, & chelidonia, quæ in mortario teris, & collyrij modo uteris.
Sicuti autem subito leucomata se in oculis suffuderint, feminis ocyini duo aut tria grana mittes, & clauſa
palpebra tenes, donec coaguletur humor, & i grana se colligat: & post hæc leuiter fordes quæ remaserint,
frequenter in die colliges. quod si senserint curam, iterabis, donec ad sanitatem perducas.

Ad pilos oculorum aduſteros, ut sublati non renascantur. Cap. XXI.

MENSE Iunio sanguifugas numero quinquaginta mittes in ollam fictilem nouã, & cooperies,
ex argilla circunlinies, & mittes in fornacem per spatium sex horarum, deinde cinerem sanguifugarum te-
res in mortario, & quatum exinde duobus digitis apprehendi potest, mittes in mortarium paruum cum
duobus uel tribus guttis aceri acerrimi, & teres, donec succum collyrium fit, tollesque a borſella pilũ cum
radice, & in ipſo tantum punctum cum melle impones de medicamine ſupradicto ter, aut quater in ipſa
hora. Hirundinum pullorũ cinis cum lacte tithymalli permixtus, & euulſis pilis impositus, renasci eos
non ſinit. Caulium ſtirpium aridorum cinis cum aceto laſeratõ mixtus, & euulſis pilis impositus, emẽdat.
Ex ligno caprifici, & cerri, & ilicis cinerem, & lixiuium factum atteritatum acerrimum, ut ſolent ſapona
iii facere; coquatur ſine axungia, & oleo cõfectum line loca quæ uoles, & deſluunt capilli, ut amplius nõ
renascantur. Ad pilos oculorum, ſuffodiens gutta ammoniaci alborẽ oui mixta, pilos illiſtos ſtatuit.
Ad pilos eradican-dos, felis uitulini deñ. unum, caſtorij unum, gummi unum, cum aqua teris, & colligis:

C. PLINII SECVNDI

reuerſata palpebra. & reuerſata prius palpebra in loco euulſorum radicitus pilorum, & in die inducis, & cōtinebis donec ſiccetur: & hoc tandiu facies donec loca curentur. Ad pilos oculorum ligandos. Refinz frixz unciam unam, aſpalati unam, maſticz unam, cerz unam, pumicis unam & ſemis: omnia igni reſoluta, & cōmixta uteris ſecundum conſuetudinem. Ad pilos oculorum. Yo unciam unam, ſarcocollz unam, ſtyptinz unam: teres cum aceto, & facies collyria: & euulſis pilis Luna decreſcente, cilio reuerſato uteris.

Ad caligines, cecitates, uel ut craſſitudo abſtergatur.

Cap. X. X. I. I.

VERETRV M ceruinum decoques, & ex ea aqua oculos fouebis per dies quindecim, & ſanabitur. Sero ac lacte caprino calido per dies quindecim fouebis, & ſtatim ſanabitur. Hederz ſuccum cum melle ſtillatio ſine fumo, & uinum theriacum in modum collyrij temperabis, & inūges cetum, & in loco tenebroſo recludes, & poſt dies ſeptem paulatim aperies feneftras, & poſt alios dies ſeptem produces in lucem, & per hos dies mollibus cibis & dulcibus utatur: in quibus etiam conſumendis diebus non laboret. Item pro ſexu duritia, Ammoniacum thymmatum in uino theriaco teres, & oculos inūges.

Ad maturandis agilopas.

Cap. X. X. I. I. I.

AD maturandis agilopas: Erumentum candidum maſticatum imponitur. Ad aperiendos eis, & emendandis, ſtercus columbinum cum ſapone gallico impones. Maluz item bōrtunale, ſiue agreſtis folia purgata, admixta ſalis parte una, & trita, & impoſita, curat. Nucis combuſtæ cinis iniectus ſanat. Aratragloſſa herba cum modico ſale trita, & appoſita, agilopas deſtruit. Plantaginis item ſuccus cum lana munda molliffima imponitur, & per dies nouem ſanat. Vuz paſſæ purgatz ſine grano accitos decem, peris grana decem in linteolo illita impones uſque dum ſanet. Vrinæ item limus ſpiſſus de caſtris collectus & impoſitus, mirè purgat & claudit. Item uermiculus qui uocatur Aratra frangis, contuſus, & cum ſapone gallico permixtus apponitur, & ſuper medullam cannz appones. Nepetam cōtuſam impones, mirificè ſanat. facit & ad tyringiam. Ad agilopas, ſaponem gallicum & cymas oliuz uirides, amygdalasque amaras æquali pondere teres, & uteris.

Ad ulcera narium, & omnia uulnera ueuſiffima.

Cap. X. X. I. I. I. I.

ARISTOLOCHIAE pulueris drachmas triginta, galbani uigintiduo, cerz uiginti, manz thuris decem, terebinthinę quinquaginta, yo ſeptem, olei ueteris drachmas ſexaginta: ſicca humeſces & miſceas, utariſque in omnibus ulceribus.

Ad graueolentiam narium, polypum uel.

Cap. X. X. V. I. I. I. I.

GRAVEOLENTIBVS nariſus ſic ſubuenitur. Succus hederz colatus, nariſus infunditur. Aristolochiaz ſuccus cum cypero uel dracontez ſemine cum melle pari pondere nariſus inditur. Hoc etiam ſi καρυώματα ſint, emendat. Dicitur etiam prodeſſe ei, qui hoc malo uexabitur, ut oſculetur nares mularum. Coſtum in puluerem redactum mittes, & cum melle mixtum, pennaque induces. Cariz contritz, & in olla noua cum poſca decoctæ, emendant foetorem, ſi ipſe ſuccus cum melle immittatur. **Ad polypum.** Examinis rubei limaturz unciam unam, ammoniaci duas, aluminis rotundi, aceti acris cotylas ſex: ſiccabis teresque cum aceto diligenter, & mittes in pyxidem æream, & agitabis de uirga ærea in ſole, uſque dum ſiccetur. Deinde teres diligenter in mortario: poſt hæc repones in uafe fictili. Quando autem curabis, mittes de puluere in pennam uel in cannam ſubtilem, & inflabis in aures, ita tamen ut oſ eius prius aqua frigida impleatur. Menſe uerò Decembri curare incipias ita. Per dies tres, & uino & carnibus & frigidis abſtineat, & quarta die non coenet. Quinta uerò accipiat geramantigonis. Poſt dies autem tres purgabis caput eius ſic: Ieiunus per triduum maſticæ commaſticet: & cum iam expuere coeperit, addes ei ſtaſilagriæ grā. unum, & poſt modicum alterum, deinde tertium, ad ultimum quartum. In die autem ſecunda incipies ab uno per ordinem uſque ad quintum: hoc quoque tertia die & quarta facies. iſtis quoque diebus à carnibus & uino abſtineat. Quinta uerò die rades ei caput & unges à media frōte totum caput medicamento hoc: Acaciz unc. I. aluminis ſciſſi ſemiunciam, nitri Alexandrini ſemiunc. cerz ſemiunciā, mānē thuris deñ. IX. Hæc teres cum aceto uſque ad ſpiſſitudinem mellis, & unges caput: & poſt dies uerò tres hoc ipſum facies, & ſic curare nares incipies. Ad narium grauem olentiam. Dracontez ſuccus cum melle infunditur: quę res etiam cēromata ſanat. Betonica in olla noua cocta, nariſus inſtipatur, & ipſa herba trita, parum ſalis adiicitur: inde quantum duobus digitis tollitur, collyrium formatum nariſus infunditur. Si quis agrimoniam manducauerit, ut non oleat, aut aliqua alia olera, coriandri radices uirides ſiue ſyccas maſticet, pulegij / Item & apij ſemen equalia commaſticet.

Ad profluuium narium.

Cap. X. X. V. I. I. I. I.

PLERVNQVE euenit ut ex nariſus is modus ſanguinis pfluat, qui niſi reprimatur, adfert mortem.

morte. Neque aliter exiliat q̄ solet e uena percussa erumpere. Occurrendū est itaque uelocissimo periculo, & magno impetu, & subito fauienti in hoc itaque casu porro sectiuo trito nares obturantur. ruta trita æque reprimunt in manibus indita. Eodem modo & radice urtica utendum est. Semen urticae cum lana succida conijcitur in nares, cum oleo rosaceo, & auriculæ lana succida spisse obturatur: & ita sanguis continetur. Coagulum agnium mirifice facit, ex aqua subactum, & infusum. Adeps anserinus cū butyri pari pondere ingeritur pastellis. Profunt cochleæ contritæ, & fronti illitæ. Anguinæ pellis cinis in tritus naribus, uel hæmorrhoidibus impositus sistit, uel idem cinis in aqua calida potatus. Prodestque sanguis tribus suffumigare. Teste ouorum, unde pulli exeunt, leniter toste, & in puluerem redactæ per triduum naribus insufflantur, ac statim sanguinem sistunt. Si auris cera concluditur ea parte qua sanguis pulli cinis naribus insufflatus, & idem porri sectiuo triti, naribus opponuntur. Ventosam in uertice uel in hepate apponi, utile est. Medulla nucis, quæ nucleū diuidit, cõburitur, eiusque cinis naribus insufflatur. Fimur equinum dum recens est, cum fimo conteres, adiunges picem uirginem, & teres ut unum corpus fiat: postea fronti illinies, & in collum ac ceruicem pones, mox clauduntur uenæ fluentes. Fimi porcini unciam unam, thuris masculi semiunciam trita ex aceto, frontem illinies, & iam impetum oculorum prope sanat. Narium gallulam teres, & puluerem eius per fistulam in nares insufflat. Linteo item exusto nares claudis. Et item raphani radice succum in aurem mittes ex ea parte, quæ defluit, & lana claudis. De porro uirgine facies collyria, & in nares mittes. Itemque glutē taurinum liquabis cum aceto, & fronti illinies. Dicitur prodesse qui hoc malo uexabitur, ut osculetur nares mularum.

Ad sanguinem de naribus eiciendum.

Cap. XXVII.

NEPETAE succus naribus supino infunditur.

Ad stillationem narium ex humore.

Cap. XXVIII.

CINIS testarum ostrearum, in cibo pane colligitur in modum salis. Porri capitati folia cruda sine pane eduntur. Canina corrigi nunquam uncta, cuilibet digito in manu circumligatur. Ostreae cū sua testa, ita ut electæ sunt, in carbonibus coquuntur, & in cibo dantur. Oleum calidum eunti dormitū in cerebrum infunditur, & in nares conijcitur. In manu dextra duo digiti medij, limo alligati, inter se destillationem cõpescunt. Ocimi semē tritum, naribus immissum, destillationē minuit, & sternutationē facit.

De oris, labiorum, gingiuarumq; uitij.

Cap. XXIX.

SEPIAE ossa in cinerem redacta, & ori inspersa, uitia emendat. Cochleæ uicæ cineres cū myrrha teres & sparges, uitia oris emendat. Sinapis item semen uel raphani ex uino decoctum, & oboli unus pondere datum, emendat. Herba claminis trita, trochiscos facies: & ex his cum opus est, ex aceto ad crassitudinem mellis illitum, reprimat & sanat. Seuum bouis uel uituli cum adipe anserino uel fissuras iungit. Oris saporem emendari quidam affirmant murino cinere cum melle, si fricentur dentes, alioqui uero admiscant marathri radices. Nero quoque ante somnos colluere ora propter halitū foetidum, utile dicit. Folia sagina commaducantur aduersus gingiuarum & labiorum uitia. Aequè & folia rubi in quo mora nascuntur. Eiusdem generis rubi teneri & pampini decoquuntur ex uino ad tertias, idque uinum in ore continetur.

Ad uulnera oris.

Cap. XXX.

CAPRINVS fimus cum melle tritus & illitus, certè sanat. Cucurbitæ exusta puluerem, piper & sal candidum rude parum, satureiam, coriandrum, mentam exustam, similiter caput sardie combustum: hæc omnia in puluerem redacta commiscet, deinde lauabis os cum uino ueteri, & sic impones. Ulcera oris, plantaginis succus emendat, & folia eius cocta, radicesque eius commasticat. Hederæ item bacce cum cassia & myrrha, pari pondere ex uino commanducata, ulcera oris emendant. Murenarum ex capite cinis cum melle illinitur. Membrana ex iulquiamo cocta, uel crudo detracta, labiorum fissuris medetur. Oris halitum emendat murinus cinis cum melle dentibus infricatus. Linguae ulcera & labiorum, hirundines in mulso coctæ sanant. Adeps item anserinus & gallinus ulcera emendat. Si feruentia os intus exusserint, continuò sanantur gargarizatione lactis canini. Aduersus foetorem oris. Folia myrti & lentisci pari pondere, & gallæ Syriacæ dimidium pondus unā teri oportet, & aspersa uino uetusto, mandere, uel hederæ bacce cum cassia & myrrha pari pondere uino aspersa. Eadem ratione ulcera oris emendantur: hoc & stomacho optimè facit: sed melius si cum mororum domesticorum uel certè eorum quæ in rubis nascuntur, sextarios tres, leni uapore decoquantur, ut ad spissitudinem mellis ueniat, tum additur de myrrha pondus denarij, & tantundem croci, & in unum totum teritur, & inde prout uisum fuerit, æger accipiat. Item succi mororum sextarij duo, cum uino Attici mellis decoquantur, deinde stomachicus prout uisum fuerit, accipiet. Capitis leporini cinis addito nardo, mulcet graueolentiam, ulcera & rimas. Seuum quoque bouis uel uituli cum adipe anseris emendat. Item amurca ex oliua nigra, oris uitij subuenit.

C. PLINII SECVNDI

Ad oris ulcera, & tumores
gingiuarum.

Ad uulnera oris, siue tumorem giuguarum. Cap. XXXI.

ABROTANVM uiride teres, & cum melle miscebis, tangesque loca de intus, que dolent: & de foris, ubi tumor est, appones: mirabiliter curat. Ad oris uel giuguarum uulnera. Mustum dulce recens, malum granatum sicum plenum mittes, & alterum uiride cum cortice coques in stagnato ad carbonem, donec spissitudinem mellis accipiat: Deinde leuabis de foco, & addes myrrhæ & styptici & scilicet puluerem tenuissimum, & commisceas, & ex eo uulnera illinies. Anthera ad os, balauiste drachmæ sex, scilicet si octodecim, croci tres, cinnoriz decem, rose floris decem, cyperi triginta duo, myrrhæ octo. Ad eos quibus subiti tumores foetorem faciunt, siue putredinem giuguarum, ita ut dentes cadant. Vno unciam unam mellis uncijs sex coques, & ita curabis.

Putredinis oris, siue palatum & giuguarum curatio. Cap. XXXII.

Ad putredinem palati & giuguarum.

ALV MINIS scissi unciam unam, gallæ asianæ semiunciam, myrrhæ uncias duas, piperis grana quindecim, in mellis despumati uncias nouem colliges, & uteris. Ad uisuram oris. Ex humore croci cum nucleo & aqua frigida tritus in ore teneatur: quod si uulnera fecerit, parum mellis addes. Item cui os ex tumore exarserit, uel palatum, cantabrum coques, & ex eius aqua gargarizabis: quod si ardor fuerit, cum ipsa aqua crocum tritum. Si aut humor abundauerit, rosam siccam cum cantabro coques: & ita gargarizabis. Gera quæ facit ad os, cui rheuma molestum est, & ad giuguas rheumatizantes, siue ad uiam, uel quibus exit de auribus, & ad tempora dolentia cum hydromelle & ad syringam cum uino ueteri & melle, & ad uulnera quæ intra nares generantur. Croci unc. I. myrrhæ I. aluminis scissi sex: hæc in puluerem redacta seruabis, & uteris cum uino & melle permixta. Ad ulcera linguæ, folia oleæ cum sulphure teruntur, & inde ulcera perfricantur. Ad uisuram oris, aut giuguarum, uel giuguarum succum, cum melle caulibus gargarizabis, statim ulcera sanant, & cepæ manducantur quæ sanant. Item succi myrrhæ unam, croci I. aluminis scissi unc. I. mellis sextarium unum. Hæc omnia permisceas, donec crassitudinem mellis accipiant, & sic crocum & alumen mittes, & bene permixta repones; ac de hoc medicamento os & giuguas tanges, si sanguinem fundunt: & hoc giuguas sanat, & dentibus prodest & uisuræ. Mense Augusti conficitur propter succi morem. Ad putredinem oris: Aloës drachmas duas, myrrhæ sex, calchati sex, croci quatuor, uini & mellis quantum sufficiat.

Ad oris foetorem.

Ad foetorem oris. Cap. XXXIII.

PVLEGIVM, & serpyllum sicum, uel origanum, cum melle manducatum, bene facit. Dormitum uadens, aceto bono lauet, masticeque & uino suauis os colluat. Arboris pruni folia cum uino coques, succum ex eo intra tenebis. Si halitus foetet, cum dormitum uadit, cyathum aceti boni per partes sorbeat. hoc & in coctionem facit: & si mane inde sorbeat, prodest. Radicem quinquefolij ex aqua decoques, & subinde os collues: ita ut in ore aqua diu teneatur. Serpyllum item herbam, quæ Gallice dicitur laurio, ieiunius diu commanduces.

Ad os saliosum & perlipidum. Cap. XXXIII.

Ad os saliosum.

LENTISCI fasciculum in umbra ficcatum tundes & cribrabis, & de cortice pini tantundem tritum & cribratum miscebis, & dentes inde fricabis. Origanum teres & cribrabis, & exinde dentes ac giuguas fricabis, hoc & tumorem giuguarum tollit. Camomillæ herbæ puluerem uino admixto coques, donec ad dimidium ueniat, ex eo os collue, statim medebitur.

Ad os & labia. Cap. XXXV.

Os & labia rugosa & fissura.

OS album & tenerum ne rugosum fiat: Farinam candidam lacte & oleo aspergito, & inde cum dormitum ibis, labra subiungito. Labia si fuerint rupta, pulegium & acetum miscebis: & maxime cum dormitum uadis, exinde tanges.

Ad dentium dolorem. Cap. XXXVI.

ASPARAGI syluatici radicem in uino decoques, ex hoc in ore contineat, dolorem sedat, succusque eius similiter facit. Brassica item cruda commanducata dolorem facile discutit. Radicem hederæ coques ex uino, quam in ore teneat, & transit dolor. Succum hederæ cum aceto & paruo sale in diuersa in nares mittes. Thymum & pyrethrum pari pondere tusum dentibus adijcies. Pyrethri item radix ex posca & melle gargarizatur, & teneat in ea parte quæ dolet. Troiscus ad dolorem dentium, & ad laxationem eorum. Aluminis scissi unciam unam, aluminis rotundi duas, castorij, croci, myrrhæ, gallæ, aloës, yō, aīna unc. duas, synopidis libram unam, uini styptici quantum sufficit ad colligendum, hinc facis troiscos: postea cum opus fuerit, resolues in uino styptico, & in ore tenebis: facit & ad dysentericos iniecius. Ad priorem dentium dolorem cyperi pilulas in uino decoques, & idē uinum tepidū in ore tenebis, bene

benefacit. Cucurbitę fatiue decoctę succus dolorem minuit, & mobiles stabiliet in ore compressus. Item trochiscus ad dolorem dentium. Cadmiz unc. duas, calcetis coctę in carbonibus seminiunciam utrumque separatim cum uino acri in modum collyrij teres, & commisceas, & facies trochiscum, & in aceto solues, & tepefactura in ore teneatur. Iusquiami radix cum aceto commasticetur. Cyperi puluere dentes & gingiuas reple. Pentaphili item radix cum aceto aut uino decocta, in ore contineatur. Quinquefolium cum sua radice in aceto decoctum, aut in uino dentibus contineatur: qui enim continue ieiunus in ore continuerit, donec liquefcat, non dolet unquam. Adijcies item ad ollam, acetum, satureiam & salem, ut in unum ferueat, & in maxilla contineatur. Foeniculum uiride masticer, & succum contineat in ore: ipsumque foeniculum in ore contineat. Ad dentes qui rheuma patiuntur. Lucernam arctinam nouam implebis sale, & claudes eius foramina, & tandiu in carbonibus uiuis obstruita sit, quandiu ipsa lucerna similis sit carboni uiuo. Ac post modum cum refrigererit, mittes in mortario folij drachmas duas, & cum ipso sale teres, & fricabis dentes, quā hora faciem laueris, & facit dentes candidos, & dolorem tollit. Thus & bacę lauri in uino deferuant, & in ore sustineat, quandiu potuerit. Styptiriz drachmę duę, strugij una, teres & uteris. Oleum cum aceto tepidum in ore contineatur. Vrticę item minoris radix commasticetur. Et item ad hęc maluz radix decocta in ore contineatur. Betonicę succum cum uino ueteri, & aceto ad tertias decoques, & postea in ore contineat. Ad dentem cauum, lumbricos exustos ipsumque cinerem impone. Et ad hęc item gummi hedere denti impones. Ad hęc, plantaginis radix commasticetur. Et item ad hęc maluz radix decocta in ore contineatur. Ad hęc item, betonica herba commasticetur. Corticem roboris coques cum aqua, & super quatuordecim gargarizer: mire facit. Dentifragium puluerem de lana succida in linteo ligabis, & pones in testam, & in carbonibus ustulabis, & duas de ipso puluere partes, & salis communis tertiam partem teres, & de ipso puluere fricabis, & dentes, & gingiuas donec sanus sit, & non doleat dens. Enula ab ieiunis cominaducata, dentes confirmat. Allium cauis dentibus imponitur, & aqua in quā coctum est gargarizatur. Acetum item si in ore contineatur, gingiuas stringit, & dentes continet. Et item caprifici radicem ex uino decoques, & ipsum uinum in ore continebis, ipsamque tritam maxillę impones aduersus dolorem. ipsa autem radix per menses inciditur, & hęc mittit succum apertissimum dolori. Item nucleus gallę commanducatus, dolori medetur. Tedas pingues in astulas concides, & in aceto decoques, idque acetum in ore continebis. Aqua in quā lentiscus decoctus est, mobiles dentes confirmat. Ruborum in quibus mora nascuntur, pampini decoquuntur in austero uino, & commanducantur aduersus mobilitatem. Idemque uinum in ore tenebis. Hysopo item utiliter collues. Item cauis dentibus cinis murini fini inditur. Vermes terreni decocti in oleo, & triti, infunduntur auriculę, ab ea parte qua dentes doleat: Eorumque uermium cinis, ex eis dentibus injectis, & ceteris cera obturatis, perfacile eos cadere cogit. idemque cinis inditus dolentibus, iuuat. Item comburi debent harenulę, quę in cornibus cochlearum inueniuntur, in testa, & cauis dentibus inditę, continuo finiunt dolorem. Idemque pręstat fimus corti in lana alligatus. Inuolari autem pręstantur dentes, si quotidie manę ieiunus sub lingua habebis granum salis, donec liquefcat. Item in dolore, cernui cornu farina colluuntur, uel fricantur. Itemque albi bulbi cinis dentibus friciū est: ossaque ex ungulis suis co-busta, eundem usum pręstant. Caprino item lacte utiliter colluuntur. Item ebuli radicem ex aceto decoque, & diu in ore tene. Itemque folia de buxo & anethi ramusculos teres, in ollam mitte cum aceto, ad tertias decoque, & tepefactum in ore tene.

Ad dentes laxatos. Cap. XXXVII.

Si ex humore capitis se laxauerint dentes, si dolor fuerit infectus, pyrethri radicem commasticet, & in ore teneat: omne decurrit rheuma. Est quidem radix uehemens, sed postea dolorem sedat & refrigerat. Puluis ad rheuma dentium. Salis uncias duas, teres cum melle optimo diutius, & colliges in ollam rudem, quam gypsaram mittes in ignem: ubi uero in modum ignis canduerit, tolles eam: & cum refrigerauerit, iterum teres, & facies puluerem, & uteris. Ad confirmandos dentes. Marrubij fasciculos tres cum aque sextarijs tribus decoques in olla noua ad tertias, deinde gargarizabis tepidum manę & meridie per dies septem: Post hęc semen herbę galliculans, quam alij dentalem, alij symphoniacam dicunt, mittes super carbones, & per traiectorium, totum fumum ore trahes: omnes gingiuas exiccat, & humores malignos producit, & dentes firmat. Myrti fasciculum unum, cunorum rubi fasciculum unum, & corticis maligni granati in aceto decoques, & inde os sapius collues. Aristolochiam tusam in puluerem dentibus laxatis iniicies: confirmat. Gallę syriacę unciam unam, corticis maligni granati troci denarios tres, in puluerem subtilem rediges, & gingiuas impones. Pulegij sine fumo libram unam, iris uncias sex, salis ammoniaci tres: omnia tusa & cribrata pro dentifricio habebis. Dentifricium ad hęc folij unc. unam, yo unam, mastice aphraz unam, ostreę testas numero quatuor, pulicis unciam unam, panis combusti unam, cyperi unam. Omnia in puluerem redacta comisceas, & ex aceto dentes fricabis. Pulvis ad humorem dentium. Farina de figala duas manus plenas tolles, ac salis tantundem: facies pastam, & coques ita, ut in puluerem possis redigere. Costi semiunc. folij semiunciam, capitis sardenę maioris combusti semiunciam, auripigmenti semiunciam. Hęc omnia in puluerem redacta, & comixta, uteris: sic tamen, ut prius de uino ueteri os laues. Dentifricium ad os, quo omni tempore uteris. Lucernas Sabinenses tres implebis sale, quarum foramina claudes de cōpasse hordeaceo, & mittes sub carbones in arena ita ut triduo iugiter carbonibus sint optat:

C. PLINII SECVNDI

quas deinde tollens in puluerem mollissimum rediges, addes folij semiunciam, costi unā, mastice unam : omnia trita & cribrata in uino miscebis, & quotidie uteris . Ad dentium dolorem . Violam siccam in ui-
no coques, idque calidum in ore continebis . Vinum & piper miscebis, & tepidum in ore tenebis . In den-
tium autem dolore, qui ipse quoque in maximis tormentis dinumerari potest, Vinū ex toto arcendum,
aceto quoque abstinendum, deinde in modico melle utendum ; ac nemo dentes irriter .

Ad dentium molarium dolorem.

Cap. XXXVIII.

PROSERPINAE, herbæ, quam alij camomillam dicunt, succus in aurem instillatus, sedat
dolorem . Item agrestis lapaſij, quod alij rumicem dicunt, radix commandatur : & succus in ore con-
tinetur, statimque dolor tollitur : ac cum aceti cyathis quinque costa in ore aceto tento idem facit . Item
acopiū calefactorium, & ualde summum . facit enim ad eas ualitudines quæ diuturnæ sint, ad paralyticos,
straticos & opisthotonicos, sed & neruorum cōtractiones & artēricos & ad omnem dolorem totius cor-
poris & turpitudinem ualde prodest . Recipit herbæ brateæ drachmas quadraginta octo, samſuū drach-
mas CCLXXXVIII. rutæ seminis uigintiquatuor . Cardamomi drachmas uigintitres . Squinanti-
drachmas duodecim, cactij uigintiquatuor, baccarū lauri uigintiquatuor, pyrethri uigintiquatuor, cypri-
uigintiquatuor, meliloti unc. tres . Hæc omnia tundes, & cribrabis grosso cribello, & ifundes in uino, sum-
mo per dies tres, quarta die uerō mittes oleum sauinum uel spanū : & omnia suprascripta coques cum
oleo diligenter, molli igne . Postea exprimes omnia : & in oleum mittes ceram, & omnia reliqua in oleū
mitti debent . Postea tolles myrrhæ & stactis drachmas sedecim, ceræ rubæ libras tres, terebinthinæ unc.
sex, calami aromatici tres, costi tres, styracis tres, yō tres, piperis albi tres, piperis cōmunis tres, sinapis dra-
chmas quadraginta octo, spicē nardi unc. tres, folij unam, aphronitri tres, opobalsami sex, adipis uituli ma-
rini sex, medullæ ceruinæ sex, guttē ammoniacæ tres, olei nardini libram unam, olei sauiui ueteris duas,
olei cyprini pondo tres, olei herini tres, olei laurini quatuor, olei styracini libram unā . Ista sequentia aro-
matica tundes, & cribrabis, & commiscebis cum omnibus suprascriptis : & cum opus fuerit uteris . & super
maxillam imposita sanāt dentes molares . Acopum ad straticos & dentes molares impositum . Galbani
unciam unam, opopanacis duas, euforbij duas, smyrnæ duas, adardis duas, sagapeni duas, castorij duas, ce-
ræ quatuor, axungie ueteris duas, piperis unā : omnia contundes & cribrabis : Postea uerō miscebis cum
galbano, & opopanace, & axungia : & uteris omnia suprascripta . sed & dentes molares sanāt .

Ad dentes uitiosos aut cauos.

Cap. XXXIX.

GALLAS Alexandrinæ uiginti, folij quantum sufficit, aduersus gallas mastice grana quinquā-
ginta, croci parum, piperis grana sexaginta, balastij cauliculos quinque, floris rosæ quantum sufficit .
Hæc omnia in puluerem redacta habebis, & uteris . Item ad dentes cauos . Tirimalli & caprifici lac cum
galbano resolutum, & cauis dentibus inditum, tollit dolore : ita, ut ceram superponas, ne lingua aduratur .

Dentificium ad dentes candidos faciendos.

Cap. XL.

PVMICE combusto & trito, ad dentificium uteris . Itemque conchylij marini testam sale ple-
nam combures & uteris, dentesque inde fricabis . Sepiæ item testam tusam cribrabis, & candidi erunt, &
cum uino candido piperato dentes lauabis .

Ad dentes molares, uel omnes, ut sint incorrupti.

Cap. XLI.

VITIS albæ, buttionis, succi cotylas duas, & mori radicū radices coques ad tertias, & in ore te-
nebis, & dilues per dies septem, & nunquam dolebunt dentes : incorrupti præstantur .

Ad dentitionem, quando infantes dentium.

Cap. XLII.

LACTE caprino & leporis cerebro gingiuarū perfricantur . Delphini dentium cinis, cum melle
gingiuis illinitur, & eius dente gingiuarū tanguntur . Cerebrum pecudis in cibo datur . Folij hederæ pru-
næ ad suffiendum supponuntur . Et item butyrum cum melle temperabis, & gingiuas inunges . Dentes
equi qui primò cadunt, alligati, faciem dentitionē præstant, ac melius si terrā non attingant . Eundemque
effectum habent dentes caniculæ .

Ad uuam distillantem & ad fauces tumentes.

Cap. XLIII.

CORIVM de nuce uiridi tundes, & exprimes succi uncias sex, mellis unā, & coques donec spis-
setur, & ex eo cochlear unum, patiens ieiunus gargarizet . Cumularum oliuarū fasciculum unum coque in
aqua fontana ad medietatem, & gargariza . Item ad reprimendam uuam & gingiuas tumentes : Betonica
in aceto decoques, & in ore diu continebis, calidumque gargarizabis . uuā iacentem uel distillantem suc-
co herbæ absinthij fubleuabis . Testarū ostreæ cinere addito melle illinies . Et item garū optimū cochleari
subijcto .

subijcto . Radicis item brassicæ cinere, testâ reprimatur . Itemque sinapi gargarizato cum aceto & melle . Item rubi in quibus mora nascuntur, cauliculi decoquantur ex uino, & ex ipso uino gargarizentur . Succus urticæ gargarizetur . Heronis item cinis cum melle illinitur . Pulvere gallæ, & aluminis scissi, et iris flore æqualiter mixtis, ieiuno uiam subleuabis . Confectio anthera, quæ ad uiam subleuandam & ad omne rheuma facit . Recipit cyperi uncias quatuor, croci den. tres: omnia teres & cribrabis, & in puluere rediges . Item aliter anthera . Recipit den. unum, ireos unc. unam, florum rosæ quatuor, costi den. unum, Gallæ tantundem . Item aliter . Florum rosæ unc. duas, croci magnati duas, aluminis scissi den. unum, gal las numero quinque, balaustij unc. unam, iris unam, sandaracæ den. unum, & semis . Item iricon antheron, Recipit cyperi drachinas octo, myrrhæ duas, croci unam, balausti unam, scissi duas, florum rosæ unam, sandaracæ quinque, iris quatuor . Item aliter . Cyperi unc. duas, florum rosæ den. unum, croci unum, gallæ unum, myrrhæ duos, sandaracæ duos, aluminis scissi duos, iris duos . Confectio antheræ ad uiam leuandâ . Recipit iris semiunciam, sandaracæ semiunciam, iunci radices semiunciam, myrrhæ den. quatuor, florum rosæ sex, gallæ sex, stypticæ sex, croci magnati sex : omnia teres & cribrabis . Aliud, uia ne molesta sit . Brassicæ folium crudum leuissimè tritum exprime: ex eo succo uiam tangito: continuo subsidet . Item ad uiam reprimendam : Pruni syluatici folia decoques ex uino austero, & subinde gargarizabis .

Ad sanguinem ex precisa uia nimium defluentem .

Cap. XLIII.

SVCCVM e Cymulis Coriandri gargarizet .

De tonsillarum uitio .

Cap. XLV.

VITIVM quod tonsillas appellant, ex utraque gutturis parte, & faucium fit . His lactis ouilli calidi gargarizatio prodest . Fimur columbinus tritus ex uino passo gargarizatur . Ficus arida & nitrum unâ teruntur, deinde faucibus illiniuntur . Asperitatem faucium emēdat & destillationē, alium tritum ex posca gargarizatum . Cochleæ demptæ, tantum coqui debent illotæ, deinde conterī, & in passo dare potui . Si quis finem ouillum contriuerit manu sua, uel alienas tonsillas leuabit . Lac caprinum cum myrrha decoctum, & sale exiguo gargarizabitur . Tonsillis priuatim medentur renes, uulpis aridi cum melle triti & illiti . Hirundinarius cinis ex melle ab interiore parte tonsillis illinitur; lini semen & anethum in oleo & aqua decoctum imponitur, & acetum gargarizatur . Rubi in quo mora nascuntur, caules teneri tunduntur, ex primitur succus ex his, qui in sole ad crassitudines mellis coquitur : hic illinitus ab interiore parte mire prodest . Herba quæ nascitur super spineta rustica, efficacissimè bibitur in aqua, ubi mus decoxerit, & uermiacia imposita prodest . Caninum corium ter collo circumdatur; fimus columbinus, uinum, oleum in unum trita, illinitur .

Ad faucium dolorem .

Cap. XLVI.

AMOMVM teres subtilissimè, & cum melle attico uteris . Itemque folium, costum, alumen scissum, spicam nardi, crocum, florem rosæ, gallam: omnia æquis ponderibus in puluerem mollissimū rediges, & cum melle despumato uteris . Si autem, uulnera intra os quasi alba nata fuerint: Primum de uino ueteri os collues, & sic puluerem impones . Lac ouillum gargarizatum prodest . Fimur columbinus tritus, ex passo gargarizatus prodest . Cortex maligranati trita & cribrata ad uncias tres; similiter roris marini unam, similiter fenotice granorum, quod de Africa uenit unam, gallarum Asianarum cribratarum puluerem numero sex, piperis grana XXIII. trita omnia simul miscebis cū melle despumato, & primo digito deduces, dehinc penna lines: sed & de ipso puluere inflabis per cannulam in fauces, ei hoc facies uel ter uel quater in die, quia optime curat . Emplastrum ad synanchen . Taurinum adipem & seuum urfinum pari pondere conficies, & uteris . Furfures item filiginaceis in aqua multa decoques, & gargarizabis; & si inflans est sanguis, de ceruice extrahitur .

Ad fauces limpandas .

Cap. XLVII.

DRAGANTI unc. tres, uiaz passæ innucleatæ quatuor, nucleis duas, croci unam, mellis despumati quantum sufficit accipies, & ex eo manē & sero cochlearia singula sumes . Lini feminis fixi, nucleis Cardamomi, iris glycyrrhizæ succum ana unciam unā, cū melle despumato miscebis, & accipies ut supra . Glycyrrhizæ succum unciam unam, myrrhæ den. duos, draganti den. unum, croci tres, mellis thymini quantum sufficit . Dragantum autem in passo infundes, & sic teres, miscebisque omnia cum melle, & accipies ut supra .

Ad uisuram palati siue faucium .

Cap. XLVIII.

TERES crocum & florem rosæ cum nucleolo & pineæ granis duodecim diligenter, & miscebis cum melle despumato, & uteris .

Ad uulnera faucium aperta .

Cap. XLIX.

RESINA terebinthina inducta optime facit .

y iiii

Ad synanchen, & ad oris vulnera, & anginas.

Cap. L.

A P I I semen, statiflagræ grana duodecim, laterpitium, piperis uncias nouem, in cacabo rudi co-
bures: omniaque trita miscebis melle, & penna uel digito induces. Aluminis spani tintorij optimi un-
ciam unam, & mellis despumati duas, aut amplius, coques in cacabo nouo lentis carbonibus, agitâs diu-
tissime: Cumque se unum corpus effecerit, colabis linteo, & penna uel digito illinies faucibus. Noces
maiores tandiu in patella affabis, donec in carbones uertantur. postea teres in mortario sâlaris optimi par-
tem bonam diutissime, & supermittes nucleorum combustorum duas manus plenas: & tandiu simul te-
res, donec in modum croci molliissimi redigatur: & ex hoc, digito uel penna curas. Cui fauces ualde
tument: Gallæ libram unam contundes in mortario: mittes in uas lapideum uel murem mundum cu-
aquæ fontanæ sextarij duodecim, ubi per triduum infundatur; quarta die coques agitans cum ferula, due-
partes donec decoquantur; postea colabis, & addes mellis despumati partem mediam, & rursum coques
ad carbones agitandû donec spissetur in modum mellis, deinde leuabis & agitabis quousque refrigerat, &
repones in doliolo, & uteris ut supra. Puluis ad hæc. Gallas, folium, costum, alumen scissum, aloes, mali-
cis, singulas semiuncias conteres & tanges. Cinis pullorum hirundinum tritus in olla noua, combustæ
spicarum nardi denarios quatuor, costi duos, croci quinque, cassiæ fistulæ quinque, cucurbitæ sicce quin-
que, mentæ sicce pulueris sex, malux rustice pulueris sex; omnia trita simul miscebis, & uteris. Lupini
crudam farinam, similiter & costi, admixto succo herbæ nasturtij, teres in modum mellis, & dum opus fue-
rit uteris. Item ad synanchen, uel ad fauces cancro occupatas puluis. Recipe thuris masculi unciam, myr-
rhæ trogloditicæ unciam, floris rosæ unciam, folij aromatici unciam, costi unciam, gallæ aphræ unciam, ma-
sticæ unciam, gallæ alexandrinæ decorticatæ unciam, iris unciam. Hæc omnia tundes, & cribrabis, & in do-
liolo uirteo repones, & uteris: aut puluerem, aut si placuerit cum melle. Aliud ad uulnera quæ in fauci-
bus nascuntur. Gallæ unciam unam, hyssopi unciam, floris rosæ unciam, costi unciam, myrrhæ unciam, folij semi-
unciam; costum uero in cacabo fistili igni subiectum in carbonem uertes: & dum adhuc ardet, in mortario
marmoreo tundes & teres. Similiter & de folio & de hyssopo, puluerem facies, myrrham uero & gallas &
florem rosæ teres & cribrabis, & sic miscebis & uteris; puro puluere; uel si habes, cum terebinthina. Ca-
taplasma ad synanchen. Vnges bene sartaginem de axungia porcina, & mittes fimum anserinum tepe-
factum ac resolutum linteo impones aliquoties in die. quanto enim sapius immutaueris, tanto magis pro-
dest. Emplastrum ad synanchen. Tetarius uiuus cum axungia mixtus, & appositus, utiliter medetur.
Pulli hirundinis uiui combusti cinis cum myrrha pari pondere, & melle permixtus, mirabiliter curat.
Cera item cum oleo rosato resoluta, & emplastri modo apposita, prodest. Itemque pullorum hirundinis
cinerem & cassiæ puluerem cum terebinthina & melle commiscebis, & cum penna illinies fauces. Empla-
strum ad synanchen. Recipit pullorum hirundinis cineris & cassiæ semiunc. myrrhæ trogloditicæ semiunc.
aluminis scissi semiunc. nitri Alexandrini semiunc. olei uero rosati & ceræ quantum sufficit, mittes, ut te-
nerius imponatur. Si uero lactens est, qui patitur, abstineat nutritrix eius ab omni carne, & uino, aciori-
busque cibis, nullam sane bibat. Accipiat etiam ipsa nutritrix potionem mane, & sero, myrrhæ trogloditicæ
scrupulos duos cum aquæ mulæ uncijis tribus. Omnis quoque qui patitur, dū adhuc in tumore sint fau-
ces, uinum non bibat: & a carnibus abstineat. Ad synanchen. Sulphur uiuum cum menta uiridi & mel-
le teres, & fricabis tumores faucium. quod si aggeris alumen humidum, constringes dentes. Sal fixum
cum aceto & oleo & melle uteris. Quod si ceruix dolet, de diachrymate calido oportet ungere. Fel quo-
que taurinum & elaterium resolutum cum aqua gargarizet, & diameron cum elaterio. Item mori syluarii
cymas, myrti dactylos, edonia folia cum sapa decocta, & dragantum gargarizet. Quando aut curatur ap-
pones spongas in aqua salsa calida calefactas, manducando buccellas mundas lanas, cum melle, sorbilia oua.
Ad hunc morbum sub lingua sanguinem detrahi, uel de brachio, ita ut alio die apophersim faciat, his ab-
stinendo, uino, carnibus: ac liquamen gargarizari precipio. permitto uinum cum melle cum uulnera uent,
ante uulnera, sapa pura frigida. Furfures, rosa, dactylos in aqua decocta; simul autem & uentrem subducit
clystere acto. loca salmatica eligi diffiniunt, propter aerem. Item phlebotomum uel apophersim secun-
dum uires. Gargarismata acra assidue ex thymo, hyssopo, origano, caricis cum mellicrate decocta. Itemque
abrotano & absinthio cum mellicrate uti. Oleo calido cum lanis cataplasmati frequenter; non satis cal-
dis uentosas poni in ceruicem, abstinentum balneo, & ab eis frigidis oportet. Absinthium cum nitro
& melle inunges. Atumoniacam item resolutum cum melle.

Confectio diampron, que facit ad tumorem faucium, & oris uulnera, & anginas.

Cap. L. I.

M O R O R V M succi sextarium unum & semis, succi uuæ acræ denarios sex, croci sex, aluminis
scissi duodecim, myrrhæ duodecim, mellis cotylam unam, gliticos cotylam unā; coques succum donec fer-
ueat: & addes mel, ac simul coques ad carbones lentos leuabis & agitabis, usque dum frigidum fiat, & sic
miscebis species tritas. Confectio diameron. Recipe succi mororum sextarios quatuor, mellis pondo
quatuor, myrrhæ uncias tres, aluminis scissi denarios duos, croci tres, myrrhæ duos; coques primo succum
fine fumo in uase stagnato uel fistili mundo diutissime; postea addes mel, ut simul ferueat leniter, donec
ad mellis spissitudinem redigatur. postquam de foco tuleris, trita pigmenta adijcies, & diutius ferula agita-
bis,

bis, donec se uniuersa commisceant. Aliud diameron. Recipit mororum succi sextarios quatuor, mellis pondo quatuor, myrrhæ uncias tres, aluminis scissi tres, gallæ asianæ tres, croci tres. coques succum usque ad medietatem, & mittes in refrigerata tusa pigmenta. Diameron ad os. Recipit mororum satiuorum succi, sed melius eorum qui in rubo nascuntur, sextarios tres: leui uapore ad mellis crassitudinem rediges; nunc addes myrrhæ denarios tres, & tantundem croci: & in unum totum teritur. Item ad hæc, succi mororum sextarium unum, cum aceto & melle heminis singulis decoquant. Confectio diameron. Recipit myrrhæ denarios sex, aluminis scissi sex, croci tres, mororum succi sextarios tres, mellis unum, sepæ hemina unam, omphacii quantum sufficit.

Angina medendo

Cap. LII.

MENARVM fassarum de capite cinis, id est, fassarum piscium ex melle illinitur. Lini semē & anethum in oleo aqua decoctum, ad tertias imponitur. Acetum item & sal gargarizetur. Pix quoque bñctia cum melle illinitur. Rubi in quibus mora nascuntur caules teneros tundes, & ex eo succum exprimes, & in sole ad crassitudinē mellis coques: dehinc illinies ab inferiori parte: mirè prodest. Felle caprino & anserino cum elaterio, & melle addito, angina celerrimè succurritur. Hysopum quoque cum uino decoctum gargarizatur. Succum item herbæ quinquæ folij cyathos tres gargarizes. Allium tritum ex posca gargarizatur. Puluis hirundinis si fieri potest, riparæ: si minus, syluestris: si neutrum, eius quæ in domibus nidificat, deuoratus, totum annum securum ab angina facit. Eosdemque pullos quidam strāgulant & comburunt, cineremque eorum in cibo dant aut porione. Item mellepedæ numero uiginti in unum tritæ, in aquæ multæ hemina aut aceti, melle addito, decoquantur, donec lentescat totum quod coquitur, & sic imponitur. Peucedanum cum coagulo uituli marini æquis ponderibus illinitur. Fel quoque caprinum aut ursinum cū melle utiliter illinitur. Ipse etiam hominis quacunque ex parte sanguis emissus fuerit, illinitus, efficacissimè prodest.

Confectio arteriaces ad raucedinem uocis.

Cap. LIII.

DRAGANTI denarios nouem infundes in passo cretico seorsum, & teres. Similiter & croci tres seorsum, & dactylos pingues purgatos separatim, dragantumque & dactylos minutatim infundes, & ficteres. Item cymini denarios octodecim, teres & cribrabis; & quod asperū fuerit, seorsum infundes, myrrhæ trogloditæ denarios quatuor & semis, piperis albi grana uiginti, succi glycyrrhizæ uel glycyrrhizæ uoz denarios sex. Hæc singillatim tundes, & cribrabis cum melle: quæ trita sunt, miscebis, addito passo quatum ad formandum sufficiat, & sic facies collyria arteriaca in modum lupini minoris: quæ cum in umbra siccaueris, tenebis cum lingua, & resoluta cum salina paulatim gluties. Item aliter: Aluii denarios tres, glycyrrhizæ succi sex, croci tres, draganti unciam unā, in careno cretico infundes, seorsum uerò singulas species teres diligenter. Postea dragantum infusum & tritum commiscebis cum omnibus his suprascriptis, & facies arteriacam in modum lupini, & uteris. Arteriaca ad raucedinem uocis. Recipe croci unciam unam, iris quatuor, draganti sex, glycyrrhizæ succi semiunciam, uel furculos glycyrrhizæ ad unc. tres. Omnia tundes & cribrabis molliter. Dragantum autem infusum in aqua, diligenter teres, & reliqua simul rursus teres bene, & facies quasi lupinos, & in umbra siccabis, & de aqua draganti eisdem temperabis. Ad raucedinem subitanæ uocis. Apij semen, cyminum Syriacum, foeniculum, anethum, pulegium: cochlearia singula plena simul terendo, in puluerem rediges, ex eo unum cochlear mittes in calicem plenum de succo foenigræci cocto, siue in calice commiscebis, & ter in die gargarizabis; hoc quoque per triduum facies: res enim est saluberrima & experta. Ad raucedinem uocis subitanæ, olei florem tepidū gargarizet. Alia arteriaca. Recipe croci drachmas quatuor, myrrhæ quatuor, libani duas, spicæ nardi duas, cassiæ quatuor, terebinthinæ duas, mellis uerò quantum sufficit. Alia. Recipe draganti & myrrhæ drachmas quatuor, thuris masculi duas, croci cilicij quatuor, spicæ nardi duas, cinamomi unam, cassiæ duas, resinæ terebinthinæ duas, mellis cotylas quatuor; coques ea in uase argenteo in uapore. Alia arteriaca. Recipe mellis optimi cotylam unam, terebinthinæ drachmam unam, croci unam, myrrhæ trogloditæ drachmas quinque, piperis grana decē & septem. Item alia, quæ facit ad peripleumonicos & ad phthi ficos. Recipe gummi drachmas octo, quas ita infundes, ut aqua supernatet, & addis mellis cotylam unā, sapæ creticæ cotylam, myrrhæ drachmam unam; quæ omnia coques ad spissitudinem; & accipies mane & post prandium.

Ad gula & ceruicis dolorem.

Cap. LIIII.

AD IPI Sanfermi perunctio remollit; eodem modo adeps gruis, farinæ lini seminis, nitro adhibito, ex uino calido in modum malagmatis temperatur. Farina hordeacea cum fico tuso; lenticula in aceto discosta, sici folia, & ipsa poma immatura, contrita; ammoniacum cum melle impositum, iuniperi semen ex oleo illinitur, folia alni uel allei ex aqua feruenti remedio sunt. Tumor ouorū lutea cum adipe anserino & rosaceo, fel taurinum uel caprinum illinitur; butyro aut adipe ursino perficantur, opistothonia leuatur, lacte capræ auribus infuso, simus caprinus cum bulbis illinitur; opistothonicis ex muluio cinere arido, tres oboli in tribus cratis aquæ mulæ bibendi dantur. Ad hæc lupinus utiliter illinitur, in ceruicis dolore, poplites utiliter fricantur: & è diuerso, in poplitem dolore, ceruicem fricari, remedium

Nota. In ceruicis dolore, poplites fricantur, ceruicem.

est. De calastico uenditiam gula confricabis, hoc & ceruicis dolorem & neruorum contractiones curat.

Ad humeros, cubitos, brachia & manus.

Cap. LV.

DOLOREBUS humerorum, mustelæ cinis cum ouo illinitur. Sal in sacco ex aqua feruenti ca-

lesfactus adijcitur. Hæc præscripta eodem modo & ad dolorem laterum faciunt perutiliter. Cochleæ in te-
sta si coctæ fuerint, cum resina terebinthina in cibo proficiunt. Prosunt & cochleæ lateri impostæ. Vpue-
caro in cibo laudatur. Lanæ succidæ ex oleo calido, melius axungia uetere, uel uellera sulphure uiuo suffu-
fusa, efficaciter excalescunt. Pugionis mucro quo homo percussus est, leuiter pungi prodest. Neruis
uulturis de alis apponitur, & statim dolor sedatur. Hos autem neruos uulturis, sed & de pedibus eius di-
ligenter seruare debes: quia omnem hominem curant: non inquinantur usu, nec pereunt, semper serua-
ri possunt: & cum necesse fuerit, semper apponi. Item ad eadem membra, si nimia perfractione indolue-
rint, De calastico uenditiam in balneo, siue cum dormitū uadis, loca dolentia fortiter confricabis, & statim
senties curam. Item ad humeros: Lana succida ex oleo calido imponitur; melius uero ex axungia uete-
ri. Itemque uellere suffumigato uiuo sulphure, efficaciter calefaciunt. Atque item mustelæ cinis cum
ouo, linteo grosso illitus, & ex aqua feruente calefactus, imponitur. Item cymini Aethiopici den. qua-
tuor, anethi III. rutæ turgiones ad den. duos, myrrhæ unū, piperis unum hæc omnia trita ex aqua, & col-
lecta ad denarios duos, & potui data, dolorem statim tollunt. Itemque sal in sacco ex aqua feruente cale-
factus & adhibitus.

Ad neruos, & scapulas, & omnia.

Cap. LV I.

AD scapulas & ad omnia: Hyssopi ceroti uncias duas, terebinthinæ unam, resinæ fixæ sex, galbani
seminunciam, adipis anserini siue fassiani duas, nardi libram unam, butyri uncias duas, ceræ libram unam: hæc
omnia simul mittes, & solues: & dum fuerit necesse, linteo uel alutide mollissime super induces & impones.
Item si ex humore uel frigore, aut sanguine scapulæ à dolore graui fuerint oppressæ, uitrum teres, & in pul-
uerem rediges. Pulegij, masticis, & thuris masculi puluerem æquis ponderibus simul miscebis, deinde oleo
scapulas confricabis, & de prædicto puluere asperges, & chartam puram desuper pones, & stricte fascia-
bis, donec omnem humorem uel sanguinem siccet, per dies tres aut quinque in balneo chartam tollat &
ungat oleo, & sic lauet: atque ita potes curari, ut nec sanguisugas ponas, nec carnificem medicum patia-
ris. Leues enim curæ si fideliter fiant, possunt dare perpetuam sanitatem. Item ad dolorem scapulæ, uel
cuiuscunque membrorum: Locū melle perunges, & farinā fabæ super sparges, & folia hederæ superimpones.

Pectori medendo.

Cap. LV I I.

PLVRIMIS morbis obnoxium est pectus, & impatientissimum frigoris: quod cum uexatum
est, non uno genere sœuit, sed infert tussim, & purulentas excreationes sanguinis, uomitus, phthisim,
synanchen; quibus singulis quemadmodum placeat succurri, explicare conabimur. Nastiurium itaque
ex lacte caprino decoctum, & in sorbitione datum, patenter pectoris dolorem emendat. Idem quoque
præstat, si in aqua coquatur, & ipsa aqua bibatur. Ruta ex uino coquitur, & si ipsum bibitur uinum,
tollit dolorem. Canapi item semen commanducatum similiter facit. Si quis circa cor uel pectus do-
let, pulegium ieiunus manducet. Ad pectoris siue thoracis dolorem, si plenum fuerit phlegmate, uel perni-
guent, aut tussis fuerit cum crasso phlegmate: Coques in olla noua foeniculi heminam in aqua sexta-
rijs tribus, hyssopi fasciculum unum, pulegij, foeniculi, origani & rosmarini tantundem, donec succus ad
unum sextarium redigatur: exinde potionem ieiunus & sero alteram bibes, hocque per triduum facies:
sed & in balneo dum sudas, accipies potionem. Pectus quoque tunde, uenditiam calastico confricabis.
Res enim est optima, & stomachum curat.

Tussi medendo.

Cap. LV I I I.

SEDAT tussis faba fricta defecta, eaque faba in cibo uel ex melle sumpta, & tussi & puru-
lenti excreationibus medetur. Aduersus diurnam tussim, uinum phalerum utiliter sorbetur.
Itemque ficus aridæ coquantur cum hyssopo & aqua, & ex ea aqua tussientibus propinatur. Sunt item
membranæ in uentribus gallinaceorum quæ proijciuntur, quarum cinis potioni in persus defillationes
& pectoris humidæ tusses faciat. Testæ cochleæ crudæ tritæ cum aqua tepidæ cyathis tribus sorbentur.
Seuum ouinum decoctum cum uino austero, tussi medetur. Oua cocta & in melle trita in cibo dantur.
Oua item cruda permixta cum pari modo passis bibuntur. Sandaracā nihilominus cum resina terebin-
thina ouo sorbili indita editur. Palmo item ceruinus cum gula sua arefactus in fumo, dein tusus ex mel-
le quotidie sumendus. Testæ cochleæ crudæ tritæ cum aqua cyathis tribus tepidæ sorbentur. Co-
chleæ cum testis suis tritæ, adiecto croco, eduntur. Vrinum quoque fel permixtum cum melle. Sa-
linæ item equi triduo potatæ ternis potionibus ex aqua calida sanant: equum morti tradunt, hominem
sanant. Sorbitiunculam ex alica seu caprino perunctam dabis. Pix liquida in ouo, iecurque lupi coctum
essui datur. Lactuæ seminis denarios uiginti, panacis radicem XXXVI. castorij sedecim, myrrhæ duo
decim,

accipit non cenet. Ad tussim, & ad eos de quibus desperatur. Recipe erui textar. I. iris unc. I. mellis dis-
cocti pond. I. hisque omnibus in se permixtis, dabis ieiuno pillulas tres ex melle inuolutas, & uespere simi-
liter. Myrrham sub lingua teneat, & in ipso momento definit tussis. Ad tussim, herbam marri subiu, &
piperis grana uiginti quinque, fabam fixam tussim, in uino teres, & cribrabis, adiecto melle commiscebis
& uteris. Medicamentum ad tussim, quod recipit sandaracum, libanum, medullam ceruinam, tundes an-
tem sandaracum & libanum, & temperabis cum medulla ceruina, & facies troiscos in modum oliue, &
mittes in testam cum carbonibus, & pones traiectorium super testam, & cooperies de mappa, & ostene-
bis in traiectorium, & sic fumum trahes. Baccarum lauri cum sinapi drach. unam, piperis unam, nuclei
unam, amygdale amarę unam, mellis libram unam cum dimidia, dabis cum succo foenugreci. Cataportia
ad tussim ueterem, quę faciunt stomacho, coeliacis, dysentericis, phreneticis, hepaticis, splenicis. Recipit
myrrham, opium, styracem, & hec equalia. Cataportia ad tussim. Recipe dialtyricis & opij drach. sex,
iulqutami sex, myrrhę quatuor, costi quatuor, croci tres, styracis item duas, & hec de aqua singis ad magni-
tudinem oropi maioris, dabisque septem aut nouem. Beticon, pulegij drach. quatuor, hyssopi quatuor, pi-
peris quatuor: colligis cum melle, & dabis cochlearia duo uel tria. facit & ad phthysicos. Beticos den. una,
amei unc. I. opij den. tres, nuclei tres, mellis cocti quod sufficit. Nuclei frixi unc. sex, cymini frixi unam, pi-
peris unam & semis, uux passę fixę quinque: quę omnia colliges cum melle, & uteris.

Ad tussientiam antiquam & diuturnas ualitudines. Cap. LX.

T E R E B I N T H I N A E unciam unam, butyri unam, mellis unam, olei unam omnia simul com-
miscebis, & in unum corpus rediges: primoque accipies cochlearia duo, de hinc tria, donec saneris. Ad
phthysicos. Amygdalas purgatas numero XXI. piperis grana XXXI. sinapis cochlearia duo, tundes &
cribrabis, addesque portionem mellis Attici, & dabis mane & sero cochlearia singula. Ad tussim cum
multo defectu. Pinas resinatas confractas numero tres, lini seminis libram unam, graminis uiridis fasci-
culum unum, pulegij tantundem: coques in uini sextariis tribus, & aquę celestis sextario uno, ad dimidias
colabis, & adicies mellis libram, & dabis cochlearia terna.

Oxymel ad phlegmata incidenda. Cap. LXI.

S Q V I L L A E in carduo unciam unam, pulegij unam, hyssopi unam, origani unam, mittes in ac-
tum, & decoques & colabis, addesque mellis duplum, & ad carbones lentos iterum coques agitando
diligenter, donec spissitudinem aquationis mellis sumat. Hincque dabis ieiuno cochlearia duo, uel qua-
rum uolueris, & post cenam similiter. Aliud ad phlegmata incidenda. Salis communis libram unam,
salis ammoniaci duas, piperis communis unc. tres, piperis albi tres, gingiberis tres, folij duas, spicz uero nar-
di semiunciam, radices lasatis semiunc. amei semiunciam, thymi semiunc. opij seminis semiunc. petroseli-
ni semiunc. anisi semiunc. hyssopi semiunciam, origani semiunc. erucę seminis semiunc. miconis seminis
frixi semiunc. tundes & cribrabis, & uteris. Apizima ad incidenda phlegmata. Coques anethum siccum
& radices apij in aqua; cui aquę ad modum portionis calide addes oxymellis simplicis cochlear. I. bibesque
ieiunus per triduum, & cum uolueris. Codiorobum ad purganda phlegmata. Piperis unc. unam, pe-
troselini unam, masticę denarium unum, erui rubei unc. tres, iris duas, hyssopi duas, nuclei quatuor, foliorum
rutę uiridis duas, mellis pondera quatuor: dabisque ieiuno cochlearia singula uel bina, pro causa seu uiri-
bus. Hyssis semiunciam, hyssopi denarios, sex, mellis cytarichum dimidium: simul coques in aquę sexta-
rio uno & semis, ita ut sextarius remaneat: postea colabis, & accipies mane & sero cochlearia singula.
Eligma ad hæc & ad phthysicos. Erui infusi & in umbra siccati tundes & cribrabis uncias duas, sesamę
unam, iris semiunciam, mellis despumati quod sufficit. Oxyporium ad hæc. Mellis heminam unam,
aceti quartarium, rutę uiridis fasciculum unum, cymini cochlear unum, piperis grana XX. nitri denarios
sex. Epithema ad pectoris phlegmata resoluenda. Butyrum, laricem, irinum, medullam ceruinam, lini
semen, foenugrecum, ceram, adipem anserinum: omnia æquis ponderibus mittes, adipem tantum duplum
mittes. Epithema ad hæc. Butyri uncias duas, adipis anserini duas, hyssopi ceroti duas, olei anethini
tres, medullę ceruinę duas, cerę quatuor. Ad phlegmata. Pastinacę seminis unciam unam, melo-
num seminis duas, teres & cribrabis, & cum melle despumato permiscebis, & dabis cochlear unum uel duo.
Eligma ad hæc & ad phthysicos. Sesamę unc. duz, erui duz, iris duz, mellis despumati quod sufficit.
Ad eos qui puulenta expuunt, uel qui apostema habent. Laricem, butyrum, eruum, & mel ad carbo-
nes unum corpus efficies, & dabis cochlearia singula uel terna pro ætatibus. Quidam uero succum marri
huius addunt, qui phlegma & pus in pulmonibus habent, & tussunt.

Phthysi medendo. Cap. LXII.

I N V E N I iam desperatum phthysicum sanatum hoc modo. Radicis decoctio in Punici mali
cortice, mixtaque ex aquę cyatho uno, & lactis pari mensura quotidie sumptui data profuit: utilius est
phthysicis & longis languoribus, qui tenentur in salibus morari, ubi pax nascitur, quam in mari navigare,
& marina loca uisitare. Cancri fluuiales ex iure in cibo sumpti ieiunis dantur. Lacerta uiridis decocta
in uini

in uini sextariis tribus, ad cyathum unum redeat, singulis cochlearibus phthificos datis diebus singulis, do-
nec conualecat. Propinatur item cochlearium cinis ex uino austero. Suis foeminae lardum manducatur.
Herba pastae in cibo datur. Carnes asini ex iure sumptae phthificis profunt. Suis foeminae cinis ex passio
propinatur. Adipis recentis pondo quadrans decoquitur in uini cyathis tribus, additur eo mel optimū,
& pillulis glutitur. Pulmo uulturis combustus super farmenta, & in puluerem redactus, & cum floribus
rosa, & croco æquis partibus tritus commiscetur: & in modum dimidij cochlearis cum uini portione bibi-
tur sero, & media nocte & ante lucem. Si autem februnt, in aqua calida, hocque & ad sanguinis reiectio-
nem facit. Thus masculum teres bene, & addes Sandaracæ tantundem, & teres postea medullam ceruinā.
Similiter ex his troscifos factos longos seruabis in charta: & cum opus fuerit, facies carbonēs de uite uali-
da & extingues, & unum carbonem excauabis quantum possit recipere medicamentū: Pillulamque in mo-
dum ciceris maioris formabis, & hunc rursum accendes, & pillulam suppones, traiectionumque operies
circundato linteo, ut totus fumus introducatur. Cum uero respirare uoluerit ac tussire coeperit, digito
claudat, hocque iter faciat, singulas pillulas singulis imponendo carbonibus: hoc & ad tussim, & ad reie-
ctionem sanguinis facit. Dragantum album tenerum eliges, & infundes in careno optimo biduo uel tri-
duo: postea teres diligenter, & addes mellis Artici quantum sufficit post meridiem. Ad phthificos uel
ad eos qui purulenta expuunt, ad eruptionem sanguinis & tussim ueterem hoc medicamentum bene fa-
cit. Opii denarius unus, aqua exigua diluitur, & cum aluminis scissi triti puluere sex miscetur, & sunt
globuli ciceris amplitudine, danturque ieiuno quaterni uel quini. Ad secundum rheuma phthificorum
temporalium. Anisi unciam unam, apij feminis unam, petroselini unam, myrrhæ trogloditis denarios
duodecim, piperis albi sex, spicæ nardi unum, mellis despumati quantum sufficit: dabisque in modum auel-
lanæ cum aqua calida. Antidotum phthificis incōparabile. Piperis denarij tres, myrrhæ unus, opopana-
cis unus, thuris masculi unus, opij unus, gingiberis unus, lasris dimidius, rutæ siccæ uncia una, abrotani
una, nascifci una, pulegij semiuncia, mellis optimi despumati sextarius unus, uini aminei quartarius, papa-
ueris quoque triti & excocti: hinc phthificis propinare, prodesse memoratur. Aliud antidotum. Re-
cipe piperis albi unciam unam, cardamomi unam, opij unam, iulquiam unciam unam, myrrhæ denarium
unum, dauci cretici denarios sex, croci tres, sulphuris iuii semiunciam, gentianæ denarios sex: ex quibus
quæ debent tundi, tundantur, & quæ teri, terantur: & cribrata uniuersa, cum melle Artico quantum suf-
ficiat commiscebis, ita ut spissitudinem in modum emplastri efficias; hoc denuo in mortario teres, & in
uitro repones. Dabis autem magnitudinem baccae lauri non plures ex aqua calida, cum dormitum ua-
dit, ne aliquem superflumat humorem.

Synthesi

Synthesi curando.

Cap. LXII.

SYNTHESIS quoque nec periculo, nec facie phthifi dissimilis morbus est, cui sic medetur.

Aliz cyathi tres, in passio sextario uno, & aquæ sextariis sex coniunguntur, & sensim coquuntur, donec aqua
cōsumatur; tunc suffundunt lactis ouilis ac caprini sextarium; quo subferuefacto, fit genus sorbitionis, qua
per se primis diebus curationis loco utuntur, procedentibus diebus & mel adiungunt. Ad hæc utilissi-
mum putant, eos in aqua marina lauari. Oxyporium ad synthefim uel ad tussim, quod conficitur sic.
Pipere albo uncia, gingibere duabus, petroselini duabus, libistico drachmis sex, factū puluerem cū melle
despumato per dies octo in sole teres, & hinc ieiunus cochlear unum accipies.

Ad sanguinem excreantes & phthificos effectus.

Cap. LXIII.

PORRI sectiui succum cum lacte mulieris, siparum cyathos duos ieiuno dabis tepesfactum.

Ad hæmoptoicos. Seminis caulium denarios tres, myrrhæ duos, picis optimæ duos, teres diligenter,
& cribrabis, dabis febricitanti cum aqua, sanis uero cum styptico uino cochlear plenum. Sed diebus ipsis
cerebellum porcorum comedat & dactylos: panem autem modicum micatum cū ipsis cerebellis accipiat.
Quinque crudorum ouorum lutea in uini hemina propinantur. Prodest item aquam bibere, in qua cy-
tonia decocta sunt. Spongiz aphræ cinis cum porri sectiui succo sorbetur. Sanguinem nihilominus ex-
creantibus, herbæ senecionis succus ad cyathum unum potui datus, sanguinem sistit. Sanguinem item
excreantes marrubij contriti in uini cyathis quatuor, calicem unum ieiuni bibant. Sanguinem per
os qui iactat, uel pus, Betonicæ den. nouem, & lactis caprini recentis cyathos tres bibat per triduum,
& continuo sanus erit. Ad Hæmoptoicos. Porri sectiui succi cochlearia duo, plantaginis maioris
succo duo, succi rumicæ duo, aceti acris cochlearia tria, omnia permixta per triduum dabis. Ad eos qui
pus expuunt. Lini feminis denarios duos, gummi ueteris cyathos sex, picis ritæ & cribratæ denarios
quatuor, abrotani triti & cribrati duos, amygdalas amaras numero quindecim, thuris masculi den. decem,
resinæ terebinthinæ unum, galbani duos, mellis Artici pro modo: omniaque simul commiscebis, donec ad
crassitudinem ueniant, & dabis ad manducandum. Ad hæmoptoicos. Foenugracum purgabis di-
ligenter, & in cacabo nouo feruere facies, & primo feruore effundes, sed non totum: postea addes aquam,
& ferueat usque dum excoquatur, postea colabis & mittes marrubium album, nuces pineas, pulegium,
eruum, & camephitum, ut totum in se ferueat, diebusque sex bibendum dabis. Troscifi ad hæmo-
ptoicos. Recipe hypocisti balausti citrini ana unciam unam, omphacij drachmas tres, gummi unam, aque

Ad phthificos, reme-

radix, cortex mali, punicæ, cicutæ
lac, lactaria rosæ, uini, lardum
herba pastæ, carnes asini, fustulæ
adipis recentis, mel, pulmo uulturis
floræ rosæ, crocus, trogloditis
opium, alumen, anisi, apij, petroselinus
myrrhæ, piperis, spica nardi, opopana-
cis, gingiberis, rutæ, abrotani, nardi
galbanus, papaueris, cardamomi, fici
herba pastæ, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad tussim & ad reiectionem
sanguinis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad rheuma phthificorum
temporalium, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum phthificis
incōparabile, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

Ad antidotum
phthificis, &c. & dantur, sed pueri, &c.

C. PLINII SEC V N D I

coelestis quod sufficit ad faciendum troiscos, habeatque troiscus denarios tres; febricitantibus cum aqua calida, sanis uero cum uino. Troiscus diacantes ad hæmopticos. Recipe acanthi drachmas sex, hypocisti sex, lycij Indici quatuor, opij quatuor, balaustij quatuor, myrrhæ duas, reupontici quatuor accipit hicrosam, aut myrtum: coques cum sapa omnia, & facies troiscos habentes drachmam unam, & dabis cum sapa cyathos duos. Troiscus cum hæmopticis optimus. Recipe libani, roris Syriaci, hypocisti, corallij ana unciam unam, tundes, teres, & cribrabis, omniaque simul miscebis, & facies troiscos habentes drachmam unam: dabisque cum oxycrate.

Sanguinem reiicientium curatio. Cap. LXIII.

SI ex alto præcipitati sunt, mille folium bibendum datur ex aceto, cruenta excreantibus. Quinque ouorum mediola cruda, in uini hemina propinantur, si & purulenta sint quæ expiuntur, eodem tempore ouum crudum cum pari mensura succi porri sectui sorbetur. Itemque Græci mellis catelectum hauriunt. Ad excreationem cruentam. Cochleæ elixæ teruntur, & ex aqua bibuntur. prodest aqua pota, ubi cydonia decocta sunt. cochleæ illoræ ex aqua marina coquuntur, & ita deuorantur. Cochleæ rursus cum testis suis tritz, addito croco, eduntur. Spongiz Africæ cinis cum porri sectui succo sorbetur, porri capitati succus cum farina thuris sorbetur, farina quæ chartæ glutitur, calida in modum forbitionis sumitur. Aquæ in qua rosa & ruta & hyssopum decocta sunt, uino miscetur, & ita potui propinatur. marthubij quoque scopæ cum pane decoquuntur, æque ex aqua bibuntur. Vuz in uinacis seruata, apta sunt excreantibus sanguinem. Oleastri folia decoquuntur ex melle, & dantur cochlearia tria; palmæ quoque thebaicæ eduntur. Cytonia matura deuorantur cruda. Nuclei amygdalarum cum amilo & mentastro deuorantur. Semen urticæ aut myrti contritum, in uino bibitur. Gummi optimum, cum uino resoluitur & datur: & si fieri potest, gummi ex amygdalis sit. Rubi in quibus mora nascuntur, cauliculi teneri tunduntur: ex his succus exprimitur, qui in sole ad crassitudinem mellis ficitur. hic haustus, sanguinem efficacissime sistit. Eorundem ruborum caules ex uino austero decocti eduntur, idque uinum bibitur in portione. Cornuceni cinis in uino uetere potatur. Ebulinus sanguis cum aceto modicè sumptus iuuat. Hædini sanguinis recentis tres cyathi cum pari mensura aceti feruentis potui dantur, coaguluni ceruinum ex aceto datur. Item coaguluni leporinum, eodem modo.

Ad sanguinem reiicientium curatio. Cap. LXV.

I V S Q V I A M I feminis drachmas sex, lini feminis, anethi feminis, styrcis, dauci cretici, croci ana drachmas quatuor, opij purgati & castorij ana tres, myrrhæ duas, mandragoræ quatuor, piperis octo: omnia teres diligenter, addisque mellis optimi quod sufficit, simul miscebis & dabis. Item symphyti radicis nocte sub cinere tritz & tritz uncias duas, mastichis aphræ unam, nuclei pinei unam, piperis grana unum & uiginti trita, melle despumato miscebis, & superadijces betonicæ herbæ tuz pulueris uncias duas, & ex eo mane & sero dabis cochlearia duo. Fimum caprinum tritum in puluerem, uel ipsum fimum recentem in lacte caprino dabis bibere. Herbæ serpilli montanz sicæ & tuz puluis denarios duodecim, & cum uino potui datus, sanguinem sistit. Item caprisici folia siue radices in cinerem redacta, & ad denarios duodecim in uini cyathis tribus, potui data; etiam & dysentericis faciunt. Sulphuris uiui denarios tres in ouo crudo forbeat. Foeniculi folia trita, & cum aceto mixta, pectori apponas, ac potui des: misce iuuant. Pulmo item uulturis in sarmentis uitis combustus, & in puluerem redactus, & cum floribus rosæ & croco equis ponderibus tritus, in modum dimidij cochlearis cum uini portione bibitur, sero & media nocte & ante lucem; febricitantibusque cum aqua calida accipiant: hoc etiam phthysicos mirè sanat. Sanguinem reiicientibus qui de alto ceciderunt. Verbasci radicis cortices in ligno tusos admixto uino dabis bibere. facitque iumeto rupto ea potio: per cornu datur, facitque ad eos qui aliquid interius ruperint.

Ad eos qui sanguinem de stomacho uel uena satis emittunt. Cap. LXVI.

G V M M I Alexandrinum teres diligenter, & facies puluerem mollissimum, & ex hoc cochlear plenum mittes in poscam megelitam, & bibes: sed de ipso puluere mittes in orizam, siue in similam ex lacte coctam, & sic manducabis. Gummi optimum in ore soluiatur, sic paulatim glutitur, multoque melius si in amygdalinum fuerit.

De cruciatus dentium curatione. Cap. LXVII.

C V C V R B I T A E satius decoctæ succus inhihet dolorem, & mobilitatem stabiliet in ore compressa. Enula ab ieiunis commanducata dentes confirmat. Aqua in qua allium decoctum est gargazitur, & idem allium canis dentibus inditur. Asparagi erratici succum in ore contineri oportet, aduersum dentis mobilitatem. Acetum si in ore contineatur, gingiuas stringit, & dentes continet. Oliuz nigra, amurcæ muria eodem modo stabiliet. Caprisici radix ex uino decoquitur; uinum in ore continetur, radix trita maxillæ imponitur aduersus dolorem: caprisici autem radix per menses inciditur, & hæc mittit succus.

tit succus, aptissimum dolori. Nucleus galæ commanducatus dolori medetur. Tede pingues in affulas conciduntur, & in aceto coquuntur, idque acetum in ore continebis. Aqua in qua lentiscus decoctus est, mobiles dentes confirmat. Ruborum in quibus mora nascuntur, pampini decoquuntur in uino alteri, & commanducantur aduersum mobilitatem, idque uinum in ore continetur. Millefolium in dolore manditur, tritumque maxillæ imponitur. Radix yoscyami ex aceto commanducatur. Plantaginis radix manditur, & eiusdem succo in aceto decocto, & tepefacto dentes colluuntur. Quinquefolium in quo fraga nascuntur, eluitur aqua marina, deinde coquitur ad tertias ex uino & aceto, idque in ore diu continetur: quidam uero malunt cinere eius dentes fricare. Hyssopo utiliter colluuntur. Cavis dentibus cinis murini fini inditur. Vermes item terreni decocti in oleo, & triti, infunduntur auriculæ, ab ea parte quæ dentes dolent; eorundemque uermium cinis ex eis dentibus coniectus, & cæteris cera obturatis, per facile eos cadere cogit. Idemque uermium cinis inditus dolentibus iuuat. Comburi debent in testa arenule quæ in cornibus cochlearum inueniuntur; cavis dentibus indite, continuè finiunt dolorem. Idem præstat finus corui in lana alligatus. Inuiolati uero præstantur dentes, si quis quotidie manè ieiunus sub lingua habeat granum salis, donec liqueat. Ceruini cornu farina in dolore uel colluuntur, uel fricantur. Albi bulli cinis dentifricum est. Ossa ex ungulis suis combusta, eundem usum præstant. Caprino lacte utiliter dentes colluuntur. Ebuli radicem ex aceto decoque, & diu in ore teneatur. Folia de buxo & ramusculos anethi teres, in olla mittes, & cum aceto ad tertias decoques, tepefactum in ore tenebis.

C. PLINII SECVNDI DE RE

MEDICA LIBER SECVNDVS.

Priora quatuordecim huius libri capita in uetusto codice non erant; notha tamen in scriptura (ut alia non pauca) exhibere, quàm prætermittere maluimus; ad rem enim non nihil facere ducimus.

Pulmoni medendo.

Caput



I OENIC VLI succi cyathus unus potui datus, mirifice pulmoni facit: nullumque in est periculum, etiam si febricitanti datur. Pentaphylli herbe succus ad cyathostres potui datus, uitia pulmonis emendat. Aceris item arboris succus ad uncias tres sæpius sumptus, pulmonum ulcera sanat. Cedrum integræ decoques, & ex ea aqua in potum cyathos duos assidue dabis: ea enim pulmonibus uitiat, tetterimum spiritum emendat.

Lac cum herbe cetaurie tusæ puluere quasi cataplasma factum, calidumque pectori sinistro superpositum per dies quatuor, uitia pulmonum sanat: lac uero quotidie bibet cum herbe superscripte puluere ad denarios duos. Butyrum ex melli pari mensura decoques, donec rufum colorem trahat, reponesque in pyxide, & ieiuno ligulam plenam dabis ei qui pulmones ulceratos habet. Raphani succi cyathos duos, passi cretici tres bene permixtos tepidos dabis bibere, pulmones uitiatos sanat. Ad pulmonum dolorem. Anethum ficcum uetus teres atque cribrabis, refinam quoque miscebis cum adipe ueteri. Butyrum etiam & mel, equali modo: coquesque usque dum rubeus color sit, repones in pyxide, & inde manè & sero ligulam edat, cui ulceratus pulmo fuerit, idque reddet eum sanum. Ad eos qui pulmonum cauissæ tussunt, uel phlegmata spissa cum sanguine mixta proiciunt, infundes pridie dragantum in aqua, & coques cum melle despumato, ac super mittes croci triti quantum necesse fuerit, & ex hoc dabis manè & sero cochlear unum. Ad eos qui pulmonis uitio tussunt. Squillæ pond. quinque, aceti optimi sextarios decem, pineas tres, pulegij fasciculos tres, coques ad tertias & colabis, addesque mellis despumati sextarios nouem, & iterum coques usquedum bene se commisceat, & accipies ad cochlear pro uiribus. Cerui masculi unciam unam, encini spermatidis unam, opopanax unam, citaperi unam, hyssopi unam, aristolochiæ rotundæ unam, mellis quod sufficit: commiscebis, dabisque in modum auellane maioris cum aqua cyathis tribus. Ad uitia pulmonis. Corij cedri exterioris libram unam, mellis tres, uini Aminei unam, piperis unciam unam, zinziberis duas, petroselini unam: coques uero cedriam in uino, usque dum uirtutem amittat, & uinum ad dimidias redigatur: & ita mittes mel ad spissitudinem mellis, ita ut agitando refrigescat, & superinfundes in ficcum, & terendo, unum corpus efficies. hoc facit & stomaticis.

Ad suspirium. Cap. II.

HERBAE Sauinæ den. duos, butyri, mellis uncias duas; conficies electuarium, & ieiuno dabis. Itemque raphani semen & sulphur uiuum pari portione trita, & mellis admixta, ieiuno ad cochlear dabis; aut radicis succum cum aqua mulsa bibat. Marrubium cum suis radicibus tundes, & succum ex eo, mel admixto æqualiter coques, & ex eo singulis diebus cochlearia duo fumes, suspirium aufert, & concreta

C. PLINII SEC V N D I

phlegmata ex intimo pectore educit. Præstat eadem herba sicca in aqua decocta, & similiter data. Betonicæ herbæ pulueris denarii duo, in nitro mellis uel oxymellis cyathis tribus, dati suspirationes auferunt, & omnia interiora phlegmata sursum euocant, & stomachum purgant, & dolorem eius auferunt, si quoti- die bibuntur. Facit eadem herba in aqua decocta, & eadem aqua in nitro mellis data. Mel & butyrū simul decoques, donec soluantur: deinde adijcies aphronitrum matronale ad dimidium, & uteris. Aristolochiæ rotundæ radicis succum siue puluerē ad duos denarios in aquæ calidæ cyathis duobus potui da- bis, suspiria, & singultus emendant. Super carbonēs simum siccum carbonibus incensum pones, & per traiectorium fumus eius ore ductus, suspirium tollit. Roris item marini uiridis fasciculum bonum deco- ques in aqua, cum tribus carycis Germanicis, donec fiat quasi carenum, indeque dabis matutino calicem bonum: & si uolueris, similiter post cœnam. Betonicæ siccæ pulueris unciam unam, ex aquæ calidæ cyathis duobus bibat. Ad hoc, & anhelitum. Cotomorum succi cyathos tres, ex melle æquali siue uino decoques. Sumpti enim suspirio laborantes releuant, & hydropicos ac spleneticos factos. Cocta simi- liter cotonea, & rufa, & illita, uel in modum cataplasmi imposita, emendant. Sulphuris uiui denarios tres in nouo sorbili accipiat: ita ut frigidis abstineat. Aphronitri matronalis pastillum unum, aut duos, uel tres cum mulsâ bibat: herba enim quæ in arborum lacunis, cauisque corticibus consistit, potata, cito liberat. Fel quoque ursum in aqua calida dilutum, ieiunus bibat, donec sanetur; quod celerrime con- quiescit. Item betonicæ denarios octo in cyathis tribus mulsæ, ieiuno dabis, cum dormitum uadit. Trosciscus ad soros, hoc est suspirium. Recipe ammoniaci triti drachmas octo, abrotani octo, castorij qua- tuor: omnibusque tritis, facies trosciscos, & dabis cum oxymelle.

Ad māmilla nucleos, & cancrum. Cap. III.

DACTILVM purgatum ablata interiori albugine, teres cum cibulla Germana, & coriandro uiridi, apponesque & sanabitur, si tamen initio est. Ad cancrum māmillæ. Herbz quæ dicitur cū cubus, folia, & de syrso eius quidquid uiride fuerit, partem unam; & herbæ quæ dicitur pastellus, partes duas, tundes diligenter, deinde infusas micæ panis recenter expressas cum herbis teres, & facies quasi ce- rotum, & pones in mamillam manē & sero frigidum, & curabis cancrum qualiter uis. Herba autem pa- stillum ab una radice ascendit, & super XIII. uel amplius dispergitur super terram. Ad dolorem mā- millæ. Medullam quæ sub cortice pini uiridis est, siccabis & teres, & cribrabis, & ex eo puluere cochlear plenum dabis cum uino calido ieiuno: ita ut in ipsa parte iaceat. Ad dolorem māmillarum, qui fit ex plenitudine lactis post partum. Cerusa cum oleo roseo bene trita, & illita, statim dolorem sedat. Ad māmillarum dolorem, quem prægnantes, aut post partum patiuntur. Quorum putamina bene trita, & uorum coctorum uitellos tres, tritos admiscebis, crocum etiam aliquantulum, & rosacei, ceræ ponticæ quod sufficit: factoque ex his ceroto, linteo impones. hoc & infantibus bene facit ad punctionem. Ce- ræ libram unam, adipis leonini unciam unam, adipis caprini duas, medullæ ceruinæ duas: singulariter teres & simul miscebis, & exinde linteolo molli induces, & super mamillas pones; uel infantes, & ex eo perun- ges, sicut supra præcepimus. Ad māmillæ duritiā, uel dolorem, compositio. Recipe adipis leoni- ni librā unam, adipis strutionis unam, adipis lupini unam, styracis uncias tres, olei lauiniensis pond. sex, son- tanz sextarios duos. herbæ autem in oleo coquuntur, donec aqua exsiccet: deinde colantur, cui oleo calē ti admiscantur adipēs suprascripti, nouissimē cera punica unā, aphra quantum sufficit ad cerotum. Opor- tet autem in uitreo uase reponi. Herbz symphoniacæ foliorum libram unam, colophoniz duas, axun- giæ ueteris sine sale unam, fermenti uncias sex accipies. Fermentum uero in muria solues & miscebis. Refinam item & oleum solues cera addita, & in doliolo uitreo repones. Ad mulierum māmillas mar- moratas herba parietaria cum axungia sine sale rufa, & imposita, tertia die aperit: sicut à balneo utatur, ter- tia die claudit. Sic enim Aurelia Rustica curata est. Ad tumorem & dolorem māmillarum. Stypti- ria herba uiridis trita, admixto pane in aceto infuso, aut axungia, impositaque sanabit. Marrubium be- ne cōteres, & cū axungia ueteri contusum ac impositum ad tumore māmillarum, & si fuerit uulnus, pur- gat & curat. Ad tumorem māmillarum, & ad febres præsens remedium. Mellis uncias nouem, olei ro- lati sex, ceræ quatuor, resolues, colabis, & teres quousque album efficitur, & uteris. Ne uero mamma cre- scant, creta cymolia cum aceto cataplas.

Ad dolorem stomachi cum acidia & nausea, & ad inflationem, & defectionem. Cap. IIII.

MASTICÆ Aphræ, absinthij pontici succum, pulegium siccum, pares portiones tritas in uase uitreo seruabis: & dum opus fuerit, stomachum nardo inuges, & sic puluerem sparges, & chartam po- nes, & super chartam, lanam, & fascias. In dolore & uitio stomachi, cataplasma uentridiani sæpius stomachū confricabis. Herbz betonicæ radicem fasciculum unum, uerbenæ unum, agrimoniz unum, coques in olla noua cum aquæ sextarijs nouem ad tertias, & exinde ieiunus portionem manē unam, & sero alterā bibat per dies septem: nexatum stomachum releuat. Confectio. Rutæ seminis cochlear plenum, fa- lis montani tantundem, sulphuris uiui similiter: hæc omnia teres diligenter, & cum uino miscebis, ut fa- gulas potiones per triduum ieiunus bibas. Terræ malum coctum, & tritum, melle modico admixto co- chlear plenum ieiunus manduces, acidiā tollit. Carnem item uaccinam cum aceto coctam, & condi- tam

tam oleo, sale, anetho, porro, māduces per dies septem, lassum stomachum subleuiat. Ad dolorem & fastidium stomachi qui nec cibo nec potu inuatur, rufus quoque amarus paritur. Centauria unum, fellis terræ conteres libram unam ex aquæ calidæ cyathis quatuor, dabisque ieiuno bibendum per triduum, diffunditur infirmitas. Fomentum ad dolorem stomachi. Absinthij fasciculum unum, anethi unum, mastice semiuunciam, nardi celtici semiunc. styrcis tantundem, olei pond. IIII. melum uel cytonium uiride, uini ueteris hemina: omnia hæc infusa prius seruefacies, & postea fouebis. Ad dolorem stomachi quo in modum epithymi uti debeat. Citonij purgati crudi triti unc. III. aloes triti duas, mastice Aphræ pulueris unam, dactylos pingues purgatos & tritos numero quinque: his omnibus comixtis facies cerotum de olei camomillini unc. sex, & ceræ tres, & in hunc cerotum mittes suprascriptas species, & uteris. Ad inflationem stomachi, ex qua defectus & angustia nascitur. Bulbum crudum in pila tundes, hunc in mortario in modum ceroti teres, addesque pulueris aluminis scissi quantum ad substringendum sufficiat, deinde pannum ex eo illitum & tepefactum stomacho superpones. Ad inflationem stomachi, rutam manducabis. Potio ad uentositatem stomachi tollendam. Cecudam, allium, & lauri folia simul coques cum aqua, & bibes ieiunus & post cœnam. Enulæ pulueris cochlear unum ieiunus bibas in uino. Epithyma ad uentositatem stomachi, meliori unc. quatuor, foenugræci quatuor, costi, cymini unam, apij seminis duas, ceræ tres, olei quatuor, nardi quatuor, dactylorum uino infusorum quantum sufficit. Item ad inflationem stomachi. Piperis den. XI. pulegij sex, liqua, & dabis cochlearia tria manè & sero.

Potio ad dolorem, stomachi, splenis, & hepatis. Cap. V.

PIPERIS uncias tres, pyrethri semiunc. cyperi den. XVIII. spice celticæ unc. unam: omnia se paratim macerantur, cribantur, atque pensantur: & facti ex his pulueris datur in potione uini absinthia termisso, rursus accipiat biduo, iterum intermissa una die accipiat duas partes, cochlear unum post unum. Cataplasia ad dolorem stomachi, quæ uentrem leniter laxant. Recipe aloes drach. duas, gentianæ unam, mastice unam, facies ex his cataplasia erui magnitudine, & dabis incipiens à tertia usque ad septimam. Ad stomachi dolorem. Vrticam summam semen habentem deme, & diligenter laua, & ex ea forbitionem facito bene cõditam sine pipere: utilissimè enim sumitur ad omne genus ualitudinis quod in stomacho provenit, ac sine dubio curabis. & ut breuiter explicemus quantum enim constat de laude experimenti, omnem librum possemus replere hoc facias quod infrascriptum est. Fœniculi radices illa quæ de foris cum colabisque & adiunges in ipso aceto mellis sextarium unum, ita ut simul ferueat ipsum mel cum aceto, & adjicito aloes semiunc. amei unc. unam, mastice semiunc. aperi unam: omnia hæc mixta ieiuno dabis cochlearia tria: quod si inflatio stomachi, uel intestinorum erit, pulegium bibito uel manducato. Ad inflationes. Rutæ hortensis modicum in potione sarcillum mittes. Ad stomachi dolorem. Folia rosæ quinque uel septem, aut certè nouem, cum piperis granis totidem, trita ex aqua calida bibas. Ex nuce pinea grana numero uiginti purgata, & cyminum quod tribus digitis capere potueris, conteres bene in mortario, additis aquæ frigidæ cyathis duobus, atque earum rerum uncia dimidia danda, uelociter sanat.

Ad calefaciendum stomachum & angustias eius. Cap. VI.

R V T A E, anethi, mentæ, apij, fasciculos singulos decoques in aquæ calicibus tribus, ita ut ad unum calicem redeat, & eam aquam bibes. Ad defectionem & calefactionem stomachi uel nauream. Absinthium & anethum in aqua decoctum ad tertias, accipias: detergit, calefacit, & consolidat. Ad angustias stomachi, de melle, oleo, & uino, farina hordei, foenugræci, meliloti, apij seminis, samfuci, camomillæ, absinthij ana unc. duas, accipies & facies cataplasma, & uteris diebus quinque, & habebis horis ternis impositum: bibas autem ipsis diebus ieiunus apozyma radicum apij cum oxymelle. Post cataplasma autè, uteris epithymo hoc. Recipe aloes unc. tres, ireos duas, apij seminis semiunc. nitri unam, baccarum lauri tres, foenugræci tres, samfuci tres, ceræ semiunc. mellis pro oleo quantum sufficit. Post epithyma autè, bibat hieram artemem, & post aliquot dies bibat costi cochlearia singula, interiecto biduo.

Ad confortandum stomachum. Cap. VII.

MITTES in fixorium sapæ sextarium ex parte tertia, & olei rosacei guttas duas. ubi cœperit feruere, florem foenugræci & lenis æquali mensura addes. quod cum fuerit spissatum, pones super stonachum per triduum. Cataplasma ad stomachum confortandum, & stringendum uentrem post fluxum, siue post catarticum. Panem fermentatum mundum coques in uino ueteri siculo, si zestas est: Absinthij herbæ pulvis simul coquitur, & inducto panno oleo rosaceo modico, & manu superlito impones: huius me uero absinthium non mittes, & oleo communi uteris. Confectio epithymi, quod confirmat stomachum. Absinthij succi unciam unam, olei nardini sex, mastice quatuor, ceræ sex. Item confectio rûssicon ad confortandum stomachum, ad nauream & ad uentrem stringendum, quæ in modum epithymi

Ad dolorem stomachi, acor seu acidiam, inflationem, defectum, fastidium, rufum, nauream. astriche, absinthij, succus, pulueris, nardi, celtici, lani, lani, bethonica, agri, verbenæ, rutæ, semina, sal montani, uini, meli, toris malum, caro vacca, olei, anethi, porri, centaurea, fel absinthij, rutæ celticæ, hyssop, cydoni, albi, dactyli, olei camomillini, ceræ, alucae, cecudæ, allii, lauri folia, anale, malicorium, foenugræci, cymini, apij seminis.

melum seu mali, dicitur cydonium. centaurea, nã fel terre.

Alia m^a ad stomachi. pyrethri, cyperi, spice celticæ, amei, aloes, gentiana, vrticæ, anethi, foenugræci, acetum, ammi, alarum, rosæ rosæ, piperis, mentæ, apij, farina hordei, meliloti, samfuci, camomillæ, nitri, melle, baccæ, apij, olei rosacei, lenis, piperis, foenugræci, nardi, costi, pulegij, cymini, olei lauri, uini.

experimentum.

Cataplasma epithymi.

Cataplasma epithymi.

epithymatis sic papyri.

C. PLINII SECVNDI

conficitur. Recipe dactylos minores numero uiginti, infusos in uino ueteri & tritos, polentæ uncias tres, mastice duas, absinthij unam, laydani duas, styracis tres: si autem cholicus est, addes meliloti uncias duas, rosæ siccæ unam, omphacij unam, olei lentiscini quod sufficit.

Ad digestionem stomachi.

Cap. VIII.

ANETHI semen cum origano & pipere æquali portione in puluerem rediges, accipiesque inde denarios duos in uini cyathis tribus: est enim magnificum. Ad hoc oxyporium diaciminos. **Piper**, cyminum, & rutam siccam in puluerem redacta cōmiscbis, & cum oxymelle despumato temperabis, & in doliō recondes, & ieiunus manē cochlearia singula accipies. Oxyporium, quod facit ad digestionem, malaxat uentrem, inflationem tollit, facit & ad colūm. Recipe cymini Aethiopici unc. duas, rutæ uiridis semiunc. piperis albi deñ. I X. petroselinī autonici sex, zinziberis non permixti semiunc. n. tri rubicundi sex, mellis quantum sufficit. Hæc omnia uerò, excepta ruta, tunduntur in aceto tantum quantum possit à puluere bibi die una: alia uerò die teritur ruta uiridis diligenter, & in mortario cum melle miscetur, & sic species quæ infusæ sunt, cōmīscuntur: accipiat autem cochlear plenum ante prandium & post pradium. Ad hæc leuistici semiunc. zinziberis semiunc. piperis albi unc. unam, sylini deñ. tres, lasidis radices tres. Digestorium membrorum optimum. Recipe leuistici deñ. I I I. zinziberis unum, petroselinī tres, piperis albi unum, cymini unum, careni sextarium unum: hæc omnia tusa & trita miscebis cum passo suprascripto. Catapotia ad digestionem. Absinthij & iris æqualia cum melle colliges, & dabis in lecto secundum uirtutem. Ad stomachum purgandum, & ad uentrem molliendum. Cymas de sambuco elixabis, & manducabis cum impenfa secundum uires.

Ad fastidium stomachi, & ad carbunculum.

Cap. IX.

CYMINVM Syriacum bonū in aceto infusum succicabis, & teres in mortario, nucleos quoque infusos, tydantum, foeniculi semen & anethi cochlearia terna simul teres diligenter, addesque piperis cochlearia quinque, & rutæ foliorum septem, & mellis despumati optimi lib. I. omnia simul conteres, & superaddes acetum, æstimabisque ut sit in modum sinapis mediocriter temperati, & repones in doliō uitreo, & exinde cum panē uel quibus uolueris cibis uteris, etiam si cum cochleari sorbeas, multum prodest. Si autem super ipsum in acerabulo liquaminis, cochlear unum melius sapit, & hoc non solum in prandio uteris, sed & in cœna. Res enim est optima, quæ non solum ad fastidium facit, uerum etiam corpori prodest. Ad hoc oxyporium. Recipe piperis albi semiunc. phu semiunc. asari denarios tres, zinziberis unc. unam, mellis lib. duas & semis, uini phalerni sextarios duos, succi cedri acerbi deintus lib. I. mel uerò & succum & uinum coques simul, donec mellis spissitudinem sumat, & tunc species rufas & crabras admiscebis, & uteris, cochlear plenum ieiunus. Itē ad fastidium intubum syluaticum crudum, siue ex aqua decoctum cum aceto edatur, fastidium tollit. Ad fastidium & marcorem stomachi, in mulsi ex uuis albis sextarijs sex mittitur / cydonia quinque non purgata, & totidem mala punica, additurque succi sorborum, totisque Syriaci sextarius unus, croci semiunc. fici sex, quæ omnia ad crassitudinem mellis coquantur, seruanturque in uase uitreo, atque de ligula sumitur. Porri capitati excocti, & in cyathis pti cyathus, prodest stomacho laboranti. Antidotum ad fastidium stomachi, & marcorem & dolorem colli. Recipe apij seminis drach. sex, petroselinī deñ. III. spicæ nardi drach. IIII. myrrhæ IIII. tani IIII. piperis longi sex, piperis albi quinque: quæ omnia simul teruntur, deinde suffunditur mellis græci despumati quod sufficit, in uase seruiatur uitreo; datur à balneo in portione mulsi mixti ex aqua calida ad drach. duas. Ad eos qui ex egrimonijs fastidium patiuntur. Betonicæ pulueris deñ. sex, ex aqua multa cyathis tribus bibant aut septem aut nouem diebus ieiuni, ut facile coquantur. Betonicæ pulueris unciam unam in melle rufō decoquito, donec obdure scat, facitoque exinde pastillos quatuor, & cum aqua calidæ cyathis duobus bibant post cœnam. Ad carbunculum stomachi, lenticulas centum crudas comedas. Aceti acri, cochlearia tria cum dormitum uadis, accipias. Aquæ item calidæ falfæ uel quinque haustus bibas. Oui rursus duri medium arsum cum dormitum uadis, manducabis. Itemque betonicæ poli deñ. unum, cum aqua cyathis duobus bibes.

Pulvis ad tensionem stomachi, uel ad defecationem, siue uomitum.

Cap. X.

BACCARVM lauri denarios quatuor, cymini tres, roris marini tres, pulegij tres, absinthij tres, mastice duas, panis ustilati XVI. hæc omnia in puluerem rediges, & perunges stomachum melle calido. Ad eos qui cibum non continent. Semperuiuam herbam tritam in uini austeri cyatho uno, ieiuno, & post cœnam potui dabis. Ad stomachi solutionē, qui cibum non continet. Gluten taurinum ex aqua resolutum, & in ceroti modum chartæ inductum, præcordijs imponitur. Item ad stomachū qui cibum non continet. Foeniculi succi partes duæ, & mellis partem unam decoques, donec succus in mellis spissitudinem redeat, & inde dabis ieiuno cochlear unum; nauſeam etiam stringit, & pulmonum aciecoris uitia sanat. Absinthium modicum in aqua decoctum, & ad cyathos duos potui datum, nauſeam restringit: si uerò tam concita sit, ut contineri non possit, erucæ ramusculos tres uel quatuor cum mali grati succo contritos ad forbendum dabis, statimque sedatur.

Ad

Ad singultum & uomitum

Cap. X I.

Ad singultu, uomitu

MENTAE cacumina cum succo mali granati trita & potui data, restringunt. Contra singultus unges stomachum melle aut oleo nardino, & super sparges scopas cypressi in testa oui calefactas, deinde pones lanam super fumum tentā calidam, & fascias. Epithyma ad nauseam constringendam. Recipe masticā unciam unam, nardi duas, adipis anserini uel pullini duas, ceræ punice liquatæ duas, croci I. hæc in stagnato uase coques, & in mortarium ubi crocus tritus fuerit mittes, & commixta in stomachum mittes. Ad stringendos uomitus, uel ad eos qui escas non digerunt, etiam febre digesta, cataplasma sic facies. Siliginem pridie in aqua recenti infundes, & alia die herbam absinthij in mortario teres, & super pulpam siligine expressa de aqua mittes, quam simul cum herba absinthij teres, adijciesque aque cyathū unum, & mittes in fartaginem, ita ut bene decoquatur, atque induces panno, & calentem stomacho impones, ita ut utatur horis tribus uel quatuor; postmodum tolles, & floccum lane tepidum ficcum impones stomacho, & sic facies. Ad eos qui cibum continere non possunt, & eiiciunt. Betonicæ deñ. duos, mellis decocti quod sufficiat, pastillos facito, & ex his pastillum unum glutiat ex aquæ calidæ cyathis duobus. Ad uomitum restringendum. Masticā unc. unam, cymini denarium unum: hæc omnia separatim trita, postea uiua passa innucleata permisces, & linteum inductum stomacho suppones. Camephritis herbam mense Iunio collectam & trita siue cocta, si febricitet, ex aqua calida: si non febricitet, ex uino dabis.

Ad ardorem stomachi & sitim.

Cap. X II.

AQVA tepida cum oleo optimo mixta, & data bibere, sitim compescit. Aqua ubi capitella papaueris fuerunt decocta potui datur. Corticem de tremulo, & absinthium uiride uel ficcum coques in aqua usque ad medietatem, & dabis cata manē.

Ad cordis dolorem.

Cap. X III.

BETONICAE herbæ, & pulegij, & nepetæ fasciculos singulos æquali pondere cum salis modico in uino ueteri decoques ad medias, & ex eo cyathos duos potui dabis. Supra scriptarū herbarum pulueris denarium unū in uini cyathis duobus similiter bibat. In lacte item caprino nasturtium coques, & ex eo dabis bibere. Rubi folia trita pectori imponuntur, & succus eorum bibitur. Itemque leporinus adeps cum uino resolutus bibitur, & cor eius ficcum in puluerem tritum cum uino datur. Aculeus item pini uiridis diligenter testas cum uino optimo bibas, & postea pinguibus abstineas, & liberaberis. Item ad cordis dolorem potio mirabilissima. Recipe piperis albi grana XXXVII, lauri baccas nouem, nucleos nouem, rutæ ficcæ fasciculos nouem, testam cucurbitæ ficcā tritam penfantem libr. II. hæc omnia simul tuades & cribrabis, & exinde dabis cochlear unum in aqua calida; statim enim liberat: calculumque hæc potio mirifice curat. Itemque ad cordis dolorem siue pulsū. Cuminum Aethiopicum commanducabis, & succum eius gluties.

Ad cordis pulsū

Cap. X IIII.

COSTVM, panace, & foenugræcū equis ponderibus in puluerem rediges, & cum melle Attico repones comixtum, & cum opus fuerit, cochlear plenum ieiunus cum aqua calida bibas per triduum. Aristolochiam item rotundam in puluerem rediges, & ex eo denarios tres ex uino per triduum bibes. Cataplasma ad cordis pulsū, ac stomachi dolorem, siue iecoris & splenis. Recipe masticā tritū, palmas tritas, hordei & frumenti farinam, uinum uetus quod sufficit: quæ omnia miscebis, & tepidus illinies pannum, & loco qui dolet, appones. Reupōticum item ex uino ueteri tritum ieiuno potui dabis.

Præcordiorum dolori curando

Cap. X V.

VNIVERSVM præcordia appellamus, quæ aliqui in plura diuidunt uocabula, uocantes modum stomachum, ubi in causa sit, interdum iecur, interdum præcordia. Hæc cum se grauauerunt, præter durissimum dolorem, uelocissimam mortem ingerunt. His itaque caninus catulus lactens subinde apponitur, in quem idem uitium transire constat; quo defuncto obrui moris est. Bulbi triti illiti uentri bene molliunt, & præcordiorum tumorem curant. Porri secti succum cum lacte mulieris pari portione ieiunus bibas. Ocimum item tritum & impositum præcordijs prodest. Lini seminis sextarius unus, & foenugræci unus, in aquæ mulse sextario decocta calida sæpius imponuntur: Sed aliqui malunt foeniculi farinam cum pari mensura mellis decoquere, ut ita imponatur. Cydonia cruda uel cocta ceroti modo, panno illiniuntur, & calefacta, præcordijs superimponuntur. Radix item aceris tusa cum uino efficacissime prodest. His quos linquit animus aut mens, & alienatur, quibusque uertigines fiunt, Cochleæ singulæ cum sua testa tritæ ex passi cyathis tribus calefacta portione per dies nouem dabis. Aliqui in eadē curatione dant per dies quinque in eadem passi mensura, prima die cochleā unam, sequenti duas, tertio tres, quarto duas, quinto unam. Eademque curatione suspiria tolluntur. In his lāguoribus si febris non sit,

C. PLINII SECVNDI

marina aqua lauari utile est. Iocinori prodest in cibo uiuaria porcelli modo assata, stomachoque medetur. Et item si fieri potest cochleæ Aphricanæ in cibo sumptæ coquuntur intactæ ex aqua, deinde in prunis torrentur, tunc ex uino & garo eduntur impari numero, sicque etiam stomachi dolori medentur. Profunt item uiuæ cochleæ ex aceto deuoratae. In hoc languore aqua marina lauari prodest. æstimo præcordiorum esse uitium cum cibi non continentur: certe cum hoc accidit stomacho, laborare ipsum oportet, horum portione inficitur uenter. Ossa fragi arefacta profunt, etiam si teneantur in manu, dum cibum sumitur. Non est ab re compositionem operi conuenientem ponere, quæ stomachi fastidium & marcorem detergit celerrime. in multa ex uuis albis congio coniunguntur cydonia quinque non purgata, totidem mala piciæ eo, additur sorborum sextarius, roris Syriaci sextarius, croci Siculi semiuncia, fici optimi semiuncia; sic coquantur usque ad crassitudinem mellis; inde in die lingua esui sumitur: seruat in uase uitreo; fit efficacissima potio, compositione ita scripta. # Apij seminis aridi uncias sex, petroselinum Macedonici unc. IIII. spicæ nardi uncias quatuor, opij quatuor, myrrhæ quatuor, Icyi uncias quatuor, piperis longi uncias quinque, piperis albi uncias quinque; hæc una teruntur cum melle græco despumato quod satis est, seruatur in uase uitreo; à balneo datur ieiuno in portione multa mixta ex aqua calida unciz duæ. Ad præcordiorum & iecoris dolorem. Leporis hepar tritum ex uino, siue sicci puluis in aqua datus, hepatis simul dolorem & fastidium aufert. Antidotum ad hoc. Recipe costum, zinziber, foenugræcum, cyperum & piper pari portione, adiecto spatorio cum melle despumato, quod in uitreo uase repones, & exinde denarios duos dabis bibere in passo Cretico cum careno. Lini item semen de ñ. pondere, formiculi quoque tantundem ex aqua multa decoctum, in panno dum adhuc calidum est præcordijs impones. Ad concoctionem. Hysopum cum oxymelle ieiunus, uel post coenam bibat. Lasis uini modicum & aquæ frigidæ sextarios tres dilues, & dormitum eunti dabis bibere. Digestorium quod recipit mellis Arici pon. unum, betonicæ uncias quatuor, in uino hæc permiscebis & seruefacies, & cum refrigerit, facies pastillos nucis auellanae magnitudinis, & in coena manducabis. Si uero uenter torquetur, betæ radices cum oleo coques, & bibes.

Ad ligulam & uomitum. Cap. XVI.

THVRS masculi & mastice æqualia pondera trita cum oui albore miscebis, & impones, & tunc duo directum sic esse permittes. Hoc enim & uomitum sistit.

Hepati curando. Cap. XVII.

MYRRHAE unciam unam, aloës hepaticis unam, costi unam, foenugræci unam: omnia in puluerem redacta, & in uino permixta seruabis, & dabis in careno cochlear plenum calefactum, ita ut in ipso latere diutissime iaceat. Asphalti unciam unam, costi denarios tres, folij scrupuli tres, meliloti denarios tres, uini Aphri sextarius unus tollitur, primumque alias species teres diligenter, postea adiecto asphalti si mul teres, & bene commisceatur; superaddes uinum, & simul miscebis, & in ampullam mittes, & ex eo teres portiones facies; & cum uolueris accipere, ieiunus in solario calefactum accipies; & cum exieris, in ipso latere iaceas, & hoc per triduum facias. Sal ammoniacum, aloës & piperis grana undecim, trita cum uino bibuntur. Piper tritum ad cochlear unum, & picem uirginem ad cochlear unum, commiscebis, & in uino ueteri per triduum dabis. Sagacem item lapidem accedes, & in aqua calida extingues, & ante quæ dormitum uadat, dabis ei bibere per triduum, & sanabitur. Trifolij itidem albi succum cum lacte uaccino, siue cum uino per dies quatuor potui dabis, hocque à dolore liberat. Violæ rusticæ succi cyathos duos cum melle modico, & uini hemina, calidos propinabis per triduum: si quod intus in hepate malum est, remediabitur; ac sanatur in quadriduo ubi miseris, qui etiam à medicis fuerit desperatus. Maluæ agrestis succi cyathos tres cum aquæ calidæ cyathis duobus potui dabis per dies quatuor, liberat & febrem auerit. Meliloti succus cum melle partis unius decoctus & sumptus, dolores inhibet. Cyminum item mel & uipum crudum teres diligenter, dabisque bibere. Item lupinus, costum, zinziber, & herba, quæ dicitur lacar, unde uermiculatæ pelles tinguntur: horum omnium puluerem ad cochlearia singula miscebis, & exinde cochlear plenum hyeme in condita portione dabis; in æstate uero manè & serò: febricitantes autem in aqua calida accipiant. Si uero per tempus locus hepatis fuerit induratus, ante potionem, ita duritiam conuenit emolliri, ut profit. Guttæ ammoniaci uncias duas uel tres teres, & cum aceto acerrimo miscebis, & mittes in ollam nouam, & superaddes parum aceti; & tandiu coques, donec ad spissitudinem mellis perueniat, & exinde per linies loca dura, & si stomachus fuerit durus, plurimum ei quoque prodest, suppones etiam chartam puram, atque fascias, statimque tollet omnem duritiam; & uinum satis non bibat, nec carnem manducet, donec sanus fiat: quod si habuerit pullum, uiscellatum edat: sin uero buccellas anefatas cum sale & oleo, porro & apio costas, oryzam atque bene conditam ac piperatam: Legumina uero non manducet, nec holera, exceptis porris & apio costis; unde & uinum bibat. Pentaphylli radix ex aqua decoquitur, & ea aqua cum uino mixta bibitur; si febricitat qui accipit, multa ex aqua facta propinabitur. Ad hepar, confectio. Recipe succi costi unciam unam, amomi unam, folij unam, stellas absinthij pauca, stercoreis hœdi lactentis pillulas quadragintaduas, tundes omnia ueteri sabateno calefacto. Potio ad hepar mirabilis. Ammoniæ semiuc. in uini spani hemina decoques in olla noua, donec soluat pigmentum, & remaneat potio in calice bono; deinde colabis, & in ampullam mittes.

mittes, quam suspendens ad noctem in aere, & prima luce accipiat: ita tamen ut nihil accipiat sed purum bibat, & iaceat in dextro latere diutissime; a tunc ita facies uerni & autumnii tempore. Item hederæ baccas collectas mense Ianuario, numero uigintiquinque, & piperis tantundem teres, & cum myrrha calida ieiuno dabis. Costi semiunciam, aloes hepaticis unc. unam, mastice duas, eupatorii unam, piperis duas, amomi semiunciam, reupontici tantundem, aloes uerò & mastice simul tundes, cetera teres & cribrabis omnia, & commiscebis, & dabis cochlearia singula cum succo foenugraeci decocta. Quartum uerò ante diem succum foenugraeci infundes, & adiecta aqua coques, ita ut prima aqua & secunda absumatur: tertia uerò aqua cum creperit feruere, addes fasciculum pulegii, & coques, ipsumque succum seruabis; & accipias ieiunus cochlear unum | pulueris supra scripti quotidie in succo tepidato. & si amarizauerit, adijcies mellis cochlear unum. sed postquam biberis, tenso brachio iaceas. Foenugraecum purgatum uino ueteri infundes, donec intumescat, & iterum siccabis, hocque facies, quoties in die potueris, à mense Iunio usque ad mensem Augustum; postea in puluerem mollissimum rediges, & addes pulueris costi tantundem, dabisque, ac simul miscebis cochlear plenum in careno optimo, ieiuno, & sic iaceat. Myrrhe, aloes, costi, foenugraeci ana unciam unam tolles, omniumque puluerem in unum mittes, & dabis cochlear plenum in careni calice pleno & calefacto, ac superiaceat. Potio ad hanc. Recipe bacchani unciam unam, semiunciam piperis, semiunciam aloes; tundes hanc, & mollissimè cribrabis, accipiesque cochlear plenum in mellis cyathis tribus. Alia potio. Caules uirides in carbonibus combures, & in puluerem rediges in cuius unam unciam, piperis semiunciam mittes, & dabis cochlear unum in mellis cyathis tribus. Caulium tyrsos siccos cinerem repones, & cum opus fuerit, mittes cochlear plenum cum piperis triti granis undecim in uini ueteris calicem, ac calefactum dabis bibere: Secunda uerò die mittes piperis grana nouè, tertia die octo. Acori unc. I. amei unam, in puluerem mollissimum rediges, dabisque cochlear unum, sanis in condito, febricitantibus cum mellicrate. Piperis albi, solij, costi, rutæ seminis, spicæ nardi, succianæ denarios tres, commiscebis, & cochlear unum cum uini calice potione calefacta dabis bibere. Foenugraecum cum uino styptico infundes, postea ad solem siccabis: hoc facies uel septies, uel octies: & huius pulueris uncias quatuor, piperis unam, eupatorii, solij, costi, petroselini, gentianæ, anisi, amygdalæ amaræ, amei ana unciam unam: hanc omnia singillatim teres & cribrabis, miscebisque simul, & iterum teres, ac dabis cochlear unum ieiuno in condito: febricitanti uerò in calida aqua. Baccas lauri quinque, piperis grana uiginti uel triginta, teres mollissimè, & mittes in calicem, & postea uino ueteri perfundes ferrum candens super calicem, commiscebisque, ac sic bibes, & iacebis. Aliud ad hanc. Intyborum agrestium succi, quem Graeci dicunt cytroxinum, potionem unam colatam, miscebis cum potione cōditi, & addes pulueris costi cochlear unum, & piperis grana decem, dabisque ieiuno bibere, & iaceat in latere horas tres uel quatuor. Laccar reuponticum ad denarios duos uel tres, & ex eo puluere cochlear plenum in uino Hadriano dabis, febricitantibus uerò in aqua calida, & superiaceant. Aloes hepaticis den. tres, solij duos, in puluerem rediges, & in aqua dabis ieiuno, modicè tepidatum, & deambulet quantum potuerit. Lauetur ieiunus, accipiat sanè mel, & intermisso triduo iterum accipiat: hoc enim plenè est utile. Syluestris rutæ fasciculos tres in ollam nouam conijcies, & cum tribus heminis aquæ feruefacies, & postea adijcies mellis uncias tres, & rursus subferuefacies, & per triduum potui dabis: hoc & icoris dolorem sanat. Puluis ad hepatis dolorem. Recipe aloes unciam unam, piperis grana undecim, lupinos quindecim, corticibus suis expoliatos torrebis: & mittes per singulos cochlearia singula per triduum in potione conditi, & calefacies, & dabis potui. Pinus acritulæ uiridis in uino optimo trite, ac potui datæ, citò profunt. + Saluam item equi, quem tussis intolerabilis uexat, ex aqua calida per triduum bibat: hac enim potione quamuis æger sit, sanabitur. Folij unciam unam, costi semiunciam, piperis grana quinquaginta, baccas lauri triginta, tundes, & cum succo intybi syluatici portionem maiorem per triduum bibat, & in ipso latere iaceat: Itemque per singulas portiones pulueris tertiam partem accipiat. Aliud ad hepar, & ad splenem. Costum, gentianam, aristolochias ambas, baccas lauri, & piper pari pondere in puluerem redactas seruabis: & cum opus fuerit, dabis in uini ueteris portione. Potio item ad hepar. Recipe eupatorii uncias duas, costi duas, piperis unam, mellis quod sufficit. Ad hepar & ad renum dolorem, & ad stomachi imbecillitatem. Cyperi unc. I. castorij I. acori I. hanc omnia tusa & cribrata cum uino & melle dabis, febricitantibus uerò cum mulla, cochlearia singula, uel secundum uires. Ad hepar item palmæ & caricæ in aceto costæ comeduntur, optimeque hepar curant. Brassicæ folia trita & in modum ceroti imposita per triduum, inueteratum hepaticum sanant. Betonicæ item herbæ siccæ puluis cum oleo sparsus, & in modum cataplasmi calidi in panno, pectori & dextro lateri impositus, quarto die sanat, & si per os sanguinem mittet. Item ceruinus pulmones cum suis gurgulionibus uirgulis extendes in fumo, donec arescant, deinde conteres, ac ex melle colliges, & dabis edendum hepaticis. Est enim res saluberrima, & presentaneum remedium, quod desperatos sine dubio sanat. Ad hepar & splenem. Centauriæ maioris drachmam unam | in uino decoques, & potui dabis, optime sanat. Confectio olei hepaticis. Recipe mirabolani unciam unam, staphisagris duas, pyrethri uncie quartam partem, nardi sextarij sextam partem, poliaris malignatæ uncias duas, cypharij unam, absinthij unam, mastice unam, croci unam, styracis unam, laludani unam & semis, solij unam; nardi celticæ unam, squinantij semiunciam, amomi unam, cassiæ fasciculatam unam, meliloti unam, ireos uncie partem sextam, enantis unciam unam, anisi comas unam & sextam partem: omnia uerò hanc sicca infundes uino, & cum uino coques in olei sextarijs quinque, & post he

C. PLINII SECVNDI

admiscebis nardum, & sic uteris. Vnges locum cum ipso oleo, & cum perunxeris, impones desuper
Hoc lanx, & iterum frigit in oleo, & cera addita perunges. Emplastrum ad hepar. Recipe picis un-
 cias duas, sulphuris duas, nitri duas. & hec omnia in puluerem redacta, commiscebis, & in chartam uel in
 pannum pones, & triduo uteris, ita ut in balneo & ponas, & tollas. Epithyma ad hepar. Recipe ceræ
 libram unam, resine terebinthinæ unam, foenugræci tusi uncias octo, samscuflorum octo, baccarum lau-
 ri octo, nitri rubei duas, olei cyprini libram unam, & unc. tres, uini ueteris heminam: omnia sicca tundes,
 & cribrabis, & cum uino ueteri teres horis tribus, deinde reliqua solues & colabis, & sicca his quæ cõsper-
 ta sunt, miscebis, & colliges in uase uitreo uel fictili & uteris: ita ut foueas hepar cum oleo samscuflino. Si
 autem uolueris medicamentum & unctionem facies, mittes nardi uncias tres, medicamenti quatuor.
Epithyma ad dolorem hepatis & tensionem stomachi. Recipe croci unc. unam & semis, aloes hepatici
 unam, mastice unam, guttæ ammoniaci unam, bdellij unam, styracis pinguis & ceræ lib. unam, adipis anse-
 rini unc. duas, hyssopi ceroti tres, olei rosati ad æstimationem, ut non sit nimis durum uel molle, uini uete-
 ris quantum ad species terendas sufficit. **Eletmadium ad hepaticos.** Recipe costi unc. unam, euporij
 denarium unum, eupatorij nouem, croci tres, piperis sex: omnia simul tundes & cribrabis, addes mellis
 despumati pond. duo, seruefacti tantum, & ex eo dabis cochlear unum & semis. **Eletmadium ad he-**
par. Fœniculi radices grossioris corticem tundes de ligno in lignum minutissimè, & eius libram unam,
 & uncias quatuor, & infundes in ueteri aceto acerrimo in uase mudo diebus septem, deinde teres in mor-
 tario, & addes paulatim acetum, donec molliorem ceroti suscipiat, & in ipso mortario aperto maneat: alio
 die colabis acetum, & exprimes radices per linteum mundum in uas stagnatum, & addes mellis optimi se-
 xtarios quatuor, & coques ad carbonem, semper agitando, & tandiu, donec ad spissitudinem mellis redet;
 & dum adhuc in foco est, addes infra scriptum puluerem pigmentorum; aloes uncias tres, folij duas, spice
 nardi duas, gingiberis ij. sane singula membratim mittes, & semper agitabis, & postquam laueris simili-
 ter donec refrigescant, repones in doliolo uitreo uel plumbeo, claudes & signabis. **Eletuarium hepa-**
ticus. Recipe piperis unciam unam, gingiberis tres, epithymi tres, rutæ uiridis foliorum semiunciam, aloes
 hepaticæ semiunc. costi unc. unam, foenugræci semiunc. aceti albi unc. sex, mellis optimi despumati pond.
 quatuor; dabis ieiuno cochlearia duo. **Troiscus ad hæc.** Amomi den. sex, spice nardi tres, croci tres,
 costi tres, eupatorij duodecim, lupini pollinis tres, myrrhæ tres, glycyrrhizæ duodecim: & omnia tundes
 & cribrabis diligenter: ex uino uerò phalerno colliges, & facies troiscos in auellanz modum, quorum sin-
 gulos febricitantibus dabis cum aqua calida, sanis uerò cum uino. **Antidotum hepaticon.** Recipe
 prassium, gentianam, petroselinum acetonicum, sinapis semen & cucumeris hortulanæ, radices enulæ om-
 nium ana unc. dauci cretici seminis unc. I. abrotani I. seminis caulium I. aristolochiæ I. piperis albi simili-
 ter, erucæ seminis similiter, eringij similiter, castorij pontici similiter, folij similiter, opij radicum similiter,
 eupatorij similiter, iuniperi similiter: omnia hæc tundes & cribrabis subtilissimè, & cum melle Attico de-
 spumato commiscebis, & dabis in modum auellanz maioris in oxymellis cyathis duobus; adduntque ali-
 qui figatum lupi ad denarium unum. **Troiscus hepaticus.** Recipe piperis drac. sex, gingiberis tres,
 dauci cretici tres, petroselini unā, anili duas, asari pōtici II. petani II. uernigarij II. costi octo, aceti & mel-
 lis quātum sufficit. **Antidotum Athanasij hepaticis.** Recipe styracis drach. IIII. cassiæ similiter, gly-
 cyrrhizæ tres, croci similiter, opij II. spice nardi quatuor, mellis cotylam dimidiā. **Antidotum hepaticis.**
 Recipe foenugræci unc. I. eupatorij similiter, costi similiter, absinthij pontici comarum similiter, mellis
 optimi despumati pondera duo. dabis autem sic. Pulegij sine fumo & apij uiridis fasciculos singulos in
 aqua fontana ad tertias decoques, & in hac aquā ex superscripto antidoto mittes in modum auellanz, da-
 bisque ieiuno bibere, ita ut in ipso latere iaceat semihora, hocque facies per triduum. Cõfectio potionis
 ad hepar de cotonijs. Intus & foris cotonia purgabis, & confringes in pila, ac pilo ligneo, post biduum
 tundes diligenter, & exprimes in pressorio, & mittes in succi sextarios duos, mellis duos, & aceti acerrimi
 dimidium sextarium, & in olla noua ad carbonem diutissimè decoques, donec in mellis aquatū modum
 redigatur, agitando semper dum coquitur, & repones in uase uitreo: quod & si thermaticum facere uolue-
 ris, mittes in hunc modum. Piperis triti unc. I. gingiberis similiter, & diligenter permiscebis. Si autem ma-
 ius thermaticum facere uolueris, maxime ad hepar, Mittes in hunc modum, Gingiberis non
 pertusi uncias tres, & piperis albi duas, tundesque cotonia, & exprimes succum, & adiecto melle & ace-
 to, in uase duplici coques, donec ad mellis spissitudinem redigatur, dabisque cochlear plenum mane:
 & si fuerit opus, etiam sero. Ad hepar, oxymel squillæ sic facies. Squillæ purgatæ in tar-
 to tenero unc. uiginti, petroselini acetonicæ tres, origani, thymi, pulegij similiter, hyssopi tres, poly-
 podij, epithymi tantundem: omnia hæc infundes in acetum acerrimum duodecim sextariorum mane,
 & alia die coques ita, ut tertia pars decoquatur, deinde colabis acetum, & addes mellis thymini despuma-
 ti sextarios quatuor, & decoques lentos ad carbonem in uase duplici, & postquā leniter coxeris, in uase
 spicato seruabis, accipiesque ex eo cochlearia duo uel tria: hoc autem & uentrem temperat. Epi-
 thyma ad hepar. Recipe spice nardi unciam unam, costi unam, aloes duas, guttæ ammoniaci duas, bdellij
 duas & semis, nardi libram unam & semis, styracis duas, ireos unam & semis, ceræ libram unam.
 Antidotum diagentianæ ad hepar. Recipe gentianæ unciam unam, helenij, absinthij, herbæ spice,
 ana semiunc. dabisque cum condito cochlear unum: si febricitat, cum aqua calida. Antidotum hepa-
 ticon siue ad scyrosin eius. Recipe croci uncias duas, spice similiter, cassiæ quatuor, myrrhæ unam,
 costi ac squinantij similiter, stactis similiter, mellis unc. XXXV. dabis scrupulos quatuor cum oxymelle.
 Diatesaron.

Emplastrum, opij, ceræ, sulphuris, nitri, picis, resine, terebinthinæ, samscuflorum, baccarum lau-
 ri, olei cyprini, foenugræci, nardi, mastice, guttæ ammoniaci, bdellij, styracis, adipis anserini, hyssopi, ceroti, olei rosati, uini ueteris.

Antidotum hepaticon, prassium, gentianam, petroselinum acetonicum, sinapis semen, cucumeris hortulanæ, radices enulæ, dauci cretici, seminis, abrotani, seminis caulium, aristolochiæ, piperis albi, erucæ seminis, eringij, castorij pontici, folij, opij radicum, eupatorij, iuniperi.

Antidotum Athanasij hepaticis, styracis, cassiæ, glycyrrhizæ, croci, opij, spice nardi, mellis, cotylam dimidiā.

Antidotum hepaticis, foenugræci, eupatorij, costi, absinthij pontici, comarum, mellis optimi, despumati, pondera duo.

Antidotum hepaticis, piperis triti, gingiberis, dauci cretici, petroselini, anili, asari pōtici, petani, uernigarij, costi, aceti, mellis.

Antidotum hepaticis, styracis, cassiæ, glycyrrhizæ, croci, opij, spice nardi, mellis, cotylam dimidiā.

Antidotum hepaticis, foenugræci, eupatorij, costi, absinthij pontici, comarum, mellis optimi, despumati, pondera duo.

Antidotum hepaticis, piperis triti, gingiberis, dauci cretici, petroselini, anili, asari pōtici, petani, uernigarij, costi, aceti, mellis.

Antidotum hepaticis, styracis, cassiæ, glycyrrhizæ, croci, opij, spice nardi, mellis, cotylam dimidiā.

Antidotum hepaticis, foenugræci, eupatorij, costi, absinthij pontici, comarum, mellis optimi, despumati, pondera duo.

Diatessaron hepaticis. Recipe eupatorii drachmas quatuor, foenugraeci sicci & ireos similiter, dabisque cum oxymelle cochlearia duo. Ad hepar, de lactucis agrestibus. Squillæ unc. duas, & cochlear unum mellis miscebis, & addita aqua calida temperabis, & sic bibes. Pulueris costi unciam unam, piperis semiunciam, foenugraeci unciam unam, si non sit febris, dabis in uino: febricitanti uero, in aqua calida. Item baccaris unc. unam, piperis semiunciam, costi denarios sex, foenugraeci uncias tres, cum oxymelle dabis cochlear unum. Item picis, spanz tritz cochlear unum, piperis unum, & modicum rutæ dabis cū uino Hadriano. Rubez item sicce radicem collectam mense Augusto, in puluerem rediges & miscebis, & infundes cochlear unum ieiuno, & ita facies per triduum: abstinebit enim à pomis & omnibus frigidis. Ad hepatis dolorem, cataplasma. Recipe aphronitri cypharij unc. quindecim, lini seminis manum plenam, farinz hordeaceæ duas manus, ex quibus in oleo cataplasma facies & impones. Cetría locum unges, & sulphur tritum supermittes, ita ut totum locum teneat: Lanam succidam superpones & fascias, cui castoriū in potione dabis, si sit febris, in aqua: si uero nō sit, in uino, & superiaceat. Epithyma tolcopini ad hepaticos, quia nō est ei simile aliud. Recipe foenugraeci, samoluci, baccarum lauri, ana drachmas quinque, enulæ, piperis, ana sex, nitri octo, ceræ septuagintaquinque, olei cyprini libram unam, uini optimi cotylam unam. Caules uirides teres diligenter, & cum melle calido miscebis, atque ad latus quod dolet, pones.

Potio ad hepaticos experta. Recipe costi semiunciam, foenugraeci unciam unam, comarum absinthij drachmas duas, baccarum lauri similiter, cymini frixi similiter, eupatorii unam; dabis cum uino aut aceto. Aliud ad hepar, expertum. Recipe foenugraeci uncias duas, costi, piperis, eupatorii, picis sicce, ana unc. unam, dabisque ex eo secundum uirtutem accipientis cum mellicrate. Facies autem electuariū cum melle despumato, & si uolueris, sic dabis. Ad hepar, expertum. Recipe lacchari unc. unam, asphalti Iudaici denarios quinque, piperis grana quinquaginta, cāriophylli uiginti, reupontici unc. unam, solij den. tres, aloes hepaticis sex. quæ in uino ueteri dabis ad denarios quatuor. Epithyma hepaticon.

Recipe adipis anserini unc. sex, taurini ac porcini & medullæ ceruinæ similiter, hyssopi unc. tres, terebinthinz duas, ceræ sex. Epithyma hepaticon. Recipe medullæ ceruinæ unc. duas, adipis gallinacei, anserini ac porcini similiter, apozimati similiter, ceræ libram unam. Cataplasma hepaticis. Recipe mastice unc. unam, cymini duas, apij seminis duas, meliloti unam, absinthij unam, foenugraeci sextarium unum, hordei unum, lini seminis unum, dactilos undecim, facies cum mulsa.

Spleni quomodo succurrendum. Cap. XV. I. I. I.

SPLENIS dolori solea piscis contra ligatur. Torpedorum & buscum, si uisidum superligatur, bona medicina est: sed prius quam soluitur, in mare remittitur. Aqua bibitur in qua holera decocta sint, addito saleis qui quotidie ieiunus serum ederit, lyenem consumi certum est. Samentorum cinis aceto conspersus binis cyathis ex aqua ei dabitur: is qui curabitur, in lyenem iacere debet. Acetum bibitur, & in spongia apponitur. Gummi hederæ poti uel illiti profunt. Hederaceis uasis in potione semper utendum est. Pecudis lyen recens super dolorem extenditur. Caninus lyen uiuenti eximitur, & laboranti in cibo datur, & liberatur de uitio lyenis. Catulus duum dierum datus ignorantī ægro in cibo & aceto inuat. Idem & lyen erinacei præstat. Cochlearum cinis cum lini semine & urticæ addito melle imponitur, donec sanetur. Lacerta uiridis uiua in olla ante cubiculum dormitorij suspenditur, & egrediens & regrediens manu tangat hoc, sedat lyenem. Fel apri uel suis potum, cerui cornu cinis potus ex aceto, equilingua inueterata ex uino bibita ualet. Præsentaneo remedio lyeni bubulus assus recens uel elixus in cibo. Alij capita uiginti tusa cum aceti sextario imponantur. Hædi lyen impositus idem præstat. Radices uiolæ lotæ ex aceto illiniuntur. Agarici oboli duo in aceto mulso poti per dies uiginti, consumunt lyenem. Defunctos obrui oportet uel pertiliones, quorum sanguine si uenter fuerit contactus, in totum annum cauentur uitia interaneorum. Cornu ceruini teneri cinis cum cochleis Africanis, cum testis suis tulis mixtus, datur in potione uini: facit optimè ad colum potio, cuius compositionem tradidimus in præcordiorum curatione, subiecta orificio. Hederæ & gladioli succus pari mensura cum passo calefactus, potui datur ad idem. Sulphuris uiui, cardamomi, ammoniaci, thymiamatis, bdellij, mirabolani, ceræ, nitri rubei mundi, ana uncias singulas simul miscebis, & facto emplastro uteris, sollicitusque eris ex die qua coeperis, sanguinem per urinam mittere, nec amplius quam triduo habeas impositum. Ammoniaci thymiatu libras tres, ceræ tres, resinæ terebinthinæ uncias octo, bdellij octo, thuris quatuor, myrrhæ quatuor, galbani octo, olei cyprini libram unam & semis; ammoniacum autem & thus cum aceto acerrimo teres: cum uino uero optimo ueteri, bdellium & myrrham, terebinthinam & galbanū cū oleo solues: & omnia simul miscebis, & linteo inductum spleni superpones. Cataplasma ad splenem.

Recipe caricas Germanas pingues numero uiginti quinque; quas niites in ollam nouam aceti ueteris acerrimi plenam: & tandiu feruere permittes, donec caricæ excoquantur, & acetum fiat, sicut mel aquatum, & inde leuabis caricas & teres diligentissimè, & ex eo per triduum, splenem cataplasmas. Aliud in aqua coctorum & tritorum tantum, quantum ambæ herbæ habuerunt: postea omnia simul terendo cum aceto & melle, unum corpus efficies, & inductum panno tepidum spleni superpones: cum uero sudare coeperit, tolles, & alia die nouum appones. Ammoniaci uncias tres, aceti tres, ceræ unam, olei unam, coques & cum aluta superpones. Ad splenem & ad hepar: Gypsi florem cum aceto acerrimo in uase si

7

Splenic remedia infusa

foi, ~~de~~ de, oliva, sal, ~~se~~ se
foi ~~cim~~, acido, ~~cum~~ ~~hodo~~

Lactuca, canina, Lin, Evinacq,

Pan., artemisia, thlas vana, uola

[Faint handwritten text from another page]

Solia, atria, oxyacanthus, ...

Verba of prohibition.

Leos aut' m' frindus

by - ~~John~~ / m171

1

100

100

100

Feing, l. pigment

100

refina pica.

1

vin? and

1

[illegible]

1

100

201

—

La F. i.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

✓

10

200-1000

Topica ad iuniorum.

in curia eius, lupini, feni, ad
 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

omnes descendunt. Centauriam item herbam siccam tritam in puluerem, & lupinorum farinam cum melle mixtam super umbilicum impones, tineas necat. Betonicæ itidem herbæ pulueris denarios tres in aquæ calidæ cyathis tribus dati potui emendant. Item costi tusi puluis ad denarios duos in aqua calida potui datus, lumbricos & tineas eicit. Lupinorum itidem farina cum felle hircino mixta, & umbilico illita idem præstat. Ad tineas & lumbricos. Lentis hemina in aceto madefacta, & in cibo uel potu data, extinctos lumbricos eximit. Lupini itidem crudi contusi, & umbilico impositi, lumbricos penitus extirpant. Itemque stercus caprinum siccum & ualde aridum tritum, adiecto melle potui datur, omnesque tineas radicibus eximit. Raphanos ad tertias decoques, & eam aquâ uino admixto, ad extirpandas tineas dabis bibere. Fel caprinum lanæ admixtum & umbilico appositum, & cornu ceruinum potui datum, aduersus lumbricos & tineas magnum auxilium præstant. Coriandri seminis uiridis unciam unam ex aquæ sextario uno, in qua lupini fuerint decocti, bibat. Itemque ad lumbricos: Ex mensa cum melle bene trita factas pillulas glutiat. Herbam itidem nepetam uiridem conteres, & succum eius in uini cyathis tribus ieiuno dabis bibere: si autem febricitat, ex aqua calida dabis. Ad lumbricos: Coriandrum & cardamomum æqualia teres cum melle, quantum sufficit, dabisque bibere cum oxymelle. Oleum item cibarium cum aceto permixtum æquali mensura, ac per triduum potui datum, contra lumbricos & tineas bene facit. Emplastrum ad lumbricos. Folia persici uiridis & absinthium uiride conteres diligenter: cumque trita fuerint, addes fellis taurini aliquantum, radesque puluerem cornu ceruini usti, necnō & polinis lupini atque aloes, & facto cerotario tenerimo, supermittes quousque permisceatur, & uteris.

Torminibus medendis. Cap. XXIII.

LACTUCA discocta editur ex oleo cymino, sale, sinapi, ouum crudum defunditur in uase; putamen eius impletur oleo, quod in uase defunditur. Eadem ratione uinum & mel: Vinum autem sit austere, hæc permiscantur in unum; cochlearij unius ad quātitatē bibitur. Holera discocta ex sale eduntur. Ruta cum hysopo discoquitur, eaque aqua ex uini potione miscetur. Panis cum lacte capriano decoctus, bis in die sumitur more forbitionis. In olei cyathis sex, ruta decoquitur, idque oleum bibitur. Malum punicum tustum ex tribus heminis uini coctum ad heminam, emendat. Malum punicum in olla addito operculo, exustum in furno & tritum, datumque in uini potione, tormina discutit. Ruborum qui ferunt mora cauliculi teneri tunduntur, & ex ijs exprimitur succus, qui in sole ad crassitudinē mellis coquitur. hic potus efficacissime prodest. Lyeu pecudis totus tritus ex uino bibitur. Palumbus ferus in cibo datur decoctus in posca. Anas uiua apponitur uentri, in eundem morbus transit, itaque moritur. Aqua calida marina clysterio infunditur. Vinum tepidum addito coagulo leporis, si potui datur, creditur efficacissimum. Aristolochiæ radicis puluerē in aqua calida dabis bibere. Ad tormina, hoc est ad tentionem uentris: Folia lauri masticet, & succū eius glutiat, ipsaque folia in umbilicū ponat, & statim paulatim.

Ventri molliendo. Cap. XXIII.

MENAE falsæ, id est pisces falsi, uentri molliendo cum felle tauri umbilico illiniuntur. Lac caprinum potatum cum sale & melle ualet. Ventriculus suillus, in quo sarda decocta sit. Porri capitati discocti per se in cibo sumuntur. Vrticæ quoque semen tostum pane colligitur. Lens non percocta forbetur. Mirabolanus, genus caryotæ nascens in Aegypto, quos non habet, uino austero trita & pota aluum citat. Fel lupi, cum elaterio umbilico illinitur. Cydonia in melle seruata cruda maducatur à ieiunis. Pruna itidem à ieiuno eduntur. Mororū maturorū succus potui datur. Ammoniacū potioni additur. Vmi cortex tusus, denarij pōdus in hemina aquæ frigidæ etiā purgat. Aqua bibitur in qua gallinæ decoxerint. Hirūdinus fimus adiecto melle supponitur. Salicis succus ex uino mulso potatus ualet. Thallusomel incundissime purgat, sine stomachi uexatione & odore grato & sapore: quod sic fieri debet. Aqua marina & aqua celestis eadem mensura, & mel eiusdem portionis, permiscantur & seruātur in uase fictili picato, usui laxatiuo. Betam gramine cum radicibus suis terges, sicque non laubis, & tandiu in cacabo bulliat, donec discoquatur, sicut cerotum, & addes ibidem modicum salis & mellis cochlearia quinque, olei unum, & ex eo dabis calicem bonum, etiam si febricitat. Ad laxandum uentrem, bulbos Aphros numero quadraginta, purgatos cum diligentia, teres in mortario, & cum mellis despumati pond. sex in ollam nouam mittes: & cum cœperit feruere lento foco, tunc addes bulbos tritos: & postea cum cœperit uelut pastilli fieri, tolles. & cum cœperit esse tepidum, addes piperis unciam unam, pulegij unam, hysopi triti unam & semiunciam, diagridij aut polypodij denarios quatuor. Oxygaron quod uentrem malaxat. Recipe zinziberis succi unciam unam, piperis albi similiter, salis ammoniaci similiter, diagridij unam & semis, mellis optimi libram unam, opij Cyrenæici denarios tres, florum libras duas, aceti acris unam; zinziberis autem & piper tundes & cribrabis molliter, sale teres, diagridion in fermento sub cinere calido coques, & sublatum cum resiccatum fuerit, teres & cribrabis, opium Cyrenæicū teres in mortario, & illinc omnia mittes, diligenterque ac diutissime teres, ut bene commisceantur, uteris autem sic, sero cum ungella aut cum pede de anlere, ita ut sorbeas exinde congium plenum, uel si quid amplius delectauerit, quia nō lædit: accipitur autem etiam cum nascentijs, ut de foenugræco. aliud sane non tenet, præter id quod cum oxygarno acceperit. Item lapaſij herbæ & polypodij radices cum aqua decoctas edat, simulque succum bibat, aut herbæ

herbz succum quæ in arbore nascitur, ipsumque holus inter cibos manduces; hæc enim uentrem sine ullo dolore purgat, & patrem familias non corrumpit. Est præterea herba quam Græci *Σύον* appellant, cuius decocti succi hauriuntur utiliter, ita tamen ut à catartici recedas. Item diagridij seu scamoneæ semiū cum mellis despumati pond. unum, dabis ieiuno ad cochlearia tria. Plantaginem in aqua decoques, & eam aquam cum melle mixtam dabis bibere. Herbam quoque Mercurialem dabis in potione.

petroselinum non corrumpit.
an uentrem?

+ in aqua dya?

scamonia seu diagridij
& dicit, sol immoluit

Ad tenesum. Cap. XXIII.

TENESMO laborantes subinde concupiscunt egerere, & nihil eiiciunt. Ad hoc uitium senes anguium cum rosaceo in uase stagnæ decoquitur, & uentri illinitur. Et si exulceratio sit, ostreæ ex mulla decoctæ eduntur. Lac item bubulum potatum prodest. Ius itidem piscium maritimorum in patina decoctorum cum lactucis sorbetur, aut pane colligitur. Holus discoctum cum sale editur. Aqua marina ex alto hauritur, seruaturque, ut uetustate uires accipiat: postea bibitur cum uino & aceto, uomitu præcedente. Aliqui uerò aquam marinam per se dant, sed raphanos supermādi iubent ex mulla & aceto, ut uomatur. Pultriculam filiginis cum sale tantum sine oleo condies, & adijcies ceræ punice denarios sex, & agitabis bene, & sic dabis edendam.

Tenesmo laborantes subinde concupiscunt egerere, nihil eiiciunt.

Recedia.

scamonia, rosaceo, ostrea, lac bubulum, jus piscium maritimorum, oleum, sal, aqua marina, uino, aceto, raphani, mulla, pultricula filiginis

Cholera quomodo succurritur. Cap. XXV.

CHOLERA, uentris uitium est malum, & præceps mirifice, cuius curæ prodest compositio quæ infra est scripta. Oliuæ quæ ueterrimæ sint, aqua calida luuntur, ita ut saporem salis amittant, & enucleatæ cum pipere teruntur, quibus admiscetur coria mali in aceto decocta, oleum & acetum acerrimum adijcitur: Oportebit autem qui curabitur, potione quā diutissime abstinere, utpote quod & uomitū per se exhausta diætā. In aqua lactucæ caules quantō maiores & amariores in patina coquantur, & sic eduntur. Cydonia si matura cruda in cibo sumitur. Optimè facit & potio, cuius compositionem cum de sto macho dicemus, exposuimus. Baccæ acrifoliæ tritæ, & uino datæ, profunt. Mororum de rubo succus efficaciter bibitur. Aqua marina calida clystero infunditur. Petroselinum, piper, costum, & baccas lauri pariter trita cum uino dabis bibere. Ex uua itidem passa & contusa cymino malagma facies, & adijcies uinum, & sic impones super umbilicum, & dabis ei ut bibat ex aqua calida. Pulegium syluaticum cōteres cum oleo græco, & dabis ut sorbeat. Hoc enim & uentrem soluit. Semen item anethi tritum admixta aqua potui datur. Polium herba cum aqua trita cholera sistit. Herbam centauriam in aqua decoques, & ex ea aqua per triduum cyathos tres dabis bibere. Itemque uitulinum finum recentem ex uino potui dabis, etiam melancholicos liberat. Tamarisci siue fellis terræ radices cōtusæ, & ex aqua mulla potui datæ, & deorsum & desursum purgabunt omnes bile, & postea toto anno bene ualebit. Pulegij pulueris cochlearia trita commanducata, & super umbilicum posita oblitaque, intempestiuos & continuos uomitus mirè continet, quod si tanta concitatio stomachi in uomitu erit, ut contineri non possit, emicet ramulos tres uel quatuor cum malignanti succo teres, atque ad sorbendū dabis, continuo sedatur. Item mundatorium cholera & prouocatorium uentris: Epithymum decoques in aqua ad tertias, addesque mel, & facies simul feruere, & dabis bibere siue calidum siue frigidum. Itemque raphanum, lini semen ac piper si quis ieiunus manducet, fortissime bilem inhibet. Pulegium item commanducatum & in umbilico positum, mirè cholera sistit. Semen itidem malæ ex aqua calida ieiuno potui dabis, cholera nasci prohibet, & caput infundit. Ad restringendam cholera, cataplasma. Recipe apij seminis uncias duas, samfuci, myrrhæ, camomillæ, farinæ hordei, foenugræci, lini seminis ana uncias duas, aqua in qua radices euiscæ decoctæ fuerint, mellis uncias sex, olei tres, sapz tetartum, per singulas autem uices addesque mel, aquam, oleum, & sapam resolues & recoques. Cataplasmati uerò sabanum calidū impones, faciesque hoc triduo, & intermisso uno die, iterum triduo facies. Ad purgationem uentris & cholera deductiones: Mastice teres unc. l. & puluerem mittes in aquam frigidam, & dabis serò eunti dormitum. Ad biles reprimendas. Herba mercurialis coquitur, & in cibo cum sale & oleo datur, & cum aqua mulla bibitur; hoc & ægrotantem iuuat, si & aqua eius cum condito bibatur.

Cholera, quomodo succurritur.

Oliuæ ueterrimæ, pipere, coria mali, aceto decocta, oleum, acetum acerrimum, baccæ acrifoliæ, mororum de rubo succus, aqua marina, cydonia, piper, costum, baccas lauri, uinum, cymino, malagma facies, & adijcies uinum, & sic impones super umbilicum, & dabis ei ut bibat ex aqua calida. Pulegium syluaticum cōteres cum oleo græco, & dabis ut sorbeat. Hoc enim & uentrem soluit. Semen item anethi tritum admixta aqua potui datur. Polium herba cum aqua trita cholera sistit. Herbam centauriam in aqua decoques, & ex ea aqua per triduum cyathos tres dabis bibere. Itemque uitulinum finum recentem ex uino potui dabis, etiam melancholicos liberat. Tamarisci siue fellis terræ radices cōtusæ, & ex aqua mulla potui datæ, & deorsum & desursum purgabunt omnes bile, & postea toto anno bene ualebit. Pulegij pulueris cochlearia trita commanducata, & super umbilicum posita oblitaque, intempestiuos & continuos uomitus mirè continet, quod si tanta concitatio stomachi in uomitu erit, ut contineri non possit, emicet ramulos tres uel quatuor cum malignanti succo teres, atque ad sorbendū dabis, continuo sedatur. Item mundatorium cholera & prouocatorium uentris: Epithymum decoques in aqua ad tertias, addesque mel, & facies simul feruere, & dabis bibere siue calidum siue frigidum. Itemque raphanum, lini semen ac piper si quis ieiunus manducet, fortissime bilem inhibet. Pulegium item commanducatum & in umbilico positum, mirè cholera sistit. Semen itidem malæ ex aqua calida ieiuno potui dabis, cholera nasci prohibet, & caput infundit. Ad restringendam cholera, cataplasma. Recipe apij seminis uncias duas, samfuci, myrrhæ, camomillæ, farinæ hordei, foenugræci, lini seminis ana uncias duas, aqua in qua radices euiscæ decoctæ fuerint, mellis uncias sex, olei tres, sapz tetartum, per singulas autem uices addesque mel, aquam, oleum, & sapam resolues & recoques. Cataplasmati uerò sabanum calidū impones, faciesque hoc triduo, & intermisso uno die, iterum triduo facies. Ad purgationem uentris & cholera deductiones: Mastice teres unc. l. & puluerem mittes in aquam frigidam, & dabis serò eunti dormitum. Ad biles reprimendas. Herba mercurialis coquitur, & in cibo cum sale & oleo datur, & cum aqua mulla bibitur; hoc & ægrotantem iuuat, si & aqua eius cum condito bibatur.

Potione diuina, quod per se continet, & dicitur de piper.

Topica.

Una pasta, epithymi, uini, pulegij, & samfuci, myrrhæ, camomillæ, farinæ hordei, foenugræci, lini seminis ana uncias duas, aqua in qua radices euiscæ decoctæ fuerint, mellis uncias sex, olei tres, sapz tetartum, per singulas autem uices addesque mel, aquam, oleum, & sapam resolues & recoques. Cataplasmati uerò sabanum calidū impones, faciesque hoc triduo, & intermisso uno die, iterum triduo facies. Ad purgationem uentris & cholera deductiones: Mastice teres unc. l. & puluerem mittes in aquam frigidam, & dabis serò eunti dormitum. Ad biles reprimendas. Herba mercurialis coquitur, & in cibo cum sale & oleo datur, & cum aqua mulla bibitur; hoc & ægrotantem iuuat, si & aqua eius cum condito bibatur.

Sabanum.
& biles serò eunti dormitum.

Coeliacis sanandis. Cap. XXVI.

EX quibus coeliacum deprehendas, breuiter sit dictum, scilicet ex officio uentris per omnia turbantur. Nam nunc aspera uel alba uel indigesta, nunc sanguinolenta aut purulenta, atque inæqualia egerunt ægrotantis stercore, eodem die frequenter & parua, aut semel & coaceruata, attestante intellinorum rugini, cum inflatione & sonitu descendens cibi; quando ægrotantes pallore cutis, albida superficie, uiriū debilitate, macie corporis totius cum fœtore, pulsu crebro, parum imbecilli, unde & coeliacis dicti sunt apertæ passionis, qua tenentur. Venter enim patitur, quem Græci *κοιλίαν* appellant, quos ita curabis. Bulbos Aphricanos rubicundos contritos ex uino candenti ferro calefacto potui dabis, & sanabuntur. Colubus ex passo decoctus donec madescat, & in cibo datus, utilissime succurrit omnibus uitij. Oua ite in aceto macerantur, & coeliacis in cibo dantur. Ungula itidem porcina combusta, & in cinerem re-

Coeliacis notæ, & proutis
unde dicitur.

recidia.

D Y S E N T E R I A M deprehendes à stercoreum qualitate, aut macilenta, uel pinguibus humo obrita, aut cumrafura intestinorum, nunc purulenta, nunc sanguinolenta: ita uerò curatur. Hoc cum fale eduntur. Per se bulbi triti dantur, & in uino austero potio miscetur. Cœlesti aqua co-
oñimum in cibo datur. Ruta cum caseo teritur in uino in modum mereri, & ita editur. Cera re-
in porione datur: Puluis fit ex alica rosta prius quam detur in quem subigitur cera remissa. In-
utur sarmenta in quibus acini uuarum hærent: & acinorum lapilli comburuntur, eorumque cinere
gitur. Succus pampinorum & uitium clysterio immittatur. Cydonia matura cruda eduntur. Myr-
tinis pondus den. in uino propina. Vinum in quo folia myrti discosta sint potui datur. Galla
commagina comburitur, cinis eius extinguitur uino, illinitur uentri hoc & ad cœliacos facit. Flos
ra tritus, & tribus digitis sumptus in uino austero, bis in die bibitur. Ryborum in quibus mora
untur, cauliculi decoquuntur in uino austero, & per se eduntur. Lutea ouorum tria, lardi ueteris
mnae tres, mellis totidem, uini cyathi tres unà conteruntur, & in nucis auellanae magnitudine ex aqua
dantur.

dantur. Rubi radices bene lotas mittes in ollam nouam fictilem & aque sext. unum, & decoques ad tertias, deinde supermittes aceti acri heminam unam, & iterum feruere facies ad tertias, ut nigrum fiat, & dabis ieiuno pusillum. Nā si plus dederis, uentri non facit. Muscum qui in tegulis nascitur, conteres in puluerem, & in uini picati, id est nigri ieiuno dabis, eadem hora claudit uentrem. Nam si febricitat, ex aqua calida bibat. Pini arboris corticem in aqua decoques, & ex ea aqua dysentericis dabis; hoc & coeliacis prodest, qui similiter uexantur. Styracem, guttam ammoniacam, specularia combusta pari portione, ac piperis grana in uini portione dabis bibere. Si uero uenter ei torquetur, betz radices ex oleo coques, & dabis ei ipsum oleum bibere. Semperuiue maioris succi cyathos quatuor in uini cyatho uno potui dabis: hoc enim dysentericos & coeliacos & lumbricos habentes curat. Corticem agrifolij interiorum & exteriorum rades & mittes in cacabum nouum, & pones super carbones, non ut comburatur, sed ut tostetur; dein teratur, & dabis cochlear plenum febricitanti cum aqua calida, sanis uero in uino styptico, & stringit misce. Cochleam maiorem que comeditur, assabis, ita ut testam semiustam primum mittas in mortarium, deinde carnem ustam simul in puluerem rediges, & ex eo dabis cochlear plenum in uino calido: uel si minus edax fuerit, dimidium dabis. Pruna agrestia, gallam, masticam, thus masculum, myrrham, piper & flores rosæ ex uino styptico propinabis. Costum, styracem, oryzam, panem Aphrum, masticam, malignanati folia, ficus, testam oui, omnia tundes & dabis puluerem in ouo sorbili, aut in uino mane & uespere. Corticem arboris mori interiorum teneram rades, & cum uino nigro coques in pultario nouo donec excoquatur, & ex eo dabis cochlearia trita mane & sero. Glandis item rubeæ grana tredécim, piperis quinque, simul teres cum uino ueteri, & dabis tribus matutinis. Si quis in folio postquam sudauerit olei spā si potest heminam, si non, uel potionem unam bibat, curatur: tanto autem melius sentiet, quanto plus biberit; lauet uero secundum consuetudinem. Item balaustium, gallam, pumicem, geras, tyrias & locustas asperas testas: omnia æquis ponderibus teres & cribrabis. Dabis uero ex eo mane & sero, cochlearia singula si non febricitat, cum uino mixtum, febricitantibus uero in aqua calida. Naxum fullonum teres diligenter, & dabis in uino uel ouo uel aqua calida mane & sero. Cauliculū malignanati, quos Græci sydia uocant, prima die teres numero quinque, & piperis grana undecim in mortario fictili, & mittes uini potionem in calicem minorem, ex quo perfundes ferrum candens, & sic miscebis puluerem, & dabis bibere. Secunda uero die cauliculos sex, & piperis grana XV. Vñ quæ ex se in uite fuerit arefacta, teres cū diligētia, tritamque in uino ueteri dabis bibere, ita ut in uino panem intingat, & sic sumat, & post ipsam potionem bibat. Fabas solidas franges, & macerabis in aceto acri, & dabis manducare ieiuno quantum potest. Oua cruda frāges, & mittes in patellam rudem, & malignanati puluerem, gallarumque pari portione admiscebis & coques, & cum aceto acri dabis bibere. Iniectio ad dysentericos. Recipe pumicis combustæ unc. unam, gallæ asianæ unam, balani barbarici unde coria conficiuntur unam, geræ, tyriæ unam. Hæc omnia tundes & cribrabis, & hinc plenū cochlear mittes in mortario, atque addes imaginati un. tres, hoc est uini austeri, in quo cocta sunt hæc, myrti & rubi fasciculi singuli, corium malignanati & lentis manus plena, sed & seorsum decoques succum oryzzæ cū seuo urfino & colabis; hinc mittes unc. unam & semis, & simul miscebis: prius autem reficiat, & sic iniiciatur tepidum; & teneat uero quantum potest. Alia iniectio. Coques ex aqua lentem myrtum, & corticem malignanati, cymas rubi, corticem roboris, & lentisci modicum, pro oleo uero seuum caprinum in aqua coques, & sic iniicies: quod si in uase fuerit, ex uino mittes quo accipiat. Alia. Cymarum rubi fasciculum unum, lentis manum plenam, oryzzæ tantundem, & corticis malignanati duos: coques in olla noua in aquæ sextariis duobus, donec succus fiat, quē colabis per linteum diligenter, ut sit uel tertia pars sextarij; deinde teres mollissimè gallam Alexandrinā unam, mittesque ouum unum, & olei unciam unam, salisque cochlearia duo, miscebis succum & iniicies: prima uero die tantum salem mittes. Collyrium ad dysentericos qui sanguinem faciunt. Recipe thus masculi unciam unam, myrrhæ unam, opij unam, quæ teres in mortario diligenter, addita paulatim aqua, donec se in modum collyrij colligat, & facies collyria diuersa pro ætatibus, quæ in necessitate cum oleo rosato suppones. Collyrium dysentericum, quod recipit drachmas quatuor, opij, quatuor, myrrhæ, & libani quatuor, succum arnoglossæ ac uinum amineum. Collyrium hypoticon. Recipe opij unciam unam, acaciæ unam, myrrhæ unam, croci semiunc. colligas cum amphacij melle. Collyrium hypoticon laudatum, ad quod, crocum, libanum, opium equali pondere teres, & cum succo arnoglossæ colliges. Hypoticon gorgon, hoc est agile, facit ad eos qui conationes patiuntur & antiquas passiones. Recipe cydon drach. quatuor, libani quatuor, acaciæ quatuor, opij quatuor, cum succo lactucæ colliges. Troiscus dysentericis. Recipe albesci drach. XXIII. asphalti XVI. sandaracæ XVI. arsenicæ XII. gallæ pulueris nouem, succi arnoglossæ quantum sufficit. Picem liquidam & refinam, oleumque uetus & ceram: omnia mittes modicum in acetabulum, & resolues ad carbones, ut fiat quasi cerotum molle, & ex eo unges & renes, appositis hinc inde floccis lanæ & fascijs; sed intinges modicū lanæ in ipso acetabulo, & iniicies in intestina, ita ut quoties uentrem fecerit, aliud mittes, Troisci confectio probatissimi. Recipe lepidi Cypris denarios octodecim, hypocisci octodecim, styptici unc. unam, sandaracæ unam, croci magnati unā, opij unam, salis ammoniaci den. sex, eptemaci Cretici quantum sufficit ad coagulanda pigmenta. Quæ omnia diligenter teres & cribrabis, ut puluerem facias; & postea tantum passum mittes, ut constringat, non ut liquefaciat, & facias troiscos habentes den. tres, & singulos iniicies; & si rasuras aut saniem facit, primū de aqua oliuarum iniicies, & postea de troisco: coques quoque cymas de rubo cum cortice malignanati, & oryzzæ pugillo, & myrti: quæ si non fuerit, buxum mittes: & coques omnia hæc in uino styptico, do-

nec de tribus partibus due remaneant, & mittes in mortario quantum porio esse potest, & sic solues troscum. Si autem puram aquam facit uenter, non iniicies de aqua oliuarum, sed tantum de troscum. Ad dolorem & conationem cum pondere, facies fomentum sic. Foenugrecum bullies in aqua & inde fouebis. Iniicies butyrum, & mel, & oleum, & modicum salem, & exinde curabis. Item troscum dysentericis, & ad eos quibus uenter sanguinem facit. Recipe iusquiami seminis unc. unam, apij seminis unam, balauftij unam, acacie unam, amei unam, agantis Aegyptie unam, uulgace seminis unam, roris Syriaci unam, opij Thebaici seminum, mandragorae radices drach. II. gerat Tyriae semiunc. quae omnia colliges cum aqua, & facies troscos habentes drachmam dimidiam, & dabis bibere ei qui non febricitat cum uino: febricitantibus uero in aqua calida manent. Troscum ad eos qui sanguinem faciunt cum conatione uel rosura uel corruptela. Recipe sandarace pontice uncias octo, arsenici masculi quatuor, acacie rubeae libram unam, calcis uiuae unam, quae omnia singillatim tundes & cribrabis, miscebisque in mortario cum uino ueteri austero, in quo cocta sint haec: Myrtus uiridis, rosa sicca, cortices maligranati, cymae rubi & buxus, tantumque mittes uini, ut ad spissitudinem redigatur: & cum coeperit siccari, facies troscos pro statibus habentes denarios octo, uel senos seu quaternos, quos siccabis in umbra & repones, & uteris sic: Primum iniicias, aqua de oliuis uel Aphra muria spissa in modum heminae dimidiae tepescit, ablues intestinum mane & sero de troscum, curabis. Sufficit autem semel abluere intestinum, troscum uero quotidie iniicies cum summate, id est in uino in quo herbae superscriptae sunt coctae. Potionem hanc dabis quibus sanguis multum fluit, quod si dolor aut conatio multa fuerit, cum succo oryzae uel lenticulae iniiciatur. Accipiat uero potionem de troscum, qui diasparmaton uocatur quotidie sero. Iniectione ad dysentericos. Recipe rubi cymulas, testas maligranati, uinum stypticum, addes acaciae, & seuum hircinum colatum ad modum potionis, tenendum diutissime. Troscum ad dysentericos. Recipe licij Indici unciam unam, quam solues in uino styptico, gallae Alexandrinae unam, & sulphur uiuum, sandarace unam & semis, quae tundes & cribrabis, calcis uiuae quatuor, & auripigmenti, quae similiter tundes & cribrabis, opij Thebaici semiunciam infundes in uino Aphro styptico, & tunc in mortario omnia permiscebis, & facies troscos quos sic iniicies: teres troscum in mortario mundo, & mittes uini Aphri quasi calicem bonum, & sic curabis. Troscum ad haec. Balauftij semiunciam, gallae similiter, croci similiter, styracis similiter, myrrhae filiquas nouem, castorij tres, capsilaginis seminis, quod est iusquiami filiquas octodecim, apij seminis semiunciam, opij filiquas octo, anisi semiunciam, dauci similiter, aquae quantum sufficit, facies troscos habentes filiquas tres. Cataplasma ad dysentericos. Recipe corticem maligranati, rosam, myrtum, polentam, masticam, gallas, aloem, quae omnia in sapa coques, & impones. Panem pulueris Aphri & foenugreci in melle & aceto coques, & in uentrem ac renes pones. Ad idem, cataplasma & ad intestini dolorem. Dactylos in uino ueteri infusos cum pane Aphro & modico croco teres, & in capite intestini pones. Dactylos infundes in melle, & mittes uinum uetus uel acetum acerrimum cum passo in cacabum, quod cum ferbuerit, mittes dactylos tritos, & puluerem panis Aphri, parum etiam farinae hordei; sed & puluerem maligranati, gallae Alexandrinae, myrrhae masculae, mannae quae uenditur a pigmentariis, & cum factum fuerit cataplasma, unges oleo lentiscino, & pones ex utraque parte. Sane antequam ad carnem ponas cataplasma, asperges super illam masticam trita, ex oleo lentiscino unges. Balauftium, item rosam siccam, rorem Syriacum, maligranata sicca in uino austero, uase nouo feruescunt, & ibi solues troscum uel puluerem ad iniiciendum. Cataplasma ad idem in modum epithymi. Gallas Alexandrinas, corticem maligranati, acacias, myrtum, myrrham & masticam teres & cribrabis. Cydonia cruda intrinsecus tantum purgata quam molliissime teres, & commiscens puluerem uinum rursus teres, addens paulatim acetum, donec simile sit epithymo; mittes etiam parum olei rosacei uel myrtini cum aceto modico, & quasi epithyma sit, & pones ad umbilicum, & ita deorsum ad renes. Cataplasma ad eadem. Malorum granatorum coria & galles decoquuntur ex uino; deinde si mollia fuerint simul teruntur; quibus adiunguntur omphacium, hypocistis, & acacia rufa; sed ex aqua infunditur pridie, eis ros coriariis & alumen scissum, utraque tusa & cribrata; miscenturque ceroto ex myrtino oleo facto. Epithyma, scilicet chlydion, quod facit ad dysentericos & coeliacos. Recipe acacie unciam unam, cyados unam, omphacij unam, tybani unam, balauftij unam, scylli unam, aloes unam, roris syriaci unam, myrrhae unam, cenanthe unam, rose siccae unam, ceræ uncias nouem, picis duas, olei myrtini unam. Fomentatio ad dysentericos. Oleastrum, tybula, myrrham, laurum, rosmarinum, cypressum equali pondere decoques. Epithyma ad dysentericos. Recipe cenanthis unciam unam, fidios similiter, aloes quatuor, omphacij unam, omphaticon unam, rose unam, acacie lib. unam, olei myrtini unam, picis unciam unam. Epithyma ad dysentericos bonum. Recipe myrrhae unc. unam, seminis myrti & thuris unam, galles unam, roris syriaci unam, acacie unam, balauftij unam, tydie semiunciam, aloes unam, bdellij unam, cenanthis unam, croci semiunciam, cymarum rubi duas, masticæ aphre semiunc. cimini similiter, apij seminis similiter, olei lentisci lib. unam & semis, ceræ octo, dactylos undecim, uini quantum sufficiat. Si uero lentiscinum oleum non habuerit, myrtinum mittes aut melinum. Epithyma item ad dysentericos. Recipe thuris unciam unam, myrrhae unam & semis, masticæ unam, absinthij unam, balauftie unam, galles quatuor, cimini unam, apij seminis unam, rubi unam, croci duas, spicenardi duas, olei lentisci lib. unam, ceræ unam, terebinthine unam. Fomentum. Gallas alexandrinas, tydias, myrtum, buxum, rosam siccam, & lentem alexandrinam simul in aqua coques, & super ipsam aquam sedebis. Vinum itidem Cilicense coques cum absinthij herba, & fouebis spongia. Cataplasma ad dysentericos explorata. Recipe

cipe galleg unciam unam, opij drachmas quatuor, tundes gallas acteres, & permiscebis cum lachryma oui, & ex eo facies catapotia in modum latholi, & dabis secundum vires accipientis. Item ad dysentericos, & ad omnes dolores & rofurās uentris. Anisi drachmas duas, iusquam quatuor, apij feminis quatuor, florum rosarum quatuor, hypocisti doscilo duas, croci unam, opij similiter, myrrhaz similiter, opium uero & hypocistium infundes in aqua, & omnia sicca tusa & cribrata permiscebis sufficienti melle, & colliges ad spissitudinem epithymi. Epithyma ad dysentericos & ad coeliacos. Recipe acaciaz unciam unam, cicido & omphacidis unam, balausti unam, cidon totas similiter, ceraz drachmas sex, rōdion libram unam, dactylo-
rum pinguum lib. unam; dactylos uero uino infundes, & simul teres. Epithyma caldion ad dysenteria. Recipe cidon unc. quatuor, styptiriz similiter, sydion rosas quatuor, roris syriaci quatuor, hypocisti do-
scilo unam, ammoniaci unam, picis lib. unam & semis, olei myrtini un. quatuor, uini parum. Epithyma ad dysentericos, quod dicitur didion. Recipe acaciaz unc. IIII. cidon rosas quatuor, roris syriaci IIII. hypocisti doscilo unam, ammoniaci unam, picis lib. unam & drach. IIII. ceraz quatuor, olei myrtini unc. IIII. uini stimmatici duas; induces autem linteos, & impones uentri usque ad umbilicum & retro. Epi-
thyma ad dysentericos. Recipe myrrhaz drac. IIII. cochlearum uiginti, carnes, oleum cyprinum purum, album ouorum septem, aceti acris quantum sufficiat. Herbam portaglam ex aqua feruefacies, & iterum radicata aqua condies, & aspersam polenta offas complures dabis edere, quia mire curat. Picem item uin-
ginem tufam in cacabo impones renibus.

Dysenteria & lienteria subueniende. Cap. X X I X.

V T R E M uetustissimum ficcum non putrem combures, & in puluerem rediges, & seruabis di-
ligenter, & ex ipso pleno cochlearia sex, radices ebuli pul. cochlear. V. speculatis costi & triri cochlearia
tria, solia quinque, piperis albi tria. Hæc omnia trita & cribrata in unum miscebis, & exinde cochlear ple-
num in uino styptico dabis: si non inhæres uino styptico, cortices de piro tolles pondo decem, & mittes
in stagnum uas grande, & cum ipsis uini sextarios uiginti, & coques ad dimidias. Cum uero refrigeret,
mittes in uas mundum ex ipso uino & uteris, & cum potionibus accipies. quod si antiquus est languor, &
sanguinem abundantem egerat infirmus, duo cochlearia mittes in potionem uini calidi, sæpiusque uta-
tur, & in solio ipsam potionem bibat, & unctiōne prædicti calastici utatur. Manducet autem oryzam cum
manu plena plātiginis benzæ costæ, & cum seuo caprino ibidem misso, & exiguo salis, anethum & porrū.
Oleum ante omnia nō manducet; assaturas caprinas peraffas manducet, & ficutum ipsius assum, pedes dis-
cortos cum paruo sale comedat, non cum aceto: & omnia interanea caprina calida cum prædicto uino mi-
xta bibat. Curat enim, & si escam quam manducauerit, emittat, quod ipsum dicitur lienteria.

Coli dolor quibus remedijs iuuetur. Cap. X X X.

F I M V M leonis diligenter colliges, & ficcabis ad solem & seruabis, quia difficile inuenitur, mit-
tesque ex ipsius fini puluere cochlearia quinque, petroselini puluere cochlearia quinque, zinziberis, co-
sti, & piperis albi cochlearia tria, & oīa cribrata cōmiscebis, & exinde cochlear plenum ieiuno in potione
conditi tepidi dabis in hyeme, in æstate uero in ueteri uino. Si autem antiqua passio est, duo cochlearia in
folio dabis. & hoc per triduum facies, unges uero uentrem & sub umbilico de superscripto calastico, &
si grauis dolor imminet amplius, pone ungenti & super lanam & fascias. obseruet quoque ne algeat, & re-
centia non bibat, nec carnes uel holera seu legumina manducet, quia passio pessima est. Si autem repē-
tinus dolor aduenerit, & prædicta potio parata non fuerit, purgabis alij accerrimi capita quinque, & con-
cides minutatim, & mittes in antipullam cum olei gremialis hemina, & macerabis die ac nocte, & ex ipso bi-
bat oleo cochlearia tria, in cibo etiam pro oleo utatur. Si uero in folio balnei prædictum oleum biberit,
plurimum prodest. Potio ad coli dolorem, seu ad calculum, quæ in una potione coli dolorem in perpe-
tuo liberet. Recipe folij, spicz nardi, piperis albi, apij feminis, opij Cretici, sisseleos, zinziberis, pulegij,
thymi, cassiæ fistulæ, satureiæ, reupontici ana uncias singulas, piperis lōgi quatuor, pyrethri duas, ireos se-
miunciam, petroselini unciam unam, & denarium, leuistici denarios octo, croci quatuor, erucz semiunciam,
costi denarios sex, scœnugræci semiunciam. Hæc omnia tundes & subtiliter cribrabis, & in uase uitreo re-
condes, & ex ipso puluere cochlearia tria in condito siue careno, in folio mox ut descenderit, dabis, & diu
in folio foueatur, & in perpetuum liberabitur. Potio ad colum. Recipe rutæ agrestis feminis semi-
unciam, gentianæ uncias nouem, cametriz lib. unam & semis, aristolochiæ rotundæ uncias nouem; quibus
alij medici addebant squinæti tres, petroselini tres, camepetij tres. Hæc omnia tusa in mollissimum pul-
uerem repones, dum opus fuerit, dabis cochlear plenum in aqua calida. Piperis uncias tres, salis mō-
tani unam, petroselini acitonici duas: omnia in puluerem rediges, & in uino cochlear plenum. Hysopi
Cretici semiunciam, feminis scœniculi similiter, piperis albi similiter, petroselini similiter, cymini similiter,
salis montani similiter, anisi similiter, apij feminis similiter: omnia teres, dabis in dolore cochlear plenum sa-
lis in uino uel condito, febricitantibus uero in aqua calida. Prædie Idus Martias, uiolez purpureæ folia
undecim, piperis grana decem, uini ueteris calicem plenum teres in mortario marmoreo, & mittes in cali-
cem ipso die, & pones sub diuo coopertum testa diligenter, ut ibi maneat, & alia die manē ibi agitabis &
mittes in calicem herinum, stans contra orientem, & uno haustu bibat. Item expertum. Cochleas

tres, quas Græci uocant corcotellas, in olla noua claufas & circumdatas, in furno combures, quarum puluerem in uino aut ubi uolueris dabis. Tria grana alij infundes aliquantisper in aqua, deinde ex condito glutienda dabis. Enema ad colum, quod appellatur diacastoreum. Recipe reupontici fici unciam unam, croci aphri unam, nitri albi semiunciam, rutæ uiridis folia trita, fimiliter mellis quantum fufficit. Conficitur autem fic. Myrrha & caftoreum feorfum teruntur, feorfum & nitrum, fimiliter & ruta. Crocū uerò infundes in uino ueteri tanto ut infundatur, non ut fupernatet, teresque in mortario. Opium uerò cū melle teres, donec foluatur, & fic commifcebis fingula, quouſque omnia adimentur, & ſuperaddes mel, ita ut ad ſpiffitudinem redigatur, reponesque in uafe uitreo, uteris autem fic. Primum cū dolor ceciderit dolor, intermittendum eſt. Si uerò manſerit contra noctem, iniicitur fic. Olei rutacei ſex in acetabulo tepefacies, medicamenti uerò in modū fabæ Cappadociæ, uel paulò amplius ſeorfum in calice ſolues cum uini ueteris cochleari, & oleum tepefactum ſecundum modum æſtimationis miſcebis, & iniicies: hoc autem & dolores tollit, & ſomnum facit. Obſeruare uerò debes, ne modum quantitatis excedas. Soler autem plus iniectū, grauedinem nimiam capiti afferre, quā quidem celeriter ceſſat. Enema ad idem, quod appellatur dyargo piſſum. Recipe aloes hepatici uncias duas, opij ſpani unam; butyri recentis unam, peculæ uiuæ ſyncetæ ſex. Conſicies autem fic: Aloen in puluerem rediges, opium cum peculæ teres, donec ſoluatur, addes aloem; & cum illa terēdo miſcueris, mittes butyrum, & rurius illud ſimul teres, & hæc omnia permixta colliges in uafe æreo, & uteris fic. Si refrigerari paſſionem contigerit, primum clyſtere inteſtinum purgabis, quod accipit oleum rutaceum & mel & butyrum, & hæc calidā; dehinc de medicamento ſupraſcripto ita curabis, ut prius cyminum & rutam uiridem in oleo & aloē ſine ſale tandiu coquas, donec rutæ frigere incipiat, quod colatum ac tepefactum, mittes in acetabulum in modum portionis bonæ; & uel certè uncias ſex, & medicamenti quantum pars tertia cochlearis eſt, in ipſo à digito ſolues, & ſuper calida pones, ut tepeſcat, & ſic uteris. Facit præterea ad eos, qui propter colicum confluxum uentrem patiuntur: tollit & libidinem inteſtini. Si autem & choleribus color fuerit, medicamentum oleo roſeo locum iniicito. Enema ad colum, probatiſſimum, ſed in nimio non iniicies dolore. Recipe cymini hemina, unam, cætauriæ faſciculos tres, amei ſemiunciam, folia lauri numero quindecim, colocynthidos unam. Hæc in aquæ ſextarijs tribus decoques ad tertias, colabisque, & cum oleo ac modico melle iniicies. Nam herbas ſupraſcriptas pridie infundes. Enema ad dorē coli. Recipe opij denarios octodecim, caſtorei quintundes & cribrabis, & colliges cum melle: & cum opus fuerit, in modum auellanz ſolues cum aqua frigida, adiungēs anethini olei uncias ſex, & butyri cochlear unum, admiſcebis & curabis. Enema ad hæc. Recipe baccarum lauri pulueris uncias duodecim, ceræ puniceæ ſex, butyri ſex, medullæ ceruinæ ſex, adipis anſerini ſex, terebinthinæ ſex, hyſopi, ceroti ſex: hæc omnia commiſcebis, & factas pillulas ſiccabis in umbra, & cum neceſſe fuerit, teres in oleo ſauinenſi ſufficiente unā pillulā, & curabis. Ad coli dorē, & qualiter ad inteſtini dorē, cuiusque uitium, medicamentum conficere debeas. Recipe adipis anſerini, adipis phaſianorum, hyſopi, ceroti, butyri, terebinthinæ ac ceræ anæ uncias ſex, reſolues, & ex eo mittes uncias ſex; addes galbani quatuor, cymini bene tuſi & cribrati ſex, bacce lauri tuſæ ac cribrate duodecim, folio rum rutæ bene tritorum decem. Hæc omnia cum ſupraſcriptis ſex uncijs bene commiſcebis & facies māſticē, de collyrio in modum nucis auellanz ſolues, & heminam facies, curabisque. Conſectio medicaminis ad dorē coli. Recipe adipis anſerini unciam unam, baſilicon ſemiunciam, butyri unam, olei ſauinenſis quatuor. Conſicies autem fic. Infundes cymini cochlear unum in uino ueteri, dehinc mittes oleum cum rutæ uiridis ſemiuncia, & uini ueteris cotyla, & ſeruafacies, donec ruta exfrigi incipiat, colabisque, & repones in uafe uitreo: & cum neceſſe fuerit, penſabis ex ipſo oleo uncias quatuor, & miſcebis cum medicamentis ſupraſcriptis, & curabis. Enema ad dorē coli. Recipe myrrhæ drachmas quatuor, croci duas, opij ſex, caſtorij ſex, commiſcebis melle in doliolo, & curabis. Enema ad dorē coli. Recipe myrrhæ drachmas quatuor, croci duas, opij ſex, caſtorij ſex, nitri duas, rutæ uiridis foliorum duas, commiſcebis melle in doliolo, & curabis cum oleo rutaceo. Olei conſectio ad dorē coli. Recipe olei ſauinenſis libras decem, butyri recentis uncias quatuor, medullæ ceruinæ duas, ceræ puniceæ optime duas, fœnugræci noui ſextarium unum, cymini unum, baccas lauri purgatas numero quinquaginta, aquæ fontanæ ſextarios duos, rutæ uiridis faſciculos tres, adipis phaſiani recentis uncias duas; fœnugræci uerò infundes in aqua, tātum ut intumeſcat, quod legatum legabis in linteolis tribus, & cyminum ſimiliter. Poſtea oīa mittes in cacabū nouum, uel in ſtagnatū optimū, & tandiu ſerueat in uafe duplici, donec decoquatur aqua; dein colabis oleum, & ceram rades cultello minutiffimè, ſimiliter & medullam, mittes & butyrum cum ſupraſcriptis in cacabum, & ſupermittes oleum calidum quod colasti, & agitabis diligenter, donec omnia miſceantur, & dum refrigerit repones in uafe uitreo, & in neceſſitate duas uel tres uncias conſectas iniicies. Enema probatiſſimum ad colum. Recipe opopanax radiciſ unc. duas, ariſtolochiæ rotundæ unā & ſemis, ſeminis ſymphoniæ duas, caſtorij unā, & ſemis, opij unā, folij duas, piperis albi unā & ſemis, croci duas: quæ omnia in puluerem rediges molliſſimum, & ſic iniicies in olei ſauinenſis hemina, cymini manum plenā & rutæ faſciculum coques in uafe duplici, & ex hoc oleo mittes cygnos tres, & de puluere unum, & diligenter temperabis, & iniicies. † Iniectio probatiſſima. Recipe opij drachmas ſex, caſtorij quatuor, myrrhæ quatuor, croci unā, nitri duas, ſeminis rutæ agreſtis duas, euſorbij duas, quæ cola

Ad my. dolorem, m.
Sunda.

louis, petro, elmo, xixibet,
piper, cora, vna, vni. aligaz
male, fua, stia nadi, ap, fone
ole, pulgum, thym, coraria
ma, compans, perrita, ius,
corus, orita, co, fone, fongu
fmes, gentiana, f, amaris
f, amaris, f, amaris
ma, f, amaris, f, amaris
ma, f, amaris, f, amaris
ma, f, amaris, f, amaris
ma, f, amaris, f, amaris

confusus ventr.
lucis infirmi.

+ en vacier, resp
dracinas

+ mag. Lilia, s. colonia.

உயிர் & நலம்.

O. si confectio ad dolorem
cap.

 $+ \gamma f'$

liges cum melle spisso, & diligenter in doliolo uitreo repones: & cum opus fuerit, solues ex eo in modum auellanz paruz cum aqua modico, & miscebis olei anethini uncias sex, & butyri cochlear plenum, ac cymini similiter, mixtisque omnibus diligenter iniicies. Iniectione dolorem tollat. Recipe castorij uncias quatuor, croci unam, nitri duas, seminis rutæ agrestis duas, euforbij duas, quibus cum mellectis, mittes olei anethini denarios sex. Ad colum & intestini dolorem. Recipe opij denarios quinque, croci duos, castorij duos, myrrhæ duos, rutæ duos, uetri tres, mellis despumati quod sufficit; postea cochlear unum in portione olei cyprini uel rutacei solues, & iniicies. Si autem uistura fuerit, cum oleo rosato temperabis. Iniectione ad colum probatissima. Recipe allij capita tria, rutæ uiridis fasciculos plena manu duos, olei cōmunis unc. quatuor; confringes allium, & cum ruta uiridi confricabis, & colato oleo addes butyri mundi libram unam, picis liquidæ uncias quatuor & semis, & cetræ mundæ tres: quæ omnia commiscebis, & uase uitreo repones, subducesque prius uentrem simplici iniectione, dehinc in oleum commune unc. nouem mittes medicaminis: & si dolor maior fuerit, commiscebis, & tepefactum iniicies. Sane nullus ieiunus iniectione utatur, quinetiam ad horam iniectionis calix plenus uino mixtus uel aqua calida haberiendus est. Iniectionem uero quam diutissime teneat. Medetur autem renum dolori, calculo qui habet renam proijcit, colicis, stomatis, & perfricationibus, causis etiam matricis efficacissime subuenit, in catarrhico utenda. Qualiter ex medicamento hoc, quod colum curat, sit adhibenda, ut & uentrem temperet. Ex hoc medicamine facies pilulas in modum nucis auellanz duas uel tres, & postquam laueris ac deterferis in capite intestini intro mittes, & ibi dormiturum, & continuo senties beneficium. Quemadmodum alio genere curandum sit colum, de hoc medicamine mittes in acetabulum uncias duas uel tres: ro & nocte, continuis diebus quatuor uel quinque, & accipies perpetuam sanitatem. Confectio Discrepantiæ ad colum probatissima. Recipe ueretra porcorum cum pinguedine sua in oleo soluta ad libram unam, follia rutæ septem den. purgati allij mundi spicas maiores quinque, olei cyprini libram unam, olei irini unam, nardi unam, adipis paltæ sine phasiani unam, ceræ punice unam. Cōficies uero sic. Confringes pinguedinem porcorum minutatim, & sic coques cum citius soluat, & sic colabis, & mittes in patellam, supermittens rutam & allium, donec ruta exarescat; rursum colabis, & sic miscebis reliqua omnia: iterumque impones super carbones molles, & mittes ceram minutatim ut soluat, quod cum gelauerit, colliges in doliolo uel pyxide. Sic autem temperabis. Olei sauinensis pondo unum uel duo, mittes in capetam cum rutæ fasciculo bono, & cymini in linteo ligati den. tres, & simul ferueat, donec ruta sicce tur, hinc mittes cignos quinque, nardi boni duos, adipis paltarum unum, plenum medicaminis suprascripti, cignumque dimidium cōmiscebis, calefacies & curabis. Iniectione discrepantiæ ad colum. Recipe adipis ceruini unc. septem, adipis taurini septem, picis liquidæ septem, olei irini septem, laurini olei quatuor, nardini libram unam, olei ueteris duas, ceræ nouem, rutæ uiridis fasciculum quantum manus capit, anethi similiter, allij purgati sextarium unum, cymini unum. Cyminum uero, rutam & anethum in oleo coques, usque dum uirtutem ibidem amittat, & postea colabis. Confectio iniectionis. Recipe rutæ uiridis uncias duas, baccarum lauri decem, cymini denarios uiginti, butyri insulsi unciam unam, medullæ ceruinæ, basilicon unciam unam, dyacilon unam, olei cyparæi libras duas, aquæ manum plenam. Cyminum uero, rutam & lauri baccas pridie in oleo infundes, alio die coques, colabis, & ita butyrum, medullam & medicamina mittes, resoluesque ita ne comburas, & uteris. Emplastrum colicæ & nephreticæ. Recipe lybani uncias sex, sinaperi sex, mastice tres, tyles tres, picis liquidæ libram unam & semis, picis ficæ unam, ceræ unam, nitri uncias sex. Iniectione ad inflationem coli, matricis & omnium interaneorum. Rutam ex oleo & butyro decoques, quod iniectionem statim inungat. His aliqui addunt oleum anethinum & adipem phasianinum & auferinum, & si habuerint, strutioninum. Iniectione ad colum & renes. In oleo anethino adipem auferinum & medullam ceruinam simul solues a digito, & commiscebis castorij bene triti denarium unum, & sic iniicies. Confectio pulueris probatissimi ad coli dolorem. Recipe folij uncias duas, croci duas, dauci cretici duas, panacis radices tres, aristolochiæ rotundæ duas, iuliquami duas, piperis albi unam, castorij duas, opij duas, myrrhæ duas. Hæc omnia tundes & cribrabis subtilissime: curabis uero primo de cucurbitella agresti & centauria sic. Mittes unam cucurbitellam & parum centauriæ in cacabum zream cum aquæ sextario uno, & decoques ad medias, & in colatâ calida cum oleo rutaceo & melle despumato, & modico nitro uel aphronitro commiscebis, & sic curabis, circa horam nonam ut uentrem faciat, uespere uero mittes in mortarium cochlear unum de puluere cum oleo rutaceo quantum est, & commixtum iniicies, quod teneat usque ad lucem uel amplius. Confectio pulueris ad coli dolorem. Recipe folij uncias duas, panacis radices tres, iuliquami duas, dauci cretici duas, castorij duas, croci duas, opij unam & semis, piperis albi similiter, aristolochiæ rotundæ uncias duas, coques uero rutam in oleo, & colabis: mittesque unum cochlear cymini triti, & unum cochlear ipsius pulueris, & sic iniicies, ut habeat olei cignos tres aut quatuor, sed tunc curabis quando in dolore est. Item experitum. Spicam allij mundatam unge ex omni parte, subscindes & balsamo intinctam iniicies. Epithyma calefactorium ad colum. Recipe axungie porcine libram unam, baccarum lauri quartatum, seu ceruini unciam, medullæ ceruinæ quatuor, refinæ terebinthinæ sex, nardi libram unam, solues & uteris. Epithyma ad dolorem coli. Butyrum, refinam, ceram, refinam punicam, & nitrum alexandrinum: omnia æquali pondere coques, & in panno pones ad locum doloris. Antidotum ad colicam. Recipe iuliquami drachmas uiginti, piperis albi uiginti, opij decem, balsami duas, cassiæ

C. PLINII SECVNDI

quatuor, croci quinque, euforbij quatuor, spicnardi quatuor, pyrethri quatuor, hircos quatuor, petroselinum decem, mellis Artici quantum sufficit, cum aquæ fontanæ calidæ cyathis tribus, dabis ad magnitudinem fabæ Aegyptiæ. Antidotum ad colicam. Recipe castorij unc. unā, asari foliorum unā, iulquami albi denarios uigintiunum, croci unc. unam & semis, mellis despumati sex, dabis ut fabam Aegyptiam in careno. Colicæ cui nihil deest. Recipe anisi drach. duas, foeniculi seminis duas, styracis duas, opij II. hæc omnia tusa & cribrata colliges melle non cocto, dabis magnitudine nucis ponticæ. Emplastrum ad phlegmata coagulata de intestinis resoluenda. Recipe ceræ lib. unam, ammoniaci unc. unam & semis, thuris similiter, terebinthinæ similiter, medullæ uirulinæ uncias tres, picis unam, adipis anserini semiunciam, galbani denarios sex, opopanacis sex, olei ueteris lib. unam uel quantum sufficit, factumque emplastrum linteo induces spisso, & impones circa umbilicum atque subter, ut non tangat stomachum.

Cap. Antidotum ad coli dolorem, & ad calculum, & ad stoffim. Lauri baccharum unciam unam, petroselinum unam, piperis unam, teres & cribrabis, & mellis despumati uncias sex admiscebis, & in dolio colliges, & facies apozima sic. Apij & foeniculi radices, rutam, pulegium sine fumo, brisæ radices, æqualia omnia coques in aqua ad tertias, & mittes potionem de antidoto cochlear plenum, & dabis ieiuno. Antidotum colicæ. Recipe anisi drachmas nouem, apij seminis sedecim, spicnardi sex, castorij quatuor, piperis albi sex, longi sex, myrrhæ octo, Iquinantij quatuor, petroselinum quinque, opij octo, croci quatuor, mellis quantum sufficit, dabisque mensura auellanæ maioris uespere, ut reijciat si potuerit. Antidotum colicæ expertum. Recipe myrrhæ drac. IIII. castorij quatuor, mormicariz duas, rutæ foliorum unā, opij sex, croci quatuor, mellis despumati quod sufficit, & dabis ad magnitudinem auellanæ maioris. Catarticum cum colicis. Recipe euforbij unc. unam, iris duas, mastice tres, dabis cochlear cum aqua calida. Enema ad colicam expertum, quo deponis & phlegmata. Recipe olei dulcis sextarios tres, quod mittes in stagnatum, rutæ uiridis fasciculos tres, foeniculi sicci fasciculum unum, alij purgati & contusi capita duo, sine nugræci manum plenam, ita ut pridie infundatur in aqua, & cum intumuerit, effusa aqua, granum cum oleo coquatur quandiu exsicetur: post hæc, colabis linteo, & iterum impones in foco, addesque ibidem adipem pullinum, anserinum, phasianinum, medullæ ceruinæ, & seni hircini parum, & laricis unc. unā & semis. post hæc colabis, & in dolio repones: & cum uti uolueris, mittes per singulas uices olei nardini cochlearia duo, & de enema sextarij partem quintam; sed prius sane uentrem curabis, cum enema acceperit, accipiat & per os. Oxyporium amaurenticon & pleum rutaceum sic facies. Rutæ uiridis libras duas, olei dulcis decem, coques in uase duplici tandiu, dum ruta palleat, & agitabis semper de ramo rutæ, postea colabis & repones in uase uitreo. Enema sic facies. Tolles olei nardini pondo duo, medullæ ceruinæ uncias quatuor, hyssopi ceroti tres, adipis anserini sex, adipis uirulini sex, butyri quatuor, castorij optimi duas, laricis duas: castorium uero tundes in pila fortiter, & sic permiscebis omnia, coquesque donec castorium quod tardius coquitur, soluatur. coques autem in uase duplici, & repones in uase stagnæ. Inijcies uero de medicamento hoc cochlearia tria, & olei rutacei cochlearia sex, permixtum & calefactum in uesica manē & sero, quod si adhuc dolor permaneat, inijcies meridie, manē & sero.

Intestini uulneribus, condylomatibus, uisuris, & rhagadibus succurrendis.

Cap. XXXI.

OLEVM

uetus, picem, pollinem decoquere oportet, ac quam calidissimum imponere. Folia rubi in quo mora nascuntur, cum cera & rosaceo sanant. Radices eiusdem rubi decoquantur ex uino ad tertias, eoque uino fouentur condylomata, & omnia sedis uicia. Araneas dempto capite pedibusque, & ita infrictas, optime sanat condylomata. Adeps quoque anserinus cum cerâ & rosaceo & cera pontica imponitur. Adeps cygni ad idem facit, & hæmorrhoidas sanat. Folij unc. unam, butyri egyptos unam, stypeos unam, cerâ unam, spumæ argenti unam, thuris unam, ceræ punice sex, adipis anserini sex, conficies sic: omnia pigmenta simul teres cum uino ueteri austro, sicut collyrium, postea solves cerâ ad pipem & oleum addes, miscebisque & uteris. Item ad intestini dolorem uel tumorem. Butyri uncias quatuor, & ceræ unam solves simul in carbonibus, deinde teres aphronitri candidi unc. quinque, mittesque simul & agitabis, donec misceatur, & cum gelauerit, facies quasi collyrium, ut cum opus fuerit paratum sit.

Item iniectio ad rigorem intestini. Aqua euisæ, foenugræci, meliloti simul coctorum, bene spissa. Item in oleum dulce mittes cyminum, anethum, & rutam, coquesque & mittes ibidem dyacilon & adipem anseris, similiterque phasianum, butyri etiam quantum estimas sufficere, miscebisque cum aqua supra scripta & uteris. Iniectio calidior in olei dulcis sextarios duos, mittes rutæ fascies duos, cymini pinguos duos, meliloti fascem unum, anethi tres, styracis lib. unam, admiscebis uini ueteris quantum possit decoquere, & simul decoques; deinde admiscebis butyri quartarium, dyacilon quantum sufficit, & adipem anseris, recondesque diligenter, & uteris. Alia iniectio leuior. Oleum anethinum, adipem anseris, adipem phasianum, dyacilon, tetrapharmacum quantum existimaueris; si tamen necesse fuerit simul miscebis, & uteris. Iniectio alia. In oleo dulci coques abrotanum & absinthium, & uteris. Ad intestini rigorem ac martricis, & ad omnia interiora corporis, tolles iunci radices unc. tres, maluæ radices tres, foenugræci quartarium unum, lini seminis unum, meliloti semiunciam, Iquinantij similiter; & hæc infusa habebis in aquæ celestis sextariis tribus per triduum, die tertia eadem hora qua infudisti, coques in zema simul, & hoc succo pensabis uncias quatuor, & mittes in stagnatum, & adijcies olei anniculi libram unam, rutæ uiridis sex, famisuci semiunciam, & decoques in primis lento igne: cumque hoc coctum fuerit, in aliud uas

uas mittes, hylo pi, ceroti unciam unam, terebinthinæ semiunc. butyri caprini unciam unam, adipis anseris tres, adipis porcini similiter, adipis pullini unciam unam, ceræ rubæ, diaculo semiplastri libram unā cum suprascriptis miscebis, & resolues, & sic coques hæc omnia: mittesque in uas in quod posteriora pigmenta misisti, & simul coques, donec unum corpus fiant, & in mortario teres, ut se commisceant; & in olla rudi seruabis: & cum iniicere uolueris, penſabis olei anniculi lib. unam, & medicaminis unam, & sic curabis. Item ad anum. Lithargyri unc. duas, cerusæ tres, olei myrtini libras duas, clinicæ creticæ uncias duas, res sicca in mortario & immittes.

Ad intestina rupta. Cap. XXXII.

MENTASTRI purgati quantum tribus digitis comprehendere potueris, tolles, adijcies fœni culi seminis & apij seminis cochlearia II. & in unum quā minutissimè trita, & in uini optimi cyathis quatuor calefacta, quod digiti pati possent, ieiuno bibendum dabis per triduum, & quemuis sedabit dolo rem. Depilis leporinis in mellis manu plena decoctis facies pillulas, & quā frequentissime ieiuno in melle dabis glutindas, & sic intestina quamuis periculose rupta sint, celeriter & efficaciter mederis. Stercus leporinum cum melle coctum & ad magnitudinem fabæ factum, datumque frequenter, interrupta in teriora intestina conglutinat, assidueque hac curatione utendum, donec omni periculo liberetur: facit & ad dolentia intestina. Sed ad lumbricos & tineas. Herba betonice sicca puluis ad denarium unum, & uini cyathis duobus ex aqua malsa datur, quod sanat illos, qui aliquo ictu omenta læsere, uel de uehiculo lapsi sunt. Ad intestinorum dolorem. Semen coriandri & parum salis bene contrita ex uino austero ac ferro candente calefactum bibat, continuo curat & defectionem tollit. Brassicam conteres & suc cum exprimes, atque aque calide cyathum unum admiscebis, & ieiuno dabis bibere per dies quinque. Ad torsionem uentris. Rutæ unc. tres ex aquæ calide cyathis quatuor & herbā brassicā dabis. Brassicæ radices contusas in pila cum axungia ueteri appones, alligatz enim, omnem humorem & dolorem tollunt.

Ad ileon. Cap. XXXIII.

ILEOS, est grauissimum uentris uirium, cui resistit discepti uespertilionis sanguis illius uentri, & fa cit dysentericis. Oua pridie in aceto macerantur, ex his & farina & aqua panis iliacis fit. Quidam uero eadem oua resoluunt, & in patinis tostant in cibo. Caseus uetus ouillus in cibo prodest. Seuum item ouillum decoctum in uino austero bibitur hoc, quod & illiacis medetur. Cochleæ duæ teruntur cum suis testis, & oua cruda ex passu cyathis duobus, & aquæ cyathis tribus, atque totum in nouo uase de coctum ad temperamentum portionis bibitur. Cochlearum cum suo putamine combustarum cinis addi ta pusilla resina, ex uino bibitur. Senectus serpentium decocta cum rosaceo in uase stugneo uentri il linitur. Dysentericis porciones ferro candenti calefieri debent. Caseus uaccinus recens immittitur. Ad omnes uero epiphoras uentris, caseum mollem in cibo poni iubent. Veterem autem tritum in mo dum farinæ, mensura cyathi addi in cyathos tres uini cibarij, & ita deuorari. Lac caprinū ad dimidias par tes decoctum infunditur. Gluten taurinum aqua calida resolutum additur. Imponitur item inflationi fi mus uitulinus in uino decoctus. Frequenter autem euenit ex causa aliqua latente, ut uentri dolor subi tus exstat, quo nunquā tentatur qui habet secum talum leporis, ut aiunt misierculæ. Antidotum pē ma, quod facit ad ileon, colum, & intestina omnia: ita ut ad unam potionem dolores cessent; facit & ad phthicos, qui etiam sanguinem excreant, sex portionibus datis ad lateris dolorem, ad sciam, ad quartanas, acceptum ante passionem: suspiriosis etiā multum prodest. Recipe autem hæc. Spicæ nardi drachmas quinque, amomi unam, croci duodecim, costi octo, euforbij sex, folij duo decim, styracis septem, zinziberis octo, iulquiami duas, opij duas, pyrethri sex, piperis quinque, piperis albi sex, piperis longi octo, reuponti ci duodecim: quæ omnia trita, melle quod sufficit, commiscebis, & dabis auellanz magnitudine.

Ad lateris dolorem, id est pleuresim. Cap. XXXIII.

RVTAE & iunci radicum fasciculi singuli, & piperis albi grana nouem trita in uini cyathis tri bus, ieiuno dabuntur. Succum erucæ uiridis ad modum potionis, uel sex grana piperis cum salis grano te pefacta bibes, & transibit dolor. Ad lateris & iecinoris dolorem: tolles costi denarios duodecim, eupas torij duodecim, aloes sex, petroselini decem, baccarum lauri decem, frenugræci quatuor, piperis duodecim: & hæc omnia in puluerem rediges, & dabis ex eo cochlear plenū cum aqua calida ieiunō, & iaceat in ipso latere. Ad pleuréticos qui in periculo sunt, melius facit. Piperis unc. unam, myrrhæ trochlicis denarios tres, mellis Artici libram unam, mel uerō & piper coques super lentos carbones, donec paululum spisse tur, postea uerō depones, & sic mittes tritam myrrham cum modico melle diligenter, & dabis ut glutiat cochlearia duo. Antidotum ad pleuréticos, quod mox dolorem minuit, ad tortiones etiam quæ remanent ex dolore coli specialiter, & ad omnes dolores frequenter eo utimur. Recipe castorij sicci denarios octodecim, dauci cretici seminis octodecim, panacis radices octodecim, iulquiami albi nouem, opij thebaici nouem. Hæc omnia tundes & cribrabis diligenter, ac miscebis melle optimo despumato: & repones in uase stagnato, & ex eo dabis quantum est faba Cappadocia cum aqua calida po tionem tres. Epithema pleurético diapaeanum. Recipe ceræ uncias nouem, olei cyprini

(Analis, ut & sequi dicitur) (Recipe)

A ij

C. PLINII SECVNDI

libram unam, opopanax uncias duas, rutæ viridis sex, sulphuris vivi duas, guttæ ammoniaci quatuor. Pa-
nacem uero & guttam cum uino ueteri teres, & ruta trita commiscebis, & addes sulphur tritum, deinde
facto ceroto permiscebis. Confectio pleurctica. Recipe hyssopi ceroti unc. sex, terebinthinæ sex, ceræ
sex, folues autem ceram & terebinthinam, hyssopum cerotum, & sic admiscebis hircos tulum. Epithema
pleurcticon diaphecanum. Recipe ceræ lib. unam, terebinthinæ unam, olei cyprini unam, opopanax
uncias duas, rutæ viridis unam, sulphuris vivi duas. Ad lateris dolorem. Stercus caprinum in sylvia
inuentum, resolutum in aqua & percolatum, ac potui datum, celeriter & efficaciter quamuis uehementis-
simum dolorem mitigat. Tritum apri sterus & admotum lateris dolorem sanare certissimum est. Ad
lateris dolorem qui respirare non potest. Foenugreci unc. unam, piperis denarios quatuor, croci duos
in puluerem rediges & commiscebis, dabisque cochlear plenum in potione: si febricitat, dabis ex mulla
cyathum unum ex aqua calida. Coriandri semen teres & cribrabis & cum melle coques, donec spissum
fiat, & exinde mane ac sero cochlearia tria dabis. Rapæ denarios quindecim, ex mullæ cyathis quatuor
dabis per diem. Ad eos qui lateris dolorem patiuntur & sanguinem expuunt. Rapas tritas ex aqua, &
lac caprinum dabis in die ieiuno, & cum dormitum uadit. Herbarum ebuli radicem dummodo sine medulla
sit ex aqua calida bibat, & lumbricos eiicit. Emplastrum ad lateris dolorem. Marribium & ceram &
oleum in unum conteres, & panno illinies atque impones.

Costarum fracturis sanandis. Cap. XXXV.

FIMVM caprinum ex uino ueteri tritum, costisque fractis impositum, aperit, extrahit & sa-
nat mirifice.

Lumbis dolentibus curandis. Cap. XXXVI.

ACINORVM nigrorum succi cyathus unus cum mullæ cyathis tribus potui datus, lumbos
dolentes sanat. Enulæ foliorum siue radice pulueris denarii duo ex uini cyatho uno bibiti emendant.

Pastinacæ item radices siue semen den. quatuor in aqua mulla decocta & potui data, lumborum & re-
num uitia emendant. Porri secti succus ad cyathos duos, in uini cyathis duobus bibitis, sine mora sa-
nat. Asparagi semen & cymini pari pondere tritum, & ex uino uel aqua calida potui datum, emendat.

Apij itidem radice succus ad cyathos duos, & uini cyathis tribus potui datus prodest. Olestri item
radix in uino coquitur, & ad cyathos duos potui datur. Radix similiter asparagi trita & in uino potui
data, lumborum dolori medetur. Cataplasma ad idem. Nasturtium cum polæta teritur, calidumque
imponitur. Ferulæ uiridis folia trita & in uino mixta & imposita, mirifice sanant. Lana succida in
oleo pice liquida, sulphure uino, nitro Attico feruefactis, intincta quam fieri potest calidissima bis in die
ponitur. Pistorum cypressi uiridis sextarios tres in aquæ sextariis tribus in olla noua decoques, ut sicut
cera mollescat, & sublatis granis quæ intus sunt atque proiectis, ipsos teres diligenter, & ut cataplasma pan-
nis induces, lumbisque impones ac desuper fascias ligabis, & hoc per triduum facies, ita ut quotidie mute-
tur, & de prædicto calastico sæpius lumbos confricabis, & in balneo cum ipso fuderis: sed & cum se collo-
cat fortius, de ipso calastico loca perungat quæcunque doluerint. Sulphur uiuum imponitur cum adi-
pe. Conditum nephreticum hoc recipit. Petroselini unciam unam, cassiæ unam, asari unam, spicæ nar-
di unam, zinziberis unam ac semis, leuistici similiter, betonicæ unā, costi uero semiunciam, pyrethri unā,
marathri unam, coconidij unam, saxifragiæ unam, olei unam, artionis semiunciam, piperis quatuor, apij
seminis unam, baccarum lauri semiunciam, rutæ seminis unam, prassij unam, cymini unam, seminis aspara-
gi semiunciam, de puluere autem mittes semiunciam, piperis unam, mellis optimi quod sufficit, uini Asca-
lonij sextarios sex, & uteris.

Renibus sanandis. Cap. XXXVII.

RADIX feniculi cum tyana decocta & in cibo data, renum densitates relaxat, & eiusdem radi-
cis succus ad cyathos duos in uino potui datus, mirabiliter uitia sanat. Vriticæ semen tritum ex uini
cyathis tribus bibitur. Betonice pulueris denarii duo, ex mullæ cyathis tribus febricitantibus cum aqua
calida propinantur. Asparagi item radix teritur, & ex ea denarii tres ex uini cyathis tribus potui dan-
tur proficue. Ozymi itidem succus sæpius bibitus, renum uitia emendat. Ius ciceris cum condito bi-
bitur. Lauri latic uirides quamplurimæ trite super renes imponuntur, & ex uini cyathis tribus puluis
earum bibitur. Ad renum dolorem, uel ad lapides eiiciendos, & ad urinam prouocandam. Recipe
petroselini unc. unam, piperis duas, feniculi seminis tres, helenij quatuor, dabis uero denarios tres cum
aqua calida. Antidotum ad renum dolorem, qui lapillos colligunt, & uix cum dolore proijciunt, & in-
terdum proijcere non possunt. Recipe men semiunciam, petroselini similiter, spicæ nardi similiter, iris si-
militer, baccarum lauri purgatarum semiunc. piperis denarios sex, testarum oui ex quibus pulli nascun-
tur, uncias tres, seminis caulium semiunciam, mellis optimi quod sufficit ad totum puluerem colligendum;
omnia enim tusa cribrabuntur diligenter, ut sint minutissima: dabis autem cum condito in modum auel-
lanæ parue, febricitantibus uero cum aqua calida. Ad renum dolorē siue ex frigore fuerit, siue ex calu,
siue de icu: hoc physicum est & probatum. Pollices pedum perunges pice liquida spissa, & lana caprina
super

super obvolues, & ambulabis. Hocque in edicamentum in diebus uel ter mutabis per dies nouem, renes autem nullo medicamento tanges. Emplastrum malagmaticum ad renum dolorem. Recipe

styracis uncias quatuor, thuris quatuor, galbani quatuor, ammoniaci quatuor, picis uirginis libras duas, ceræ duas. Styracem uero & galbanum & ceræ partem mediam in pila tundes & facies collyria, deinde picem & ceram simul solues, thus in puluerem rediges, ammoniaci puluerem cum aceto teram tritam cum aceto & puluerem thuris supermittes, & agitabis bene, ut se commisceat; deinde leuatis

partibus omnibus in recentem ollam mittes & facies collyria: hoc idem etiam sciaticos sanat. Recipe terebinthinæ uncias tres, galbani duas, euforbij semiunciam, panacis similiter, olei cyprini libram unam, ceræ uncias sex. Cataplasma ad idem. Euisi radix ex uino decocta & trita atque imposita, dolores renum sanat. Serpillum & radices caulium contundes & teres admixta axungia, & renibus appones.

Recipe styracis uncias duas, mannæ thuris duas, galbani duas, ammoniaci sex, terebinthinæ sex, ceræ libræ unam, picis unam. Conficitur autem sic: Ammoniacum & thus cum aceto uel biduo teruntur, deinde styrax & galbanum & ceræ pars in pila tunduntur, ut unum corpus fiant: pix, refina, & residuum ceræ resoluuntur & colantur, ac sic commiscetur species superscriptæ: hinc fiunt madalia, & seruantur. hocque & sciaticos curat. Emplastrum ad idem. Recipe euforbij unciam unam, pyrethri duas, castorij unam,

stafisagrie unam, sansuci unam, ammoniaci quatuor, ceræ libræ unam, nardi unam. Epithema ad renum dolorem, quod in modum collyrij colligitur. Recipe ceræ libræ unam, gypsi specularis cocti denarios sex, colophonizæ fixæ unc. decem, mellis boni viginti, spumæ argenti auroreæ triginta septem & semis, aceti acris sextarios octo & semis, & denarios sex, olei Saurinensis unc. unam, ius sciti unam. Diatesaron nephreticon, fu, meu, asarum, nardum, celticum æqualia teres, & dabis in mellis crato. Elegma nephreticon. Recipe piperis albi denarios tredecim & semis, petroselini similiter, cassiæ fistulæ tres & semis,

betonicæ quatuor & semis, zinziberis nouem, nardi potici nouem & semis, saxifragi nouem, mellis despumati lib. unam & semis, dabis autem cum condito cochlear unum. Emplastrum nephreticon. Recipe nardi uncias nouem, ceræ sex, colophonizæ duas, myrrhæ unam, quod facit & ad eos qui pulmonum inflammationem patiuntur, uel cui uiscera tument, quod est plancia. Emplastrum ad quod supra. Recipe ammoniaci unc. duas, lybani duas, bdellij duas, myrrhæ duas, castorij unam, masticæ duas, nardi octo.

Epithema pleureticon. Recipe ceræ drach. octo, iris quatuor, piperis albi duas, codion quatuor, cyprini rutatum: quæ cum cyprino rutato coques, & ita cerotum facies, & omnia permiscebis. Antidotum ad renum dolorem, quod harenas detrahet. Recipe apij feminis uncias duas, petroselini duas, anisi tres, dauci denarios duodecim, scaonitis octodecim, croci unum, mellis quantum sufficit, daturque in modum lupini cum cochleari mellis & aquæ cyathis tribus. Antidotum ad renum dolorem & tumorem, & ad iecinoris ac lienis tumorem, & ad eos qui propter hæc uitia mali coloris sunt: facit & ad aquas matris.

Recipe croci den. sex, nardi rustici sex, costi sex, scenitis tres, cynamomi tres, myrrhæ & stactis tres, mellis unc. tres & den. tres: datur uero in modum auellanzæ ex mullæ cyathis duobus, ita & febrietibus dabis. Antidotum ad renum dolorem, & ad uescicam, & calculum comminuendum & expellendum, ad tumorem & exulcerationem renum & ad omnia uitia eorum, etiam si sanguinolentam urinam faciunt.

Sicca rosa, papaueris semen, & nuclei pari potere coquantur & trita miscentur, & hinc datur in modum auellanzæ amplioris ex aquæ cyathis duobus uel tribus. Ad renum & lumborum dolorem in picem liquida, lanulam intringes, & super umbilicum pones. Emplastrum ad dolorem renum, a quo multi curati sunt. Citonia optima intus & foris purgata numero decem coques in omphacio melle siue uicino Ascalonio aut Siculo, dactylos etiam optimos purgatos numero decem coques similiter, addes aloes heræ patigis tritæ tres, croci tritici cum uino semiunciam, postea facies cerotum de oleo melini libræ unam, ceræ unam: quod cum refrigerit, omnia simul miscebis, & impones. Herba agrimonia trita & potui data, dolorem sedat. Si uero ex pondere sentiat, pollinis fabæ sextarium, & betæ uiridis succum simul coques & calidum impones per triduum. Betonicæ denarios duodecim ex aquæ calidæ cyathis tribus, si febriet: si autem non febriet, in uini cyathis tribus. Ad renum dolorem. Castorij denarios tres, refinæ tres, seui taurini similiter, picis duræ similiter, styracis similiter, olei nardini quantum sufficit. Hæc omnia in unum coques & impones: examinatum est. Catapotia ad renum dolorem. Recipe apij feminis uncias duas, sisseleos duas, petroselini unam, fardeli quatuor, piperis albi unam, cruce feminis duas, nuclei sextarios duos, partem dictam, farine rubi heminas tres, mellis sextarium unum. Conditum nephreticum. Recipe eupatorij unam unciam, petroselini unam, squinautij unam, spicæ nardi unam, asari drach. unam, marathri feminis sex, solij unam, cyperi unam, piperis decem, reupontici IIII. dauci Cretici sex, uini optimi quadraginta, mellis libras uiginti quatuor, teres autem diu sicca cum melle: Postea mittes uinum, & cum digestum fuerit, dabis in balneo in folio, & post balneum agitabis, & uteris. Conditum nephreticon, hoc est ad renes. Recipe petroselini, spicæ nardi, saxifragæ, piperis, betonicæ ana unciam unam, asari, dauci, fu, ana semiunc. singulas, croci drach. duas, uini sextarios duodecim, mellis duos. Epithema nephreticon expertum. Recipe euforbij unciam unam, nitri sex, adipis porcini unam, opopanaeis unam, galbani duas, bituminis unam, cum aceto autem sicca teres, permixtisque uteris, pones super lumbos & umbilicum. Cofectio ad renum dolorem, uel ad uescicæ & stomachi. Recipe masticæ unc. tres, cassiæ denarios nouem & dimidium, solij similiter, costi similiter, ammoniaci octodecim, absinthij nouem, rosæ sicæ nouem, alicæ nouem.

PETROSELINI semiunc. sicorum seminis similiter, apij similiter, tundes simul & cribra-
bis, adiecto paruo myrrhæ optimæ cum piperis granis nouem. Hæc omnia cum uini optimi cyathis duo-
bus miscebis, & dabis potui in folio post sudorem: & cum redierit, in calido mēbra contineat. Hæc enim
potio sexum & ætatem celerissime sanat. Nasturtium tritum cū uino dulci cibario ac ualde spissum per
triduum potui datum. Apij radices & fœniculi & asparagi bene lotas & exiccatas, æquis pōderibus sub-
condes, & hoc septem diebus in uino calidissimo macerabis, ita uti operiantur uiuo, & hinc merum, cum
opus fuerit, accipiat ieiunus. Aluminis scissi unc. unam, & draganti duas conficies sic. Dragatum pri-
die in aqua maceratum, alumini trito miscetur, hinc facti pastilli in modum scrupuli dimidij cum passæ cy-
this duobus dantur. Brassicæ seminis triti den. unum, piperis duos admiscebis, & ex eo cochlear plenum
in careni potione dabis per triduum. Fœniculi, asparagi, petroselini & apij, & herbæ saxifragæ uel uer-
benæ manipulos singulos cum aqua ad tertias decoques, & ex hac aqua in ieiunio in uino optimo
& asparagi infundes in uino ueteri albo, & ieiunio quantum unus est calix dabis. Ad uescæ dolorem,
uel urinae difficultatem. Pulegium, spicam nardi, & folium trita mittes in sacculum paruum & plenum
appones ad uescæ dolorem, uel qui sanguinem mingit. Marrubium conteres & addes passum, ac tan-
tundem aquæ decoctæ, & bibes. Ad uescæ dolorem, uel si guttatim aquam digerit. Cardij semen ex
uini sextarijs duobus decoctum, ut ad heminam redeat, totum uirium tollere constat, si frequenter fiat.
Fœniculum itidem decoctum & potui datum unc. decem, nimis proficit ad omnes difficultates. Itemque
millefolium & acetum bibitur contra omnes uescæ difficultates. Trifolium item minutissimum cum
pipere & pulegio potui datur. Petroselini cyathos duos, olei rosati duos, apij seminis tres, simul tūdes
& cribra bis tenuissime, & ex eo cochlearia tria in mortario trita tenuissime edes. Fomentum uescæ ut
meatus anterior laxetur. Recipe meliloti unc. unam, fœnugræci heminam unam, euiscæ fascem unam,
maluarum agrestium & satiuarum radices, camomillæ siccæ uel uiridis unciam unam, lauri quoque folia
& herbam uescalem simul decoques, & per triduum fouebis. Euiscæ sanæ & laurus fœminis molestior,
ut si mulier fuerit, saluatur matrix: si uirgo, rheumatizet. Ad hoc fomentum renum postea faciendum.
Laurum, pulegium, myrtum, gramen, anethum & rutam decoques, & per triduum fouebis. Ad uescæ
dolorem, quæ iam grauiter afflicta est, sed & si puteat & ad stranguriam, ad calculum quoque, necnon ad
loca mulierum, quæ res & homines à morte reuocat: Tolles asparagi radices, graminis radices, apij quo-
que cum suis folijs, maluas & ius maluarum quod exprimitur: Subinde adijcies rosmarinum, ramulum
cypressi, ramulum herbæ sauinæ, ramulum pulegij ueteris, fascem alij, cerros restis unius siccos, coronam
roseam siccam, lauri ramulum, nepetæ montanæ fasciculum, fœnugræci semen contusum, hedere ruteque
ramos, uerbenæ ramos cum suis radicibus, herbæ quæ nascitur secus aquam, & habet folia similia, fabæ fa-
sciculum, apium erraticum. & hæc omnia mittes in uas amplum, ut aquam plurimam capiat, & decoques
usque ad tertias, ita ut ter uas impleas, & ex hac aqua decoctâ dabis ieiunio bibere, & in ipsa aqua calidissi-
ma, prout pati potuerit, sedeat in balneo, ita ut testiculos & uerenda in aqua habeat: sedeat uero, quâdiu
potuerit, & subinde ex eadem calida adijcies, donec sentiat se proficere, ac sabulum per urinam digerere;
hocque facies per triduum, & licet uisidum sit uetustissimum, sanabitur, in utroque sexu, quolibet sit ætas.
Mulier autem quæ his locis aut uescæ laborauerit, ex ea intus utatur ut sedeat similiter, ut supra de uiro
diximus, explicabit enim & stranguriam, & tortiones omnes uescæ statim soluet. Ad podicem uero po-
tionem sic demonstrabis. Mittes in uescam calculos, & cum ipso medicamēto suspendes in calore bal-
nei, ut tota nocte pendeat, & inuenies manē calculos ui medicaminis resolutos. Rutæ agrestis grana no-
uem trita ex aceti hemina subferuefacies, & dabis bibere continuis diebus nouem, sanusque fiet. Quo-
rum putamina, unde pulli nati fuerint, quod sufficiat, contundes, & myrrhæ tusæ & cribratæ semiunciam
commiscebis, & in passo ieiunio dabis. Asparagi item montani siue syluatici fasciculum bonum, aut cer-
tè radices eius decoques ex aqua bene, & ex ea aqua bibat cum uino: mirifice sanat. Porri itidem sectiui
uirginis succi cyathum unum ex passi cretici cyathis tribus bibat. Item amygdalas numero triginta dili-
gentissime teres. Draganti etiam semiunciam in sapa infusam & bene tritam simul miscebis ac colliges,
hinc dabis in modum auellanz, cum dormitum uadat.

AMILI semiuncia conteritur, & ouum eiusque putamen ter impletur passo, idque balneo sub-
feruefactum datur aduersum calculi dolorem. Cicer arietinum in aqua discoquitur cum sale, & ex ea aqua
bibuntur bini cyathi per triduum in difficultate urinae, sic & calculi pelluntur. Castorei trita dolori im-
ponuntur aduersus urinae difficultatem. Murino itidem fimo dolorem illinire prodest. Vermes item
contriti bibuntur ex uino aut passo. Ad calculos comminuendos pellendosque. Cochleæ inanes com-
bustæ conteruntur, & cinis earum in potione datus, calculos pellit. Lapilli autem qui in gallinaceorum,
aut palumborum uescâ inueniuntur, contriti potioni insperguntur. Fimus palumborum in sorbitione
ex faba fracta bibitur. Turturum itidem fimo in mulla decoctus imponitur. Cicadas coctas das in
patella

parella in uesciz dolore, utile enim est contra omnes uesciz dolores seu difficultates. Cinis plumarum palumborum ferorum ex aceto mulso bibitur. De nido isidem hirundinis glebula uti diluta ex aqua calida bibitur. Turdorum fimus ex mulso decoctus imponitur. Conuenit quoque turdos esse cum baccis myrtis in aqua, in qua decocti sint pedes agnorum. Scorpio marinus in uino necatus, uesciz uitia sanat, & calculos pellit: ipse autem sanè editur, & uinum bibitur. Lapillus qui inuenitur in scorpionis marini cauda, utiliter potatur. Inueniuntur in branciis capitis piscis quasi lapilli, qui poti ex aqua, calculosis prædare medentur. Echini cum spinis suis tunduntur, & singuli ex hemina uini bibuntur. Difficultatibus urinz succinum potatum alligatumque prodest. Plantaginis itidem uel folia, uel radices potare ex passo prodest. Vesica apri in cibo elixi sumitur. Leporis renes inueterati in uino poti, calculos pellunt. Ungulæ equi cinis ex uino uel aqua bibitur.

Ad uesciz calidum.
apri, scorpionis, turdi, cinis, aceto
calido, decoctus, cinis, fimo palumborum
apri, scorpio marinus, uino, necatus, uesciz
uitia sanat, & calculos pellit. Lapillus
qui inuenitur in scorpionis marini
cauda, utiliter potatur. Inueniuntur in
branciis capitis piscis quasi lapilli, qui
poti ex aqua, calculosis prædare medentur.
Echini cum spinis suis tunduntur, & singuli
ex hemina uini bibuntur. Difficultatibus
urinz succinum potatum alligatumque prodest.
Plantaginis itidem uel folia, uel radices
potare ex passo prodest. Vesica apri in cibo
elixi sumitur. Leporis renes inueterati in
uino poti, calculos pellunt. Ungulæ equi
cinis ex uino uel aqua bibitur.

Incontinentia urina compescenda.

Cap. XL.

VERRINI genitalis cinerē potare ex uino dulci oportet. In canis ualet cubili urinam facere. Item remedium, ne ipse urinam faciat, ut canis in suo cubili. Ungulæ apri uel suis cinis potioni inspergitur. Leporis quoque cerebrum in uino bibitur, & eiusdem testiculi tostī eduntur. Anserum etiā trium ligulæ asæ in cibo sumuntur. Cochleæ Africanæ cum carne sua comburuntur, cinisque earum ex uino bibitur.

Urina compescenda.
Verrini genitalis cinis, uino dulci potatur.
In canis cubili urinam facere. Item
remedium, ne ipse urinam faciat, ut
canis in suo cubili. Ungulæ apri uel
suis cinis potioni inspergitur. Leporis
quoque cerebrum in uino bibitur, & eiusdem
testiculi tostī eduntur. Anserum etiā
trium ligulæ asæ in cibo sumuntur.

Ad uerendorum uitia, si fornicatio sit uel uerruca.

Cap. XLI.

ARIETINI pulmonis sanies illinitur. Cæteris uerō uitijis arietinorū uellerum cinis ex aqua, & seuum omento pecudis præcipuè ab renibus admixto, & pumicis cinere & sale imponitur. Lana item succida ex aqua frigida. Caro pecudis combusta trita ex aqua frigida. Mularum itidem ungulæ cinis. Dentium caballinorum tusorum farina inspergitur, ulceribusque imponitur cum melle, hyssopum & plumbistoria. Muricim uel purpurarum cum suis testis & carne combustarum cinis cum melle, carboniculusque eorum falsamenta cum melle cocta confringunt. Singulariter uerō cerebrum apri cum suis sanati quæ serpunt. Fel item bubulum cum alumine Aegyptio ac myrrha ad crassitudinem mellis subactum illinitur. Insuper beta cocta ex uino & trita imponitur.

Ad uerendorum uitia, si fornicatio sit uel uerruca.
Arietini pulmonis sanies, arietinorum
uellerum cinis, seuum omento pecudis
admixto, & pumicis cinere & sale
imponitur. Lana succida ex aqua frigida.
Caro pecudis combusta trita ex aqua frigida.
Mularum itidem ungulæ cinis. Dentium
caballinorum tusorum farina inspergitur,
ulceribusque imponitur cum melle, hyssopum
& plumbistoria. Muricim uel purpurarum
cum suis testis & carne combustarum cinis
cum melle, carboniculusque eorum falsamenta
cum melle cocta confringunt. Singulariter
uerō cerebrum apri cum suis sanati quæ
serpunt. Fel item bubulum cum alumine
Aegyptio ac myrrha ad crassitudinem mellis
subactum illinitur. Insuper beta cocta ex
uino & trita imponitur.

Testibus & ramicibus medendis.

Cap. XLII.

HOLVS cum faba cocta æquis partibus dolori apponitur. Bulbi triti ex uino mulso & illiti medentur. Rutam item cum teneris lauri ramis contritam tumori imponunt. Cyminum quoque tostum, contritumque cum cera & melle ac rosaceo. Farina lini feminis cum resina & myrrha contra dolorem facit in uino cocta & cōtrita. Inflationi uerō beta ex aqua imponitur aut melle. Ad idem. Fex uini aut faba ex uino illinitur. Folia cypressi cum polenta trita ramini profunt. Pillulæ item de cypresso teneræ tritæ cum axungia & lomento imponuntur. Succus de pillulis cypressi, si cum fici arida, prius demptis granis imponitur, iuuat. Farina quoque fœniculi in hydromelle decocta, addita axungia, facit ad omnia. Si uerō decidit alter ex testibus spuma cochlearum illinitur, tetrisque uulneribus ibi manantibus auxilia tur capitis canini recentis cinis. Senectus anguium trita ex aceto atque hydromelle. Stelliones quoque demptis pedibus, & interaneis, & capite, & assati in cibo dantur. Tumores testium marina aqua utiliter fouentur: quod si & dolor & tumor sit, posca calida imponitur in sponsia.

Ad ramicos.
Holus cum faba cocta æquis partibus
dolori apponitur. Bulbi triti ex uino
mulso & illiti medentur. Rutam item
cum teneris lauri ramis contritam tumori
imponunt. Cyminum quoque tostum,
contritumque cum cera & melle ac rosaceo.
Farina lini feminis cum resina & myrrha
contra dolorem facit in uino cocta & cōtrita.
Inflationi uerō beta ex aqua imponitur
aut melle. Ad idem. Fex uini aut faba
ex uino illinitur. Folia cypressi cum
polenta trita ramini profunt. Pillulæ
item de cypresso teneræ tritæ cum
axungia & lomento imponuntur. Succus
de pillulis cypressi, si cum fici arida,
prius demptis granis imponitur, iuuat.
Farina quoque fœniculi in hydromelle
decocta, addita axungia, facit ad omnia.
Si uerō decidit alter ex testibus spuma
cochlearum illinitur, tetrisque uulneribus
ibi manantibus auxilia tur capitis canini
recentis cinis. Senectus anguium trita
ex aceto atque hydromelle. Stelliones
quoque demptis pedibus, & interaneis,
& capite, & assati in cibo dantur.
Tumores testium marina aqua utiliter
fouentur: quod si & dolor & tumor sit,
posca calida imponitur in sponsia.

Inguinum uitijis iuuandis.

Cap. XLIII.

NEGANTVR inguina itumescere eius qui habeat secum surculum ex myrto, nec ferro, nec terra tactum. Cochleæ minutæ tritæ ex melle illiniuntur, inguina priusquam exulcerantur uel intumescant in licio autem facere nouem nodos oportet, atque ad singulos nominare singulas mulieres uiduas, ac tum liciū alligare ad talum, uel cruri, uel infra genu. Si autem ex equitatu femina uexata sunt, spuma equi ex ore feminibus illinitur, & inguibus imponitur. Fimus suillus sub testa calefactus, & tritum cum oleo. Oleo item de lucerna intestini caput perficabis ter, miraberisque effectum, sed posteaquam meatu unxeris, aliquantulum reijcias. Lini itidem semen ex aceto & oleo decoquitur, & tritum inguini imponitur. Myrtea uirga quæ ferro tacta non fuit, in dolore inguini circumligatur; absinthiumque habere in uentrali prodest. Lupini ex aceto cocti fomentum optimum est, & tollis & parothetis utile est.

Ad uicia inguinum.
Negantur inguina itumescere eius qui
habeat secum surculum ex myrto, nec
ferro, nec terra tactum. Cochleæ minutæ
tritæ ex melle illiniuntur, inguina
priusquam exulcerantur uel intumescant
in licio autem facere nouem nodos
oportet, atque ad singulos nominare
singulas mulieres uiduas, ac tum liciū
alligare ad talum, uel cruri, uel infra
genu. Si autem ex equitatu femina
uexata sunt, spuma equi ex ore
feminibus illinitur, & inguibus
imponitur. Fimus suillus sub testa
calefactus, & tritum cum oleo. Oleo
item de lucerna intestini caput
perficabis ter, miraberisque effectum,
sed posteaquam meatu unxeris,
aliquantulum reijcias. Lini itidem
semen ex aceto & oleo decoquitur,
& tritum inguini imponitur. Myrtea
uirga quæ ferro tacta non fuit, in
dolorē inguini circumligatur; absinthium
que habere in uentrali prodest. Lupini
ex aceto cocti fomentum optimum est,
& tollis & parothetis utile est.

Ad intertrigines.

Cap. XLIII.

PVTREDO ligni in puluerem redacta inspergitur. Lentisci foliorum puluis ad idem facit. Myrti item foliorum puluis mirabiliter facit. Corticis quoque granatorum puluis mirè facit.

Ad intertrigines.
Pvtredo ligni, lentisci foliorum
puluis, ad idem facit. Myrti item
foliorum puluis mirabiliter facit.
Corticis quoque granatorum puluis
mirè facit.

Scia sananda.

Cap. XLIV.

VERMIS terrenus effoditur, & imponitur in catillum ligneū, fissum, ferro alligatū, aqua pfun-

Ad intertrigines.
Pvtredo ligni, lentisci foliorum
puluis, ad idem facit. Myrti item
foliorum puluis mirabiliter facit.
Corticis quoque granatorum puluis
mirè facit.

A. iiii.

ditur, rursusque in eo loco, in quo erutus est, uiuus suffoditur, & ea aqua in eodē catillo bibitur. Cochleę crudę ex uino mero cum pipere bibuntur. *Lacerta uiridis* dempto capite & pedibus cum interaneis condita, ut fastidium abigat, in cibo datur. Rubeam qua pelles conficiuntur, quotidie bibere utile est. Lauri & genescę rami pluribus diebus in aceto macerantur, deinde tunduntur & coquantur, & ex eo succo quotidie cyathus potui datur. Fimus quoque bubulę calefactus in cinere feruenti, locis dolentibus in folijs cuiuscunque holeris imponitur. Picis purę pond. IIII. solues in cacabo, donec penitus liqueat, addesque sulphuris uini triti unc. unam & semis, hordei pollinis heminam, & aceti acerrimi heminam; quodque tandiu misceri & confricari facies, donec unum corpus efficiatur, & sic induces in aludam. & postquam balneum exieris, in locum qui dolet, impones, & uteris biduo; & post rursus lauabis, ac post balneū renouata cataplasmata impones, hocque tertia uice facias, & recipies integram sanitatem. Capparis radices in aqua decoctas & bene tritas, pannoque inductas, ad noctem impones, & alio die sanus lauabis. Nepeta ante solis ortum sublata & imposita, remedium præstat: hac etiam trita seu uiridi in balneo fricetur. Frustum enulę uiridis cum uino albo bene teres, & colabis per linteum, & dabis cui coxa uel scia dolet. Sed prius aliud frustum teres, & illiniēs uertebro uel coxę dolenti, & cum fricauerit, bibet potionem superscriptam, & in ipso latere iacebit. Silphij cochlear plenum cum aceto & aqua dabis bibere. Potio ad sciam. Herbam agrimoniam cum fuste roboreo euellēs, teresque radices eius, terges diligenter, & teres in potione unā cum uino quantum sufficit, & sic dabis bibere per triduum. Bulbi albi succus potui datus, medetur. Itemque senecionis succi drachma una cum oxymelle potui data, si mox deambulet, prodest. Porri item capitati succus potui datus, ad sanitatem efficaciter perducit. Salis item ammoniaci cochlear unum in uini cyathis duobus bibitur. Malagina galię sciaticis. Recipe pyrethri unciam unam, castorij unam, helenij, adarcis unam, euforbij unam, zinziberis unam, cerę unā, uini quātum sufficit. Alia potio ad sciam. Plantaginem, porrum uirginem, & heliotropij iurs folia, teres diligenter, & expressum succum dabis in uino ueteri tepesacto, luna decurrente per ter dabis bibere, & quando heliotropium folia non habet, radices eius tolles uel cetera. Potio ad sciam, ad coxam, ad arthrum, ad pedes. Hibicini fimi pugnum, piperis grana XXVI. teres diutissime, addesque mellis heminam unam, & uini sextarios duos, dabisque stanti per dies septem. Genescę item frondes & caules cum aceto madefactas sumere triduo conuenit. Vntio item leonis, & leopardi adipēs, & pyrethrum pari pōdere admiscebis, aphronitro & euforbio tantundem admixto & balsamo, & quotidie coxam in sole perfricabis, & cum melius senseris, adijcies passam & oleum rosatum quod sufficit. Curat etiam nemorum & articularum ualētudines. Acopum ad coxę uitia, calidissimum. Recipe olei terebinthini libram unam, axungię ueteris duas, cerę IIII. galbani unam & semis, euforbij duas & semis, panacis similiter, adarcis duas, sagapeni tres, castorij pontici sex. conficies uerō sic: Sagapenum & panacę infundes in modico aceto, & teres oleum terebinthinum, & axungiam ceramque simul solues, cetera tundes & cribrabis: & si mul omnia miscebis, & colliges in uase uitreo, & uteris, confricando per unam horam cōtra solem, uel ad carbones. Confectio tylopomi ad sciam. Recipe pyrethri uncias duas, medullę ceruinę unam, galbani unam, hytopi unam, adarcis duas, terebinthinę unam, piperis unam, balsami libram unam, olei cyprini uncias sex, olei hircini librā unam, olei styracini unam, olei amarjini uncias tres, olei laurini quatuor, cerę punice tres. Confectio malagini sciaticis experti. Recipe cerę libram unam, picis durę duas, terebinthinę de cauliculis unc. sex, ammoniaci sex, styracis optimi duas, mannę thuris duas, galbani unam & semis, aceti acerrimi quod sufficit. conficies sic: Ceram, picem, & resinam igne lento solues, styracem & galbanum admixta modica cera tandiu tundes in pila, donec malaxari possint: ammoniacum uerō leni manu teres, ut puluis fiat, addesque acetum, ut pinguius fiat. Deposito uerō cacabo, galbanum cum styrace supermittes, & de spatula mouendo, commiscebis postea omnia: deinde in mortario super omnia condimenta fundes, uel manibus permiscebis acetum, hocque facies assidue, spargendo super quantum species possint combibere, & uteris. Confectio medicamenti sciaticis. Recipe salis communis uncias tres, & den. tres, lepidi unc. unam & semis, ammoniaci sex, sinapis sex, pyrethri unam, struthij unam & semis, aristolochię longę sex, camēpitheos unam, colophoniz tres & den. X. olei ueteris unc. nouem, propolis sex, resinę pituinę siccę sex, stercoris columbini semiunc. melibdenę tres, & den. tres. Cōfectio nitri sciaticis. Recipe adarcem, pyrethrum, sinapis semen, stasifagniam & nitrum rubeum aquis ponderibus: quę omnia contundes & cribrabis diligenter, in balneo uteris sine unguento. Ad coxarum dolorem, & ad scia. Brusci radicem contundes, & in uino ueteri decoques ad tertias, & tres cyathos exinde ieiuno dabis bibere. Herba camipides, quam piscariolam uocant, teres si uiridis est, den. III. & ex aqua multa potione dabis per dies XX. Ipsam item herbam uiridem contundes, panem aut nauticum pridie infundes in aceto acris; postea ipsam herbam contusam exprimes, & adijcies salis tenerā pro modo, & saponis gallici pilulas, & in modum cataplasmatisciatico induces a uertebra coxę usque ad geniculum, ita ne subfragmen tā sudauerit, tolles, & locum ipsum oleo perfricabis, mirū effectū est. Cochleas crudas cum testis XIX. bulbos crudos XXI. piperis grana XXIII. in unum cōmiscebis, & teres, ut fiat in modū ceroti, & inductum panno, exeunti de balneo induces in coxam, & ligabis, & post triduum solues eunti ad balneum. Apij uiridis, siue apiastri radices, ipsosque uerticulos rotundos ad modum ceroti facies, & eunti de balneo impones in panno, & post triduum solues in balneo, post pangra perfricabis, quod conficies sic. Cerus unciā I. argenti spumę unciā unam, cerę quantum sufficit, & post balneum impones. Hoc cerotū aliqui

totion

Cardamomum, vel potius cardamum
amagalliz, hincem fubarum, ac
alioq. usifons, rubrica, fel caprini, u
vagina, semis calsi siat, fimas
ut, fims caprini, lentharia aqu
mentra, vagina, cerussa, ovis max
api vel suis, heliun, molulla cer
fel tauri, oleu oppimi, iind vel

MVSCVLVS *Talorum utrius tollendis . Cap. XLIX .*
ex oleo tritus sedat uitium, & tumorem tollit . *Limus aquaticus cum oleo*

& sanabitur. Ut unges lēfos emundes uiscum cum sulphure uiuo tere, & infundes unges. Quinque folium tritum cum adipe impones. Emplastrum proscadramnata, hoc est, cum de frigore in manibus uel in pedibus uulnus nascitur, quæ sunt comedere. Recipe cerusæ libram unam, ceræ albæ unam, folij communis siue amygdalini unam, spumæ argenti cerusam uero & spumam argenti teres cum oleo diu tuis, donec colorem mutent.

Ad corporis salubritatem.

Cap. LV.

BETA syluatica sine semine cum aceto & uino cocta & supertensa, mire salubritatem corporis præstat. Myrrha cum uino trita, sanitatem corporis uiri mire seruat. Ut totum corpus hilare sit, uini ueteris feces cum oleo teres, & perunges totum corpus in sole. Ne corpus male oleat uel puteat: Latere antiquum, & rosam siccam tundes primum, & uteris in balneo. Ad seruandam item corporis sanitatem: Marthubij unciam unam ex lacte ouillo calefacto bibat semel in mense.

Lichenis arcendis.

Cap. LV I.

GRAECO nomine lichenæ appellatur, quod uulgo mentagrâ appellant, & est uitium quod per totam faciem solet serpere, oculis tantum immunibus; descendit uero in collum & pectus, ac manus, locat autem: eosque qui sic uexantur, osculari non conuenit, quoniam contactus eorum perniciosus fore perhibetur. Manlius Cornutus Prætor, prouinciz Aquitanæ legatus, C. C. in hoc morbo locauit se curandum. Huic ergo uitio sic conantur mederi. Cantharides illiniunt cum succo uiaz Amineæ, & seu ouis uel capræ. Murium simum illiniunt ex aceto. Cinerem item Herinacij ex oleo imponunt. sed in hac curatione prius faciem ex nitro & aceto foueri præcipiunt, & tunc illiniunt adipem uituli marini. Itemque delphini iecinoris cinerem ex aqua. Ficulneæ caules in aceto cocti & triti, illiniuntur. Euiscia radix cum glutino lupino in aceto decocta, ad quartas similiter adhibetur. Flos uisci cum calce subactus laudatur. Thymalli quoque flos cum resina decoctus adhibetur. Lomentum cum thuris polline zquis ponderibus ex aqua adhibetur & illinitur. Tâpsiaz radix trita cum melle imponitur. Glutinum, factum genitalibus uitulorum, liquatur ex aceto cum sulphure uiuo, ramo ficulneæ permixto, ita ut reces bis in die reponatur. Item troiscus lichenicon. Recipe gummi scissi unciam unam, tinaperi unam, lybani unam, tytaneos librâ unam, ammoniaci unc. unam, lithargyrij unam, gumeos duas, aceti quantum sufficit. Lybani drachmas decem, tinaperi decem, bdellij decem teres cum aceto. Catapotia ad lichenas exportata. Recipe lithargyrij unciam unam, alcionei unam, arsenici unam, asphalti unâ, lybani unam, tinaperi unam ammoniaci unam: quæ omnia teres cum aceto, & facies troiscos. Troiscus quo utimur ad lichenas & ad exanctumata, hoc est ambusta, & ad herpustigoden, hoc est, scabiem. Recipe ptymitij drach. octo, lithargyrij VIII. calcis uiuæ duas, aceti & olei quod sufficit. Troiscus lichenicon. Recipe cameleontis nigre drachmas III. pyrethri duas, tinaperi quatuor, chrysocolle quatuor, aceti acris cotylas nouem. Troiscus. Recipe alcionei ustulati drachmas duas, cameleontis nigre quatuor, asphodeli radices quatuor, tinaperi, lybani, pyrethri, aphronitri ana duas, tauro collis quatuor, aceti ueteris quantum sufficit. Troiscus ad lichenas. Recipe Iu syderon unc. tres, scordion purgati unam & semis, tinaperi similiter, gumeos quatuor, quæ in aceto acris teres in sole, & facies troiscos.

Elephantiasis depellende.

Cap. LV II.

A Facie hoc malum plerunque incipit, & nare primo surgit, uelut lenticula, quæ celerrimè per totum corpus serpit maculis uarijs, colore, & inæquali cute, alibi crassa, alibi tenuis, alijs dura, locis quasi scabie aspera, & postremo nigrescente, & ad ossa carnes apprimente, tumescentibus digitis in manibus & pedibus. Hic morbus peculiaris est Aegyptiorum populis, totus exitiosus est, cum in reges excedit. His qui hoc malo afficiuntur, cinis mustelæ & eiusdem sanguis mixtus illinitur. Radix asparagi in aceto cocta & trita imponitur. Mentastri folia, comasticata adhibentur, cedro illiniuntur. Bulbi quoque triti in aceto & sulphure medentur. Nitrum etiam ex melle & lacte bubulo tritum, faciem purgat & erugat. Smegma ad elephantiacos. Recipe pumicis drach. X. testarum sepiæ decem, nitri decem, cimoliæ decem, gumes albi quinque, cydon omphacion quinque, post hunc puluerem uteris & thure cum uino. Troiscus hero optimus tollens humores acerrimos, id est lichenas. Recipe lybani drach. octo, calchanti octo, tinaperi octo, calideos similiter, acaciæ quatuor, mysei tyri octo, gumeos quatuor, quæ cum aceto colliges, & uteris.

Ad morbum comitalem.

Cap. LV III.

ALLIUM elixum subinde in cibum & in potione sumatur. Fel agninum cum melle uel co chleu uel ligula sumatur. Lini semen & urticæ ex melle illitum sanat. Coagulum quoque uituli marini bibitur cum lacte equino aut mato puniceo sicco, aut mulla aut aceto. His qui sepius cadunt clyster infunditur ille. Castorij drachmas duas, mellis heminam unam, aloës unam, aquæ sextarium, si suppuratio erit, unguentum facies. Recipe crocum & thus masculum, & myrrham, gallas albas, acacia nigra, heliotropia quæ appellantur, corium mali punici, centauriam, olosatri semen, equis ponderibus teres omnia ex

Ad morbum comitalem,
m^o sumenda.

in dixerim, fel agnium, mel, aceto,
vitioli marini, lac agnium, myrrha,
mili suavis, melle, crocus, galla,
lic, acacia, cichoridii, malicorium,
pluribus comen, castoreo, vino,
apuli, caro aliter ingu, ali
comitalem, sanguis & ros sicut

Opica.

lini, urtica, mel, coqueant cum;
vini ferreus figendus rubi caput.
lini, coqueant.
mido (mundo) alio, collo.
vini, melle, coqueant.
vini, melle, coqueant.
vini, melle, coqueant.

Ad m^o sumenda.

lini, anetini, sanguis hominis, pe-
lis, vitioli, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.

Regium morbi pellendo

melle, pipere, alium, vino, coqueant.
lini, anetini, sanguis hominis, pe-
lis, vitioli, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.

Ad m^o sumenda.

lini, anetini, sanguis hominis, pe-
lis, vitioli, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.

Topica.

Ad m^o sumenda.

uino, & uteris, dabisque portionem bibere ei qui patitur. & abstineat à balneo, & si usus exegerit, lauet.
Testiculi urfani in cibo profunt. Testes aprini crudi, triti, ex aqua bibuntur, cum primum quis ceciderit,
in eo loco quo caput eius fuit, clauus ferreus figatur, non repetit. Dantur item carnes edendæ bestiarum oc-
cisa eo ferramento, quo homo ante occisus est. Hirundinis sanguis cum rhure, uel eiusdem cor recens de-
uoratur. Lapillus idem hirundinis cū nido alligatur ad collum iacentem, recreat, & ab hoc periculo tutum
præstat. Tenentes in manu anethum, comitiali morbo non appetuntur. Testiculi itidem arietini in-
ueterantur, & ex his dimidij denarij pondus datur in hemina aquæ tritum. Abstinentia uero utendū
est uini diebus quinque, & ante & totidem postea. Sanguis pecudis uel uiruli ter bibitur, sed & huma-
nus sanguis hoc uirio liberat. Catulus item lactens absceso capite & pedibus, exectis interaneis, ex uino
& aceto coctus editur. Vinaria quoque sumpta in cibo prodest. Cochlearum cinis addito lini semi-
ne & urticæ, ex melle illinitur cum sale. Iecur itidem uulturis tritum cum suo sanguine propinatur ter-
septem diebus; meliusque prodest si ea auis cū occiditur, saturata sit humano cadauere. Fel testudinis na-
ribus illitum, iacentem erigit. Castoreum item in aceti mulsi cyathis tribus ieiunis datur. Mustelæ quo-
que iecur marinæ in cibo bene sumitur. Carnes etiam caprinæ in rogo hominis tostæ, hunc depellunt
morbum. Caprini similiter uel ceruini cornu ussi nidor adhibetur.

Regio morbo pellendo. Cap. LX.

SALSA MENTVM in cibo ex pipere sumitur, seruata carnis abstinentia. Allium tritum
in potione uini sumitur. Cicer item arietinum discoquatur in aqua, duo cyathi potui dentur, uel ex mel-
le in cibo. Nuces Græcæ cum absinthij semine teruntur, deinde pilulæ ex aceto eduntur. Herba sa-
uina, quæ habet folia quasi cypressu, trita ex uino potui datur. Folia quoque oleastri ex uino trita impo-
nuntur, atque ipsum uinum bibitur. Sordes de auriculis aut mamma pecudis denarij pondere cū myr-
rhæ pusillo ex duobus cyathis uini hauriuntur. Vermes item terreni cū myrrha in aceto mulso pro-
pinantur. Cerebrum perdicis in tribus cyathis uini bibitur. Cineres interaneorum palumborum co-
chlearia duo bibuntur ex mulso. Erucae syluestris tria folia sinistra manu decerpta, ex aqua mulsa bibun-
tur. Rubea qua pelles efficiuntur, in aqua mulsa bibitur. Fimus pulli asini, quem primum edidit à par-
te, datur ex uino ad magnitudinem fabæ, triduo medetur. Canini capitis cinis in mulso propinatur.
Gallina si sit luteis pedibus, aqua ei pedes purificatur, deinde uino colluuntur, idque uinum potui datur.
Ad idem, equini pulli fimus ex uino propinatur. Eademque ratione cyminum ex uino albo in balneo
datur. Optima & certa ratio est, qua ego iam desperatæ salutis plurimos curavi; Si raphani succum in
balneo bibat, & in quocunque potu mane ieiunus parum urinae suæ bibat. Lapathi radices coterat ex ui-
no austero, colabisque & potui dabis, mire auruginem tollit. Radices porri cum aqua, quanta uolueris, ex uini
hemina potui dabis. Radices hæte tundes & exprimes succi cyathos quatuor, teres & dabis cū uino bono
bibere, sine mora sanabitur. Raphani item succum in folio usque ad collum uersus bibat. Chrysolagis
quoque seminis denarios undecim cū aqua satis calida bibat, & sanabitur. Item ad auruginem. Her-
bæ fellis terræ, quam centauriam uocant, fasciculum unum, anethi unum, alij capita septem, atriplicis
seminum. Hæc omnia in olla noua ex careno coques ad tertias, & dabis ieiuno in balneo,
ita ut in calida non descendat, sed sudorem detergat: & post balneum, radículas ex oleo
sale edat, & uinum accipiat modicum. Item in pila radicem tundes, ac succum ex
primis, & in balneo ex eo succo fricato te, usquequo descendas in folio sine
oleo lauare, & statim aurugo super aquam apparebit. Amygdalæ ama-
ræ unciam unam, anisi seminum, absinthij florum denarios sex:
insimul tere, & factroscos duos, & da cum uino & melle ad
cochlear unum. Prassium succum tundes & cribra-
bis, & dabis similiter cum uino & melle. Ra-
phanos item aut septem, aut nouem, contu-
des, & ex eo succo per linteum colato
dabis in folio statim cum
uino bibere.

Ad m^o sumenda.
lini, anetini, sanguis hominis, pe-
lis, vitioli, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.
lini, melle, coqueant.

Ad febres calidas intercidendas.

Cap. I.



MEDVLLA ceruina, adipe anferis, adipe porcino recenti, & exiguo cere perunges ferro, ac statim de succo lini feminis. Idemque asinae lac tepidum facit. Cotonia item matura, & rosam siccam, & papaueris capita sicca in olla rudi cum aqua decoques, & ex hoc dabis bibere. Item portiagla & apium tufum cum axungia colata, & oleo rosato, & lactuce folijs, & rasura cucurbitarum, & ouis crudis permixtum, & in modum ceroti pesto ti impositum, ardores ac subitos dolores hemitritici, & febres emendat. Ad ardorem stomachi febrientis. Rosaceum in aquam calidam mittes, & agitabis in carbonibus, quo platulam lineam infundes & stomacho superpones. Mellis libram unam, adipis porcini recentis colati unam, olei rosati unam, cere unam, argenti spumae uncias duas, teres autem spumam, & simul decoques, deinde croci triti mittes uncias duas & teres in linteolo inductum, super stomachum impones. Ad hanc ambrosia. Recipe olei rosati libram unam & semis, cere unam & semis, croci unc. duas, succi rasurae cucurbitae quantum sufficit, medullae ceruinæ uncias quatuor, serue facies autem eceram & medullam cum oleo tepidato cerotario addes succum per partes, & teres diligenter, postea addes crocum, & diutissime teres, permiscebis & facies pastillos, seruabisque, & cum opus fuerit, teres cum ouorum uitello. Cumque unum corpus fuerit, linteum illitum impones super stomachum. Ad ardorem stomachi in febribus, quæ non declinant, ex lini feminis farina cum albo oui facies cataplasma, & frigida super stomachum pones. Lactucas autem in calida coques, & teres cum albo oui, & stomacho superpones. Itemque rasura cucurbitae & uuae acerbæ cum albo oui imponuntur. Rasura iridem cucurbitae & crocum æquale cum albo oui imponitur. Confectio ambrosia. Cere lib. unam, olei rosati unc. sex, olei camomillæ sex, axungiae recentis lib. unam, croci unc. unam, lithargyrii unam, meliloti unam & semis. Iniectio ad febres calidas. Succus lini feminis cum oleo rosato seu camomillæ bene faciet. Si uero nimium febris æstauerit: Plantaginis folia uiridis & caules simul tundes, succoque eorum corpus perunges. Ad ardentissimam febrem, herbam quæ dicitur Iouis barba, coteres, ac succum eius exprimes, & miscebis cum cinere aquatica tanze, & addito oleo rosato perunges, tunc ægrum cooperies, inde somnus irruet, & ardor compescetur. Item ad febres. Axungiam leoninam manu subiges, & totum corpus perunges. Ruta item cum oleo subacta totum corpus perunges. Lilij radices tres aut quinque, croci den. V. macerabis in aquæ quartario uno, & ouorum tribus, uitellos teres bene, & adicies olei rosati quantum sufficiat, & inde totum corpus perunges, præter manus & pedes. Ut febrem tollas: Nucleos tritos ex aqua calida dabis bibere. Itemque ut febres foras eicias. Siliginem in aqua recentem macerabis, & teres in mortario cum tribus ouis duris, & panno induto ad stomachum ligabis. Si quis uero febres patitur, & fatigatur aut angustias patitur, dañlos quam plurimos & adipem aut recentem aut uetustum in recenti aqua macerabis, donec exallescatur, deinde in mortario teres, ut unum corpus fiat, & panno induces quasi cataplasma, & stomacho impones nocte, sed prius dañlos tritos in careno aut fapa macerabis. Ut febrem tollas, & ut ex infirmitate pallidum ad bonum colorem perducas, canina & lupinos dulces ieiuno in cibum dabis. Succum item calamenti & oleum rosatum æquis ponderibus comiscebis, & sic perunges. Itemque herbam, quæ uocatur canis lingua, mense Iunio tundes, & uua exprimes, succoque eius ægrum perfundes.

Hemitritico depellendo.

Cap. II.

RANVLAS paruas uirides capies, & aperto uentre uiuarum harundine, intestina auferes ac proijcies, illas uero mittes in stagnatum nouum & frigidum: quibus sublatis, mittes in oleum, ceram & facies cerotum molle, & ab auribus usque ad pedis ungulas triduo perunges, & non lauet, sanus erit: quia uulnere exiit per corpus, a quibus cito liberabitur. Potio ad hemitriticum, siue ad teuticos. Croci denarios duos, nardi duos, absinthij pontici duos, enule tres: quæ omnia cribabis, & cum opus fuerit, dabis cochlear dimidium in aqua calida. Potio. Recipe costi denarium dimidium, folij denarium unum & semis, spicnardi duos, croci tres, semperuiue cauliculum unum, aut certe prout uideris, magnitudinem cauliculi dabis cum aqua calida. Herbam camomillam cum rosa sicca coques, & ipsam aquam cum colaueris mittes camomillinum oleum, & farinam lini feminis coques & uteris tepido, sed alij tantum de farina hordei & lini feminis & oleo camomillino faciunt: alij dañlo, camomillam & melilotum aqua infundunt, & coquunt, in qua mittes farinam lini feminis & hordei, coquesque, & ita cataplasmas, sed cum qui magnis laborat febribus. Trochiscus ad hæc & ad febricitantes, ut non sentiant: ad ardorem stomachi, ad febres, & ad solis ardorem nimium. Recipe succi glycyrrhizæ drach. sex, feminis cucumeris hortensis quatuor, draganti duas, quæ teres singillatim, & permiscebis cum albo ouorum, & facies catapotia.

Febribus periodicis medendis.

Cap. III.

IEC V R delphini ante accessionem gustandum datur. In aselli piscis capite lapilli, qui plena lu

C. PLINII SEC V NDI

na inuenti sunt, alligantur in linteolo. Vtile est inungi oleo & sale. Cancris fluuiatilibus tritis in oleo & aqua ante accessionem perungi oportet. + Oculus item lupi dexter falsus alligatur, ante meridiem quoque dantur heminae tres potui, in quibus additae sunt guttae tres sanguinis ex uena asini, quam in auricula habet. Recidivas autem febres prohibet lacerta uiridis uiua alligata in uascello quod eam capiat. Ty-xopenta ambrosia ualde optima. Recipe lithargyri li. I. rodini I. mellis I. sed prius facies cerotum, postea mittes lithargyrium, & feruefacies ut supra fortius, leuabisque de foco, & cum spatha agitabis donec refrigescat.

Quotidiana curanda. Cap. IIII.

D A B I S bibere mentam tritam ex aqua cyathis duobus, statimque sanguis e naribus exit. Costum tritum & admixtum oleo ante accessionem perunctos a febris liberat. Beta agrestis cum oleo rosato totum corpus perunges. Itemque rutae succum cum uino bibat qui potest, quia uehementissimus est. Ad horrores. Betonicae denarios sex, aquae calidae cyathos duos ex uino austero sub accessione dabis bibere, & sudabit.

Tertiana curanda. Cap. V.

S V B accessione, pauca grana apij seminis cum aqua calida bibat. Itemque succum trifolij hora prima dabis bibendum ei qui patitur. Folia item de persico & modicum tafari teres, & dabis potionem. Rursumque ante accessionem tria grana coriandri deuoret. Mellicratum item frigidum bibat. Ante solis ortum spongiae africanae cinis ex oleo uel aceto fricti illinitur. Cancris fluuiatilis oculi eruti alligantur, & ipse cancer in aqua remittitur. Pulegij similiter ramus in lana inuolutus ante accessionem olfaciendus datur, aut stratis subditur. + Vrticis autumnalis radix alligatur. Is uero qui eam effodiet, debet nominare eum cui medetur, & quibus parentibus natus sit. Herba quae in fluminibus aut riuis nascitur, alligata in leuo brachio, quid sit nescienti, tertianas discit. Legi autem debet ante solis ortum, sic ut eum qui colligit, nemo uideat. Aranci tres cuilibet emplastro infricantur, idemque emplastrum ut liber in aluta, tanquam anacolina imponitur. Ante accessionem quoque aquae frigidae decem unc. bibuntur.

Quartana curanda. Cap. VI.

VINI optimi Spateni uel pecinum, uel puto Hadriani Aphriue, seu burdi gallici pond. nouem pensabis, hinc quotidie in maiori calice potionem dabis uini calefacti ieiuno, donec totum bibat, & sanus erit. Parum croci quantum tribus digitis leuatur, teres, & ex aqua calida dabis sub hora accessionis iam suspecta. Communiter autem ad omnes typos facies pannum talem. Recipe axungiae lib. unam, picis unam, absinthij tenelli unam, primumque teres absinthium & dehinc picem: postea simul omnia in pilula tundes in modum ceroti, & panno illita, per totum pectus & stomachum ac uentrem pones, habendum iugiter quinque diebus ac noctibus. Cataplasma ad quartanas. Recipe farinae baccarum lauri sextarium unum, foenugraeci unum, farinae lupi unum, saepe heminam unam, carycas numero triginta, oleum laurinum ad unguendum stomachum habebis, prius uero sacculo de furfure per quatrduum souebis, & sic cataplasmasabis. Apocis thermauticus ad quartanas. Recipe terebinthinae drach. sex, ceras similiter, mellis ceruinae similiter, guttae ammoniaci similiter, galbani similiter, aphronitri similiter, hyssopi uncia una, piperis unam, myrrhae unam, uini cyathos duos, mellis Attici duos, olei ueteris drachm. septuaginta, irini sextarium unum; soluta uero resolues in olla, & sic mittes ficca, trita & cribrata, & sic omnibus permixtis uteris. Ad quartanas expertum. Recipe castorij sex, panacis regij sex, opij sex, uisquam duas, mellis quantum sufficit, dabis ante horam dimidiam accessionis ad magnitudinem fabae Aegyptiacae cum uino mixtu. Caput clauis quo aliquis in crucem fixus est, alligatur panno. + Fimbubuli cinis spargitur. + Vrina perurini illiniuntur primi digiti in manibus & pedibus. Leporis cor alligatur; coagulum quoque eius bibitur ante accessionem. Leonis quoque in cibo datur. Viperae etiam caput abscissum in linteolo alligatur. Muri uiuo rostellum primum & auriculae summae praeciduntur, & in roseo panno alligantur, & ipse murus dimittitur. Ranae in triuio decoquantur cum oleo, carnibusque earum proiectis & oleo utuntur ad unctionem. Alij elixi caput unum cum lasare tritum obulo in uino austero bibitur. Hirundinis uero fimi drachma una trita ex lactis caprini aut ouilli aut passij cyathis tribus ante accessionem propinatur. Rubet & ranae cor uel iecur alligatur in panno leucopaeo. Semen anethi tribus digitis comprehensum, & circa arborem licio alligat, & iuret per ter panem & salem. Crastino mihi hospites uenturi sunt, scipite illos, hoc ter dicat.

Lethargicis. Cap. VII.

E X quibus lethargicum deprehendis? ex febre acuta cum sensus oppressione, aut ut difficulter, aut nihil sentiat, pulsus magno, raro & inani. Vnde lethargia dicta est ab obliuione mentis atque corporis uagatione. Graeci enim ad hanc obliuionem, aegias uagationem uocauerunt. Hos itaque tali ordine curabis: ferulam accensam naribus ad moueto, fumigatione facta si repente eger hunc morbum incidit, sicut alijs usum est, celeriter emendabit. Nepeae succus ex aceti parte una mixtus & capiti fronti que illitus

illius lethargicos dormientes excitat. Euforbium cum castoreo suffumigatum excitat. Calchantum item cum aceto tritum, & naribus illitum, dormire non sinit. Euforbium quoque ex aceto tritum, & naribus conficatum, excitat. Capilli item mulieris incensi, suffumigatione sua liberant dormientes. Satureia & cum aceto capiti frequenter infusa excitat. Caprina similiter pellis, uel cornu eius combustum, idem facit. Sanguis testudinis fronti illinitur. Peucedanum cum oleo rosato & aceto tritum & incoctum naribus inditur, & iam uidebis dolores capitis emendare. Ruta item ex aceto odoratur. Vis imbrum quoque capiti ex aceto infunditur. Vrtica etiam fronti & pedibus illinitur. Cimices septem triti in aqua cyatho uno dantur, si uir sit: si puer, eodem modo aquae cimices quatuor. Spondilium capiti instillatur. Mustelae quoque iecur exurit ad olfaciendum. Pulmo pecudis calidus circa caput alligatur. Palumbi item tres putrefacti lethargum excitant odore. Tolles item uulturis neruos, & eos circa manus laborantis ligabis. Apostolicum rotundum cum adipe uulturino teres, & ex eo manus fricabis.

Somno asciscendo. Cap. VIII.

OPIVM in modum fabae cum oleo rosato mixtum, naribus illinitur. Coriandri quoque semen tritum, colatumque, & ex aqua calida potui datum, prodest. Item ad eos qui non dormiunt: Styraeis unc. tres, glycyrrhizae tres, croci unam, opij tres, castorij unam, lycij Indici duas, spicernardi duas, mellis pondera duo. Haec omnia trita commiscebis, & naribus fronti que illinies. Glycyrrhizae unc. tres, styraeis duas, croci unam, opij duas, castorij duas, lycij duas, zinziberis unam, piperis longi unam, spicernardi unam, mellis pondera duo, conficies & uteris ut supra. Confectio diacodion ad haec, & ad febres. Codias unam, capita papaueris numero triginta infundes in aquae sextariis tribus per triduum, postea ad tertias decoques, addesque in aquam ipsorum, mellis partem dimidiam, hoc est sextarium unum & semis: dehinc coques ad carbonem uel lignem sine fumo, donec in mellis pinguitudinem redigatur: & hoc dabis ad noctem glutientum singula uel bina cochlearia. Papauer ex aqua elixatum ad tertias bibas, statim somnum adducit. Ad somnum saluabis aegrum sic. Opij denariis tribus, myrrhe, croci, thuris ana denario uno, cum cera mixtis pastillos scipulares facies, & praecalefactos umbilico impones; quae res tam somnum quam uentrem molit. Antidotum anethinum ad somnum colicis expertum. Recipe anisi uncias duas, apij feminis unam, iulquami duas, opij semiunciam, mellis quantum sufficit, dabisque aduersus uirtutem patientis integram potionem ad magnitudinem fabae Aegyptiacae cum aqua calida. Hypnoticum ad somnum. Recipe bdellij drac. quatuor, lybani quatuor, galbani quatuor, rosae siccae quatuor, myrrhe uero duas, croci duas, castorij unam: quae cum oleo rosato teres ad spissitudinem mellis, & induces in nares in frontem & in aures.

Phreneticis sanandis. Cap. IX.

EX quibus signis phreneticum deprehendis? ex febre acuta cum alienatione, & manuum uano errore, ut aliquid suis digitis apprehendat. quem ita curabis. Succus rutae ex aceto tritus, & temporibus instillatus, mire prodest. Castorio & peucedano ex rosaceo peruncto capite somnus accedit. Allium elixum in cibo datur. Suffumigatio lae succide prodest. Hyeme etiam oleo anethino caput infunditur. Ad phreneticos, siue ad eos qui uertiginem patiuntur. Hederae ramum cum suis folijs teres adijciens oleum, eumque cerebro superfundes, & tempora unges. Ad uertiginem capitis. Rosam in aceto fricabis, spissamque capiti impones. Ad insanos & mente motos, & si qua alia uitia in capite habuerint, herbam tythimallum caprae lactariae solum manducare dabis: postero die mulge, & lac eius ieiuno dabis, qui uexatur, nam cordialum sine mora emendat. Grillis adipe frontem lini, & dormit. Pellem de lepote albo nescientis sub capite pones. Lauri folia trita nescientis capiti supponas, & dormit. Semen lactucae ac papaueris cum dactylis tribus in aqua coques ad tertias, dabisque bibere, & ante expectatum, dormit. Spondilium capiti infunditur. Pulmo pecudis calidus circa caput alligatur.

Ad epilepticos. Cap. X.

EX quibus epilepticum deprehendis? ex accessione quae eum tenet, quemque ita curabis. Vulturis cerebellum teres cum oleo uetustissimo, & post illud cetriz uel balsamo, ac repones, & ex hoc in modum grani fabae cum portione uini ueteris potui dabis per dies septem aut nouem: balsamum autem tunc mutes pro cetriz, si odorem non fert. Herbam fauinam dabis triduo in uncias aquae tribus. Mustelae hepar sine felle assum dabis bibere cum aqua uncias quatuor, hocque cum biberit, si intra septem dies non fuerit uexatus, scias illum sanum esse. Cerebellum quoque agni assum dabis ad manducandum. Medulla cameli cum oleo rosato teres, & frontem stomachumque perunges. Apoplegmatisimus. Recipe itasifagriz drach. quatuor, salis ammoniaci unam, pyrethri duas, sinapis quatuor, exinde factum puluerem diuides in partes tres, & cum maffica per triduum mafficet unam partem in die.

Cardiaca sanandis. Cap. XI.

RUTA ex aceto & melle cum farina hordeacea mixta, & pectori imposita, emendat. Vinum

— 200 —
Singen.

Cap. XII.

Rénolia.

Topica.

Ad favorem pium.

Ευθύνος,

2

;

day camp

... and ...

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

uinum exinde temperabis. Cataplasma ad idem. Recipe fimi bubuli siccī pulveris partem maiorem, & farinę hordei minorem; quę miscebis & coques ex mulla, & induces panno, qui cingat totum ventrem, & superasperges sulphuris triti minutissimę cochlearia tria. Cumque innerso panno venter caluerit, de subtus manu confricabis: & cum uideris sustinere posse, repones fascias, & usque in diem alterum non tollas. Cumque manę tuleris, sic alterum impones, usque dum tumor cesset. Sanę bibat ieiunus apozymum mixtum cum apozymate. Ad hydropidis durtiam. Salis & milij æquas partes feruefacies, & in facello impones, cum iam humor eruperit. Lana cum sale & oleo tepido in uulneribus imponitur. Item ad nimiam sitim, quę ex hydropisi nascitur. Corticem ulmi interiorem in aqua decoques ad tertias, & ipsam calidam uel puram, uel cum uino, quoties sitierit, bibat. Stercus bubuli recens cum acetę cataplasinabis. Ad hydropicos. Anisi unc. septem, amei sex, cymini sex, diffinadō sex, absinthij sex, sandonice sex, cardamomi sex, brathei sex, lybani sex, resinę frizę libras sex, cerę tres, olei glaucini quantum sufficit. Epithema hydropicis. Recipe carýcarum pinguium podo quinque, nitri lib. unam, hylopi gummi unā & semis, agarici unc. sex, camileę V. absinthij sex, celuci sex, coconidij purgati tres. Carýcas autem tundes, donec cerotum efficiatur: postea coconidium purgatum teres, & miscebis cum carýcis diligenter: post hæc sicca trita omnia mollissimę permiscebis, & addes oxymel terendo quandiu ad modum malagini efficiatur, & uteris. Vrinam item in porione sæpius dabis, mirum præstat auxilium. Hæbu radicem sine medulla ex mulla sextario dabis bibere, & in sole deambulet. Itemque uomitus canini uentri illiniuntur.

Paralyticis curandis. Cap. XIII.

N V L L V S tam idoneus est paralyticis cibis, quam bosca rubea. Salubriter ex his bibitur, sed ut usus sequatur balnei. Aliqui solent folia temperare addito euforbio, pingue glyrium, & foricum decoctorum ex aqua dant edendum. Calasticum ad paralytim. Recipe euisci unc. quatuor, ptisanę quatuor, lini seminis quatuor, foenugręci quatuor, meliloti quatuor, quę coques in aqua fontana donec fiant spissa, exprimes, & mittes succi lib. unam, olei communis unam, cerę unam, seui taurini unc. sex, resinę frizę septem, resinę terebinthinę quinque, hylopi medicaminis duas, galbani unam & semis; coques primū oleum cum succo, lento igni, donec excoquatur pars dimidia succi, & colabis, dehinc mittes reliqua infra scripta atque simul miscebis, ut soluiatur. Vnctio ad paralyticos. Recipe baccarum lauri tritarum & cribratarum unc. unam, cymini tuss. & cribrati unam,atureiz non tuss. sex cum furculis rutę sicę tribus, quę infundes uini ueteris sext. quinque per triduum, postea miscebis olei anethini nō flores sextarios octo & semis, coques lento igne, agitanis indefinenter. Cum autem uinum consumptum fuerit, colabis illud, & expressis herbis, ex eo oleo unges manę & sero eum, qui patitur. Lino autem non utatur nec in lecto, hoc etiam oleo in balneo uti debet, quando sine febre est. Abstinerē uero oportet a bubula & porcina carne, pisce, & caulibus, & maluis, & utatur pipione molli ac reliquis holeribus: si aquam calidam bibere non possit, uinum accipiat aquaticū: quod si hyems fuerit, aut infirmitas grauior uel senectus, addes hinc oleo balsami primi unc. tres, piperis unam. Acopum ad paralytim & neruorum tensionem & dolorem, & ad omnem perfractiōem. Recipe nardi lib. unam, olei hirini unam, laurini unam, cyprini unam, styracini sex, panacis unam, castorij unam, euforbiј semiunc. adartici similiter, piperis similiter, ammoniaci similiter, medullę ceruinę unciās quatuor, galbani duas, propotet unam, butyri tres, hylopi ceroti duas, cerę lib. unam, olei sansuci unci. sex, cucumerariј sex, resinę terebinthinę nouem. Conficies uero sic. Euforbium, adarcam, ammoniacum, piper, castorium, insimul tundes, & cribrabis galbanum & propoleium, malaxabis contra focum, ceram, & medullam cum omni oleo resolues, & admiscebis puluerem, dehinc panacę tritum cum modico aceto, postea galbanum & propoleium. Ad paralyticos & ad omnem neruorum causam seu contractionem sine stuporem. Recipe farinę fabę lib. quatuor, picis frizę quatuor, pulueris uistri duas, piperis duas, aceti quod sufficit. Hęc pariter coques, & in modum cataplasmae grosso induces, & locis dolentibus seu contractis impones, & calabricis ligabis bis in die per triduum: & intermisso uno die, iterum repetes per triduum, post hæc uteris unguento infra scripto. Vnctio ad paralytim & ad omnes neruorum causas. Recipe cerę unc. sex, terebinthinę IIII, hylopi ceroti unam, ammoniaci IIII, piperis unā & semis, nitri septem, pyrethri semis, galbani unā & semis, melis similiter, olei ueteris lib. unam, euforbiј unc. tres, cyperi quatuor, olei irini unam & deñ. XVIII. uini uerę redacta, pyrethrum, euforbium & cyperum similiter in puluerem redacta permiscebis, & resolutis certeris speciebus superfundes in mortario, & pariter teres, & cum opus fuerit, uteris, fricabisque uehementer bis in die, & lanis inuolues & calabricabis.

Podagra depellenda.

Cap. XIII.

M V S C V S qui in aqua nascitur, ritus & impositus prodest. Farina frumenti cocta ex aceto imponitur, utiliter dolor perungetur, in quo decocta sunt ranarum intestina. Ranz rubetę cinis cum adipe ueteri. In palustribus lens nascitur in aqua non profluente, refrigeratoria sine comparatione, hæc imponitur uel per se contrita, uel cū polenta. Adipe piperino, sanguine quoque milui pedes perunguntur. Euisi radices coctas cum axungia miscebis, & cataplasma pedibus impones. Matuz erraticę coctę,

pifas, cum fale, pedibus impones. Vrtica trita cum columbarum sanguine apponitur. Lenticulam co-
 quis, teris, adiectis mellis cochlearibus tribus, & pedibus impones. Adipe uitulini marini pedes perungun-
 tur: cuius & pellibus calciari conuenit. Ranz aquatice discerptæ subinde recentes imponuntur. Lenit
 & plantago, cum axungia. Limus aquaticus cum oleo subactis mire prodest. Vrsino adipe, seuo tauri-
 no cum ceræ pari pondere decoctis utuntur. Bubulum finū cum aceti fecce magnificant. finū similiter ca-
 prini cinis cum axungia ueteri prodest. Cum uero pluribus malagmatis utantur hi, qui hoc malo labo-
 rant, prout illa apud unumquemque commendat monstrantis auctoritas, ponam compositionem de qua
 nemo qui usus est, questus est. Pici bruti uncias sex, & scrupulos septem, ceræ ponticæ tantundem, re-
 sinæ frictæ tantundem, galbani scrupulos undecim, ammoniaci semiunciam: omnia hæc in cacabo nouo
 componuntur, & coquuntur ad unum feruorem bonum: in mortario autem teruntur hæc. Euforbij
 unciam unam, styptinæ scyllotis tantundem, thuris pollinis scrupulos nouem, opopanacis nouem, sellis tau-
 rini octo, salis ammoniaci sex. his suffunduntur aceti acerrimi cyathi tres: tum quod in cacabo coctum est,
 mortario imponitur, & pistillo permiscetur. Cum eo utendum est, alutæ illinitur. quod si induruit, mo-
 dice ad ignem calefactum manibus perfricabis, & sic mollescet. Hoc medicamentum non inquinat uires
 in usu, non perdit, appositum reseruari potest. Sunt & qui potionem, podagra sint liberati. Cuius compo-
 sitionem subiiciam, & quemadmodum ea sit urendum, pandam. Cametriz lib. unam, centauriz unc. tres,
 aristolochiz rotundæ tres, stichadēs tres, agarici quatuor, cyperi seminis quadrantem, aloes unc. quatuor,
 & hæc pondera singularum specierum expendi oportet, & trita cribrataque permisceri ex mellis Artici
 lib. sex, & in uitreo uase recondi. Vfus autem huius potionis talis esse debet, ut sumatur à ieiunis qui be-
 ne concoxerint, & per numerum dierum anni adiecto uno die, si dies continuari non potuerint, propter
 cruditatem, aut languorem, aliquamque causam, quotquot intermissi fuerint, totidem restituuntur. Potio-
 nis uero mensura erit, ut denarij argentei bibatur pondus ex tribus cyathis aquæ, semel in die. Radix
 cucumeris erratici ex aceto coquitur, & imponitur: mitigatur, si secum habeat is qui uexabitur, pedem le-
 poris uiuo albidissimum. Peractis singulorum membrorum malis & eorum remedijs, quæ improviso solent
 accedere, percurramus eo ordine, quo una quæque res succurreret: Incipiemus itaque à re podagræ pro-
 xime. Vrtica trita cum columbarum sanguine apponitur. Porcellum dierum undecim, nec minus
 nec amplius, occides, & coques diligenter, ita ut si fieri potest, ossa decoquantur: quibus sublatis, teres car-
 nes in mortario in modum cataplasmi, & impones. Expertum. Stercus duorum uel trium porcello-
 rum, quod inuenitur in uentre occisorum, ferueat in sartagine cū aceti sextario uno, & in ipso dolore pe-
 dibus imponatur. Incipientem podagram mirifice discutit. Betæ combustæ cinis, si leuissime admixtus,
 sanguine hubulo imponatur. Ad impetum doloris. Salis sextarium unum solues cum aqua tepida,
 ita ut totum liquefiat: deinde mites aceti sextarium unum, & agitabis diligenter: postea mites aquam fon-
 tanam frigidam & temperabis prout delectat, & spongia fouebis diutissime loca dolentia, & terges ac li-
 nies medicamento subscripto: defruti partes quatuor quasi tessellas, & aphronitri quatuor pastillos nume-
 ro quinque teres diligenter, & addes ouum unum. & rursus tandiu teres donec in modum ceroti molis
 fiat, & linies penna: quod cum siccauerit linteum superpositum, caleretur. Ad podagræ dolorem &
 tumorem. Fimum columbinum, ammoniacum, carycas ægre natas, & nitrum pari portione tundes &
 cribrabis, admixtis olei cyprini & melini singulis semiunc. & omnibus in unum mixtis, in modum mala-
 gmatidis impones, dolorem & tumorem tollet, & podagram annorum decem sanabit. Foenugræ cochlea-
 ria duo cum aceti cochlearibus duobus teres diligenter, & inductum linteo impones. Folia item lactu-
 carum purgabis, ita ut medium thyrsium & uenas tollas ac proicias: folia uero elixabis in aqua, infundes
 panem, teresque semotè. Postea simul folia cocta mollissime teres, & tepefactum cataplasma cum linteo
 pones. Ceratōrium podagricum expertum, quod facit ad arthricos. Recipe seui hircini lib. unam,
 butyri unc. quinque, lini seminis, foenugræ, althææ, anethi, rosæ, melliloti ana libram unam; soluenda sol-
 ues, & permiscebis omnia, malaxabis & uteris. Emplastrum faciēs ad podagricos, quod exiccat optime.
 Recipe niolybdæz libras quatuor, salis ammoniaci duas, typpidos sideron: quod & facit ad sciatos.
 Defrictum & oua cruda & aphronitrum teres diligenter, & tepefactum illud linteo illitum impones.
 Herba item euisci tusa cum axungia ueteri, & imposita, tertia die sanabit. Huius herbæ experimentatam
 uim plures auctores annūciant. Cucumeris syluatici radices in aceto coctas teres, & impones podagræ
 arque articularum morbo. Præsens enim remedium est, & melius si oleum simul pari portione miscue-
 ris. Torpedo nigra marina uiua in oleo putrefiat, siue in eo uiua coquatur, ex qua cerotum facies, de
 quo manus & pedes confricabis, dolorem sine mora tollit, & nervos liberat: quod si fel eius infricatur pe-
 dibus, dolore similiter carebunt, ita ut corium eius superponas: quod qui ei detrahet, ozimō uindi ma-
 nus confricet. Item pullos ciconiarum teres in olei dulcis sextarijs septem, decoques ad tertias, con-
 labisque, & in ipsum oleum adicies adipis ursini libras tres, seui taurini uncias sex, medullæ ceruinæ se-
 ptem, olei laurini sextarium unum, myrtini unum, stercoris ciconiæ unciam unam & semis, conficiesque, &
 repones & uteris. Ad aliud melius, quod in annos septuaginta curat. Fimum ciconiæ & axungia
 ueteris partem unam commiscebis, & uteris, & miraberis. Podagræ pituita siue sanguis ubique
 se fixerit, & dolorem nimium fecerit: Foenugræcum in olla noua ex aceto acri siue urina humana
 discoques, & teres in modum ceroti, quod linteo inductum quotidie impones, sæpius renouatum, quia
 cito siccat; & dum recens est, uim habet, & sanum ocyus facit. Alij uinum & oleum adijci debet
 re tradunt, & sic decoqui. Recipe ceræ libram unam, olei ueteris cinarij unam, resinæ frictæ, siue res-
 rebinthinæ

rebinthinæ, siue pituium, qualem inueneris, libram unam, nitri Alexandrini unam & unc. tres, aphronitri albi uncias sex, lexiuæ qua utuntur saponarij, libram unam, uncias quatuor. Nitrum uero & aphronitri teres diligenter in mortario, addes lexiuam: sed paulatim augendo atque terendo, donec totum expēdas, & fiat tanquam cerotum. postea oleum, refinam simul solues in trulla, ac mittes super species prius tritas; & rursum simul omnia teres, donec diligenter misceantur. ex eo induces panno, & suppones pedi dolenti, donec aperiatur ex semetipso, & humor digeratur, ita ut aliud nihil ponas, nisi manē uel sero foueas prius emplastro mutato. & cum humor cessauerit, tantum siccum superponas linteum, usque dum sanetur.

Cerotum ad hæc. Recipe fornugraci bene purgati sextarios quatuor, quos infundes aqua, lini seminis duos, infundesque seorsum, euisci pond. quinque seorsum, maluæ radicem plurimam: quæ omnia in aqua pariter coques, ita ut ad maximam molliciem perducas. postea colabis, & mensurabis ex eo sextarios octo, admiscebis olei quatuor, baccarum lauri tusarum unum in uase duplici diutissime coques, donec ad mensuram olei reuertatur, colabisque, & mittes refinæ fixæ unc. quatuor, laricis quatuor, hyssopi ollaris quatuor: diu agitabis, donec frigidum fiat; de quo, dolenti bis uel ter in die pedes confricabis, hocque facies etiam cum dolet bis in die. Cerotum ad hæc. Recipe herbæ personatæ succi & uini ueteris sextarios duos, medullæ ceruinæ uncias quatuor, seni ceruini quatuor, olei rosati quinque, ceræ duas, succum autem ac uinum & oleum simul miscebis in cacabo nouo fictili, & ad carbones ad tertias decoques, agitans cum canna: Scuum uero & ceram rades de canna minutarim & supermittes: Cumque liquefactum fuerit, leuabis, & in aquam frigidam pones: & dum sese colauerit, quod supernatat, manu colliges; uinum colabis & proijcies: quod uero in fundo de succo inueneris, exprimes, & cum eo quod summo tuleris, simul in mortario conteres, & inductum linteo appones dolenti loco. Emplastrum expertum. Recipe ceruicæ uncias tres, spumæ argenti tres, ceræ puniceæ sex, axungie porcine ueteris colatæ lib. unam: cerusam uero & spumam in Thebaico mortario tandiu teras, donec in puluerem redigas: ceram autem & axungiam solues, & puluerem totum paulatim admiscebis, & leuato cacabo mittes manum, & agitabis tepidum, donec omnia soluantur, & sic in patellam fundes ut regeret, serueturque mundè: & cum opus fuerit, malaxatum oleo rosato imponatur. Confectio medicamenti ad dolorem pedum. Nitrum Alexandrinum sine lapidibus teres fortiter, & admiscebis oleo Saurinensi, & coques leniter, donec se colligat & denset, inducesque linteo & superpones. Hoc enim medicamentum dolores qui sunt intrinsecus citius foras producat. Si autem felicitus est qui patitur, pro oleo saurinenfi rosaceum mittes. Ad hæc compositio.

Recipe anethi uiridis uncias septemdecim, scyllæ uiridis septemdecim, olei gremialis sextarios septem & semis, aquæ septem. In oleo uero & aqua macerabis acetum & scyllam per dies tres, postea simul coques, donec aqua deficiet, & colabis oleum, & mittes ceræ nouellæ libras duas & semis, seui porcini recentis duas, medullæ ceruinæ unam, seu seui ceruini duas, liquefacies & superpones pedibus. Aliud ad hæc.

Recipe croci uncias duas, ceræ septem, spumæ argenti tres, olei rosati libram unam, seui porcini recentis unam, mellis uncias quatuor, lini seminis integri pisati & infusi succi treis: spumam autem teres, & succum mittes lini seminis, in quo crocum simul triueris; dehinc omnes species reliquas in cacabo resolues & agitabis: quæ cum se miscuerint & refrigerauerint, supermittes hæc in mortario, quæ trita sunt & commiscebis, factumque medicamentum panno impones. Aliter ad dolorem pedum seu manuum. Recipe ceræ puniceæ sex uncias, aphronitri candidi duas, stactis & olei rosati libram unam & semis, gummi saurinen-

sis uncias sex, styptiriz tres. Styptiriam uero cum aphronitro teres molissimè, ceram solues cum oleo, & puluerem admiscebis, addito succo lini seminis, & agitabis donec se misceat uel refrigeret; hinc malaxatum ad uaporem, dolenti loco corporis impones, & linteum superpositum fascia ligabis. Ad podagræ medicamentum. Recipe seui taurini libras duas & semis, refinæ marmoreæ similiter, medullæ ceruinæ uncias nouem, lapatij duas, mentæ duas, marubij unam, gypsi tres; herbarum uero puluerè & gypsum in unum rediges & commiscebis: medulla uero, seuum, & refina miscentur: & omnia mixta faciunt medicamentum. Confectio medicaminis ad pedum dolorem. Recipe succi symphoniæ herbæ sextarios sex, & cetræ tres; quos miscebis & decoques ad tertias; post hæc mittes oleum saurinense uel Aphrû ad sextarios tres, adijcies & refinæ fixæ libras duas, refinæ marmoreæ duas, axungie porcine sine sale duas: Cum omnia hæc soluta fuerint, colabis ea, & postea addes ceræ libras duas, & soluta iterum simul bulliant, reponesque in cacabo fictili. & cum non dolet, quotidie inde leniter unges: quando dolor paulò amplior fuerit, amplius confricabis. Emplastrum armozos, bene faciens ad tumorem.

Recipe lithargyrij drachmas septuaginta, porcini adipis septuagintanouem, coques lento igni. Emplastrum diastotion ad podagram. Recipe lexiuæ uncias quatuor, nitri Alexandrini libram unam & uncias quatuor, ceræ libram unam, terebinthinæ unam, olei ueteris unam. Emplastrum podagricum. Recipe lithargyrij libram unam, ceræ unam, cianij uncias duas, chalcanthi cyprij duas, nitri tres, salis fusci tres, olei ueteris libras tres, yu uncias tres, aceti quod sufficiat ad sicca terenda: coques amolentum. Item ad hæc. Recipe herbæ personatæ tusæ, & manibus expressi succi sextarios duos, medullæ ceruinæ uncias quatuor & semis, ceræ ruberæ spanæ duas, olei rosati quinque, uini ueteris saurinenfis sextarios duos: omnia autem in oleo separatim calefacta, in stagnato coques, ita ut omnia soluantur. post hæc depones stagnatum super aquam fontanam: & cum regelauerit, species tolles crustocalatas, & in mortario marmoreo diligenter teres, & rosaceo perunctis manibus miscebis. Medicamentum ad hæc, quod appellatur dramas. Recipe olei ueteris libras duas & semis, spumæ argenti duas, cerusæ unc. sex, ceræ sex, guttæ ammoniaci tres, galbani quatuor & semis, refinæ laricis libram unam, meconij uncias

C. PLINII SECVNDI

duas. Est autem quàm optimum & probatissimum. Ad podagricos. Micas infundes in aqua & teres, addesque coriandrum, aphronitrum, & lacrymam oui, & modicum olei, & tepidum impones super pedem: Iterum lenies, & superpones maluarum folia, & sic ligabis. Si autem linteum posueris, arefcit. Emplastrum ad dolorem pedum. Micas panis in aqua infusas teres, & adiecto oleo coques, & sic ponas in linteo tenui. Item aliter. Fœnugræci farinam in aqua coques, & post infusum panem teres, & miscebis; quo illitum linteum impones, adiecto modico seuo porcino. Itemque aliter, ut lomentum fabæ subtile coquas, & adiecto seuo porcino, linteo illitum imponas. Radices maluarum coctæ, contusæ, & superpositæ, idem præstant. Herba quidem quæ polycarus dicitur, in aqua coctæ & superposita bene medetur, humorem uaporare facit. Ad nodos soluendos. Recipe lib. unam, terebinthinæ lib. unam, aphronitri unâ, galbani unc. quatuor, propolæ quatuor, guttæ ammoniaci octo, lexiuz quantum sufficit. Vntio Fauij Clementis ad homines resolutos, & ad omnem membrorum resolutionem siue podagram. Recipe olei sauinensis lib. duodecim, terebinthinæ unam, radicis cucumeris agrestis duodecim, ceræ unam, medullæ cerninæ unâ, galbani I. ranas maiores de flumine sex; in oleo uero radices cucumeris fricabis, postea colabis, & sic mittes ranas in sportellam palmiceam, & coques in oleo, donec discoquantur, ossaque pura remaneant. Istud medicamentum Valerius Paulinus sic conficiebat. Recipe samisuci libram unam & semis, microcrocini unam, folij unam, balsami unc. tres, sanguinem decem testudinum. Si uero crocinum non est, syriacum mittes, sanguitudinum in samisucum colligens. Vnguentum diacedrui ad dolorem pedum uel manuum. Recipe cetria duo, peucedanum, aristolochiam rotundam & rosamarinum, ita ut hæ tres species contra cetriam pensent, olei sauinensis libras octo; quod coques uase duplici, donec oleum ad terrias decoquatur, colabisque oleum diligenter, & cera addita, facies cerotum, ex quo si laueris per diem, secundo unges: si minus, semel. Trochiscus phycus ad dolorem suspendendum podagræ uel chiragræ. Recipe terræ Alexandrinæ lentæ unc. duas, thuris masculi unam & semis, herbæ lentigle quæ in aqua nascitur, succi cochlear unum, aceti acris duo. Hæc omnia simul teres & penna illinies, dolorem uehementer leuat. Malagma. Recipe costi unciam unam, folij unam, zinziberis unam, piperis albi unam, iulquiami semis unam, sulphuris uiui unam, picis quinque, petulæ portionem unam, nitri assi unc. unam, ammoniaci unam, alcyonæ unam. Ex his quæ sicca sunt, tundes & cribrabis, & cum primum pix & petulæ resoluta fuerint, mittes ammoniacum, ut simul soluantur; agitabis diligenter & commiscebis. deinde cum tepesceri cœperint, mittes quæ tusa sunt paulatim, & agitabis diligenter, & supra marmorem aqua lotum fundes medicamen; quod tepescit colliges: uteris autem sic. Primum cataplasma facies de nitro albo, & bulbis tritis diligenter mixtum, temperatum cum uino leni, ita ut spissum sit; quod tepescit ad carbones, & panno illitum superpones, & post triduum solues, post quod stanti malagmata superscripta, alutæ induta impones, medicamentumque methæ quod facit post impetum podagræ. Ad confirmandos pedes. Recipe picis spanz pond. unum & semis, spumæ argenti unciam unam & semis, terebinthinæ octo, seni taurini octo, thuris octo, ceræ quatuor, galbani unam & semis & denarios sex, yu unciam unam & denarios sex, opopanacis unciam unam & denarios sex, olei rosati uncias quatuor, olei ueteris decem, uini ueteris quantum sufficit. factum autem medicamentum triduo in uino sit, & postea malaxabis cum oleo rosato, & inductum linteis pedibus appones, donec tumor qui ex dolore reficitur auferatur. Antidotum podagricum. Recipe gentianæ creticæ unc. duas, aristolochiæ longæ duas, & rotundæ tres, myrrhæ trochilitis quatuor, baccarum lauri purgatarum octo, seu pôtici primi unam, spicæ nardi denarios sex: quæ omnia simul tundes & cribrabis. Accipiuntur autem mensibus continuis denarii duo, in aqua calida: Alijs uero mensibus die intermisso, denarii singuli & semis; alijs autem duobus biduo intermisso, sicque facies donec compleantur petitiones CCCCLXV. cætero tempore per singulos menses semel accipiantur, æstimabisque aquam calidam, quantum est uini in calice minore. His autem abstinentum est rebus, propter antidoti huius uirtutem: à porcina, bubula, ueruecina, caprina, pedibus omnium animalium, pipere, liquamine falso, oleo, mentâ, fasciis Alexandrinis, cicere Alexandrino, cedro, raphano, faba, rapis, porro, caulibus, cepis, condito, præter pullino, sine pipere & liquamine, sine adipe porcino: uinum modicum bibat, nigrum uero acinaticum carenum ne bibat, mulierem ante omnia ne contingat: sed & si somniauerit tale aliquid, lauetur, & accipiat potionem: habetur autem cum omni munditia, uel ab euncho in uestibulo horti, uel à puella seniatum. Sane si fortis fuerit accipiens, ut citius curetur, debet unius anni laborem. Hæc autem maxime in cibo accipienda sunt, pulres fungi, arbutus, seu eporeos, liquamine quoque fungorum utatur. Conditum podagricum. Recipe costi uncias tres, folij unam & denarios sex, spicæ nardi uncias tres, zinziberis unam & semis, gentianæ duas & denarios sex, aristolochiæ longæ denarios sex, & rotundæ tres, seminis asparagi unc. duas & denarios sex, pionæ unc. tres, baccarum lauri unc. sex & denarios sex, mellis Attici lib. quinque & semis, uini ueteris sext. octo. Emplastrum podagricum, quod dicitur angelus. Recipe galbani unciam unam, ceræ tres, picis tres, butyri pondera duo, colophoniz duo, saponis duo. Ad podagram. Recipe sâpiz Siculæ lib. unam, guttæ ammoniaci unc. octo, resinæ pituinæ libram unam, ceræ unam, olei ueteris unam, euforbij scrupulum. Tapsiam uero & guttam ante trita, in uino ueteri infundes, tertia die teres diutissimè: resinam autem & ceram & oleum in ollam nouam mittes, uti soluantur, & cum soluta fuerint, mittes in mortarium, ubi tapsia & gutta: & sic omnia commiscebis, & quoniam papula facit hoc ceroto, uteris. Testudinis decollatæ sanguine pedes fricantur. Ranas ad tertias in oleo in olla rudi quandiu in modum ceroti fiant, & exinde pedes unges. Asinum autem duabus hebdomadis fursure cibabis abundanter,

abundanter, & occides, & mox uentrem eius aperies, & pedes qui dolent, in uentrem eius mittes: quod si in principio doloris hoc feceris, sani erunt. Hunc autem uentrem sago molli inuolutum, in sportam pones, ne refrigescat. Ad podagram frigidam, quæ fuerit ac uetustissima. Recipe costi unc. unam, folij unam, zinziberis unam, sulphuris unam, piperis albi unam, iusquamini denarios quatuor, picis duræ semunc. picis liquidæ portionem: quæ uero sicca sunt, tundes, & cribrabis: Cumque pix utraque bullierit, addes quæ tusa sunt, & miscebis diligenter: Postquam uero coxeris, super marmor asperges aquam, & sic effundes medicamentum. quod cum se refrigerauerit, repones in alio uase: & cum opus fuerit, induces alutæ, & sic impones. Antidotum podagricum. Recipe cametrix unc. nouem, centauriz & epicarpi octo, aristolochiz longæ septem, gentianæ ponticæ sex, hyperici quinque, petroselini quatuor, fup pontici tres, albi asari duas, meu adamantici unam, mellis Attici sext. unum. Vntio podagricis. Recipe anserini adipis unc. III. ceræ sex, terebinthinæ III. succi lini seminis decem, colophoniz quatuor, lactis bubuli sex, ammoniaci duas, lybani duas, butyri sex, uitellos ouorū octo: factaque unctione, leniter unges. Emplastrum podagricum. Recipe pulueris rosæ unc. VI. corticis granati VI. miferi III. calchati V. lithargyrii duas, cyperi III. piperis III. ceræ tres, cochlearum ustatum tres, gallæ quatuor, porri lib. I. & unc. tres, panis autopyri lib. I. diacito tres, succi lapatii sext. unum, olei ueteris unum & semis, uini ueteris similiter, aceti heminam unam. Conficiatur autem sic: Prius mittes succum lapatii, oleum, porrum, lithargyrium, cortices granati, & mouebis in foco, quandiu bene discoquantur, & postea mittes diaciton cum cera, & miscebis quandiu unum corpus efficiatur, & sic mittes per partes, dum coquitur, & leuabis de foco. Emplastrum podagricum. Recipe peculæ lib. I. ceræ I. otosanū unc. tres, galbani II. olei ueteris quatuor, colophoniz quatuor. Epixis manethonos. Recipe ceræ unc. sex, colophoniz III. & semis, adipis anserini III. butyri X. olei ueteris XIII. succi lini seminis tres, lactis bubuli XII. & semis, thuris duas, ammoniaci III. ouorū uitellos octo. Item pyxis. Recipe ammoniaci unc. II. lybani duas, teni duas, succi lini seminis quinque, colophoniz duas, lactis bubuli V. adipis anserini tres, olei ueteris quinque, butyri quinque, ceræ tres, galbani duas, oua quinque. Antidotum podagricum. Recipe reupontici unc. duas & den. quatuordecim, aristolochiz longæ unc. unam & den. uiginti, spiczenardi den. duodecim, gentianæ uncias duas & denarios quatuordecim, myrrhæ trochlitis uncias duas & denarios XVIII. betonicæ unc. duas & denarios XVIII. cametrix unc. duas, costi denarios decem, baccarum lauri siccarum unc. duas, folij denarios decem: quæ omnia tundes & cribrabis, & in uase uitreo recondes, & accipiat qui patitur, per totum annum, diebus exceptis, quando sunt cynocaumata. Portiones uero quas non accepit primo anno, sequenti anno accipiat. Mensura portionis est den. tres. Oportet uero accipientem abstinere a Venere. Lauacro uero utatur in V. dies, sumat uinum nigrum stypticum & dulce, & holera. A cepis uero, cucurbitis, apioque abstineat, & piscibus de stagno, ac fluminalibus. Abstineat quoque ab anseribus & anate, & ab omnibus carnibus pinguibus, a carnibus etiam bubulis & ueruicinis, & ab omni genere leguminis. Antidotum podagricum expertum. Recipe reupontici unc. duas & den. XX. aristolochiz longæ unam & den. XX. gentianæ duas & dena. XIII. myrrhæ trochlitis II. & denarios XVIII. betonicæ Creticæ unc. unam & den. octo, cametrix unc. duas & denarios XVIII. folij semiunc. baccarum lauri siccarum & purgatarum un. duas, pulegij Cretici unam, peucedani montani semiunciam: quæ omnia simul teres & cribrabis, & dabis per singulos dies denarios duos cum aqua calida a Caleñ. Septembris usque ad Caleñ. Maias.

Ad neruos, articulos, & arthriticos. Caput. X. VI.

ARTIC. VI. & frigora & pruinas sustineant, ne adurantur, malo terræ contuso, adiecta axungia ueteri perunguntur. Fimus caprinus in puluerem redactus, & ex melle, acetoque coctus, & pro malagmate impositus, articuloꝝ dolores sanat. Vrsinum fel articulis infricatum, dolorem sedat. Vitulinus quoque siue bubuli fimus recens cum creta argentaria ex aceto coctus, & articulis dolentibus illitus, dolorem sedat. Adeps ite uulturis cum felle eius inungitur. Iecur et eiusdem calefactum & tritum cum axungia imponitur. Beta & ficus pari mensura trita, & imposita, morbis articuloꝝ medentur. Agrifolium rufum addito sale & oleo prodest. Idem seuum pecudis cum cinere capillorum mulieris facit. Neruorum uero nodis, capitis uiperini cinis cum oleo cyprino imponitur. Terreni uerumes triti cum melle imponuntur. Styra quoque illinitur. Fimus quoque caprinus decoctus in acetate, tritus cum melle, apponitur. Tremulis inutile est manducare holera, & panem ex aqua ad balneum quoque ungi oportet oleo quod in castoreo additum est. Articuloꝝ fracturis cinis ex femoribus pecudis cum cera medetur. Articuloꝝ dolori fimus caprinus ex melle seu passo potui datus prodest, & super puritis neruis medetur, expurgatque, & ad sanitatem perducit. Potio ad morbum articuloꝝ. Recipe ligonibis radices numero quindecim, plataginem rotundam cum radicibus ac folijs parte dimidia, rodonabis radices quantum plantaginis est, herbæ balsamariæ folia propensius, ardisiæ minoris quam plantaginis, uerbena similiter: quas omnes herbas simul teres, addens mellis pondera tria, piperis semiunciam, & semperabis in uini sextarijs sex, prius tamen quam piper minas, linteo colabis, & addes piper, singulasque portiones in balneo dabis. Potio ad arthriticos. Recipe thymi denarios sex, quos in aqua uncias tribus teres, & grana piperis octo, & dabis hoc prima die bibere: secunda, thymi denarios quatuor, piperis grana quinque in aqua suprascripta, liquamine uero abstineat, & porcina, quando bibit. Ad arthritin &

C. PLINII SECUNDI.

ad sciam. Herbam agrimoniam teres & cribrabis, accipiesque cochlear plenum, & mittes in uinum ne-
tus, potionem, & tepetatum in folio bibes, ita ut ibi moram facias. Vntio ad arthriticos. Recipe
eiusci pond. II. castorij unc. tres, panacis pondera duo, herbæ dontezæ duo; quæ infundes in uini ueteris
sextarios duodecim, & coques donec herbæ bene coctæ intumescant, & teres, quousque uinum misceat-
tur, postea iterum sicca adijcies herbæ sauinæ pondera tria, rosæ siccæ lib. unam, adarcæ uncias duas, eufor-
bij duas, cymini sex, piperis duas, trita prius & cribrata. Item alia. Recipe hyssopi ollaris uncias sex,
terij sex, seui taurini sex, medullæ ceruinæ sex, olei rutacei pondera tria: quæ sic conficies. Mittes rutam,
adipem & pulueres superscriptos, & omnia diligenter admiscebis. qui uerò unguendus est, post balneum
calente corpore utatur, & cum diligentia sibi attendat per triduum, & sic habeat illam unctionem: post
hæc lauatur, & eadem faciat similiter. Ad articulorum uel nodorum dolorem. Marribium uiride
cum sale teres, succoque ex eo facto loca dolentia fricabis. Ad hæc, & ad eos quibus nervi expanescunt,
Euforbij uncias tres & semis, galbani similiter, castorij similiter, panacis similiter, medullæ ceruinæ quin-
que, terebinthinæ sex, resinæ fixæ unam & semis, resinæ pituinæ similiter, sulphuris uiui sex, betonicæ
quatuor, cetriz quatuor, ceræ libram unā & semis, nardi I. Olei cypharij libras quinque. Amphisbe-
na mortua neruorum doloribus alligatur. Senectus quoque serpentium in corio taurino appenditur.
Folia item uitium trita, & admixta hordeaceæ farinæ, articularibus morbis imponuntur. Incisos ue-
ro articulos aranei tela commodissime curat.

Ad sideratos. Cap. X V I.

ASININI pulli urinam & afinæ matricis, ungulasque posteriores in cinerem redactas, & axin-
giam eius admixto nardo coques ut sit quasi cerotum; ex quo corpore peruncto liberabitur ut mireris.
quod & ad podagram facit. Sideratis uerò remedium, quibus manus, pedes, & faciem euertit, facies con-
tinuo. Recipe herbæ artemisiz folia, mentha, bdellium, opopanax, oleum Cyprinum: quæ omnia mi-
scebis, & coques, & unges per dies quatuor: qui ad se nō fuerit reuersus, dimittas, sciens eū ita ira Dei esse
perculsum. Ad sideratos, fel taurinum & sulphur uiuum coques, & ex eo perunges, mirificum reme-
dium est.

Ad uulnera. Cap. X V I I.

SI QVIS ceciderit, aut undecunque uulnus habuerit, siue ulcus cyromū, tolles agrimoniz pat-
tem unam, millefolij duas, axungiz unam, cymarum rubi qui mora fert, unam: tundesque omnia quasi ce-
rotum; quo illito linteo, positoque ad uulnus, sanat. Ut autem uulnus purges, modicum mellis biduo po-
nes, sicque curabis uulnus undecunque fuerit. Ad uulnera siue ulcus cyromū. Porcini fimi fici & cy-
usti cinerem rediges intus in ulcus cyromū, & superimpones medicamentum superscriptum. Si uero
quis aliunde cadens, caput uel aliquod membrorum ruperit, aut ferro præciderit, folia cardi nō de pomis
mundabis à spinis, & omnem duritiem auferes. ipsam uerò pinguedinem cum axungia teres diligenter,
& ut cerotum impones: sed antea uel biduo aut triduo mel pones, & de medicamento superscripto.

Si quis ictu pugni uel manum leserit. Cap. X V I I I.

QVICVNQVE ita ictu pugni manum leserit, uel humano dente aut de digito, ut aut san-
guis fluat, uel per tunsuram fecerit aut tumorem, lumbricos terenos teres, addito modico aceto acro, do-
nec sit in modum ceroti; ex quo linteam illitum pones ad locum. quod si minor dolor fuerit, alutæ impo-
nes, & ligabis manum.

Ad fracturam seu rupturam pellis. Cap. X I X.

SAPONEM impones, & fascia stringes, tertiæque die solues, & sanus erit.

Vulneribus recentibus & nervis concisis conglutinandis. Cap. X X.

VVLNERA recentia conglutinant uermes tereni triti, adeo ut etiam nervos incisos solidet
in die septimo. Idem arefacti in sole, & ex aceto triti, uulneribus imponuntur, & interposito biduo sol-
uuntur. Cochleæ exemptæ de suis testis crudæ tritz, mirifice solidant. Cochleæ item cum suis testis
ustæ, cum myrrhæ & thuris pari pondere ex aqua præcisos nervos sanant. Efficaces sunt & bulbi triti
per se ad uulnera glutinanda. Adijciebat tamen illis Damon medicus muscum, quia aqua gigitur, & die
quinto soluebat. Myrobolanum, ut iam diximus, genus est cariotæ, quod os non habet, hæc ex uino tri-
ta austero, uulnera curat & solidat. Cupressi folia trita ad eundem effectum profunt. Babi item siue
platani uel flos uel mora sine collectionis periculo sanant. Millefolium quoque tritum uulneribus im-
ponitur. Centauriæ radix tam efficax est ad plagas conglutinandas, ut etiam carnes cohærescant, quæ cum
ea coquuntur. Lana etiam succida infunditur melle & aceto frigido, & oleo deinde expressa imponitur.
Spongia ex aqua coelesti imposita, recentia septa non patitur intumescere. Caro uiruli recentibus ul-
neribus arcet tumorem. Idem simus bubulus cum melle præstat. Recentes plagas à ferro factas
gluten

gluten raurinum liquefactum, calidumque impositum, nec ante diē tertium solutum, efficacissime iuuat. **Marthubium** cum sale exiguo tritum, purgat omnem saniem. Ad uulnus, siue etiam cancer sit. **Vr** tice trita pond. unum, ac salis unc. duas impones, & frequenter mundabis: sanatur & uulnus recens, ne timorem habeat, neque cicatricem faciat. **Trifolium** ieiunus commanducet, & uulneri superneccat. **Folia rubi** trita cum melle permixta. **Artemisia** quoque imposita, uulnera eadem die claudit. **Bulbus recens** tenuiter incisus, & ad uulnus appositus, concite claudit, & uestigia cicatricis extirpat. **Milia** item contusam impones, quæ non soluta triduo solidat cicatricem: & eum solueris, sanum uulnus inuenies. **Xeron polyticon** ad complenda uulnera, aut si est ustum. Recipe psimithij drach. octo, typpidi octo, manz quatuor. **Plaron** ad complenda uulnera. Recipe cycidon drac. X. calchanti X. typpidos octo, ley stos sex. Radices caulium combustæ, & in puluerem redactæ & insperzæ, omni uulneri profunt, etiā ferro facto. Ad omnia uulnera facta uel nara. Cinerem cribrabis, subradis subtiliter, & cōsperges oleo, atque impones: sed si fistula fuerit facta, collyria intramittes, mundat & sanat. Ad uulnera, confectio medicamenti, & cicatrices non pereat. Recipe olei unc. I. elcismados unam, aque marinæ sex, colophonie unam, picis unam, ceræ quatuor: quæ omnia coques, & sic uteris. Si paruum uulnus est, linteum illitum impones & colligit: quod si scissura est, prius consue, & sic impones. Si autem adhuc suppuratum est, prius fomento catēfacto locum uulneris, & ita emplastrum impones: facit hoc ad syringium, purgat enim & colligit. Si autem euenerit, ut non colligat, tunc modicum uiridis medicamenti solues cum oleo rosato, ut facias aquatum, & carpra linteā ibi infundes, & secundum mensuram uulneris impones, & interius emplastrum molle, quod si difficile potest colligi emplastrū, collige de medicamento uiridi spissius, ac superpone, quod medicamentum uiride sic conficitur. Recipe ceræ unc. sex, colophoniz nouē, yunam & semis, olei semiunc. mannæ thuris unc. tres, aceti quantum sufficit: quæ omnia commiscebis & uteris.

Sanguini ex uulneribus sistendo.

Cap. XXI.

HY SOPVM cum hordei farina siue cinere eius sparsum, prodest. **Fimus caballinus** cum ouorum putaminibus crematur, isque cinis admixto melle spatonulæ plagæ impositus, mirè sistit. **Cortex uitis** & folia eius arida, tusa in farinam, sanguinem sistunt, & uulnus glutinant. **Bubulus** quoque fimus in cinerem redactus, ac sparsus, sanguinem profluentem sistit. De fundo cacabi fuligo trita imponitur. **Leporis pili** defubtus mento mollissimi imponuntur. **Polypus tufus** in pila instar emplastri adhibetur. **Pilule platani** tuse ex aceto impositæ sanguinem sistunt. **Calcitis** in puluerem redactus, sanguinem sistit. **Perfici folia** trita & imposita hæmorrhoida sistunt. **Vitis** etiam uinari cinis cum pari pondere resinæ ex aceto impositus, sanguinem sistit, & uulnera conglutinat. Ad eum, cui sanguis ex præciso non potest retinere. **Spongia albā** nouā de mari mittes in cacabum supra picis spanæ optimæ resolutæ & colatæ pond. II. ita ut operatur pice. Cumque simul benè coxeris, leuabis spongiā & suspendes. quæ cum flicata fuerit, redigis eā in puluerem, de quo tages locum, ex quo sanguis fluit, qui facit & ad profluuiū. **Ad uenas uel neruos præcisos**. **Lumbricos** de terra contundes & pones, statim sanant. Ad omnia loca dolentia herbam cyclamniōn contusam pones, & statim sanat. Ad sanguinem sistendum, resinam fraxinam tritam locis supersperges. Faciunt & linteā usta, & in posca extincta.

vulneribus, canceris, & nomis uermibusq; arcendis.

Cap. XXII.

SCIO gratus futurum fuisse, si singulis generibus ulcerum nominatim dedissem titulos & remedia: sed cum aliquoties pluribus uitijs profint, breuitatem secutus, genus scripturæ elegi, quod subiectum est. **Vermes** qui in ligno nascuntur, uocantur tōsses; hi triti in panno illinuntur, & ulceri apponuntur. **Iidem** combusti, cum anethi pari pondere impositi, nomas, quos uocant cancos, sistunt. **Fimo ouium** sub testa calefacto & subacto tumores sedantur, fistulæ sanantur. **Nomas** sistunt cochleæ crudæ de sua testa eietæ & in linteolo illitæ, & appositæ, æquæ emendant. **Viola** discosta in oleo & contrita, cui misceatur butyrum ouillum & mel. Eadem ratione curantur. & tibio uetere, quod ut emplastrum panno illi debet. **Vermes** ulceribus innati ranarum felle tolluntur. Quæ serpunt, fassamento ueteri tuso in modum emplastri curantur. **Radix peponis** contrita, ulcera sanat, in modum fūi concreta, quæ uocant. **Semen raphani** ex aqua tritum & impositum sistit ulcera, quæ færedines appellant. **Porrus capitatus** contritus ex melle ulcera purgat. **Allium** cum sulphure & resina fistularum uitia extrahit. **Vetera** ulcera etiam carcinomata foueri debent aqua calida, in qua cocta sint holera, deinde ipsa holera trita imponuntur bis in die: sic curatur fistulæ & tumores, quos euocari quos uel tolli opus est. Cruda holera trita ueteribus ulceribus imponuntur. **Lini feminis** farina in uino decocta prohibet serpere. Eadem farina cum melle, eruptiones & pituitas emendat. **Fistulas** ulcerum lenticula cocta rumpit: eadem collectio nes sedat, eadem intra suppurantia cum polēta decocta imponitur. **Lenticulæ** succus ulceribus & erosis & genitalibus adhibetur, sed cum rosaceo trito & cydoneo. **Farina erui** serpere uulnera non paritur spatio melle imposita. **Lini farina** eodem modo imposita ficit. **Cinis uitium** cum axungia uetere fistulas curat & sanat. **Folia oliuæ** commanducata, & imposita, ulceribus manantibus medentur. **Cauliculi oleastri** decocti cū melle, & impositi, carnes quæ ab ossibus recedunt, cōprimunt. **Cōtra collectiones**. **Folia oleastri** ex uino trita imponuntur. **His** quæ purgāda sunt, oleastri folia ex melle adhibentur. **Vlcera manantia**, oleum

amygdalinum cum uino expurgat. Fici ramorum teneri cauliculi tusi imponuntur cum melle ulceribus quæ *xipia* uocant. Carcinoma si sine uulnere sit, quàm pinguiſſimam ficum impone, ſingulare remedium eſt. Nuces inglandes peruetereſ commanducat, uulnerebus medentur impositæ. Glans roboretur trita cum axungia duritias quas *karouides* uocant, & euocat & emendat. Vlcerebus quæ ſerpunt, & quæ in his excreſcunt, ſpondelium cum ruta illinitur. Pix britta cum melle ulcera purgat, explet, ſanat: eadem pix cum uina paſſa & axungia ulceribus putreſcentibus medetur. Aqua in qua lentifcus decoctus eſt, ulcera quæ ſerpunt, utiliter fouentur. Pilulæ de platanis tuſæ emendant. Vermes tollunt mala tuſa ex melle. Hedera ex uino decocta imponitur. Idem præſtat & lana ſuccida ex melle. Cinis fimi pecudum, addito cinere ex oſſibus firmorum agnorum, & nitrum tuſum adhibetur ulceribus, quæ cicatricem non trahunt. Pulmo arietinus carnes excreſcentes in ulceribus exequat. Vlcerum quæ ſerpunt, & quæ in his excreſcunt, cinis capitum menarum coerceat. Fiſtulæ aperientur ſiccanturque ſalamento cum lintheo immiſſo intraque alterum diem, omnem callum auferat. Serpentium ulcerum coerceat impetus galla non lota, temperata ex roſaceo & aceto atque indita, mox cera & roſaceo permixta perducit ad cicatricem. Symphytum omnia ulcera celerrime perducit ad cicatricem, & ſanat. Plantaginis ſuccus inſunditur fiſtulis, & eiſdem medetur. Fel taurinum cum porri ſucco pari meſura, carcinomata curat. Lentis farina eodem modo carcinomata cum axungia ueteri imposita, curat. Coagulum leporis cum capparis pari pondere, quod utrunque adſperſum uino teritur unâ, cangraginis penna illinitur. Fel urſinum in his quæ ſerpunt, medetur. Caſeus caprinus ſiccus ex aceto & melle purgat ulcera quæ ſerpunt, cohibet ſeuum caprinum cum cera, id etiam, additis ſulphure & pice, purgat. Allee linteolis conſperſis imposito purgantur ulcera. Ad ulcera autem ſordida qualibet in parte corporis fuerint: Cognoscuntur autem cum candicant, aut cum cruſtam albam ſuperduxerint, purgatque ea mel inſuſum, aut puluis iris, uel mali terræ, aut panacis radix. Mirificeque purgat hoc medicamen, etiam ſi cancer tentauerit: eſt autem lene, & recipit auripigmenti drac. ſex, iris tres, elaterij unam, cineris chartæ combuſtæ IIII. & cū opus eſt, cochlearia IIII. roſæ cyatho permilcetur, atque uulnere ſuperponitur. Hoc medicamentum cito & ſine ullo morſu expurgat ulcera ſordida. Cortex item cauliculorum papaueris contuſus in puluerem, ac melle permixtus, ſordidis ulceribus imponitur. Ad excreſcentem uerò carnem, iris floris uſti drac. ſex, calideos uſti quatuor, ſed acre hoc eſt, & quaſi cauterium cruſtam ducit. Creſcentem enim cancerem prohibet. Vlcerum item ſordida optime mundat lenticula cocta, & addito melle imposita ſanat. Xeron dicitur faron, quod facit ad nomas. Recipe calideos cocti drach. calchati quinquaginta, myſeos uſtuli XXI. calcoi cauminos XII. & ſemis in aceto: quæ omnia teres donec ſicca efficiantur, & in puluerem perueniant. Xeron caroteten, quod facit ad nomas. Recipe calcoi cauminos unc. unam, calideos unam, calchanti unam, myſeos unam. Xeron catapaſtaton diacorcon facit ad nomas, & ad paturam ſparges & ligabis. Recipe typpidi unc. unam, myſeos unam, calchanti unam, ſchiltos unam, cideos IIII. Lypara ad nomas & ad uſtulationes. Recipe albelci drachmas IIII. plymithij IIII. ceræ XVI. ceruſam uerò & albes ſcum teres cum lacte mulieris donec habeat ſpiſſitudinem ceroti, & ſic permilcebis in mortario, & teres diligenter. Xeron ad nomas, melanthium, hoc eſt propter arſenicum ſandaracæ calcoi cauminum, equalia teres & uſteris. Item xeron ad quod ſuprà. Recipe calideos aſſi drach. XL. calchanti XXX. myſeos aſſi XX. uſtuli decem. Xeron Theodori, ut ſuprà. Recipe calideos drach. IIII. ſandaracæ IIII. arſenici IIII. albelci octo, quæ teres & ſic uſteris. Ad ulcera, ad uulnera, ad canceromata, ad uermes necandos. Herba nepeta uiridis trita, adiecto modico ſalis, & appoſita uulnere, quod ex negligentia uermiculos habere coeperit, omnes eiicit & perſanat. Folia cannabis & millefolij, & laſtuce in uino teres, & ſuccum earum ulceribus immittes, uermes necat & ad ſanitatē perducit. Betonicæ item pollinem bibat ex aqua calida, ſtatim ſponte exeunt.

Ad apoſtemata interiora, cap. X. X. I. I.

APOSTEMATA interiora uomicas uocamus. Erumpunt enim plerumque e lateribus mebranz ſuperuacuz ex languoribus natæ humore concreto, intusque conuerſo: qui adeo ſecundè innatiſcitur, ut non tam excreetur, quàm euomatur. Eos qui in hanc paſſionem inciderint, oportet ambulare, ne ſtari, ungullectos & requies. & ob hunc morbum malum, ſuſtentandi erunt cibis firmis, glutinofis, auiſibus pinguibus, operibus piſtorijs plus equo mellitis, prout patiuntur facultates. Vomica ſunt priuati melle in quo ſint apes demortuæ: facit autem & induſtriæ potio hæc. Ouum crudum euacuabis, & putamen eius implebis ex ſucco marthubij, & in eodem uafe colabis: repleatur item melle, quod eodē abiicitur, & ita permixta caleſcāt uſque ad teporē. Hæc enim uomicas rūpunt, purgāt, & ad ſanitatē perducunt: ideo etiā curatio eius expetiſta eſt, ut etiā hyeme aſperſima explicari poteſt, & intra uerni & æſtatis tempus. Aliqui tamen curati ſunt intra finitum tempus, compoſitione ea quæ infra ſcripta eſt. Recipe man dragoræ denarios tres, iuſquiami tres, thuris decem: ſingillatim tuſa teruntur ex uino ad ſpiſſitudinem plus craſſiorem quàm mellis; ex quo medicamento, miſtiō pondere uictoriati in tribus cyathis aquæ euntibus dormitum datur: mox deinde ex eodem modo aquæ pondus denarius, à prima uerò portione ſentitur profeſtus, deinde incredibilis in altera explicatur curatio. Ad apoſtemata interiora. Braſſicæ ſucci cyathi duo, paſſi unum, tepefactus & potui datus, mirifice prodeſt: Marthubij ſucci cum butyri tantundem in portione conditi tepidum bibat, ſanus erit: & ſi uetus eſt paſſio, ſucci minus mitas & plus

& plus butyri, ne subita eruptione praeferatur. *Marthubium* item cum mellis æquali mensura coques, agitando donec unum corpus efficiatur, & cum cochleari pro uiribus dabis. *Butyrum* quoque cum melle optimo permixtum, ieiuno sæpius ad comedendum dabis. hoc si frequenter feceris, miraberis effectum. *Hortulanæ rutæ* semen ex aqua tritum per dies septem calida mixtum cochlearis mensura ieiunus accipiat. Itemque alia septimana *lapatij* radicem colliges, & diligenter in pila tundes, & iacebit infusa in uino ueteridiebus septem, deinde per triduum singulas potiones bibat, mixta calida temperata. ipsam uero radicem linteo imposita & tepesactam stomacho superpones. qua enim hora imposueris, accessio fiet.

Ad omnia apostemata exteriora, uel tumores. Cap. XXXIII.

CERVSA M, nitrum, ceram, oleum, pari pondere, sed plus nitri adijcies. *Cerulam* uero & nitrum teres, ceram & oleum, cerotum facies, miscebisque omnia & teres diligenter, quod alutæ impositum, mirabile est effectum. *Agrimoniæ*, *uerbenacæ*, & *quinquefolij*, coques æquis partibus ex aceto, & adiecto semper uino, dehinc trita & imposita sanant. *Ad uomicas exteriores*. *Charidas* uiuas in oleo necabis, & ex hoc unges, liberant. *Hebuli* radices ac cortices cum aceto teres, & in modum cataplasmi impones, sanant. *Ad omnia apostemata*, maxime ad *parothecas*. *Herbas uirides*, *pædariam*, *lymphoniacæ*, *lapatium* & *marthubium* singulatim in creta inuolutas, luto uapore coques, & carnem quæ inter medullam & corticem est, separatam diligenter teres ad crassitudinem mellis, quod cum herba supra scripta admiscebis, deinde manna, thuris, & sterus columbinum siccum cum nitro Alexandrino teres. Præterea facies cerotum de oleo simplici, & cera quantum satis est: *terebinthinam* quoque adijcies ceroto, cui & cetera omnia ad unitatem corporis misceantur: omnibus autem pigmentis & herbis, exceptis cera & oleo, æqualiter uteris.

Ad collectiones uel tumores. Cap. XXXV.

VISCVM decoctum cum foenugræco impones. *Adipem* item cum alio mixtum impones, omnes tumores suspectos soluit. *Censolium* tritum bene facit. *Oleatri* quoque folia ex uino contrita, & collectionibus imposita, prosunt. *Carnis* etiam *caprinæ* combustæ cinis ex aqua illitus, omnes tumores soluit. *Symphonium* item tritum & impositum, tumorem sedat. *Ebuli* folia tusa cum pane molli, uino infuso, permixta & imposita, omnes tumores discutunt. *Lenticula* itidem cum lomento fabæ, *pulegio* & sale, pari portione aqua conspersa & imposita, collectiones quaslibet facillime soluit. *Mali terræ* nihilominus radix contusa, & in aceto deferuescens, discutit & sanat. *Pix liquida* adiecto cinere cribrata, & apposita, omne genus collectionis discutit. *Iuniperi* quoque semen tustum, & in aqua decoctum, & in panno impositum, tumorem sistit. *Ad tumorem & duritiem*. *Faba friza* cocta sine sale, & mixta cum melle uel uua passa innucleata & imposita, duritiā mollit, & tumorem spargit. *Farina* quoque hordeacea in aceto discocta, & cum fimo columbino, ac fici sicca simul trita, coctaque & imposita, discutit. Itemque *lens* cocta & cum melle trita & imposita, maxime ulcera tollit ac sanat. *Ficus* etiā quæ adhuc non maturauit, admixto adipe anserino imposita, mirè sanat. *Herbam* itidem *lymphoniacæ* cum *axungia* commiscebis.

Scyrosi uentris uel stomachi curande. Cap. XXXVI.

ABSINTHII pontici fasciculum, cassiæ manum plenam, infundes in uini *Hadriani* sextarium unum, & gremialis sextarios quatuor, coquesque in uase duplici, & fouebis: altera die rutæ fasciculum breuissimum, iris uncias quatuor, squinantij duas, infundes in uini *Hadriani* sext. unum, & olei gremialis sext. III. coquesque in uase duplici, & suprascripto oleo permiscebis, & fouebis diebus duodecim. *Cataplasma* ad eandem scyrosin. *Recipe* foenugræci sextarium unum, lini seminis unum, meliloti unum, hyssopi ceroti libram unam, iris unam, feseij sext. unum: quæ omnia tusa cribrabis mollissime, postea caricas pingues optimas numero centum infundes in aqua, & discoques, ita ut aqua spissa fiat, sicut passum, & adijcies mellis optimi heminam unam, & facies cataplasma diebus octo uel decē: aut quotquot necesse fuerit, ex eadem aqua cataplasmata coques, addes etiam resinæ *terebinthinæ* optimæ unciam unam; sequenti die unam & semis; tertia die duas, uel accedentibus diebus duas, rutæ siccæ libram unam: & si uiridis fuerit, ficitur in patella argentea super carbones, butyri optimi unc. I. accedentibus diebus duobus, euiscum cocti sub cinere libras duas, commiscebis cum axungia non satis, ita ut prius euiscum rundas, & postea simul utrumque ceroti modo spissum fiat. Hinc facies sphaeram grandem ex aqua, & cataplasma semper adijcies: quod si hyems fuerit, duodecim diebus fouebis, & totidē cataplasma bis: si uero æstas fuerit, uel senex, diebus septem, uel pro uiribus ægrotantis. Epithema ad eandem scyrosin post cataplasma. *Recipe* iris uncias septem, quas tundes & cribrabis mollissime, & in mortario duo uiri à mane usque ad uesperam terant, dehinc ceræ minutissime pingui melle uncias sex, & solues cinere calidissimo: quæ cum soluta fuerit, addes *terebinthinæ* optimæ uncias sex, & diligentissime agitabis, ut nullam asperitatem habeat: cum soluta fuerit, leuabis de foco, & mittes puluerem suprascriptum, & teres diligentissime hinc facies collyria maiora, & pones in capsella mûde, & cum opus fuerit, linies linteum spissum, & pones in stomachum quotidie ita, ut totum uentrem & sub umbilico teneat. Item epithema ad scyrosin, ad hepar, ad splen, ad stomachum. *Recipe* ceræ uncias quatuor, *terebinthinæ* quatuor, ammoniaci quatuor, bdellij quatuor, myr-

bdellij duas, iris fel, medullæ ceruinæ unam, olei cyprini octo, floris lapidis ammo niaci quatuor, cere nin-

Parus depellendis.

Cap. XXV I.I.

Maturis aut maturefcentibus lens imponitur

Ad cystas, quæ sunt glandulæ, et ad tumorem antequàm apostema fiat.

Cap. XXVIII.

uncias tres. galbani tres. cere tres. cineris de fermentis vitis mundifi-

TEREBINTHINAE uncias tres, galbani tres, ceræ tres, cineris de sarmentis uitis mundissime facti candidi unam, cineris caprifici unā, simul mittes in cacabum cum cera minuta & olei hircini uncijs duabus, & foliis, postea colabis acteres, panemque facies. & cum opus fuerit, linteo spisso illitum impones. Ad cyradas & strumas. Lolij siue auenæ farinam cum lini seminis farinæ pari portione, & columbinum fimum recens tantundem ex uino decoques, & impones, utrunque sanat. Strumis item & cyradis echinorum testæ contusæ, & ex aceto acri tritæ, illiniuntur. Ranæ quoque rubetæ cinis admixto butyro inductus cyradas exiccat. Viscus, calx, & cera imposita maxime profunt. Conchylij etiam marini testa tusa in puluerem, admixta ueteri axungia imponitur. Mustelæ uiuæ combustæ cinis cum rosaceo & cera imponitur. Columbinus fimum recens collectus, & in folijs betæ uel brassicæ coctus, deinde tritus, & admixto aceto calido impositus, sanat. quod & carbunculos curat. Emplastrum cyradicon. Recipe perysterios drach. IIII. pyrethri IIII. propolis XIII. ammoniaci XVI. caccij grana octo, uisci de quercu drach. octo, nitri IIII. terebinthinæ octo, galbani octo. Ad cyradas & paniculas. Ostrea uiscæ uncias duas, calcis unam cum aceto diu teres, & calefacies bene locum, & sic impones. medicamentum.

Strumis profligandis.

Cap. 19 X XI X

CAPRIFICI corticem intumescentem puer impubis si detracto ramo tollat dentibus, & me-
dulla ipsa alligetur ante solis ortum, prohibere strumas constat. Echinorum testē contusē cum alumi-
ne ex oleo, folia hederē, marrubium cum adipe, lēs in aceto discōcta, lupini ex aceto cocti tritique, folia fī-
ci, & ficus immatura unā tusa imponuntur. Succus pilulē cupressi ex fermento, galbanum per se exulce-
ratis strumis imponitur. Mustelē sanguis illinitur. Mustela ex uino discōcta imponitur. Cochleē
cum suis testis tūsē ad hoc faciunt optime, quē salicibus adherent. Cinis aspidis cum seuo taurino im-
ponitur. Adeps anguis mixtus oleo. Anguium cinis ex oleo, testē eōs quoque precipitur, abscessis à
capite & cauda digitis quaternis, aut cinerem crematorium bibere. Aliqui finum columbinum imponūt,
aliq̃ mixta hordeacea farina ex aceto acri. Talpē cinis ex melle imponitur. Iecur talpē quidam inter ma-
nus tritum circumliniunt, & triduo non abluunt. Talpē capita precipiuntur, & cum terra egesta à talpis
conterantur, & in pastillos rediguntur, sicque seruantur in stagna pyxide, utiles ad omnia apostemata.
Vermes terreni totidem quot sunt strumę alligati cum his pariter arescunt; circumligantur lino quo uipe
ra suspendio

ra suspendio occisa est, millepede imponuntur, addita resine quarta parte. & non solum strumas sic curari precipiunt, sed & omnia apostemata. Calx uiua cum resina liquida, uel adipe suillo, addito melle, strumis utiliter auxiliatur. Cinis ungule asini uel equi ex aqua & oleo illinitur. Bubulum seuum ex oleo imponitur. Ebuli folia conteruntur, & mixta cum fece ceruise, superadditis folijs eiusdem ebuli illud alligatur. Fel aprinum uel bubulum tepidum illinitum discutit. Vrtice radices in aceto coctæ & trite, & in modum ceroti impositæ, discutunt, maturas aperiunt, & omnes radices extrahunt. Viride nasturtium cum lomento fabacio cōtritum adhibetur, & desuper folia hedere uel brassicæ apponuntur, strumas tollit. bulbi quoque ex melle triti tepidi imponuntur, & alia die cauliculi ruborum teneri cum folijs suis ex uino decocti triti que. hæc alternis diebus & uicibus imposita, ad sanitatē perducunt. Sinapis semen cum fabæ pari portione in aqua coctum & tritum, atque impositum, strumas sanat. Cancro quoque fluuia tilis cinis tritus cum melle, & impositus, discutit. Taurinum siue bubulum seuum cum cera & resina impositum discutit. Fimus item eius cum aceto coctus idem facit. Medicamentum ad strumas. Recipe aphronitri libram unam, resine fixæ unam, terebinthine uncias sex, cere sex, ammoniaci quatuor, calcis uiuæ duas, olei rosari quatuor. Ad strumam uero claudendam: Axungia cum urtica trita, & imposita, opri-
me facit, & claudit uulnus. Item radices cortices coctæ cum aceto, & contusæ, imponuntur strumis incipientibus: discutunt, maturant, aperiunt, & ita educunt: & omnibus radicibus extractis, ad certissimā sanitatem perducunt. Porro ad suggillationes, urticæ folia teres & impones. Emplastrum ad strumas. Recipe olei ueteris uncias sex, cere sex, herbe cyclaminis sex, floris aphronitri sex, oleum uero, refinam & ceram in cacabo resolues, postea mittes puluerem cyclaminis, & agitabis donec unitas fiat: deinde adijcies florē aphronitri, & continuo depones, ubi refrigerauerit, finito nono inducū pones, quandiu pus reddat. Cum autem uideris exinanitum esse, facto ceroto curabis.

Carbunculo medendo.

Cap. XXX.

Suggillationes folia urticæ discutit.

Ad carbunculum.

CVCVMERIS syluatici succus superinfusus & alligatus emendat. Item expertum.

Mel cum lomento fabæ mixtum imponitur, & folia lactuæ desuper, hoc ad sanitatem perducit. Nasturtium fermento mixtum utiliter medetur. Suppurationes dirumpit plantago sine lanugine cū sale cōtusa. Cum autem purgauerit, sine sale apposita procurat. Cepæ acerrimæ sub cinere bene coctæ meli miscentur, & loco emplastri admoventur. Thymum quoque trita admixto sale, cymino & melle æquis portionibus, & in modum medicaminis imposita, sanat. Nitrum cum oleo tritum & impositum, carbunculos arduos sanat. Porri succus cum cinere mixtus & impositus. Calx uiua ex aceto soluta imponitur. Gutta item ammoniaci ex aceto teritur, & uulneri superponitur, frequenter rumpit, & foras protrahit. Caseus caprinus uiridis, siue ficus cum porri sectiui succo tritus imponitur. Pix britia cum uua passa, exemptis nucleis, addita axungia purgat. Nuces siue glandes perueres teres & impones. Erui farina ex uino imposita, carbunculos rumpit. Fimus columbinus cum lini semine ex aceto mulso, carbunculis imponitur. Mullorum falsorū cinis prodest: rutaque ex aceto trita. Fimus pecudis incipientibus carbunculis imponitur. Ficus sicca in uino decoctæ aut tritæ & confictæ extrahunt. Herba fauina quæ habet folia simillima cupresso, cū melle illinitur. Cerebrum suis coctum, & tostum, imponitur. Expertum ad anthracas, quod alij dicunt oculum pullinaricum, alij carbunculum. Folia rutæ uiridis, uua passam pinguem purgatā, aphronitrum album: omnia æqualia cum melle uteris. Emplastrum ad anthracas. Recipe galbani unciam unam, asphalti unam, nitri semiunciam, arsenici similiter, seu ueruecini de renibus unciam unam, coques ampulentum: facit & ad uulnera recentia seu pustulas malas.

Ad papulam noxiam.

Cap. XXXI.

Cucumers syluatici succus, lomentum mel, folia lactuæ, nasturtium, fer-
plantago, sal, cepa, thymum, meli, nitru, oleu, porri succus, cinis, u
aceti, gutta ammoniaci, casus
pix britia, uua passa, axungia,
f. linder, uui fauina, uui. fimus
lini semen, acetu mulsu, mulloru
rutæ, fimus pecudis, ficus, sebina
cucurbitæ suis, aphronitru, asphalti
arsenicum, seu ueruecini.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

AD papulam noxiam, quæ tertia die occidit. Bullos crudos teres mollissime, addes coriandrum uiride, mel & acetum, teresque simul & impones. Porcinum sel ficcabis in fumo, & exinde tantam partem præcides, quantum spatij ipsa pustilla tenet in capite: quam calefactam foco, in modum ceroti induces, & sic impones. cum hæserit, non dimittit, nisi secum papulam extraxerit. Signum uero morituri est, si medicamentum non hæreat. Ante omnia de carycis Germanis in uino Aphro discoctis, leuatis, ac tritis, adiecto paruo melle, cataplasma facies, & super omnem curam impones. Roma caprifici sicca cōbures, & cum sapone miscebis, & impones. Ex uirga item ipsius interiorē albuginem rades & teres diligenter, & sapone mixtam impones: ipsa enim uim eius mox necat, ne amplius serpat. Galbanum item per se imponitur, aperit & extrahit. Postea uulnus factum curatur alio medicamento.

Furunculis medicandis.

Cap. XXXII.

Papula noxia, tertia die occidit.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

Ad papulam noxiam.

FICUS sicca decoctæ ex uino, & tritæ, imponuntur. Fimus gallinaceus rufus uel albus recens ex aceto tritus, & impositus, efficaciter sanat. Nasturtium fermento coquitur, & imponitur. Papauer quoque syluaticum cum axungia suilla tusum imponitur. Bulbi triti & impositi exiccant. Da-tilus etiam tritus, & cum molli pane infusus, imponitur. Fermentum cum sale mixtum imponitur. Pellis similiter muris detracta. Seuum arietis cum farina punicis æquis ponderibus prodest. Nitrum

cum refina mixtum detrahit. . . Seuum bubulum cum fale imponitur : aut si dolor est , sine fale liquatur . cum oleo . simili modo facit seuum caprinum . Galbanum per se prodest . Ventriculorū ciconiarū ex uino decoctus illinitur . Muscæ impari numero infricantur digito minimo sordes ex auriculis pecudū illiniuntur . Limacis cinis aspersus purgat . + Nouem granis hordei si quis furunculum circumdat , singula manu sinistra , & in ignem conijciat , confestim sanat . . . Ad furunculos , & ad omnes tumores . Adipem caprinum recentem cum pice dura pari pondere tundes , subactumque more malagmatis induces donec sanentur . Nitrum quoque cum refina superpositum furunculos extrahit . . . Ad idem compositio bona . Recipe guttæ ammoniaci , aluminis schisti , propolis , stercoris palumbini ana unc. unam , seu taurini mundi tres , resinæ sex , ceræ sex ; ex his sicca tundi & cribrari oportet , ac cætera in nouo cacabo lento uapore solui , & siccis misceri . Item omnēs seuum si ponatur , utile est .

Ad circinnu, quem alij zonam vocant. Cap. XXXIII.

CIRCINVS, quem alij zonam uocant, talis est. Velicæ tanquam combustæ exeunt & crepant, primum pauca, deinde citò multiplicantur: quæ si hominem cinxerint, occidunt. Curètur uerò sic. Succum cicutæ, coriandri, colophonis, ebuli, & sambuci radices cum uitello oni & oleo rosaceo miscebis, & penna lines, ac supersperges puluerem milij combusti: & hoc si frequenter feceris, sanantur. Succo coriandri calicem dimidium, & croci aqua infusi ac triti tantundem permiscebis, & uteris à pœna, & sic supersperges puluere de carycis in area candenti combustis.

Igni sacro medendo.

VERMES terreni ex aceto illiniuntur. Lens quoque in aqua marina decocta imponitur. Herba fauina quæ habet folia quasi cypressus, ex melle illinitur. Oua cocta trita cum oleo imponuntur, & folijs betæ operiuntur. Quorum trium candidum cum anuli pari mensura imponitur. Hysopū contritum cum panis polline & rosaceo illinitur. Ac fimus uitulinus seu bubulus. Ramenta iræ caprinæ pellis eiecta punice, & ex aceto trita, illiniuntur. Serpentium senectus cum bitumine & felle sine fimo agnino ex aqua illinitur: à balneo, alij cinis ex oleo & garo illinitur. Ruta ex aceto & oleo illinitur. Amurca oliuæ nigre infunditur. Gryllus contritus ab eo qui non sit uitio illo apprehensus, cum qui hoc fecerit, in totum annum ab hoc malo liberat: oportet autem eum erui ferro cum cauernæ suæ terra. Anseris adipe perungitur utiliter hoc vitium. Viperæ caput aridum adustū ex aceto superlinitur. Spongia ex aceto imponitur tam grandis, ut sanas quoque partes obtegat: ursinus adeps adiicitur. Est genus sacri ignis, quod Zoster uocatur, quod occidit eum quem appetit, si præcingit. Huic occurrit planta, go imposita cum creta cymolia aqua cysterina, aut certe dulcis soluitur ex oleo, deinde penna perungitur, eadem die liberat. Oui medium quod est rufum, teritur sublato albo, in uase cupreo, deinde pistillo de cupro, & sic dolor penna illinitur. Herba heliotropium sicca comburitur, cuius cinis oui uitello permiscetur, & penna illinitur. Plantaginis succum, cerulam, & cretam cymoliam miscebis & induces, curat. Album cicer aut nigrum infundes in aqua fontana, post triduum teres diligenter ut cerotum, dehinc in ipsam aquam infundes medullam panis, & seorsum diligenter teres, deinde in uinum miscebis, & si durū fuerit, adijcies duo uel tria cochlearia ipsius aque, ita ut post illitum pannio uel linteo imponas. Teres cretam diligenter, & seorsum bene teres coriandrum & commiscebis, simulque teres, addito uino ueteri modo dico: lauabis etiam uino ueteri locum, atque à penna induces medicamentum.

Ad rubeam Cap. XXXV. *ad unguis rubeola?*

LAVABIS primum uino ueteri, & puluerem uerninum terrenorum superasperges, quoad solē fiat arefacti, & alligabis: quod si locus talis est, ut alligari non possit, ipsos lūbricos recentes teres & linies.

Amblystis fariandis. Cap. XXXVJ.

FIM V Souium cum cera ambuffis imponitur. Ambuffum polenta cum aqua subacta & imposita sanat. Maluz folia ex aqua decoquuntur & ex ea aqua fontentur combusta. Folia quoque cruda trita, admixta axungia caprina imponuntur. Myrti viridis folia confusa & imposita sanant. Pulsis foliorum eius si cum rosa perfundatur, exicat & citem nutrit. Terra quam talpa eiecerint; cum aceto mixta & trita imponitur. Ouum crudum cum sua testa tritum & illinitum sanat. Fimi columbini cinis ex oleo illinitur. Cucurbitæ aridæ farina uiliter aspergitur. Lens ex aqua semicocta imponitur. Procedente uerò curatione lens cruda continetur, eiectioneque fursure eius decoquitur, & sic imponitur, posteaque mel adiicitur. Vitis cortex comburitur, & cinis eius ex oleo illinitur, & pilos reddit. Hordei tostum tritum ex albo ouorum illinitur. Quæ in aqua decoquantur, deinde in pruna torreatur donec putamina eorum comburantur, tunc lintea eorum ex rosaceo illiniantur. Oleum addito sale, pustillas reprimit. Eis uerò quæ feruenti aqua combusta sunt, ranarum cinis inspersus adeo prodest, ut etiam pilos reddat. Efficax est fibrinari pelium cinis. Fimus leporis & capræ illinitur. Quis portionibus. Gluten

Gluten taurinum remissum, sicut solet à fabris remitti, sine cicatrice sanat. Hederæ nigra folia ex uino uetustissimo cocta, & contrita impones. Illinitur item canini capitis cinis, cochlearumque cinis ex oleo, atque adeps uerrinus, garum infunditur, nec nominatur. Cancrorum marinorum uel fluuiatium cinis ex oleo prodest ambustis: illita item fex uini, siue sapæ. Oliuarum carnes teruntur, & imponuntur. Nigra oliua cōtinuò si imponatur cōmanducata, pustulas gigni prohibet. Flos hederæ cū cera utiliter imponitur. Magnes lapis crematus, tritusque inspergitur. Optimum est si ex auribus taurorum & genitalibus sordes applicantur. Emplastrum ad combustum. Recipe spumæ argenti uncias duas, ceræ tres, adipis porcini mundati lib. duas & semis. Emplastrum quod ad combustum mirifice facit, & cum multa sint, nullum magis probatum: protinus enim impositum, tollit dolorem, & infinita celeritate per sanat. Recipe spumæ argenti uncias duas, adipis porcini purgati sex, ceræ libras duas & semis, oui anserini intello teres, & miscebis, spumæ argenti tritam ceram cum adipe resolues. Ceram item in oleo rosato resolues, & facto tenui ceroto, admiscebis bulbum lilij diligenter tritum. Alij tamen addunt cerusæ puluerem molliissimum, & panis micam infusam in aqua & tritam, & spumæ argenti bene trite puluerem: hoc facit ad faciem frigore uel calore exustam. Cerorum de rosaceo, adiecto adipe porcino recenti quod satis est. Radices lilij conteres, & cum opus fuerit, uteris. Herbam cuculum inuolutam, coctam in cinere contundes, & oleo atque aceto permixtam induces, combustum intra triduum sanat.

Ad frigore exusta. Cap. XXXVII.

LEPORVM pili cinis, pulmoque eiusdem adalligati, frigore exustis medentur. Ad combusta à frigore, mori quoque arboris succus cum oleo æquali mixtus facit: mitigat enim perunctus uisuram. Ad ignis & frigoris adustionem. Rutæ folia in oleo cocta & trita colabis: peruncta deinde & imposita calefaciunt. Puluerem aristolochiæ ex oleo trito, contra frigora & algores perungi utile est. Vrticam item teres & superpones, & alligabis. hoc facito bis in die, & intra dies quinque sanus erit. Ituri uero per niuem, farinam opopanacis bibere debent, eaque perungi. Vim enim habet mirifice calefactoria. Si autem facta sint uulnera, frumentum rostum in ferro, ac tritum in uino, presentaneo remedio est.

scabiei arde. Cap. XXXVIII.

MEDVLLAE asininae illitæ plurimum profunt. Vina asini cum suo luto imposita sedat. Gluten taurinum cum aceto tepefactum, addita calce, imponitur. Fimus bubuli, alumen liquidum admixto nitro ex melle imponitur. Nitrum candens ex uino extinguitur, quod tritum ex oleo spargitur in balneo: hoc enim & pruritus sedat. Folia fraxini coques ex aqua, & inde sapius lauabis. Sanguis quoque bubulus recens impositus: qui cum aruit, alter superillinitur, postero die abluitur cinere lexiuio. Sanguis caninus illinitur. Trium locustarum pratenium pedes cum seuo hircino triti medentur. Ad scabiem & pruritus. Radicibus runcicis, hoc est lapatij medullatis, non coctis, sed cum sale tufis, aceto acrimixto uteris in balneo. Ad scabiem purgandam folia herbæ parietariæ conteres diligenter, & exprimes, colabisque, & mittes in trullionem aut acetabulum succum, ut bulliat diligenter, & postea lauabis ac refrigerabis: cumque gelatum fuerit, si quis humor remansit ex illo succo, fundatur de reliquo, perunges locum scabiosum. Perfici folia mittes in oleum Sabinense, cum iam feruere coeperit: ubi se contulerint, illis leuatis alia mittes. hoc facies & tertio. dehinc colabis oleum, & cera addita factum cerotum repones, & in necessitate uteris: facit enim ad lateris ac splenis, & uernorum dolorem. Resinæ, ceræ, sulphuris uiui, & picis den. sex, conteres singillatim & sic miscebis, iterumque teres, ut lene sit, & inde in sole calido corpus illinies, & paulisper morabitur, donec bene sudet. Emplastrum aliud, siue medicamentum ad scabiem. Recipe spumæ argenti unciam unam, cerusæ duas, ceræ punice sex, olei rosati quatuor, axungie porcine recentis sex. Ad scabiem uel combusta. Recipe cerusæ unciam unam, spumæ argenti semiunciam, olei rosati sex, ceræ sex, facto ceroto tritum puluerem miscebis, & album duorum ouorum addes. Item phlegmæ quibus manus replentur. Micas panis in recenti infusas cum lactuca tere, & impones. Coccyton ad scabiem. Recipe ceræ libram unam, rosati unam, lithargyrii quatuor, cerusæ quatuor, medullæ ceruinæ quatuor, ouorum trium uitellos, succum prisanæ: quæ omnia scabiem curant. Itemque annum cum melle mirabiliter curat.

Ad papulas, & pruriginis. Cap. XXXIX.

LV PINORVM farina ex aceto subacta in balneo papulis illinitur. Pruritus sedant, coctæ minutæ impositæ. Nitrum candens uino austeri extinguitur, deinde conteritur, & sine oleo in balneo aspergitur, pruritus & scabiem sedat. Oleum in quo pastinacæ marinæ decoctæ sint, aluminis liquidi pars tertia, duæ partes mellis in balneo papulis illiniuntur. Aequæ papulis creta cymolia in balneo illinitur. suilli fimi cinis, uel cornu ceruini cinis ex aqua illinitur. Sulphur tritum mixtum liquamine in balneo utiliter illinitur.

Ad pustellas que uocantur uolatice. Cap. XL.

TROCISCVS ad pustellas uolatice. Recipe yu fideron uncias III, alij purgati unam &

Ad pustulas psoricas.
semis, sulphuris uiui unam & semis, cymi den. duodecim, aceti acri quantum sufficit: teres simul omnia ad solem, & permiscebis. *Cap. XLII.*

Uariis tollendis.
FOLIA porri sectiui trita & imposita, tollunt uaros. Itemque farina erui ex aqua imposita fanantur, & toto corpore maculæ emendantur. Oleum amygdalinum ex melle illinitur. Adeps gallinæ cum creta contritus cum cepa imponitur. Varos tollit farina auenæ ex aceto cocta & imposita. Lacertæ quoque sanguine ieiunus, illiniatur. *Cap. XLIII.*

Uerrucas, clauos, callos tollit.
VERRUCAE abolentur urina recenti canis, cum suo luto illita. Fimi canini cinere cum cera & cepa imposita. Agrimonia cum aceto imposita, uerrucas tollit. Fimus autem cum sanguine mulino recenti illinitur. Herinacij felle & sanguine lacertæ, fimo gallinaceo cum olei & nitro efficaciter tolluntur. Ocimo cum atramento sutorio. Immaturo rum etiam ficorum lacte cum axungia mixto. Caput menarum cinere cum oleo trito. Itemque fimi uetuli cinere triti ex aceto. Asinina urinaq; toto tolluntur. Item sanguine lacertarum, quæ tyzelicolæ dicuntur, si perunguntur ipso. Ad uerrucas & clauos. Nitrum tritum cum exiguo mellis illinitur, donec cadant. Clauum autem qui primum surgit, de sapone circumlinies, & in circuitu, & in medio. *Cap. XLIII.*

Ad pruritus corporis.
LAURI uiridis folia cum sale ex uino ueteri conteres, & in corpus perfricabis, & non terges. Lauri tymolæ cum oleo conteres, & ex eo corpus perunges. Apium conteres cum oleo rosato, & inde corpus illinies. Vinam calidam, & nitrum coctum ac tritum commiscebis, & exinde corpus lauabis. Nuces rancidas & sulphur æqualia teres, & de liquamine optimo temperabis, ac fricabis, dehinc perfundes ex aqua temperata corpus, & postea de uino ueteri & pane fricabis; sulphur uiuum cum liquaminis flore teres, & ex hoc in balneo perunges, ita ut non scalpas. Cumque diu moratus fueris in calore, de mica panis in uino infusa corpus perfricabis, & sic descendes in solium. Herba cuculi contrita, locum qui prurit, sanabis. Foeniculi uiride concides minutatim, & nitrum uiride conteres, & sulphur ex aqua coques, & inde corpus fricabis. Item ad pruriginem. Recipe nitri libram unam, sulphuris uiui uncias tres, axungia sine sale tres, nuces rancidas numero triginta, liquaminis optimi quod sufficiat. *Cap. XLIII.*

Ad impetiginem.
NUCLEVM pinæ uiridis teres diligenter, & mundissime, & mittes uinum uetus, & terendo, quasi cerotum mollissimum facies, & locum illinies. Silicem quoque tritam cum aceto impones. Fallam item de foco cum salua induces. Salua ieiuni perfricantur. Similiterque uua canina draganum in aceto infusum & illitum mire curat. Gummi in aceto infusum ad utrumque facit. Myrrha trita imponitur. Herba cuculus inter manus confricatur & illinitur. Succus chelidonie, illinitur ruptis folijs expressus, expertum est. Thuris masculi, nitri, ac spumæ argenti, paria pondera cum aceto conteruntur ad spissitudinem mellis, & illiniuntur. *Cap. XLIV.*

Ad maculas de corpore emendas.
MENTAE siccæ unciam unam, & sulphuris uiui semiunciam, in puluerem mollissimum rediges, & in balneo cum sudare coeperis, super cutem asperges, & ex eo puluere perfricabis. Ad eos uerò qui durioris sunt cutis. Radicis chamæleontis uncias tres, nitri floris duas, sulphuris uiui unam, ex aceto bene contere, & illini in sole, sed non diu pmaneat, & ne exulcereris, inde laua. Ad uarietates coli uel thoracis, quæ ex cholera uel phlegmate ueniunt. Helleborum album, sulphur, nitrum rubrum & alcyonem æqualia in puluere redacta colliges, & in balneo cum sudare coeperis, loca maculosa asperges. Ad maculas uerò albas uel nigras, quæ exeunt in pectore, uel in collo, siue in brachijs, aut ubicunque de phlegmate aut de felle, aut undecunque de phlegmate. Tinaperi drachmas quatuor, foliorum fici II. aphronitri quatuor, alcyonem quatuor, cymolæ XII. tere, & in balneo utere. Ad maculas albas uel nigras. Alcyonem unciam unam, struthij unam, hellebori nigri duas, tinaperi tres, nitri tres, pumicis tres, felle tres, sinapis sex, certron sex, cerusæ tres, teres, & uteris in balneo. Ad lepram. Gallæ omphacitæ uncias III. chalcanthi, aciciz, melle, rubi, aut marrubij succo æquali pōdere uteris. Capparis item cortices cum aceto coques, & uteris, quandiu autem tuleris medicamentum, uteris dirodino. Lapatij radicem decoctam cum sapa & tritam illinies. Helleborum item album tundes, cribrabis, & teres cum aceto acri, & uteris: quando autem defudaueris, de spongia terges. Similiterque sandaracæ alumine rotundo cum aceto uteris. Ad lepram antiquam. Recipe pulueris hireos congiuum unum, cardamomi dimidiū, nitri drachmas III. chalcanthi octo, asphodeli radices numero quatuor: ista omnia trita & permixta repones. Quando autem necessarium

cessarium est ad usum, coques cum aceto acri ad spissitudinem, & uteris, ita ut prius corpus nitro diluas. Lapatij item agrestis radices drachmas XII. gummi sex, coques ex aceti cotyla una ad quartas, postea admi-

scabis sulphuris uiui drach. tres, myrrhē duas, gallē duas, agitabisque & leuabis de foco citius: & loto prius corpore de nitro, sic uteris. Item nitrum / Chameleōtis nigre radices, cardamomum, chalcanthum, alu-

men schistum, hircum: omnia æquo pondere teres cum aceto, & uteris ut supra. Ad lepram. Recipe Em-

plastrum ad lepram siue scabiem. Recipe ituriz folia ustulata ad unciam unam, yu schiston unam, cerā-
& olei rolati quod sufficit: quod inductum linteo impones, & solues post triduum, postquam tuleris em-
plastrum, impones salem cum aceto coctum & tritum: bibe & uteris; biduo, hoc curat, & splenem sustētat.
Ad lepram ualde bonum; facit autem & ad antiqua uulnera. Recipe yu unciam unam, chalcanti unam, cerā
cerā unam, adipis porcini duas, sicca teres & commiscebis. Emplastrum Claudiani. Recipe lauine unc.

tres, sandaracē duas, aluminis schisti duas, ammoniaci duas, sulphuris uiui duas, uisci unciam unam & semis,
erebinthinē quantum sufficit ad colligendum. Conficies autem studiose, & facies ut malagma, & impo-

nes, & locum inductum in alutam, & solues post dies septem uel octo impositum, & hoc uulnus non facit.
Item aliud. Recipe pond. sulphuris hellebori albi unc. duas, adarcē unam, nitri IIII. alcyoni unam, ti-

naperi unam, foliorum fici siccorum unam, fecle unam, rosē sicce duas, cessare quatuor
Ad colorem cicatricibus reddendum. Cap. XLVI.

ARIETINVS item pulmo recens quā frequentissime imponitur. Adeps leoninus cum ro-
faceo imponitur. Seuum eiusdem ex nitro efficax est. Utendum quoque est anguium senectute ex
uino decocta. Idemque felle scorpionis marini. Fimo etiam columbino ex melle, eruceque semi-

ne cum melle bubulo. Lupini ex aceto costi imponuntur. Rursusque seuum asini uel uituli adiecta
myrra, oleo & croco extenuat, & in hos usus seruat in pyxide creta, & calefactum imponitur.

Ad liuores recentes, & tumores. Cap. XLVII.

RECENTI liuori cortex raphani ex melle tritus imponitur. Holus tritū crudū per se. Allū
tritum cum melle equali. Apium uiride tritum cum albo oui imponitur. Sinapē item tritum cum
melle & adipe anserino. Acrisoli radix decoquitur, & trita imponitur. Aqua marina utiliter tumor
fouetur. Tumorem uero recentem aqua falsa calida sepius cum spongia posita tollit. Fimus quoque
suillus sub testa calefactus, & tritus cum oleo, mire aduersus tumores facit. Percussa in facie aut desqua-

mata, pane ex melle sanantur. Si sit ex percusso, fimus aprinus decoctus ex aceto imponitur. Fel
quoque ouium cum lacte mulieris. Cancri item fluuiales triti cum lacte asinino. Sinapis Alexandrini
triti heminam, adipis anserini uncias quatuor, melissā libram, in mortario commiscebis, & panno induces,
& parti quæ ex contusione in dolore est, impones, mirifice sanat. Pulmones pecudum in tenuissima fru-

sta conciduntur, deinde coniecta in feruentē aquam calida subinde tumoribus imponuntur. Plantagine
cruda & contrita, si tumor siue duritia cataplasmetur, efficaciter sedatur, quod remedium & alia huiusce-
modi curat, & cautromata. Sal in saccum lineum conijcitur, deinde intinctū in aquam feruentem, & ita
calefactum crebro imponitur. Fimi aprini farina inspersa potioni, eueris utilissima est. Sed aliqui putāt
melius esse eiusdem fimi fracti a quadrigis & rotis pressi. proximam huic putant fimo suillo uim inesse.

Luxatis uero recens fimus uel aprinus, uel suillus, uel uitulinus imponitur. Verris spuma recens cum
aceto illinitur. Fimusque caprinus cum melle. Caro bubula ruptis conuulsisque illinitur. Hoc lo-
co compositionem emplastri ponimus, quo Sagares uti solebat. Pancratiastes de nobilissimis, aduersus
omnia quæ in huiusmodi certamine solent inferri: quod præterea furunculis, strumis, uulneribus, collectio-

nibusque, podagris quoque medetur. In cacabum nouum figile conijcitur spumæ argenti tusa & cribra-
ta libra una, olei ueteris sesquibra: hæc coquuntur, & subinde rudicula permiscuntur. Modus enim
est, ut fiat crassitudo glutinis fabrilis; tunc adijcitur picis sicce pondo quadrans, seui taurini diligenter triti
pondo uncia; interposita horæ dimidia parte, cum defierit, rudicula in aquam frigidam missa, & aramota di-

gitis inquinata tollit: & cum opus fuerit, linteo spisso imponitur, ita ut oleo non tangatur. Si sanguis
luffiderit, farina frumenti ex aqua temperata imponitur, quæ tantam habet potentia, ut sanguinem pro-
ducit usque ad fascias. Nero initio sui imperij, quoties nocturnis grassatris in faciem uerberatus erat,
thapsiam cum thure & cerusa illiniebat, & postero die sine ullis argumētis rixē populo Romano uultum
suum inspectandum præbebat.

Ossium fracturis sanandis. Cap. XLVIII.

CANINVM cerebrum linteolo illitum imponitur, superpositis lanis, quæ subinde oleo suffun-
duntur, quartodecimo die solidat. Cinis syluestrium murium imponitur cum melle. Cinis uero ter-
renorum uernium cum melle etiam minuta ossa extrahit. Lardum elixum circunligatum mira cele-
ritate solidat. Sed articularum fractorum cinis de femoribus pecudum cum cera coctus imponitur.
Caprinus fimus ex ueteri uino aperit, extrahit, sanat.

Corpori refixa extra sunt
 riuus disceptus, lacerte caput,
 lacerta riuus discepta, cochle
 coagulum, testarum sepię cinis
 elixu, pice, nasturtium, & latte
 elixu, pice, nasturtium, & latte
 filicis, agrostis, canci, flumini
 purpurarum cinis, aceto, riuus
 capre, coagulum omne, thuris

Ad extrahenda ea que corpori infra sunt. Cap. L. I. X.
M. V. S. uinus disceptus imponitur. Lacerte quoque caput concisum, & cum sale tusum. La-
 certa etiam uiua discepta. Cochlee item exemptę de testis suis, & contrite cum leporis coagulo. Testa-
 rumque sepię cinis. Allium elixum cum pice, harundines extrahit. Nasturtium cum pice impositum.
 Farina lini seminis cum radice syluestris cucumeris una trita. Vrtice radix trita & imposita, filicem ex-
 trahit. Filicis item radix eodem modo harundinem extrahit. Radix etiam acrisolij coquitur, & teritur,
 & sic imponitur. Blatte sine pedibus, & sine capite & pennis trite illiniuntur. Canci fluuiatiles triti,
 Testarum purpurarum cinis ex aceto. Fimus capre ex uino. Coagulum quodcunque est, sed maxi-
 me leporis, cum pari pondere thuris aut uisci.

filicis radix arundinem,
 arundinis radix filicem extrahit.

Aduersus morsum canis rabiosi. Cap. L. I. X.
SALSA MENT V. M. imponitur. Succu rutę pondus den. quindecim ex uino bibitur. Pla-
 ge imponuntur rutę folia trita cum sale, & melle uel cum pice & aceto. Folia nigře ficus trita ex aceto
 medentur. Rose syluestris radix pota, efficacissime abicit aque pauorem. Plantago pota, & imposita, fa-
 cit & aduersus canis rabiosi morsum, & aduersus omnium bestiarum. Lana succida indita morsum sanat
 post diem septimum soluta. Cinis capitis canini illitus abigit aque pauorem, aut caput canis deuoratum.
 Vermis quoque de cadauere canis alligatus, pauorem tollit. Est limus sub lingua canis rabiosi, qui da-
 tus in potionem, hydrophobiam prohibet. Omnia autem preceedit, ut iecur eiusdem canis qui momorde-
 rit, deuoretur, si fieri potest, crudum: si minus, quoquo modo coctum. Crista gallinacei contrita imponi-
 tur plagę. Anserinus quoque adeps cum melle. Saliuntur a quibusdam canes, qui rabiosi fuerunt, ut in
 remedium carnes eorum edantur. Laetens catulus eiusdem sexus qui momorderit, in aqua necatur, eius-
 demque iecur crudum deuoratur. Fimus gallinacei rursus ex aceto morsui imponitur. Glebule ex hi-
 rundinis nido solute ex aceto illiniuntur. Catulus laetens priusquam uideat, aperitur, eiusque coagu-
 lum bibitur, ita ut is qui bibit, in defluenti aqua stet usque ad umbilicum. Pauescuntibus uero aquam, to-
 tam faciem perungunt adipe uituli marini. Aquam expauescuntibus uita plaga ferro continuo sanatur.

lacta pemat. quid.
 Ad morsu canis rabiosi.
 mentu, succu rutę & filicis, sal,
 acetum, folia ficus, pice, plantago,
 syluestris radix, lana succida,
 pice canis, uermis de cadauere canis
 alligatus, anserinus adeps, crist gallinacei
 nido, hirundinis, adeps uituli marini

Aduersus morsum canis non rabiosi. Cap. L. I. X.
N. I. T. R. V. M. & axungia & resina equis ponderibus ex aceto imponuntur. Alex cruda in lin-
 teolis conceptis. Allium cum melle tritum. Menta etiam cum melle cōtrita. Marrubium tusum
 cum axungia ueteri. Vrtica trita addito sale. Cinis uitium cum oleo, acetum calidum cum spongia.
 Ramorum fici cauliculi teneri bene triti. Nuclei amygdalini cum melle triti. Nucum iuglandium car-
 nes cum cepa & sale ac melle contrite; easdem carnes nucum ab ieiuo homine commanducas imponi
 iubent. Spongie minute conciduntur, & imponuntur infuse uel ex aceto aut ex aqua seu ex melle.
 Fex aceti cum melanthio, plagę imponitur.

axungia, resina, aceti, alex, alliu,
 menta, marrubium, uirtica, sal, elixu
 uitium, spongia, cauliculi ramorum fici,
 nuclei amygdalini, nucum iuglandium
 carnes cum cepa, sale ac melle contrite,
 melanthio

Aduersus morsum canis non rabiosi. Cap. L. I. X.
S. V. N. T. qui uel suis pilis uel seniorum suorum in balneo offendantur, sine ulla quidem ratione:
 sed illorum quoque persuasioni succurrendum est, & monstrandum, quemadmodum effici possit, ut cuile
 si pilis non renascantur. Non omni autem psilothro sic utendum est, ut prius quam adiciatur, resina pilli
 auferantur. Sanguis uiz tuse in fictili uase, ex aceto illiniuntur per horas tres, deinde in balneo ab-
 fluuntur. Lac canis primi partus illinitur. Amerinę nigre semen cum spumę argenti pari pondere
 illinitur in balneo. Sanguis quoque uespertilionis. Vipera exęptis ossibus in tribus heminis olei dis-
 coquitur & teritur: hoc peruncti psilothrantur. Fel herinacę illinitur. Cum aduersus omnes morborū
 incursum fuerimus diligentissimi, non ideo tamen habebimus spem salutis, cum ex improviso serpentes se-
 uiant, mures aranci, & phalangij, & his omnibus nocentiores sunt uenefici hominis morsus. Aduersus
 hæc itaque conuertendus est animus instruēdis remedijs, ut appareat, benignitatem naturę etiam ea mor-
 tifera esse noluisse. Igitur tithymali succus oleo illinitur in sole frequenter & hyęnz sanguis illinitur.

psilothrum, resina, cap. L. I. X.
 S. V. N. T. qui uel suis pilis uel seniorum suorum in balneo offendantur, sine ulla quidem ratione:
 sed illorum quoque persuasioni succurrendum est, & monstrandum, quemadmodum effici possit, ut cuile
 si pilis non renascantur. Non omni autem psilothro sic utendum est, ut prius quam adiciatur, resina pilli
 auferantur. Sanguis uiz tuse in fictili uase, ex aceto illiniuntur per horas tres, deinde in balneo ab-
 fluuntur. Lac canis primi partus illinitur. Amerinę nigre semen cum spumę argenti pari pondere
 illinitur in balneo. Sanguis quoque uespertilionis. Vipera exęptis ossibus in tribus heminis olei dis-
 coquitur & teritur: hoc peruncti psilothrantur. Fel herinacę illinitur. Cum aduersus omnes morborū
 incursum fuerimus diligentissimi, non ideo tamen habebimus spem salutis, cum ex improviso serpentes se-
 uiant, mures aranci, & phalangij, & his omnibus nocentiores sunt uenefici hominis morsus. Aduersus
 hæc itaque conuertendus est animus instruēdis remedijs, ut appareat, benignitatem naturę etiam ea mor-
 tifera esse noluisse. Igitur tithymali succus oleo illinitur in sole frequenter & hyęnz sanguis illinitur.

ANTIDOT V. M. Mithridaticum laudant medici, eiusque diuersas afferunt compositiones,
 & ad commendanda pigmenta pretiosa, propter raritatem, ingentes pecunias proscunt. Appendant nā
 que singulas libras uicenis HS. & infelicium credulitatē hoc quoque ingenio circumpueniunt, ut illis per-
 suadeant emere, quę noceant. Alia nanque stomachum ledunt, alia caput aggrauant, alia pallorem affe-
 runt, aggrauant & corporis maciem: & ita frequenter accidit, ut hi qui illorum antidotis usi sunt, miserius
 morerentur, quasi bibissent uenenum. Pompeius autem Magnus, Mithridate deuicto, in scrinio eius in-
 uenit ipsius manu scriptam compositionem, qua ipse præsumpta aduersus omnia ueneficia in totū diem
 tutum

Antidot V. M. Mithridaticum laudant medici, eiusque diuersas afferunt compositiones,
 & ad commendanda pigmenta pretiosa, propter raritatem, ingentes pecunias proscunt. Appendant nā
 que singulas libras uicenis HS. & infelicium credulitatē hoc quoque ingenio circumpueniunt, ut illis per-
 suadeant emere, quę noceant. Alia nanque stomachum ledunt, alia caput aggrauant, alia pallorem affe-
 runt, aggrauant & corporis maciem: & ita frequenter accidit, ut hi qui illorum antidotis usi sunt, miserius
 morerentur, quasi bibissent uenenum. Pompeius autem Magnus, Mithridate deuicto, in scrinio eius in-
 uenit ipsius manu scriptam compositionem, qua ipse præsumpta aduersus omnia ueneficia in totū diem
 tutum

Venenis prohibendis, datisq; expellendis. Cap. L. I. X.
 Venenis prohibendis, datisq; expellendis. Cap. L. I. X.
 Venenis prohibendis, datisq; expellendis. Cap. L. I. X.

Nota. Spongia de melle & lacte
efficiat antidoto, & p
mundo.

tutum se incolumemque præstabat, in qua nuxes iuglâdes duæ, ficus sicca duæ, rutæ folia viginti, salis gra
num unum, in unum contunduntur, & deuorantur à ieiuno. Electrum, est aurum, in quo quinta pars ar
genti inuenitur, ex quo si quis uase potatorio utatur, infidias ueneni uitabit: discurrent enim in eo ar
cus coelestibus similes cum stridore igneo, eoque modo duplici ratione deprehenditur scelus. Est ele
ctrum fictum in auro, addita argenti quinta parte: sed hoc tantum præstat, quantum illud naturale. ergo
monstrauimus quò antidoto uenenum non admittatur, & quo uasculo arguatur: nunc & remedia sugge
remus. Centaurion potum, omnia mala medicata exigit per aluum. Aristolochiæ radix pondere de
narij ex hemina uini bibitur. Sanguis caninus hauritur aduersus toxica. Coagulum anguium in potio
ne. Ventriculus ciconiæ cum lacte ouium in cibo datur. Mustela vulgaris inueterata drachmis binis po
tatur. Sanguis anetharum ponticarum feruatur spissus, & diluitur ex uino. Asini sanguis potus, uenena
restringit. Hædi sanguis utiliter bibitur.

Contra leporem marinum & pastinacam.

Cap. LIIT.

ASTRUITUR quidem & de lepore marino, qui cum sit genus piscis, mortem inferat in ci
bo impactam non subitam, sed quæ trahatur, quantum plerique existimant, totidem diebus, quòt is uixit.
atque qui has infidias inciderit, ipse suo corpore ostendit ueneficium. Habet namque odorem piscis: hoc
periculo liberabitur, cæcis marinis coctis, & in cibo sumptis. Ostrea fricta, & in cibo sumpta. Malua cum
sua radice coquitur, & succus eius potui datur. Sanguis anserinus æquè cum olei potione ad omnium ma
rinorum ictus bibitur; coagulum leporis & hædi uel agni bibitur ex uini cyathis tribus.

Muris aranei moribus curandis.

Cap. LIV.

MVS araneus exiguus est ultra modum, longo rostelllo, oculorum acie obrusa: & ideo, quantum
existimo, iners & huius natura, ut non possit transire orbitam, morsum uerò uenenatum habet; cui si oc
curritur, coagulum anguium bibitur. Vngulæ arietinæ cinis cum melle imponitur. Ipse mus araneus di
uulsus imponitur. Terra quam in orbita rota depreffit, plagæ imponitur. Talpa discerpta imponitur.

Contra phalangium remedia.

Cap. LVI.

PHALANGIUS præcipue in leguminibus & in hortis obseruatur. Sed & araneus & alia ge
nera bestiarum mortifera, quorum morsus non sentiuntur, sed pruritu intelliguntur: aduersus hæc o
mnia uinum merum bibitur, acetum calidum in spongia quàm amplissima imponitur, ita ut tres sextarios
habeat aceti, sextantem sulphuris. Radicis hederæ succus bibitur. Bibitur succus etiam miorum de ru
bo: Gallinacæ cerebrum cum piperis exiguo imponitur. Adduntur in poscæ potione fimi pecudum
cineres ex aceto.

Serpentium moribus & hominis medicandis.

Cap. LVII.

SERPENTES præcipitem morsum inferunt, quos sanare in promptu est, cum etiam ipsos
fugare sit facillimum. Vulturinarum scilicet penna, suffitu ebuli fumo, nidore usti cornu ceruini. Vipe
ræ uerò qui iecur coctum hauserit, negatur unquam à serpentibus feriri. Erucis ex aceto tritis perunctos
non mordent. Habentem secum cor uulturis, nec serpentes, nec feræ appetunt. Nunc remedia moribus
subijciemus. Satiuus raphanus ex aqua coquitur, & tritus plagæ imponitur. Allium tostum cum testis
suis, & tritum ex oleo adijcitur. Radix ferulæ ex uino medetur imposita. Farina milij cum pice liquida
optimè facit. Eruium tritum ex aceto, & ad serpentium morsus, & omnium ferarum, & hominis mirifice
facit. Vinum merum in spongia imponitur. Mori folia trita recentia, si arida sint, decocta, & æquè trita
imponuntur. Hysopi semen bibitur: eius qui percussus est, uertex inciditur, eoque additur euphorbiū,
& medetur quacunque corporis parte periculum est. Centauriæ radix pondere denarij in tribus cy
athis uini bibitur. Betonica herba trita morsui imponitur. Agarici oboli quatuor in duobus cyathis ace
ti mulsi propinantur. Aristolochiæ radix pondere den. in uini hemina sæpius bibitur: & ipsa ex aceto
contrita, imponitur plagæ. Fimus pecudis recens uino decoctus imponitur. Mus discerptus adijcitur.
Viperæ uerò morsui, uiperæ cuiuslibet tritum & appositum caput, efficacissime prodest. Carnibus galli
naceorum discerptorum ita ut tepeant, extrahitur uenenum. Columbarum cerebrum & gallinacæ, pla
gæ imponitur. Sal cum origano & hysopo ex melle. Fraxini tenerorum foliorum succus bibitur, & ipsa
super plagam adijcitur. Non omittenda est & theriaca, qua Antiòchus rex aduersus omnes serpentes
utebatur, præter aspidem, quæ adeo probata est experimentis, ut apud insulam Coum in templo Aescula
pij incisa sit in lapide, quàm sic componi oportet. Opopanacis, serpylli, mellis, singulorum drachmæ, trifo
lij seminis pòdus denarij unius, anethi & foeniculi seminis & apuli atque apij singulorum pond. den. se
mis, erui farinæ pondus den. duodecim: hæc singula trita & cribrata, dein mixta ex uino teruntur & dige
rit, singuli pastilli dantur ex uini mixti cyathis tribus. Hominis autem morsui carnes bubulæ, sed effi
caciùs uituli imponuntur, neque ante diem quintū soluuntur. sordēs ex humanis auribus illiniuntur plagæ.

Historia. Scenacis statio diu regis,

Opopanax, serpyllus, mel, trifo
lij, foeniculi, apij, anethi, erui farinæ.

Opopanax, serpyllus, mel, trifo
lij, foeniculi, apij, anethi, erui farinæ.
p. 24. l. 21.

Homini morsum curant

Carnes bubulæ, uitulæ, sordēs ex auribus humanis.

Alia Topica.

Opij, serpylli, mel, trifo

AD morsum aspidis, morsum unum refugium habebant priores, ut percussus urinam suam biberet: inter paucos annos interuentum est casu & alterum remedium. Nam is qui utrem plenum aceti ferebat, percussus ab aspidem, dolorem non sensit, donec fatigatus requiescedi gratia, utrem deposuit, de quo facto perniciem sentire coepit, rursusque imposito fibintre desijt. Intellectumque est, quod si acetum bibisset, posset sanari: & ex eo experimento palam factum est, hanc potionem esse efficacissimam. Si uero morsum aspidis sequutus sit sanguis, nulla de eo qui percussus fuerit, spes salutis est.

C. PLINII SEC V N D I D E R E

MEDICA LIBER Q V A R T V S.

De Raphani uirtutibus.

Caput



RAPHANO calidam esse uirtutem, omnium medicorum opinione compertum est: sed & nobis intelligere de usu licet ipsius. Cur enim mixtus cum cibis ceteris, solus de stomacho ructus eiciat, nisi prius concoquitur? Capillos, alopecia iniuria, raptos, cum melle tritus restituit. Eiusdem succus etiam grauitatem aurium instillatus emendat. Contra uenena unicum remedium est, si a ieiuno sumatur. Contra phthiriasim succus eius adhibetur; qui solus potest tenuitate subtili adimi corporis liniamenta, cor penetrare. Aegyptij enim reges, quibus erat studium scrutari corpora mortuorum, & causas ualitudinum, occulta fide recognoscere, in corde ipso nasci eiusmodi uirium prodiderunt. Semine raphani cum melle trito, & sumpto, suspirium mitigatur, & tussis arcetur. Solus cum sale sumptus, uentris animalia extinguit, Venerem stimulat & urinam, puerperis copiam lactis acquirit.

De facultate Apij.

Cap. III.

APII quoque calida uis tradita est, quam de iudicio licet colligas. Nulla enim alia res fortius uel urinae difficultates resoluit, uel foeminarum mensuris imperat. Vnde mirari necesse est, quod a quibusdam imperitis adiuncta aqua calida febricitantibus detur, cum res calida calorato malo addita, magis accendat ardorem: nisi uel strictura stomachi, uel praclusa praecordia relaxanda sunt, ut priore in loco causa ponatur: unde etiam ipsa febris exoritur; abique his similibus causis dari non contrarium cedunt. Aqua pota, in qua uel ipsi uel eorum radices incocta sunt, efficaciter pugnat contra insidias uenenorum: theiacis & antidotis, post amoma, post cinnama iam non ut uile miscetur. Est anodynos ex apij semine, quae stomachum mundatione capitis laborantem mire tuetur, ut Hierax Cappadocia intimo suo retulit. Ea recipit apij seminis uncias sex, anisi sex, hyoscyami sex, comari apij septem, quae omnia trita & cribrata, & cum aqua subacta, in breues pilulas deformantur, ex quibus una uel duae, si febris non fuerit, dulci uino resoluta potantur: si febris fuerit, aqua resoluta dormitum euntibus propinantur. quantum haec potio ualeat, utinam nulla cal amitas coegisset experimento meo nouisse.

De uiribus Rutae.

Cap. IIII.

Rutam ualde hominibus salutarem testantur tot antidota medicorum, quae de eius nomine gloriantur; e quibus unum non inutile ponam, repertum in Aegyptia Iouis ciuitate Diospoli, atque adhuc dipeganon dictum, quod stomachum excitat, digestionem accommodat, aluum mollit, biles extenuat, uitia pectoris, lateris, iecoris, ac renum mitigat. Conficitur autem sic. Rutae uiridis unc. sex, cymini sex, piperis sex, nitri tres: cymini uero prius in aqua maceratur, deinde torretur: & uniuerfa tusa & cribrata, mel li optimo mixta subiguntur. Rutam uenenis resistere, mustela docent: quae cum serpentibus dimicatur, cibo eius armantur. Docuit & rex Ponticus Mithridates, qui cum fratris sui timeret insidias, rutae folia uiginti cum duabus nucibus iuglandibus, & totidem carycis, admixto salis grano, quotidie ieiunus accepit. Nec minorem nobis opem & contra uitia corporis praestat. Aceto enim & oleo rosaceo mixto, mirifice dolorem capitis auertit, & inflationem coli. Item matricis, omniumque interaneorum statim mitigat cum butyro & oleo deosco, & iniecta. Ad lumbricos necandos, utile est oleum bibisse, cui ruta incocta est. Ignis sacros, cum aceto & oleo rosaceo, & cerusa temperata, illico extinguit, datur & succus eius ante accessionem bibendus contra febres cum frigore uenientes. Item instillatus auriculis, efficit ut contingat audire. Stultissime quidam rutae uitia dixere, quod uentrem inhibeat, generale semel extinguat, infantes in utero necet. Facit enim haec non ipsa, sed qui uirtutis eius obliui, nec modum, nec tempus aspiciunt: & ideo temperare prudentis est, ut de auxilio non fiat uenenum.

De Coriandri potentia.

Cap. IIII.

NON dubitanter coriandro refrigeratrix potestas datur: non tamen simplex, ut prudentissime Galeno uidetur, sed cui quædam portio austeritatis immixta sit, inde quod quædam ex eo uiria curatur, quæ nunquam omnino curaret, si sola uirtute frigida uteretur. Cum mellē & uua passa tritum, & impostum, omnes tumores collectionesque compescit: præcipue tamen isto genere medicaminis doloribus testium subuenitur. Succo malignanti & oleo in portione permixtum, animalia interaneis innata persequitur. Semen ex aqua potum, solutionem uentris stringit. Scriptumque à multis legitur, tria coriandri grana tertianas excludere ante accessionē, si fuerint deuorata. Hisdem quoque repellendis efficacē est ipsum coriandrum ante solis ortū ignoratū, ceruicali uiride subiectū. Mirum est quod Xenocrates tradit, si unum seminis granum foemina biberit uno die menstrua contineri duo, si duo, & totidem iam diebus quot grana sumpserit.

De malua.

Cap. V.

OLYMPIAS Thebana abortiuas putat esse maluas cum adipe anseris genitali parti subiectas. Sextius Niger & Dioscorides stomacho inutiles arbitrantur. Maluam molliendi dissoluedique naturam esse sortitam, Græco uocabulo licet credas, nam ἀπό τοῦ μαλασσειν nomen accepit. Interaneis itemque brastice profunt in cibo sumptæ. Assueuerant item, uulnera recentia, folijs maluarum ac salicis simul tritis, ad sanitatem usque perducī. Melius enim emplastrum iisdem eam addidēre. Malua cum axūgia ueteri pulcherrimē quassaturas fouere. Radix etiam unius caulis admota denti, pellit dolorē. Eadem temori alligata, stimulat Venerem. Eadem nigra lana obuoluta, & alligata, mammarum uitia compescit. Dioscorides, & Galenus criminantur in maluis, quod corpus minimē alant, sed citato lapsu per meatum uentris erumpant. Est & agrestis malua fortioris effectus, quam Galenus altheam esse contendit, emplastris mollibus accommodata; quæ tamen & plagis recentibus possit subuenire, & ulcerum tabes admota ficare. Hæc cum in præsentia non erit, in eius usum satiuā succedit.

De Cucurbita.

Cap. VI.

VETERES medici de cucurbita ita sensere, ut eam aquam dicerent coagulatam. Dioscorides humidæ putat uirtutis & frigidæ: idque ex eo probat, quod ipsa in cibo sumptæ, stomachum relaxat, bibendi desideria non excitat. cætera etiam in cucurbita talia, ut aperte frigidæ potestatis exempla demonstrat, cruda & trita leniunt omnem tumorem, in cibo sumptæ molliuāt uentrem. Succus earum, ut Galenus ait, ad compescendum uel acriter auriculæ dolorem, repositus infunditur. Idem succus & dolorem dentium mitigat, si diutius in ore teneatur: sed & rosaceo mixtus, & unctioni corporis admotus, febrium refringit ardores. Sius aridæ cortices efficaciter possunt combusta sanare: eundem cinerem didicimus ab expertis uulnera in uetro iam in putredinem uersa purgare, & ad cicatricem usque perducere. Dioscorides ramenta corticis uiridis in cucurbita landat, earumque effectus sic tradit. Phthiriasim infantium, cuti imposita, depellunt: cum polenta podagræ æstuanti, & ignibus sacris cum pane subueniunt. Semini sicco illa uis traditur, ut in puluerem tusum & inspersum, impleat uulnera quæ cauata sunt. Quidā illud in uino bibendum dedere, ut solutiones alui fluentis inhiheret. Viticulæ cucurbitæ iam senescentes cum passo & aceto dysentericis datæ, miro modo faucia intestina componunt.

De Atriplice.

Cap. VII.

ATRIplex, humidæ atque frigidæ substantiæ olus est, amplius tamen ex humido possidet, & est illi sicut malue, facilis succus ad lapsum, inde in cibo sumptus, indubitatē uentrem resoluit. Crudus siue coctus impositus, duritias omnes ac furunculos sanat. Pernionibus qui adhuc æstuant, antequam in uulnus erumpat, utiliter imponitur. Scabros ungues sine iniuria detrahit, ignes sacros sedat: podagræ feruorem, cum nitro & aceto cum melle refringit. Galenus ad aurugines expellendas uino tritum, & in portione datum, efficacius putat semen eius.

De Lapatio.

Cap. VIII.

CALIDAE austeræque uirtutis est lapatium: & ideo in cibo sumptum, Venerem reprimat, stomachum confirmat, ructus excitat, confundit urinam: cum fimo gallinaceo, paniculas rumpit. Semen ex aqua uel uino potum, dysentericis subuenit, scorpionum uenenis uehementer resistit. nec ferri creditur posse, qui antequam præsumpserit eiusmodi potionem. Radices ex aceto coctæ, & positæ, duritiā lienis confringunt. Scabros ungues leuigat, uulnera in mento nascentia extinguit: in uino coctæ, & impositæ, strumas & parotidas sanant. Gargarizatæ, dolorem dentium & uux tumorem mitigant: potæ, auruginem expugnant. Quidam etiam putant ipsam radicem, si collo suspendatur, scrophas fugare.

De Bitto. Cap. I X.

QVIBVSDAM bliti natura iners & sine acrimonia uisa est, uentrem usque ad cholera[m] plenique conturbat: Hippocrate precipiente ad sistenda omnia menstrua foeminarum in cibo dandum. Clavi quoque pedum, imposito eo, elidantur & comprimi creduntur. Succus ex uino datur utiliter aduersus scorpionum uenena. Quidam uero putant, ipsum tritum, & impositum, plagis mederi.

De Beta. Cap. X.

IECORE laborantibus & splenericis beta cum sinapi utilissime esui datur. Ignis sacros, & quae adusta sunt, cum alumine illita, restringit, ulceribus in capite manantibus. Item alopecij cruda trita optime illinitur. Aqua in qua decocta est, furfures capitis eliminat. Perniosis in fomento adhibita prodest. Iniecta cum melle, onera uentris exponit. Est autem illis natura frigida, non tamen noxii frigoris: ceterum nec usui esse potuissent, uenim medium temperamentum sortita, rigorem praestant, & statis ardores releuant, fastidio languidos ad cibum prouocant, sanguinem acquirunt, lacte plurimo nutrientes foeminas implent, aluum restringunt, copiosius ingestis resoluunt. Optime illas stomaticis dari non Iotas affirmant: trita cum sale, coibusta sanant. Si ante pustellas illinientur, ignem quoque eadem ratione compescunt: cocta in parina, aliorumque horum more condita, cholera laborantibus utilissime offeruntur. Quidam eas ad eandem causam cum lacte coxerunt.

De Intubo. Cap. X I.

SATIVVS intubus stypticus, ut medici aiunt, & austera naturae est: ideo & stomacho accommodatus est, & uentrem restringit coctus, & maxime cum aceto datus: & thoracis ardores, & oculorum epiphoras, & podagras, cum polenta optime lenit. Cardiacis supra sinistram papillam ex aceto impositus prodesse certissimum est. Radix trita scorpionum plagis medetur. Ignis sacros, adhibita cum polenta, sugat. Succus, cum aceto & rosaceo mixtus, capitis dolores releuat. Iecoris & uescicae uitia, cum uino haustus, emendat. Sanguinem reijicientibus, itemque geniturae abundantia laborantibus, alterno die offertur potandus. omnibus partibus quae refrigeratione sananda sunt, cum aceto & cerusa efficaciter succus illinitur.

De Nasturtio. Cap. X I I.

NATVRA nasturtio caustica est, & tamen usum uenereum uidetur inhibere, eadem fortasse ratione qua ruta nimia ui caloris semen genitale consumit. Fermentum mixtum & appositum, furunculos, itemque carbunculos prouocata suppuratione dirumpit. Succus illitus capillis fluentibus prodest. Idem infusus auribus, dolores dentium mitigat. Seminis autem maior effectus, adeo ut etiam partus necet: cum uino haustum, animalia uentris extinguit; uenenis serpentum occurrit, & fugare eos creditur. Carbonibus suffumigatum, lienem reprimat in portione cum aceto datum, uel cum ficu deuoratum. Scia-
tis utilissimum est, cum aceto & polenta impositum. Lichenas, cum melle illitum, purgat, ulcera capitis, itemque porriginem, cum adipe anserino tergit: aluum purgat, ex aquae cyathis quatuor unius denarii. propinatum: sorbitionibus mixtum, pituitam pectoris soluit: cum lacte caprino coctum, dolores pectoris mitigat: a ieiuniis ex melle sumptum, tussientibus salutare est.

De Eruca. Cap. X I I I.

CALIDAE quidem, non tamen nimium austera, ignita quae uirtutis est eruca; inde Venerem maxime stimulat in cibo sumpta, & digestiones adiuuat, & urinam mouet. Lactuca quoque optime in cibo iungitur, ut rigori par feruor admixtus, temperamentum salubre componat. Ex uino pota, duritiam sensus contra uerbera creditur praestare. Infantibus tussientibus in cibo utilis est, maculas cuti rollit: ex facie, cum melle illita, lentigines extrahit. Radix in aqua decocta, extrahit ossa quae fracta sunt. Semen ex uino potum, scorpionum uenena, itemque aranei muris excludit: nigras cicatrices, cum felle bubulo, ad ca-
dorem reducit. Condituras coquorum tam ipsa, quam semen adeo suauissimas reddit, ut inde a Graecis *eruca* nominata sit.

De Pepone. Cap. X I I I I.

MELONIS usus est quidem gratior, uenim difficile concoquitur, propter naturalem rigorem: & ideo nonnulli cum aceto sumunt, pulgium ei & cepas admiscunt, quod nocitura uis frigoris temperatur. Pepo in cibo leuior: nam detracta cute, ac semine abiecto, esui datus, stomachi compescit ardores, aluum leniter mollit: coctus ex aqua cum oleo, aceto, melle, iucundissime sumitur. Caro eius imposita, frons turgens, glaucas oculorum epiphoras miro modo mitigat. Ulcera in modum faui concreta, quae uocant, trita radice pelluntur: assignanturque cortici eius, quod maculas a facie sine signi uestigio detrahant. Semen in puluerem uersum, lomentoque permixtum, nitidiorem foeminis cutem praestat.

De Cucumere.

De Cucumere. Cap. XV.

CUCUMIS & ipse natura frigida reperitur, ventrem soluit, stomacho accommodatus est: quibus liquitur, odore succurrit. Folia eius ex uino trita, uulneribus medentur, quæ caninus morsus impresserit. Semen ex uino dulci datum, uesicæ laboranti faciem præstat urinam. Dysentericis ex lacte muliebri acetabuli mensura datum, prodest: purulenta autem expuentibus, cum cumino pari pondere, & iocionis utrius auxiliatur.

De Carduo. Cap. XVI.

CARDUS natura mordax & subaustera est, ideo succus eius alopecias ex capite depellit: stomachum iacentem, si non auidius sumatur, erigit & componit. Radix ex aqua cocta, cupiditatem bibendi potatoribus subministrat, matrici utilissimus cibus est. Nec mirare, quod sic à foeminis carduus ambitur. Est & alia causa, qua patrocinari eis possit: nam Glaucias scribit, cardui cibum adiuuare, ut masculos procreent. Massica carduorum odorem oris commendabilem reddit: Non præteribo, quod de seruadis legisse me memini, aceto scilicet melle diluto cõdiuntur, addita radice lasaris & cymino, eiusmodi arte proculum est, ne quis omnino sine carduis dies esset.

De Allio. Cap. XVII.

MAGNA uis allio, & ideo in eo maxima est utilitas: omnibus quippe perniciosis hominum malis uehementer resistit. Serpentes & scorpiones, itemque alias latentes bestias odore solo fugat, ictibus eorum æquè medetur, siue uulneri illitum, siue in portione uel in cibo sumptum: morsui canino, cum melle, succurrit. Tineas & alia uentris animalia in multo aceto coctum, perimit & expellit. Siccum cum restibus suis oleo permixtum, omnes ictus uenenatos efficaciter sanat. Eodemque modo & attritas corporis partes & ulcera in capite manantia, quæque in uesica tumescunt, lenit impositum. Peregrinantibus esui datum minime patitur eos aquarum acidorum mutatione perturbari. Suffragio eo, foeminarum secundas euocari, Hippocrates auctor est. Suspiriosis quidam per se crudum, aliqui & cum lacte tritum dedere. Dioscorides hydropicis cum centaurea miscuit, idemque phreneticis elixum dedit. Praxagoras allio usus est contra morbum regium in portione uini. Viride cum coriandro & fici datum, aluum mollire perhibetur. Tussim & suspirationem pectoris mitigat in faba coctum. Elixum illitumque temporibus, dolori capitis opitulatur. Aurium doloribus, succus cum adipe asserino tepesfactus, infunditur. Raucedinem uocis emendat in fisa aut faba sumptum: & quod ad uocem attinet, coctum crudo, elixum sicco, utilius existimatur. Tenefimo, ex pulte coctum, medetur. Tumores suspectos, ex adipe, dissoluit.

De Papauere. Cap. XVIII.

CAPITA papaueris & folia eius decocta, meconicon faciunt medicamentum, contra ea corporis uitia, quæ medio rigore sanantur. Succus cum rosaceo mixtus, doctorem aurium mitigat. Folia decocta, & cum rosaceo trita, tumoribus auricularibus optime illiniuntur. Aqua foueri in qua papauerum capita decocta sunt, uigilarum morbo laborantibus. Itemque ex epiphora oculis lippientibus prodest. Semen tritum cum aceto & melle, non modicam tumeribus opem præstat. Cortex cauliculorum contusus, & redactus in puluerem, melli que permixtus, sordidis uulneribus imponitur. Est & syluestre modici capitis, & non ita fruticis elati, quod miro est in usu faucibus in tumore positus, & asperatas arterias sanat: sitque ex eo medicamentum, quod medici, Chrysippo auctore, diocydon uocant.

De Satureia. Cap. XIX.

SATVREIAE calida uis & propè ignita est. Vnde & illi nomen inditum credunt, quod prosterinos faciat in Venerem, ideoque grauidæ prohibentur eo in cibo sumere. Nam trita, & uentri supposita, partus etiam mortuos expellit, urinam mouet: & ex uino pota, lethargicos letaliter dormientes excitat: & capiti eorum cum aceto frequenter infusa, stomachum nausentem, uel in ouo sumpta uel pota confirmat. Contra animalia quæ aculeatis ictibus feriunt, non inuuliter adhibetur.

De Porro. Cap. XX.

PORRO capitato ad multa corporis uitia Hippocrates usus est. Succum enim eius sanguinem reicientibus etiam solum bibendum dedit: quamuis ceteri cum galla uel thuris farina dandum censuerint. Vuluas contractas eodem succo resoluit. Ipsum etiam in cibo sumptum, fecunditatis plurimum acquirere existimauit. Purgat ulcera, ex melle contritus, & in sorbitione pristinæ datus. Distillationes itemque tussim, thoracis, arterie, pulmonisque uiria compescit, uocè purgat; Venerem stimulat, somnos adducit: capita bis aqua mutata cocta, molliunt aluum. Eadem aqua cum aqua pota restringit. Succus eius citis profluuium sanguinis sistit, & maxime in naribus, si cum mamma thuris aut galla contritus, atque illitus inharescat. Ex abortu plus iusto sanguine profluente, septem & semis scrupulos cum myrti baccis pari pondere in portione dados purgat. Contra ictus uenenatos, uel cum mero, uel cum aqua mulsa succus datus, prodest. Sed & folia cõtrita cum melle, ac mulieribus apposita, non minus profuerunt. Eodè succo plerique

cū lacte muliebri uetere tuffim atque pulmonis uitia sanarunt. Aurium quoque dolores cū felle capri
no uel pari mēfura ufi compescuerunt. Profuit multis in dolor e capitis cū dormitum irent idē succus,
siue auribus, siue naribus cū parte tertia mellis infusus. Ita idē lumborū dolores ex uino mitiores facit.
sanguinem excreantibus, phthificis, etiam distillationibus uetustissimis, uel ex ipso cibis utilis sumatur,
uel succus eius in portione misceretur. Idem succus in cibo sumptus, plurimum prodest contra uenena
fungorum; fracturas alligat, duritias relaxat, uulnera recentia cum felle appositus statim claudit, ebrieta-
tes discutit, uenerem stimulat, sitim sedat, uentrem mollit, uocem adiuuat, affipulante Nerone, quā
porro debuit, quoties bene cantauit.

De Ocimo. Cap. X X I.

DE uirtute ocimi penes medicos incerta est opinio. Nam auctore Chrysippo criminantur, hęc
eius uitia percerent, quod oblit stomacho, quod oculos hebetet, & quod insaniam faciat: Iecori oblitit;
& ideo capram genus hoc herba nunquam omnino cōtingere. Addunt pręterea, si tritum lapide con-
tegatur, scorpiones gigni: commandacatum, & in felle positum, uermes creare, pediculos etiam nutrire.
Aphris quoque hoc putant esse persuasum, si quis eo die, quo ocimum sumperit, a scorpione feriat, nō
posse saluari. Sed qui in diuersa opinione sint, hęc falsō tradita asseuerant: quinimo inflationes stomachi
ructu dissoluit; cōstum cum aceto & sumptum, reprimat aluum fluentem. Semen tritum, haustumque na-
ribus, sternutamenta compescit, uerrucas tollit atramento furorio temperatum.

De Nepeta. Cap. X X I I.

NEPETAM Gręci uocauerunt, nostri uulgo nepetam dicunt, quę magnę uirtu-
tis, & uehemens in calore est. Vnde etiam nobilissimis antidotis meruit ascribi; quibus unum quod hō
dieque diacalaminthes a medicis prędicatur, publicandum putauī. Accipe nepetę unc. sex, petroselini
sex, fiseleos sex, pulegij sex, thymi scrupulos XII. apij seminis scrup. XII. lybistici unc. unā, piperis unā;
hęc omnia tusa, cribrata, mellique optimo mixta, diutissime subigatur: digestionem facit, stomacho & prę-
cordijs utile est, & pituitas thoracis capitisque soluit ac purgat, iecori medetur, duritiā lienis infringit,
calculos pellit, urinam ciet, admoget menstrua foeminarum. Hoc autem antidotum Galenus Potolensis
scribit, quod putat tam salubre, ut plurimis annis uitam hominum possit extēdere.

De Menta. Cap. X X I I I.

DE menta quę potuimus annotare, subieciimus. Labentem animum odoris efficacia recreat. Stō-
macho nihil concupiscenti fastidium detrahit. Sanguinem excreantibus in sorbitione prisana optimē
propinatur. In dolore capitis cōtusa temporibus illinitur. Instillari auribus succum cum aqua mul-
la uile est in dolore. Aridę puluis digitis tribus apprehensus, & cum aqua calida in portione datus, om-
nem stomachi detergit iniuriā, Eadem etiam res uentris animalia interficit.

De Foeniculo. Cap. X X I I I I.

CALIDAM uim foeniculo insitam, non tamen simplicem, sed cui austeritas etiam admixta sit,
gustus ostendit, & multa pręterea, per quę uel soluendi, uel extenuandi, uel etiam siccandi exprimit po-
testatem: traditumque in libris, & serpentes annuam senectutem formiculi gustatione deponere, & oculo-
rum caliginem succo eius excludere. Vnde intelligi datum est, easdem uirtutes & corporibus utiles esse,
sicuti postea experimenta docuere. Succus ergo eius cum melle Attico mixtus, uetustissimam licet cali-
ginem discutit. Auribus purulentis idem succus infunditur. Vermiculos etiam qui in hisdem nascun-
tur, interficit. Radix in prisana data, laxat renum densitatem. Hydropicis ex uino pota succurrit. Ve-
terno laborantibus, ex uino cocta fomentum perquam utile subministrat. Ipsa cum oleo trita, eidem cau-
se medetur. Tumores & quę icu uel repentina indignatione commota sunt, folia ex aceto trita dissol-
uunt. Aduersum ictus scorpionum, itemque serpentum optimē semen ex mero sumitur. Simili modo
temperatum, Venerem stimulat, urinam ciet, sistit aluum, pulmonis & iecinoris iniurias abigit, abundan-
tiam lactis puerperis pręstat: ex aqua tritum, nauſeam sedat, stomachum dissolutum astringit. Nec est il-
lud periculum, etiam frim febre sumatur, uulnera dentis canini, cum melle illitum, purgat, atque sanat.

De Holofatro. Cap. X X V.

SCORPIONVM ictibus & morsui canis semen holofatri ex uino datum occurrit. In mul-
so decoctum, atque potum, difficultatibus urinz medetur, tormenta uentris, & ceteras intestinorum que-
relas eodem modo sanat. Radix in uino decocta, calculos pellit. Lateris & lumborum doloribus
eadem portione succurritur. Succus argentibus propinatus, exoptatum calorem per membra dif-
fundit.

De Cepis.

De Cepis.

Cap. XXVI.

DE uirtute ceparum inter medicos nulla diuersitas est. Dioscorides putat ex cibo earum fitim accendi, inflationes fieri, caput pręgrauari. Galenus existimat, illis demum qui felliti uideantur, esse contrarias: ceterum phlegmate laborantibus etiā utiles asseuerat. Asclepiadi uidetur ceparum usus perquam necessarius, & firmitatem ualitudinis obtinere, qui eas ieiuni quoridie sumpserint. credit & stomacho cibum salutarem, uidelicet ea ratione, quod spiritus agitet. Pręter hæc peculiare cepis attributum putat, ut quotiescunque uidentur, gratiam nobis boni coloris acquirant. Somnum uero cepas adiuuare alium mollire, consensu omnium creditum. medentur oris ulceribus, si cum pane manducantur. Morsus caninos, uirides ex aceto illitę sanant. Siccz quoque cum melle contusę, contra morsus eosdem pari uirtute subueniunt. eandem ob causam ex uino & melle decoctas iubet uulneribus imponi, nec nisi post tertium diem solui. Dioscorides & cum cepa sale & rutam caninis morsibus suadet imponi. Infillatus auribus succus cum lacte mulieris, prohibet dolorem. Quidam illum repente obmutescantibus ex aqua bibendū dederunt. colluendis dentibus frequenter assumitur: zgos eos seruare pręsumitur. tardaribus menstruis foeminarum, non inutile est, uel ipsas in cibo offerre, uel succum ex uini potione miscere. idem succus et caput optime purgat, si modo patienter naribus fuerit attractus: & cum adipe gallinę, trituras pedum mitigat, quas calcamenta fecere. Fluxu uentris laborantibus profuit. coctas eas in cibo sumere, oleo prius tinctas scilicet, & mitigandos morsus, quos in huiusmodi causis necesse erit experiri. Alopecias etiam tufis cepis inficere, inter efficacia remedia compertum est. Galenus affirmat, citius ex ijs nasci capillos, quā si alcyonio quis utatur.

De Anetho.

Cap. XXVII.

ANETHO & si calida uis traditur, nō est tamen plurimum feruens, nec austera: uerū in se habet aliquam molliendi potestatem: si Gręcis auctoribus credimus, etiam nutriendi. nullum denique athletarum cibum sine anetho esse patiuntur. Aegrotantibus prodest cum oleo tepesactū, ac crebrō infusum: creditur enim illis dare aliquas ex febre inducias. mitigat capitis dolores, neruorum tensuras relaxat, non dormientes ad spem quietis innitat: stomachi querelas, coctum in aquę cyathis tribus ac porū, miro modo releuat. indicio est ructus, per quē intelligere datur, aperta omnia quę clausa torquebant. digestionē adiuuat, ideo uentrem uidetur inhibere. Intestinis laborantibus, & uentri, uel ex aqua datum in potione succurrit. Tritę radices, & impositę, feruoribus medentur oculorum. Cinis eius suspendit uiam faucibus ingrauescentem. Radicum uero actior cinis est, adeo ut curentur ex eo, & caro crescens & sordidum uulnus, & quę serpere incipiunt. Semen eius seruēfactum, ad motum quę naribus singultire non patitur.

De Sinapi.

Cap. XXVIII.

PYTHAGORAS inter ea quę propter uirtutem et efficaciam laudat, primum sinapi locum assignat, cuius naturam uult esse thermaticam, hoc est coloratam: lepticam, quę quod inueniat, extenuet: epispasticam, quę quod comprehendat adducat. Merito ergo uirtus eius omnis est tantis insinuatā indicijs, tanquam numerosis corporis uitijs pręstet auxilium: sensus acuit, aluum niollit, urinā ciet, menstruis imperat, calculos frangit, caput purgat: nūc gargarizatum, ut pituita crassior profluat: nunc ad motum naribus, ut sternutamento stricture soluantur. Stomacho contra omnia querelarum genera succurrit, suspensio phlegmate dissoluto, hauriendi aeris pręstat meatum. Serpentiū ictibus & scorpionum cum accotritum illinitur, nec inuitis cibis est contra uenena fungorum. Positum extrinsecus autem in causi- cas uoluerat, raro medicis ad huiusmodi remedia uenietibus; quomodo pene intolerabilem suscitāt uisio- nem: necnon nisi in magnis & uetustissimis causis tā saua tormenta subeunda sunt: sed hoc genere tor- menti humor capitis aueritur, qui cecitatem oculis cōminatur, qui quę stomacho atque pulmōi acer in- stillatus, letaliter ad phthisin pręstruit, & coxę dolorem per uescas & pustulas digeruntur, & splenis tu- mor soluitur, aciecinorum indignatio relaxatur, & hydropicis minitans humor tam non reuersurus hau- ritur. Aiunt & lethargos excitari, si pedes eorum simul tritis sinapi & ficu ariola perfricentur. Nunc in- terim de succo locuti sumus, qui semine exprimitur, admixtis scilicet nunc aqua, nūc melle, si usus exigit. Est & alius qui caule colligitur: hic cum expressus fuerit, lacteam facit guttam utilem dentibus, si in dolo- re illiniantur. Fit quę elegans ex eo antidotum sicut docuimus: semen sinapis, eiusdemque radices in ter- tico datur uitijs faucium, stomachi, capitis, oculorum, potioni modo statuto quantum manus plena conclu- dit. Fit quę ex sinapi oleum semine infuso, lumborum doloribus, & neruis torpentibus necessarium.

De Cauliculo.

Cap. XXIX.

CATO tradit Po. Ro. sexcentis fere annis medicina brassicę usum, nondum enim in urbem cō- meauerant medici, qui in artem redegerunt, quemadmodum magno sanitas constet, & peregrina seculi pigmenta attulerunt, ut illis imponerent pręcia quę uellent: ceterum militares uiri gloriosas cicatrices pręuito holere curabant, eodem horro cura usi ad salutem, dum illos pascit & sanat.

C IIII

in loco medicamentum re uera ita appellandum Catonis Antidotum, quod ille ex brassica componendum putauit, capitis dolori, oculorum caligini, stomacho & præcordijs profuturum. Crudam cum conidro & ruta & menta & radiculis lasaris ex aceto & melle conteri iubet, ac manè ieiunis duorum acetabulorum mensura propinari. Cæterum brassica hoc modo curans, uulneribus nō solum recentibus, uerum etiam ueteribus canceratisque, si prius aqua calida fota sint, crudam contritam bis in die imponi, & ad imperigines iubet; creditque hoc modo tritam, sine exulceratione sanare. podagraz atque articularibus morbis cum ruta & coriandro & hordei farina, & salis quoque mica utiliter admoueri putat: fistulas atque luxata discutere, humores aut euocare aut spargere imposita, insomnia ac uigilias compescere, decoctæ aquæ in fomento nervis articulisque prodelle. Eius quoque qui brassicam ededit urinam seruari iubet, quam calefactam nemis asseuerat utilem. Pueros etiam nunquam debiles fieri, si ex ea urina frequenter lauentur. Hactenus de Catone: nunc ad medicos transeamus, ex quibus Chrysippus peculiarem brassicæ librum dicauit, omnium morborum ex ea remedia continentem: Eiusque & cæterorum de brassica hæc opinio est, quod cibus eius assiduus caliginem discutit, cōcoctioni prodest, foeminis expurgationē excitat, copiā lactis infundit, semicruda aluum resoluit, discosta constringit. cruda ex aceto sumpta splenicos curat, parvus etiam mortuos pellit: cocta contritaque, stomacho cum axungia ueteri & rosaceo superposita, ardores febrium mitigat. lepras & psoras, cum alumine rotundo ex aceto illita, emendat. eadem uirtute medicaminis etiam fluentes capillos retinet. testium & genitalium uitij utiliter imponitur: efficacius profutura, si fabæ tritæ miscetur. Dioscorides uerò succum eius uiridem cum iri & nitro ad molliendum aluum dari censet, podagricis & arthriticis cum aceto & foenugræci farina utiliter imponitur. Catapotia Corneliana alledoria fiunt ex brassica satis innoxia, quod post balneum sumpta, circa cantum gallorum aluum incipiunt cōmouere. Eorum compositio talis est. Cucurbitæ agrestis interioris medullæ scrupulos sex, piperis sex, dyagridij XII. quæ trita & cribatæ succo brassicæ temperantur, & in pilulas ad modum heruiliæ deformantur; ex his quinque uel septem, interdum etiam nouem post balneas propinātur: nec erit necesse, ut is qui accipit, aliquid de quotidiana uitæ consuetudine immutet. stirpes quoque eius aridi combusti, & in cineres redacti, uim causticam præstant. quæ ratione ad uentris, lateris, coxæque dolores cum axungia ueteri efficaciter admouentur: eundemque cinerem, si quis philothris cum aceto & lasare coniunxerit, detracti pili non renascuntur. Apud Galenum autem inuenio, semen brassicæ potum, maximeque Aegyptiæ, quæ uehementior illi uidetur, lumbricos & omnia intus animalia extingui. Puluis uerò & cinere radicū iacentem uiam subiectus attollit. Melius quoque affirmat uiaz esse remedia, radicem plantæ auulsam, colloque suspensam, ita ne terram post euulsionem contingat.

De Asparago. Cap. XXX.

ASPARAGO inest & caloris aliquantum, sed illi etiam styptici uigoris temperatura miscetur: inde stomacho laborantibus cibus utilior transit in antidoti uicem si cum cymino, oleo, sale ieiunis offeratur. & coli dolores sic acceptus emendat, caligines discutit, uentrem leniter mollit. Radix ex uino albo trita, & in portione data, calculos frangit. eadem lumborum dolorē & renum sedat. Medetur etiam uuluz querelis aceto discosta & imposita. Contra elephantiasim efficax creditur. Eadem sicca trita, & in lana denti dolenti admota, sine dolore eum detrahit. Semen obolorum trium cum cymini pari pondere potui datum, Venerem stimulat, urinam sollicitat.

De Armoracia. Cap. XXXI.

CALIDA est armoraciæ uirtus, & ideo in cibo sumpta, copiosam effundit urinam, incitat etiam menstrua foeminarum, stomacho utilis ex aceto data, pituitas glutinosas cum melle sumpta dissoluit. Radix adusta, & in pulcrem uersa, siccandis ac purgandis uulneribus imponitur. Quidam uerò succum eius ex uino datum contra uenena utilem credidere. Eadem & triti seminis ins est, si cum melle sumatur. Nobis quoque expertum est, armoraciam in pituitæ sorbitione discostam, thoracis uiria sanare.

De Pastinaca. Cap. XXXII.

PASTINACAE uis omnis in radice & semine est constituta. Aqua uerò mulla, in qua radix est discosta, potui data, iecinoris & lienis querelas, lumborum & renum uiria compescit. Dysentericis etiam uetustis utilis radix in lacte decocta, aut trita ex aqua, aut in succum redacta, ac potui mensura quatuor unc. data, opisthoronicis & pleuræticis præstat medelā. Radix quoque collo alligata, tumores testium sedat. Negant feriri à serpentibus, qui pastinacam secum ferant, uel ante gustauerint. Venerem stimulat copiosior in cibo sumpta. Dentes uerò radice pastinacæ circumsculptos credunt dolore releuari. Semen uerò ex uino uel ex posca datum, scorpionum uenenis resistit. quæ semen ex uino datum, tumorem aluum foeminarum, & suffocationes ex matrice præclusas, efficaciter soluit. Cum melle tritū, canceratis uulneribus imponitur.

De Napo. Cap. XXXIII.

NON unam eandemque uirtutem in omnibus napis experta est medicina. Id enim quod angulosis

gulos foliorum caulibus ad anethi floret similitudinem, uelut laboranti, itemque cessantibus menstruis feminarum decoctum ex aqua multa, uile existimant: perque non dubie ostenditur, calidam possidere uirtutem. Semen quoque eius tostum, atque tritum, bibendum ex aqua calida cyathis quatuor, dysentericis obtulerunt: sed urinam uidetur inhibere, nisi illi aequali modo lini semen addatur. Alterum genus est quod simile raphano ac rapo uidetur, lautissimi seminis, & contra uenena fortissimi. Ob quam causam, optima quaque theriaca sine illo non conficitur.

De Rapa.

Cap. XXXIII.

RAPAM Democritus tanquam contrariam corpori damnat. Putat enim ex ea inflationes stomachi excitari. Contra Diocles, itemque Dionysius, etiam necessariam existimant, propter eas uirtutes, quae subiectae sunt. antidotum nanque representat. ex oleo & uino trita sumitur, uenerem stimulat, eo ualidius si cum enica condiantur tosta, & cum adipe contrita. Articulorum dolori medetur. Feruens imposita perniones mitigat, frigus ex pedibus expellit. Aqua in qua discocta sunt, frigidis podagris salubre fomentum est. Cuiusque uero uitio pedum, maximeque trituris, cruda tusa succurrunt. Contra serpentes & toxica datur semen ex uino bibendum. Itemque semen uulneribus uenenatis ex uino illitum prodest. Secundum hanc, semen in rapis potest calidum & feruens uideri, ipsa paulo solutiora creduntur, sed quod minus possident caloris, molliendi potestatem plene compescant.

De Thymo.

Cap. XXXV.

THYMVS recte inter haec ponitur, quae uirtutem calidam simul, austeramque sortita sunt. In cibo sumptus, caliginem discutit, lumbricos interimit, urinam impellit, menstrua foeminis prouocat, uterum reliquias uulue inherentes, uel ipsos emortuos partus extrahit. tritus cum melle, & ad modum ligule datus, phlegmata in cibo soluit. tritus ex aceto, & impositus, eodem modo papulas fugat, & eminentia excidit. mixtus polentae, & in uino maceratus, coxae quae feruens superpositus, sciaticis salutaris est.

De Origano.

Cap. XXXVI.

ORIGANO Graeci tria nomina posuere, e quibus unum Trigoricum, aliud Eradium, tertium Onitem uocauerunt. Sed illa maioris uirtutis atque efficaciae sentiuntur. in ratione medicinae satiuum, cuius nos meminimus, aliquando infirmius illis scilicet comparatum. Ceterum nec ipsum sine acri uirtute sentitur: ex uino enim albo tritum, & in portione sumptum, scorpionum & araneorum uenenis resistit, cruditates discutit, morsus stomachi ex aqua calida datum lenit. Cum oleo & aceto tritum, collectumque succida lana, luxaris & contusis partibus prodest.

De Cerifolio.

Cap. XXXVII.

CERIFOLIO igneus est, & acerrimus. Potest cum melle canceratis mederi, lateris dolores haustum ex uino mitigare. Quidam uero illud oleo incoctum, acopis ad soluendam iniuriam frigoris miscuere. Ex aqua autem multa pituitam resoluit, ex aceto lumbricos & rineas perimit, urinam ciet, menstrua pellit: tritum cum cera, & axungia ueteri, parotidas discutit, soluitque omnem tumorem.

De Serpillo.

Cap. XXXVIII.

SERPILLVM calidum simul nobis uile medicinae usus ostendit. Capitis dolores costu ex aceto & rosaceo, temporibus fronti illitum, mitigat. Serpentes & omnia animalia uenenata adustum, nido repellit, ideo & messoribus in cibo miscetur, ut si fatigatos forte somnus oppresserit, tute quiescant contra animalia: haec hoc tempore uenenatis haustibus sature, confluuerunt. Contusi puluis ex scrupulis XII. in aqua datus, tormina emendat, urinae difficultates resoluit, lienis quoque iniuria idem puluis ex aceto, mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit ex duobus cyathis mellis, & aceto temperatus. Atque ut serpilli potentiam intelligas, subdidi theriacam in templo Aesculapij ab Antiocho rege Syriae uerbis dedicatam, in qua non leuem meruit portionem: quae recipit trifolij scrupulos sex, serpilli sex, opopanax sex, anisi XII. foeniculi XII. amyli XII. apij seminis duodecim, cuius farinae unciam unam; haec simul trita uino optimo colliguntur, & in pastillos uictuarii ponderis scrupulorum duorum digeruntur, ex quibus singuli dantur ex uini mixti cyathis tribus. Hac theriaca magnus Antiochus semper est usus aduersum toxica, & potiones malas, & animalia uenenata: cui quantum debuerunt, ex eo licet colligere, quod testimonij sui participem medicinae deum fecerit.

De Pisor.

Cap. XXXIX.

PIRORVM naturam Dioscorides stypticam credit, ac ideo contrita imposita, impetus omnes

incurrentis humoris auertere, eaque ratione cōpescere et quæ de tumore sublata sunt recentibus certe admota vulneribus, sistere sanguine fluentem, perducere vulnus ad cicatricem. Galenus non unâ in pîris, sed ex pluribus mixtâ putat esse uirtutem. Nam quædâ ex his austera, quædâ acida, quædâ dulcia deprehendit: & austeris quidem concedit, ut styptica & constrictura uideantur. acidis autem inesse aliquid & caloris, unde & pleniusque dissoluunt inhzrentem stomacho phlegmatis densitatem. Dulcia cum sint, aquatici & soluti saporis, nihil in se nec calidi, nec frigidi continere. Ex quibus singulis pro generum discrimine, & causarum necessitate ordinanda sunt etiam subsidia medelarum. Austera itaque atque acida in cibo sumpta, stomacho existimantur cōuenire. In dulcibus uerò omnia contraria. Aqua in qua pira sicca discocta sunt, mirifice ualet fluxû uetris inhibere; nec minus poterit, si uel folia sola discocta sint. Annoratumque in pîris, quod præter alia poma corpus nutrire creduntur. Affirmat etiam Galenus, pira ieiunis oblata, uentrem constringere: eadem post cibum sumpta, dissoluere. Folia ignitis admota uulneribus, mitigare feruorem. Radix uerò piri alligata, tandiu creditur conceptum impedire, quousque portetur. Aiuunt & ipsa poma remouenda, cum formine partus incubuit. Si enim in eodem loco fuerit, difficulter uteri claustra referari. Semen autem pyrorum cum melle tritum, & sæpe ieiunis datum, traditum dolorem iecoris submouere.

De Malogranato.

Cap. XL.

DE punici arbore, quod uim stypticam obtinet, omnes fere medici una opinione consentiunt. Verum in ipso genere pomorum dissonans uirtus & quadrisariam diuisa cernitur. Nam dulcia continere aliquid & caloris, & inde inflationes stomacho mouent, nec tunc febricitantibus dari possunt. Acida stomacho accommodata sunt, & urinam mouent, pulmonem refrigerant, iecori blandiuntur. Vinolenta de superioribus singulis æqua parte composita, mediam sibi uendicant potestatem. Illa uerò acerbissima sunt, quibus coria curantur, frigidæ, siccantis, constringentisque uirtutis: quod intelligere licet, cum feruescentē tabernaculum, trita & conspersa, consumant. Cibus ex punico nullus est. Nam & si dentibus mādatur, folia à stomacho succus hauritur. Igitur recte tradidit, qui negant punico corpora nostra nutrirî, ac sic opinantur utendum, ut mederi potum, non alere uideatur. Mala propterea punica diuisa in duas partes, per triduum in aqua coelesti macerantur: quæ potui data, coeliacis, sanguinemque instantibus salutaris est; & aluum fluentem miro modo sistit. Punicum in olla noua cooperculo illito in furno exustum, & in puluerem redactum, & in uini portionem perductum. Ex cytrinis fit remedium, quod creditur totum coelestem dolorem detergere. Dioscorides uerò simplicius in hunc modum tradit, ut cum primum cytrini erumpere incipiunt, tres numero additi, sine contractu dentium transfluere. Ceteri ut diximus, efficacius putant, ut qui hoc remedium petiturus est, omni uinculo solutus, duobus sinistra manus digitis, pollice & quarto cytrinum detraheret: & ut supra positum est, transfluere, ac leui artatu floris oculos suos ante iustraret. Idem cythnus siccatus, & in puluerem redactus, exedit carnem quæcunque uulneribus excreuit. Estque in extremo flosculus quidam, antequam ex eo mali figura formetur, quem Græci vocauerunt, maxime mirandæque uirtutis: ulceribus oris & item tonsillis medetur. Et uia cum melle tritus sicci pulvis, uulnera, in quacunque parte genitalium nara, compescit: & idem excreantibus sanguine datus in postea forbitione, succurrit: solutiones quoque uentris, sumptum ex mero, constringit. Fit ex ad punico medicamentum, quæ Græcis nominatum, cuius compositio eiusmodi est. Detracto coriacea mala rinduntur; ex his succus exprimitur, is decoctus ad tertias cum ad sextarium uenerit, croci scrupuli sex, myrrhe sex, aluminis sex, mellis optimi libra una, miscentur, & ex hoc medicamēto, præcipue quidem & humoris uiria sanantur. Verum & narium uiria mitigat, & aurium uulnera expungat, & otulorum caliginem discutit: Vlcera etiam genitalibus innata per sanat. Fit & hæc compositio de punicis, apud Græcos opone dicta, contra marcorē stomachi ac fastidium necessaria. In congiu musti coniunguntur quinque punica, totidem & cydonia; cum his sorborum sextarius, foris Syriaci sextarius, croci scrupuli sex: quæ omnia simul tandiu coquuntur, donec in mellis corpus crassitudo pinguescat; ex quo cochlear grande plenum oprimē ieiuno quotidie datur. Ipsum uerò medicamentum salubriter uitreo in uase seruetur.

DIOSCORIDIS, quod ad æstima mala pertinet, ita sensit, ut ea crederet phlegma nutrire, sed ardores excitare, inflationes mouere, membris partibus minime conuenire. Galenus non omnia reicienda pronuntiat, sed quæ aut aquatici saporis, aut asperi, aut acidi, aut prope dulcis occurrunt. In his tantum esse uiria, quæ frustra omnibus adiudicantur, ipse austeris & stypticis adest, fermeque his omnibus quæ in sola hyeme feruunt, ita si in matra lecta & salubriter custodita prouenerint, etiam prodesse lægentibus assenerat. Denique fama inuoluta, & ibi calido cinere discocta in quærelis utiliter putat stomachi naufragantis offerri. Potest uerò malum maxime Matianum, sanguinem reijcientibus, pulmonis & iecoris iniurie obnoxios releuare: melius tamen, si nunquam ieiunis, sed post cibum detur, uis ergo malis & humida & frigida est: quod ex eo maxime comprehenditur, quod succus qui fuerit expressus, facile transit in aco-rem. Austeris tamen malis & acidis possunt recentia uulnera statim claudis, si contrita ponantur: tumores atque liuores ex aqua cocta, & cum axungia trita, compescunt. Fit ex malis nobile medicamentum, quod Græci Hednice dicunt, perquæ utile & efficax, si quando in uerendis partibus cōdylomata uel papule eminentes,

la eminentes, quas exacodas medici uocant, uel calculosa pars carnis excreuit; cuius compositio talis est. Mala concisa, & interius lignosa parte purgata, librae unius pondere, adiectis croci scrupulis sex, in passiflorario decoquuntur: & cum omne concoxerit, tandiu cum pulpa, id est molli pane, & tinaperi conteruntur, donec in ceroti lentorem mollescat hoc appositum, uitia supradicta sic curat, ne ad ferrum uenire possint. Fit ex hisdem malis edumna perquam elegans. Decoquitur enim ex uino phalerno succus expressus, & cum melle miscetur. Folia eorum uulnibus apposita, impetum feruoris excludunt: trita cum nitro & butyro, parotidas sanant: siccata & fumigata carbonibus, serpentes fugant. Corticis succus eiusdem pene uirtutis est, nisi quod adustus, & in puluere dissolutus, uulnibus cauat, ut carnem reddat, imponitur. Vuam iacentem cum melle tritus leuat. Genitalium uitia cum uino aspersus emendat.

De Cydonio . . . Cap. . . X L I I .

MEDICINA ex cydonijs plurimi medici stomachantur. Eadem Dioscorides & adiure-
ticam existimat, auferitatis fortasse beneficio: ceterum styptica, comprimere urinam magis, quam ciere scō-
fuerunt: cruda, matura, coeliacis, dysentericis, sanguinem resistentibus profunt in cibo sumpta coquuntur
& cinere calidissimo, farina inuoluta, & ægris, quorum iam diuturna febris, sine periculo datur. Aqua
etiam coelesti madescunt, quæ potest ad multa prodesse. Nam & sedis mīria in fomentum assumpta deli-
nit, & matricibus forminarum in tumore succurrit, omnibusque uehementer feruoribus obfistit. In fundi
quoque in aceto siue in uino solent, quod stomaticis & intestinorum fluore uexatis opportunissime of-
fertur. Fit ex cydonijs uinum, quo colore languentium desideria fallantur. Nam specie, gustu, & odo-
re cuiuslibet uini ueteris imaginem repræsentat, ideoque Græci *ὑπόκυμνον* appellant, & ex multis compo-
sitionibus eius melior hæc & utilior traditur. Post caniculares æstus, quæcunque se ex nouis imbribus
aqua coelestis infuderit, mundo uase suscipitur, & in umbra posita, sæpiusque transfusa colatur: tunc cydo-
nia iuxta maturitatis ex ligno interiori purgata, & in frusta concisa, immerguntur aquæ: & tandiu cum ea
relinquuntur, donec in succum trāsisse matorum uini colore probatur, quam diligenter colatam, & in uasa
picata diffusam, eiusmodi in loco seruare solenne est, ad quem maxime fumo, & si fieri potest, soli negetur
accessus: quo septimo mense pro uino uti licebit. Quidam ex his & oleum, quod appellatur melinum,
faciunt, uehementer accommodatum ad ea corporis uitia, quæ styptica pellenda sunt: maxime tamen ex
eo sudores molesti detineri solent, & stomachi aperta componi, & uulnera in capite nata liniri. hæc sicco
die ad meridiem lecta, & linteo purgata mundiore, in uitreum uas mittuntur, & recentissimo oleo uas us-
que ad fauces repleretur, & pelle coopertum, umbroso in loco seruiatur.

De Persico. Cap. XLIII.

PERSICORVM Cibus est quidem stomacho inutilis, eo quod cito succus eius inacescat, & caro aque in digestionem uictetur: uerum minime grauis, dum non diutius in intestinis moratur, & ad ima† semper exitu celeri festinat. Pericorum cibus negatur a medicis membra nutrire. Sed & Galenus suadet, numquam omnino post cibum sumere, corrumpi affirmas, si in cibis ceteris innatent. Pericorum folia trita, & imposita, uentris animalia perimunt & expellunt. Eadem sicca atque in puluerem tusa, recē† res plagas cruentorum uulnere claudunt. Nucleus pericorum, capitis dolori cum oleo tritus illinitur: quamuis cum solo rosaceo quidam terere maluerint. Gummi gutta, quam perici truncus illacrymat, siue† alio medetur. eadem cum uino, etiam in uescica pillos frangit: trita ex aceto, impetigines reprimunt. decocta cum croco, tumorem faucium mitigat, arteria alperam canalem leniorem facit, excreantibus sanguinem miro modo subuenit, thoracis obstrictos sinus referat, uicia pulmonis expurgat.

De Cytro. 1. 1. Cap. XLIIII.

NON una eademque uirtus in omnibus cytrei partibus continetur. Nam semini acidam potestatem ac per hoc stypticam inesse, manifestum est: denique prequantibus fastidio laborantibus esui datum, stomachum à nausea uendicat: tritum & in potione uini datum, lieni medetur, quereis iecoris occurrit. Aqua tritum & inspersum, humidis uulneribus adhibetur: inde pernionibus singulare præsidium est. Cortici austerior natura cōcessa est: quæ quantum ualeat, etiam ipso odore testatur: qui modicè sumptus, aut potioni calidæ diutius immerfus, maturæ digestionis beneficia operatur. medicamentis quæ purgādo uentri præparantur, succus eius admixtus, turbationis periculum demit. Fit ex cytreo nobile antidotum tussientibus, quod eximie pectus exonerat: labrasion, quod apud medicos hoc uocatur: sed maxime uirtus eius in cytreo constituta est. Id uariè quidem apud multos, uerum explorata & recepta eiusmodi cōpositione conficitur. Recipe cytrei unciam unam, marri subij unam, hyssopi unam, enulæ unam, glycyrrhizæ unam, iunci radices unam, pulegij scrupulos sex, roris marini sex, pineam integram unam, palmulas collas XXI. caricas XXI. quæ omnia in aqua fontana infundantur, & ibi die ac nocte mergantur. post aqua ipsa cum pigmentis, sicut infusa sunt, decoquitur, & inde colata despumato melli miscetur, mollique igniculo, ne aduratur, hucusque incalescit, donec subacta in mellis crassitudinem transeat.

MESPILI arborē Dioscorides contentus agrestem nominasse, præterijt. Hoc tamen assenerat, quod poma eius & folia uirtute non discrepent. Sed & ceteri diligentius, qui & uocabuli eius aliud addidē: apud quosdam nanque tricocta nominatur, ex tribus granis, quæ ad seminis sobolē retinet intus inclusa. Austerum semen est mespili, fructum & ante uirtutem gustus ostendit, sed & fluxus uentris immodicos fortissime detinet, stomachum dissolutum uehementer altringit. Sunt etiam qui putant dentibus non leuiter subuenire, si in dolore mandatur. Folia quoque eius & cortex, itemque radices eius, si se & imposte, cuiusque feruori & tumori subueniunt. Sicca & trita cum melle, ad cicatricem uulnus adducunt: hausta cum dulci, solent sanguinem reijcientibus opem ferre: & cum uino propinata, ueneficis potionibus repugnare.

ZIZYPHA modicum cibum corpori præstant, licet illis saporis non nulla gratia lenocinetur. Habent tamen plurima incōmoda, egre coquuntur, sitim accendunt, pregrauāt stomachum, difficilimum reddunt officium uentris, ex quibus aspera uiscerum & primum ligno sortita deprehenditur. Folia tamen ipsa poma contrita, & impostita, spleneticos & hydropicos adiuuare, certissimum est. Radices & corticis eadem uirtus habetur: quorum succus ex melle coctus, tussim mitigat: cum mero mixtus, icori medetur, uescam leuat, urina largiori.

FICORVM natura calidissima est, sed quod ad poma pertinet, nimium recētibz austeritas inest, & ideo tales stomachum inflant, & intestina perturbant modice quidem; nam statim per aluū defluit omnis iniuria. Quæ igitur maturiores sumptæ sunt, propè innoxuæ creduntur, & corpus sic siccant, sicque faginant: denique athlete antea ficis alebantur, priusquam eos Pythagoras exercitatos ad carnis usum, qui fortior cibis est, trāstulisset. Siccæ tritæ & impostæ, uehementēs tumores aut maturāt, aut discutiunt efficacius, si in eis nitrū uel iris accesserit. Coctæ ex aqua cum hyssopo, dant potionē, quæ pectus expurget. Item coctæ cum uino, sedi tumenti præstant salutare fomentū. Ipsæ pāno illitæ, & impostæ, paniculas parotidas, firmiter rumpunt. Itemque cum foenugræco ex aqua decoctæ, somētum faciunt, quod uitia matricum extinguit: cum ruta & melle succum dant, qui à pleuriticis & pulmone uitijs salubriter hauriatur. Cum æris flore tritæ, molestissimis tibiurum uulneribus imponuntur. Tritæ cum sale, scorpionum plagis medentur: canceratis, quanto pinguioribus fuerint, tritæ & impostæ, tantò efficacius subueniunt. Hydropicos extrinsecus siccant ex uino contusæ, & cum absinthio & hordeacea farina in modum cataplas-matis adunatæ, combustæ & tritæ.

PLVRIMIS medicis placet, sorba pro medicamentis magis, quàm pro cibo esse sumenda. & quidem alba adhuc, & semicruda deiecta, uehementius solutioni uentris obstitunt, stomachum pregrauāt: ueruntamen matura siccata subleuant, fastidia pellunt, uulnera interancis innata deliniunt. Quidam sicca sorba tusa, urinam soluere, & pro polenta cum uino splenicis & icore laborantibus, maximeque pulmonis molestiam sentientibus obtulere. Aqua uerò, in qua decocta sunt, non minùs & ipsa causis supra dictis potui oblata succurrit. Dysentericis quoque iniecta medicatur.

SILIQVAE recentes, stomachum auertunt, aluum soluunt. Eadem siccata incōtrarium potant. Cibus earum ad urinam proficit commouendam; traditurque, contra stomachi dolorem non leue præsidium, si ternæ in sextario aquæ ad dimidias decoquantur: Isque succus per dies quinque continuus hauriatur. Galenus tamen de siliquis pessime sentit, quod uix digerantur, & uentrem stringant, & humores noxios nutrant.

CERASI uiridis pomum uentrē humectat & prouocat, aridū ficit & detinet, stomacho uiride contrarium, siccum perquam utile accipitur; & hoc quidam existimant urinam mouere. A non paucis auctoribus traditur, si manē recentia cum suis nucleis denotata sint, aluum tam copiosè fluere, ut ex eadē causa etiam pedes morbo implicati liberentur. Fit ex his diacerascon, quod omnibus notum est. Galeno placet non in omnibus cerasi pomi unam esse uirtutem. Nam in quibusdam austera, in quibusdam acidus, in quibusdam dulcis apparet. & uult austera ad hoc ualere, ut uentrem cōstringant, stomachum confirmant. Acida indicat phlegmate abundantibus stomacho opportuna: nam magis siccant, & crassitudinem densioris humoris inducunt. Dulcia stomacho aduersa pronunciat; citius tamen per intestina defluere. Gummi, quod truncus illa crymat, exasperatas arterias optime lenit, si in uino ueteri detur in sorbitione.

ione resolutum. Simili modo datum, fastidium stomachi nauseantis auerit: & e facie foeditatem palloris excludit, cum mero haustum. Calculos etiam, quibus uesicę cannalis obstruitur, in harenę puluere soluit.

De Amygdalo. Cap. L. I.

AMYGDALVM recens, ut multis uidetur, stomachum onerat. Dioscorides uero etiam stomacho prodesse arbitratur, si cum folliculo suo nucleus deuoretur. caput pręgrauat, caliginem nutrit, cupiditatem Venereę voluptatis etiam accendit. Sicca uero contra ebrietatem ualent, si ante uinum quinque sumantur. Sitim ex his inflā mari illo argumēto docetur, quod uulpes cum amygdala deuorauerit, nec aquam in proximo habuerit, interire credatur. somnum faciunt, urinam mouent, foeminarum iusta precipitant. Amygdala quoque cum mēstrā trita, & in potionem perducta, sanguinem reijcientibus profunt. Oleum in quo decocta sunt, infusum capiti, caducos & lethargicos exērat. ulceribus canceratis & caninis moribus, trita cum melle subueniunt, dolores iecinoris ac renum, coctorum in aqua potus extinguit, admixto modico passo, quo solet potionis eiusmodi amaritudo leniri. cū resina terebinthina procemata data, calculos frangunt, obstrictum canalem uesicę laborantis peruium præstant: tussi & collo profunt, cum hēlilifacē ac melle contrita, & in auellanę nucis magnitudine sumpta. Fit medicamentum ex amaris amygdalis, quod Dioscorides diamygdalon appellat, spleni & iecinori maximeque aurugini necessarium. quod conficitur sic. Accipe amygdalorum uncias duas, gentianę IIII. anisi duas, absinthij potu anam: quę omnia simul tusa cribrantur, & ex eo puluere cochlear ex aqua datur. Mulla miscent, qui nimiam amaritudinem uirāt: uehemens nanque hoc esse, etiam domesticis in uxore seruata experimentis, probauit. Gummi quod amygdali arbor exudat, mixtum potioni, reijciētibus sanguinem saluberrimum creditur, tussim mitigat, cum mero potum. Eadē & ceteris arboris partibus uis inesse traditur, ut folia uel cortex ad tempus sumpta, aperiant, purgent, extēnuent.

De Auellana. Cap. L. II.

AVELLANAE in cibo sumptę, dolorem capitis incutiunt, inflatione stomachum distendunt. Corpori sanę pinguedinem conferunt: siccę in uase fictili si torreantur, distillationibus mitigandis utilissime offeruntur: trita ex aqua mulla, potęque, etiam uetustissime tussis molestiam sedant. Alij uero tritas & cum passo bibendas dedere, ad pulmonis & iecoris uitia sananda. Multi cum pipere miscuere, & cum uino propinatas, contra catarrhum, & tormenta uentris, & urinę distillantis angustias ualere senserunt: cum axungia uel adipe ursino contrire, & alopecij illite, capillorum damna restituunt. Aiuntque oculos infantium cęcorum ad colorem nigrum posse reuocari, si aduste cum oleo conterantur, & ex eo cerebrum quotidie perungatur.

De Pistatio. Cap. L. III.

PSISTATIORM uirtus austera & styptica, & prope aromatis gratia inuncta colligitur, ideoque etiā stomacho accommodata creduntur. Maxime tamen constat, ea & thoracis, itemque pulmonis & iecoris uitia purgare. Trita uero cum uino, contra morsum serpentum profunt.

De Castanea. Cap. L. IIII.

CASTANAE ex omnibus fortissimum quidem cibum corpori præstant, sed qui difficile coquatur. Coctę autem in carbonibus, uel in fictili uase sicco assatę, & cum melle ieiunis datę, tussientibus profunt. Aqua in qua cum succo cortices coquuntur, coeliacis, dysentericis, sanguinem reijcientibus, bibenda haud inutiliter propinatur. Interior membrana, quę corticem fructumque discernit, ad tertiā partem decocta in aqua, & potui oblata, mirę alium fluentem refrenat, adeo ut Dioscorides putet etiam castoreo datę, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit, purget.

De Nuce. Cap. L. V.

NVX uiridis, utpote adhuc aquationis humoris styptica & frigida uirtute censetur. Potens denique & stomacho aliquid uigoris acquirere, & uentrem cum garo sumpta mollire. Nuces autem sicca duę cum carycis duabus, & uiginti rutę folijs, addito salis grano, simul conteruntur, nullisque uenenis opprimi poterit ea die, quisquis ieiunus acceperit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero nuces statim ut arbori deptę sunt, cortice adhærente quassantur. His admiscentur aluminis schisti librę tres, & in nouo fictili uase ponuntur. Super hæc infunduntur olei boni librę tres, & diligenter in loco neque humido, neque nimium sicco obruuntur: post nonaginta dies dabunt oleū, quod fluētium capillorum dāna restituit.

De Pineā. Cap. L. VI.

FORTISSIMVS ex nucleis cibus est, & humores optimos gignit, & sitim sedat, ac stomachi

C. PLINII SECVNDI

acrimoniam temperat, purgat urinam. præstat antidoti uicem cū laferis uncia una, nitri una, cymini una, palmularum una: quæ omnia in oxymelle resoluta, iucundissimum præstant oxyporium, si unciam nuclei triti simul accipiat cum uinis passis. Nuclei frequētius sumpti, excitare creduntur tardiores ad usum Veneris uoluptatis. Ipsæ uerò pineæ cum resina quā gerunt, tusa, singulæ in singulis sextarijs ad dimidium decoquantur. ex eo quotidie binos haurire cyathos excreantibus sanguinem, salutare est. Cortex autem arboris decoctus in uino, efficacissimam portionem contra uentris tormina subministrat.

De Myxis.

Cap. LVII.

ID nanque genus manifeste stypticæ uirtutis esse apparet, & frigida, quamuis plurimum illi de rigore siccitas decoquat. Verum & ardores febricitantium extinguit ore compressum, sitim mitigat: & in cibo sumptum, stomachum erigit, solutioni uentris obstitit: tritum, & cum polline impositum, collectiones suppurare non patitur. Ossa combusta, & in puluerem redacta, butyro & melle comitantibus, non abiecti uigoris xirocollyrium præstant.

De Spomelidibus.

Cap. LVIII.

HOC pomum Dioscorides frigidissimum affirmat, atque idem ad laborem digestionis incutere: stypticum tamen & stomacho accommodatum plerique dixerunt. Arboris eius natura cum malis congruit, ali quantò quidem infirmioris, & (ut diximus) propemodum potest in causis similibus assumpta medicari.

C. PLINII SECVNDI DE RE

MEDICA LIBER QVINTVS.

Victus in fluoribus capillorum ratio. Cap. I.

IBOS igitur accipiant acros, qui magis aperiant poros, qualia sunt erica, cardamomum, porri, cepa uel allia. Hæc enim omnia quæ condensantur, habent uel poros constrictos, inutilia sunt. Quibus autem ex raritate pororum profluunt capilli, contraria sunt hæc, necesse est. Utantur etiam intubis, lactucis, maluis, ouis mollibus, pane nauali, & filiginis in aqua calida aut frigida infuso. Melones quoque accipiant, cucumeres, pisces, duras carnes habentes, ac porcinas carnes recentes: & nihil ex eis quod pingue est sumant. Accipiant uerò steriles & peruerint, aqua, antequam intrent, infundant caput: & iterum in piscinam intrantes, caput sub fistula ponant.

Si de hepate caput dolet. Cap. II.

CIBOS accipiant frigidam habentes uirtutem hora secunda aut tertia, panem accipiant in aqua calida infusum, aut cetrum, aut melum, aut aliquod quod in frigidare possit pomum, & cum cibo utantur, aquam frigidam si in usu habent, bibant adhuc amplius, ut certe toto prandio cum uino mixta ipsam aquam bibant frigidam, & modicum uinum. Sed & omnibus dicta talis sit sic patientibus: necnon & illis qui calidum habent uentrem, uel stomachum, aut splenem, talia sunt facienda.

Si de uino caput dolet. Cap. III.

CIBVM offeres panem ex aqua cocta, oua a pala columbarum, & pullorum ascellas, & gallorum testiculos. sitque omnis cibus euchenmus, & qui uapores prohibeat.

Si de percussione caput dolet. Cap. IIII.

VINVM ab initio prohibendum est, carnes, & omnis cibus fortior: quod si febres sint, succum prisanæ dabis, & uirellos ouorum, ac maluas uncellatas, lactucas, intubos & cucurbitas.

De ratione uictus phreniticorum. Cap. V.

APRIMORDIO, prisanæ succum bene coctum: si autem non est eis suauis, cum granulis dabis sine aliquo condimento. Addes eis oleum aut rhodomellis aliquatulum, quod si adhuc suaves non sint prisanæ, his dari oportet auenæ succos aut cedos. Si uerò abhorrent forbitiones, panem in aqua calida infusum dabis, & magis cum holeribus comedant, qualia sunt malua, intubi, elixæ interdum & non coctæ.

coctis fatis: & sic caules thyrsosque coctos lactuca dederis, & melones, & cucumeres, & interiora ipsorum. *oliva delictus, piscium, pomorum.* Pisces dabis echinos & peccines; poma accipiant perfica, duracina, cerasia, mela, & malogranata: sed hæc omnia ana modice. *ana / à phlegmæ periculi* Potionem quoque eis dabis subinde, & paulatim calidam aqua omnino bibere oportet. *phlegmæ m.* Nam si sit phlegmon, intrinsecus non paruum periculum accedit; cautiusque est calida aqua uti quam frigida: & si febre & alienatione caruerint, tunc præsumendum est, vinum dare eis qui habuerint *phlegmæ m.* *Et non vinum ad somnum conueniendum.* *Somnicul.* *cibi & potus m.* *+ quasi pyramitis & lethargus sunt sunt febre.*

Dieta in lethargo obseruanda.

Cap. VI.

DANDA sunt, succus de amygdalis cum modico melle coctus, & prisanæ succus habens comas, porri aut apij radices aut hyssopi, si febris non est: quod si febris est, hyssopum non mittas: sufficiunt enim apij radices cum simplici oxymelle admixto. Post prisanas uero, dabis & micas panis cum apomelite ac hydromelite, ac post, digesta ægritudine, vinum dabis ana modice. *perficum illud (ana) cui sit uicæ species in perficum habet & potus m.*

Dieta epilepticorum.

Cap. VII.

CIBOS accipiant, panem bene coctum, & optime infermentatum, & maxime in dybano coctum. *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* calidam aquam bibant. Coriandrum autem si comedant, prohibet humores ascendere in caput, quod *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* maximum adiutorium est. De holeribus uero manducant heram, caucaliam, rapam & porrum mixtu, *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* sed non faginosos: & de anseribus alas, collum, caput, & pedes: & græculas & aues omnes, præterquam que in paludibus & in aquis degunt. Ius etiam prohibendum est ad bibendum: admiscenda uero sunt noue *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* re, & maxime porcina aut bubulam, sed & alias carnes modice pro desiderio accipiant, & non pingues: ip *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* sauerò carnes in sinapi intingant, & apozima magis q̄ zima bibant. cepas & daucum non manducant, ne *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* que emeron: apium uero in omnibus prohibendum est. Pisces dandi sunt, merula, turdi, aut scorpio, *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* aut scardus: pinguis autem & pelæicus prohibendus est. De fluuiatilibus edant eum, qui dicitur an- *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* dromis, sed cum oxymelle manducet, aut modico pipere. cochleæ fugiendæ sunt. echinus manducandus *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* ex interuallo: aptus est enim stomacho, & urinam mouet. accipiat aliquid apozima calidum, quale est ab- *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* stinendum: maxime si lenticulam uoluerint manducare, cedrum ibidem bulliat, seu pulegium aut piper. *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* Poma autem bonum est eos fugere: quod si utique accipere uoluerint, causa sanitatis modicum assumen- *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* dum est, & maxime post cibum. Tragemata etiam fugienda sunt, qualia sunt nuces, dacili. Pistacia autē *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* & uia, nucleusque, uel quæ de amygdalis sunt à pistoriis, non sunt fugienda. vinum, quantum ad ipsam *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.* passionem pertinet, fugiendum est, maxime uetus. modicum uinum album lene sumendum est, propter *condimenta.* *cas. ab arib. p. h. a porcinis, but.* uinum, & omne quod ex lacte fit, ipsumque lac fugiendum, & omnia dulcia fugienda sunt. *panis.* *Coriandri vis.* *oliva.*

De melancholicis.

Cap. VIII.

CIBVS eorum sit prisana, quam manè accipiant cum granulis suis hora secunda in prædio, aut *prisana cum granulis, non colata.* pisces apratiles, & domesticos pullos uel gallinas, & aues alias, quæ non in paludibus degunt, & peccines *pisces. uoluerit non palustres.* & astaces & ychinos. De holeribus autem lactuca & intubi omnino comedenda sunt, & malua: omnia *oliva. poma.* alia prohibenda sunt. De pomis, pepones, cucumeres, & uia dulces, duracina, & mela quæ non sunt sty- *cas. a fine.* ptica. Ficus autem omnimodo prohibendæ sunt: quod si accipiant, duæ aut tres, & hæc fati mature sunt *vinum quatuor, & delictus, casio.* dandæ. De placentis autem omnia prohibenda sunt, propter quod cum caseo factæ sunt: uinum autem bo- *ad aptus ferat.* num est dare chryfaticum, & hoc modice, quod si istud non inueniatur, dabis uinum quod nihil habeat re- *vinum chryfaticum.* perousionis aut stypticum, aut aliquam austeritatem, ne cum bibitur, caput petat. Carnes autem & for- *cas.* tiores cibos adsumere egrotantem ad melius accedentem ordinandum est, paulatim augmentando, & non sa- *cas.* tis de subito: quod enim paulatim fuerit oblatum, melius est, & cautius transire ad fortiora paulatim. *cas.* Post balneum autem mox non bibant uinum nisi calidam aquam: & sic cibum sumat, sicut iam dictum est. *cas.* & prandere uolentibus offerenda est iterum calida aqua. Hoc enim modo dieta obseruanda est, & tunc *cas.* conuenit fieri, quando iam uidetur uiolentior in cerebro effecta materia, constricta & pinguior effecta. *cas.*

De oculorum passione.

Cap. IX.

CIBOS mitiores & sine mordicatione accipiant, & qui pinguiore reddant humores, id est or- *Cibi non mordaces.* phos & alios pisces, duriores carnes habentes, glaucum, cyridiam, ex ipsis sicciore. *pisces.* *oliva.* *cas.* Holera autem, intus- *cas.* bas & maluas. Ex pomis, mela, melones, uia dulces. Ficus autem nullo modo sunt accipiendæ in oculorū *cas.* dolore. De cernio uero cortex dandus est, & bibant calidam aquam. Vinum si uoluerint bibere, chryfati- *cas.* cum eis dabis, aut dulce, aut aliud, quo impinguari possint humores. *cas.*

De aurium passione.

Cap. X.

CIBVS eorum sit succus prisanæ, & alicæ, & ferri, ac similia bene cocta, similiter & ouorum *leg. istum (quod est placens genus) sit ferri & ferri.*

parotides, auris passio.

C. PLINII SEC V N D I

cibi fortis. uirelli utilissimi sunt, & maluarum caules, & pisces alpratiles, & pipiones, & de domesticis pullis extremas partes, sicque & ad omnium diuersitates paroridum uti oportet.

Dietā in faucium morbo, quem Græci στυγίαν, Latini anginam uocant.

Cap. X I.

ANGINAE tres species sunt, scilicet: synanche, cynanche, & parasyanche: In quibus primū omnium aquosa mulla, quæ ualeat extenuare & purgare per urinam & uentrem, exhibenda est. Quibus thorax & pulmo suspirat, ministranda est mulla per dies tres; ac post diem tertium succum prisanæ & ouorum vitellos dare mollissimos & non multos oportet. Utilissimum quoque, cibi abundantiam fugere, uel magnum malum. Si enim in periculo sunt, modico cibo accepto: si plus accipiant, magis existimandū est. Hæc ergo sufficiat de synanche laborantibus dixisse.

Dietā Catarrho laborantium.

Cap. X I I.

CIBVS eorum, holera & amyllum uel lapaſium, prisanæ succus uel aficæ, aut lens cum melle modico cocta, & omnes pulles cum pipere albo, & fassamenta quæ uolent: oua quoque à palā comedant. sitim uero dissimulare, multum adiuuat. ebrietas aut potio multa fugienda est: & sicut diximus, omnes cibos saluos comedant.

De pleuritico.

Cap. X I I I.

CIBVS dandus est pleuritico, succus prisanæ quamoptime coctus: si uero non fuerit coctus, in flat hypochondria: amygdalas autem purgatas & riras admiscebis prisanis, ut simul coquantur, & succum acalitis seminis admiscebis in prisanæ succum aut hyssopum simul coques; succum quoque ex amygdalis eis dabis, cui modicum admiscebis mel. Est autem melius, si mane succum prisanæ accipiant, & ad uesperam succum de amygdalis. Quod si uirtus infirmantium imbecillis tibi esse uideretur, & de pane mundo micas dabis cum apomelle, aut dulci hydroto satō. Is uero qui uocatur cyarriticon fugiendus. Est enim qui & febres accendat, & caput perat, ita ut alienationes faciat. Vnde & melius est si uirtus imbecillis uideretur, dare modicum cūidij aut hydromelon: Si autem micas de mundo pane non habent, qui infirmantur, ad accipiendum in aquam dulcem potionem accipiant, & zemon sine oleo factum, ac solam galinam dabis, sed modice, quibus uirtus imbecillis est, & cibum fastidiunt. Sed & pisces, & maxime cydas. Est enim piscis, molli carne, & natura humidus, & digestibilis, quem & prisanas maritimas uocant. Pêfines autem qui dicuntur, & omnia ostracoderma fugienda sunt. De holeribus uero: Holera prohibenda sunt, si aspera lingua non sentiat, & sitis nimia non sit, & non febrat satis: quod si febrat, nō est malum, si dederis maluas coctas in miscello, aut intubos. Similiter & mella danda sunt. Calida autem aqua est ministranda, & mullam calidam quotidie bibant.

Que in pleuritide seruanda dieta.

Cap. X I I I I.

ESCA eorum utilissima, succus prisanæ, oryza, palmulæ Thebaicæ, succus arnoglosse. Postea uero bibenda est. Facit & foenugrecum, si fusum in aqua coques cum carycis, & ut electuarium dabis in cibo: & puitre, & oua à palā, cerebellum porcinum uel agninum aut hedinum cum paruo sale & oleo.

Dietā stomacho existente frigido.

Cap. X V.

DANDVM est uinum rubeum & cibi pingues, ac magis oleum habentes, phasiani, pingues carnes habentes. Carnes quoque porcorum pinguium, & olea. De holeribus, brassica tertiō cocta, & comixta cum apozimo in uino condito, caules ipsi similiter aut rape, aut polenta, id est, aspera, pulles, alica cum uino Tyro. De auibus autem, perdices, merulas, turdos, anates. De carnibus, caprina & ceruina. Poma etiam quam maxime sunt fugienda. De tragematibus, uue tantum, & sufficiat.

Si de calore nimio fiat fastidium.

Cap. X V I.

CIBOS dabis panem mundum, qui utilissimus est in aqua calida acceptus, & oua dura hora diei tertia; & holera intubas, & lactucas, ac maluas. Et de auibus domesticis, gallinas non satis coctas, & de anseribus extremas partes, & pectus de phasiano. Syluestria uero omnia sunt prohibenda. De piscibus autem, utantur duras habentibus carnes, qualis est lacerna, orphon, caclon, cerida, cocida & astopodes ac sepias, & ostragoderinas, id est, astaginas, & curetias, & pectines, etiam cochleas comedant: legumina, fassolos, fabam, oryzam, poma, mala dulcia, uuam duracina, cedria, melonis carnes, & cucumeris interiora, & perfica duras: cinas, & balneis de aquis dulcibus utantur.

si de glutinosi & pinguibus fiat.

Cap. X V I I.

DARE oportet ea, quæ extenuare possunt humores, dabis igitur eis capparium in oxymelle compositum,

Cibi attenuantis,
L. 2.

Cap. XVI.

aculeis refrigerant,
 & m. f.
 Cibi refrigerantis.

Cap. XIX

, mala /
fouus.
jmita.
refus. Cibi non faali
temperantia. bulbus.

~~pff~~ ~~bulbus~~ ~~fir~~ ~~ly~~!

polipus, pelfines, apaci, celum,
vell ifium, bulbus &

Cap. X X.

Si ex cholera[^]rum plenitudine effusio nimia ventris uel uomitus existat. Cap. X X I.

Cibi & potus fig. {un.
E¹ m.
olera m.
piscis.
carner.
poma.
frugum m.
potionis m.

Сар. X X I I.

m.
= multa condimentis, &
ratio utriusq.
polygoni usus.

Cap. XXXIII.

cibi solubilis, qui.
temperatū, et sum-
mum fuit.

Cap. X X I I I I.

m. *destruamur.*
pifer. + au finia, e con
vini delibet. Cas. abous,
ment, delib.
pam, vno.

Ср. X X V

oxy.
 clava temperata.
 Haec confusa, ovis
 fuscula.
 volatilis. - viscellis, et;
 Cantale à cantu, an. / Can. ab eo
 summi pul. p. ilomela. bib. calidus, et
 pifcos.
 quadrupada. / algaribus, quia in astra
 affertur ab spha. lovis p. et
 magis et cepto nomine spha.
 decurritur p. ies.

Scordala & mazachara. an puz sagria /
 foma. mazachara
 a. a. uic. puzing. fadur. affantur me
 clat puzir. bazarat. bum cum n
 an fampand. spilas seme
 vel fampand. pia & nucle
 fampand. & cipa gra
 fampand. aut cum ga
 fampand. aut cocta, a

Dieta frigide dis temperantia hepatis, sive ventris.

brassica fer colla. / Jams, vini
 & melleo. / oliv.
 carnos.
 fructus.
 piscos.
 et coryphans, aut, seu amida
 fragmenta
 cum a piscibus, autibus, & iaco.
 piscis, amig. latis. / & spars.
 # biduo signatio (piscis)
 ad regem & 3 p. d. l. l. l.
 mercurio.

Dieta dysentericis observanda.

- pulvis p[er]
 condimentis
 - latic
 - casu in p[er]
 - casu, seu p[er]
 - casu
 - alio q[uo]d
 - p[er]
 - legum
 - latic p[er]
 - olia
 - r[ati]o
 - p[er]
 - anab[is] ag[ri]
 - cup[er]
 - r[ati]o
 - in p[er]
 - de p[er]
 - in p[er]
 - r[ati]o
 - in p[er]
 - r[ati]o
 - in p[er]
 - r[ati]o

D. E. frumēto pulres dandę sunt, sed alica plus digestibilis est. oryza minus nutrit, sed plus stringit. Pulres de farre & milio & de panico & Alexandrino pane & hyđri dandę; & pro condimento, anethum mittas; pro oleo, adipem anserinum aut pullinum: sed antę coquantur ipse pulres in aqua, & sic mittas lac antę coctum & despumatum, ibidemque admiscēs ros marinum & grana maligranati trita. Mela quoque & cydonias purgatas & uvas tritas in aqua unde pulres fiant, antę coques sorbos aut pura cruda, aut matura, aut mala cydonia, aut mespila, aut siliquas, aut dactylos: similiter & cascum recentem colabis per cribrum, & condēs inde pulres, dabisque ad edendum: quod si pultem recusant, alicam dabis eis, uel oryzam cum aqua, in qua coxeris dactylos, aut damascenos, seu sorbos, siue reliqua suprascripta. De leguminibus; uerō lentacula danda, aut tollis corticem: & cum purgata fuerit, rore marino & de adipe suprascripto cum modico aceto condies, & sale modico: & cum fuerit cōdita, in modum sorbitionis cum ipsa pulre lenticulam ad edendum dabis. Prisanę per se non sunt stypticę, sed laxant. Ar uerō de holeribus dabis plantaginem, iorubam, maluas, coctam betam & bene expressam, & cum aceto tritam atque cōditam. Ea uerō quę cruda manducari possunt, cum pane edantur. Brassica quoque uel caules montanę bis coctę impinguat quidem, sed conspissant stercore: assumantur autem cum aceto, sale, & oleo condita. De maritimis uerō piscibus non multi sunt qui expediri possint, sed scorpynam accipiat cōditam aceto & cymino: sic etiam albugo datur, ostreaque assata testa iuuat. Carnes uerō omnes sunt inutiles de agrestibus aubus, quod genus sunt turdus, perdices, turtures, menilz, strumii, & columbi, & maximę pipiones omnes non saginati coquendi sunt in posca, & deinde assandi: melius si intrinsecus mittatur myrtus, aut sorbus, tritus, succus, aut incisus minutatim, aut mespila, aut pira uirida, aut cydonia mala intrinsecus cocta, & deinde assata. De quadrupedibus omnes carnes prohibendę sunt, pręter lumbos, solum porcinos, aut hędinos, quos comedant. Quę quoque gallinacea cluxata in posca donec indurescant, sublatos uitellos solos assabis super carbones, & cum aceto ac rore marino trito dabuntur ad edendum. In pulres etiam ros marinum mittes, aut desidia modicū, aut gallę, aut omphacij. In prisanā etiā coques ungues uitulinos, & comedat prisanā cōditam cum aceto. De pomis uerō, dulcia poma quę uento sitatem generant, prohibenda sunt: danda sunt pira, sorbi, mespilę, ac mala cydonia, ac uirę in olla aut fumo suspensę, quas cum semine suo comedat, do nec ipsum semen in are minutetur. Ipsa uerō poma cum pane sunt manducanda; malagranata contriungunt, sed corrumpunt. Dactyli cum pane manducandi sunt.

Dieta. Spleneticis frigida dysmperantia.

Cap. X X V I I I

PISCES aspratiles accipiāt, & gallinas domesticas, phasianosque & perdices, & omnes aues quę in montibus degunt, & columbos à matre subductos. Carnem porcorum mediam ætatem habentium, & hœdos anniculos seu bimâros, & ptisanę succum cum optimo melle ac pipere, sed & modico, quia omnia dulcia naturaliter contraria sunt : sicut est uinum dulce, quod & ipsum prohibendum est.

Dieta calida diffemperantia splenis.

Cap. : X X I X.

CERVINAM carnem edant à lenticula prohibendi sunt. Oryza & auellana fumendz sunt. Panis de symula utilis est. Casei recentes & lactantes dandi sunt. Carnes autem recentes boedinas, herinaceorum, spondiles, asparagos, brioniam, omnia in fassamento. uti autem unum sit stypticum cum

cum calida temperatum. comodant etiam lactucas, blitos, atriplices, cucurbitas, ptisanæ succum. ac balneo de aqua dulci utantur. Dandi sunt autem eis & pisces aspratiles: & de auibus omnes, præter quam quæ in aquis ac paludibus degunt.

Dietæ hydropicis, siue hepate laborantibus. Cap. XXX.

PANIS cibariis dandus est, habens in se seminum genera conspersa, anisi, cymini, feniculi, & tenonij. De holeribus apium, petroselinum, & daucum, ericam, pulegium, rapam & caules, atque alia quæ sunt his familia accipiant, quæ extenuant uel euacuant & calefaciunt. De uolatilibus pullos, & aues agrestes magis quam domesticas, qualia sunt merula, turdi, turtures, uel minutæ aues, præter illas quæ saginate sunt. De piscibus aspratilibus miscellatum cum aniso conditum aut pipere modico. De carnibus uero, carnes agrestes, quales sunt ceruina, caprina, aprina, capulina: lepores prohibendi sunt. Fiat autem coctio eorum cum liquaminibus quæ extenuant cibos, & assatos magis inuant. Legumina omnia sunt prohibenda. castanæ & nuxes accipiendæ sunt: amandula, pistacia, uiaz, dactylique raro sunt accipiendi. Vinum Tyrium & Aforiconum maxime uetus plus omnibus propinandum.

Dietæ hæmopticoorum. Cap. XXXI.

SIT omnis cibus eorum substypticus mediocriter succus alicæ aut ptisanæ, melior est autem si de amylo tritico sit ex modico melle coctus; cum ipse autem succo ptisanæ de amylo facto utaris & succo farris aut de symila bene facto, & micæ panis accipias in aqua calida, & ouorum uitellos, qui utiliores sunt, quam ullam forbitionem, aut quemcunque cibum calidum dare: sed omnia sint temperata, & magis ad frigorem inclinata, salis & olei non multum habentia. De holeribus uero malas & lappatas bene sine sale, & lactucas in posca coctas, & cum aquosa posca datas: sic & intubam & proporcagiam. Pullos & gallinas non saginatas, perdicesque & testiculos gallorum & uentres assata sine sale. De anseribus uero dandi sunt extremæ partes uentris, & de ipsorum ouis uitelli: & pedes porcini dandi sunt: & aspratiles pisces admixto aceto, ibi coquantur. De leguminibus dabis alicam & citrion & oryzam multum coctam: quando autem sine febre sunt, cum lacte coquantur. De pomis uero mala cydonia elixa, pira, sorba, mespila: & si sitiant, melones & cucumeris interiora, uias quæ suspensæ fuerint, uel quæ exiccatae sunt. Ficus prohibendæ sunt, tragemata fugienda sunt: de quibus tamen dandi sunt pistacia, amygdalæ, & malagranata & uiaz, & postquam sanguis quieuerit, calida aqua danda est in tota ægritudine.

Dietæ nephritici præscribenda. Cap. XXXII.

ASSIDVE calidam aquam accipiant in medio prandio: aut aquam frigidam, seu uinum frigidum aut rosatum, aut uiolatum conditum, prohibendum est & hydrogarum, & omnia quæ cum pipere sunt. Offerendæ autem sunt anserum extremæ partes, & aues quæ non sunt saginatae. De pomis accipiant cucumeres, & quæ intrinsecus sunt melonis, ficus uirides, & ficcas uias, mela & pira nec multum nec frequenter accipiantur.

Dietæ ad renum inflammationem. Cap. XXXIII.

CVI uenter multum currit, cibus dandus est is qui tardius digeratur, qualis est alica cum rosato, aut chrysarium, aut hydromel, seu modicum feraprenum. Holera uero troxima, aut lactuca & carnes steriles aut pedes porcini, sed maxime bouini & gruini & hyficini. Pisces autem qui duriores carnes habent, & melones præter femina, ac mela dulcia: fugienda sunt fassamenta, omnia quæ urinam mouent: echinos, amygdalas, pistacias, ficus, dactylos, castanæque accipiant.

Dietæ in coli passione, quæ ex frigore fit. Cap. XXXIV.

PANIS filiginis bene coctus dandus est, & apozima ubi coctæ fuerint apij radices, aut anethum, aut cyminum, seu anisum. exinde spargenda est farina, & cum uino modico accipiant, quod si cum pipere conditam accipiant inuat. Holera uero danda sunt apium, portum coctum, capita ipsorum cauliculique, asparagus alia quoque accipiant. De auibus autem pipiones, columbos, & perdices, gallinasque domesticas: & condiantur cum aniso aut cymino, aut porro, aut apio seu pipere. De piscibus uero aspratiles, & condiantur ex seminibus, quæ inflationem tollunt, aut cum allio. Carnes si fieri potest, prohibendæ sunt, donec sanentur. Legumina quoque, præter ptisanas, & hæc dum coquantur, apij radices, aut comæ porri, aut pulegium, aut origanum, siue anisum, aut piper, seu amygdalæ simul coquantur. De tragematibus uero expedit ut amygdalas edant, & maxime succum earum, admixto melle & modico pipere: de uino si purum detur, melius inuat: de propoma apiatum & anisatum, & leuistatum. Omnia enim hæc, eos qui de frigido humore dolores patiuntur, sanare possunt.

si de cholericâ humore coli patiuntur, quomodo dietæ est ordinanda. Cap. XXXV.

DANDVS est ptisanæ succus, nullam habes alicuius generis admixtionem, nisi modicum salis.

C. PLINII SECVNDI

dabis & ouorum vitellos frigida holeraque cocta, cruda, lactucas maiores & dulces, maxime his qui in-
mnetatem patiuntur, & omnia poma quae in frigidare possunt: cucurbita prohibenda est. Carnes dabis,
pedes bouinos & uentres, ac scrophinas steriles, & ungulas bene coctas, frigida poma, pepones, mela cum
aceto: omnia poma quae in frigidant, sumenda sunt.

Dieta podagrica ex cholera humore. Cap. XXXVI.

OMNIS cibis qui in frigidat & humectat dandus est: qualia sunt, intuba, lactuca, malua, blica,
brassica, chrysolata, cardamum, erica, porrum, allium, & cepe fugienda sunt. Volatilia dabis, phasianos
ac domesticos pullos, perdices, turdos, merulas, cantulas, ficedulas: pisces aspratiles, & maxime qui duras
carnes habent. Veruecinas uero carnes manducant miscellatas, & maxime ex his uentres, ac bouinas simi-
liter: quando autem grauis est dolor, haec non sunt danda, sed tenues cibi. Legumina dabis, fabas uirides
& siccas, sed in aqua ante infusas, & faseolos similiter infusos. Alia legumina prohibenda sunt.

Dieta Galeni in febribus & ephemeris. Cap. XXXVII.

REFICE eos cibo, & uino subtili, quod sufficiat.

Dieta in quotidianis febribus. Cap. XXXVIII.

CIBOS eis dabis, ut est piper, ruta, cyminum, & alia similia, poto ante accessionem uino subtili
albi coloris, & ipso modice calido temperato. Generaliter autem in accessione nihil eis dari potest. Post
accessionem dabis eis pullos conditos cum pipere cyminoque, porrum coctum, de lactante pedes bene
coctos, conditos de aceto & melle, ac pulegio, buccellas de filigine habentes modicum oleum: & si aetas fuerit,
facies eis apozima de apio, foeniculo, petroselino, anetho, & aniso, & dabis eis bibere: & infra paucos dies
haec faciendo, liberabis aegrotum.

Dieta in tertianis febribus. Cap. XXXIX.

VSQVE in octauum diem nihil ei facias: post octauum uero die dabis ei apozima, absinthium,
& anethum per dies plures: & si sitis nimia fuerit, dabis ei apozima ubi coquitur apium, bibere. De holer-
ibus autem dabis eis maluas, atriplices, lactucas, cucurbitas: de uolatilibus, alas pullinas, & gallorum testi-
culos, & oua forbilia: de quadrupedibus, de lactante pedes, cerebella, armos: at uero poma, mela, persica:
nullam autem acrimoniam, nec uinum, usque dum absoluitur febris, dabis & ptisanas.

Dieta quartana febris. Cap. XL.

IN primis dabis apozima ubi coquitur epithymus, pulegium, satureia, & anethum. Cibabis eos
mapo & rapis coctis cum pullo, & uino subtili albo & pipere: & omnia quae possunt esse calida, secunde da-
bis eis.

Dieta senacum febris. Cap. XLI.

CIBABIS eos cibo subtili, ut est filigine & ptisana cum aqua bene cocta & modico sale. Lactu-
cas elixas cum posca, atriplices, beras, cucurbitas, dabis eis & aquam frigidam bibere. Post septem uero dies
dabis eis bibere, dabisque eis in escam intubas, lactucas, maluas, betas, & atriplices. De uolatilibus, phasia-
nos, pullos iuuenes, perdices, merulas, turdos, turtures, & pipiones. De piscibus generaliter quantos inue-
nis albas carnes habentes: quod genus sunt aspratiles, & molles, nullam duritiam habentes: secis dabis
eis & fluuiales pisces, hoc est saxatiles, humena, acerma, lepta, pettines quoque & ostreae. Securus etiam da-
bis ueruecinam carnem bene coctam, panticas de uacca, & de porco pedes & cerebella, musculumque de
porcello & pedes. De leguminibus, fabam bene coctam, faseolum, & foenugracum, alicam bene coctam
cum rosato habente modicum mellis, & ptisanas. De pomis uero, persica, & dura cedria mundata, abla-
tis corticibus, uuas etiam maturas. Dabis quoque malagranata comedere, & alia poma cum reuerentia,
modumque dabis ad manducandum: melius tamen est, si omnia non manducant. De opere autem puto-
ritio noli dare: castaneas bene coctas, nuces ponticas, nucleum pini, aut amygdalas remoue. Cydonia
uero bene cocta dabis ad manducandum. noli excitare eos nimis post prandium, sed si uoluerint ante
prandium, & ipsum modice. & si uis in hebdomada balneare, debes, non est contrarium: tamen post pau-
sationem prandij balneas offerre, aut nocte cum dormitum. Ipsum uero balneum ex dulci aqua fiat,
non ex salmactida. & antequam aegrotus ingrediatur in calorem, aqua frigida perfundas eum. & cum
ingressus fuerit in calorem, modicum fudet, & postea unges eum separe de oleo & aqua calida facta. &
post unam horam, stet, sed non fudet, & descendet in solum optimum. & cum egressus fuerit, de oleo
& aqua frigida eum perfundas, totumque corpus & pedes iterum lauabis. & post balneum, ad pra-
sens non des ei bibere, sed in medio prandio unum calicem aquae frigidae bibat. quod si hyems fuerit, cali-
cem aquae calidae accipiat, ac uinum conditum nullatenus accipiat.

Que nam

Quæ nam diæta in paralyfi seruanda.

Cap. XLII.

QVI paralyfi obnoxius tenetur, omnem piscem, qui squamam non habet, omnem etiam auem, quæ in palude moratur, non comedat, sicut anseres, ameres, & stagnatiles pisces qui limbum habent. Puti pum uerò sapiam & omnem ostream, omneque legumen quod restrictionem facit, azimum, hordeaceum, milium, panicum, caules, uel betas, rapas, melones, cucumeres, cucutias, sorba, mela, mogarum, ochynum, mannam, carnem porcinam, caprinam, caseum & lac uaccinum atque caprinum, trilionem, columbam, porrum, crudum, cepulam, coriandrum, allium, citrium, malum granatum, cerasia, pruna, cydonium crudum, panem infusum in uino, lactucas, intubam, daucum, maluas, pineas, fungos, uuasque nigras edant; uinum præter album non bibant, neque dulce, neque conditum: mustum usque in Nouembrem mensam non bibant. Idque etiam obseruandum est, ne folia sinapis comedant, nec cocta nec cruda.

Vniuersalis ratio uictus.

Cap. XLIII.

OMNEM aspratilem piscem, uidelicet ut sunt lupi, corui, pisces de flumine, qui petram habent, ut trutti, qualis, comede: sed non multum carnem porcinam, gallinas syluaticas, pullos, perdices, phasianum, gruem, merulas, turdos, oua forbilia, uel modicum caseum pecorinum, modicum cappari: simulam, alicam, porrum coctum ex aqua, statifagiam, asparagos, pastinacas, foenugracum, semen satureiæ crudum & coctum, mentham, rutamque pro desiderio comede: erucas in uiscello interuallo, & ipsas apium & petroselinum cocta: interuallo apij & petroselini uirides radices. modicè pro desiderio apij semen, amandulas, ficus ficcas & uirides, modicè, & ipsum cum pipere, uuas passas & uirides albas modicè & interuallo coctum, spineam, sinapis semen interuallo, foeniculi semen, modicè, cydonia asia & cocta modicè. Vinum uerò album & leue, Græcumque bibe. Super omnia, cautè homini agendum est, & de pluuiâ cauendum primo uere & autumno, semperque ad uentrem accipiendum est, qui ipsos humores deponat.

Si quis syringiones in carne habuerit.

Cap. XLIII.

ABSTINENDI sunt à carne bubula, porcina, anserina, ungula, & ab omni legumine.

De obseruatione totius anni, ut sanus custodiat.

Cap. XLV.

AB octauo Calendarum Ianuarij, usque in diem octauum Calendarum Aprilis, utendum est calidis & optimis cibis, nec uino abstinentum. Ex die sexto Calendarum Aprilis in quartum idus Maij, utendum beneolentibus, sed acrioribus cibis, labore corpus exercendum. Ex die quarto Calendarum Maij usque in diem octauum Calendarum Iulij, usque in diem septimum Calendarum Octobris, utendum est frigidis ac dulcibus & beneolentibus, parcius laborandum, & duodecim diebus proximis Venereo usu obseruantissime abstinentum. Ex die sexto Calendarum Octobris, usque in diem septimum Idus Nouembris, utendum est acidis acribusque quibuscunque escis, minime laborandum. Ex die sexto Idus Nouembris, usque in diem octauum Calendarum Ianuarij, utendum leuius cibis, uino indulgendum, parum bibendum, nec Venere abstinentum.

Hæc (ut dixi) obseruans, incolumi sospitate uitæ spatia transcurres, & nulla indigebis expectatione medicorum.

F I N I S.

Nancelius Lectori S.

Perlegi, ois Dæd, non sine ingenti labore, & animi contentione incredibili, per etiam, ut stomacho, hunc commentarium, falso sub nomine Plinii secundij editum, & cu ex historia temporis, & ex tractatu varietate, deprehenderim, hunc autem Plinio aliquot seculis inferioris, quippe qui & Galeni sepe meminit, ac ipse dissentiant, certo non longe potuerit. Et tamen non effugit, multa se ex Plinio assumpta, & suis qd in appositione, ut sepe, penitus in seculum immutatis. Quæ omnia, ut monitis responsa erant, ut omnes lepores, gratiam (que sepe peroris in se, sub stylo tamen sepe dissimul) talis fœda spurcicia uerborum, & sensus corruptissimi, deturparent. Quæ si non, omnia minus, mala comestura, & fœdiorum, & sensus, emendare potui: tamen, cum lucid addidi, ut hinc se legi & intelligi à bonis & castis uirgine quant, cu aliqua nostri gratia; que uirgine, & difficultate exanderetur, & merces propostæ expectatur. Vale.

Turonibus
Alibi in manu S. d. b. Octob. 1575.

L. APULEII M. AD AVRENSIS,
PHILOSOPHI PLATONICI, DE HERBARVM

VIRTVTIBVS HISTORIA, QVAM CHIRONI

CENTA VRO, ET AESCVLAPIO

ACCEPTAM RETVLIT.

Admonitio. Ego magis Dioscoridis, a quo longè plurima pene ad verbum transcripsi, et sepe tam-
in commentis suis lapsus, non tam opus, rei & verborum ignorantia, quam
carum, exemplis, erroribus indutus. Tu, fac periculum.

De Arnoglossi nominibus virtutibusq. Cap. I.

Nominum varietas.



RAECORVM alij arnoglosson, aliqui arnion, alij probation, alij cynoglosson, alij he-
ptapleuron, alij hepataneuron, alij polynuro, alij churion; Prophetæ Vranichneumano, he-
Aegyptij Asuth. Galli Tardos, Lotios: Hispani Thasancam: Daci Simpeax: Punici Ar-
tiercon uocant: Romani plantaginem latam, alij plantaginem maiorem, alij Septener-
uiam. nascitur paludibus plurimum, & pratis.

Græci ἀρνὸν agnum uocant, πλάσσω uerò linguam. Rursum quòd sepe adnata habeat germina
in longitudine, septem lateribus similia, Græci ἐπταπλευρον uocauerunt. Ceterum sunt eius species duæ:
nam quæ heptapleuros appellatur, est maior forma, & folijs ornatioribus & latioribus & nervosis. nasci-
tur in uallibus atque hortis, necnon & paludibus plurimum & in pratis. estque magis constrictiua. Alia
uero minor atque nigrior, lenior & renuior. Nascitur in chartarijs locis, sed in usum uariè adhibetur.

*Dolori capitis medendo prodest.

Herbæ plantaginis radix in collo suspensa, capitis dolorem mirificè tollit. *Ventris dolori cu-
rando. Herbæ plantaginis succus tepefactus, fomentando, uentris dolorem tollit: & si tumores fue-
rint, tusa & impolita tollit tumorem.

*Interioribus malis succurrendis.

Herbæ plantaginis succus potui datus, & interiora sanat, & thoracem purgat mirificè.

*Dysenteriz compescenda. Plantago cum lente cocta, & manducata, stringit uentrem.

His qui purulentum cum sanguine excreant. Herbæ plantaginis succum dato bibere, sanabun-
tur.

*Vulneribus sanandis. Herbæ plantaginis semen tufum, in uuluis sparsum, uulnera cito sa-
nabit: & ipsa tusa, & impolita, refrigerat ea loca quæ nimio calore urgentur, & per sanat.

*Ventri sistendo. Ad uentrem stringendum, plantago ex aceto cocta, in mero bibatur mensura
unius cyathi.

Serpentium moribus excludendis.

Herba plantago trita ex uino sumpta, commodo erit.

Scorpionum moribus.

Plantaginis radix alligata, mire prodesse creditur.

Lumbricis purgandis.

Herbam plantaginis contundes, & succi eius de cochleario, uel de ligula dabis bibere; ipsam quoque
herbam rufam umbilico imposito.

Si qua durities fuerit in corpore.

Herba plantago pisata cum axungia sine sale, instar malagmatis facta & impolita, durities discutit.

In febre quartana, Herbæ plantaginis succus in aqua mulla ante duas horas accessionis potui da-
to, & miraberis effectum.

Podagra & omnium nouorum dolori & tumori.

Herbæ plantaginis folia contusa, uel pisata cum salis modico, & impolita, optimè facere certum est.

Tertianæ curadæ, Herbæ plantaginis radices treis coterito, & sub accessione cum uino aut ex aqua
ieiunus bibat.

Secundæ doloribus.

Plantaginis semen contritum, & potui datum, prodesse cre-
ditur.

Vulneribus recentibus.

Herba plantago contusa, cum axungia uetere sine sale imponi-
tur, & laborans sanus efficitur.

Si cui pedes tumuerint ex itinere.

Herba plantago contusa cum aceto impolita, tumorem tollit.

Si cui ulcus secus oculum siue nares natum fuerit:

Herbæ plantaginis expressæ & contusæ succo, lana molli madefacta, & impolita, per dies nouem curat.

Ad dysentericos & torminosos.

Herbæ plantaginis semen tritum pro polenta in uino calido bibat, & sanus efficitur.

*Ad parotidas. Herba plantago cum axungia ueteri pisata & impolita, parotidas sanat.

*Ad ulcera oris. Herbæ plantaginis succus, & folia eius cocta in ore tenentur, & radix eius in ore
commanducatur.

*Ad fistulas sanandas.

Herbæ plantaginis succus fistulis infunditur, & facil-
limè medetur eisdem.

*Ad morsum canis rabiosi.

Herba plantago tusa & impolita, moribus
caninis auxilium præstat.

Contra omnes uesicæ difficultates.

Herbæ plantaginis folia uel radices ex passo fortiter medentur.

Nomina & uirtutes Pentaphylli. Cap. I. I.

Nominum varietas. GRAECI Pentaphyllon, alij pentapeges, alij pentamonon, alij pentapontes, alij pentadactylon,

lon, alij pseudoselinon, alij callipetalon, alij xyloloron, alij aspalton, alij pentacœnon, alij thymiatitin: Aegyptij orphite biocen, alij themonestron, alij æthorro, Prophetæ Ibeos onyx, (hoc est unguem ibis) alij pteron ibios, (id est pennam ibis) alij hermodactylon, alij hermubotanem; Galli pompedulon, Daci propedula, alij dročila; Itali quinquifolium, alij manum Martis. Nascitur locis pratensibus, cultis ac mundis, gustati aspero, lacte molli: folia mentham referunt, singulis sæpius quina, flore pallido, radice longa atque subrubra.

Ad uitia artuum, etiam si perculsi sint.

Herba quinquifolium cum axungia uetere sine sale imposita sanabit.

Ad uentris dolorem.

Quinquifolij succu dabis bibere cochlearia duo, sine mora dolorem tollit.

Ad uitia oris, lingue,

& gulæ. Quinquifolij radices ex aqua coctas dabis ut gargarizentur.

Ad capitis dolorem.

Herba quinquifolium circumscripseris digito medio, & pollice subblata, contrita, & capiti illita, efficaciter sanat. peracto remedio, loco puro reponi conuenit.

Ad sanguinem naribus profluentem.

Herba quinquifolium pota, uel illita, restringit mirè.

Ad morsum serpentis,

Herba quinquifolium contrita, si potui datur cum uino, mirè succurrit.

Ad ambusta,

Herbam quinquifolium potatam prodesse, plures auctores affirmant.

Ad cæcum exiccandum.

Herbam quinquifolium cum uino & cum adipe ouillo ueteri sine sale pisatam de ligno in lignum uino sane ueteri aspergis, & sic imponis, remque unicam experieris. Leges eam mense Augusto.

De Hierobotanes herba nominibus facultatibusq.

Cap. III.

GRAECI hierobotanen, alij peristereon, alij hierobotanon, alij orthon, alij diosatin, alij pectoron, alij panchromon, alij collectis; Demetrius & Aesculapius Cyparillon; Pythagoras ericeptron, alij aristeron; Aegyptij pempsempse, Prophetæ Heraclacyon; Itali uerbenacam, alij liciniam, alij lustraginem, alij columbinam, alij militariam, alij uertipedium, alij cristam gallinaceam; Græci rursum trigonon, cameli con, sideretin, curitin, persephonion. Nascitur ubique in planis & aquosis locis, folijs subalbis & uelut incis, radice simplici atque cyrso, uirtute redarguenti, quam stypticen uocant. Est quæ uulnera conglutinat, atque putredines abstergit. est autem columbis esca iucunda.

Ad ulcera & parotidas,

Herba uerbenacæ radix in collo ligata, summè proficit.

Ad strumas & parotidas,

Herba uerbenaca tusa & imposita, mirificè sanat.

Ad eos qui induratas uenas habent, & cibos nō recipiunt,

Herba uerbenacæ succus datur bibere; sed cocta postea miscetur cum uino, & melle, & aqua: & statim sanat.

Ad hepatis dolorem,

Herba uerbenaca solutio lecta, in puluerem redacta, robusto dabis cochlearia quinque, ex uino quā optimo, cyathis tribus potui sumpta, mirè proficere creditur: cæteris pro cuiusque uiribus sic dabis.

Ad calculosos,

Verbenacæ radix contrusa ex

multo optimo tepido data, incredibiliter calculosis succurrit: nec solum ipsis calculosis, sed & quidquid esset quod urinam impediret, celeriter reducit.

Ad capitis dolorem,

Herba uerbenacæ corona

facta & capiti imposita, dolorem capitis tollit.

Ad serpentium morsus,

Herbam uerbenacā

cum suis folijs & radicibus, quisquis offultam cinctamque secum portauerit, ab omnibus serpentibus tutus erit.

Ad morsum araneorum, quos Græci phalangios uocant,

Herba uerbenacæ ramulos

ex uino decoctos & contritos, deinde quod acerauerit, plagæ impones, & adaperiet: postea crudam cum melle contritam in ulcus audaciter insertam, maturè ad sanitatem perducere, certus auctor affirmat.

Ad morsum rabidi canis & hydri,

Herbam uerbenacam in uulnus adponito, tritici quoque gra-

na integra indita uulneri, donec humore remollita expleant: iam humidam proijcito illas gallinæ. si non appetit, simili modo alia grana coniicito: si sic esse coeperint, periculi sublatis signum erit.

Ad uulnera recentia,

Herba uerbenaca contrita cum butyro, uulneri imponitur.

Ad morsum serpentis, Herba uerbenacæ ramuli ex uino decocti & contriti, si cæca erit plaga, cum tumore impositi, adaperiunt primum, exulcerat deinde: postea crudi cum melle contriti, & ulceri inserti, donec ad sanitatem (quod celeriter fit) perducunt, imponuntur.

Morbo regio laborantibus, auruginosisue,

Herba uerbenacæ drachma una, & nardi oboli tres, bacca crudæ foliorum expressus succus, & paululum myrrhæ contrita, ex aqua cyathis tribus potui data, expellere morbum creditur.

Symphoniaca Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes.

Cap. IIII.

A GRAECIS Hyoscyamos dicitur, & Dioscyamos; alij adamantem, alij Pythonion, alij adamion, alij hypnoticon, alij Emmanes, alij auginon, Pythagoras Propheten, Oftanes Xelechion, Zoroastres Typhonon, Latini insaniam uocant, aliqui Apollinarem, alij Laterculum, alij Symphoniacam, alij calicularem appellant: alij Dentariam; Punici Gigan, Aegyptij saphtho, Phryges Remenia, Tusci Fabam lupinam, Galli bellinuntiam, Daci dieliam, Prophetæ Aegyptij Ligeam. Thyrsio fruticoso: multis ramis, nigris scissis, hirtis: balanos generans, ut sunt Atali punici, ampulantium appellatum, obstruosos quidem & semine plenis, paulo longiore, papauere. Sed sunt differentiz eius tres. Nam altera flore purpureo, & semine nigro: altera flore nigro, ac semine fuluo. sed utraque fumentibus insaniam parit. Appellata denique est, insaniam faciens, Mania poetis. Tertia semine atque flore albo, nascitur locis cultis.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

Hyoscyami uel nomenclatura atque uirtutes. Cap. IIII.

L. APVLEII MADAVRENSIS

^{Loc. gen. talis.} & fabulosis, & hortis, & litoribus rudentibusque. eius succus similis est ^{id est papaveri} herba. ^{Ad aurium dolorem.}
^{succus meconii} Medetur hyoscyamos ille ergo candidior, & has vires habet.
^{Herba symphoniace} succus tepidatus in aurem instillatus, aurium dolorem mirè tollit: etiam si uer-
^{mes fuerint, necat.} ^{Ad dentium cruciatu.} ^{Herba symphoniace} radicem costam cum uino au-
^{stero forbeat, & teneat eam in dente qui laborat, mox sanat dolorem.} ^{Ad tumores cuiuscunque par-}
^{tis corporis.} ^{Herba symphoniaca tusa, & imposita, tumorem tollet.} ^{Ad inguinum dolorem.}
^{mirum.} ^{Symphoniace} radix alligata femori, & tumorem & dolorem inguinum tollet. ^{Ad pedum dolo-}
^{rem.} ^{Herba symphoniaca} alligata, pedum dolorem & tumorem tollet. & tusa eadem cum sua radi-
^{ce, & super pedes posita, mirè dolorem & tumorem pedum tollet.} ^{Ad iocinoris & pulmonis uexa-}
^{tionem.} ^{Herba symphoniace} succum potui dato, & cum summa admiratione sanabit.

^{Ad pectinem, mulierum dolorem.}
^{Herba symphoniace} succum mixtum cum croco in potione propina, & miraberis effectum.

De uiperine appellationibus & potentia.

Cap. V.

^{G R A E C I} eam Phlemon, Echidnon, Herpyzon; Latini hinnulam, uiperinam, serpentariam, &
^{radicem Macedonicam nominant.} Nascitur secus flumina uel fegetes, folijs mollibus, gustu aspero.

^{Ad uiperarum morsus.}

^{Herba uiperina} trita cum uino, potui data, mirè morsus sanat, & uenenum discutit.

Nomina & uirtutes Acori.

Cap. VI.

^A ^{G R A E C I S} dicitur Acoros, Choros, Aphrodisias, Gallis piperapium, Italis ueneria, Radix
^{nautica & Singentiana & Vnguentiana.} Nascitur locis cultis & hortis ac pratis. Leges eam menſe Au-
^{gusto.} Ne apes examinent, & diffugiant.

^{Herbam Veneriam} in uase apum suspensam habeto, & nunquam seducentur: hæc sanè herba ra-
^{ro inuenitur, nec eam scire quis poterit, nisi cum flosculum emiserit.} ^{Ad dyfuriam & stranguriam.}

^{Herba uenerie} radicem ex aqua decoctam ad tertias, dabis bibere per triduum, mirifice urinam dedu-
^{cet, & stranguriam sanat.}

Nomina & uirtutes Leontopodij.

Cap. VII.

^{G R A E C I} Leotopodion dicunt, iidem leontopetalon, iidem Prapapilon, iidem thorybeton,
^{iidem Lacethon, Aphereſin, Lacithron, Leuceoron, Orobethron, prapedion, Leonchosremon, topon pla-}
^{typhyllon; Dardanus calalia, Punici guddubal; Latini flammulam uocant Veneris, iidem Brumatiam, pa-}
^{pauerculum, & pedem leoninum.} Nascitur sæpe cum tritico, thyrsis bipalmis, furcolis, in quibus ueluti
^{lanx binæ uel ternæ semen continentes, folijs cauliculi agreſtis ſimilibus, radice nigra, rapæ ſimili.} Nasci-
^{tur etiam circa campos, & circa fossas & harundineta.}

^{Si quis denotus defixusque fuerit, ſic eum resolues.}

^{Herba leontopodij} frutices sine radicibus coquito ex aqua, Luna decreſcente, lauato eum & te qui fa-
^{cis ante limen extra domum prima nocte, & herbam incende aristolochiam, & eum ſuffumigato, & redi-}
^{te ad domum, & ne poſt uos reſpiciatis, reſoluisti eum.}

Botroci seu ſclerata ſynonyma atque uirtutes.

Cap. VIII.

^{G R A E C I} Botrocion dicunt, aliqui Choran, alij glorophin, alij Nileon, alij ſtalice, alij cauſtice,
^{nechon, iidem alij chlorozophin, alij rhoſolinò, alij catacauſtice, alij pheorion, alij lycopnun, alij ſelenò agrior,}
^{Aegyptij ſycarcadana, iidem nemeco.} Latini apium ruſticu, iidem apium riſus, iidem herbam ſcleratā. Nasci-
^{tur locis humidis & aquoſis: ſi quis hominum eam guſtauerit, ridendo exanimat: habet enim uirtutem}
^{cauſticam.} Sunt eius ſpecies quatuor, quarum altera cum folijs pinguibus & craſſis & latis, colore albo,
^{alia ſubalbo, alia uelut nigro, alia cum flore ſimili uel purpureo.} Thyſo cubitali, minime robuſto, radi-
^{ce alba cum adnatis germinibus, uel erumpentibus, tanquam in helleboro.} Nascitur autem in ſtagnoſis,
^{uel umbroſis locis.} Secunda eſt longioris thyſi, ac folijs hirtis & inciſis, guſtu acerrimis. Nascitur ſepe in
^{Sardinia.} Tertia eſt breuiſſima, terri odoris, atque incendioſa, cum floribus aureis. Quarta eſt cum flori-
^{bus lacteis.} ^{Ad ulcera Chironia.}

^{Sclerata herba} tusa cum axungia, ſine ſale imposita, uulneri excomedet: & ſi qua fuerit ſordes, expur-
^{gat, ſed non diutius patiaris, quam neceſſe eſt, ne & corpus ſanum exedat.} Si argumentum rei experi-
^{uolueris, tunde eam, & ſuper manum ſanam impone & alligato, & continuo corpus arrodit.}

^{Ad ſtrumas & furunculos.}

^{Herba ſclerata} tusa, & ſubacta cum ſimo porcino, imposita ſtrumis uel furunculis, intra paucas horas
^{diſcutit, & pus eiſciet.}

De batrachio

Cap. IX.

^{N A S C I T V R} locis fabuloſis & campeſtribus, aquoſiſque. radix eius uerticillo ſimilis eſt. radi-
^{culas}

culas pancas & tenuissimas habet. uirtutes porro has possidet. Lunaticis praesidio est. Batrachion si lunatico in ceruice ligetur lino rubro, Luna decrefcente, cum erit signum Tauri & Scorpionis parte prima, repente sanabitur. Ad nigras cicatrices. Herba Batrachion tusa cum sua radice mixto aceto, imposita his qui habent cicatrices nigras, exedit eas, & similem corpori reliquo reddit colorem.

De artemisia nominibus & uirtutibus. Cap. X.

ARTEMISIAM Graeci Toxatin appellant, alij Toxitesian, alij Ephesian, alij Caristotelotiar, alij Parthenicon, alij Hypolysson, alij Lian, alij Anaetorion, alij Sozusan, alij Leucophycā. Prophetā Hē mātropu, (id est sanguinem hominis) alij Onicantem, alij Chrysanthemon, alij Theonisin, alij Busbasteo, scardian, alij Osta anthropu, alij Hamacronu, alij Gonosephellu, alij Philaterion, alij Lachanon Basilicon, Aegyptij Anesen, alij Neiafar, Pythagoras Pexasin, & Toxobolon, Galli Ponem, alij Titumen, Daci Zyred, alij Zonustem, Itali Serpillū maius, alij Sirium, alij Valentiam, aliqui Artemisiā, nō pauci Persepollentem. Nascitur locis lapidosus & sabulosus. his uirtutibus praedita est. Faciendo itineri prodest.

Herbam Artemisiam monocaulon, si quis iter faciens, eam secum in manu portauerit, non sentiet laborem itineris, fugat & daemona: & domi posita, prohibet mala medicamenta; auertit oculos malorum hominum. Ad pedum dolorem. Artemisia tusa cum axungia & imposita, pedum dolorem tollet. Ad intestinorum dolorem.

Herba Artemisia pilata, & in puluerem redacta, cum aqua multa potui data, intestinorum dolorem sedat.

De artemisia tagete. Cap. XI.

Ad uesciae dolorem & stranguriam.

ARTEMISIAE herbe succus ex uino duabus uncis exhibitus, uesciae dolori ac stranguiae praesidium est. Ad febrem conducit. Herbe artemisiae succo ex aqua calida febricitanti cyathis duobus potui dabis. Item artemisiae succus cum rosaceo febrilem perunges, & curabitur. Ad coxarum dolorem. Herbam artemisiam, quae tagetes uocatur, tundes cum axungia, & aceto bene subiges, & impones, & alligabis, tertia die sanabit. Ad uenarum dolorem & tumores. Herbam artemisiam tusam, cum oleo bene subactam impone, mirifice sanabit. Ad uehementem pedum dolorem. Artemisiae radicem ex melle dabis manducare, & ita purgabitur, ut uix credi posset tantam uirtutem eam habere. Hanc herbam si conficaueris, laetis optimi odorem habet.

De artemisia, quam leptophyllon cognominant. Cap. XII.

NASCITVR circa fossas & aggeres, in agris ite frumētarijs. flosculi eius si contriueris, sanifici odore habet. Ad stomachi dolorem. Herba artemisia tusa, & cum oleo amygdalino bene subacta, more malagmatis induces panno mundo & impones, quinto die uexationem stomachi sanabit. Et si fuerit eius artemisiae radix super limen aedificij suspensa, domui ei nemo nocebit. Ad uenarum dolorem atque tremorem. Herba artemisiae succo cum oleo rosaceo mixto perunges eos, & desinent esse tremuli, & omne uirium tolletur. Has artemisiae tres species Diana dicitur inuenisse, & uirtutes earum & medicinam Chironi Centauro tradidisse, qui primus de his herbis medicamenta instituit. Has autem herbas ex nomine Dianae, quae aeternus graece dicitur, artemisias nuncupauit.

De lapatho. Cap. XIII.

LAPATHVM alij Rumicem ferē dicunt. Nascitur locis sabulosus & aggeribus.

Ad paniculam, quae in inguine nascitur.

Lapathum herbam contundes cum axungia uetere sine sale, sic ut axungia duplo plus sit, quam herbe, & his bene commixtis facies turundam, & uolues in folio cauliculi, & immittes eam subicitus calidam, & cum calcauerit, tunc impone paniculae, & panno ligabis. hoc quidem eximium est, & omnium optimum.

Dracontea nomina & uires. Cap. XIV.

AGRAECIS dicitur Dracontea, alijs Asclepias, alijs Phytonion, alijs Anchomanes, alijs Sanromaton, quibusdam Aphryssan, aliquibus Theron, nonnullis Sceon, item Dorcadion; Prophetā Thyphonon uocant, alij Corcodrillon, alij Ostaes, Zoroastes Theriophonon; Aegyptij Eminion; Itali herbam Draconteam & Columbrum. Draconis sanguine nata fertur esse Dracontea. Nascitur montibus summis, ubi sunt lacus, maxime locis sanctis, terra Apulia, super saxis, tactu molli, gustu dulci, tanquam castanea uiridis. saporem radicis ima caput draconis habet. Ad omnium serpentium morsus & aspidis fracta. Herbae draconteae radix ex uino trita, tepesacta, potui data, uenena discutit. Ad ossa in corpore fracta. Herbae draconteae radix cum axungia, facta quasi malagma, ossa fracta de corpore educit, & lapides extrahit. Leges eam mense Iulio.

LIB. APVLEII MADAVRENSIS

Nomina & virtutes satyrionis. Cap. XV.

GRAECIS dicitur Satyrion, alijs Cynoforchis, alijs Entaticon, Eriton, Panion, Serapiō, alijs Orchis. Aegyptij Menem, Galli Vram, Itali Priapifcon, alij Torminalē, alij testiculum leporinum nominant. Nascitur in montibus, locis solidis & cultis, in pratis item & locis maritimis.

Ad ulcera difficilia & cicatrices vires habet.

Herbæ Priapifci radices tufas ulceribus imponis, & repurgat, & cicatrices claudet. Ad lippitudines oculorum. Herbæ Priapifci succo oculos unges, & lippitudines & dolores tollit sine mora.

Si quis mulierem subagitare non poterit: + Herbæ Priapifci radicem, id est testiculum dextrum, quia maior est, & piperis albi grana quadraginta septem, mellis uncias tredecim in uino optimo medicamē soluis, & pondo scrupulorum nouem per triduum fumes. Leges uerō eam mense Iulio.

Nomina & vires gentiane. Cap. XVI.

GRAECIS Gentianam, Aloen Gallicam dicunt, alij Narcen, aut Chironiō, Dardanus aloetis, Itali Gentianam, alij Comitalem aut Ciminalē. Nascitur gemellis montibus & locis umbrosis hec herba. Facit autem ad omnia antidota, tactu molli, gustu amaro, scapo solido, vires habet. Contra serpentium morsus. Herbæ gentianæ radicem ficcā & in puluerem redactā pondo drachmæ unius dabis in uino cyathis tribus, sumptumque ualidissime proderit.

De cyclamini synonymis & viribus. Cap. XVII.

GRAECIS quibusdam dicitur Cyclaminos, alijs Cyssanthemon, alijs Cyssophyllon, alijs Chelion. Zoroastres Cylinen Chyllenæue, Trimalchites Osthane, Prophetæ Asphet, (aut Aspho) alij Measpho, Aegyptij Palalia, Itali Titothos, alij Orbicularem, alij rapum terræ, alij rapum porcini, Syri Elardia. Nascitur locis cultis aut montuosis. Ad caput.

Herba Orbicularis naribus immittitur. Ad aluum concitandum. Herba Orbicularis in collyrium facta, & eo iniecto catarticum est. Ad splenis dolorem. Herbæ orbicularis succum cyathum unum, & aceti optimi cochlearia quinque, diebus continuis octo potui dabis, miraberis effectum. Item radix eius in collo suspensa, ut contra splenem pendeat, efficaciter medetur. Nam & cyclaminis succo quisquis anum tetigerit, mira celeritate alui solutionem experietur.

Polygoni nomina atque vires. Cap. XVIII.

POLYGONON, alij Cynochalen, alij Polygonaton, aliqui Asphalton, alij Chiliophyllon, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Cnopodion seu Crinopodionton, alij Myrtopetalon, alij Zachian, alij Pedalinon Petalonue uocant: Aegyptij Thephin, alij Stemphin, Prophetæ Gonos Herois, siue Gonoreronos, aliqui Onyx Myos, Itali Sanguinariam, alij Proserpinacam, alij Sorpinacam alij Statunariam, & quidam Misferdiuinum. Nascitur ubique locis cultis & aggeribus. Legito eam æstiuo tempore. Ad eos qui sanguinem reiiciunt.

Proserpinacæ herbæ succos cum uino optimo & austero sine fumo repositos sanguinem excreantem iunus bibat per dies nouem, miram certe rem experieris. Ad lateris dolorem. Herbæ proserpinacæ succo cum oleo rosaceo, si eos sæpius perunxeris, dolorem tollit. Ad mamillarum dolorem mulieris, quæ lactem habet & tumorem. Herba Proserpinaca tusa, & cum butyro subacta imposita, discutit mirè tumorem & dolorem. Ad oculorum uitia. + Herbam Proserpinacam accede ante solis ortum uel occasum, & circūscribes eam anulo aureo, & dices tollere te remedium oculis; deinde post triduum ante solis ortum sublatam circundabis diligenter, proficiet. Ad dolorem aurium.

Herbæ Proserpinacæ succus repositus, & auri instillatus, dolorem mirifice discutit. id quod etiam ipsi experti fumus, tam potenter, inquam, proficit, ut & ulcera quoque aurium sanet. Ad dysentericos. Herbæ Proserpinacæ foliorum succus cum aqua calida potui datur, quantum tibi uidebitur; & sanus diuio procul efficitur.

Nomina & vires aristolochiæ. Cap. XIX.

ARISTOLOCHIAM Graeci Ararezan uocant, alij Ephestion seu Hephesian, alij Helestin, alij Pyxiontem, alij Melecapron, alij Melocarpon, alij Teuxipon, teuxitemonue, alij Dardanon, alij Tontin; Aegyptij Sophosph, alij Chamæmilon, alij Opetin, Itali malum terræ, Daçi Absinthium rusticum, Scardian. Nascitur locis montuosis, solidis, calidis, & cultis. Contra uim ueneni.

Herba Aristolochia trita uel pisata cum mero potui data, uim ueneni uincit. Contra febres acern mas. Herba Aristolochia sicca suffumigabis febricitantem, & hilariorem eum facies. fugat etiam & demonia. Ad fistulas. Aristolochiæ radix fistulis inserta, celeriter expurgat, & ad sanitatem perducet. Medici quoque sine ea nihil feliciter percurrere possunt. Frigore exustis. Herba

Herba aristolochia ex oleo usque ad calefactoriam uim habet cum axungia porcina. ^{refus. medicis nece-} ^{rius.} Contra ser-
pentium & hominum morsus. Radices aristolochiae pōdere denarij unius in uini hemina sepius po-
ta, discutitur uenena serpentis. Si infans contristatus fuerit. Herba aristolochia suffumigabis
cum & hilariorum cum facies. Ad carcinomata quae naribus nascuntur. Herba aristolochia
cum cypero, & dracontei semen cum melle impositum emendat.

Nomina & uirtutes nasturtij. Cap. X X.

GRAECORVM alij Cardamon, alij Cynocardamon, alij Hiberis, alij Cardaminaeam, Aegy-
ptij Semeth, Itali nasturtium. Ad caput deplendum. Herba nasturtij succum si naribus in-
dlexeris, caput deplet. Hoc nasturtium non feritur, sed per se nascitur circa ima parietum. Ad capitis
uitia porriginis & furfures. Herba nasturtij semen mixtum cum adipe anserino, & tritum ablutio-
ne furfures e capite eiciet. Ad cruditatem. Herbam nasturtium & pulegium ex aqua decoctū
bibere dato, emendabis & discuties cruditatem. Ad strumas. Herba nasturtium cum lomento
tritum super strumas imponis, superposito etiam folio holeris. Ad furunculos sanandos.
Herba nasturtium cum fermento imponitur, concoquit & sanat.

De hieribulbo. Cap. X X I.

NASCITVR Hieribulbum ubique circa sepes, & locis quibuslibet fordidis, & has habet uirtu-
tes. Ad articulum dolorem. Herba hieribulbi accipito uncias sex, seu caprini tantundem,
olei cyprini libram & uncias duas in se p̄nsati & commixti, uteris, dolorem articulum tollit. Si
mulier habuerit lentigines in facie. Herba hieribulbi radice cum lomento lupinacio commixta, mu-
lier si faciem lauerit lentiginosam statim purgat.

Nomina & uirtutes apollinaris. Cap. X X I I.

GRAECI Dicea, alij Stricionon manicon, alij Dorigenion, alij Cecabon, Itali Apollinarim, alij
Bacinam, Daci Colida. Apollo hanc herbam fertur inuenisse, & Asclepio dedisse, & Apollinaris nomen
imposuisse. Ad uulnera Chironia & ranarum morsum.
Apollinarem herbam cum axungia ueteris libra, sine sale teris, & uini ueteris cyathum sine fumo si-
mul pilabis, & facies tanquam malagma, atque Chironio uulneri impones, medebitur.

Nomina & uirtutes chamemili. Cap. X X I I I.

GRAECI quidem Chamemilon, alij Parthenion, alij Drycolaphon, alij Chrysocalin, Trouisco-
selian, alij Aperito, alij Nymphon, alij Hieranthemin uocant; Itali bene olentem, alij Superbam, alij Au-
liticam; Aegyptij Thaborin, Galli Qualidiā, Campani Amalocian, Tusci Apianam, Daci Amalustam: has
uero habet uirtutes. Ad oculorum uitia atque dolores.
Herbam Chamemilō si quis ante solis ortum carperit, dicat albuginem uel oculorum dolorem se car-
pere, eamque alligatam secum gestet, & curabitur.

Nomina & uirtutes chamedryos. Cap. X X I I I I.

GRAECIS Chamædryos dicitur, alijs Drys, alijs Drysites, alijs Teucrion, alijs Chamærops.
Itali Trislaginem, alij Trixaginem appellauere. Prouenit locis montuosis, petrosis, & solidis.
Ad rupturam impendit prodest.
Chamædryos herba cōtusa de ligno in lignū, adiecto uino potui data, cū mira celeritate ruptos sanabit.
Ad sciam. Herba trixago feruēfacta, ac triduo potui data, sciaticum mirifice sanat. Ad mor-
sum serpentis. Herba chamædryos in puluerem molliissimum redacta, in uino ueteri potui data, uene-
num uehementer discutit. Ad podagram. Herbam chamedryn perinde dabis ut supra calidā,
mirè paragoriam praestat. Legenda uero est mense Augusto.

Nomina chamelae & uirtutes eiusdem. Cap. X X V.

CHAMAE LAE AN quidam Graecorum nominant, alij Corcodrillon, alij Dipfala, alij Ono-
cardion, alij Cneoron; Propheta Aphroditeloter, Aegyptij Semmeor, alij Imeleta; Itali Labrum Vene-
ris, alij Cicer rusticum, alij Statorius, alij Mararia; Hispani Analentidium, Daci Sciate, alij Calox cardiatos,
Aegyptij Gerbaste, alij Sapho. Ad hepaticos.
Chamelae herba succus potui datus cum uino, hepaticis, febricitanti cum aqua calida mirè proficit.
Contra uenenum iam sumptum. Herba chamelae ficcata, in puluerem redacta, & in uino propi-
nata, discutit uenenum. Ad hydropicos. Herbam Chamelaeam & Chamædaphnem, & Cha-

L. APVLEII MADAVRENSIS

medrin, & Chamapityn equali pondere tufas, & quam molliffime cribratas, fi in potione uini mixti, iun-
nibus cochlearia quinque, item minoribus & mulieribus cochlearia tria, puerulis cochlearium unum mi-
niftraueris, mirifice aquam omnem de corpore per urinam digerit.

Nomina & uirtutes chamapityos. Cap. XXV.

GRAECI Chamapityn, alii Orozelon, alii Holocyron, alii Bryon agrian, alii Sideritin uocant;
Prophete Hema Athenas; Itali Thicam, alii Cypreffum nigram, alii Rapam, alii Spiculam, alii Mamalle; Ae-
gyptii Nemenespa, Daci Dochela. Et habet quidem uires / Ad uulnera glutinanda.
Herba Chamapitys contufa, uulneri impofita, conglutinat: fi autem altius uulnus fuerit, fuccum
eius herbe in uulnere mittes. Ad ftrophu, hoc eft interaneorum dolorem.
Herba Chamapitys potui data, ftrophu dolorem tollit.

Nomina & uirtutes chamedaphnes. Cap. XXVI.

CHAMAEDAPHNE à Græcis quibusdam Daphnites, aliquibus uerò Daphne, aliis Hydra
gogos feu Caragogos dicitur. Itali Mustellaginem dicunt, alii Lactilaginem, & Lauraginem, alii Eugu-
bim, Vsuben. Ad aluum concitandam.
Herba Chamedaphne in puluerem redacta molliffimum, & in aqua calida potui data, aluum concitat.

De oftriagine. Cap. XXVII.

NASCITVR Oftriago circa monumenta, aut in monumentis, aut parietibus, qui funt circa
montiu radices. facit peculiariter ad eas res, quæ in homine nafcuntur. Ad ea quæ in corpore oriuntur.
Oftriago tufa, & impofita, omnes res quæ in corpore nafcuntur, perfanat: hanc herbam fi uolueris eu-
lere, mundus & ante folis ortum leges mense Iulio.

Nomina & uirtutes britannica. Cap. XXVIII.

A GRAECIS dicitur Britani, & Damafinos. Itali Britanicam, alii Betam plantaginis, alii Bibo-
nem uocant. Ad uitia quæ in ore nafcuntur, nempe nomas & tonfillas. Herba Britanica fum-
pta uiridis cum lactuca, oris uitia fanat: & per fe trite & exprefse fuccus, in ore contineatur, & aliquid ex
ea deglutatur, adæque proficiet. Ad ofcedinem. Herba Britanica fumpta uiridis, ofcedinem
tollit. Quod fi uiridem non habueris, etiam arida contufa cum uino ad mellis craffitudinem, eodem mo-
do fumpta, eundem effectum habet. Ad dentium dolorem, & fi laxi fuerint / Herba Britanica,
mira quadam potentia fuccurrit, reponendus autem eft in hyeme fuccus uel puluer eius, nam femper appa-
ret. Succum eius feruabis in uafe abietino, & calefacito, & puluerem reponito; nã ad eodẽm ufus cum ui-
no fumptus æquẽ efficaciter prodeft. Ad aluum ciendam. Britanica herbæ fuccus pro uiribus
cuiusque potui fumptus, per fe fine periculo purgat. Ad paralyfim. Herba Britanica uiridis
cum radicibus contufa, uini meri optimi cyathis duobus uel tribus potui fumpta, mirẽ proficere creditur.
Ad anginam, quam Græci στυάχην appellant. + Herbæ Britanicae flos, antequam tonitrum audiat,
collectus, deuoratus, per annum totum anginam non experietur.

Nomina & uirtutes lactuce fyluestris. Cap. XXIX.

GRAECIS Didaxagria, alijs Hieracios, alijs Aspideion, aliquibus Picris; Aegyptijs Iobonfos; Ita-
licis Lactuca fyluatica. Nafcitur locis cultis & fabulofis. Ad oculorum caliginem.
Dicunt Aquilam, cum in altum uolare uoluerit, ut profpiciat rerum naturas, Lactucæ fyluaticæ folium
euellere, & fucco eius fibi oculos tangere, & maximam inde claritudinem accipere. Herbæ igitur Lactucæ
fyluaticæ fuccum mixtum cum uino uetere & melle acapno qui sine fumo collectus eft, optimum fucco
herbæ uinum & mel commiscebis & teres, & in ampullam uitream condito, ex eo uteris; summam medi-
cinam experieris.

Nomina & uirtutes agrimonie. Cap. XXX.

A GRAECIS dicitur Arfella, item Sarcocolla; Italicis Artemonia Agrimonia uel, quæ has uir-
tutes habere memoratur. Ad oculorum uitia fiue dolores.
Agrimonia uiridis per fe trita: fi autem arida fuerit, in calida aqua intincta, ut facillime teri poffit, illita,
fugillationes & lobares oculorum mature difcurit. Ad uepris dolorem. Agrimonia herbæ
dicem bibere dato, mirẽ prodeft. Ad uulnera, ulcera, & cancrumata. Herba Agrimonia uiridis
contrita, & appofita, uulnera, ulcera, & cancrumata fanare apta eft: fi autem arida fuerit, aqua tepida remif-
fa idem proficere creditur. Ad luxum. Agrimonia herbæ contrita, & appofita, mirẽ doloribus
uel tumoribus ex luxu concitatis fuccurrit. Ad morfum serpentis. Agrimonie herbæ drachme
duæ

DE VIRTUTIBVS HERBARVM HIST.

215

duz cum uini cyathis duobus potui data, discutiunt uenenū mirifice. Ad ferro uel fude percussū.
 Agrimonia herba contusa & imposita, mirifice sanat. Ad uerrucas tollendas. Agrimonia herba cū
 aceto imposita, tollit uerrucas. Ad splenis uitium siue dolorē. Herba Agrimonia in cibo sum
 pta, splenem consumet. Ad ea quæ secanda sunt. Herba Agrimonia contrita & imposita, ape
 rit & per sanat.

Nomina & uirtutes asphodeli. Cap. XXXIII.

A GRAECIS Asphodelos, alijs Hastula regia uocatur. Itali Albucum appellauerunt. Has
 uirtutes possidet. Ad dolorem tibiurum uel pedum. Herba Asphodeli succo cum oleo amygd
 dalino ungebis quod dolet, mirifice sanabitur: etiam si tumores fuerint, ipsam tusam & subactam imponis.
Ad hepatis dolorem. Herba Asphodeli radix discocta, ex aqua mulsa potui data, hepatis do
 lorem mirifice per sanat & tollit.

Nomina & uirtutes oxylapathi. Cap. XXXIV.

A GRAECIS Oxylapathon uocatur. Itali uero Lapathum acutum pro uocabuli etymo no
 minant. Si qua durities in corpore. Herba Oxylapathon cum axungia ueteri ouilla pisata, &
 ex pane domestico, facta ut malagma, imposita, corporis duritias mirifice sanat.

Nomina & uirtutes centaurie maioris. Cap. XXXV.

A GRAECIS dicitur Maronion, alijs Nestion, alijs Plectronias, quibusdam Lymnites. Pro
 phetæ Hemaheracleos, alijs Chironias, alijs Lymnestis, alijs Apogorisapo, alijs Hydos, alijs Emericos; Aegyptij
Antiamas; Itali Fel terræ siue Vnefera. Ad hepatis dolorem. Herba Centauria maior in ui
 no decocta ac potui data, mirifice auxiliatur. Ad spleneticos. Centauria maior in uino decocta
 & potui data, lienem per sanat, experti sumus. Ad ulcera, uulnera, & cancrumata.
 Herba Centauria maior contrita, imposita, tumore fieri non patitur. Ad singillationes & dolores.
 Herba Centaurie maioris succus perunctus ex aqua, summe facit. Ad uulnera recentia.
 Herba Centauria tam efficax est ad plagas glutinandas, ut etiam carnes coherescant, quæ ex aqua eius
 coquuntur.

Nomina & uirtutes centaurie minoris. Cap. XXXVI.

EST & Centauria minor à Græcis Elleborites uocata. Prophetæ Hema Heracleos, Aegyptij Ama
rantum, Daci Stirfozila, Itali Febrifugiam, alijs Multiradix. Chiron Centaurus has herbas fertur inue
 nisse, unde & nomen Centauræ tenent. Nasci amant solidis locis & fortibus. Ad morsum uipere.
 Herba Centaurie minoris puluer in uino exhibitus, aut ipsa pisata, in uino ueteri potui data, ualidissi
 me proficit. Ad oculorum uitia. Herba Centaurie minoris succus oculis inunctus, aciem exte
 nuatam sanat: adiecto etiam melle, idem proficit. Caligantibus quoque oculis claritas restituitur recte fa
cile. Ne quis in hoc periculum incidat, Centaurie minoris manipulum in uini congio coquito, ac tridui
 maceratum eximito. Inde cotidie ad heminam mixtum, melle adiecto, ieiunus bibat. Aurugini pel
lende. Herbam Centauriam decoque in aqua ad tertias, & ex ea dabis bibere, quantum potuerit, sa
 nabitur. Lumbricis & tineis purgadis. Herbam Centauriam dabis ut supra, eijciet.
 Si quinenenum sumpserit. Herbam Centauriam ex aceto tritam dato, bibat, mox discutit uene
 num. Item centaurie radices pondere denarii unius in tribus cyathis uini bibuntur.

Nomina & uirtutes personatæ. Cap. XXXVII.

GRÆCE Profopites aut Protopes uocata est, alijs Bacchion, alijs Elephantosis, alijs Elephas, alijs
Nephelion; Itali Personatiam, alijs Dardana, alijs Manifolium; Galli betilolen, Daci Riborasta.

Ad omnia uulnera, siue serpentium morsus.

Personatæ herbe succus cum uino ueteri in potionem datus, omnes morsus serpentium uel colubri mi
rice sanat. Febribus medendis. Personatæ folijs cinges febricitantem, statim mirifice sanat,
& effugat febres. Ad uulnus, etiam si cancer erit. Herba Personatæ aqua foueto, deinde ipsam
 cum nitro & axungia & picula cum aceto tere, & in panno inducito, & imposito. Ad intestinorum
dolorem. Herba personatæ succi cyathum unum ex melle, cyathis duobus ieiunus bibat.
Ad canum rabidorum morsus. Herba Personatæ radix cum sale marino trita, morsui imponitur.
Ad uulnera uetera, quæ humore prestant. Personatæ radicem & spinā quæ in locis ficcis nascitur,
 equali pondere conteres, & impones. Ad ambusta. Personatæ succi cyathum unum ex melle,
 cyathis duobus bibat.

De uirtutibus herbe fragi. Cap. XXXVIII.

COMAROS Græci, Romani Fragum nuncupant. Nascitur quidem locis opacis & mundis,

LIB. APVLEII MADAVRENSIS

virtus. & collibus. His est prædita uirtutibus. *Ad splenis dolorem.*
 Fragi herba succus ex melle potui datus, mire ad splenis dolorem proficere, certum est.
 Ad inspiriosos. Herba Fragi succus cum albo pipere & melle mixtus, potui datus, mirificum
 Car. emedium præstat. Legito eam mundus.

Nomina & uirtutes ibisci. Cap. XXXVIII.

nomina sine
nomina. A. GRAECIS appellatur Althea; alij Ororiza, alij Aeleomoloché, alij Molochén agriam aut
 Creticé, alij Anadendromalachen, alij Sycophyllon; Itali Ibiscum uocant. Nascitur locis humidis & capis.
alt. hiocon. Virtus eius confert podagra.
malopon. Herba Ibiscus pisata cum axungia uetere imposita, tertia die sanabit. Eius herba experimentum
alt. lean. plures auctores affirmant. Ad collectiones, quæ in corpore nascuntur. Herba Ibiscus decocta
 cum foenugræco & lini semine, pollice imposita, duritias omnes discutit. Ad omnia encatismata
us. Ibiscum herbam decoctam cum malua erratica & foenugræco imposito. Eadem aqua fouebis, & his
 ominibus tritis, encatismatis impone. Ad intestinorum dolorem. Herba Ibiscus perinde ut su
 præ decocta cum singulis, sed ut encatisma postea esca. calida intestinum foues, tertio die sanabit. Id fumus
 experti

Nomina & uirtutes ippirionis. Cap. XXXIX.

nomina. A. GRAECIS dicitur Ippirion, Itali uerò æquiseiam uocant. *Ad dysentericos.*
us. Herba æquiseia succus ex uino dulci cyathis duobus potui datus, dysenteriam sanare creditur.
 His qui sanguinem euomunt. Herba æquiseia succum ex uino austerrimo sine fumo ieiuni bi
 bant, mox sanguinem restringet.

Nomina & uirtutes malua erratica. Cap. XL.

nomina. MALACHINAGRIAN Græci uocant, alij Aeleomalachen, alij Acopon, alij Collyris, alij
 Malachen, alij Helionstrophon; Itali Oxyriacam, alij Maluam rusticam, alij Ibiscum, alij Maluam erraticam.
 Nascitur ubique in locis cultis. *Ad uescicæ dolorem.*
us. Malua erraticæ cum rotis radicibus suis libram in congio aquæ coctam ad dimidium, per triduum ie
 iuno dato bibere, sanabis eum. *Ad neriurum dolorem.* Malua erratica pisata cum axungia ue
 tere, & imposita, neriurum dolorem mirifice sanat. Facit & ad omnia encatismata, decocta cū Ibi & fo
 nugræco. *Ad pleuretida.* Maluam erraticam decoques cum oleo, & postea defringes, & folia in
 mortario teres, & in pannum induces & impones, & triduo non solues: emendasti dolores.
 Ad uulnera recentia. Malua erraticæ radicem in cinere coctam contere & impone, sanabitur.

Nomina & uirtutes buglossæ. Cap. XLI.

nomina. B. VGLOSSON græce, Prophetæ Gonosæ luri, Osthane Tzanuchi, Aegyptij Antueorinbe
 Tos, Romani linguam bubulam, Lucani Carroga. Nascitur locis cultis & sabulosis.
us. *Ad tertianas siue quartanas.*
 Herba Buglossæ, hoc est Bouis linguæ, quæ treis thyrsos feminis mittit, radicem totam ex aqua de
 coctam, potui dabis, tertianæ medetur. Quæ autem quatuor thyrsos habet, faciet ad quartanas: dabis
 autem ut supra alia. Eadem herba similis ei est, quæ folia Lapathi fert, minuta eius radix potata ex aqua,
 ranis & serpentibus aduersatur. *Ad suspirationes.* Herba Buglossa ex melle & pane pisata, ui
 ce malagmatis mirifice rumpit. Hanc leges mense Iulio.

Nomina & uirtutes bulbi scillatici scillæ uæ. Cap. XLII.

nomina. A. GRAECIS dicitur Scilla, alijs Pancratios, alijs Typhonos. Aegyptij Sylitho, Prophetæ
 Optalmontiphonos, Itali Scillam rubram masculam, alij Bulbum scillitem, siue scilliticum appellant.
us. *Ad hydropisim.*
 Scillæ herba bulbus torretur, deinde circumpurgatur, & medium eius in aqua coniicitur, dum madidū
 fuerit, eximitur: & inde tres oboli potui dantur ex melle & aceto, & euacuatur per urinam.
Ad Perniones. Herba Scillæ quod est in medio eius, hoc est interius, cum oleo defuncto, at
 que ea quæ dolorem exhibent, perungito, sedabuntur. *Ad Panaritium.* Herba Scillæ radix pi
 tata cum aceto & pane imposito, panaritium mirifice sanat. *Ad extinguendam sitim hydropicorū,*
 siue dum sitiunt illi. Herba Scillæ folium subiectum linguæ, sitim compefcit. Legenda est ea om
 ni tempore.

Nomina & uirtutes cotyledi. Cap. XLIII.

nomina. GRAECI Cotyledon, alij Cepos Aphrodites, alij Gefomphalos, alij Stoechis, alij Stergethron;
 Itali umbilicū Veneris appellat. Nascitur in testis aut in monumētis. *Ad strumas discutiendas.*
 Cotyledon

Cotyledon herba pilata cum axungia suilla, foeminis sine sale, æquis ponderibus calida imposita, stru-
mas discutit. Leges eam hyemali tempore.

De herba Gallicura.

Cap. XLIII.

NASCI amat herba Gallicrus locis solidis & circa uias; eius cacumen instar pedis galli. Virtutes
habere dicitur, Ad canis morsum. Herbam Gallicrus tritam cum axungia, & pane domestico
imponas, mox sanabit. Ad duritias. Eadem sic (ut diximus) parata, duritias discutit.

Nomina & virtutes præstij seu marribus. Cap. XLV.

GRAECORVM quidam Prasion, alij Eupatorium, alij Philophares; Aegyptij Afterlope; pro-
phetæ Hæma tauri, alij Aphedros, alij Gonos Hori; Itali Marrubium, alij Mellirenam siue Mellicam, Ve-
ceriam; alij Chamele podium, alij Nosprason dicunt. Ad grauem tussim.

Herbam Marrubium coques ex aqua, & dabis eis bibere qui grauer tussunt, sanabit mirifice.
Ad stomachi dolorem. Herba Marrubij succus potus, stomachi dolorem tollet: si febricitat, ex-
aqua potus, satisque eleuat se. Ad lumbricos. Herba Marrubij, Absinthij, & Lupinorum pa-
ria pondera in aqua mulsa cocta cum uino, bis aut ter in umbilico posita, necat lumbricos.

Ad condylomata. Herbam Marrubium combure, eiusque cinerem infrica, sanabit.
Veneno accepto pellendo. Si quis uenum sumpsit, herba Marrubij succum dabis ex uino ue-
teris, discutit nanque uenenum. Ad scabiem uel impetigines. Herba Marrubij decocti aqua
corpus lauato, scabiem discutit, & impetiginem tollit. Ad pulmonis extensionem.

Herbam Marrubium ex melle coctam sumat, mire curabitur. Ad omnem duritiam.
Herba Marrubium tusa cum axungia & imposita, mire sanat. Ad lassitudinem & languorem
ab opere contractum. Si quis ab opere lassus inciderit in languorem, & neruorum habuerit dolorem,
herba Marrubij succo cum oleo rosaceo permixto perunges eum, sine mora sanabitur.

Nomina & virtutes xiphij. Cap. XLVI.

GRAECORVM quidam Xiphion, alij Phasganon uocant; Itali Gladiolum dicunt.
Ad fistulas quæ in corpore nascuntur. Herba Xiphij radicis uncias sex, Amyli uncias sex, acetu-
cyathos duos, adipis uulpini uncias treis ex uino pilabis, in panno lines & impones, miraberis.
Ad capitis fracturam. Herba Xiphij superior pars sicca contrita æquis ponderibus, mixto uino, ca-
pitis ossa fracta extrahit: aut si quid in corpore suppuratum fuerit, uel si pedibus calcata sint ossa serpen-
tis, contra ea uenena efficax est.

Tam nomina quam virtutes callitrichi. Cap. XLVII.

GRAECI Callitrichon, iidem Adianton, iidem Polytrichon, iidem Trichomanes, iidem Tricho-
phytes, alij Selinophydon, alij Diphyes, alij Hippomanes: item Scolopendrium, Asplenon, Scolobrocus: alij
Amiantion; Latini Capillum Veneris, iidem herbam capillarem; Punici Nello essefede; Romani Saxi-
fragum. Nascitur in locis aquosis, uirgulis nigris, lenibus, cum splendore, bipalmis, folijs ut Coriandrum,
fossis in summate. Ad strumas uirginum. Herba Callitrichi pilata per se, & imposita, uirgi-
nibus strumas sanat. Ad capillos tingendos. Herba Callitrichi in oleo trita, capilli uncti in-
ficiuntur.

De Moly uirtute & præstantia. Cap. XLVIII.

MOLY, clarissima herbarum est, Homero teste, qui inuentionem eius Mercurio assignat, con-
traque eius succum beneficia demonstrat; radice rotunda nigraque, magnitudine cepis. Ad matricis
dolorem. Herba Moly confusa & imposita, dolorem matricis sedat.

Nomina & virtutes Heliotropij. Cap. XLIX.

GRAECIS dicitur Heliotropion & heliotrophon, quibusdam Heliuron, aliquibus Dialio,
alij Sesamon agrion, item Scorpiocton, item Heraclea; alij Sideritesin, alij Vra Scorpiu, Prophetæ Go-
nostchronu; Galli Hæmatites, Pythagoras Pareoron, Osthane Putagonon, Aegyptij Nisine, Itali Verta-
num, alij Mulcetram, alij Intybum syluaticum. Nomen accepit primo, quod æstiuo solstitio floreat, uel
quod folijs motibus folia conuertat. Sed & specie duplex: quarum altera maior, appellata est Scorpiuros,
à similitudine caudæ scorpionis: alia minor. Maior igitur nascitur in asperis locis, tenui radice, ex qua ra-
mulus quatuor aut quinque, atque ab ipsis plurimas furcas emittit, folijs Ocymo similibus, paulo maiori-
bus atque succulentis, & nigrioribus & asperis, cum flore in summate tenui, & uelut purpureo atque
uncato in similitudinem caudæ scorpionum. Minoris herba species similis est supradictæ. Nascitur lo-
cis concauiis, folijs rotundis, semine pendenti, in caudæ scorpionum similitudinem. Eius herba diuinæ ad

L. APVLEII MADAVRENSIS

Historia bella.
in nominis ra-
natales.
pro, pulvis /
Nis.
**Solis cursum floscellj se uertunt: & cum Sol occidit, flores se claudunt: rursus cum oritur, floscellj se aper-
 riunt. Nasci amat ubique, locis cultis mundis, & pratis. Facit ad remedia ista. Ad omne uenenum.**
Herbæ Heliotropij puluer mollissimus, aut succus eius cum uino uetere optimo potui datus, mirè ue-
nenum discutit. Ad luxationem. Herbæ Heliotropij folia contusa & apposita, efficaciter sanant.

De uirtutibus Cryas. *an cryas /* *Cap. L. uirtutibus Cryas.* *forma N*

regio.
forma.
Nis.
**NASCITVR Cryas in Lucania, marmoris albi colorem habens, quatuor rubicundis ornata
 cauliculis; has potentias habet. Ad Sciatricos. Herba Cryas contusa & imposita, sciatricos tertio
 die sanat: hæc quasi malagmatis genus imponatur. Ad omnes corporis dolores. Herbæ Cryadis
 radix pisata & imposita, omnes dolores sedat.**

Nomina & uirtutes Polytrichi. *Cap. L I.*

Nomina uirtutes.
**GRAECORVM alij Adiaton, alij Polytrichon, alij Trichomanes, alij Ebenotricō, alij Hopte-
 rin, Aegyptij Ethui, Rhomani Cincinalem, alij Terræ capillum, alij Supercilium terræ uocant. Nascitur
 in parietinis, & locis humorosis. Hæc etiam herba Callitrichos appellatur, de qua superius loquuti sumus,
 & quam antea posuimus. Ad coli dolorem. Herbæ Polytrichi, eius quæ habet ramu-
 los, quasi seta porcina, folia contrita cum piperis granis nouè, & seminis coriandri grana nouem simul cō-
 trita, cum uino optimo dabis bibere intranti in balneum: facit & ad capillos mulierum nutriendos.**

Nomina & uirtutes Asule. *Cap. L I I.*

Nomina.
**ASVLA, Græcè Molocheagra dicitur. Ad dysentericos. Herbæ Asule regiæ radix
 cum uino trita, potui datur dysentericis, statim sentient beneficium. Aduentris fluxum restringen-
 dam. Herbæ Asulæ regiæ semen mixtum cum aceto acerrimo potui datum, uentrem restringet.**

Nomina & uirtutes papaueris Syluestris. *Cap. L I I I.*

Nomina signa.
**GRAECIS Mecon ceratiris, alij Aphrodes, alij Heradion, alij Mecona agriā, alij Mecō Rheas,
 alij Anemone, & Enemion, alij Oxytonon, alij Prosopon, alij Lethe, alij Lethusa; Prophetæ, Basilice, Per-
 sephion appellat; Itali Papauer album, Papauer nigrum, Papauer agreste, Papauer syluaticum, &c.
 Māxw, Latini papauer dicunt. Eius alia est usualis, quæ etiam folliculosa uocatur, alia agrestis, & altera
 appellata. Succum quidem ex ipsa fluentem, Opium appellant, uel quæ facile florem dimittat. Alia xēpatis
 siue ἀργός. Est igitur usualis longioris capitis atque semine albo. Agrestis uerò, quæ Rheas appellatur,
 cum capite sessili, semine nigro. Alia aridior atque agrestior, cuius caput longius, flores rubri uel albi,
 semen fuluum, radix subalbida, longa, minimi digiti robore; colligitur tempore uerno. Cerastitis uerò na-
 scitur in litioribus, creto thyrso atque hirtis, folijs insectis, hirtis, albis, flore pallido, fructu sine semine
 paruo, uncata ut cornu, semine nigro, paruo, radice ualida, nigra, atque in superficie terre. Item Aphrodes,
 quæ appellatur Herachios, ex omni parte alba est; eius semen colligitur æstiuo tempore aridum.
 Ad Epiphoras oculorum. Herbæ papaueris succus uel cauliculus cū suo fructu oculis imponitur.
 Ad hemicranium uel capitis dolorem. Herbæ papaueris syluatici teres cum aceto & impones su-
 per frontem, sedabit dolorem. Ad somnum prouocandum. Herbæ papaueris syluatici succo
 in quem perungas, somnum ei cum sopore obijciat.**

Virtutes herbæ oenantes. *Cap. L I I I I.*

Vis.
**HERBAE Oenāthes radix in puluerem redacta, data ad stranguriam in nini cyathis duobus sum-
 mē facit. Aduersus tussim. Oenantes herbæ radicem dabis potui ut supra, tussim sedat.**

Nomina & uirtutes Narcissi. *Cap. L V.*

Nomina uirtutes.
**NARCISSVS a Græcis dicitur Anhydros, Autogenes, bolbos, Emeticos; Aegyptij Emptone,
 Prophetæ Cynoglossa; Itali Bulbum uomitorium uocauerunt. Nascitur thyrso bipalmi, folijs porri simi-
 libus, sed paulo breuioribus, flore interius albo, croceo, uel in aliquibus purpureo. fructus sine semine ut
 in membranula nigra, in magnitudine bulbi. Ad uulnera, quæ ex se nascuntur. Herbæ narcissi
 radix contusa cum oleo & farina, uice cataplasmatismis imponitur uulneri, & sanat mirifice.**

Nomina & uirtutes splenij ac sauerie. *Cap. L V I.*

**AGRAECIS dicitur Lonchitis, alijs Hermionion, alijs Scolopendriion, alijs Phrygia, alijs Phry-
 gitis,**

gitis, alijs Philtradotis, alijs Aturion; Prophetæ Hamagales. ^{Lonchitis} Lonchitis folia habet rubra, flores nigros, comoda multis huiusmodi, semen siue fructum album, radicem latam, lanceæ similem. Alijs uirtutibus traditur etiam alia Lonchitis, similis scolopendriæ, cum aceto spleneticos in potu dara.

Ad splenis dolorem. Herbarum Splenion radicem in puluerem mollissimum redactam uino leniore potui dato, summam rem experieris: constatque eam sic esse inuentam, cum extra super eam essent proiecta adhæsisse leni, eumque exinanisse. Propter hoc à quibusdam Splenion uocatur. Narrantur fides, qui radicem eius sumplerint, sine splene inueniri. Quidam eam dicunt ramis hyssopi fasciculosam; folia fabæ eodem nomine appellantur. Legunt autem eam dum florere, maximè ex Ciliciæ & Persidis montibus laudant.

Nomina & uirtutes Polij. Cap. LVII.

GRAECI quidam Polion, alijs Phuxalpidion, alijs Achamenis, alijs Ebenitis, alijs Melosmon, alijs Belion, alijs Leontocharon uocant; Aegyptij Cathotis, Latini Conula, Martialis Polium, Neptunia. Duceius sunt species: alia est fructuosa, atque inuitilis: altera syluestris, frutice bipalmi albo, folijs renuibus, semine pleno, cum capitello in summitate pariuolo, crinoso ueluti canam capillaturam, frangenti odoris grauiusculi, cum quadam iucunditate. Nascitur locis asperis.

Ad lunaticos. Polij herbarum succum commisceas cum aceto & oscillante, & perunges eos, curabuntur. **Item pilulam eius & radicem linteo mundo, circa collum eius qui patitur, ligabis, experta est res.**

Nomina & uirtutes Victoriz. Cap. LVIII.

EVPEPLIOS Græci, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetalon, Diglosson, Daphne Samothracia, Daphne Alexandrina, Daphne Minthos, Danae, Stephane Alexandru, Camadaphne, Carpophyllon, Daphnitis. Latini Peruincam, uictoriae folium, Laurum Alexandrinum, Macedonica, Lauraginem, Murellaginem terrestrem uocant. Frutex eius sæpius cubitalis, folijs ut muria paulo maioribus, atque tenebrioribus, & non in fractis gustu remordentibus & incendiis. His prædita est uirtutibus.

Ad phlegmata incidenda.

Herbarum Victoriz succi cyathos duos dabis cum melle bibere ieiuno, mox phlegmata intercidet.

Nomina & uirtutes Consolida maioris. Cap. LIX.

GRAECI Xylophyrion, Symphyton, Anazethesis, Democritus Hamestriasis, Latini Consolida, Emula rustica, Atium Gallicum. Nascitur in petrosis, lignosisque locis, incundi odoris, saluam prouocans, ramis origano & capitelli thymi similibus, radice longa fulua, in robore digitali, sed appellatur etiam picnis, thyrsium bicubitalem genicularum inanem, in quo folia hirta, angusta & ueluti longa, cum adnationibus secundum genicula, flore nigro, fructu siue semine floceorum corticis simili, pruritum mouens, radices exterius argillosas, uirtutis densabilis.

Ad profluuium mulierum.

Herbarum Consolida puluerem mollissime contritum potui dabis in uino, restringet.

Ad conuulsos uel intus ruptos. Herbarum Consolida radices cinerem tepidum coquito, & ex melle ieiuno dabis ut edat, sanabitur, & thoracem purgabit.

Ad stomachi dolorem.

Herbam Consolidam si cum Oxygalo edat, magnum beneficium sentiet. **Contra tussim.**

Herbarum Symphyti radices in caldaria decoques cum melle, & pipere, & castoreo ad quartas, & in uino ueteri ieiuno dato in potu. Hæc herba hoc augmentum habet, ut carne bubula concisa, & in cacabum emissa, eius radices, si miseris drachmas duas, cocta caro in unum coharebit.

Nomina & uirtutes Asterij. Cap. LX.

GRAECORVM alijs Asterion, alijs Asterisco, alijs Aster, quidam Bubonion, alijs Hyophthalmion uocant. Latini Inguinalis, Punji Terdum. Herba est lignosa habens uirgas, & florem in summitate nigrum, tanquam Anthemidis herbarum capitam. Ambitum foliolis stellæ similibus, sed in thyrso folia longiora atque hirta, uel crassiora, & est laxatiua uirtutis. Nascitur ubique inter petras & loca aspera. Hæc herba noctu tanquam stella in coelo lucet: & qui uiderit ignorans, dicit phantasmata se uidere, & metu plenus irridetur à pastoribus pecorum. Adhibetur denique inguinum tumoribus.

Caduco laborantibus opitulatur.

Herbarum Asterij baccas si dederis manducare Luna decrecente cum erit signum Virginis, & ipsam herbam laborans habeat in collo suspensam, remediabitur.

Nomina & uirtutes Lagopus, hoc est pedis leporis. Cap. LXI.

LAGOPVS Græcis à similitudine pedis leporini dicta est. Romani pedem leporis appellant. Nascitur in pratis.

Fluori uentris compescendo.

Herba Lagopus cum uino potui data, uentris fluori medetur.

L. APVLEII MADAVRENSIS

Ad uentrem soluendum.

Herba pesleporis (item benedicta) perficata, in puluere redacta, da in potione uini, si sine febre fuerit: si autem febricitat, in aqua calida dabis, mox uentrem soluet.

Nomina & uirtutes Dictamni.

Cap. LXII.

A GRAECIS Artemedion appellatur, alij Creticen, alij Ephimeron, alij Eldiam, alij Belotiacon, alij Belotocon, alij Doradion, alij Elbunion. Itali Vstilago rustica, alij Labrum Veneris; Aegyptij Emenypse & Diplosos. Nascitur in insula Creta, & in monte Ida, folijs similibus papaueri, sed paulo maioribus, atque flaccosis uel lanuginis adnationibus, & neque florem generans, neque fructum. Item alia huic similis, quae appellata est Pseudodictamnium. Nascitur plurimis in terris, similis acrimoniae Dictamni. Memoratur etiam tertia species apud Cretam Dictamni, cum folijs similibus Sisymbrij, maioribus ramis & flore nigro & molli, similis uirtute Pseudodictamni. Harum denique multo efficacior est prima.

Habuerit si qua mulier in utero pecus mortuum.

Dictamni herbae succum, si sine febre fuerit, cum uino dabis: si autem febricitat, cum aqua calida: mox eijciat pecus sine periculo. Ad plagas siue a serpentibus, siue a ferro, siue a fide impactas.

Herbae Dictamni succum in plagam infundet, & aliquid biber, & mox sanus erit. Ad serpentium autem morsum, succum eius in uino bibat, & mox discutit uenenum.

His qui uenenum sumperint. Bon. Herbae Dictamni succi cum uino in potu heminam sumat: nam tanta uis est eius Dictamni, ut non solum interficiat ubicunque fuerint serpentes praesentia sui: sed & si odor eius a uento sublati fuerit, ubicunque eas tetigerit, mox occidet. Fertur & hoc exemplum: Si capra in uenatione telo percussa fuerit, cum peruenit ad herbam Dictamnium, & mox ea pascatur, telum a se eijciat, & plaga sanatur pascendo Dictamnium. Ad uulnera recentia. Herba Dictamnium & Agrimoniam & Ambrosiam contritas, cum butyro plagae imposito, miraberis in omnibus Dictamni effectum. Ad ulcera & nomas.

Herba Dictamnus imposita, ulcera & putres nomas & purgare, & explere dicitur.

Nomina & uirtutes Solaginis maioris.

Cap. LXIII.

SOLAGINEM Graeci Helioscorpion & Heliostraphon appellant, & caetera ut supra.

Ad serpentium morsus & scorpionum ictus.

SOLAGO herba maior siccata, & in puluere mollissimum redacta, in uino potui datur, & ipsa contusa plagae imponitur.

De Solagine minore.

Cap. LXIII.

HERBAM Solaginem minorem, alij Heliotropion appellant. Nascitur locis concauis, folijs rotundis, semine pendenti in Agrio cardami similitudinem. Virtutes habet lumbricis latis atque rotundis perimendis & excludendis. Lumbricis excludendis. Solaginis herbae decoctio potui datur ex aqua cum cardamo atque hyssopo & nitro ad excludendos lumbricos latis siue rotundos.

Ad lumbricos necandos. Herba Solago minor siccata, & in puluerem redacta, in aqua calida potui data, lumbricos occidet.

Nomina & uirtutes Paeoniae.

Cap. LXV.

PAEONIA a Graecis appellatur Penterobon, alijs Glycyfide, alijs Aglaophotis, alijs Pzonion: alij Selenion, alij Mencon, alij Pantheceatos, alij Selenogonon, alij Dicomeneon, alij Gludim; Itali Pzoniam, alij rosam fatuinam uocant. Pzonia porro auctoris nomen retinet. Nascitur in Creta, quam Homerus sacer auctor libris suis inseruit. Inuenitur saepe a pastoribus hac in extrema facula, habet magnitudinem, quae noctu quasi lucerna lucet, & est granum eius cocto simile. Ad Sciaticos.

Paeoniae herbae radice partem alligabis ei qui patitur, & circumcinges, res est saluberrima. Ad Lunaticos. Herba Paeonia si lunatica iacenti imposita fuerit, statim se leuat uelanus. Vel eandem secum habuerit, nunquam ei hoc mali accidet.

Nomina & uirtutes Peristerei.

Cap. LXVI.

GRAECI Peristereon Orthos, alij Trigonon, alij Bunion, alij Hierobotanon, alij Philtrodoten, Aegyptij Thiophenges, Prophetae Herasdacryon, alij Hamagales, alij Hama Hermu; Itali Cristam gallicam, alij Columbinam, alij Feriam, Punici Zimicum, alij Exuperam, alij Matricalem, Herculianam, Azirgozol uocauerunt, atque Peristereo herba siue redacta siue supina. Nascuntur ubique in planis & aquis locis, radice simplici atque thyrso. Sunt autem ex columbis esca iucunda, unde & hoc nomen habent.

Ad omnia uenena.

Peristereo puluer si cui in potu datus fuerit, omnia uenena discutit.

Nomina & uirtutes Bryoniae.

Cap. LXVII.

GRAECI Bryoniam, Chelidonium, & Melothron & Arthezostin, siue Apiastellum; Itali uiam taminiam,

DE VIRTUTIBVS HERBARVM HIST.

218

raminiam, Vitam albam, Agrifolium, Dentariam: Aegyptij Thodona, Gardiada, Syri Hugadeffi, Di-
nupula, Daçi, Dochlea appellauere. Virgultis atque folijs & corymbis, ut uitis nostra, sed omnibus hirtis,
quæ se colligit uicinis fruticibus, fructu siue semine botruoso, longo, raro, filuo, quo etiam tergora depi-
lantur, thyrsos emittens prima informatione & e radice, qui sunt asparagis similes,
Spleni sanando uirtutem habet: Herba Bryonia in cibo data lienosis, per urinam lien digeritur, &
emendatur. Hæc herba tam laudabilis est, ut in theriacas etiam potiones mittatur.

Nomina & uirtutes Nymphaeae. Cap. LXVIII.

N Y M P H E A Græce Cacabon, Lothonietram, Rhopalon, alij Androgamos, alij Hydragodos,
 alij Heradeos; Latini Matrem Herculaniam, Algam palustrem, Papauer palustre, Clauum Veneris, Digi-
 tum Veneris dixerunt. Nascitur in aquis stantibus: Ita denique nomen sumpsit thyrsos nigro, lenis, folijs si-
 milibus herbæ cicoriz, aliqua ex parte superatibus, flore pallido, fructu siue semine lato, denso, atque gu-
 tu argilloso, radice stipidola, nigra & acerrima est. Præterea nascens Ompenjo tenus flumine, cuius flos
 niger est, radix alba & aspera.

Herbæ Nymphaeæ succus cum uino tritus in potu detur. Item radices eius rades, & dabis manducare
 dysenterico diebus decem, curabitur. Item si cum uino austero data fuerit, uentris cursum restringet.

De Crisio.

Cap. LXIX.

Herba Crisio thyrsos est bicubitali, Trigona inferius, summitate rotunda, cum thyrsiculis purpureis
 atque canescentibus folijs hirtis, radice, ut Andreas memorat, dolori medente. Ad faucium dolorem.
 Herbæ Crisio radicem si quis collo portauerit, fauces ei nunquam dolebunt.

Nomina & uirtutes herbæ Isatis. Cap. LXXX.

Cap. LXXX.

G R A E C I Isatis, Prophetæ Apisi, Romani Alutam appellauere. Ad serpentis morsum.
 Herbæ Isatis folium contritum in aqua, & in plaga positum, adiuuat, & dolorem tollet.

Nomina & uirtutes Herbæ Pastinacæ. Cap. LXXXI.

Cap. LXXXI.

A GRAECIS dicitur Agrios Staphylinos, alij Ceras: Alij Ydonaulion; Itali Pastinacam rus-
 ticam, erraticam, & syluaticam. Nascitur in locis saxosis & aggeribus. Alia est hortualis siue seminalis
 & uiribus imbecilla: Alia agrestis, quæ appellatur etiam à quibusdam Ceras, eo quod cornu fingat: habet
 comam ut foeniculus, thyrsus tenuem asperum, in quo umbraculum, & flores paruos tenues, quorum in
 medio croceum germen purpurei coloris, radicem bipalmen, robore digitali, odore iucundam.

Pro mulieribus quæ partu laborant, neque purgantur.

Herbam pastinacam syluaticam decoquant, & de aqua eius se fomentent, & sanabuntur.

Ad purgationem mulieris.

Herba pastinaca decocta, cum eadem aqua ubi cocta est comisce, & da

re bibere, purgabitur.

Nomina & uirtutes Perdicalis. Cap. LXXXII.

Cap. LXXXII.

HERBAM Perdicalis, Græci Luffimachion, Sidentin, Elefinen, Helxine, Parthenion dicunt;
 Latini Muralem & Parietariam, alij Oridanam, alij Victorianam appellant. Sed nomen sumpsit à perdi-
 calibus, siquidem ipse ea aluntur. Vocatur etiam Heraclia & Ion agrion, & Elitis, Elebatis, & Polyony-
 mos. Nascitur in turribus uel parietibus, habet thyrsos tenues fruticosos, rubros, in quibus semina aspera
 & folia Linozostis herbæ similia, rotundiora tamen atque hirsuta, & aspera qualitate remordentia atque
 coherrentia. Est enim, ut Græci aiunt, uirtutis stypticæ. Denique ad similes causas, ac similiter ut arno-
 glossos herba adhibetur. Ad podagram & chiragram.

Herba perdicalis coquitur in aqua, & eadem aqua fouebis pedes uel genua, deinde ipsam tusam cum
 axungia impones pedibus panno inductam, uel supra genua, sanabit mire. Nascitur parietibus aut mace-
 rijs, aut aggeribus.

Nomina & uirtutes Mercurialis. Cap. LXXXIII.

Cap. LXXXIII.

MERCVRIALIS à Græcorum alij Linozostis arren, alij Argyros, alij Artrilis, aliquibus
 Parthenion, quibusdam Clibadion, & Chrystitis, Arguminosque appellata est. Aegyptij Aphlopho, Pro-
 phetæ Hermu Bassilion, Itali Mercurialem. Frutex eius herbæ bipalmis, folijs Ocymi similibus, atque ra-
 mis inanibus, cum furcis plurimis atque densis: & est foemina maior quæ appellatur. Mas uero uocatur
 Mercurialis masc. siue Testiculata, & est minor atque rotunda, & ueluti testiculis binis paruis circa exor-
 dium ornata. Ad uentris duritiem.

Mercurialem herbam coques, & tritam ex passo dabis, statim detrahet, & stomachum purgabit. Sec-
 men quoque eius tritum ex passo datum, idem detrahet. Ad menstrua cienda.

APVLEII MADAVRENSIS

Mercurialis herba admota cum irino uel rosaceo oleo potui data, prouocat menstrua. Ad oculo
 num epiphoras. Mercurialis folia cum uino albo ueteri imponuntur. Si aqua in aures in-
 troierit. Mercurialis succus tepidus in aurem instillatus, mox liberabit.

Nomina & uirtutes herba radioli. Cap. LXXXIII.

HERBAM Radiolum alij Felicinam uocant, similis est Felici quæ forte in lapideis nascitur, uel in parietibus, habens in folijs singulis binos ordines punctorum aureorum. Ad capitis dolorem.
 Radiolo herba cõfusa, atque curiose depurgata, cum aceto scillitico usque adeo decocta, donec non pa-
 reat, perungito, capitis dolorem sedat. Ad aluum concitandum. Herbe Radioli radix euulsa, &
 cultro cortice depurgata, cum malua; & ita malua & ius earũ bibatur, sine labore uel aliquo remedio uentre
 deducit, & omnes ætus.

Nomina & uirtutes Asparagi agrestis. Cap. LXXXIV.

GRAECI Myacantha, alij Aranthillidam appellauere, alij Anaspargos, alij Sparagos agrios; La-
 tini Corrudam, alij Asparagum agreste, alij Sparagum rusticum, alij Sparagum nostrum. Ad uesci-
 dolorem siue tumorem. Herbe Asparagi agrestis radicem coque in aquæ sextario in pultario nouo
 ad quartas, & ieiunus, diebus septem laborans sumat in potu: plurimis diebus balneo utatur: in frigidam
 non descendat, neque frigidum bibat: mirifice experietur. Ad detium dolorem. Herbe Aspa-
 ragi succum in ore continere oportet. Herbe Asparagi radix cocta, trita utiliter imponitur.
 Herbe Asparagi radix trita cum uino potata, proficit. Si quis maleuolus deuotauerit hominem.
 Herbe Asparagi agrestis radice ficca cum aqua fontana delustrabis eum, & solutus erit.

Nomina & uirtutes Sabina. Cap. LXXXVI.

GRAECI eam Nerion dicunt, alij Arathy, alij Baryton; Itali herbam Sabinam atque Sauinam.
 Cupresso similis. Ad morbum regium siue auriginem. Herba Sabina cum melle & uino pota,
 auruginem discutit: cum uino trita, idem facit. Ad capitis dolorem. Herba Sabina diligenter tri-
 ta, cum aceto & oleo rosaceo mixta, capiti & temporibus illita, ualde prodest. Ad carbunculos.
 Herba Sabina carbunculis cum melle illinitur. Ad igne sacrum. Herba Sabina pariter cum
 melle illinitur.

Nomina & uirtutes Cynocephali, hoc est capiti siue Cerebri canis. Cap. LXXXVII.

GRAECI Cynocephalon dicunt, alij Antirion, alij Brucanon, alij Ameston, alij Brathin; Pro-
 phetæ Offreostaphæ, Itali Canis cerebrum appellant. Ad oculorum Epiphoras.
 Canis cerebri radicem cum aqua decoque, & de eadem aqua subinde oculos foueto, celeriter lenit.

Nomina & uirtutes herba Eruci, rubiue. Cap. LXXXVIII.

A' GRAECIS dicitur Batos siue Batofda; alij Cynosbatos, alij Syntrophyllon, alij Asyntro-
 phon; Prophetæ Hema Ibeos, & Hema Titanu; Itali Senticem, alij Rubum, alij Moram syluaticam, Daci
 Mantiam, Aegyptij Aemoos. Ad aurium dolorem. Eruci herbe teneri cymæ succus expres-
 sus tepidus, & instillatus, aurium dolore liberat, & per sanare eundem est certum.
 Ad hemorrhoidas restringendas. Eruci herbe teneri cymæ nouem, & muscæ syluaticæ cymæ tan-
 tundem, maligranati ficci cortices tres conteruntur in se, & in calida eorum sedes encathesina, & cum iam
 refrigerauerit, fomentabis tibi anum. hoc triduum facies, mirifice restringit & per sanat.
 Ad profluuium mulieris. Eruci cymas teneras ter septenas coque in aqua usque ad tertias, & tri-
 duo ieiuno in potu dabis, ita ut cotidie renoues potionē. Ad Cardiacos. Eruci folia per se tri-
 ta imponuntur mamille sinistre, & sic dolori resistunt. Aduersus gingiuarum & laborum uicia.
 Eruci herbe cauliculi teneri in uino decoquantur, & ipsum uinum in ore continetur.
 Vix remedium. Eruci herbe folia arefiant in umbra crematorum cinere in cochleario tacto re-
 filiet, presentaneum est. Ad uulnera recentia. Herbe Rubi aut flos aut mora imponitur, sine
 collectionis periculo sanat. Ad condylomata. Herba Rubus cum uino decoquitur ad tertias,
 eoque uino fouentur condylomata, & omnia uicia sedat. Contra serpentum & hominum morsus.
 Herbe mori folia recentia trita imponuntur.

Nomina & uirtutes herba Millefolij. Cap. LXXXIX.

A' GRAECIS dicitur Myriophyllon, & Chiliophyllon, alij Melophyllon, alij Stratioticon, alij
 Achilleon, alij Chrysites, alij Ambrosiam dixere; Itali Millefolium, alij Militarem, alij Supercilium Vene-
 ris, alij Acorum syluaticum; Galli Bellicocandium, alij Vigentiam, Daci Diodela. Nascitur in palustribus
 locis, thyrsi unius radice, molli, fuluo, ita coarctato atque elimato, ut manufactus uideatur, folijs forni-
 culi similibus. Hanc herbam Achilles inuenit, unde uulnera ferro facta sanabat, & ob id Achilles uo-
 catur.

DE VIRTUTIBVS HERBARVM HIST.

219

catur hac sanasse Telephum dicitur . Ad dentium dolorem . Millefolij herbe radicem ieiunus
manducet laborans dentibus . Ad vulnera ferro facta . Herba Millefolium cum axungia pisata
& imposita vulnere purgat & sanat . Ad tumores . Herbam Millefolium contritam cum buty-
ro tumoribus imposito . Ad dyfuriā hoc est urinz difficultatē . Herba Millefolij succus cum
aceto potus mirē prodest sanātque .

Nomina & virtutes Rutæ hortensis .

Cap. X C.

difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

Difficilis .

GRAECIS dicitur Peganos & Eriphion . Romani Rutam hortensem appellant . Nota qui-
dem hæc est omnibus herba : cuius est altera usualis altera agrestis atque virtutis acrioris sed utraq; fer-
rentissimæ comprobantur . Mutatur etiam nomina pro regionum varietate apud Cappadocas appella-
ta est Moier a quibusdam Armola a Bins Bessa . Memorant etiam in Macedonia appellari Mollicines
ab alijs Viperalem vocari eaque interfectibilis eorum cum probetur . Ad sanguinem fluentem e na-
ribus . Herba Ruta frequentius odorata sanguinem de naribus mirē restringet . Ad inflationes .
Herba Ruta hortensis paululum edito uel in portione sumito . Ad stomachi dolorem .
Herba Ruta semen cum sulphure uiuo & aceto ieiunus gustato . Ad inguinum dolorem .
Herba Ruta uiridis coquitur ex oleo deinde commiscetur cera eo ut ceroto in linteolo utendum .
Ad epiphoras oculorum . Herba Ruta cum polenta bene trita & imposita lenit epiphoras : nam
& radix cōtusa & illita eas emendat . Ad caliginem oculorum . Herba Ruta rorem matutinu
aut matutino madentes succos collectos in uasculo habeto & ex eo ungebis . Eadem & carbunculis ex
aceto tusa imponitur . Ad morsus canis rabidi . Herba Ruta pondus denariorum sex ex uiuo
bibitur . Plaga imponuntur Ruta folia trita cum melle sale & pice . Ad cardiacos .
Herba Ruta fasciculus cum rosaceo decoquitur adiecta aloes uncia & olei perunctio dolorem sistit .
Pro Lethargiis excitandis . Herba Ruta trita ex aceto infunditur fronti . Eadem ignem sacrum
ex aceto & oleo illita sanat . Ad oculorum aciem . Folia Ruta subinde manducet ieiunus
Herba Ruta cum uiuo contrita potui data antidotum est . Ad profinium mulieris .
Herbam Rutam circumscribe auro & argento & ebore & sublatam eam alligabis infra talem .
Si fluit semen . Herba Ruta manducatur ex uiuo cum liquamine . Ad capitis dolorem
Herba Ruta ex uiuo potuidatur & trita capiti instillatur cum aceto & oleo rosaceo .

Nomina & virtutes Mentastri .

Cap. X C I.

MENTASTRVM Græci Calaminthen alij Glechon agrion alij Hedyosmos alij Osmites
Bregiu Thesmu Osthanges Prophetæ Gonos Apollonos Itali Mentastrum uocant . Alij Neperā Hispa-
ni Creobula Galli Mentam . Huius species tres memorantur . Est enim syluestris folijs Ocimi similibus
atque subalbidis ramis caulicularis cum flore purpureo sed eius folia sunt odore pulegio similiter forma
ta sed maiora . Secunda species appellatur agreste pulegium quā specialiter Latini (ut supra diximus) Ne-
petam uocant cum folijs menthæ similibus longitudine à prædicta porrectionibus thyrsis atque ramis ma-
ioribus sed inferioribus effectū omnium aciora sunt folia gustu atque incendiosa . Ad aurium uitia
& dolorem . Mentastrum herba succus cum uiuo austero mixtus & in auriculam coniectus uermes na-
tos necare creditur . Ut scias in cuius stellæ tutela sis . Herbam Mentastrum tollis mundus in
lineteolo mundo habeto ut quando in pane cocto granum frumeti integrum inueneris quem simul cum
herba ponito & preceris septem stellas id est Solem Lunam Mercurium Iouem Venerem Saturnum
& sub puluino pone ut tibi per quietem ostendant in cuius stellæ tutela sis . Pro elephantiacis .
Herba Mentastrum folia frequenter manducato sanare certum est .

Nomina & virtutes Ebuli .

Cap. X C II.

EBVLVM Græci Chamæacten dicunt alij Chamæacen alij Moecola Phrodites alij Agrian
acten alij Eboiten Galli Ducone Daci Olima Itali Ebulum Ramis rotundis digitalibus terre prostratis
succo plenis folijs lenticularis fructu siue semine rotundo radice tenui . Ad calculos . Ebulum
herba tenerum cum folijs tritum ex uiuo potui datum calculos pellet . Ad colubri morsum .
Herbam Ebulum antequam succidas ter nouies dicis Omnia mala bestia canito atque ferro q̄ acutissi-
mo elima secundam terrē trifariam præcidito & id faciens de eo cogitato cui medeberis reuersus ita ne re-
spicias & ipsam herbam contrita opponito cōtinuō sanabitur . Ad Hydropicos . Herba Ebuli
radicis succus expressus cyathis quatuor ex uini sextario semis potui semel in die datus hydropicis uali-
dissime proderit per annum enim humor omnis detrahatur . Splenis dolori curando . Herba
Ebuli radicem siccata & in puluerem mollissimum redacta ex uini cyathis quatuor pulueris cochlea-
ria tria in limine stans bibat & Ebulum semper secum habeat sine ferro lectum .

Nomina & virtutes Pulegii .

Cap. X C III.

GRAECI Blechon alij Glechon alij Arsenachanthon alij Poludon ac Heniton Prophetæ Pan-
ta agathon Osthanges Dimoron Latini Pulegium . Quam uim Pulegium secum habeat multi
E iij

L. APVLEII MADAVRENSIS

ignorant. Duo enim genera sunt, masculum & foemina: masculum florem albu habet, foemina rubeum
sive purpureum: utrunque utile est & mirabile. Ceterum mirabile in se habent, cum maximis aestatis ca-
loribus floreant, cum fere alie herbae arescunt. Virtutis est acerrimae ac feruoris. Capiti ne noceat aestus,
Herbam Pulegium tecum aut super aurem, aut sub annulo portato, hoc & hyeme tota facies, nec gra-
uetudinem senties, nec perfrictionem. Ad infantium intestinorum dolorem.

Pulegium & cuminum tritum ex aqua super umbilicum posito, & continuo sanus fiet.
Contra nauseam stomachi. Pulegium tritum, uel in aqua maceratum, cum aceto potui dabis, nau-
seam stomachi sedat. Ad uentris pruriginem. Pulegium in aqua feruente maceratum tandiu,

donec bibi possit aqua, optimum est, & pruriginem sedat. Ad uentris dolorem.
Pulegium commanducatum, & in umbilico positum, religatum ne excidat, continuo dolorem discutit.

Tertianae curandae. Pulegij ramulos lana inuolutos odoret ante accessiorem: quod si quis coro-
nam Pulegij in capite habuerit, capitis dolorem sedat. Si infans in utero mulieris mortuus fuerit,

Pulegij codas treis recentes, quae adolent suauiter, tritas in uino ueteri optimo, quartario da, bibat.

Ne in nauis nauiseas, Pulegium & Absinthium simul tere ex oleo & aceto, nares frequenter frica.

Si mulier minus purgatur, Pulegij pon. semiun. in oxymelle cyathis duobus mane ieiuna bibat.

Si secundae a partu non sequuntur, Pulegij treis distingue codas, & in uino bono da, bibat.

Aduersus uesciz dolorem uel calculum. Pulegium in uini cyathis duobus bene contritum, ie-
iunus bibat, & continuo in folio descendat, intra paucos dies sanat, & calculus pellitur.

Si quis circa cor, uel pectore dolet, Pulegij & aceti cyathos duos ieiunus bibat.

Contra spasmus. Idem faciat si spasmus molestus fuerit. Si mulier obtineat,

Pulegium contritum, & in puluerem redactum, lana conuolutum subijciatur ab obstetrice.

Ad stomachi aut intestinorum inflationem. Pulegium ex aqua calida cotritum, uel ex uino, aut
per se dato, rem miraberis illico. Ad morbum articularum. Pulegium in oxymelle, quartario

uel cyathis tribus ieiuno da bibere, eijcet bilem & saniem albam: idem faciet ut facile respiret.

Splenis dolori medendo, Herbam Pulegium decoque ex aceto, & id acetum calida permixtu po-
tui dabis. Ceterum ne quid pulegij pregnantis dederis. Ad Sciam uel coxarum dolorem.

Herba Pulegio & pipere aequis ponderibus tritis in balneo perficabis ubi dolet.

Nomina & uirtutes Nepitae. Cap. XCIII.

GRAECI eam Mentham agrian, alij Menthamorinon, alij Diaulan, Prophetz Hama Ammo-
nos, alij Gonos Ammonos, Itali Nepitam montanam, siue syluestrem. Moribus serpentum curadis.

Herbae Nepitae montanae ex uino trita succus expressus, cum uino potui datur: cuius etiam folia con-
trita plagae utiliter imponuntur.

Nomina & uirtutes Peucedani. Cap. XCV.

A GRAECIS dicitur Peucedanon, quibusdam Lycis agnon, alijs Agriophyllon, Prophetz Aga-
thos Dæmon, Itali Pinastellum, alij Satanaram uocant. Thyrsus habet ut foeniculus, radicem magna

& nigram, grauissimi odoris, succo plenam, secundum ipsam, coronam densam, flore nigrum, pro tempon-
bus augetur, & propterea aliquado praefecta molli radice defluit, atque in umbra deponitur seruanda. Sole

nanque uires amittit; sed probatur melior esse flauus & feruens gustatu & odore grauis, ut in Sardinia &
Samothea gignitur. Ad serpentes fugandos.

Peucedanum herba ardet serpentes odore suo. Peucedanum item cum betonica & adipe ceruino aut
medulla aceto mixto, morui medetur. Contra Phrenitum, Herba Peucedanum cum aceto, ca-

piti infusa, summè facit.

Nomina & uirtutes Hinulae campanae. Cap. XCVI.

A GRAECIS dicitur Panax Chironia. Alij Centauriam, alij Panax Helenion, alij Helenam;
Itali Hinulam campanam appellant. Habet folia Amarathro similia, flores aurocos, radicem tenuem, non

altam, acerrimam gustu, medetur serpente uexatos. Ad uesciz dolorem.

Herba Hinula & Apij semē & Asparagi, & foeniculi quoque radices, in unum trita, & in tepida potui
data, efficaciter prodest. Remedium ad cruciatus dentium. Herbam Hinulam ieiunus comman-

ducat, dentes confirmat. Ad lumbricos, Herbae Hinulae folia ex uino trita, supra uentrem
ponuntur.

Nomina & uirtutes Cynoglossae. Cap. XCVII.

GRAECI Cynoglosson, alij Phrygian, alij Emionion, alij Splenion, alij Caballatio, alij Acolym-
bos, alij Scolymon, alij Pyrgys, alij Leucrion; Aegyptij Zenis, Itali Linguam caninam, alij linguam canis,

alij Sublabium, alij Linguam Macedonicam. Ad morsum serpentis,

Cynoglossa herba trita, & ex uino sumpta, prodest. Quartanae typo medicando,

Herba Cynoglossa, quae folia quatuor habet, pisata, & potui data ex aqua, liberat. Pro ijs qui mis-
nus audiunt. Herbae Cynoglossae succum ex passo & oleo tepesfacto in aurem stillato, mire sanat.

Nomina

Nomina & virtutes Saxifragae.

Cap. XCVIII.

A' GRAECIS dicitur Saxifragos, alij Adiantos, alij Scolopendriion, quibusdam Scolymos, nonnullis Scoliprochos, Asplenon, & Prochos agrios; Aegyptij Phepere; Itali saxifragam, alij uitem cam, alij Apruco, alij Lampago uocant. Nascitur in montibus, locis saxosis, uirgultis nigris, lenibus, cum splendore, bipalmis, ut coriandrum scissis in summitate. Calculosis amuletum praesentaneum. Saxifragam herbam contritam ex uino bibendum dato, febricitanti ex aqua calida: tam praesentis effectus ab expertis traditur, ut eodem die perfractis eiectionisque calculis, ad sanitatem perducatur.

Nomina & virtutes hederæ nigrae.

Cap. XCIX.

GRAECI eam dicunt Cissos Melas, alij Cissarion, Cissonecion, ue, alij Cryfometas, Galli Bolus ferron, Daci Arborriam, Itali Hederam nigram. Ad calculos pellendos.

Herbæ hederæ baccas aut septem aut undecim contritas, ex aqua potui sumptas, mire calculos in uescia congregatos frangere & extrahere per urinam, certum est. Ad capitis dolorem.

Herbæ hederæ cum oleo rosaceo & cum succo eius, mixto uino tempora uel frontem perfricabis, sedat dolorem. Ad splenis dolorem. Herbæ hederæ nigrae grana, primo III. secundo V. tertio VII. quarto VIII. quinto XI. sexto XIII. septimo XV. octauo XVII. nono XIX. decimo XXI. in uino bibuntur diurnis diebus, si febricitat in aqua calida, maximo auxilio lienosis auxiliatur.

Ad isphalangionum morsus, Herbæ hederæ radices succus bibatur: item ulceribus, hederæ ex uino decocta, utiliter imponitur. Ad nares graueolentes, Herbæ hederæ succus bene colatus in nares infunditur. Ad aurium uitia, & eis qui minus audiunt, Herbæ hederæ succus mundissimus cum uino stillatus medetur. Ne caput à sole doleat. Herbæ hederæ folia mollissimè trita in aceto & oleo rosaceo aduersus omnem capitis dolorem fronti illanitur.

Nomina & virtutes Serpylli.

Caput. C.

A' GRAECIS dicitur Herpyllos, alij zygis. Alij Polion, Aegyptij Meronopus, Itali Serpyllum, alij Cicer erraticum, alij Cicer rusticum: eius est alia hortualis siue uisualis, humi serpens cum folijs atque ramis Origanum similibus, albidioribus quidem, atque famulodorem fingentibus: alia agrestis, quæ etiam Zygis appellata est, non in solo serpens, sed directæ atque statim positione subrecta cum ramis tenuibus atque lignosis, longitudine bipalmi, & folijs paruis & angustis tanquam rutæ, sed paulò longioribus atque plenioribus & angustioribus. Floribus quoque omnibus in uirgis constitutis, in summitate purpureis, remordentibus linguam, odore iucundo, radice inutiles. Nascitur in petris. uehementior est autem nuba, quæ seminalis siue hortualis appellata est. Capitis dolori medendo.

Herbæ Serpylli succum cum oleo & sale fricto, & in puluerem redacto, omnibus permixtis caput perunctum sanatur: Item Serpyllum decoctum in aceto, tritum illinitur temporibus & fronti.

Ad combustum. Herbæ Serpylli furculi unciam, spumæ argenti uncias treis, rosam: hæc in mortario teres: ceræ puniceæ, adipis ursini & ceruini semilibram, simul decoques, colabis, & impones.

Nomina & virtutes Absinthij.

Cap. C I.

GRAECI Absinthion Bathypicrò cognominant, Romani Absinthium rusticum, Aegyptij Somi appellant. Est porro Absinthium omnibus cognitum; cuius probabilis generis est Ponticum, uirtutis acerrimæ, feruentis, & redarguentis amaræ. Nascitur locis cultis & montuosis & saxosis. Est præterea aliud Absinthium marinum, quod quidem Seriphium uocant: gignitur in Tauro monte & Cappadocia plurimum, & in Taphosiri Aegypti prouincia, tenuioris fructus ac seminis à supradicta & angustioribus folijs, neque tam amarum, sed odoris grauioris. Contra periculum fungorum.

Herbæ Absinthij succum ex aceto bibat, hoc serotinus uir cetenarius euasit, cum esset à fungis têtatus. Ad liuores tollendos. Herbam Absinthium in aqua decoctum, & inductum panno impone: si corpus tenerum fuerit, ex melle imposito. Lumbricis necandis.

Absinthij herbæ & Marrubij & Lupinorum paria pondera in aqua mulsa cocta, uel in uino austero bis aut ter in umbilico posita, necant lumbricos. Ad inguinum uel intertriginis molestias.

Herbæ Absinthij & marrubij furculum fumito, & in semicinctio tecum portato, sanaberis.

Nomina & virtutes Saluie.

Cap. C II.

Q. VIDA M Græcorum Cission, alij Eleliphacon, alij Phaenon, alij Bechion appellauerunt; Aegyptij Anusi, Itali Saluiam, alij Tussilaginem uocant. Eleliphacos agrestis, grauioris est odoris. V. uisualis uel ro, quæ est boni odoris ac lenioris, Saluia uocatur. Est igitur frutex siue farnærum longitudine porrectus, subalbidum, uirgis maioribus, folijs paulò asperis, odoris boni, & fructu siue semine in summitate ramorum, similior minor agresti. Nascitur asperis locis, & est uirtutis redarguentis cum acrimonia, quæ denique pro

E iiii

L. APVLEII MADAVRENSIS

Disamno saepe uenenum ejicit.

Contra ueretri pruriginem.

Herba Salvia decoquitur, & de ea aqua ueretrum inficitur.

Ad pruriginem circa anum.

Herba Salvia decoquitur, & de ea aqua inferiores partes fomentantur, & sedat pruriginem summe.

Nomina & uirtutes Coriandri.

Cap. CIII.

GRAECI Corion, Itali Coriandrum, Aegyptij Ocheon nominant. Notum quidem omnibus

vir. frigida uirtutis esse. Lumbicis purgandis.

Coriandrum coquitur ad tertias in oleo, & in caput mittatur. Mulier ut cito pariat.

+ Coriandri feminis grana XI. aut XIII. in linteolo mundo de tela alligato, puer aut puella uirgo ad femur sinistrum prope ingue teneat: & mox ut peractus fuerit partus, pueri remedium cito soluat, ne inreftina sequantur. Ad frigora & omnes febrium typos.

+ Herbam Coriandrum ubi mane uideris ad olitorem propositum, accedis ad eum, & proijcis denarium, & tollis fasciculum de Coriandro; sed noli nominare, & portes tecum usque dum hora suspecta ueniat. cum hora transierit, & nihil tibi prouenerit, sub sero proijcis illud post te, dum ambulas, & noli post te respicere, liberabis te.

Nomina & uirtutes Portulacae.

Cap. CIII.

A GRAECIS dicitur Andrachne. Alij Cappara, alij Andremas; Prophetæ Hama areos, Dani Lax, Aegyptij Mothmutim, Itali Portulacam, alij Pocastrum, alij Illecebram, nonnulli Amaranthos uocarunt. Notum est omnibus, Portulacam frigida uirtutis atque redarguentis esse.

Ad feminis immodicum profluium.

Portulaca herba sumpta, bene facit, & per se, & cum Oxygano.

Ad stomachi inflationem.

Portulaca herba purgat, & in aceto sumpta, mire inflationem tollit.

Nomina & uirtutes Cerefolij.

Cap. C.V.

GRAECI Paderota uocant, alij Boopes, alij Arctophyllon, Latini Cerefolium.

Ad stomachi dolorem.

Herba Cerefolij uiridis cymas treis colliges, & pulegium in liguo res, mellis cochlearium malaxes, ut ebulliat cum papauere uiridi, & induces stomacho.

Nomina & uirtutes Sisymbrij.

Cap. C.VI.

GRAECI Sisymbrium, alij Stephanon Aphrodites, alij Herpyllon mega, Latini Terralem Austeralem, ue, alij Mentham Veneriam appellant. Est quidem similis menthe, sed latioribus folijs atque odoris summi, & uirtutis feruentis.

Ad uescia dolorem & stranguriam.

Sisymbrij herba contriti excepto succo, scrupulos duos febricitanti ex aqua calida, non febricitanti ex uino potui dabis, mire remediaberis.

Nomina & uirtutes Olusatri.

Cap. CVII.

SMYRNION Graeci uocant, alij Hippofelinon, alij Selinon agrion, Itali Olusatum, Aegyptij Denterobon; Radice alba, stomacho commoda, non ualida, thyrso molli, cauo atque celfo, ueluti scitpturis notato, quas Graeci uocant, folijs latis atque rubris cum albis notis, semine longo, acutmulatur masticatione, atque odore aromata simulat. Ad uescia dolorem & stranguriam.

Herba Olusatum trita ex passo in potu sumpta, stranguriam potenter emendat.

Ad purgationem mulierum.

Herba Olusatri semen ex mulso potui dabis, foeminas purgat.

Nomina & uirtutes Lilij.

Cap. C.VIII.

GRAECI eam Crinon uocant, alij Lirion, Latini Lilium, alij Rosam Iunonis.

Ad percus-

sum serpentis,

Herba Lilij bulbum conterito, & in potu dabis, ipsum etiam bulbum tritum mor-

fui adponas, sanabitur.

Ad luxum.

Herba Lilij folia tusa & imposita, efficaciter sanant: & si tu

mor fuerit, sedat.

Species & uirtutes Tithymali.

Cap. CIX.

TITHYMALI species sunt septē, quarum alia masculum, sine Characias appellatur, uel Comites, aut Amydaloides, atque Cobios, Helioscopos, Meconitis, Alipos: Latini Lactucam marinam, Prophetæ Conos artos. Alia foemina, quam Myrtiten, uel Caryiten, Myrfiniten appellant; Romani Mutiliginem capraria. Tertia Paralios, siue Tithymalis, Paraplion, Mecon aut Meconiō. Quarta Helioscopios, Dentritic Tithymalis, Latine Cicer columbinū, & Caprago dicitur. Quinta Cyparissias. Sexta Dendroides. Septima Platyphyllus siue Persires. Prophetæ Asclepiu diadema. Latine Tritum appellatur.

Characias

DE VIRTUTIBVS HERBARVM HIST.

221

Characias igitur nascitur in collibus, uel montuosis locis, thyrsis ultra longitudinem cubitalem rubris, succi acrioris, atque albis folijs oliuæ similibus, paulo angustioribus, sed longioribus, coma in summitate sunt iuncti similes, uirgulis porrectis, in quibus ueluti cauliculi cum semine, radice longa. Succus eius potui datus duobus obolis, purgat phlegma bilemque: in posca uetrem soluit, in mulso uomitum mouet, emor- tuos dentes & exesos tollit. Foemina autem asperis nascitur locis, & alba est, folijs similibus myrti, paulo maioribus ac firmis, & acutis in summitate, spinosis uirgulis bipalmis, fructu siue semine nuci similis, quæ leniter arguat gustu, ac singulos per annos renascatur: eius succus plus est uomificus. Paratios na-

scitur circa mare, ramis bipalmis, rubris, quinis uel senis ab radice ueniētibus, in quibus folia parua, angusta & longa, cum capitulo in summitate denso paruo, in quo Eruo similis, sed uarium floribus albis ex toto, atque quinq; bipalmis, tenuibus, rubris, folijs portulacæ similibus, paulo tenuioribus, capitulo, anethi simi- lis, fructu siue semine uelut in folijs, coma quasi dei folis motibus uel circumflexionibus conuertat, uirtute prædictæ similis, sed paulo uehementiore. Cyparissias, thyrsis bipalmi, nigro ac subrubente, folijs præ- ni similibus, sed paulo longioribus. Dendrys nascitur in petris, latior ac rubrior prædictis ramis, folijs myrti tenuioribus similis, fructu siue semine ceu Characias. Platyphyllos similis est Verbasco for-

ma atque uirtute. Ad interiorum dolorem. Tithymali herbæ fruticem teres, & in uino cya- this duobus, ex eodem succo cochlearia duo dato ieiuno bibere, sanabitur. Ad uerruculas tollendas. Herbam Tithymalum lactem mixtum cum Batrachii herbæ succo, si in uerrucâ impo fuerit, tertio die sa- nabit. Ad fistulas. Herbe Tithymali succum cum uino mixtum superexprimito, deinde cere- ris fomentis obligato. Ad lentiginem, hoc est lepram, Tithymali herbæ flos cum resina deco- ctus illinitur.

Nomina & uirtutes Cardui syluatici. Cap. C X.

GRAECI Chrysiceptron, alij Ixian, alij Pancration, alij Chameleon, alij Gnidium coccum, alij Vlophonon, alij Cynomazon, alij Cynozolon, alij Ocimoides: Latinis Carduus uaria, Carduus lactes, Carduus nigra: alij Vernilago, Vstilago. Nascitur in pratis, & secus uias. Ad infirmitates stomachi. Herbe Cardui syluatici, quam habet in capite summo medullam uiridem dato ex Oxygano, edat. Ut occusus malos non timeas. Carduum herbam si Sole nouo fuerit Luna in Capricorno tollis, & quandiu tecum portaueris, nihil mali tibi occurrit.

Nomina & uirtutes Lupini. Cap. C X I.

A GRAECIS uocatur Thernos orinos, à Romanis Lupinum montanum. Nascitur fecus se- pes aut locis fabulosis. Ad lumbricos & tineas. Herbam lupinum montanum tere cum radice, & dato ex aceto cyathum unum bibere, sine mora eiiciet. Item infantium, cum absinthio tritum, umbilico imponitur.

Nomina & uirtutes Lathyridis. Cap. C X I I.

A GRAECIS dicitur Lathyrus, Coccus gñidios: Alij Chameleon, alij Eupolis, alij Epantemon, Itali Cicotatium, alij Lathyridem nuncuparunt. Nascitur locis cultis & fabulosis, thyrsis cubitali, roboris digitalis, cuius in summitate furcæ, atque folia longa, ut in aristolochia, semine in summitate ramorum tri- gono & rotundo, ut capparitis, in qua tria semina obrecta, folijs inuicem discreta, rotunda, & eruo maiora: quæ purgata, alba reperiuntur & dulcia. Ad duritiâ uentris. Herbe Lathyridis semen quod est granum, purgatum potui dabis in aqua calida, alium citat.

De uirtutibus Lactuce Leporina. Cap. C X I I I.

NASCITVR Lactuca leporina locis fabulosis. Lepus estate cum animo deficit estu, hac her- ba remediatur, ideo Lactuca leporina dicitur. Ad febricitantes. Lactuca leporina supponitur sub puluino nescienti, remediabitur. Si pili oculis obstant. Lactuca leporina pilos oculis obsta- tes summè relegat.

Nomina & uirtutes Cucumeris. Cap. C X I I I I.

GRAECI Elaterion, alij Licys agrios, alij Grynon, alij Bassis, alij Bubalion, alij Scorpion, alij Phe- rombron, alij Peucedanum, alij Notiô; Itali Cucumerem Anguinum & Cucumerem syluaticum; Prophe- te Nemaictinos, Punici Cussimezara. Nascitur locis arenosis, sed maritimis & calidis, folijs cucumeri usua- li similibus, cum uirgulis breuioribus, radice alba, magna, & fructu longitudine digitali, totus frutex ama- rissimus. Ad neruorum dolorem & podagram. Cucumeris syluatici radices coques ex oleo cibario pondo III. ad tertias, inde perunges eos, sanabuntur. Ad abortum. Herbe Cucumeris syluatici radices ad tertias in aqua coquantur, & inde se- sublaues. Si quis autem ieiunus, fructum eius ediderit, periclitabitur: ideoque quisque abstineat, ne- que manducet.

L. APVLEII MADAVRENSIS

Nomina & virtutes Cannabii. Cap. C X V.

Camabis diffusi

Dis. for. adit. Graec. Cannabion. Scholasticus trop. an. astringon. omni cannabion vocant.

CANNABIS alia est usualis, alia agrestis, quam nonnulli Hydrastinam, Itali **Terminalem** appellant, radice similis Altheae, quam nos **Ibiscum** appellamus. Nascitur locis asperis, & secus vias ac sepes.

Ad mammillarum dolorem.

Herbam Cannabem sylvaticam rufam, cum axungia imponat, discutiet tumorem: & si collectio fuerit, expurgat. **Frigore exustis.** Cannabis sylvaticae fructu tritum cum urticae semine subiges aceto, & eis impones.

De virtutibus Rutae montanae. Cap. C X V I.

Real agnion

nomina. locus.

GRAECI Peganon orion, Itali Rutam montanam vocant. Ceterum titulum quare supra in Ruta hortensi. Nascitur in montibus locis asperis. Ad caliginem oculorum & ulcera.

Si dicitur. Cannabion. Scholasticus trop. an. astringon. omni cannabion vocant.

Herbae Rutae montanae rosida folia decocta in uasculo vitreo mittes, vinum uetus admisce, & sic inunges. Ad praecordiorum dolorem. Rutam sylvaticam contunde in uase ligneo, deinde adde tribus digitis, quod prendere poteris, mitte in calicem, & vini cyathum unum & aquae calidae cyathos duos, da bibat, & contineat se in lecto modicum, mox sanus erit. Ad hepatis dolorem. Rutae sylvaticae manipulum in olla noua & aquae heminas treis, mellis tantundem adijcito, exempta ruta, & fac inferue-

scat aqua cum melle, id per triduum facies bibere, & sic plures poteris sanare. Pro ijs qui micere non possunt, uel dysuriam patiuntur. Herbae Rutae sylvaticae cauliculos nouem conterito, additis aquae cyathis tribus, & aceti hemina, & subferueat, & dato bibendum dies continuo nouem, sanus fiet.

extenuatus a vino, & mebratus a fructu deducitur.

Si mulier intrinsecus aliquid mali habuerit. Rutae sylvaticae semen contritum, ex uino austero da bibat, praeter partum liberabitur. Ad extenuatos a uino. Rutae sylvaticae semen cum uino potum, mire facit. Scorpio si quem percusserit. Herbae Rutae sylvaticae semen contritum ex uino dabis potui, dolorem sedat.

Nomina & virtutes Heptaphylli. Cap. C X V I I.

nomina. locus.

GRAECI Heptaphyllon, Itali Septefolium dicunt. Nascitur locis cultis & fabulosis. Ad pedum dolorem. Herba Septefolium trita, cum luto mixta, pedes perunges, tertio die dolorem tollit.

De Ocymo eiusque virtutibus. Cap. C X V I I I.

Ocym. vis & natura.

OCYMMUM, est herba notissima, atque difficilis digestionis, & mutatione sui inflabilis, & uirtutis medicinalis. Capitis dolori medendo. Herba Ocymum tritum cum oleo roseo aut myrtino, uel aceto fronti imponitur. Epiphoris curandis. Idem ad epiphoras oculorum ex uino optimo tritum, oculis illinitur. Idem ad renes in malignanati corrice bibitur.

Nomina & virtutes Apii. Cap. C X I X.

nom. varia.

SELINON Graeci & Melissophyllon, Prophetae Hama areos, Romani Apium, omnibus notum est accerrimae uirtutis esse & medicinalis. Ad epiphoras oculorum. Herba Apio trito bene cum pane oculi teguntur.

Nomina & virtutes hederæ Chrysocanthos. Cap. C X X.

nomina. locus.

GRAECIS dicitur Cissos & Chrysocanthos sic appellata, quod grana aurei coloris ferat. Ad hydropicos sanandos. Herbae hederæ Chrysocanthos grana uiginti in uini sextario contrita, ex uino terni cyathi bibantur per dies septem, qui per urinam exinaniantur.

Nomina & virtutes Menthae. Cap. C X X I.

nomina. locus.

HEDYOSOMOS Graecis, Romanis Mentha dicitur. Ad ignem sacrum. Herbae Menthae succus expressus, adiecto sulphure & aceto, de pena inunctus, sine mora dolorem sedat. Viceribus in capite manantibus. Herba Mentha contrita, & impofita, ulcera siccant.

De Anetho. Cap. C X X I I.

nomina. locus.

ANETHVM herbam combure, & cinerem eius commisce cum melle, dein uulnus fouet ex aqua, dein ex myrtino calida laua, & sic medicamen impone. Loci mulierum si dolent. Herbae Anethi medicamine supra scripto pelium factum iniiciatur ab obsterice. Ad capitis dolorem. Anethi florem cum oleo decoque, temporibus illinito & alligato.

no. d. anetho, peligida, ali. amictos: gonor. gynocephali, fuchos gynocephali, gonor. fherma.

no. d. anetho, peligida, ali. amictos: gonor. gynocephali, fuchos gynocephali, gonor. fherma.

Nomina & virtutes Origani.

Cap. CXXIII.

ORIGANON à Græcis Heracleoticon, Onitis, Asclepion, Panaces, Conila appellatur. Latini *Cunilam Gallicam* & *Origanum* nominant. Tussi medendo. Herbam *Origanum* commandu-
cet miraberis effectum. *Origanum* item herbam in puluerem mollissimè tritum, & melle ad tertias deco-
ctum, misce puluerem & figurabis troiscos, & bibat in aqua calida.

Nomina & virtutes Semperuiue.

Cap. CXXIII.

GRAECI Aizoon, alij Aithales, Latini *Semper floridum* & *Semperuium*, siue *Vitale* nomi-
nant. *Semperuiue* nomen sumpsit, quod sit semper uiridis. Ab aliquibus *Stergethron* uocatur, eò quod
amorifica iudicetur; unde & pro foribus à plurimis ponitur, ut pellat odia: etiam *Ambrosia* dicta, pro-
pter uinum lacrum: item *Euphthalmos*, *Zoophthalmos* appellata est, propter cymas: cubitales enim euo-
mit thyrso, robore digitali, linguam simulantem, folijs pinguibus, pollicis crassitudine, linguæ similibus in
summitate, inferior uero supinata; sed in capite præstricta, rotunditatem oculi simulantia. Nascitur in lo-
cis montuosis, in domibus etiam plurimi ferunt. Prouenit etiam parua in parietibus, petris, & sepulchris,
& locis umbrosis. Ad apostemata. Herbam *Semperuium* cum axungia & pane & coriandro
simul tritam, uice malagmatis impone. Ad hemitritum. Herbae *Semperuiui* folia quinque tri-
ta in aqua calida potui dentur.

Nomina & virtutes Foeniculi.

Cap. CXXV.

GRAECI Marathron, Latini *Foeniculum*, omnibus notum. Vinam mouet cito data, lac pro-
uocat. Ex eius thyrso siue folijs succus sole præficatus, acuit uisum. Præterea lemen eius ex uirore con-
stitutum cum suis uirgultis. Ad tussim. Herbae *Foeniculi* radicem tusam in mero ieiunus bibat
per dies nouem. Ad uescicæ dolorem. Herbae *Foeniculi* uiridis fascem, & apij uiridis radicem, aspa-
ragi agrestis radicem in pultarium nouum mittis & aquæ sextarium, ut simul ferueant ad quartas, & ie-
iunus bibat per dies septem, uel pluribus, balneo utetur, in recentem non descendat, frigidum non bibat,
uesicæ dolorem sedat sine mora.

De Erythio.

Cap. CXXVI.

ITALI hanc herbam *Rutam* agrestem indigitant. Nascitur in Gallia in monte *Soracti*, figuram
habet Apij, florem habet purpuræ similem. Nasturtium septem radicibus totidemque ramulis: ipsa au-
tem patula humo asperis minimisque irriguis, omni florens tempore, semen habet tanquam faba.
Phthificis curandis.

Herba *Erythion* pilata, malagmatis instar imposita sanat; succi eius potui dati, miraberis uirtutem.

Nomina & virtutes Symphyti.

Cap. CXXVII.

A GRAECIS *Symphyton*, & *Xylophoron*, *Anachallis*, & *Nemostasis* dicitur. Latini *Con-*
feruam, *Hinulam rusticam* uocant. Ad profluium mulieris album. Herba *Symphytum* sicca-
ta, pilata, & in puluerem mollissimum redacta, in uino potui datur, & mox restringet.

Nomina & virtutes Petroselin.

Cap. CXXVIII.

GRAECI *Petroselinon*, alij *Smyrnion*, Itali *Apium syluaticum*. Nascitur in petris: sed est sum-
mum, ac probabile *Macedonicum*, odoris boni, hoc est aromatici, sapor dulce, urinam moues, medetur uen-
tositati stomacho & colo, & his similibus. Ad serpentium morsus. Herbae *Petroselin* puluere
mollissimum pondere drachmæ unius ex uino potui dabis, & ipsa contrita plagæ imponetur.
Ad neruorum dolorem. Herba *Petroselinum* trita, & imposita, neruorum dolorem sedat.

Nomina & virtutes Brassicæ syluaticæ.

Cap. CXXIX.

GRAECI *Cramben*, alij *Cynanchon*, alij *Cynanchen* nuncupant: Itali *Brassicam rusticam*, &
Brassicam aliqui *caninam*, *Punici Butzrutum*. Ad tumores quosunque. Herbae *Brassicæ* sylua-
ticæ cinerem cum axungia ueteri pilata comixtum, quasi malagma inducis linteolo grosso, & in aluta im-
ponis. Ad lateris dolorem. Herbam *Brassicam* syluaticam imponis, ut supra. Ad podagrâ.
Brassicam conficies ut supra: quod si uetustissimum fuerit, eò magis efficacius erit.

Nomina & virtutes Basilicæ.

Cap. CXXX.

BASILICAM Græci, Itali *Regiam* nuncupant. Hec herba illis locis nascitur, ubi fuerit ser-
pens basiliscus. Non enim unum genus est eorum, sed genera sunt tria: Vnus enim est *holochrysus*:

DE BETONICA

alio stellatus, capite aureo: tertius sanguineus, ut minium, & ipse capite aureo. Hos omnes hanc herba Basilica obtinet facile, si quis eam secum portauerit: sed nec mala ei nocere possunt. Holochochrysus autem qui dicitur Chryseos, quod uiderit, insufflat, & incendit: stellatus autem qui est Chrysocephalos Asteris, hic quod uiderit, arescit, & occidit: tertius autem qui est Hematites, & Chrysocephalos, quod uiderit uel percusserit, defluet. Uti ossa per se remaneant. Omnes uolentias eorum herba Regula obtinet, si quis homo eam secum habuerit, ab omnibus serpentium generibus erit tutus. Est autem herba similis ruta, lactem habens aurosum, similem Chelidoniae, flore autem chrysocecum. Qui eam leget, mundus circumscribat eam auro & argento, cornu ceruino, ebore, dente aprino, cornu taurino, & fruges mellis, totos in uestigio ponet. Hac utebatur imperator Augustus. Stomachi ea dolorem compefcit, neque rectoris, aut splenis, renum, cordis doloribus obnoxius fuit: neque scia, neque spasmus, aut tussis, aut coli dolor, neque hydrops eum tentabit: suspirium, pectoris dolores & lateris sedat, spissos humores per urinam deducit, renes purgat, uenenis resistit, & breuiter, omni corpori, quod ea usum fuerit, sanitatem restituit.

F I N I S.

LIBELLVS VTELISSIMVS DE BETONICA

QVEM ANTONIO MVSÆ QVIDAM, NON NVLLI APV

LEIO ADSCRIBENDVM AVTVMANI.



BETONICA siue Britanica, Graeci Cestron, & Prioniten, iidem Pyrinem, iidem Adianthum, iidem Psychotrophron, item Thyarizan, Seropodion, & Pandiona appellauerunt: Prioniten herba nascitur in pratis & montuosis locis, & opacis circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes a maleficijs, periculis, ab iustis etiam & uisionibus metuendis tuetur ac defendit, & omni rei sancta est. Cestron uocatur & psychotrophron, siquidem frigidis reperitur in locis. Radicibus quidem tenuibus & rubicundis, thyrsi tenuiore, ultra cubitum, quadrangulo, folijs quercui similibus, boni odoris, semine in summitate thyrsi, spicato, modo thymbræ.

VIRTUTES BETONICAE.

Fracturis capitum sanandis.

HERBA Betonica confusa, & super capitis ictum posita, uulnus mira celeritate conglutinat, & sanat: Eoque efficacius, si ter die refectam, hoc est recentiore, frequenter impoſueris, donec sanescat. Eius potestas, tantum habere utilitatem, ut ossa quoque fracta consolidet, & ui sua extrahat.

Oculorum doloribus medendis. Betonice herbarum radices ex aqua ad tertias coquito, & ex ea aqua oculos foueto. Ipsam aut eius folia certa supra frontem & oculis imposito. Ad oculorum caligines.

Betonice drachmam unam, aque calide cyathos quatuor ieiunus bibat, deducit ad inferiorem partem cum sanguinem, qui caliginem oculorum fecerat. Ad oculos lachrymosos. Betonica manducata aciem oculorum clariorem facit. Item Betonice herbe trite paululum salis adiecto digitis duobus & pollice quantum tolli potuerit, sublatam formatam turundulam si naribus inferueris, idem efficit.

Aurium doloribus succurrendis. Herbe Betonice recentis folia, uel per se, aut in aqua madefacta, deinde adiecta rosa liquida tepescito, & in aures stillato, lanaque spissato, mire proficere creditur.

Ad dolorem dentium. Herbam Betonica ex uino ueteri & aceto ad tertias decoctam gargariza, dolorem dentium discutiet. Ad uomitus & suspiriosos. Herbe Betonice drachmam unam, & sumptis ex aqua tepida cyathis duobus, bibendum si dederis, iuuat. Idem suspiriosis prodesse creditur.

Phthificis, & eis qui purulentum egerunt, curandis. Betonice drachmas treis dato cum melle, & glutiat ieiunus, auxiliatur. Spleni curando. Betonice drachmas treis dato manducare per triduum, uel in aqua frigida cyathos dabis bibere. Betonice drachmas quatuor, aque calide cyathos quatuor da, ut bibat per triduum. Herbam Betonica ex uino decoctam, & potui datam, lienosis prodesse experti affirmant. Betonice drachme binæ ex mulso cyathis duobus, bibentem sanabunt.

Ad renes. Betonice drachmas treis ex uini ueteris cyathis tribus, piperis grana XXVII. contrita & calefacta ieiunus bibat. Ventris dolori medendo. Herbe Betonice drachmam unam in aqua calida cyathis duobus bibendam da. his autem duntaxat hæc apta erit compositio, quibus non ex cruditate intestina torquebuntur. Ad uentrem concitandum. Betonice drachmas quatuor, hydromellicos, octo dies bibendum dato, uentrem mouebit. Ad lumborum dolorem. Betonice drachmas tres ex uini Aminei cyathis tribus, piperis grana XVII. contrita & calefacta ieiunus bibat, curabitur.

Betonica ex mulso potui data, febrienti ex aqua calida, lumborum dolores sanare creditur.

Ad colum. Herba Betonica cum uino austero, eque proficit. Ad tussim. Herbe Betonice uncias duas ex melle accipiat per dies octo. Ad typum quotidianæ. Herbe Betonice drachmas duas, arnoglossæ unam ex aqua calida, cyathis quatuor bibendum sub accessione ministra.

Ad

Ad rypos tertianæ & quæ quartanæ. Herba Betonice drachmas treis, mellis Attici unciam, aquæ calidæ cyathos tres in unum miscebis, & ante accessionem potui dabis, mirè sanabitur. Ad neficè dolorem. Betonice drachmas quatuor, apij radices scrupulos treis decoquito; radices uero apij in aquæ sextario ad medium cum decoctæ fuerint, tum demum betonica admiscenda, potui exhibenda, dolorem ita exterminant, ut postliminio redeat nunquam. Ad calculum. Betonice drachmas treis ex aceto quam optime, & mellis & aquæ calidæ cyathos octo bibere confert. Hydropicis curandis, mulieribus item quæ partu laborant, necnon & ijs qui febricitant, Betonice drachma una ex aquæ calidæ cyatho uno pota medetur. Betonice item drachmæ duæ, aquæ calidæ cyathis quatuor, si sine febre fuerit: si cum illa, ex uini cyathis duobus ministra, fert opem. Ad paralyfum. Betonica trita, & imposita, neruos etiam præcisos glutinare, & per sanare creditur. Contra horrores. Betonice drachmæ duæ ex uino austerio, cyathis duobus. Item ex aquæ calidæ pari mensura sub accessione bibere dato. Pro mulierculis quibus loci frigore uexantur. Betonice drachmas tres ex aquæ calidæ totidem cyathis ieiunè per triduum bibere dato. Aduersus ebrietatem. Betonica si prius sumatur, ebrietas uinum non comitatur. Morbo regio curando. Herbam Betonice ex uino sæpius sumptam proficere piria didicimus. Carbunculo sanando. Betonica in aquæ calidæ cyathis duobus pota, carbunculo medetur. His qui perfrictionibus laborant, Betonica cum axugia trita, plage imposita, prodest utique. Lassæ ex itinere. Betonice unciam ex uini cyathis tribus triduo ex itinere lassus bibat. Aegris fastidientibus cibum, Betonice drachmas geminas ex aquæ mulse cyathis tribus potui dato. Ut facile quis decoquat. Betonice drachmas treis, mellis decocti unciam sumi solet, mel quo ad indurefcit, coquito, & aqua calida, cyathos duos potui dato. Pastillos quoque ex eo facere conuenit, & ex calida deglutire. Ad serpentium morsum. Betonice drachmas treis ex uini cyathis tribus diluito & potui dato, omnium quippe serpentium morsus sanat. Betonice quoque uini nigri cyathis tribus conterito, & uulneri illinito. Venenis datis expellendis. Betonice drachmæ tres statim potæ, uenenum discutunt. Ad morsus rabidi canis. Betonica contrita, & contusa, morui imponitur. Ad fistulas. Ex Betonica contusa & cõtrita tunindulas facito, & pusillum salis inferito, fistulâ obligato, expurgat. Podagræ fugandæ. Betonice radices cum folijs costas ad tertias, in aqua potas: ipsam quoque per se tritam, & applicatam, mirè dolorem podagræ lenire, experti affirmant. Ad purgationes. Betonice drachma purgationes herentes in uino expellit.

LIBELLI DE BETONICA FINIS.

Nancelius Leston S.

Apuleius Madagrens, vir in philosophia acutus, in antiques cultor, latini idiomatis præcipue affector, ut si quis autem, eius libellus studiosus, inter reliqua opera, hoc de re herbaria opus conspexit, manum sane & mops, & plurimis paucula colligens; ac uelut ex fonte Hesperidum, aliquot strophos in corollam aut festulum legens. Quo in opere laudem Comis debet industria, in copiosa nomina omni generum synonyma peruestiganda: nam quicquid præberi iust præterea, vel in descriptione verborum, vel virtutis earundem amplitudine, id totum Dioscoridi acceptum referre debet: præter admodum pauca & ex illis, tum etiam superstitiosa, ex arcana illa philosophiæ parte de prompta: quibus sola Comis auctoritas vix apud me fidelis præbebit. Ceterum & ipsi Dioscoridi turba innumera uocum tum Grecarum, tum Latinarum, tum etiam peregrinarum accessit, quamquam minus modis deprauatarum; quæ se nihilominus in signatione reliquarum verborum & plantarum, non parum potuerunt adiuuare, si quando inter legendum (quod mihi sæpe contigit in his aliquot Latinorum auctorum corruptissimis operibus examinandis) inaudita quædam, & à communi usu aberrantia, occurrant: quo è fonte hæc etiam synonyma, magna ex parte fluxisse videntur. Quantum autem labori subieci in ijs omnibus emendandis, & nuda coniectura, sed non merulita tamen, opinor, restituendis (nam cum nullo alio exemplari, Deum testor, pueri vel minimè subleuatis, tantum opere insupersis) ijs hæc æstimandum relinquo, qui aliquando in re consimili periculum fecerunt: à quibus statim illud perij audiam, Et pluteum cedit, & demorsos aperit onguis.

Val: 8. Cal. Decembris. J. uxorij, 1575.

AE MILIUS MACER DE HER

BARVM VIRTUTIBVS, CVM IOANNIS

ATROCIANI COMMENTARIIS LONGE UTILISSIMIS

Nancehus. lecton 5.

Ad candidum Lectorem.



E HOC Macro (candide Lector) nihil certi auctores tradidere, nisi quod coniectura est, plures Macros extitisse. De quorum altero sic Volaterranus: Aemilius Macer, Veronensis Poeta, uolucres & herbarum cecinit uirtutes Ouidij tempore, ut ipse testatur.

Sepe suas uolucres legit mihi grandior equo

Quaeque nocet serpens, quae iuuat herba, Macer.

Sed & opus Homeri persequitur, quidquid apud Ilium actum, usque ad finem belli, ut adeo poeta testatur:

Tu canis eterno quidquid restabat Homero.

Ne careant summa Troica bella manu

Opus autem de herbis ad nostram usque peruenit etatem. Hec ille. De altero uero, Plinius

epist. lib. 5. in epistola, cuius initium, Pergarum est mihi, quod tam diligenter libros auunculi mei lecti

tas, ut habere omnes uelis, &c. Et in calce epistolae, Confido tamen inquit, haec quoque tibi non mi

nus grata, quam ipsos libros futura, quae te non tantum ad legendos eos, uerum etiam ad simile aliquid

elaborandum possunt emulationis stimulis excitare, haec Plin. Atque hunc Plinianum Macro huius ope


ris fuisse auctorem asseruerim, quod Plinius adhortatur illum ad simile quid elaborandum. Quod au

tem praesens opus non sit Macri illius Ouidiani, ex eo elucet, quod hic noster Plinium, multis seculis Ovi

dio iunior, plerisque in locis citat. //

AE MILII MACRI DE HERBARVM VIRTUTIBVS.

De Artemisia



HERBARVM uarias dicturus carmine uires, Herbarum matrem (dedit Artemisia nomen, Cui gratus sermo iustum puto ponere primo.) Huius opem fertur prior inuenisse Diana, Artemis graecae quae dicitur: indeq; nomen

Herba tenet, quia sic inuentrix dicitur eius.

Praecipue morbis muliebribus ipsa medetur.

Menstrua deducit, eius decoctio sumpta:

Hocq; facit, matris si sepe fouetur eadem,

Vel si cruda mero sociata reuendabibatur,

Aut si trita uirens super aluum nocte ligeretur.

Quae uel abhorruum potu, uel subdita tantum.

Duricias soluit steriles, pellitq; tumores.

Vrinam potata ciet, lapidesq; repellit.

Elericoq; iuuat, cum uino saepius hausta.

Hanc adipi iunctis instrumentis apponere, laudat

Plinius, atque iubet cum uino sumere, triplam

Hec, opum nimium si quinquam leseris haustum;

Subuenit eximie, si uino iuncta bibatur.

Affirmant etiam, quicquid gustauerit illam,

Quod nullo ualeat nocuo medicamine ladi

Et quod cum morsu non appetat ulla ferarum.

Radix illius collo suspensa, rubetis

Dicitur, & cunctis nocuis habessere uanis.

Succus ad hoc eius cum uino proderit haustus.

Si musto contrita recens seruebitur herba,

Vinum praedictis reddit medicabile morbis

Et sapor est & odor uino gratissimus illi:

Confortat stomachum, sanat praecordia: sumptum

Et multis alijs affirmant uile causis.

HERBARVM uarias.] Proponit, omissa inuocatione, quicunque tandem huius utilissimi operis

auctor, quid & qualiter dicturus, uarias herbarum uirtutes scilicet: non soluta oratione, hoc est prosa: sed

ligata, & numeris astricta, hoc est carmine: nec quolibet, sed hexametro tantum, in quo si quid contra uete

rum ac classicorum consuetudinem & auctoritatem, quod sit quidem rarissime, ponitur, studiosum lecto

rem minime celabimus. Sunt tamen ex tanto studiosorum numero admodum pauci, quibus curae sit syl

labarum discrimen, eandemque proba aut improba positio. Et cum totus orbis hodie refertus sit pre

ceptoribus, uix tamen unus aut alter reperitur, qui sciat discernere inter carmen & prosam. Olim mihi

quidam nondum agenti annum, persuadere uolebat, hymnos quos canit sacrosancta Dei ecclesia, oratio

nem esse solutam ac prosam: in quo uicisset ille, si ab incunabilis aliter sentire haud edoctus fuisset. Qua

le genus hominum, hoc est indoctum, & a multis prorsus alienum, non solum Macro huic, sed optimis

quibusque auctoribus multum nocuit, & multa fœda uulnera infixit. Opera tamen nostra pristinae sanitati

restitutus est Macer hic noster, quem & modo multo tutius legere possunt literatum candidati (quibus haec

qualiacunque commentariola scribimus) quam antea. Volentes scire, qui latine usus herbarum scripse

rint,

rint, & quando ad Romanos notitia eorum peruenit, & qui primi Græcorum de his composuerint, legant Plinium Natur. hist. lib. 21. Cap. 2. Herbarum matrem.] Artemisia dicit matrem, uel propter ipsius inuentricem Dianam, uel propter ipsius præstantē efficaciam: & Artemisiam græcè uocatam, ab Artemide hoc est Diana. Ponitur autem hæc Artemisia rixuosa, hoc est, ut quidam loquuntur, materialiter, & pro uoce tantum. Est autem, dedit Artemis. parenthesis, ut signatum cernis. Huius.] Artemisiz. Opè.] Sic etiam Gell. retulit Prior ad plures li. 14. ubi ait, Qui eorum prior alijs esset, ei potissimum senatus consulendi ius fuisse. Inuenisse.] Reperisse, quamuis hæc differam. Naso horum differentiam clarè expressit in Metamorphosi, hoc hemistichio, Non inuenta, reperta es. Diana.] Fuit hæc Iouis filia, & græcè ἄρtemis dicitur, hoc est, ærem uerberans: testis Macrobius Saturnal. lib. 7. cap. ultimo. Artemia Dianæ sacra uocantur, in quibus facies gestabantur: quod Cælius etiam libro Antiquarum lectionum adnotauit. Indeque nomen.] Hoc est à Diana, quæ græcè ἄρtemis dicitur, herba nomen habet Artemisia. Dissentiant auctores de inuentrice huius herbæ, quod docemur ex Plinio, qui li. Natural. hist. cap. 7. hæc scribit: Mulieres quoque hæc gloriam affectauere, in quibus Artemisia uxor Mausoli, adoptata herba, quæ antea Parthenis uocabatur. Sunt qui ab Artemide Artemisia cognominatam putent, quoniam priuatim medicum foeminarum malis. Putatur autem Artemisia eadem cum Ambrosia: genusque duplex illius asserit idem Plinius. Absinthij autē modo (inquit) fruticosa, maioribus folijs, pinguiusque. Ipsius duo generantur eodem nomine appellant, simplici caule, minimis folijs, flores copiosi erumpentes, cum uua maturi, odore non iniucundo, quam quidam botryn, alij Ambrosiam uocant. Artemisia etiam nomē opidi & insulæ, ut docet Plinius. Inuentrix.] Diana. Muliebribus.] Id est mulierum, quibus mulieres infestantur. Menstrua.] Hæc etiā muliebria rectè dixeris, ut in Genesios libro, cap. 18. Erant autem ambrosenes, prouectæque ætatis, & desiderant Saræ fieri muliebria. Sunt autem menstrua, mulierū profluvia singulis mensibus redeuntia. Hocque.] Hoc est, matricis etiam mala per illius concoctionem sumptā fugantur. Cruda.] Non cocta. Mero.] Vino. Nocte.] Quando ægrotans foemina cubitum abiit. Abortiuum.] Quod abortum, hoc est immaturum ortum facere potest. Subdita.] Supposita per suffumigationem. Stericas.] Hystericas ab hystera rectè dicitur, non stericas, ut enim uocant uterum, uulnam. Et mulieres ab utero suffocata, hystericæ dicuntur. Et ut pueri intelligant, hystera, quod Macer dicit, steram, est uas foetum conseruans. Insignis autem eius affectio est, ubi obdurefcit. Stericas ergo, id est hystericæ, hoc est uteri seu uulnæ. Ciet.] Mouet, & fluere facit. Lapides.] Calculis qui sunt in renibus, mediocriter opem ferunt artemisiz, inflammationibusque femorum. Ictericos.] Ictero morbo laborantes. Icterus, teut. Gelsucht. Hic uocatur etiam morbus regius, item aurugo, & inde homo auruginosus, qui patitur. Et appellatur argutus, à colore celestis arcus: nonnunquā demoniacus, & comitalis. Hystericis qui hoc malum habent, teut. Gelsuchtig. Strumis.] Struma gutturis uitium. Struma, inquit Celsus, quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex parte & sanguine, quasi glandulæ oriuntur. Quæ uel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturefcunt, siue ferro, siue medicamentis curantur. Pierunque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se reperisse, chirurgicus Meges auctor est. Opium.] Succus ex papauere, habens per forum nimis copiosus sumatur, morriferam. Affirmant etiam.] Artemisiam quoque secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, bestiam uel ullam, ne solem quidem. Bibitur & hæc ex uino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, pota uel aduersus ranas: auctor Plinius libro 25. capi. 10. Rubetis.] Ranas uenenosis. Iuuenalis, Porrectura uiro miscet sitiente rubetam. Stomachum.] Qui est rex totius corporis. Nec stomachus semper pro uentriculo apud scriptores accipitur, sed etiam pro gula ipsa, ut Galenus libro 13. Vitale.] Quod sit, si recens Artemisia contrita multo seruata fuerit, & tali uino erit sapor & odor gratissimus.

DE ABROTONO.

ERTIVS Abrotono legitur gradus esse caloris, Et desiccandi. semen feruentius herba est; Vnde inuac ueruos, ex causas pectoris omnes, Illu elini si su decoctio sumpta. Sic quoque dyspnoici prodest, ruffumq; repellit. Et prodest lumbis, sic uulnærumq; querelis. Omnibus his crudum cum uino proderit haustum. Vitis purgat, sic ex præcordia mundat: Sic schia sm curat, sic sumptum mensurus purgat. Serpentes midore fugat, bibicumq; uenena

illorum extinguit. sedat quoque frigora febris, Antea quam ueniant, si mixto sumitur amne: Aut oleo, quo decoquitur, si membra prurugas. Lumbricos uentris hanc sepe bibendo necabis. Huic panis micæ, ex mala cydonia iungens, Insimul amne coquas, oculorum cuncta dolores Apponas, uel feruori: curabis utrunque. Serpes infixos ex spina abstractet, ipsum Appositum per se, uel adeps si iungitur illi. Hæc etiam uenerem, puluino subdita tantum, Incinat, ex ueneri nocuis potata resistit.

ABROTONO.] Scribendum & legendum abrotonum, & non abrotanum, ut mendosi quidam codices habent. Græcè enim sic scribitur ἀβρότον, quam orthographiam diligenter seruata uidemus à

Artemisia, aut matrem
herbarum.
Ergo.

prior de pluribus.

inuenire, reperire.

Diana, Artemis, quasi
ἀρtemis rixuosa, hoc est,
ἀέρεα uerberans.

Artemia, uel potius sterica.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Dissimilis, & forma,
natura.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Artemisia uel dicitur
à quæ inuenta.

Ero benio in imprimenda Historia naturali. Et quis audet adferere, græcarum literarum peritiam non esse
nece sariam? Lucret. lib. 3. inflectit abrotonum in uirili sexu dicens, Abrotonique graues, & tristes centau-
rea. Serenus uero in neutro, cum ait, Pullegium, abrotonum, nitida cum mastice coctum: quod est nomen
herbz. Abrotonium uero, siue Abrotonia, nomen mulieris proprium. Gradus.] Totius caliditatis
quatuor ordines, quos gradus uocamus, instituit medicus, ut primus sensu uix omnino percipi queat, uel
certe non percipitur, sed considerantis tantum ratione perpendatur. Alter qui secundus iam sensu perci-
piatur. Alius qui tertius iam multum calefaciens, necdum tamen exurens gradus. post quem quartus ac-
ulimus uim habet exurendis. Tertius ergo gradus abrotono, hoc est multum calefaciens, non tamen exu-
rens. Desiccandi.] Habet enim uim desiccandi ac distrahendi. Feruentius.] Calidius: hoc est, se-
men magis calidum est, quam herba. Abrotonum duorum traditur generum, campestre ac montanum:
hoc foeminam, illud marem intelligi uolumus. Amaritudo absinthij in utroque; Siculum laudatissimum,
dein Galaticum. Vfus est & folijs, sed maior semine ad calefaciendum: ideo neruis urite, tussis, orthopnoicis,
commutis, ruptis, lumbis, urinae angustijs. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias par-
tes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen drachmaz pondere. Prodest & uuluz. Coquitur
panis cum farina hordeacea, & oculorum inflammationibus illinitur, cotoneo malo concocto. Serpentes
fugat. Contra ichus earum bibitur cum uino, illiniturque. Efficacissimum contra ea, quorum ueneno
tremores & frigus accidunt, ut scorpionum & phalangiorum, & contra uenena alia pota. Prodest & quo-
que modo algentibus, & ad extrahenda ea quae inhaerent corporibus. Pellit & interaneorum mala; ramo-
eius si subiiciatur puluino. Venerem stimulari aiunt; efficacissimamque esse herbam contra omnia uene-
ricia, quibus coitus inhibeat. hanc Plin. lib. 21. cap. 21. Neros.] Hos Aristoteles in corde ortum habe-
re tradit: quem ut in alijs, ita etiam in hoc Albertus sequitur. Galenus his contrarium scribens, neruos pri-
mo Canonis a cerebro oriri asserit. Neruum, appellamus etiam uinculum ferreum, quo pedes impediun-
tur, quanquam Plautus eo etiam ceruices uinciri ait, perfidiose captus, eo & de pol neruo ceruices probat.
auctor Sex. Pompeius. Pectoris.] Pectus dicitur anterior pars animalis a gula usque ad uentrem, hoc bo-
mini tantum, ut Plin. ait, latum est, reliquis animalibus carinatum. Illius.] Abrotoni. Elix.] Aqua
cocti. Dyspnoicis.] Difficulus spirantibus. Quæ difficultas spirandi dum modica est, neque ex toto
strangulat, dyspnoia appellatur: cum uehemens est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit,
ædix: cum accessit id quoque, ne nisi recta ceruice spiritus trahatur. Auctor Cornelius Cel-
sus lib. 4. ca. 4. Lumbis.] Sunt lumbi, pars corporis qua libido designatur, a cinctura usque ad nates.
Vnde & lumbos quidam a lubidine, hoc est a libidine dictos existimant. Nam ueteres, lubet & libet, lubi-
dinem & libidinem dixerunt. Vnde lumbago, uitium & debilitas lumborum. Vuluarumque querelis.]
Hoc est doloribus hysterarum & maricium. Crudum.] Non coctum. Vrinam.] Lotium. Nec so-
lum pro potus excremento usurpatur urina, sed etiam pro genitali spermate. Plinius: Incontinens as-
tutis uerus genitalem urinam reddit, ut cogatur in cursum uerberibus a coitu. Præcordia.] Hæc sic di-
cuntur, quod cordi prætendantur, membrana uidelicet quæ extra feriunt ab inferiore uiscerum parte.
Quam membranam septum Plato; Hippocrates & Galenus phrenas nuncupant; Græci quandoque
περιπνεύρα uocant: sed & περιπνεύρα, quod cinctum Theodorus transegit, appellat, & περιπνεύρα, quamquam &
in naribus septum eodem censetur nomine. περιπνεύρα etiam Poëtæ uocant, ut scribit Eustachius. Et reci-
tat Celsus Antiq. lect. lib. 2. cap. 53. Schiasim.] Schiaticam, quam inepte recentiores medici uocant, in-
telligit. Hic morbus græcè ἰσχία dicitur, & est coxendicis labor. Inde Ischiadici, qui ex coxendicibus la-
borant. Est autem coxa & coxendix idem. Illorum.] Serpentina. Amne.] Aqua. Lumbis
cos.] Vermes. Mala.] Poma. Virg. Aurea mala decem. Cydonia.] Cydon, oppidum Cretæ;
unde mala cydonia, quæ & Cotonea dicuntur. Plin. His proxima amplitudine mala, quæ uocamus Co-
tonea & Græci cydonia. Malorum genera sunt, Armenium, Coronium, citreum, Coumellium, condi-
tium, empetrum, musteum, mastianum, orbiculatum, ogranum, præcox, pânucum, punicum, Persicum, qui-
danum, prosiuum, rubrum, scadianum, syluestre, struthium, Tybur, uenianum. hæc Macrobius Saturn. lib. 4.
cap. 19. Insimul.] Simul in amne, id est aqua. Feruori.] Inflammationi. Curabis.] Fugabis.
Vtrunque.] Tam dolorem, quam feruorem oculorum. Infixos.] Digitis aut pedibus aut reliquis
partibus corporis. Abstrahet.] Eximet. Per se.] Hoc est solum sine aliarum rerum admixtione.
illi.] Abrotono. Venerem.] Appetitum cocundi. Subdita.] Supposita. Tantum.] Solu-
modo. Potata.] Bibita, quod de succo eius intelligitur.

DE ABSINTHIO.

cal. 1. sic. 2. N primo calor esse gradu, uis sicca secundo
Dicitur Absinthij. Stomachum corroborat herba
illius, quocumque modo qui sumperit illam:
Sed melius plura si sit decocta liquore,
Et sic sub dio prius infrigidata bibatur.
Sic poterit uarijs eius succurrere morbis.
Hocq; modo pellit tumores, mollit & aluum:
Eius & immodicum sedat sic sumpta dolorem.
Vrinam potu producit, menstrua soluit.

illi si nardum, quam profere Gallia, iungas.
Et coniuncta teras, & multa tria resoluas,
Præcipue tali purgabis mensura potu.
Hoc quoque præstabit cum lina subdita molli,
Si siler, & nardus, & accum iungitur illi.
Noxia deterges potu fastidia tali,
Gramina si ruta iungas huic, salq; pipereq;
Cumq; mæxo tundens, des hac decocta ne porum,
Noxius & crudus stomachi purgabitur humor.
Iri coniuncta, pectus melle iuuas, hausta.

Non cum uino rite se quilibet unguens,
Non metuet culices, usq; fugantur odore.
Viceris crudam dabis hanc apio sociatam.

Curat epas, sibi iungatur si gallica nardus.
Splenq; sibi iuncto potata iuuabit aceto.
Sic quoque fungorum depellit sumpta venenum.

Obstus lethifera cum uino sumpta, cicuta.
Sicq; venenatis occurrat moribus hausta.
Et claros oculos reddit, cum melle perunsta.

Hocq; modo sugillatis superaddita prodest.
Decoq; uapor obstruas liberas aures.
Si manent sanie cum melle reuens superadde.

Subuenit angina, melli nitroq; iugata.
Vulneribus prodest contrita recentibus illa
Si superaddatur. capitis sis ulcera curas.

Pruritusq; iuuat eius decoctio foris.
Nausea non poterit quengquam uexare marina,
Aures commixtam uino qui sumpsit illam.

In lini parba si circumcincta geratur,
Inguinis in modicum fertur cohibere tumorem.
Olfactu somnum capiti uel subdita prestat,
Hanc sibi supponi si non praesentis aget.

Denigrat crines cinis eius, si bene mixtus
Ceroto fuerit, eo sit saepe perunctus.
A tinea tuam reddat, qua conditur, arcam.

Sub lingua factum curas cum melle tumorem.
Liuoremq; nigrum, qui circa luminis orbem
Apparet solis, purgabit idem medicamen.

Auris depellit sonitum, cum felle bouino.
Duritiam splenis eius caecaplasma resoluit.
Coniuncta sibi melle stera si subdiur herba,

Desiccabit eam, manarq; menstrua coget.
Ex oleo fuerit uiridis si cocta, iuuabit
Non modice stomachum, qui sit hoc unguis foris.

Incausto, uino qua sit macerata, soluto,
Si scribis chartam, mus non teret amplius illam.
Plinius attollit magnis hanc laudibus herbam,

Romanoq; refert sacris ex more diebus,
Dum quadrigarum cursu certare solebant,
Absinthii succum solutos donare bibendum

In Capitolina uictori sede locato:
Credentes pretium praecunq; reddere dignum
Illi quo firmam posset firmare salutem,
Qua constat mundi pretio pretiosior omni.

IN PRIMO.] Hoc est, Absinthium est calidum in primo gradu siue ordine, sicum autem in se-
cundo. Quidam tamen absinthium aridum dicunt in tertio. Succus ipsius est herba multo calidior, parti-
cipat uero acerbis non obscuris, imprimisque poticum, ideo absterget & confirmat, & arefacit. Abs-
inthii.] Pro absinthii, ut Verg. Cura peculi, & pauperis tuguri. Stomachum.] Ob hoc sapor eius in ui-
na transfertur, ut tradit Plin. Sunt eius genera plura. Santoenicum appellatur a Galliz ciuitate. Poticum,
a Ponto, ubi pecora pinguescant illo, & ob id sine felle reperiuntur: neque aliquod praestantius, multoque
italico amarius, sed medulla pontici dulcis. Quocunque modo.] Siue coctam, siue non. Illam.] Her-
bam absinthium. Pluuie liq.] Aqua pluuiali. Dio.] Coelo. Graeci *θω*, coelum uocant. Infrigidata.]
Bibitur & decoctum aqua (inquit Plin.) & postea nocte & die refrigeratum sub diuo, decoctis sex drach-
mis foliorum cum ramis suis in coelestis aquae sextarijs tribus. Oportet & salem addi. Eius.] Alui. Se-
dat.] Mitigat, remouet, extinguit. Sic sumpta.] Aqua coelestis & pluuiali. Vrinam.] Lotium, potata
herba absinthium ciet. Herba (inquit Plin.) lente coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore
centauro quareitur succus. Sed hic absinthii, inutilis stomacho, capitiq; est; cum sit ille decoctus saluber-
rimus. Nanque astringit stomachum, bilemque detrahunt, urinam ciet aluum molliat, & in dolore sanat.
Menstrua soluit.] Vrinam ac menses, hoc est menstrua, ciet tres quatuorue ramuli, cum Gallici nardi
radice una, cyathis aquae sex. Cum lana.] Menses priuatim cum melle sumptum purgat, & in uellere ap-
positum, quod Macer dicit cum lana. Deterges.] Auseres. Fastidia.] Plin. fastidia absterget, concoctio
nes adiuuat. Diligenter legit Plin. auctor noster quicunque tandem sit: na sepe eisdem cum Plin. uerbis uti-
tur. Huic.] Absinthio. Crudus stomachi.] Cruditates detrahunt cum ruta & pipere & sale, inquit Plin-
nius. Iri.] Herba sic dicta, de qua in sequentibus dicit auctor. Pectus.] Facile thoracem purgat in iri-
de sumptum. Culices.] Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo, si uratur. Istericis.] Auruginosis alio
nomine, hoc est morbo regio laborantibus. Apio sociat.] In regio morbo crudum bibitur cum apio,
aut adianto. Curat epas.] Iocinoris causa cum gallico nardo sumitur. Splenque sibi.] Causa lienis cum
aceto, aut pulte, aut fico sumitur. Fungorum.] Vicerum in sede similium fungis terrestribus, quibus ab-
sinthium aduersatur ex aceto sumptum. Lethifera.] Mortifera. Cicuta.] Huius herbae succum bi-
bentes moriuntur, quo Socrates uitam finiuit. Persius, Barbatu crede magistrum Dicere, forbitio tollit
quem dira cicuta. Venenatis.] Venenosis. Absinthium enim aduersatur muris aranei moribus, draco-
ni marino, scorpionibus. Claros oculos.] Claritati oculorum, teste Plinio, multum cofert. Sugillatis.]
Qui ex percussione tumorem, maculamque contraxerunt, quibus cum melle imponitur haec herba. De-
coct.] Herbae absinthii. Vapor.] Aures eius decoctum uaporis suffitu sanat: aut si manat sanies, cum
melle tritum. Obstruas.] Clausas. Manant.] Fluunt. Sanie.] Sanguine corrupto. Subue-
nit.] Opitulatur, medetur. Angina.] Apostemati gutturi, quod ab angendo, hoc est strangulando
dici uolunt. Et Graece *σώω*. Nec audiendi sunt, quibus in ore est barbara dictio, Squinantia. Nitro.]
Subuenit, inquit Plinius, anginis cum melle & nitro. Iugata.] Sociata, addita. Vulneribus.] Sanat
uulnera recentia, priusquam aqua tangantur impositum: praetereaque capitis ulcera. Pruritusque.]
Sanat & pruritus. Nausea.] Vomendi appetitus. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum.
Inguinis.] Inguinum tumorem in uentrali habitu fugat. Olfactu.] Somnos allicit olfactum,
aut inscio sub capite positum. Hanc.] Herbarum Absinthium. Denigrat crines.] Capillum denigrat
absinthii cinis unguento rosaceo que permixtus. Ceroto.] Vnguento, ut Plin. docet, rosaceo. Cerotu

[Coronæ & coronæ, siue ceratū dicitur, quod uulneribus supponi solet. Tineis.] Vestibus insertū tineas arcet. Arcā.] Ve
Gr. 24. p. 101. *a. p. m. d. m. d. m. d.* *h. p. citharus, citharus, citharus, citharus.*
 res in arca inclusas. Luminis.] Oculoru. Cataplasma.] Emplastrū. Stere.] Vulu, matrici, qñ obdu
h. p. citharus, citharus, citharus, citharus.
 ruit. Eā.] Sterā, quā rectē hystērā dixeris. Nō modice.] Plurimū. Vnguinē.] Vnguēto, quale face
 re docuit. Encausto.] Inustu dicitur encaustu. Encausto ergo, id est atramento. Solutu.] Diluto. Nā
 atramentum librarium ex ditto eius temperatum, literas à musculis tuetur. Est autem sensus, Cum scri
 bis chartam encausto, hoc est atramento, quod temperatum est uino in quo absinthium maceratum, mu
 res nihil nocebunt chartam. Plin. attollit.] De usu eius cōuenit dicere herbā facillimē, atque inter pau
 cas utilissimā, praterea sacris populi R. celebratā peculiariter. Siquidem Latinarum feriis quadrigz cer
 tant in Capitolio, uictorūque absinthium bibit. credo sanitatem pramio dari honorifice arbitratis maiori
 bus. Hæc de laudibus absinthij Plin. Capitolina.] Capitolium, in quo templum Apollinis, locus Ro
 mæ, sic dictus à capite hominis ibi reperto, dum foderent fundamenta. Antea enim Tarpeius mōs diceba
 tur, à uirgine uestali Tarpeia, quæ ibi à Sabinis necata atque sepulta fuit. Illi.] Victori. Salutem.] Sa
 nitatem. Pretiosior.] Quare Iuuenalis Satyra 10. dicit, Optadum est, ut sit mens sana in corpore sano.

DE VRTICA.

R AECVS Acalephen, nos urticam uocamus.

G Feruida non modice uis illi dicitur esse:
 Vnde nec immerito nomen sumpsisse uidetur,

Nota. Tella quod exstat digitor urtica tenentis.
 Hæc soler iſtericos cum uino sumpta iuuare.
 illius semen cotius cum melle medetur,
 Et iussim uicem curas si sepe bibatur.
 Trigu pulmonis pellit, uentrisq; tumorem.
 Omnibus his prodest puluis cum melle iugatus,
 Aut succus uiridis cum uino sepius haustus.
 Cum sale de folijs eius factum cataplasma,
 Vlceribus prodest, & uulnera sordida purgat.
 Et contra morfus ualet hoc cataplasma caninos.
 Hoc cancos, & parotidas, luxatq; curas.
 Hocq; reformatur caro quæ discessu ab offe.
 Et solet humores hoc desiccare nocentes.
 Acti cum uina radix contrita tumorem
 Compeſcit splenis; podagra sic subuenit illa.
 Omnibus & morbis sic subuenit articularum.
 Omnibus his prodest superaddita, uel sibi iuncto
 si coquis hanc oleo, foueasq; hoc unguine membra.
 Naribus impositus succus, folium ue, cruorem
 Elicit, innata est illi uis tanta caloris.

Quod si manantem cupias retinere cruorem,
 Vrtica succo frontem line, reprimis illum.
 Si supponatur cum myrrha, menstrua pellit.
 Sædendi uuluum maris, humore graua,
 Vrtica folijs reuocabitur illa fricata.
 Cum uino bibitur, uenerem semen mouet eius,
 Et melius trita, si iungas melle, pipereq;
 Et sic cum uino, prædicto more bibantur.
 Pleuriticos, pectus, pulmones, adiuuat eius
 Semen, si sumptum fuerit cum melle iugatum.
 Cum mulla bibitur, totum producit abundans.
 Herba recens eius ualerum si more coquatur,
 Detur & illius decoctio, molliet alium.
 Ore diu clausus succus si uolueris eius,
 Vna non modicum poterit sedare tumorem.
 Sudorem mouet ex oleo decocta perunctis.
 Si quadrupes quæcunque matrem perferre recusat,
 Vrtica folijs illius uulua fricetur:
 Sic naturalem calor exeat ille calorem.
 Defluuium capitis, si succo seminis huius
 Vngas sepe caput, reprimis, doctore Galeno.
 Illius semen collectum tempore messis,
 Et desiccatum, multis erit uile causis.
 Omnibus his prodest puluis cum melle iugatus.

G R AECVS Acalephen.] Quod Græcis est *ακαλέφην*, Latinis est urtica; quod nomen herbæ ab uren
 do ferunt impositum. Est urtica etiam piscis. Dicitur autem hæc herba acalephe, enide, scinthia & urtica.
 Plures urticæ differentiz. Syluestris quā feminā uocant, mitior. Et in syluestri quæ dicitur cania, acro:
 Caule quoque mordaci, fimbriatis folijs. Quæ uero etiam odorem fundit, herculeana uocatur. Semen o
 mnibus copiosum, nigrum. Mirum, sine ullis spinarum aculeis lanuginem ipsam esse noxiam, & tactu tan
 tum leni pruritum, pustulasque confestim adusto sumites existeret. Notum est & remedium olei. Sed mor
 bus, si dactilas nō protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi folijs roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere,
 non ingrato, multis etiam religio so in cibo est ad pellendos totius anni morbos. Syluestrium quoque ra
 dix omne carmen tenentior facit simul cocta. Quæ innoxia est, morſu carens, lamium uocatur. Nō mo
 dice.] Plurimū. Vnde.] Quod illi uis est non modicē feruida. Digitos urtica.] Non solum digitos
 adurit, sed etia reliqua corporis mēbra, si apposita fuerit. Vrtica igitur ab urendo dicitur, quod folia eius
 tacta acerrimē urant, quamuis genus urticæ est, quod lamium uocant, multo cæteris mitius, & folijs terē
 nihil mordētibz. Cōstat si qs decocto urticæ pedes hyeme lauerit, eo die nō frigescere. Iſtericos.] Mor
 bo regio laborantes. Morbo regio resistunt etiam sordes aurium, aut māmaram pecudis denarij pondere
 cum myrrhe momento, & uini cyathis duobus. Canini capitis cinis in mulso. Multipeda in uini hemis
 na. Vermes terreni in aceto mulso cum myrrha. Gallina si sit luteis pedibus, prius aqua purificatis, dein
 de collutis uino, quod bibatur. Cerebrum perdicis, aut aquilæ in uini cyathis tribus. Cinis plumarum aut
 interaneorum palumbi, sed in mulso ad cochlearia tria. Passerum cinis sarmentis crematorū cochlearibus
 duobus in aqua mulsa. Auis iſterus uocatur à colore, quæ si spectetur, sanari id malum tradunt, & aue mo
 ri. Colicis.] Colicam passionem habentibus. Est solica passio ægrotudo maxima in uentre sub angu
 lo in intestino quod dicitur colon, de quo Celſib. 1. cap. 7. Et si inquit laxius intestinū dolore cōsueuit
 Enōe, & alijs generibus exerceatur, utatur balneo, cibis quoque & potionibus calidis, denique omni modo
 frigus

figus euitet, item dulcia omnia, leguminaque, & quidquid inflare consuevit. Tullim.] Phanas phisica
utilissimam esse urticam scripsit in cibis coctam, conditam uel leni duritiae uentris intestinis an maliu,
articularibus, & podagricis morbis, arteriæ, tussi, uentris distillationi, stomacho, panis, parotidi, per nioni-
bus. Pectus præterea purgare, urinam cire, sanguinem narium sistere, calculos rumpere, uiam reprimere.

Parotidas.] Apollonem fecus aures. Podagræ.] Pedum dolori. Podagræ morbus (inquit Plin.) ra-
rior solebat esse, non modo patrum, auorumque memoria, uerum etiam nostra. Peregrinus & ipse. Infana
bilis non est credendus, quippe quoniam in multis & sponte definit, & in pluribus curatur. Medetur pa-
natis radices cum uua passa, succus hyoscyami cum farina, uel semen scordion ex aceto. Articulorum.]
Prodest articulis etiam quinquifolium impositum. Mādragoræ folia cum polenta, uel radix recens tu sa cu-
cūmere syluestri, uel decocta in aqua. Elicit.] Manare & fluere facit. Quid si manantem.] No-
tatu dignum & utile. Menstrua.] Menses, muliebria, fluxu sanguinis. Pellit.] Fugat, sedat. Vuluā.]
Improprie hic accipit uuluam pro cunno. Cunnus autem clauditur, quando uuluā seu matrix intumuit
humore grauata. Reuocabitur.] Puto melius legi referabitur, pro reuocabitur: ut sit sensus, uuluā fri-
cata folijs urticæ, referabitur, quæ antea clausa erat propter matricem humore grauata. Semē eius.]
Vrticæ. Pleureticos.] Laterum morbo laborantes. Stomachus lateribus cingitur, atque in his quoque

6. uehementes dolores esse consueuerunt, & iniriū uel ex frigore, uel ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo
est. Sed interdū id malum intra dōtorē est, isque modo tardē, modo celeriter soluitur, interdum ad perniciē
quoque procedit, oriturque acutus morbus, qui pleuriticus à græcis nominatur. hæc Cornelius Celsus li-
bro 4. cap. 4. Vuz.] Hoc malum Græci staphylen uocitant, & sit circa fauces, quia depēdet sicut uua, no-
men uuz accepit. Quæ si (ut tradit Celsus libro septimo, capite duodecimo) cum inflammatione descen-
dit, dolorique est, & tubrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Itaque melius est his uti, quæ
alias proposita sunt. Si uerò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra instum modum a-
pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Itemque, si ima, liuida, & crassa; summa, tenuis
est. Neque quidquam commodius est, quam uolsellaprehendere, sub eaque quod uolumus excidere.

Sudorem mouet. Hominem sudare facit. Si quadrupes.] Si equa marem non admittit, & urtica
infricatur natura, libenter coitum paritur, quod etiam Marcus Varro de Rustica tradit. Defluuium
capitis.] Capillorum fluorem. Liber subicere quæ breuiter docet Placentinus ille Georgius; Medes-
tur tuberculis, & parotidibus, ex thorace ac pulmone deducit humorum crassitudines & renacitates. Ha-
bet quoque uim inflandi: unde etiam falax esse perhibetur, præsertim cum potatur. Eius semen ue-
nerem acuit cum uino dulci potum, sunt qui cum melle. Alium autem mediocriter subducit, emitten-
do leniter ac tirillando, non etiam purgando. Cancris potestatis, & cancrum & cancrenam spectantia, &
prorsus quæcunque opus fuerit arefacere, citra ullam uellicationem appositè medicatur.

DE ALLIO.

CORODON à Græcis sunt allia dicta latine.

Huius uim medici calidam, siccamque periti

in quarto posuere gradu. mansum uel inunctum,

Curat quos serpentes uel scorpiones intulit ictus.

Et nocuū uermes triti pelluntur odore.

Sanat & appositum morsus cum melle caninos.

In mulla coctum, commixtum cui sit acetum,

Et bibitum, uermes uentris, tinedque repellit.

Ex oleo cum ueste sua si decoquis illud,

Morsus pestiferos reddes hoc unguine sanos.

Corpus attritum cura sanabis eadem;

Vagrine uesicae dolor & tumor hoc reprimuntur.

Iste refert ipocras educi posse secundas

Et cum combustis si uuluā diu foueatur.

Pulmonis uarias coctum cum lacte querelas

Potatumque; iuuat, uel crudum sepe comestum.

Cum centaurea Diocles dare præcipit illud

Hydropicis, sic humores desiccet aquosos.

Idem nephreticis elixum sumere iussit.

Pythagoras illo fuit usus cum coriandro

Ex uino, causas sic curans ielericorum:

Et sic potatum dicit quod molliat alium.

Cumque faba coctum, capitis sedare dolorem

Dicitur, attrito si tempora perluis illo.

Anseris hinc adipem iungas, tepidumque dolenti

Infundas auri, præclare subuenit illi.

Elixum tussim iuuat, & suspiria sedat;

Clarificat raucam crudum, coctum quoque uocem:

Sed magis elixum iuuat illam sepe comestum.

Adiuuat incoctum pulti, sumptumque; tenesmon.

Porcina iungens adipi si conteris ipsum,

Non modicos reprimis superaddens saepe tumores.

Hunc ignotatum non lædet potus aquarum,

Nec diuersorum mutatio facta locorum,

Allia qui mane ieiuno sumpsit ore.

SCORODON.] Hæc dictio græca est, & Græce scribitur σκόροδος, & latine significat allium. Allio

magna uis, magnæ etiam utilitates contra aquarum, & quorumlibet locorum mutationes. Serpentes abi-
git, & scorpiones odore: atque, ut aliqui tradidere, & bestiarum omnium ictibus medetur, potu uel cibo,
uel illitu. priuatim contra hæmorrhoidas prodest, cum uino redditum uomitu. Ac ne contra araneorum
murum uenenatum morsum ualere miremur, aconitum, quod alio nomine Pardalianches uocatur, depel-
lit. Item Hyoscyamum, contra canum morsus, inque uulnera cum melle imponitur. Ad serpentium
quidem ictus potum cum uestibus, efficacissime ex oleo illinitur: Attritisque corporum partibus, uel si-
nifica intumuerit. Quin & suffitu eo, secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum
cum oleo, capitis ulcera manantia sanitati restituens. Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Dio-
des hydropicis cum centaurea, aut in fico duplici ad euacuandam alium; quod efficacius præstat uiride,

Imperium cum coriandro in mero potum. *Suspiriosis* aliqui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras & cōtra morbum regium uino miscuit & contra ileum in oleo & pulve sic illinens. Strumis quoque antiqui & infanti-
tibus dabant crudum. Diodes phreneticis elixum. Cōtra anginas tritum imponi & gargarizare prodest.
Dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit, uel si decoctā aqua colluantur, addaturque
ipsum in cava dentium. Autibus etiā instillatur succus cum adipe anserino; phthirias & paurigines po-
tum, uelum item cum aceto & nitro. Copescit & distillationes cum lacte coctum uel tritū permixtum ue-

* cafeo molli: quo genere & rauritatem extenuat; uel phthisim, in fabæ sorbitione. In totum autem co-
ctum utilius est crudo, elixumque tosto: sic & uoci plus confert. Tineas & reliqua animalia interaneo-
rum pellit, in aceto mulso coctum. Tenasmo in pulve medetur; temporum doloribus illitum. Elixum; &
pustulis coctum cum melle, deinde tritum; tussi cum adipe uetusto decoctum, uel cum lacte; aut si sanguis
etiam excreetur, uel purulenta sint, & pituita sub pruna coctum, potum & cum mellis pari modo sum-
ptum; conuulsis & ruptis, cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores suspectos sanat. Extrahit fistulis

uitia cum sulphure, & resina; etiam harundines cum pice. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat, sanatque
cum origano, uel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata aut luentia ad colorem
reducit, combustum ex melle. Credunt & comitalem morbum sanare, si quis eo in cibo utatur, ac po-
tione. Quartanas quoque excutere potunt. Suppurationes quantaslibet sanat, fractæ incoctum fabæ,

atque ita in cibo sumptum, donec sanitatem restituat. Facit & somnos, & in totum rubicundiora cor-
pora. Venerem quoque stimulat, cum coriandro uiridi tritum, potumque ē mero. Vitia eius sunt,
quod oculos hebetat, inflationes sanat, stomachum laedit copiosius sumptum, sitim gignit. Ceterum
contra pituitam & gallinæ & gallinaceis prodest. Mixtum farre in cibo summentis unum reddere atque
non torqueri tradunt, si eo trito natura tangatur. Huius uim.] Hoc est, alij uim calidam & aridam
in quarto ordine posuerunt medici. Curat.] Sanat. Scorpius.] Hunc etiam scorpionem dici-

mus. Nocui uermes.] Serpentes & scorpiones, uiperæ & natrices. Scorpio sibi ipse pulcherrimum
medicamentum est. Quidam contritum cum uino hibunt: quidam eodem modo contritum super
uulnus imponunt: quidam super prunam eo imposito, uultus suffumigant, undique ueste circumdata,
ne is fumus dilabatur, tum carbonem eius super uulnus deligant. Hæc Celsus libro quinto. Caninos.]

Canum. Tineas.] Non intelligit tineas, hoc est uermiculos, quibus uestes & libri corroduntur: ut
apud Horat. Aut tineas pasces taciturnus inertes. Nec intelligit per tineas, uermes in aluearibus no-
xios, ut apud Columellam. sed uentris animalia intelligit Macer hic per tineas. Serenus Samonicus pri-
mam syllabam in tinea præter morem aliorum producit, dum ait:

Quid non aduersum miseris mortalibus addit

Natura? interno cum uiscere tinea serpens.

Elminthes graeci dicunt in intestini recti extremo reperti. Celsus uocat lumbricos. Cum ueste ad ser-
pentium quidem ictus (ut Plinius scribit) potum cum uestibus suis, efficacissime ex oleo illinitur.
Morsus pestiferos.] Serpentum, aliorumque uenenatorum. Vngue.] Vnguento. Secun-
das.] Secundarum, pluralis numeri tantum, pro membrana illa qua partus obuolutus utero prodit;

dictæ, quod nascentem infantem sequantur. Querelas.] Morbos & dolores. Et quis hæc legens, que
optimi quique ac doctissimi de herbarum uirtutibus tradiderunt auctores, non rapitur in opificis naturæ
amorem? Allium secundum uulgi opinionem, uile est, cum tam sit magnarum uirtutum: quas si etiam
pueri cum aliarum herbarum uirtutibus inciperent quodammodo per lulum discere, non ne animi com-
& citius & uehementius poterint amore Dei incendi? Quod quidem fieret, si fidelis præceptor prælege-

ret interdum semel unam aut alteram in hebdomada paginam ex hoc auctore: cuius eruditio minime est
uulgaris, cuiusque carmen non est inelegans: nisi sit quem fortassis leonina carmina frequentius occur-
rentia offendant. quod tamen non fit, si lector (candidatum literarum & tyronem intelligo) conside-
rauerit, auctorem hunc nostrum nihil aliud uoluisse, quam breuiter prodesse: nec præterea ingenium olle-
dere uoluisse, quod quidem non defuit illi: imò poetam præstare potuisset non insuauem. Doleo sæpissi-

mè considerans multorum præceptorum negligentiam, quibus satis est, si pueri, quos instituendos lum-
père, nouerint panem & uinum, sapiam & papyrus latinis aut grecis uoculis appellitare: cum non mi-
nus essent herbarum, gemmarum edocendi uocabula: præterea animantium. Ex quibus quid norunt,
præter asinum & uaccam? quia asinus apud istos præceptores semper currit: & uacca, etiam si dormiat &
mactata sit, semper mugit. Interroga unum aut alterum ex uulgo præceptorum, quo nomine hæc aut il-

la uocetur herba: respondebitur tibi fortassis de urtica, aut allio, quæ herbæ usque adeo notæ sunt, ut etiā
fere uulgo illarum nomina sint cognita. De ceteris minus sciunt literatores isti, quam inscitia ipsa. Quod
si quem propterea redarguas, habet quo se defendat clypeum, Nō scilicet sum medicus, nec medicinā pro-
fiteor. Quid ergo nobis cum herbarum uocabulis? Quid si talis diceret, Nō sum homo, sed asinus. Cē-

taurea.] Herba, de qua in sequentibus: Diodes.] Hunc etiam citat Plinius. Hydropicis.]
Morbo hydropico laborantibus. Phreneticis.] Id est delirio obnoxii. Elixum.] Coctum.
Istericorum.] Auruginosorum. Sedare.] Curare. Illo.] Allio. Illi.] Dolenti auri. Cla-
rificat.] Claram facit. Incoctum.] Crudum. Tenesmon.] Tenesmos, siue tenasmus, est fre-
quens desidendi cupiditas, æque dolor, ut in torminibus, ubi aliquid excernitur. auctor Celsus in quar-

to. Porcino.] Porcorum. Ignotarum.] Non nocebit ignotarum aquarum potus.

DE PLANTAGINE

ERBAM qua nostra lingua plantago vocatur,

H Hanc Arnoglosson Græci vocat, est quæ lingue

Agnine similis folijs. Plantaginis huius

sunt gemine species. Et maior prima vocatur

Altera vero minor, quam vulgo lanciolatam

Dicunt, quod folijs ut lancea surgat acutis.

His inflammandi, desiccandi, notatur

Terius esse gradus. maiorem uim tamen esse

Maiori dicunt. nimis humida vulnera secat,

Si superaddatur cum melle, et sordida purgat.

Cum sale, licet olus si iuncta coquantur aceto,

Ventrem refrigerat nimium sic mania fluentem,

Si supradictis tem sit concocta, iuuabit

Hic dysentericos melius cibis, et ciliacos.

Stringit manantem superaddita sepe cruorem.

Erumpit maculis ferit reparare colorem.

Ovi cum lacryma mire medicatur aduſis.

Sola canis morsum curat, sedatq; tumorem.

Et scrophas spargit, superaddita cum sale tria.

Hydropici ut olus decocta, comestq; prodest.

Sic iuuat asthmaticos, feritq; iuuare caducos.

Sordida purgabit bene vulnera qualibet oris,

Ore diu tenens si succus uoluerit eius.

Hic inus fusus curat syringia succus.

Et dolor hoc auris sedabitur, et facer ignis.

Fert hemophisicis hic opem, si sepe bibatur

Per se: fortior est, si sit coniunctus aceto.

Sicq; iuuat phleboticos, iniectus uero per anum,

Stringit non modicum fluxum dysentericorum.

Pellitur ex oculis tumor, hoc, feruorq; perunctis.

Sapius hanc ipsam si dentibus atteris herbam,

Gingiuſ reprimet tumidas, et sanguine plenas.

Sicq; sicut dantis compeſcere sepe dolorem.

Succus cum lana matrici subditus eius,

Stringit manantem nimium siccando cruorem.

Cunctis prædictis eius decoctio cauis.

Prodest, et potus cum uina seminis huius,

Vesica, renumq; iuuat potando dolorem.

Dicunt non nasci scrophas, gestantibus eius

Radice collo suffragam, uis ibi tanta est.

Radices eius tres attere iungito triis

Vini tres cyathos, et aqua fac sit modus idem:

Hæc nondum tremulo potanda dabis febrienti:

Sic pelles febrem, cui dat hoc tria nomen.

Bis bina quoque quartanis prodesse putantur,

Cum totidem uini cyathis si dentur, et ammis.

Cuncta potest plantago minor prædicta iuuare,

Quamuis non tantas uires uideatur habere.

Præcipue succus curat plantaginis huius,

Quod iuxta nares uel lumina nascitur ulcus,

Si superaddatur cum lanis mollibus illi,

Perq; noxam cataplasma dies istud renouetur.

Eius si succo tepido uenter foueatur,

Acri depulso sanabitur ille dolore.

Lumbicos succus depellere dicitur eius,

Si porrina uerus axungia iungitur illi.

Sedabit duras istud cataplasma tumores.

Parotidas, uulnusq; recens hoc adiuuat unguen.

Ante duas horas quartana quam tremor agrum

Vexet, si succum biberit plantaginis huius,

Sentiet eximiam facili medicamine curam.

Eius potarum depellit sperma secundas.

Si uia longa pedum mouet (ut sit sepe) dolorem,

Acri cum uina superaddita tria iuuabit.

Cum passa succus bibitur si sapius eius,

Vesica uariis fertur succurrere morbis.

In desiccando uis est plantaginis ingens

Maioris, queat ut (ueluti cauteria) corpus

Appositum siccare, refert ut Plinius auctor.

Composuit librum Temeson de uiribus eius,

In quo præclaris celebrat uir laudibus illam.

HERBAM.] Plantago latine, ἀρνόγλωσσος Græce, Arnoglossum, alij agni linguā, uerbum uerbo red-

dentes: alij plantaginem uocant. refrigerat & arefacit in secundo gradu, ut uocant. Quia linguæ.] Red-

dit rationem auctor, quare arnoglossos uocetur plantago. Geminæ species.] Duo plantaginis genera,

auctore Plin. minor angustioribus folijs & nigrioribus, linguæ pecorum similis, caule anguloso, in terram

inclinato, in pratis nascens. Altera maior, folijs laterum modo inclusa: quæ quia septena sunt, quidam eam

heptapleurō uocauerunt. Huius & caulis cubitalis est, & napi similis. Nascitur in humidis multo efficacior.

Vis mira in siccādo densandoque corpore, cantherij uirtē obtinens. Nulla res æq̃ fistit fluxiones, quos græ-

ci rheumatismos uocāt. Lanciolatam.] A similitudine læce, ut ipse interpretatur. Ventre fluent.]

Fluxum uentris. Dysentericos.] Dysenteria est malum, cū intus intestina exulcerātur. Lege Corn. Cel-

sum lib. 4. Et latine tormen dicitur. Inde dysenterici & torminosi. Dysentericos ergo, id est dysenteriam

& tormen patientes. teut. rot rur. Ciliacos.] Scribēdum coeliacos, id est aluiuos; quī Græce κοιλιακοί dicun-

tur, qui uentris profluuium patiuntur. enim latine uenter transfertur. de quo malo Celsus lib. 4. sic:

In ipſius uero uentriculi porta consistit, qui & longus esse consuevit, κοιλιακός à Græcis nominatur. Sub

hoc uenter indureſcit, dolorque eius est. Alius nihil reddit, ac spiritum quidem transmittit. Extremæ

partes frigeſcunt, difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter iniria, calida cataplasmata toto

uentri imponere, ut dolorem leniant, post cibum uomere, atque ita uentrem exinanire. Manantem.]

Fluentem. Nigris mac.] Nigras maculas fugat. Scrophas.] Apollēmata sub lingua. Hydropi-

cis.] Aqua intercutē laborantibus. Asthmaticos.] Difficulter spirantes. Caducos.] Caduco mor-

bo, quem Germani S. Valentini morbum uocant, laborantes. Enallida Græce dicitur hoc malum. Sy-

ringia.] Id est fistulas. & declinat syringia in neutro genere. Opinor hunc uersum sic debere legi,

Hunc intus succus curat larynx reſuſus. Et autem fistula, ulcus altum, angustum, & callosum in corpore, siue ex

uulnere sit, siue ex uitio orto, quod ad suppurationem uenerit. Sedabitur.] Placabitur & curabitur.

Sacer ignis.] Hunc sancti Antonij ignem uocāt, qui etiā pruna, & ignis persicus, & carbo, & à Dioſco-

ride ignis sancti nominatur, alijs dicitur formica militaris. Dicitur irem anthrax. De qua re tamen est con-

AE MILIUS MACER

trouersia. De quo malo nos lib. 3. de Origine morborum hæc scripsimus carmina:

*Auffonis comati
lib. de origine morbi.*

Auffonis vir effra.

Sermos.

+ Lib. Hemorrhoidis

Illius exurit scintillans ignibus anthrax

Membra. latent causæ. nulla medicabilis arte,

Progreditur, morbusque hominem depascitur omnem;

Concremar & rapidis iniussis corpora flammis.

Sequentia uero Serenus:

Est etiam morbi species, quæ dicitur ignis,

Languida quo multo torrentur membra calore.

Hæmophthilicis. Sanguinem spuentibus. Per se. Id est, sine alterius admixtione. Fortior. Hoc est, succus ille plantaginis potentior est, si sit comixtus aceto. Phthilicos. Phthilum, hoc est, spiritum nem patietes, quam etiâ compescit allium in fabæ sorbitione. Dysentericorum. Dysenteriam, hoc est, tormina patientium. Hoc. Succo. Gingiuas. Has à detibus gignendis sic dictas asserunt. Teuton. das zan fleisch. Eius. Plantaginis. Subditus. Suppositus. Stringit. Constringit, & cohibet, retinetque ne fluat. Scrophas. Apostemata sub lingua. Eius. Plantaginis. Tres cyathos. Id est tria parua pocula. Modus idem. Hoc est, facito ut tantum sit aquæ, quantum uini. Tres ergo cyathos uini, & tres aquæ. Nodum tremulo. Hoc est, nodum febris tremore patienti. Lux tertia. Tertianâ intelligit. Bis binæ. Hoc est quatuor radices plantaginis. Quartanis. Quarta die redeuntibus. Amnis. Aquæ. Huius. Minoris plantaginis. Lumina. Oculos. Superaddatur. Succus subaudi plantaginis minoris, illi. Vlceri. Cataplasma. Emplastrum. Ille. Véter. Lumbæcos. Animalia uentris, hoc est uermes. Axungia. Interior porci pinguedo inueterata, sic dicta, quod plaustorum axes ea ungantur, quò facilius circum eos rotæ uertantur. Parotidas. Apostemata iuxta aures. Vnguen. Vnguentum. Quartanæ. Febris quarta die reperi solitæ. Tremor. Horror quem facit febris. Aegrum. Aegrotum, febris obnoxium. Sperma. Succus. Secundas. De his in alio. Acri. Forti. Cauteria. Cauterium est instrumentum, quo nora imprimuntur, & morbi alioqui insanabiles inuri solent. Est & pictorum instrumentum. Sumpsit autem hanc cõparatiõnem ex Plin. dicere, Vis mira in siccando densandoque corpore, cauterij uicem obtinens. Vt Plinius. Sic habet ille: Celebrauit & Temelon medicus uulgarem herbam plantaginem, tanquam inuentor, uolumine de ea. In quo. Libro scilicet. Celebrauit. Subaudi Temelon. Illam. Plantaginem.

DE RUTA.

Ruta vir califera

Medicis Ruta uis feruida dicitur esse, siccaq; feruit in his gradus illi certius esse. Vilis est ualde stomacho, si sape bibatur.

Ulyss.

Expellit partus potu, uenerentiq; coeret.

Tussim, si bibitur, compescit: menstrua purgat.

Si coquis hanc in aqua, cui uinum iunxeris acre,

Compescit talis decoctio tormina uentris.

Pulmones iuuat, & pectus, morboq; medetur

Costarum, quem pleuresim uocat Attica lingua.

Arthriticos, sciatq; iuuat, febribusq; medetur

Hausta, uel ex oleo, utridem si coxeris illam,

Et foueas tepido patientes ante tremorem.

Matricis prodest, intestiniq; tumori

Hoc unguen, uel clysterio si funditur intus.

Haustaq; cum uino prodesse ualebit utriusque.

Lumbricos oleo decocta & pota repellit.

Cum carici decocta diu, uiniq; liquore,

Profunt hydropicis, si sint superaddita nocte.

Cruda comesta recens, oculos caligine purgat.

Et melius marathricum succo, felleq; galli,

Melleq; si succus ex aqua iungitur eius,

Indeq; sint oculi patientis sepe peruncti.

Cum roseo miscens oleo, necnon & aceto

Illius succum, capitis curare dolorem

(Quamuis immodicum) poteris hoc sepe perungens.

Naribus expressus si succus funditur eius,

Sistit manantem bene desiccanda cruorem.

In corio maligianari si repositum

Auribus infundas, depelles inde dolorem.

Ceruse, roseaq; oleo miscens & aceto

Illius succum, mirandum conficit unguen

Ad depellendum sacrum, quem dicimus ignem.

A MEDICIS rutæ. Rutam à ruêdo, id est eruendo dictam uolunt, quòd una ex oibus herbis propter

Et scabiem derta, qua dicitur herpetæ grace.

Et grace dictas acoras hoc unguine purgas,

Vlcera sunt capitis humore fluentis pingui.

Curas & ozenas, immisissum naribus: hæc sunt

Qua grauius ferient in naribus ulcera nata.

Obstat pota, mero: uel, cruda comesta, uenenis.

Hoc Mithridates rex Ponti sepe probauit,

Qui ruta folij uiginti cum sale pauco,

Et magnis nucibus binis, caricisq; duabus

Ieiunus uesci confurgens mane solebat.

Armatuq; cibo tali, quasunque ueneno

Quilibet insidias sibi tenderet, haud metuebat.

Mustelaq; docent, obfistere posse uenenis

Mirifice rutam, comedunt que primitus illam

Cum pugnatum sunt cum serpentibus attris.

Cum butyro, modicq; oleo decocta, tumorem

Matricis subiecta repens fugat illa, coliq;

Et cunctis intus morbis, sic subdita prodest.

Hæc etiam testes poteris curare tumentes,

Cum folij lauri bene triam si superaddas.

Ex hac antidotum non paucis uile causis

Conficitur: medici dicunt diapeganon illud,

Peganon in græca lingua quòd ruta uocatur.

Illius antidoti confectio talis habetur:

Pondere iunge pari nitrum, piper, atque cuminum,

De tribus his, quantum de ruta, ponito tantum:

Sed prius ex acri uino macerare cuminum

Conuenit, in ferro post affari calefacto:

Omnia deinde simul bene tria, ex melle iugalas.

Peiloris, & lateris, iecoris, renumq; dolores

Hoc ex antidoto curantur sepe comesto.

Extenuat bilem, mollit sine tormine uentrem,

Confortat stomachum, facit ut bene digerat escam.

[illegible]

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538

sunt, pluresue cruste, & odorem foedum habent; cui malo uix potest succurri. De ozœnis lege Celsum li bro 6. cap. 8. Immissum.] Vnguentum subaudi. Grauiter foetent.] Male olent. Carycis] Fiar bus. Armatus.] Munitus. Matricis.] Vuluz.] Coli.] Podicis. Antidotum.] Remediū. Anti dorum ex cōtrario datum trāsferri potest, quia cōtraria contrarijs curantur. Remedium igitur cōtra ue nena datū, nocatur antidotum. Extenuat.] Tenuē facit. Bilem.] humorē in fellis existentē sollicito.

DE APIO.

EST APIUM dictum, quod apex hanc ferre solebas

Victoris, ueterum faret dum more triumphus.

ipse sibi talem prior imposuisse coronam

Dicitur Alcides: morem tenere sequentes.

Ast alij dictum credunt, quod apex uehementer

illius soleant auide decerpere flores.

Hanc herbam selinon solet attica dicere lingua.

Virtutis calida, sicca quoque dicitur esse:

Tertius a medicis datus est gradus huic in utroque.

Illius succo, si candida mica terendo

Panis iungatur, oculi sedare tumorem

Dicitur, emplastri noctu superaddita more.

Sicq; ferunt mammas prodesse tumentibus illam.

Sedat feruorem stomachi, pelliq; tumorem.

Et quidquid ueni creat, includit ne nociui,

Desiccans poris assumpta repellit apertis.

EST APIVM.] Hanc herbam Græci ἀπύον uocant, Latini apium, quod uictores, qui Nemea uicerat,

hac coronabantur. Iuuenalis, Graicque apium meruisse coronæ. Quod Lucianus etiā præter alios testa

tur, ut tradit Politianus epist. lib. 11. epist. 10. Plin. Natural. hist. lib. 19. cap. 8. Ab æquinoctio uerno (in

quit) feritur apium, semine paululum in pila pulsato. Crispus sic putat fieri, aut si satum calcetur cy

lindro, pedibusue. Proprium ei, quod colorem mutat. Honos ipsi in Achaia coronare uictores faci cer

taminis Nemeæ. Apex.] Caput. Hanc.] Herbam apium, hoc est coronam de apio. Vergilius apii

dicat amarum, propter succi amaritudinem, in Silen, ofloribus atque apio crines ornatus amaro. Talē.]

Hoc est de apio factam. Alcides.] Hercules ab αλκι, quod uirtus, robur & fortitudo transferri potest.

Morem.] Coronandi apio. Illius] Apij. Attica.] Græca. Gradus.] Latinus ordo. Huic.]

Apio. Vtroque.] In calore & siccitate. Illius succo.] Apio (inquit Plin. in lib. 20.) gratia uulgo

est. Nanque rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent.

Præterea oculis illitum cum melle, ita ut subinde foueantur feruenti succo decocti, alijsque membrum

Epiphoris per se tritum aut cum pane aut polenta impositum, mire auxiliatur. Pisces quoque si ægro

tent in piscinis, apio uiridi recreantur. Verum apud eruditos non aliud erutum terra in maiore senten

tiarum auctoritate est. Distinguitur sexu. Chrylippus foeminam esse dicit crispioribus folijs & duris

crasso caule, sapore acris & feruido. Dionysius marem nigriorem, breuioris radices, uermiculos gignentem.

Ambo neutrum ad cibos admittendum, imò omnino nefas, nam id defunctorum epulis feralibus dictum

existimant. Ipsi quoque uisus claritati inimicum. Cautē foemina uermiculos gigni. Ideoque eos qui

ederint, sterilefcere mares foeminasque. In puerperijs uerò ab eo cibo comitiales fieri, qui hubera hauri

unt. Innocentior tamen esse marem. Eaque causa est, ne inter nefastos fructes damnetur. Māmarum

duritiam impositis folijs emollit. Suauiores aquas potui incoctum præstat. Succo maximè radices cum ui

no, lumborum dolores mitigat. Eodem iure instillato, grauitatem aurium. Semine urinam ciet, menstrua

ac secundos partus. Etsi foueantur semine decocto, suffragillata reddidit colorum oui albo-illitum. Aut ex

aqua coctum, potumque renibus medetur. In frigida tritum, oris ulceribus. Semen cum uino, uel radix

cum ueteri uino, uelica calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex uino albo. Iungatur.]

Addatur. Sedare.] Reprimere. Noctu.] Nocturno tempore. Tumentibus mammas.] Id est duri

tici mammarum. Nociui] Morbiferi. Poris.] Meatibus per quos sudor exire solet. Est & porus, iter

per quod genitura in urinz uias defertur. Prouocat.] Ciet, & prodire facit. Hęc.] Herba apii. Cru

da.] Nō cocta. Hausta.] Potata. Mage.] Quod nihil à magis differt. Facit hoc.] Id est, magis prouo

cat urinas sumpta radicū decoctio. Hoc itidē.] Hoc est, fortius ciet urinas haustu apij semeni. Venenatis

morf.] Id est moribus uenenatorū animalū. Semē.] Apij. Apoxima.] Coctio. Cū uarijs cōdimētis

aqua cocta, dicitur apoxima. Modo eodē.] Eadē cōcoctio. Coërcet.] Cohibet & sedat. Lymphę.]

Aquę. Aegris.] Infirmis. Reparare.] Reddere. Tremorē.] Qd alibi morē aliorū dicit, ante typū

Hydropicos.] Aqua intercute laborātes. Hac.] Herba apio. Turpis lētigo.] Lētiginē uocat turpē

reddat hoīem turpē, i. deformē. Nā turpis hic ab effectu dicitur lētigo, qā turpe, etiā deforme significat.

Oui. Turpe pecus mutū, turpis sine gramine capus. Sūt aut lētigines maculę subrusę, & iterdū nigre in

facie, et alibi, ad lētū similitudinē. Dñr & lēticulę, et gręcę hypopia. Illius.] Apij. Polline.] Flore triti

DE

AE MILIVS MACER

posse. nem spuētibus. Deformes.] Turpes, quę corpus deformare solent. Polca.] Commixtione aque
& uini. Mollit.] Molles facit ac resoluit. Pestiferos.] Lethiferos, uenenolos

DE ANETHO.

MEDICIS calidum, siccumq; refertur anethū:
Et dicunt quid sit gradus huic in utroque secundus.
Lat dat abundanter eius decoctio sumpta.

Nutrici: stomachiq; solet depellere morbos,
Tres cyathos eius tepida si sumserit ager:
Indicio ructus sit, qui demonstrat apertum
Os stomachi, utrumq; per hoc exisse nocuum.
Aque grauis tali sedatur nausea potu.
Prouocat urinas, obstantia quaque repellens.
Matricemq; iuuat, bene si foueatur eadem.
Cum tepido tritum patiens, si poter, aceto,
Intestinorum curat, uentrisq; dolorem.
Hoc etiam potu digestio tarda iuuatur,
Vnde minor fieri uis egestiua uidetur.
Assidue bibitur, uisum nocet, et genitale
Cauda iter, siccam humorem seminis intus.
Vnaq; si nimio turgens humore grauetur,

suspendit puluis combusti seminis eius
Appositus digitis, aut intus clystere fusus.
Acrior esse cinis radicum dicitur eius.
Rodit crescentes cinis hic in uulnere carnes.
Vulnera quę serpunt, et sordida uulnera curat.
Vlcera precipue membri curare uirilis
Dicitur iste cinis infusus sepius illis.
Olfactum reprimat singultum semen anethi,
Assatum et feruens si sepius olfacit ager.
Dicunt feruores oculorum tollere posse
Eius radices tritas prius, appositasq;
Vena spina per quas sanguis transit anum,
Apposuit hemorrhoidis si semen anethi
Vltum, curat ed, et condylomata soluit.
Elos oleo si decoquitur, medicabile reddit:
Illud precipue natis de frigore causis
Prodest, et capitis compefcit saepe dolorem.
Nerutorum laxat tensuras, frigora pellit.

A. MEDICIS.] Anethum quod gręce scribitur, calefacit tantum, ut secundi sit ordinis ab-

soluti: aut primi largi, ut tradit Valla ille Placentinus. Arefacientium autem secundi ordinis incipientis,
Valla p. a. uel primi finiti. Decoctum autem ex oleo, distrahendi & doctores amouendi, somnum excitandi uim ha-

bet, crudaque concoquit, tumoresque fedat. In tertio autem ordine est inter calefacientia & arefacientia;
& ob hoc contractis, concretisque huiusmodi impositum prodest, praesertim in pudibundis, & quę exul-

cerata, cicatrixque in genitalibus & uescicę loco. Humidius autem & minus calidum uiride, quod adhuc
in succo & perinde purgat magis quam aridum, magisque somnum excitat, distrahendi que uim minorem

habet. Anethum quoque, ut Plinius ait, ructus mouet, & tormina sedat: aluum sistit: epiphoris radices
illuminantur ex aqua uel uino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptum ex aqua, sedat crudita

res. Cinis eius uiam in faucibus seuat, oculos & genituram hebetat. Refertur.] Dicitur anethum, &
debet scribi cum th aspirato. Cyathos.] Paruum poculum, cyathus. Iuuenalis, Cardiacum nunquam cy-

athum missurus amico. Indicio ructus est.] Lege indicio ructus sit, ut stet uersus. Per hoc.] Osto-
machi. Sedatur.] Compefcitur. Nausea.] Appetitus uomendi. Prouocat.] Ciet, mouet.

Patiens.] Aegrotans. Digestio tarda.] Digerendi difficultas. Vis egestiua.] Vis egerendi. Af-
fidue.] Frequenter. Visum nocet.] Nocet oculis. Et recte uerbo (nocet) accusandi casum addidit.

Nam noceo te accusatio, quam datiuo iungitur: ut, noceo te uel tuis rebus: nocet uisum & uisui, oculos
& oculis. Vnaque.] Quod malum gręce Staphyle dicitur, & circa fauces sit, ut adnotatum est in urti-

cam. Combusti.] Concremati in puluerem. Clystere.] Mediam huius nominis syllabam debebat
producere, quam corripuit tamen. Acrior.] Fortior & uehementior ad repellendam uiam. Cinis.

hic.] Seminis anethi combusti. Vulnera quę serpunt.] Herpetas intelligit, quę sunt uulnera, quę ser-
punt. Quare legendum censeo, huiusmodi quę serpunt, & non uulnera: nisi intelligat phagedenas, quę tamē

dicuntur uulnera rodentia. Illis.] Huiusmodi membri uirilis. Reprimat.] Compefcit. Hemor-
rhoidis.] Est hemorrhoidis in sede, cum ora uenarum sanguinem fundunt: nec solum sedem uexat, sed in

ora uulue forminarum incidere etiam consueuit. Vltum.] Combustum. Condylomata.] Condy-
loma cum y gręco, morbus, qui nascitur circa coronam ani, siue podicis tuberculum insanabile. Frigo-

re.] Morbis, ut loquuntur, ex frigore causatis. Nerutorum tensuras.] Spasmodum intelligit.

DE BETONICA.

ETONICAM soliti sunt cestron dicere Graci.

Vrinis potata ciet, lapidib; repellit.

re. hemaphysica, cum posca sumpta, uiamen

Hydropicor; iuuat, cum uino melleq; sumpta.

De folijs eius tritum factum cataplasma;

Non modicum prodest oculis, quos leserit ictus.

illius succus roseo commixtus oliuo,

Auribus infusus, uarios fugat inde dolores.

Betonica puluis uario cum melle iugatus,

Hemphecos, ruffimq; iuuat, suspiria sedat.

Et stomach uarios sumptus iuuat ille dolores.

si febrile, ex calida: cum uino, si febris absit.

Cum mulla bibitis idem puluis, mouet aluum.

Cum sale, contritis folijs, cataplasmate facto,

Vulnera curabis, fuerint quę facta recent.

Cratę fractura capitis hac sola medetur.

De folijs eius elixir sit cataplasma

Veile non modicum uariis uicijs oculorum.

Restringit lacrymas oculorum, mansa uel hausta.

Hac etiam catigo solet metuenda repelli,

Aequo si rube fuerit cum pondere iuncta,

Et sic cum lymphā sumatur trita repenti;

Sic oculis nocuum sanguis per fabriciora

Dicitur expelli; sit tamina libera reddit.

Sumpta hac cum tepida purgatur uomica diu.

si febrile, & hac uomica tepide purgabit sumpta profunda pectoris

(quę uomica pectoris uulgit.)

pectoris & morbi potu. curantur eodem.

Splen tuar. silius decoctio sumpta, iecurq;
Vicia betonica socianda quaterna, uerusti
vini cum cyathis tribus; atque his addito grana
viginti septem piperis: simul hac bene tria
Haustisq; purgabitur renes, pelleniq; dolores.
Vicia cum cyathis calida potata duobus,
Dicitur immodicum uentris sedare dolorem.
Hec suffum cum melle fugat, uentrem quoque mollit.
Vna quaque die febre si uerabitur eger,
Vicia iungatur plasmaginis una, duobus
betonica, succum tepida contrita bibatur - sic cum/
Antea quoniam febris praenuncia frigora fiant.
Vicia betonica calida cyatho resoluta
Prodest hydropicus, si sit potata frequenter.
Radicum pulvis cum mulla tritus & haustus,
Humores uelut helleborum uomitu cito purgat.
Bis binas drachmas praecipit Plinius harum
Radicum dare cum passo, mulla ne bibendas;

Praecipue phlegma uomitu purgabitur isto.

Cum mulla bibitus praedest pulvis foliorum

Ruptis, atque steras potus tenax iste cadentes.

Cum uino sumptis obstat potata uenenis,

Praecipue semen: quod si desit, datur herba.

Vicia betonica cum uino sumpta repenti,

Ictericoccurat: cum mulla, menstrua purgat.

Pandere uero faba pulvis cum melle uoratus

Post coenam, stomachum inuat, ut bene digerat escam.

Si de betonica uiridi sit facta corona,

Circa serpentes (ut Plinius asserit auctor) lib. 25. cap. 8.

Audebunt nunquam positam transire coronam:

Sed morsu proprio perirent, & uertere caude.

Omnibus antidotis Memiacus eam sociari

Praecipit, ut stomacho magis herbis omnibus aptam.

Plinius hanc, inquit, qui secum gesserit herbam,

A nullo poterit nocuo medicamine ladi.

Et dicunt, quod ea cum uino saepius hausta,

Plumbens abscedat color, & melior reuocetur.

BETONICAM.] Haec herba graece *νεσπορ* & *psychotrophon* dicitur, ut scribit Plinius, & uim fe-
candi habet. Nam in renibus calculos dissipat, & pulmonem, & thoracem, & iecur purgat & abstergit, &
menstrua ciet, comitatemque curat morbum, & fracturas, & luxationes, acuta febre affictos, & ischiadi-
cos pota iuuat. nominatur etiam ferratula. Haemophthificis.] Sanguinem spuentibus. Iuuamen.]
Opem auxilium. Posca.] Commixtione aquae & uini. Hydropicos.] Morbo intereunte laboran-
tes. cuius mali causas Serenus his uersibus reddit:

Corrupti iecoris uitio, uel splenis, acerbis

Crescit hydrops: aut cum siccata febre medullae,

Atque auidae fauces gelidum traxere liquorem;

Tum lympham interius uitio gliscente tumescit,

Secernens miseram proprio de uiscere pellem.

Inde.] Ex auribus. Iugatus.] Sociatus, comixtus. Haemphicos.] Quibus collectio facta est in
pulmone, uel sanguinem spuentes. Nec legendum est embecos. Cum mulla.] Potione ex uino, mel-
leque confecta. Dicimus aut mulla & mulsum, quae tamen quidam distinguunt, dicentes: Mulla est potio
ex aqua & melle confecta: sed mulsum uinum, attico melle temperatum. Lumina.] Oculos. Ouidius,
Parcitur luminibus. Elixis.] Coctis. Aequo.] Aequali. Lympham tepenti.] Aqua tepida. Lu-
mina libera reddit.] Oculos liberat a caligine. Vomica.] Tumor in corpore purulentus, a uomen-
do dicta. Plautus accipit uomica pro marsupio nummis adimpleto. Quid, inquit, in hoc cello tibi tu-
met? Responder uomica est. Passo.] Genere liquoris, quod ex uua passa cogitur. Phlegma.] Pi-
tuitam. Circa serpentes.] Mirum est quod hic ex Plinio recitat. Verberere.] Ictibus. Plum-
beus.] Liuidus.

DE SABINA.

RATHEOS est graece, sabina uocata latine.

Sicca calensque eius uis est, & tertius illi

Est in utroque gradus. uulnus, cum melle, uel ulcus

Exsiccat, sordes quoque purgat eorum.

Sic inuat anthracas, bona quae plebs ulcera dicit.

Menstrua deducit, corruptos extrahit alio

Conceptus, si cum uino sit sumpta frequenter:

Vel si tria prius matris subditur ori.

Carotis admixta, curem facit esse mentem.

Omnibus & morbis praedest de frigore factis.

Illius in uino uel aqua decoctio, curat

Quos uerigo nocet, si lotum sit caput inde,

Herbaque temporibus, & fronti cocta ligetur.

Duplum sabinae, si desint cinnama, poni

In medicamentis iubet Oribasius auctor

BRATHEOS.] Herba sabina (inquit Plin.) brathy appellata a graecis, duorum generum est. Al-
tera tamaricis similis folio est altera cupressi. Qua ex re quidam Creticam cupressum dixerunt. A mul-
tis suffitus pro thure assumitur. In medicamentis uero duplicato pondere, eisdem effectus habere quos
cinnamum traditur. Collectiones minuit, & nocuas compescit. Illius ulcera purgat. Partus emortuos
apposita extrahit & suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & uino pota, regio morbo
medetur. Gallinaei generis pituitas fumo eius herbae sanari tradunt. Sicca calensque.] Hoc est sicca
& calida est sabina in tertio gradu & ordine. Bona quae.] Expositio praecedentis. Menstrua.]
Quae muliebria & menses. Deducit.] Fluere facit. Corruptos conceptus.] Emortuos partus ap-
posita extrahit & suffitu, ut Plinius docet. Carotis.] Carotum dicitur quod uulneribus superpo-
ni solet. Inde.] Ex coctione. Temporibus.] Hoc hic accipitur in eo significato, in quo accipitur
apud Vergilium primo Georgicorum, ubi poeta ait, Cingens materna tempora myrto.

AE MILIVS MACER

DE PORRO.

N multis causis usus medicamine porri
Dicitur Hippocrates, medicina maximus auctor.
Istius succum solum dedit ille bibendum

Approis, qui reijciunt, spurant uel cruorem,
Quos hemophthificos soliti sunt dicere Graeci.
Cum galla dant hunc alij, thuris uel farina,
Aut geminis drachmis porrorum, seminis unam
Apponunt myrrha, uino quoque tria resoluunt.
Pre cunctis alij dicunt haec sumpta iuuare.
Manantemq; potes naris retinere cruorem,
Vngas si nates intus medicamine tali.
Contractas uulvas succo curabis eodem.

Nota. Reddit fecundas masculum per sepe puellas.
Vlcera cum melle tritum iuuat, apposuitq;
Humorum capitis si distillatio fiat.
Pulmones, pectusq; nocem, uocemq; canoram;
Indeq; constringat iussu praecordia tadens,
Cum pulsat succum porri sorbere iuuabit.
Et per se solum prodest his omnibus ipsum.
Si porri partes in lymphis coactis albas,

Sic ut aquam primam mices, addasq; secundam, Nota
Vilis eius aqua dero in potio uentri.
Dicitur haec eadem cum uino stringere uentrem.
Cum uino potus datur his quos legerat anguis,
Quodlibet aut animal fundens lethale uenenum.
Nec minus his prodest, si uulneribus superaddas
Sic uelut emplastrum porrum cum melle subactum.
Commixtus porri succo lacti muliebri,
Et bibicus, cussim fertur sanare uerustam.
Et uariis uitis pulmonum subuenit idem.
Auris compescit cum capra felle dolorem.
Praestat idem pariter cum mulso mixtus, et auris
Infusus tepidus. fungit, si manditur, obstat.
Eius iungatur succo pars tertia mellis,
Et sic per naves tepidum fundendo, ut aures,
Immensum poteris capitis sedare dolorem.
Ex uino bibat hunc, lumborum quem dolor angit,
Dicitur uelut tali nihil esse dolori.
Fracturas solidat cito, duritiasq; relaxat
Apposuit uulnusq; recens cito cum sale claudit,
Si crudum fuerit sumptum, lenax ebrietatem.
Sic uenerem stimulat, sic durum molliet alium.

In multis. Porrum Graeci praecon dicunt. Porrorum alij sunt Tarentini, qui & sectui dicuntur
alij Aricini, qui & capitati. Porro lectuio profluuium sanguinis lisi in naribus, contrito eo obnatis, uel
galla mixto, aut menta: item ex abortu, profluuium, potio succo cum lacte mulierum. Tussi etiam ue
teriar pectoris & pulmonis etiam uitijs medetur. Illitis folijs sanantur ambusta epiphyrides: ita uocatur
ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim humor emanans. Quidam eodem nomine appellant
pustulas lucentes, ac noctibus inquietantes. Et alia ulcera cum melle trito. Vel bestiarum morsus ex
aceto, item serpentium. Aurium uero uitia cum felle caprino, uel pari mensura mulsi. Stridores, cum la
te mulieris. Capitis dolores, si in naves fundatur, dormituris uel, in aurem duobus furei cochlearibus, uno
mellis. Succus & ad serpentium scorpionumque ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolo
res cum uini hemina potus. Sanguinem uero excreantibus, phthificis, distillationibus longis, uel succis,
uel ex ipso cibis prodest. Item morbo regio, uel hydropidis, & ad renum dolores, cum prisanz succo,
acerabuli mensura. Idem modus cum melle, uulvas purgat. Tostus uero editur & contra fungorum ue
nena, imponitur & uulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietates discutit. Sed oculorum aciem
hebetare traditur, inflationem quoque facere, quae tamen stomacho non noceat, uentremque molliat. Vo
ci splendorem affert. Capitato maior est eadem effectus. Sanguinem reijcientibus, succus cum caule aut
thuris farina, uel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, uulvasque contractas aperiri pu
tat, fecunditatem etiam foeminarum hoc cibo augeri: contritum ex melle, ulcera purgare, fuffim & distil
lationes thoracis. Pulmonis & arteriae sanat uicia datum in sorbitione prisanz, uel crudum, praeter capi
ta sine pane, ita ut alternis diebus sumatur, uel si purimenta excreentur. Sic & uoci uel ueneri fominoque
multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt, & inflationes ueteres. Cortex decoctus,
illitusque, inficit canos. Hippocrates. Et haec est proba lectio. Medicinz. Laus Hippocratis.
Hemophthificos. Graece enim sic uocantur, qui sanguinem spuiunt, ut etiam supra adnotatum est.
Galla. Fructu quercuum. Nec pauciora genera gallae fecimus (inquit Plinius) solidam, perforatam;
item albam, nigram, maiorem, minorem. uis omnium similis. Optima comagena. Excrecentia in corpo
re tollit. Profluit gingiuis, uulgis, oris exulcerationi. Cremata & in uino extincta, coeliacis, dysentericis illi
nuntur. Paronychijs ex melle, & unguibus scabris, pterygijs, ulceribus manantibus, condylomatibus, uulne
ribusque phagedenica uocantur. In uino autem decocta, auribus instillatur, oculis illinuntur. Aduersus
eruptiones & panos cum aceto. Nucleus commanducatus dentium dolorem sedat. Item intertrigines,
& ambusta. Imaturae ex his potes, lienem consumunt. Eadem cremata, & aceto falso extincta, menses
sistunt, uulvasque proclidentes potu. Omnes capillos denigrauit. Geminis. Duabus. Naris cru
rem. Sanguinem e naribus fluentem. Contractas. Constrictas. Reddit. Facit concipere puel
las, & matres fieri. Pectusque nocens. Nocens protulit, sicut nocet, & hoc quidem latine. Vtrum
que enim recte dicitur, pectus nocens, & pectori nocens. pectori tamen hic legi non potest. Lympha.
Aqua. Aquam mutes. Sic etiam Plin. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt. Stringere. Quae
Cohibere. Lethale. Mortiferum. Lacti muliebri. Quod habet mulieres. Vetustam. Quae
quis longo habuit tempore. Subuenit. Opitulatur & prodest. Compescit. Reprimit & sedat.
Fungis. Vlcerebus in sede nascentibus, fungis terrestribus non dissimilibus. Obstat. Impedim

ad no. uulvas, uel
galla mixto, aut menta:
item ex abortu, profluuium,
potio succo cum lacte mulierum.
Tussi etiam ueteriar pectoris & pulmonis etiam uitijs medetur.
Illitis folijs sanantur ambusta epiphyrides: ita uocatur
ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim humor emanans.
Quidam eodem nomine appellant
pustulas lucentes, ac noctibus inquietantes.
Et alia ulcera cum melle trito.
Vel bestiarum morsus ex
aceto, item serpentium.
Aurium uero uitia cum felle caprino, uel pari mensura mulsi.
Stridores, cum late mulieris.
Capitis dolores, si in naves fundatur, dormituris uel, in aurem duobus furei cochlearibus, uno mellis.
Succus & ad serpentium scorpionumque ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum uini hemina potus.
Sanguinem uero excreantibus, phthificis, distillationibus longis, uel succis, uel ex ipso cibis prodest.
Item morbo regio, uel hydropidis, & ad renum dolores, cum prisanz succo, acerabuli mensura.
Idem modus cum melle, uulvas purgat.
Tostus uero editur & contra fungorum uenena, imponitur & uulneribus.
Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietates discutit.
Sed oculorum aciem hebetare traditur, inflationem quoque facere, quae tamen stomacho non noceat, uentremque molliat.
Voci splendorem affert.
Capitato maior est eadem effectus.
Sanguinem reijcientibus, succus cum caule aut thuris farina, uel acacia datur.
Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, uulvasque contractas aperiri putat, fecunditatem etiam foeminarum hoc cibo augeri: contritum ex melle, ulcera purgare, fuffim & distillationes thoracis.
Pulmonis & arteriae sanat uicia datum in sorbitione prisanz, uel crudum, praeter capita sine pane, ita ut alternis diebus sumatur, uel si purimenta excreentur.
Sic & uoci uel ueneri fominoque multum confert.
Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt, & inflationes ueteres.
Cortex decoctus, illitusque, inficit canos.
Hippocrates. Et haec est proba lectio.
Medicinz. Laus Hippocratis.
Hemophthificos. Graece enim sic uocantur, qui sanguinem spuiunt, ut etiam supra adnotatum est.
Galla. Fructu quercuum. Nec pauciora genera gallae fecimus (inquit Plinius) solidam, perforatam; item albam, nigram, maiorem, minorem. uis omnium similis. Optima comagena. Excrecentia in corpore tollit.
Profluit gingiuis, uulgis, oris exulcerationi. Cremata & in uino extincta, coeliacis, dysentericis illinuntur.
Paronychijs ex melle, & unguibus scabris, pterygijs, ulceribus manantibus, condylomatibus, uulneribusque phagedenica uocantur.
In uino autem decocta, auribus instillatur, oculis illinuntur.
Aduersus eruptiones & panos cum aceto. Nucleus commanducatus dentium dolorem sedat. Item intertrigines, & ambusta. Imaturae ex his potes, lienem consumunt. Eadem cremata, & aceto falso extincta, menses sistunt, uulvasque proclidentes potu.
Omnes capillos denigrauit. Geminis. Duabus. Naris cruorem. Sanguinem e naribus fluentem. Contractas. Constrictas. Reddit. Facit concipere puellas, & matres fieri. Pectusque nocens. Nocens protulit, sicut nocet, & hoc quidem latine. Vtrumque enim recte dicitur, pectus nocens, & pectori nocens. pectori tamen hic legi non potest. Lympha. Aqua. Aquam mutes. Sic etiam Plin. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt. Stringere. Quae Cohibere. Lethale. Mortiferum. Lacti muliebri. Quod habet mulieres. Vetustam. Quae quis longo habuit tempore. Subuenit. Opitulatur & prodest. Compescit. Reprimit & sedat. Fungis. Vlcerebus in sede nascentibus, fungis terrestribus non dissimilibus. Obstat. Impedim

DE HERBIS.

DE CAMOMILLA.

ANTHEMIV magis comēda; laudibus auctor
Asclepius: quam camimellam nos, uel camomillam
dicimus: hac multum redolens est, & brevis herba:
Herbe rari foliis, quam iusto nomine uulgus
Dicit amariscam, quod forteat, & sit amara,
Ve collata sibi uix discernatur odore.
Auctores dicunt, species tres illius esse.
Quas solo florum distingui posse colore,
Tradunt; est cunctis medicis flos aureus illis:
Sed uariis folijs flor circumcingitur ille;
Albi, uel nigri sunt, purpurei uel coloris.
Dicitur anthemion proprie, cuius foliorum
Purpureus color est, maiorq; & fortior hac est.
At leucanthemion, folijs deprehenditur albis:
Medicus crysanthemion uis omnibus illis
Sicca calensq; gradu primo conceditur esse.
Pronocat urinam cum uino quolibet hausta.
Vesica frangit lapides, & menstrua purgat,
Si fouetur aqua matrix qua cocta sit herba;
Aut sicum uino poterit sapius illa.
Tormina sic sedat, stomachiq; inflatio potu

Pelletur rati. Squamas de uentibus auferre,
Sicriam apponas solam, mellis uel iugatam;
Ictericis prodest eius decoctio sumpta.
Et mirē prodest iectis potius querelis.
Pellere cum uino potius refertur abortum.*
Hac oleo cocta foveas si febricitantem, Nota.
Frigus depelles, febrem quoque saepe fugabis.
Vequine purgantur hypochondria turgida rati.
Pestiferos morsus serpentum, pondere drachma
Cum uino, prohibet anthemis sumpta nocere.
Plinius affirmat hanc quadraginta diebus
Vnaquaque die bis sumptam pondere drachma,
Cum geminis cyathis uini subtilis & albi,
Cum lacte sensim totum purgare licentem.
Aegilopas curat, si quis commastice illam,
Et sic apponatur sic ulcera sordida purgat.
Ebullire caput febris feruore grauatum
Saepe solet, uel collectis humoribus in se,
Vlcera producit, uocat exanthemata Græcus.
Hac decocta uirens oleo camomilla repellit.
Quod si defuerit uiridis, maceretur aceto
Et caput inde lauet. nullum magis adiunat unguen.

ANTHEM.] Anthemis, ut scribit Placentinus ille, ut alij antimis, uel chamæmelum, calefacit &
arefacit in primo ordine, tenuiumque partium est, & perinde uim distrahēdi, & rarefaciendi, & deprimen
di summittendique habet. Si igitur uiridis fuerit, expedit ex oleo coquere, in quo flos sub sole detentus:
sin arida, pauco aspergatur aceto; inde cocta cum oleo, efficitur commoda, ubi necdum materia perfecte pa
cata est, quæ ad caput euoluebatur: distrahit namque quæ in capite, aliamque non attrahit, quod nullum
aliud facit medicamē. Necepsio autem Aegyptius iubet florem purum ipsius chamæmeli pubescentem
colligere, terereque in mortario, beneque subigi in fidelia, conficique pastillo, mediocres, & in umbra
arefieri & reponi: cum eorum usus aduenerit, pastillum sumi unū, immitti in oleum primarium, quan
tum satis sit, quod expressum primo fuerit: inde inungi corpus a capite usque ad imos pedes totum febrici
antium; inde regi ægrum, & foueri. tum ait excitari sudorem salubrem, ac febre liberari: foreque ob hoc
idoneum peregrinantibus remedium: quia facile quiuis secum habere potest, & absque impendio sibi ca
uere, idque experientia plurimum. Alij quoque eruum esse attestantur, maximeque congruere meatibus
aperiendis. Iubet quoque is pastillos in aqua calida dilutos potare febris correptos drachmæ quantitate.
Chamimolam.] Chamæmelon (ait Perottus) est herba uulgo nota, ab odore malo sic dicta, quam me
dici recentiores chamomillā barbarē uocant. **Amariscam.]** Quæ est mali odoris herba; unde ait quod
forte at, id est, male oleat. **Collata.]** Comparata. **Purpureus.]** Qualis est purpura. **Qua.]** Aqua.
Iugatam.] Additam. **Ictericis.]** Morbo regio laborantibus. **Querelis.]** Doloribus, propter
quos queruntur homines. **Hypochōdria.]** Hypochōdria uocant nonnulli partem corporis ubi illa
alij lagaron. Hæc Perot. ille in Cc. **Aegilopas.]** Aegilopæ abscissus est pusillus, oblongusque sub ip
sum palpebræ torulum: officit luminibus. De quo malo Cor. Cel. lib. 7. c. 7. Etiamnum, inquit, in angulo
qui naribus propior est, ex aliquo uitio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue distillat, cui
græci uocant, idque assidue male habet oculum: nonnunquam etiam ex eo osse usque ad nares pene
trat, idque interdum natura carcinomatis habet. **Exanthemata.]** Quæ ulcera græcis uocat exanthe
mata. De quibus Cor. Cel. lib. 5. cap. 22. At pustulæ, inquit, maxime uernis temporibus oriuntur. Earū
plura genera sunt. Nam modò circa totum corpus partem uel aspreo quædam sit similis his pustulis, quæ
ex urtica, uel sudore nascuntur, quæ Græci uocant; eaque modò rubent, modò colorem cutis non ex
cedunt. Nonnunquam similes uariis oriuntur &c. **Vnguen.]** Vnguentum. Maxime tamen notan
dum, quod tussim curat, si quis succum porricum prifana sorbeat. Est autem prifana, hordeum decorti
catum, uel hordei succus siue aqua. prifanarium, uas in quo coquitur.

DE NEPETA.

ERBAM quam nepetam uulgari more uocamus,
Hanc medici græco catamphthi nomine dicunt.
Sicca calensq; illi uis est, & rarius item illi
Est in utroque gradu. Cum mulla tria repenti
sumpta, totum sudore resoluit corpus
Ex oleo quo sit decocta perunze fricando
illam, uenit a mensis qui frigora febris,

Non facit tantum, sed febrem saepe repellit. Nota.
illi qui schiasim patitur, coxe supperadde
Contritam uiridem, fertur comburere pellem,
Et sic humores siccando, fugare dolores.
Apposita, potiusq; suo cito menstrua purgat.
Est tertia species, elephantiæq; uocatur;
Quæ cunctis morbis maior sic esse uidetur,
Ut maior cunctis elephas animantibus extat.
Hunc in principio morbum potius calaminthes

+ Carnis. Aegyptiorum, per Rhenium, per Siliam, per Siliam.

AE MILIVS MACER

Cum uino curat, humores extenuando.

Serpentum morsus superaddita trita, nocere

Non sinit, et pellit cum uino sumpta, uenena.

Potus, et iniectus, lumbricos emicat, eius

Succus, et in membris uermes necat omnibus ipse.

Si mel iungatur huic cum sale, plus operatur.

Cau. Si bibi hanc pragnam, aut tritam subdit, abortit.

Purgat et istericos cum uino, curat anhelos,

Asthmaticos medici quos Græco nomine dicunt.

Et iccoris morbos cum uino mitigat hausta.

Hocq; modo ueterem lateris iuncta illa dolorem.

Atque cicatrices nigras superaddita, trita, nota

Hæc naturalem reddit purgando colorem.

Vino decocta facit hæc melius cataplasma.

Compescit stomachi cum uino sumpta, dolorem.

Fumus de domibus serpentes effugat eius.

Tollere singultum cum uino dicitur hausta.

Hocq; modo ueterem cohibet potata frequenter.

HERBAM.] Nepeta græce *νεπέτα*, est renuium partium essentia, & calida & arida temperamen-

to, in tercio ferè ordine utraque in qualitate. Hæc pota arida, ob multum calefaciens satis sudorem elicit,

& distrabit, & arefacit uniuersum corpus. Ob hoc, ipsa quidam usi sunt, ad sedandos febrium rigores ex-

trinsecus apponendo, ex oleo coquentes, & iungentes totum corpus, ualide fricando, ut interna petat.

necnon ilibus accommodant, & apponunt ischiadicis, utpote præsentaneum remedium. attrahit nanque

funditis, ac contremittit ad internam cutem, & uniuersum eum concalefacit articulum. Subuenit fracturis, &

spasimis: lumbricos perimit, cocta cum uino: & cataplasmate iposita, cicatrices atras reddit albicantes, uritque

manifesto cutem: & menstrua, pota atque apposita, prouocat efficaciter. Præsentaneum quoque medica-

men elephantiasis correptis, non modo quod distrabat tennes humores, sed etiam quod attenuet & secet

ualide crassos humores, qui hanc ægritudinem gignunt. Ita etiam cicatrices illustrat nigras, & distrabit in-

terim quoque hypopia. Melius autem facere illi existimantur, qui in uino coquentes ipsam apponunt

uiridem potius, quam aridam. Nam arefacta ualidior est, ad urendumque expeditior. Superimponitur

autem immoribus uirulentis atque pestiferis, ob amaritudinem perimens lumbricos, & serpentes, assum-

ptus & potus succus necnon in auribus & huiusmodi uermes absumit. Iuuat autem anhelosos & arqua-

tos, abstergendo ac purgando iccoris oppilationes. Ad hæc autem cuncta iam dicta, efficacior montana

est. Orpheus autem ait, succum ipsius cum æquali rosaceo cum psimmytho solutum, soluere crassitudi-

nem, & inunctum, curare igni exusta. Illud admirabile uideri, quod ne quidem mali uestigium appareat,

pilosque educit locus. Cum cimolia autem & aloe æqualibus succum exprimendo, & inducendo fron-

ti atque temporibus, pacaueris statim capitis dolores. auctor Valla Placentin. In utroque.] Tam sic-

citatem quam calorem. Gradus.] Ordo. Sudore reuoluere.] Id est, facere ut totum corpus sudet, & su-

dorem emittat. Metuit qui.] Qui febri obnoxius est. Fertur.] Dicitur. Menstrua.] Fluxum

sanguinis. Lepræ.] Est (inquit) species lepræ, quæ elephantiasis dicitur, per similitudinem sic dicta,

quæ exponitur, cum dicit, Quæ cunctis &c. Græci *ἐλεφαντία* appellant, de quo Celsus lib. 7. cap. 25. Ignos-

tus autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem *ἐλεφαντία* græci uo-

cant, isque longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque uitari dicantur. Summa pars

corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuer-

titur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque quasi squamis quibusdam exasperatur; cor-

pus emacrescit; os, furæ, pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tu-

more conduntur; febricula oritur, quæ faciliè tot malis obrutum hominem consumit. Protinus ergo inter

initia, sanguis per biduum mitti debet, aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tum quanta sustineri po-

test, inedia est: paulum deinde uires reficiende, & ducenda aliis. post hæc, ubi corpus leuatum est, utendu

est exercitatione, præcipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationi-

bus euocandus; frictio adhibenda moderandumque inter hæc, ut uires conseruentur; balneum rarum esse

debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus. Vinum præterquam primis diebus rectè da-

tur. Corpus, contrita planago, & illita, optime tueri uidetur. De elephantia sic ait Serenus, ut sequitur:

Est elephas morbus, tristi quoque nomine dirus,

Non solum turpans infandis ora papillis,

Sed cito præcipitans funesto fata ueneno.

Huic erit aduersus cedri de cortice succus,

Mustellæque cinis, uel fusus sanguis ab illa.

Nonnulli dixerunt ferum prodesse bibendo.

Mentastri folium potu, appositumque salubre est.

Nec frustra bulbos & sulphura iungis aceto,

Præterea nitrum debes cum melle iugatum

Spargere lacte bouis, utas sic ungere frontes.

Cerufam & chartam (quam gens Aegyptia mittit)

Thura simul, misceque oleum, quod flore rosarum

Conditum est; line sic faciem, sic recde salutem.

Calaminthes.] Nepetæ. Lumbricos.] Vermes. Negat.] Non permittit. Abortit.] Abor-

tum facit. Istericos.] Morbo regio correptos. Anhelos.] Anhelosos & difficulter anhelantes, quos

græci asthmaticos uocant. Compescit.] Sedat, reprimat. Fumus.] Nota, ut etiam cetera, dignum.

Venerem cohibet.] Refrenat cœundi appetitum; quod quidam fortassis melius fieri putant urberibi-

bus

bus; cum tamen contrarium etiam constet. Hominum naturam extra reliquorum modum admirantibus, succurrit exemplum raro alias auditu euentus. Siquidem non multis abhinc annis iuxta quendam in ueneris ingenij stupendi maxime, quodque uix impetret fidem, ex adiuratis compertum est, qui quod pluribus affectus fuisset plagis, eo impetuosi ardentiisque in concubitu ferebatur preceps. Fuit omnino mira res: nescires, utrum affectaret audius uerba, an coitum: nisi quod illorum mensu libidinis uoluptas constabat. Proinde extensis se precibus difflagellari exposcebat, pridie quam id pateretur, flagello aceti asperitate obdurato: quod si uerberator lentius agere foret uisus, uelut extrinsece rabie, conuicijs incessebat: nec factum sibi satis arbitrabatur, nisi inter cedendum sanguis sese ostendisset. Vnus, optimus mortalium inuentus, qui eodem impetu in supplicium ferretur, ac delicias: qui que inter tormenta sensuum titillationes, ac astutem pruritum uel expletet, uel incederet. hec Coelius antiq. lecti. lib. 6. cap. 36. Frequenter.] Quia unus potius tanto monstro domando non sufficit, cum interdum nihil remediorum quidquam aduersus tam immanem bellum ualeat. Plinius, unde auctor noster fere omnia sumpsit, lib. 20. cap. 14. sic scribit de nepeta: Nepeta quoque uires contra serpentes habet. Fumum ex ea nidorumque fugiunt, quam & subternere in metu obdormitur, utile est. Tusa zgilopis imponitur, & capitis doloribus recens cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius in stillatus naribus supinis, profusum sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine in passio tepido gargarizata, anginis medetur.

DE PVLEGIO.

ERVIDA pullegij uis, sicca; dicitur esse. Tertius a medicis datus est gradus huius in utroque.

Cal. Septius hanc herbam si praegnans sumit, abortit.

Menstruus deducit cum uino sumpta repenti.

Hanc modo raras haec extrahit herba secundas.

Hoc nomen quia non notum reor esse quibusdam,

Exponam tibi quid nomen significetur.

Vi nondum natus, testa circumdatur oui

Pullus; sic infans matris uestitur in aluo

Quodam pellicula matris de semine facta.

Hanc nescis rumpit, quasi testam pullulus oui,

Ipsi pelliculas medici dixerunt secundas,

Quod mox expositos natura iure sequatur.

Et si plus iusto, uicio cogente, morantur;

Aut mors subsequitur, dolor aut qui uix toleratur.

Ipsi pullegium praedicta more repellit.

Cum sale contritam melli si iunxeris illam,

Virgine contractis potes hoc succurrere morbis.

Illius pulvis sumptus cum melle, uel haustus,

Pectus humores uiscosos exenuare,

Et per spina potest illos educere mire.

Nausea, uel morsus stomachi curabitur illa

Cum posca sumpta, uel aceto quod sit aquosum.

Cum uino nigram choleram posca repellit.

Sicque uenenatis serpentum morsibus qstas.

ERVIDA.] Hoc est, pullegium est calidum & siccum in tercio gradu. Magna societas cum menta ad recreandos defectos animo pullegio, cum furculis suis in ampullas uitreas aceti utrisque deiectis. Quae de causis dignior est pullegio corona uertigini quam & rosis, tubicinis nostris pronuntiata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur lenare. Quia & osfactu capita tueri contra frigorum aestusque iniuriam, & ab his traditur: neque estuare eos, qui duos est pullegio furculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cum polenta & aceto. Foemina efficacior. Est autem haec flore purpureo. Mas candidum habet. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac uentris dolorem. Stomachi autem ex aqua interaliones sistit, & uomitiones cum aceto & polenta. Intestinarum uicia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit, ex uino: & si aminum sit, & calculos, & interiores omnes dolores. Ex melle & aceto fectat mentum, & secundas. Vuluas conuersas corrigit. Defunctos partus eijs cit. Semine obmutescensibus osfactu admouetur. Comitialibus in aceto cyathi mensura datur. Si aque insalubres bibende sunt, tritum inspargitur. Salsitudines corporis, si cum uino tradatur, minuit. Nervi causa & in contractione cum sale & aceto & melle conficitur opisthotono. Imbibitur ad serpentium icus decoctum. Ad scorpionum, in uino tritum, maxime quod in ficis nascitur. Ad oris exulcerationes, ad tussim efficacior habetur. Flos recentis incensus, pulvis necat odore. Xenocrates pullegij ramum lana inuolutum, in tertianis ante accessionem osfactum dari, aut stragulis subijcit, & ita collocari egrum, inter remedia tradit. hec & multa alia Plinius Nat. hist. 20. cap. 14. Deducit.] Fluere facit muliebria, quae

Si per uim febris, nimio ue fluore cruoris,

Aut aliquo casu subito defecit ager,

(Quod solet a doctis medicis malefactio dici)

Pullegium ualido tritum iungatur aceto,

Naribus egroti sic apponatur, odore

Solo confestim dicunt releuare tunc

Gingiuas sicci pulvis confirmat, & uesti.

Apposita uiridem dicunt sedare podagram;

Et quosvis alios solet emendare tumores,

Si superaddatur repide permixta polente.

Addita cerotis, papulas de corpore tollit.

Spleneticis multum, superaddita cum sale, prodest.

Eluxatur, si quisquam saepe repenti

Illius abluatur, pruritus non parietur.

Et sic matricis poteris curare tumorem.

Tussim compescit, cum uino sumpta repenti:

Et sic urinam compellit reddere largam.

Et magis, ex uino si sit decoctio facta,

Aut oleo mixtam contrariam si superaddas.

Si radix acris trita iungatur aceto,

Sedabit quosvis superaddita saepe tumores.

Obstat serpentum cum uino sumpta uenenis.

Et sic assumptum, uenerem stimulare facientur.

Sic quoque pulmonis prodest, iecorisque querelis.

Et sic nutritia sumptum, lac praebet abundans.

Herba uirens curat morsus cum melle caninus

Si superaddatur, & uino mixta bibatur.

AE MILIUS MACER

antea fluxum naturae negabant. Hoc nomen.] Secundas intelligit, & doctè nominis significationem explicat. Expositos.] Infantes in lucem datos. Istas.] Secundas sequi morantes. Vnguine.] Vnguento. Viscosos.] Qui multorum malorum, etiam leprae causa dicuntur à medicis. Defecerit.] Hoc non simpliciter intelligendum est de pulegio, sed de pulegio cum menta: quod docemur ex Plinio, qui ut supra adscripsimus, ait: Magna societas cum hac, id est, menta ad recreandos &c. Podagram.] Podagram ob doloris atrocitatem, Serenus uocat rabidam, cum dicit:

Quaedam sunt rabidae medicamina digna podagra,
Cuius tricenae species Epidaurius ipse
Dixit inesse Deus: requiem tamen indere morbo
Fas erit, & tristem saltem mulcere dolorem.

Cerotis.] Quae uulneribus superponi solent. Papulas.] Pustulas, tubercula. Spleneticis.] E splene laborantibus. Compellit reddere largam.] Large facit mingere.

DE FOENICULO

FOENICVLVM medicum calidum, siccumque secundo
Dicunt esse gradus; marathrum Graeci uocat illud.
Cum uino cunctis obstat hoc herba uenenis.

Hac martha serpens oculos caligine purgat.

Indeq; compertum est, humanis posse mederi

illam luminibus, atque experiendo probatur.

Radix succus mixtus cum melle recenti,

Pulsa reddit eos omni caligine claros.

Expressus marathri uiridi de semine succus,

Soleq; siccatus, magnum medicamen habetur,

A quo quicunque uelis oculorum pellere morbos.

Auribus infusus, uermes succus necat eius.

Remibus in praisana radix decocta medetur.

Cum uino fugat hydropicos potata tumores.

Sicq; uenenis obstat morsibus illa.

Sic quoque pulmonis obstat, necorisq; querelis.

Et sic nutrit sumpta, sit copia lactis.

Cum uino uel aqua radice coctio sumpta,

Nephriticis, & uesicae morbis medicatur.

Urinam purgat, & menstrua sumpta resoluit,

Vel si tria super pectus hac herba ligetur,

Nausea cum uino sumpta sedabitur illa.

Uentrem stomachi cum lymphâ mitigat hausta.

Radix illius uino decocta, dolores

Fomento curat, patitur quos uirga uirilis.

Hoc quoque si iungas oleo, facit, hocq; perungas.

Ictus, uel factos subito quoscunque tumores,

Apponas triam iuncto sedabis aceto.

Semen cum uino bibitur, ueneris mouet actus.

Hocq; modo lateris diros sedare dolores

Dicunt, aut herba si sit decoctio sumpta.

Tradunt adactores, eius iuuenescere gustu

Serpentes, & ob hoc senibus prodesse putatur.

FOENICVLVM.] Hanc herbam Graeci uocant, & uehementer calefacit, tanquam ex ter-
tia iam sit potentia; sed arefacit in primo ordine, ob hoc, lae gignit quod non admodum arefaciat. Suffu-
sionibus opitulatur; eadem ratione nimis mingendi, & menstrua agit. Est etiam aliud marathrum, quod à
magnitudine hippomarathrum uocant, cuius radix & semen magis arefacientis est potestatis, quam dome-
sticum; cuius semen est ut milium; id calidius opitulatur, menstrua & urinam mouet. Est & alterum hip-
pomarathrum, cuius semine rotundum & acutum, coriani simile, potentia imbecillius alio hippomarathro.
Placentinus ille auctor, quod maxime sumpsit ex Dioscoride. Humanis luminibus.] Oculis hominum.
Pulsa.] Fugata. Marathri.] Foeniculi, quod grammatici à foenore dictum uolunt. Prisana.]
Succo seu aqua hordei. Hydropicos.] Quos facit hydrops. Virga uirilis.] Membrum uirile, quod
& uentretrum à uertendo, & colis, & nonnunquam priapus, alijsque nominibus. Fomento.] Hoc à fo-
uendo, hoc est nutriendo, dictum est. Vnde fomenta dicuntur applicationes rerum calidarum seu humi-
dorum ad partes corporis laesas, & medendi gratia, quae & fatus appellantur. Mouet.] Incitat. hoc pro-
lasciuioribus. Auctore.] Vt Plinius.

DE ACIDVLA

ICIMVS acidulam, quam graeci dicunt aizoym,
Sic dici credunt, sapor illi quod sit aceti;
Crescit aretensis in pratis, & secus amnes.

Hanc auidè quidam comedunt in tempore ueris;

Expertumq; ferunt sibi, quod fastidia tollat.

Virum est illi succus, & frigida ualde.

Tertius à medicis datus est gradus huic in utroque.

Hac fugit apposita facit ignis, & herpetia mordax.

Et tumor ex oculis triae cataplasmate cedit.

Vlcera quae serpunt, cohibet, combusti q; curat.

Et mulum calide dicunt prodesse podagra,

Si fuerit solis illius operata uirrentis,

Aux cataplasma mixta contraria potenta.

Eius cum roseo succo permixtus olino,

Dicitur antiquo capiti prodesse dolori,

Qui dictus dolor est lingua cephalalgia graeca.

Omne genus fluxus uentris restringere mirè

Cum uino potata solet, uel martha frequenter.

Hocq; modo nimium marantia mensura sistit,

Vel si matrici triam uiridem superaddas.

Sic quoque tumbricos pelis potata rotunda.

Taliter & cunctis prodest potata uenenis.

Exhibeat uisus, illius succus inunctus.

Cum uino uariis obstat potata uenenis.

Affirmant, istam qui secum gesserit herbam,

Quod non appetet hunc terribili scorpium ictu.

Auribus expressus succus si funditur eius,

Adiuuat auditum mirè, pellitq; dolorem.

Alteri uero minor species est istius herba,

Quam semper uicam dicunt, quoniam uirer omni

Tempore: barba iouis uulgari more uocatur.

Esse refert similem praedictae Plinius istam:

Nec minus omnibus hanc praedictis posse iuuare.

Et de ista est, non de ista, &c.

non solum ad o palpebre glutine quodam
phlegmate aspergi, ualeant ut uix aperiri;

Hanc mire succus herbe deglutinat huius
illo si iacta fuerint, digitis se perantia.

DICIMVS acid.] Quod latini acidulam, Græci azoum uocant. Azoi duo genera: maius in fi-
nibus uasculis feritur, quod aliqui buphthalmion uocant, alij zoophthalmion: alij stergethron, quod ama-
tonis conueniat: alij hypogelson, quoniam in subgrundis fere nascitur. Sunt qui ambrosiam potius uo-
cant, & qui amernion. Itali sedum magnum, aut oculum, aut digitellum. Alterum minusculum, quod en-
thales uocant, alij trichales, quia ter floreat, alij Chrysorthales, aliqui isoetes, sed alij Itali sedum, alij azou,
utrunque quoniam uireat semper, alij semperuium. Maius, cubiti altitudinem excedit, crassitudine
plus quam pollicari. Aliud in cacumine linguae simile, carnosum, pingue, largo succo, latitudine pollicari:
Alia in terram conuexa, alia stantia, ita ut ambitu effigiem imitetur oculi. Quod minus est, ut muris parie-
tisque nascitur & tegulis, fructu colum à radice, & sursum usque ad cacumen, folijs angustis, mucronatis,
succolis, palmo alto caule, radix inutilis. auctor Plin. lib. 22. cap. ultimo. Azou. inquit Placentinus. Val-
la) quod semperuium dicimus, utrunque tam paruum, quam magnum, arefacit quidem aliquantulum,
quod etiam mediocriter acerbescit atque aspergit, refrigerat uero non mediocriter: est enim tertie distan-
tiae, atque ordinis refrigerantium; & ob hoc aduersum ignem sacrum & herpetas atque inflammationes, que
ex diuillationibus sunt, conuenit. Secus.] Iuxta. Vtroque.] Tam ficitate, quam frigore. Sacer.]
Ignis S. Antonij, qui & alijs nominibus appellatur, ut supra pueros docuimus. Non enim hæc criticis scri-
bitur, sed duntaxat pueris, & literarum candidatis, quibus utile est hæc minuta legere. Herpetas.] Vi-
cus quod serpit & mordet, inde dixit Mordax satis conuenienti epitheto. Tritax.] Acidule. Podagre.]
Pedum dolori. Operta.] Testa. Aut cataplasmata.] Pessimus uerius, nec facile deteriorem apud
auctore hunc inuenieris. Cephalagia.] Morbus est, quo totum caput infestatur, qui & cephalæa. He-
micrania ab hemierania sunt, qui dimidia parte capitis laborant. Restringere.] Cohibere. Manan-
tia.] Fluentia. Sistit.] Stare facit ne fluant. Lethali.] Mortifero. Refert Plin.] Ut supra ha-
bes. Phlegmatis.] Pituitæ. Deglutinat.] Dissoluit & aperit.

DE PORTULACA.

ANDRACHNE græce, que portulaca latine. Dicitur, hac uulgo pes puli more uocatur.
Humida est eius, & frigida dicitur esse. Indiuuat febrem, quam dicit græcia causam,
Terminus humori, stridori uero secundus. Hinc gradus est, uetus stomacho quoque habetur.
Ita super stomachum uiridis si ponitur herba. Praestidem succus si sumitur, herbaq; mansa,
Aut uel dicitur, soles lenire calorem.

ANDRACHNE.] Græce est portulaca latine. Andrachne uero sine n in prima syllaba, est
syluestris arbor, neque in planis nascens, similis nœdons, folio tantum minore, & nunquam decedente, cor-
tice nec scabro quidem, sed qui circūgelatus uideri possit, tam tristis aspectu est, ut scribit Plin. lib. 22. cap.
11. Est autem andrachne in potestate refrigerandi, tertij ordinis ac distantie, humectandi autem secundi. Pau-
lulum austeri habet, ideo fluxus amouet, imprimis biliosos & calidos trāsmutando ipsos, mutādoque qua-
litatem, & aliquatenus refrigerando, quapropter æstuantēs iuuat: si quidquam aliud, ori, atque aluo ap-
posita, cunctisque hypochondrijs, leuigatque admodum, ouo crudo iniecto cum albumine ac nitello: me-
deturque, Galeni sententia, febribus hecticis, mixto etiam oleo rosaceo, & pauculo aceto, inuncto que toto
corpore, statim facilem infert in edelam per febrem exæstuantibus, & æstus prorsus extinguit, ut insurge-
re amplius nō sinat. Id nos ex ipsa profitemur experientia, sicut & cichorii decoctionis aqua pota ieiuno
stomacho, ut inde dormiatur, ilico leuatur febris. Fluentem sistit sanguinem, succusque eius um habet cō-
similem, ut uon solum extrinsecus appositus, uerum etiam potus refrigeret. Hæc nimirum herba cōuenit
unuerse manducationi, quod subacerbescat, eduliumque aptum torminibus, et fluxui muliebri, & sangui-
nis electionibus; ad quæ efficacior, quam ipsa herba, est succus. hæc Placentinus. Esse uetat.] Tollit
emulsioporem dētiū. Feruorem.] Notatu dignum quidem, & maxime ijs, quorum capita solis estu-
facile debilitantur. Hæmorrhoidicis.] Sanguinem spuentibus. Comesta.] Mansa. Salubris.]
Vtilis & sanitatis causa. Effectus.] Virtutes. Pares.] Similes.

DE LACTUCA.

Rigida lactuce nris constat, & humida ualde.
Vnde potest nimis hæc mansa lenire calorem.
Et præstabit idem, supersaddas si bene tritam.
Vtilis est stomacho, somnum dat, mollior & alium:
Omnibus his melius prædest decocta comesta.

Et stomacho potius non lota comesta medetur.
Lactuce semen comestis somnia uana.
Cum uino bibitum, fluxum quoque reprimet alij.
Lac das abundanter nutriti sumpta frequenter.
Vt quidam dicunt, oculo catigo creatur
Hic quibus assidue fuerit abus eius in usu.

FRIGIDA.] Lactuce Græci tria fecere genera, unū latū caulis, adeo ut offiola olitoria ex his faci-

AE MILIUS MACER

tari prodiderunt. Folium his paulò maius herbaceo & angustissimum, ut alibi consumpto incremento. Alterum rotundi caulis. Tertium sessile, quod laconicon uocant. Est etiamnum alia distinctio atræ, quæ metonis uocatur, à copia lactis saporiferi, quanquam omnes somnum parere credantur. Apud antiquos Italiz hoc solum genus earum fuit, & ideo lactucæ nomen adeptæ. Purpuream maximæ radicis Cæcilia nam uocat. Rotundam uerò, ac minimæ radicis, latis folijs, astylida. Quidamque eunuchion, quoniam hæc maximè refragetur Veneri. Est quidè omnibus naturæ refrigeratrix, & ideo æstate gratæ à stomacho siccitiam auferunt, cibique appetentiâ faciunt. Dicitur certe Augustus lactucæ conseruatus in ægritudine fertur, prudentia Musæ medici, cum priores eam ob religionem minime comanducarent; in tantu recepta commendatione, ut feruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Sanguinem quoque auerere creduntur. Est etiã num quæ uocatur caprina lactuca. Est quæ cilia uocatur, auctor Plin. lib. 19. cap. 8. Humida ualde. Est enim lactuca humidum & frigidum holus, non utique extremo modo, sed ut fontana aqua, perfrigida; ideo aduersus inflammationes congruit, & leues sacros ignes. Edulium plane situm extingnens. Leuare. Minuere. Mollit. Mollem facit, & soluit indurata. Eius. Lactucæ.

DE ROSA.

Rosa, flos, flor, & ipsius dignitas.
ICI flos storum nobis rosa iure uidetur,
Que specie cunctos præcedat, odoreq; flores;
Non tamen hæc tantum specie, nec odore inuare
Nos ualet, at uariis nos adiunxat illa medelis.
Eius sicca gradu sit est & frigida primo.
Compescit sacrum, si tritis apponitur, ignem.
Sic quoque si stomachus calet, aut præcordia, sedat.
Fluxum matricis cum uino stringit & alui.
Illius succum collyria plurima querunt.
Et sicca puluis morbis bene subuenit oris.
Infrictus per se tantum, cum melle uel mixtus.
Omnes feruores superaddita trita coarctet.
Ipsa recens, uel si missa contrita bibatur.
Ex hac conficitur oleum, roseumq; uocatur.
Diuersis morbis, & multis uile causis.

si bibitur, uentrem mollit, stomachiq; calorem
Extinguit nimium, bene si foueatur eodem.
Et dolor & feruor capitis curabitur illo.
Permiscendo illi si forte iungatur acetum,
Expurgat fordes, uulnus repletq; profundum.
Et ranciditatis præclare subuenit ignis.
Ore diu tenent, dentes sedare dolorem
Dicitur, & duras palpebras reddere molles.
Aufferi suppositum præteritis interiorum.
Et sterici uariis ualet hoc succurrere morbis.
Hoc oleum quoniam uariatur conficiendo,
Dicam Palladius quid scripserit inde peritus.
Quod rubrum fuerit foliorum summo floris,
Vincta sic purgatorium iungatur oliui
In libra; uireo sic claudens omnia uase,
Sub phæbo tantum septem suspende diebus;
Inde medelarum uarios seruetur ad usus.

resq; uir. DICI flos. Rosa uis ex essentia aquosa calida remixtis duabus qualitatibus, acerbescit & amare
scenti constat. Flos autem ipsarum adhuc magis acerbescit rosis, & ob hoc arefaciens. Rosa nascitur spina
uerius, quam frutice, in rubo quoque proueniens. Illic etiam iucundi odoris, quamuis angustii. De generi
bus rosarum multa scribit Plin. lib. 11. cap. 4. Eius sicca. Est rosa, inquit, sicca & frigida in primo gradu.
Compescit. Sedat. Stringit. Cohibet. Illius. Rosæ. Collyria. Medicamenta oculorum, de qui
bus lege Corn. Cels. lib. 6. cap. 6. Illo. Oleo rosaceo. Subuenit. Opitulatur. Stericis. Hystericis,
hoc est hysteræ matricis uidelicet. Rubeum. Tu lege rubrum. nec opinor auctorem scripsisse rubeum,
sed rubrum: nam rubeum non est satis latina dictio. Phæbo. Sole. Medelarum. Medicinarum.

DE LILIIIS.

leg. Aurosas. AVROSAS (ut credo) rosas, argenteas debent
Lilia inire sequi, quæ nec specie, nec odore
Cedere creduntur, roseo collata decori,
Nec minus in multis hominum sunt apta medelis.
Eius radicitus bulbis, quæ lilia profert,
Sub primis tectis, iuncto quoque tritis oliui,
Prodest astatis mirè superadditus ignis,
Et melius roseum sibi si iungatur oliuum.
Duritias stericas mollit, si subditur idem.
Elixir eius folijs, cataplasmâq; factum,
Mollefcunt nerui, combustaq; membra iuuantur.
Sicq; superpositus morsus curabitur anguis;
Aut si cum uino bulbis potabitur ipse.
Sic quoque fungorum uicæ ille uenena nocere.
Hunc uino coctum tritumq; pedum superadde
Clauis, nec solbas nisi cum lux tertia transiit.
Pingui porcino si decoquis hunc, uel oliui,

Reddere posse pilos membris narratur adustis.
Cum uino potum, nocuum purgare cruorem
Per uentrem dicunt, & sic prodesse lieni.
Sicq; in uulnibus, sic idem menstrua purgat,
Vel si cum uino ueteri coctum superaddas.
Præciso neruis tritum cum melle medetur.
Expressus succus foliorum mixtus aceto,
Et melli coquitur; sine mellis, sine & aceti
Ut gemine partes, prædicti quinque liquoris;
Ad desiccandas nitas est magis uile plagas,
Inq; cicatrices ducit, licet inueteratas.
Elixir bulbis, & cerotis bene mixtus,
Rugas distendit uultus, maculas fugat omnes.
Lichenas purgat, faciem quoque furfure mundat.
Exprimitur succus de tritis floribus eius,
Qui uulnus mollit cum lana subditus illis.
Illius asseritur sudorem posse mouere.
Turgida maturat, primo coquit, & cito purgat.

leg. Aurosas. LAVROSAS. Liliij flos temperamenti mixti est ex tenuibus partibus, terrestri quadâ essentia, ex
qua gustu quoque habet amaritudinem, aquosâque cuiusdam temperatæ essentia est; ex quo oleum uim
distrahendi

DE HERBIS.

distrabendi citra uestigationem habet, potestatisque molliendi est, extremaque duritiei idoneum. cuius radix & folia per sese soluta arefaciunt, & abstergent, mediocriterque distrabunt. Radix naque in primo est ordine abstergentium; ita nimirum conuenit ambustis & inflammatis locis. Radicem igitur torrentes, inde cum rosaceo dissoluentes oleo, ambustis imponunt, quo ad cicatricem peruenierit. Est autem alio: qui huiusmodi omnium perducendorum ad cicatricem egregium remedium; molliendo quoque menstrua prouocat; folia quoque praecotta imposita, cicatrices subducunt, omnibus huiusmodi salubre medicamen. Succum quoque foliorum coquendo apponimus cum aceto & melle, quo sistatur corporis humectatio. hanc Placentinus. Lilia iure sequi.] Liliun (ut tradit Plin.) rose nobilitate proximum, & quadam cognatione unguenti oleique, quod lilion appellatur. Et impositum etiam maxime rosas decet, medio prouentu earum incipiens: nec ullis florum excelsitas maior. Interdum cubitorum trium; languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, folijs foris striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim sese laxantibus effigie catathi, resupinis per ambitum labris, tenuique filo & semine stantibus in medio crocis. Ita odor colorque duplex, ut alius calycis, alius staminis, differentia angusta. In unguenti uero, oleique usu, folia non spernuntur. Et flos non dissimilis illi in herba, quam conuolutum uocant, nascentis per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac ueluti rudimentum naturae lilia facere condiscens. hanc Plin. lib. 21. cap. 11. Cedere.] Rosis. Roseo.] Rosarum. Colata.] Comparata.] Apta.] Idonea.] Bulbus.] Significat bulbus radicem rotundam tunicatam. Hoc nomine, ut scribit Dioscorides, Romani significant althum agreste, ab althum marinum. Dicitur bulbus uenerem mire stimulare ac excitare. Idem sentire uidetur Epigrammaticus Poeta Martialis, dicens:

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,

Nit aliud bulbis quam satur esse potes.

Qui prestare uirum Cypriæ certamine nescit,
Manducet bulbos, & bene fortis erit.

Languet anus, pariter bulbos ne mandere cesset,
Et sua ridebit praelia blanda Venus.

Et ego olim sic lusi:

Epigramma Martialis
Liliun, roseo, & melle coctum
Ambustis imponitur, quo ad cicatricem
peruenierit. Est autem alio: qui huiusmodi
omnium perducendorum ad cicatricem egregium
remedium; molliendo quoque menstrua
prouocat; folia quoque praecotta imposita,
cicatrices subducunt, omnibus huiusmodi
salubre medicamen.

Fungorum.] Qui uescentibus sunt periculossissimi.] Clauis.] Clauus, genus tuberculi. Nonnumquam quidem alibi clauus, sed in pedibus tamen maxime nascitur, praecipue tamen ex contuso: quamuis interdum aliter: doloremque etiam, si non alias, tamen ingredienti mouet. lege Celsum lib. 5. cap. 28. Clauo interijt Silius Italicus clarissimus Poeta; quod docemur ex Plin. qui tertio epistolarum sic scriptum reliquit: Modò nunciatus est Silio Italicus in Neapolitano suo inedia uitam finisse. Causa mortis ualeat. Et ait in natus insanabilis clauus, cuius tædio ad mortem, irrevocabili constantia decurrit, usque ad supremum diem beatus & felix, nisi quod minorem e liberis duobus amisit: sed maiorem, meliorem, flore tenique etiam consularem reliquit. Lux tertia.] Tertius dies. Vuluas.] Hysteras quas Graeci uocant. Rugas.] Pro uetulis maxime, quibus uenus multo charior, quam uirtus. Distendit.] Expli- cat. Lichenas.] Mentagram intelligit, quam latini sic uocant, quod à mento ortum deducat. Martialis sordidos uocat lichenas his uersiculis:

Non huius acris, pustulae ue lucentes,
Nec triste mentum, sordidi ue lichenas.

Furfure.] Capillorum morbus, sed faciei squamas intelligit. Vuluas.] Matrices, non cunnos, ut imperiti loquaz latinae interpretantur.

DE SATYREIA.

HYMBRA solet graece dici, satyreia latine.

Ulli si ca nimis uis est, sed feruida ualde.

Prouocat urinam cum uino menstrua sumpta.

Pelle abortiuum, muliebricia uiscera purgat.

Illius pulvis cum cocto melle subactus,

Et mansus, uel cum uino si sumitur idem,

Pectoris humorem pellit persumpta tenacem.

Cum uino tepido composita tormina uentris,

Si large bibitur: uerum iam sepe probasi.

Est quidam morbus lethargus nomine dictus,

Opposum medici quem dicunt esse phrenesi,

Quod uetat hic somnum, somno grauat hic nimis agrius.

Hac eam lethali somno depressus, aceto

Thymbram commiscens, foueat caput inde frequenter,

Sic uitium pigri poterit depellere morbi.

Hanc herbam caueat mulier contingere praegnant:

Nam non mansa modo, sed partum subdita tollit.

Nausea sedatur haec, si bene tria bibatur

Cum modico uino, uel si fumaris in ouo.

Hocq; modo mire uenerem solet illa mouere,

Si largo potu utrida, uel succa bibatur.

Quod si cum uino mel nungitur ex piper illi,

Non modicum ueneris succendere dicunt ignem.

Hinc est à satyris merito satyreia uocata,

Quod sint in uenerem nimis haec animalia prona.

Si desit thymus, pro thymo ponere thymbram,

Precipiant medici: quia uis est aqua duobus.

HYMBRA.] Hanc & cumila & satyreia dicitur, Plin. lib. 11. cap. 18. Thymbram uero, quæ sit cunila hanc apud nos habet uocabulum & aliud satyreia dicta in condimentario genere. Seritur mense Februarii, origano æmula. Nusquam utrunque additur, quippe similis effectus. Sed cunila Aegyptium origanum praefertur. Prouocat.] Ciet. Urinam.] Lotium. Menstrua.] Muliebricia alio nomine & menses. Muliebricia.] Mulierum. Tenacem.] Viscosum humore intelligit, multorum malorum auctor. Lethargus.] Seuerinus Boetius in primo Celsi philosophici libro, Lethargum patitur. Est autem

morbis quoque alter (ut scribit Celsus) aliter phrenetico contrarius. In illo, difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas: *ut ait Grece nominatur, atque id quoque genus acutum est: & mihi succurritur, celeriter iugulat.* Hic.] Morbus phreneticus. Grauat hic.] Lethargus. Mulier contin.] Hoc omnibus notandum, quò minus periclitentur grauidæ mulieres. Subdita.] Supposita. Tollit.] Necat. Nausea.] Vomendi appetitus. Venerem.] Panditur hic aliud imbellibus auxilium, quod quidā fortassis libentius legunt, quàm si quis scribat, quæ uia sit, quæ ducat ad astra: usque adeo stimulo carnis, & beluinz prurigini insensibile placet. Visæqua.] Par & similis uirtus. Thymbra enim præcipue hortem. proximam thymo uim habet, at imbecilliozem, ut ait Placentinus.

DE SALVIA.

ALVIA, cui nomen eleliphacus est apud Argos, Cum mulla lecoris prodest potata querelis. Petat abortiuum, lotiumq; & menstrua purgat. Tria uenenatos iuuat & superaddita morsus. Crudi uulneribus, quæ multo sanguine manant,

Apponit triam, dicunt retinere errorem. Cum uino succus repidus si sumitur huius, Compescit uentrem, tussim, lateribq; dolorem. Prius uulnæ curat, uirgæq; uirilis, Si foueas uino fuerit quo salvia cocta. Ibis succo crines nigrescere dicunt, Si sine hac uncti crebro sub sole calenti.

SALVIA cui.] Eleliphacus, quæ à nobis salvia, euidenter cõplexionis est calidæ, dementer subacrescentis: in prunis suffumigata, mulieribus corripit menstrua immoderatè fluentia, & fluxum muliebrem. Agrippas autem inquit, eleliphacum sacram herbam leenæ concumbentes comedunt: est enim ad fornum concipiendum potentissima. Cum igitur huius succum acetabuli unius mensura cum pauulo ole potant mulier aliquoties, atque cū uiro dormierit, in coitu sine controuersia cõcipiet. Perhibent in Copto Aegypti peste defecisse multos, & reparatâ multitudinem, coactis mulieribus ea-uti. Argos.] Grecos, unde Argolici. Querelis.] Doloribus, morbis. Lotium.] Vrinam. Compescit.] Cohibet. Ventrem.] Fluxum uentris. Vuluz.] Hic improprie usurpat uulnam pro cunno. Virgæque uirilis.] Membri, pudendorumque uirilium. Nigrescere.] Quomodo crines nigri fieri possint.

DE LIGVSTICO.

LIGVRVM patria sumpsit ligustica nomen, Copia quod maior ibi nascitur illius herbe. Tenuis huic gradus est calidi succi, uigoris. Maior radicitus est, & seminis eius. Et par est illi uis in medicamine quouis. Inflatu stomacho cum uino sumpta medetur. Et tali potu uis digesta, immatur. Omnibus & morbis sit prodest interiorum. Vrinæ sic sumpta mouet, & menstrua purgat. Tota uenenatis medicatur moribus herba, Si bibitur bene tria prius, uinôq; salua, Es pars contrita ponatur desuper herbe.

Non modicum colicis prodest hoc mansæ uel hausta, Vel si radices elixatur bibatur. Nec solum colicis decoctio praderit ista, sed supra dictis medicabitur omnibus hausta. Digestilibus semen bene iungitur eius Omnibus antidotis, quod sit huic peptica uirtus. Hanc oculis Strabus potuq; & odore nocuam. Asserit: antidotis eius tantummodo semen Miseri iussit. hoc uerum dixerit à se, Aut à doctorum libris, non est mihi notum. Hoc scio, quod ueteres non paruis laudibus istam Attollunt herbam: nec me legisse recorder Vltum, quæ Strabi sermonebus aspiuleretur.

A LIGVRVM.] Quod frequens in Liguria herba nascatur, dicitur ligusticum. Cuius herbe natura & medicinæ ex ea scribuntur à Plinio Natur. hist. lib. 20. cap. 17. Est autè ligusticum calidum & sicum in tertio gradu. Illis.] Radici & semini ligustici. Vnde Placentinus ait: Radix & semen calefacientium est eo usque, ut menstrua moueat, & urinas aduertat: est autem sufflationis expertus. Digestiua.] Peptica uirtus græco nomine, ut sequitur. Colicis.] Colicam passionem habentibus. Elixatura.] Coctio. Antidotis.] Remedijs aduersus uenena datis. Peptica.] Digestiua. Hanc oculis Strab.] Sic in hortulo Strabus monachorum doctissimus cecinit:

Inter odoratam memorare lybistica sythiam Fortia, suadet amor parui diffusior horti. Hoc germen succo quamuis & odore, gemellis Orbibus officere, & tenebras inferre putetur: Semina sæpe tamen quæsitis addere curis Parua solent, famamque aliena laude mereri. #

Quod autem auctor noster Strabum citat, argumētum est hunc Macrum Strabo esse inuiorem, nisi coequi fuerint. Ego tamen in nomine auctoris huius libri erratum crediderim, ut etiam antea in scholijs in Macrum indicauimus. Potest etiam hic liber immutatus esse in aliquot locis, cuiusque tandem sit adscribendus, Vt etiam diximus in epistola, quæ præfixa est scholijs nostris in Macrum. Claruit autè Strabus mortuus fuisse, natione teutonicus, Rabani abbatis quondam auditor & scriba, sub Ludouico imperatore anno 1340. ut scribit Abbas Spanh. in lib. de Eccl. scriptoribus.

DE OSTRVIO.

TRUTHION, ostrui quod vulgi more vocatur,
Vim calidam, siccamq; tener. radix fugat eius
Cum vino morbos iccoris, si trita bibatur.

Ictericis sic sumpta iuuat, splenisq; tumorem

Durum, quem graui scitrosin dixere, repellit.

Hocq; modo lapides uelica frangere dicunt.

Menstrua sic, totumq; mouet, tussimq; medetur.

sic orthopnoicis prodest si saepe bibatur.

Cui subdita matrici depellere fertur abortum;

Et sic tarda nimis seducere menstrua tradunt.

Acri cum uino si iungitur, atque polenta

Illius succus, lepras emendat immittas.

Hoc etiam succo iuncto cum poline, quem dant

Hordea, curatur (ut dicunt) pustula quous,

si superaddideris emplastri more dolori.

Illius succus cum melle terendo iungatur,

Humores capitis purgat, si nare trahatur.

Sternutamentum per se pulvis mouet eius

Naribus iniectus, ueratro non segnibus albo.

Ictericis succus mirè medicabitur eius,

Hanc si nare trahant tacti mixtum muliebri.

STRUTHION.] Struthij radix utilis, calida & arida in quarto fere ordine, estque abstergens, in-
de sternutamentum gignit. De hac herba sic Plin. lib. 24. cap. 11. Tinentibus, inquit, & radícula ramos præ-
parat, quam struthion vocari diximus a Græcis. Medetur morbo regio ipsa decocta, & insipitum, item
pectoris uitij; urinam citet, aluum soluit, & uulnas purgat. Quamobrem aureum poculum medici uocant.
Ea & ex melle prodest magnificè ad tussim, orthopnoe cochlearis mensura. cum polenta uero & aceto, le-
pras tollit. Eadem cum panace & capparis radice calculos frangit, pellitque. Panos discutit cum farina
hordeacea & uino decocta. Miscetur & malagmatis & collyrijs, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis
inter pauca. Lieniquoque ac iocineri. Eadem denarij unius pondere ex mulla aqua, suspensio fa-
nat. Orthopnoicis.] Qui, nisi recta ceruice, spirare nequeunt.

DE CEREFOLIO.

Cerefolio uis acris & ignea ualde.

Apposuitur canceris citum cum melle medetur.

Cum uino bibitur, lateris sedare dolorem

Sape solet, tritam si nectis desuper herbam.

Cum mulla bibitur, pituitæ noxia soluit.

Ex oleo coctum, frigus depellit, inunctum.

Sicritum mixto uiolento soluis aceto.

Lumbicis tali potu tinea; repellit.

Cum uino citet urinas, & menstrua purgat.

Virgine cum cera, uetus huic axungia mixta,

Non modo parotidas, uerum quoscunque tumores

Curat, uel reprimat, si sepius hec superaddas.

Intinctum ualido si manducetur aceto,

Sape solet nominem, uentremq; tenere solutum.

Si crito regitur pectus, succusq; bibatur,

Urina clausos referat quoscunque meatus.

Illius elixatura uerrigo fugatur,

Si caput hac repida patientis saepe lauetur.

Herba; temporibus & fronti cotia ligetur.

EST Cerefolio.] Vehemens est hæc herba & ualde calida. Cancris.] Quod malum serpit ut
cancer. Pituitæ.] Phlegmatis. Violento.] Multum acri. Tinea;que.] Tinea; hic uermes sunt
corporis, ut supra. Parotidas.] Apostemata secus aures.] Reserat.] Aperit. Meatus.] Vias per
quas urina fluit.

DE ATRIPLICE.

INFRIGIDARE gradu primo, humectare secu-

atrimplicem dicunt: eius mollit aluum. (do

Duritas soluit uarias, clauisq; medetur,

Emplastrum crude, uel cocto si superaddas.

Hocq; superpositum scabros cito detrahunt ungues.

Ignibus & facris dicunt sic posse mederi.

Atriplicem tritam cum nitro, melle, & aceto,

Dicunt appositam, calidam sedare podagram.

Ictericis dicitq; Galenus tollere morbum

Illius semen cum uino saepius haustum.

INFRIGIDARE.] Attraphaxis græcè, à nostris atriplex nominatur. Et est secundi ordinis hume-
tantium, primum uero refrigerantium. Non est acerbioris particeps, sed aquosa, ut malua, & aluum cit. Sunt
etiam hortenses agrestibus humectantiores, & magis refrigerantes; & proinde utiles inflammationibus.
Mollit aluum.] Duritiam alui tollit. nec præterea multæ uirtutes illius herba; sunt. Quæ autem hic
commemorantur ex Plin. sumptæ sunt, sicut fere omnia auctor noster habet. Atriplex, inquit, & sylue-
stre est, & fatium, accusatum à Pythagora, tanquam facere hydropicos, morbosque regios & pallorem.
Coquitur difficillimè, ac ne in hortis quidem iuxta id nasci quidquam nisi languidum culpauit. Addi-
dere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos; nec nisi mutata sæpius aqua coquendum; sto-
macho contrarium esse; lentigines & papulas gignere. Miror quare difficulter in Italia id nasci tradide-
rit Solon Smyrnæus. Hippocrates uulgarium uitij id infundit, cum beta: Lycus Neapolitanus contra
cathartas bibendum dedit. Panos, firmiculos incipientes, duritias omnes, uel cocto, uel crudo utiliter
illini putant. Item ignem sacrum, cum melle, aceto, nitroque. Similiter podagris. Ungues scabros
detrahere dicitur sine ulcere. Sunt qui in morbo regio dent semen eius cum melle; arterias & tonsillas ni-
tro addito perficunt, aluum moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula, concitantes uomi-
tionem syluestri capillos tingunt, & ad supradicta utuntur medicina.

G. iij

AE MILIVS MACER

DE CORIANDRO.

Uis. RIGIDA uis herba coriandri dicitur esse,
Galenus. F. Austeraq; simul, quiddam uirtutis habere.
 Hancq; Galenus ait, per quam depellere uentre
Uis. Lumbricos tineasq; solet, si trita bibatur
 Cum uino, uel si mixta sumatur aceto. *h. misto*
 Vna cum passa coriandrum, melq; iugatum,
 Sedabunt uarios superaddita trita tumores;
 Praecipue testes tumidos iuuat hoc medicamen.
 Illius semen uentrem stipare solum
 Fertur aequae iunctum, fuerit si saepius haustum.
 Argenti spumam cerussa conterere mixtam,
 His tritis, succum coriandri iunge, et acetum,
 Quattuor his roseum miscendo iugabis olium.
 Ista terendo simul pretiosum conficis unguen,
 Quo sacros ignes pellas, calidosq; tumores.

Q. Consider the following: $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$.
 Differentiate: $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

FRIGIDA vis.] Cofiandrum (ut scribit Plinius) inter sylvestria non inuenitur. Præcipuum
tamen esse constat statim Aegyptium. Valer contra serpentium genus unum, quod amphifibanas uo-
cant, potum, impositumque. Sanat & alia uulnera pynctas, pustulas, tritum. Sic & omnes tumores,
collectionesque cum melle, aut uia passa. Panos uero ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertianis de-
uorari iubent aliqui ante accessione, uel plura illini fronti. Sunt qui & ante solis ortum ceruicalibus sub-
iici efficaciter putent. Vis magna ad refrigerandos ardores uiridi. Vlcerâ quoque quæ serpunt, sanat
cum melle, uel uia passa. Item testes ambusta, carbunculos, aures cum lacte mulieris, epiphoras oculo-
rum, uentris & intestinorum fluxiones. Semen ex aqua potum bibitur in cholera cum ruta. Pellit ani-
malia interaneorum, cum mali punici succo & oleo semen porum. Xenocrates tradit rem miram, si uera
est: Menstrua contineri uno die, si unum granum biberint foemine: biduo, si duo: & totidem diebus, quot
grana sumperint. M. Varro, coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam æstate semari putat.
Sedabunt.] Reprimunt. Tumidos.] Inflatos. Stipare.] Cohibere fluxum uentris. Cerussa.]
Cerussa fit uel per se in plumbinarijs officinis, uel ramentis plumbi tenuissimis super uas aceti aspersum
impositis, atque ita distillantibus. Quod ex eo in acetum cecidit, arefactum molitur, & cribatur, iterumque
aceto mixto diuiditur in pastillos, & æstate in sole siccatur. Potus eius lethalis est sine spuma argenti, in-
de cerussatus. Vnguen.] Vnguentum. Sacros ignes.] De hoc malo sæpius supra. Scrophis.]
Apostematibus sub lingua. Cui dat lux tertia.] Tertianam febrem intelligit. Xenocrates.] Vt
adnotauimus etiam ex Plin. quem auctor noster diligentissime legit, & imitatus est.

DE NASTVRTIO.

Vis. ICVNT feruientes quoddam habent nascuntur vires,
 D. Et siccas: hac te uenerem ceruicia coarctet,
 Cau. Siccando semen fuerit si sumpta frequenter.
 Sermo commixta recens hac herba recendo,
 Anthracas curat, bona qua plebs ulcera dicit. + Desfrago
 si superaddatur curatq; furunculus ista. + 5 ab ipso, fl
 Emittit saniem cum qua dolor ipse recedit. + 120: cura fura
 Illius succus crines retinere fluentes
 Illitus asseritur, deniq; lenare dolorem,
 De qua parit dolens dens est, insusus in aurem.
 Fortius est herba semen; depellit abortum,
 Haustum cum uino, ueneritq; animalia pellit.
 Et sic serpentis dicunt obolare uenenis. + 120: cura fura

DICUNT feruentes.] Nasturtium (ut tradit Plinius) ^{lib. 19. cap. 8.} nomen accepit à narum tormento. Et in
de uigoris significatio, prouerbio id uocabulum usurpauit, ueluti torporem excitantis. In Arabia mirz
amplitudinis dicitur gigni. Nasturtium uenerem inhibet, animum exacuit. † Duo eius genera. Al-
uum purgat, detrahít bilem potum in aqua decem denarium pondo. Cum lomento strumis illitum,
opertumque braccia, prædare medetur. Alterum est nigrius, quod capitis uitia purgat. Visum clari-
ficat. Commotas mentes sedat ex aceto sumptum. Lienem ex uino potum, uel cum fico. Tussim
ex melle, si quotidie ieiuni sumant. Semen ex uino omnia intestinorum animalia expellit, efficacius
addito mentastro. Prodest & contra suspiria & tussim cum origano & uino dulci. Pectoris dolori-
bis decoctum in lacte caprino. Panos discit cum pice, extrahitque corpori aculeos. Et maculas il-
lirum ex aceto. Cōtra carcinomata adijcitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus
uerò

Si tibi difficilis confectio tanta uidetur,
 Succus cum solo prodest commixtus aceto.
 Et si frumenti panis mundissima mica
 Iungitur huic succo, sedat quemcunque calorem.
 Huic succo si iuncta fabae sit sola farina,
 Et superaddatur scrophis, medicabitur illis. *scrophis*
 Et cedit feruens emplastro pustula tali.
 A multis scriptum legitur, febris ante tremorem *historia*.
 Si tria grana uoret coriandri seminis ager, *Nota* *
 Evadat febrem cui dat lux tertia nomen.
 Praestat idem lectum coriandrum mane, priusquam
 Sol surgat, cervicali si subditur agri. *Xenocrates*.
 Xenocrates scripsit totidem cessare diebus *scribitur* *scrophis* *Xeno-*
Mensura, quot mulier coriandri grana uorabit. *scrophis* *mirum*.
 Assiduum quidam condemnant illius usum,
 Nempe putant mortem, quemuis ne parare dolorem. *Cau.*

1549.20.46.20.

Solus odor positi carbonibus, effugat illas. *Gr. si placet, semper repetitur.*
 Splen reprimat mixto, si saepe bibatur, aceto. *si sumis, aceto.*
 Herbam vel semen cum polline iunge, et aceto.
 Haec contrita simul schiasis superadde dolori. *Gr. haec sunt alia, si schiasis.*
 Vitale non modicum confirmant hoc medicamen.
 Lichenas succus purgabit, melle perunctus.
 Si prurigo caput, aut ulcera turpia furdant, *Gr. vel si*
 Anseris admiscens adipi nasturtia tria,
 Sapius unge caput, vitium pellebor utrumque.
 Si coquis hanc herbam capra cum lacte recenti,
 Illius aut semen, dolor angit pectora quisquis,
 Assumpto tepido potu sedabitur isto.
 Semen cum tepida contritum pondere drachma,
 Et bibitum, dicunt quod durum molliat alium.
 Tussim compescit, semen cum melle uoratum. *

1. 12. 19. 19. 8.

uero è melle utilissime. Sestius adijcit hoc, serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contri-
 rum & alopecias emendare addito sinapi. grauitatem autem toto impoſito amibus cum fico. De ntiū
 dolores infuso in aureis succo. Porriginem & ulcera capitis cum adipe anserino. Furunculos concoquit
 cum fermento. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. Phagedenas ulcerum expurgat
 cum melle. Coxendricibus, & tumbis cum polenta ex aceto illinitur. Item heheni, item unguibus sca-
 bris; quippe natura eius caustica est. Optimum autem Babylonium. Syluestri uero ad omnia ea effe-
 ctus maior. Anthracas.] Bona ulcera plebi, ut ait, dicta. Curaque furun.] Furunculus est tuber-
 culum acutum cum inflammatione & dolore, maximeque ubi iam pus uertitur. Qui ubi ad apertus est,
 & exiit, super adparet pars carnis in pus uersa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem uentriculum
 quidam furunculi nominant. In eo nullum est periculum, etiam si nulla curatio adhibeatur. Mature-
 scit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit ut porior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium
 eius medicamentum galbanum est. hzc Celsus libro quinto, capite uigesimo octauo. Fluentes.] De-
 dentes.] Dentisque.] Notatu dignum, propter mali magnitudinem: nec nisi expertus credit, quan-
 ta patiantur, quibus dentes dolent. Illas.] Serpentes. Schialis.] Ischiadica recte. Lichenas.]
 Nominatius huius est lichen, non lichenus. Et est lichen, quod latini uocant nientagram.

DE ERUCA.

RVCAM calidam dicunt mediocriter esse;
 Siccam non adeo. cibis eius digerit escam.
 Tertius eruce ferrur gradus esse caloris,

et ualeat urinas hac manſa uel hausta mouere.
 Manditur uiliter pueris, tussimq; repellit.
 Emundare cutem maculis cum melle iugatam
 Tradunt, & mundos lentigine reddere uultus.
 Elixata prius ra dix, ualideq; subacta,
 Ossibus & fractis superaddita, reijcit illa.
 Cum uino tritum si semen sumitur eius,

ERV CAM calidam.] Erucam quidam dictam putant, quod erodat, quidam quod urat: sunt ab
 edendo qui sic dictam uelint. Erucæ semen scorpionum uenenis & muris aranei medetur. Bestiola sin-
 nascentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cum melle illitum; lentigines ex aceto. Cicatrices nigras re-
 ducit ad candorem cum felle bubulo. Arom, uerbera subituri, potum ex uino, duriciam quandam cōtra
 sensum induere. In condiendis obsonijs tanta est suauitas, ut Græci euzomon appellauerint. Putat, sub
 trita erucæ si foueantur oculi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta
 fracta ossa extrahere: nam de uenere stimulata diximus, tria folia syluestri erucæ sinistra manu decerpta,
 & trita in aqua mulla bibantur. hzc Plinius libro 26. cap. 13. Tertius.] Eruca calida est in tertio gra-
 du. Manditur.] Editur. Iugatam.] Commixtam. Reddere mundos.] A' lentigine liberare.
 Ossibus.] Dicitur enim extrahere ossa fracta. Indurare.] Id quod, ut cetera etiam, Plinius memoriæ
 mandauit. Condituris.] A' conditura primi ordinis nominandi casu. Conditurā autem dicit ea forma,
 qua elixaturam. Venerem stimulare.] Vnde Ouid. erucam appellat salacem de Remedio amoris,
 Nec minus erucas iubeo uitare salaces. Lactucis.] Vide quæ in lactucā scripsimus. Hzc her-
 ba.] Eruca. Comeſta.] Manducata. Salubris.] Sanitatis bonum præbens. Temperiem.]
 Temperamentum. Calor.] Propter erucam. Frigore.] Propter lactucam.

DE PAPAVERE.

ICVIT uim gelidam, succamq; papaueris esse.

Tres illi tribuunt species: flos unius albus,
 Alterius roseus, rubens pallensq; minoris

Flos est: hanc uulgo dicunt agreste papauer.

Cunctis nobilior, cui flos innascitur albus.

Ex huius generis facit opium capitellum.

Infusa leniter summa cite, lacq; quod inde

Defluit, accipiunt cochleis, succumq; reseruant.

Ani dotis multis apriam, uarijque medelis.

Sunt qui contundunt eam lacte suo capitella,

De quibus expressum siccant in sole liquorem;

Post primum succus uires habet iste secundas.

De specie uero, roseis quam gignere flores

Dei, consuevit oleum de semine trito;

Nam modicum gustu licendum, somniferumq;

Tertia, cui flos est rubens, semena nigellum.

Præstat, si bibitur, reliquarum more soporem.

Elixatura repida cuiuslibet harum,

Aeger si foueat faciem, uel si bibit illam,

Optatum capiet, nisi mors sit proxima, somnum.

Sperma nigri bibitum cum uino, stringere uentrem

Dicitur, hocq; modo fluxus inhibet muliebres.

Somnum dat bibitum, tussim compeſcit iniquam.

Pondere denarij debent hæc semina sumi:

Nam plus tethargum, uel mortem sepius infert.

De fustis eius tritis factum cataplasma,

Eximit fauces dicunt curare tumentes.

Quotq; uocant sacros, extinguere dicunt ignes.

Frigore, uel cantu, potu uel cibo uel, uel astu,

Aspera si fuerit uocalis reddita uena,

Appoſito tali fiet medicamine lenis.

Candida micom species (sic nempe uocari

G iiii

pancor. Graecorum lingua dicunt quodcunque papauer)
praestantia papae Longe nobilior est, utiliorq; duabus.
nostr. adhib. Tunc cum lacte fluunt capicella papaueris huius,
Comp. diocadi. Lecta coquantur aqua, cui sit part tertia mellis
Diocadi. Addita; cuncta coquis, donec decoctio spissa
Gal. 4. 1. 1. 1. sit quasi mel; varios sic conseruetur ad usus.
reus. Sumpta facit somnum, rursus fugat, abstinet alium.
 Vocatis uena bene rheumatismata siccatur.
 Eiusdem generis opium factum capicellis,

Sicut iam docui, roseo miscebis oleo;
 Ut caput mixtis, sedabitur his dolor omnis.
 Et solet hoc unguen somni praestare quietem.
 Prædictis admisce croci redolentia fila,
 Auris curabis hæc infundendo dolorem.
 Hoc quoque femineo cum lacte crocoq; subactis,
 Ungiendo, calidam poteris sedare podagram.
 Ano suppositum, solet hoc adducere somnum.
 illud idem solo praestare uidetur odore.

DICUNT uim.] Papauer, quod & rheas nominatur, quoniam confectum flos defluit, refrigerat
 di potentia, sed hortense, quod thylacitida uocant, uim habet mediocriter somnum conciliandi. Rheadidis
 semen ualidius refrigerat, ut eo nemo utatur secure, ut hortensi. Agrestis papaueris semen atrum est ap-
 tum medicamini, satis frigidum: succus admodum refrigerat, stupore tenuis opium appellatus. Intentum
 quandoque affert ex somnolentia; est namque quarti & ultimi refrigerantium ordinis. Vidimus adole-
 scentem ausum fuisse uetula epulis admiscere, quo tantisper eius filia abuteretur, quoad mater dor-
 miret: qua adeo consopita est, ut eo somno nunquam expectata sit. hæc Georg. Valla in libro de
 simplicium natura. Innas. albus.] Satiui (inquit Plin. lib. 10. cap. 18.) albicalix ipse teritur, & bibitur
 somni causa. Semen elephantis medetur. Huius.] Papaueris satiui albi. Antidotis.] Remedijs quæ
 contra uenena dantur. Sperma.] Succus Stringere.] Cohibere. Ventrem.] Fluxum uentris.
 Fluxus muliebres.] Menstrua.] Lethargum.] Morbum illum, de quo supra. Candida meconis.] Me-
 con id Græcè scribitur: & mecon ceratit, id est papauer habens cornua. Abstinet alium.] Profluum
 uentris sedat. Rheumatismata.] Fluxiones, quæ & rheumatismi & rheumata dicuntur.

E CEPIS.

E cepis medici non consentire uidentur.
 Namque Dioscorides, inflare, capitiq; grauare,
 Atque suum cepas dixit succedere manus.
 Feltis non esse bonas, ait ipse Galenus;
 Phlegmaticis uerò multum puer esse salubres.
 Non modicum sanas lalepius asserit illas,
 Praefertim stomacho: pulchrumq; creare colorem,
 Affirmat, quoties aliquis conspexerit illas.
 Et dicit, quisquis ieiunia soluerit illis
 Vnaquæque die, quod uiuet hic absque dolore.
 Affirmant omnes, manus inferre soporem.
 Et dicunt, illas molire salubriter alium.
 Appositas perhibent morsus curare caninos,
 Si trita cum melle prius fuerint, uel aceto.
 Apponunt alij cum uino melleq; tritas:
 Transactisq; tribus soluiunt cataplasma diebus.
 Salitrum, cepasq; Dioscorides iubet anguis
 Morsibus apponi, sic asserit ille iuari.
 Femineo lacti commixtus succus earum,

Pellit saepe graues infusus ab aure dolores.
 Hic succus commixtus aque, bibitusq; inuabit
 illos, quos subitus facit obmutescere morbus.
 Naribus attractus harum tantummodò succus,
 Humores noctuos capitis deponere cogit.
 Mansa uel pote, tardantia menstrua purgant.
 Tritasq; pedem, solæ quas, uel caligarum
 Duritie faciunt, succo sanabis eodem,
 Cum gallinarum pingui si saepe perungas.
 Mane sibi dentes qui succo perficitur isto,
 Dicunt hunc dentis nunquam sentire dolorem.
 Vlcera compescunt oris cum pane comesta.
 Intingens oleo coctas qui sumperit illas,
 Sedat quos intus dat dysenteria morbos.
 Contritis cepis loca denudata capillis
 Sepe fricans, capitis poteris reparare decorem.
 Oris fautori prosum, fastidia tollunt.
 Nasq; iubent hæmorrhoidis superaddere tritas.
 Illarum succus caligine tumina purgat.
 Admixtus melli, maculas quoque iunctus aceto
 Emendare solet, si sint hoc sepe fricata.

DE CEPIS medicis.] Cepe ex quarto est calefacientium temperamento; cuius essentia, crassarum
 partium est, unde hæmorrhoidas, apposita, interrumpit: & cum aceto peruncta oleo, uiridines absterget:
 & attrita, alopecias confectum exuscat in pilos: mādūcata uerò, corpus calefacit acumine, attenuatque in
 iplo crassos & tenaces humores, uentum in uentrem inducit, ob essentia crassitudinem partium, sangui-
 nemque gignit. hæc Placentinus. Allium cepasque inter Deos iure iurando habet Aegyptus. Cepæ ge-
 nera apud græcos, sardia, samothracia, halsidena, setania, Item schista, ascalonia, ab oppido Iudææ nomi-
 nata. Omnibus etiam odor lacrymosus, & præcipue Cyprijs, minime Gnidijs. Omnibus corpus tutum
 pinguitudinis earum cartilagine. E cunctis setania minima, (excepta Tusculana) sed dulcis. hæc Plin.
 libro decimonono, capite sexto. Affirmant.] Afferunt. Cepe (inquit Plinius) syluestres non sunt.
 Satiæ offætu ipso & delacrymationi & caligini medentur, magis uerò succi inunctione. Somnum
 etiam facere traduntur, & ulcera oris sanare, commanducate cum pane. Et canis morsus, uirides ex aceto
 illitæ, aut sicæ cum melle & uino, ita ut post diē tertium soluatur. Sic & trita sanant. Tostā in cinere epi-
 phoris multi imposuere cū farina hordeacea, & genitalium ulceribus. Succo & cicatrices oculorū, & albu-
 gines & argemas inuxere, & serpētium morsus, & oīa uiscera cū melle. Itē auricularum cū lacte mulierū,
 & in iisdē somitū ac grauitatē emēdantes, cū adipe anserino, aut cū melle stillauere. Et ex aqua bibedum
 dederūt repētē obmutescētibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum
 omnium

omnium priuatim scorpionū. Alopecias fricte & ploras, tuis cepis. Coctas dysentericis uescendas de-
dere & contra lumborum dolores: Purgamenta quoque earum cremata in cinerem, illinentes ex aceto
serpentium moribus, inter ipsas quoque multipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas.
Proximi inutilia esse præcordijs & concoctioni, inflationemque & sitim facere dixerūt. Asclepiadis scho-
la ad ualidum quoque colorem profici in cibo. Et si siccum ieiuni quotidie edant, firmitatem ualitudi-
nis custodiri, stomacho utilia esse. Ipse agitatio, uetrem molliore, hæmorrhoidas pellere subditas pro-
balans; succum cum succo foeniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas ru-
ta & melle. Excitari eisdem lethargicos. Varro, quæ sale aut aceto pisa est, arefactaque, uermiculis non in-
festari, auctor est. Compescunt.] Sanant. Dysenteria.] Tormen intestinorum exulceratio: Vn-
de dysenterici, qui latine torminoli dicuntur. Contritis cepis loca.] Modus reparandi crines. Hæ-
morrh.] Est in sede malum hæmorrhoids, cum uenarum ora sanguinem fundunt, nec est solum sedis, sed
etiam ianuz. uuluz.

DE BUGLOSSA.

INGVA bouis, græco sermone buglossa uocatur.

Hæc cholera rubeam nimio seruire perustam.

Purgat, cum uino fuerit si sumpta frequenter.

Cardiacum, cholera quem fecit copia nigra,

Consumit potata modo curare ualebis.

Humores nocuos pulmonis detrahitis hausta.

Mixtus aqua repida si succus sumitur eius,

illi qui patitur schiasim mirè medicatur.

Vin memorem cerebri dicunt seruire periti,

Vinum potatum, quo sit macerata buglossa;

Latens conuiuii decoctio dicitur eius.

Reddere, si fuerit inter conuiuia sparsa.

LINGVA bouis.

Buglossum humidum & calidum est temperamento; uino impositum, causa te-
perantiz est. Congruit autem ob gutturis asperitatem tuffientibus coctum in mulso. Aiunt tertiam
congruere febribus quidam, quæ trinum habet caulem herba, si cum radicibus & femine conteratur, in-
de potetur. Quartanis porro eam, quæ quaternis caulibus surgit, harum decoctio ex uino abscessibus uti-
lis perhibetur. Cholera.] Bilis.] Rubeam.] Sæpius illatum hoc uocabulum in hoc libro, nescio cu-
ius culpa, ponitur. Cardiacum.] Id nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis, quod stomacho
langente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi uenarum exigui imbecillique
pulsant: Sudor autem supra consuetudinem & modo & tempore, ex toto thorace & ceruicibus atque
etiam capite prorumpit, pedibus tantummodò & cruribus siccioribus atque frigentibus. At ubi id morbi
genus est, curatio prima est, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda, su-
dorem prohibere. id præstat acerbum oleum uel rosa, uel melinum, aut myrteum. Quorum aliquo
corpus leuiter perungendum, ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor uincit,
delinendus homo est, uel gypso, uel argenti spuma uel cimolia creta, uel etiam subinde horum puluere re-
spargendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti uel rubi folijs, aut ex austeri, & boni uini arida
fecce. hæc Celsus lib. 3. cap. 19. Schiasim.] Ischiam intellige, coxarum dolorem. Inter conuiuia.] Bu-
glossos bonarumque similis, cui præcipuum, quod in uinum delecta animi uoluptates auget, & uocatur
euphrosynum. Auctor Plin.

DE SINAPIO.

N.T.E. eas, quas Pythagoras laudauerit herbas,

Afferitur primam laudem tribuisse sinapi.

Quartus ei gradus est in ui secca, calidaque.

Extrahit humores viscosos, extenuatque.

Comburens, eumque, uis illi est tanta caloris.

Maiores eius in semine dicitur esse.

Sensus exacerbat cibis eius, commouet aluum,

Confringit lapides, urinam & menstrua purgat.

Si triam iungas repida, uersisque palato

Ad solem, capitis purgabit phlegma nocuum.

Sermonis mentis hoc admiscere, salubre est;

Isto nam capitis strictura resoluitur omnis.

Mansum confortat stomachum, fustigia sedat.

Morsum serpentis, crito si iungas acetum,

Et superapponas, tali medicamine curas.

Mansum pestiferor uetat intus ledere fungos.

Vi nimium feruente, curam comburere dixi;

Sed tamen hæc multis est utilis usio causis.

Hæc oculis nocuus capitis sedabitur humor,

Et qui distillans pulmonum concaua ledit,

Et stomachi morbosque creat, tussimque phthisimque.

Hoc per uescas, coxe dolor inueteratus

Elicitor schiasim quam græco nomine dicunt;

Hiæc, tumor splenis durus, iecorisque fugatur,

Et multum causis hæc subuenit inueteratis.

Vtile tot causis quoniam cataplasma sinapis

Sæpius a medicis variatur conficiendo,

Hoc dicitur qualiter fieri iubet Meniacus:

In mortariolo tritum bene pone sinapis

Semen, iungatur panis huius candida mica,

Sic, ut tertia pars sit panis iuncta sinapi;

His succis succas, & mel iungas, & acetum

Acetatis quantum, uel morbi causa requiritur.

Nam quod plus sit succas, uel mellis habebit

Ille sinapis, tanto solet acrior esse:

Debilior, quod plus panis mittitur, & acetum.

Ne tibi sit uilis, moneo, confectio talis,

Effectum cuius in multis sæpe probasti.

Non tamen hanc inbecillitatem apponere morbis,

Sed raro magnis, & causis inueteratis.

Plinius in musto cum semine præcipit huius

Radices mergi; sic postquam senserit horum

Omniem uim uinum, multum putat esse salubre

Faucibus, & stomacho potatum, luminibusque:

AE MILIVS MACER

Pluribus & capitis dicunt prodesse querulis.
 Infuso faciant oleum de semine quidam.
 Volebanturum vitis, supradis quoque veris.
 Exprimatur succus tenero de caule sinapis,
 Quod siccum mandens dentis tormenta fugabit.
 Vocales venas semen lenire sinapis
 Mansum confirmant, adipi tundendo uetusto
 Conmixtus, scrophas dispergit, si superaddas.
 Illius fumus malum prodesse caducis

Dicitur, atque flere causas siccando iuuare.
 Cum sic tritum capiti superaddere raso.
 His, qui lethargum patientur, magna medela est,
 Vel si saepe pedes ungendo fricabis eorum.
 Semen contritum melli coniunge, uel uncto,
 Illud alopecias iuuat unguen saepe fricando.
 Acri cum uino tepras emendat inunctum.
 Hoc quoque curatur manso, periodicis febribus.
 Antea quam diu ueniat commotio morbi.

INTER eas.] Sinapis, cuius in satius tria genera, Pythagoras principatum habere ex his, quorum
 sublime uis feratur, iudicant, quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad serpentium
 idus & scorpionum tritu cum aceto illinitur. Fungorum uenena discutit. Contra pituitam tenetur in ore, do
 nec liquecat, aut gargarizatur cum aqua mulla. Ad dentium dolorem manditur. Ad uiam gargari-
 tur cum aceto & melle. Stomacho utilissimum contra omnia uitia, pulmonibusque. Excretiones faci-
 les facit in cibo sumptum. Datur & suspiriosis. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerum. Sen-
 sus atque sternutamenta capitis purgat, aluum mollit, menstrua & urinam ciet. Et hydropicis imponi-
 tur. Cum fico & cumino tu sum ternis partibus, comitali morbo. Et uuluarum conuersionem sustinuit
 excitat odore aceto mixto. Item lethargicos. Est autem id semen ex fesele. Et si uehementior somnus
 lethargicos premit, cruribus, aut etiam capiti illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thoracis, lumbo-
 rum, coxendicium, humerorum, & in quacunque parte corporis ex alto uitia extrahenda sunt, illitum cau-
 stica uiu emendat, pustulas faciendo. At in magna duritia sine fico impositum, uel si uehementior ungo
 tuncatur per duplices pannos. Vtuntur ad alopecias cum rubrica, psoras, lepras, phthiriazes, lithanicos,
 opisthotonicos. Inungunt quoque scabras genas aut caligantes oculos cum melle. Succusque tribus mo-
 dis exprimitur in fideh, calescitque in eo in sole modice. Exit & e cauliculo succus lacteus, qui ita cum in-
 duruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix cum maduere, multo conteruntur: manusque plenz
 mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusque omnes. Mulierum etiam
 lassitudines, saluberrimo genere medicinz. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Illinitur & liuori
 bus, fuggillatisque cum melle & adipe anserino, aut cera Cypria. Fit & oleum ex semine madefacto in
 oleo, expressoque, quo utuntur ad neruorum rigores, laborumque & coxendicu perfrictiones. Quartus
 ei.] Hoc est, sinapium siccum & calidum est in quarto gradu. Extenuat.] Tenuis facit, ac prius
 dissoluit. Phlegma.] Pituitam. Fungos.] Vlcera in sede. Phthirimque.] Quo malo fit exulcera-
 tio pulmonis a capite distillante. Schiasim.] Ichthiam tu semper intellige, ubi hac dictione non recepta
 utitur. Luminibusque.] Oculis. Tormenta.] Dentium dolorem. Serophas.] Apostemata
 sublingua. Stera.] Hystere hoc est matricis. Lethargum.] Morbum in quo est marcor, & in expu-
 gnabitis pene dormiendi necessitas. Alopecias.] Fit hoc malum cum capillorum profluuiio: de Alo-
 pecia lege Celsum lib. 6. cap. 4. Et Caelium, Antiquarum lectionum lib. 10. cap. 41.

DE CAULE.

AVLIS Romana, Grecorum brassica lingua

Dicitur: is quamuis passim nascatur in hortis;
 Est tamen illius ad multa salustifer usus.

Annis sexcentis ufos medicamine caulis

Romanos, Catotestatur, medicina priusquam

A medicis Roma descripta fuisset in usu.

Tunc hortus effectus illis debet, & medicinas.

Vulnera non tantum curare recentia caulem

Ipsemet affirmat, sed quamuis inueterata:

Et caneros etiam: loca sed prius amine laxari

Præcipit, aut uino tepido; sic denique crudum

Vnaquaque die bis tritum apponere caulem.

Hordeum quam dederint, cauli miscere farinam

Idem præcepit, tritam quoque cum coriandro,

Et sale permodico: sic omnia mixta terendo

Apponi diu docuit cataplasma podagra.

Hoc etiam morbis medicabitur articulorum.

Hoc quoque syringas ait, & luxata iuuare.

Atque superpositum, uarios sedare tumores.

Illius urinam, fuerit qui caulibus usus,

Causis neruorum calidissimam censuit aptam.

Hac ex urina pueri si saepe laxentur,

Asserit illorum multum conferre salutem.

Hac narrat de caule Cato. Scripsisse libellum
 Chrysippum deum huius de uiribus herbe.
 Omnes confirmant, caligine lumina tergi,
 Eius qui uiridi uesctur caule frequenter.
 Auger lac matris cibis eius, menstrua purgat:
 Atque inuolat stomachum, sumptus ut concoquat efcas.
 St multum coquantur, restringere dicitur aluum.
 Ac semicrudus solet illam solvere sumptus.
 Ac sumptus crudus sic ut tingatur aceto,
 Splen reprimat tumidum: semen depellit abortum.
 Ncto cum ueteri coctus bene conseret caules,
 His oleum roseum quantum res postulat, addas,
 Ardores nimios inuolat hac confectio febris,
 Si superaddatur stomacho, membro ue calenti.
 Acri non scissum si mergis alumen aceto,
 Et caules, sic ut corpus redigantur in unum,
 Canela terendo diu; poterit hoc compescere lepram,
 Et plures alias maculas his saepe perungent.
 Hic etiam crines potius trituere fluentes:
 Dicitur & tester istud curare tumentes,
 Et uarios morbos generatim que patiuntur.
 Et melius si predictis faba cocta iugatur.
 Cum sanguine si tundis hanc & aceto,
 Et super arthriticas apponas ista dolores,

AE MILIUS MACER

uino potum contra uentris dolores. Pellit & urinam, & phagedanas ulcerum sistit recens cum melle im-
positum. Vel arida farina interlam radicem eius Dieuces contra iocundis ac henis, ilium, lumborum,
crennum uitia, ex aqua multa dari iubet. Cleophrantus & dysentericis ueteribus. Philistion in lacte co-
quit, & ad stranguriam dat radicis uncias quatuor, ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleu-
riticis, & comitialibus. Habentes eam, feriri à serpentibus negantur: aut qui ante gustauerint, non laedi.
Percussis imponitur cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorum inesse sta-
phylyno dixit; fortassis quoniam uenerem stimulari hoc cibo certum est; ideo conceptus adiuuare aliqui
prodiderunt. Ad reliqua & fatua pollet. Efficacior tamen syluestris, magisque in petrosis nata. Semen
latius quoque contra scorpionum ictus, ex uino aut posca, salutare est. Radice emstrum scalpri dentes,
dolore liberantur. Syria in hortis operosissima (inde quoque est prouerbiu graecis, Multa Syrorum ole-
ra) simillimam staphylino herbam ferit, quam alij gingidion uocant: Tenuis tamen & amarius, cuius
demque effectus est, coctum crudumque stomachi magna utilitate. Siccat enim ex alto omnes humores
Althmaticos. Quos asthma premittit, quod fit cum anhelitus cum difficultate trahitur. Qui pa-
stinacam. Mirabile hoc quidem & omnipotentia Dei miraculum, si uerum, qui hoc asserunt, loquun-
tur. Venerem. Quis putat hic opus esse, ut admoneamus quempiam, ut hic attenti audiat, cum etiam
stupidi lectores, in talibus narrationibus libenter arrigant aures, quod facit hominibus innata libido.
Quod paltum. Vnde fit dicta paltinaca, docet.

DE ORIGANO.

RIGANI utres calide succa; leguntur.
Tertius huic in utroque gradus conceditur esse.
Illius in uino curat decoctio sumpta
Quosuis pestiferos morsus, si saepe bibatur.
Cum multa sumpta prodest aconita bibenti.
sic multis alijs dicitur obistere uenenis.
Conquassata iuxta manus, uel saepius haustum.
Hydropicos reprimat bibitur, siccata; tumores.
Cum multa bibitur, choleram deponere nigram,
Dicunt oxybaphi fuerit si pondere sumptum.
Mensura deducit bibitur, uel si superaddas
Tritum, uel cocta midet si se foverit herba.
Illius pulvis rissim cum melle repellit.
Pruritus, acoras, maculasque cutis fugat omnes,
In quo decoquitur, si saepius amne lauentur.
In lauacro iuuat ietericos hac coctio sumpta.
Succus predictae uiridis si sumitur herba,
Vnas & fauces curat siccando tumentes.
Oris uulneribus medicabitur ore retentus.

Naribus infusus, irino mixtus olivo,
Infusum capiti coget manare cruorem.
Auribus infusus sedat cum lacte dolorem.
Hic succus mixtus cepis, & rosyraco,
Ponitur ad solem, cum quando Sirius ardet.
Sicque quater denis fruebit in are diebus.
Si supponatur lecto confectio talis,
Effugit (ut dicunt) animalia cuncta nocua.
His quibus ex aliquo uitio digestio tarda
Euenit, ex uino prodest si sumitur alio.
Cum calida morsus stomachi tenere probatur.
Illius succos oleo mixtos, & aceto
succida lana bibat, & sic superaddita membris
luxatis uel contrusis, multum iuuat illa.
Pronocat urinam, lumbricos proicit haustu.
Dente diu tritum solet inde fugare dolorem.
Omnia potatiss succus inuicat interiora.
Eius cum succo si caryca tria bibatur,
Sudorem sporis producere fertur apertis.
Appositus coxis succus cum polline farris,
Haurum saepe grauem pellit reprimat uel dolorem.

ORIGANI. Huius herbae tertia est species, secandi, & attenuandi, & arefaciendi, & calefaciendi,
potentia. in tertio hac habet ordine: nam heracleotica efficacior est onitide, estque agrestis, quam pana-
ces heracleum, alij cumilam uocant. At quae dicitur tragoniganus, quiddam etiam admittit acerbitatis, hac
Valla. Illius in uino. Origanum quod in sapore cumilam emulatur, plura genera in medicina habet,
& onitum uel prasion appellant, non dissimile hyssopo. Priuatim eius usus contra torsiones stomachi in
tepida aqua, & cruditates. Contra araneos, scorpionesque in uino albo. Luxata & contrusa in aceto,
oleo, & lana. Auctor Plin. lib. 20. cap. 17. Aconita. Venena. Cholera. Atram bilem. Persius
de hac: Atram bilem. Oxybaphi. Hemine, quae continet dimidium sextarii. Pondere. Menfu-
ra. Menstrua. Muliebria, menses. Acoras. Capitis ulcera. Amne. Aqua. Ietericos.
Ietero, hoc est morbo regio correptos. Vnas. Quod malum circa fauces nascitur: sic dictum, quod ue-
lut uua dependeat, de quo & supra. Irino. quod iris herba praebet, & quod ex iride fit, ut uerbis
Perotti. Sirius ardet. Hoc est canicula. Est autem sirius proprie stella in ore canis admodum pern-
ciosa. Aere. Olla. Succida lana. Hec à succidendo dicta, quod talis sit, qualis succida est, hoc est
plena sordibus. Varro à sudore deriuat: dicit enim consurgere tempus inter æquinoctium uernum & sol-
stitium cum sudare inceperunt oues: à quo sudore recens lana tonsa, succida est appellata. Iuuenalis, Qua-
lis coena tamen? unum quod succida nollit Lana pati.

DE SERPILLO.

ERPILLVM ueteres dixerunt, quod quasi serpat.
Terra uicinum: huic feruida succa; is est.
Acti cum uino coctum, contundis olivo
Cui rosa dat nomen: hoc unguine perline frontem

Aegroti, capiti solet hoc sedare dolorem.
Nidor combusti serpentes effugat omnes,
Et quoduis animal infundens ore uenenum.
Hoc ideo miscere cibis, messoribus est mos,
Ut si forte sopor fessos depresserit illos,

vermibus & nocuis tunc requiescere possint.
Pessimos morbus balneum inuade, appositumque.
Prostat utrinque, compescit tormina ventris.
Splen tunc admixto si saepe bibatur aceto.

SERPILLUM ueteres.] Serpillum (inquit Plinius) à serpendo putant dictum, quod in syluestri erigit in petris maxime. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Pinguis uoluntarium & candidioribus folijs & ramis, aduersus serpentes efficac, maxime cenchrin, & scolopendras terrestres ac marinas, & scorpiones, decoctis in uino ramis, folijsque. Fugat & odore cominus si uratur. Et contra marinarum uenena præcipue ualeat. Capitis doloribus decoctum in aceto illimitur temporibus ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina, & urinae difficultatem, anginas, uomitiones, drachmis quatuor datur. Ex aqua bibitur & ad iocinerum dolores. Folia obolis quatuor dantur ad tamen ex aceto. Ad cruentas excretaiones teritur in cyathis duobus aceti & mellis. Vergilius serpillum inter olentes commemorat, cuius est hoc carmen in Alex. quæ est eclogarum secunda:

Allia, serpillumque, herbas contundit olentes.

Oliuo.] Oleo rosaceo. **Messoribus.**] Quod & Thestylis rustica mulier fecisse dicitur à Vergilio,

DE VIOLIS.

E roseus superare decor, nec litia possunt
Eragantes violas specie, nec in, nec odore.

Dicitur humida uis illis, & frigida primo
esse gradu. species tres esse leguntur earum,
Nascentur quas eandem diuerso flore ualeamus.
Nem sunt purpurei flores, albiq; nigriq;
Cunctis pene partes sunt in medicamine uires.
Inflammati uisq; loca, trita si superaddas.
Crispata discutiuntur bibitis, capitisq; grando,
Olfactu solo, uel si caput inde coronas.
Anginis potest medicantur aqua resoluta.
Purpuream uiolam dicunt curare caducos,
Præcipue pueros, si mixto sumitur amne.
Radices uiole cum myrrha tunde, crocoq;
Hoc inflammatis oculis apponito nocte.
Constitu folijs uiole cum melle perungens,
Vlcera sanabis capitis si iungis acetum,
Et cataplasma facis, ceder collectio queris.
Illi curat elixatur a tumorem
Mauris, repida si saepe fouebitur illa.
Ani fissura, quas appellant rhagadias,
Addas cerotis medicatur saepe perunctis.
Pustula si fuerit, melli superadde iugata.
Illi semen cum uino, menstrua purgat.
Tunc cum mixto radices eius aceto,
Splen sicant bibite, uel splen si superaddas.

Hocq; modo calidam dicitur sedare podagrama

A stomacho cholera rubeam potata repellit

Herba uirem uiole, uel flor. succisat, recens ue.

Morbos de cholera rubra, uel sanguine factos,

Mollibus in costis, aut in pulmonibus ipsis,

Sedat, si mixto potabitur amne recenti.

Infantium cassum, sic & suffiria sedat.

Ex uiole oleum, sicut de flore rosarum,

Conficiunt, multis quod dicunt uile causis.

Antibus infusum, sanctorum fugat aequa dolorem.

Ei capiti prodest quocumque dolore laboret,

Teniter in frigidam, corpusq; sopore resoluens.

Lumbaribus necat infusum, bibicum, uel inunctum.

Eragapus furfur, oleo depellitur isto.

Os capitis ictu fuerit si forte plicatum,

In tantum, ut lingue patenti amiserit usum;

Fac prius hanc uiolam cum uino sumere tritam;

Postea, si fuerit capitis pars dextera laesa,

Contricam plantæ pedis hanc adnecte sinistri;

Aequa e conuerso facias, si laeva plicata est;

Os resiliit, linguaq; die redit usus eadem,

Ut inquit tradit medicus, qui calia scripsit.

Altera uis uiole fertur mirabilis esse.

Alba si uiole radix uenerit in ore,

Et transglutius sic succus sapiuicini,

Vulnere immo dicunt tradunt maxillæ fluxum.

Hanc liquiritia tradit uim Plinius esse.

NEC ROSEVS.] Viola folia (inquit Placen. Valla) Aquosam & subfrigidam obtinent potestatem, & per se, & cum farina subacta, calidas inflammationes auertunt. Quæ alio etiam id apponitur, & inflammatis oculis. Violarum (auctore Plinio) plurima genera: purpureæ, luteæ, albæ, plantis omnes ut olus satæ. Exiis uero quæ sponte apricis & macris locis proueniunt, purpureæ, latiore folio, statim ab radice carnosæ exeunt: solæ quæ græco nomine à cæteris discernuntur, appellata iā, ut ab his ianthina uelut. Sed satius maxima auctoritas luteis, genera ijs tuscoulana, & quæ marina appellatur, folio aliquanto latiore, sed minus odorato. In totum uero sine odore, minuto quæ folio calathina, munus autūni, cæteris uicis. Superare decor.] Liliū rose nobilitate proximum est, uiole honos proximus, hæc etiam Plinius. Et uide, quā raro discadat à Plinio auctor noster, & quā frequenter eisdem cum Plinio uerbis utatur. Ob eam causam magnæ auctoritatis apud me est hic Macer, quicumque tandem sit. Et nemo doctus est, qui negare possit hunc esse doctum librum. **Fragrantes.**] Odorem emittentes, odoras. **Pares.**] Aequales potestates. **Anginis.**] Hoc malum ut sup. Græce οὐδύνη, de quo lege Celsum lib. 4. cap. 4. **Caducos.**] Comitiali morbo laborantes, quem S. Valen. nec scio ob quam causam, uocant. **Myrrha.**] Quæ arbuscula maxime prouenit in Arabia. In myrrham arborem scribit Qui. poetarum in geniosissimus, Cynaræ regis Cypriorum filiam nomine Myrrham transformatam fuisse. **Crocoque.**] Quod tatarum communiter appellant. **Rhagadias.**] Anus quoque multa tardijque plena mala recipit, nec in se multum abhorrentes curationes habet. At primum in eo saepe, & quidem pluribus locis

antis exciditur. *Græci* uocant. Id si recens est, quiescere homo debet in aqua calida desiderare. Colubina quoque omnia coquenda sunt: & ubi induruerunt, purganda. deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, sicut in uniceum utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyodes, rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendum cum terato liquido ex rosa facto: aut eidem terato liquido plumbum elotum adijciendum. Aut resina terebinthina, aut spuma argenti, uetus oleum. Et quolibet ex his ad perungendum. Sic quidquid lesum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est: & quidquid ante adhibuimus, terato cōtegendum. In hoc autem casu neque acris, & tibus utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus, ne aridum quidem quidquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt. Vix leni uti, nihil prohibet. Hæc Celsus. Rubeam.] Modo iterum occurrit hæc illatina dictio, nec quidquam prohibet legere rubram: & in tertio uersu sequenti pro rubea, rubra. Plicatum.] Cōstitutum.

DE ARISTOLOCHIA.

ARISTOLOCHIAE species tres dicimus esse.

A Longa prior, radix est cuius longa, uocatur. Dicitur rotunda sequens, quod sit radice rotunda. Tertia dematit, græco sermone uocatur. Viribus hæc penè par dicitur esse rotunda. Omnes uim calidam siccamque leguntur habere. In primo uis sacra gradu, feruensque secundo est. Pestiferor morfarum uino sumpta rotunda, curat, & assumptus prodest sic hausta ueneris. Hæc modo tardas educit sumpta secundas. Cum pipere & myrrha putredine mandat ab omni, Post partum, potata, iteras, uel subdus tantum. Asthmaticis prodest, & frigora sumpta repellit. Pleuriticis curat, mixto si sumitur amne. Quodlibet infixum, superaddita crura, repellit. Videretur cum melle purgatque repletque liquore. Quod si praedictum coniungis, & inde Ungas gingivas, denique putredine purgas. Splenis duritiam soluit, laterumque dolorem, si mixta potatur aqua, febresque malignas.

ARISTOLOCHIAE species.] Aristolochie, seu aristolochia dicitur. Inter nobilissimas, aristolochie nomen dedisse grauidè uidentur, quoniam esset *ariston* & *lochos*, nostri malum terre uocat, & quatuor eius genera seruant: Vnum tuberibus radicibusque rotundis, folijs inter malum & hederam nigrioribus, pinguioribusque. Alterum masculè, radice longa quatuor digitorum longitudine, baculi crassitudine. Tertium longissimè tenuitatis, uitis nouellæ, cui sit præcipuus, quæ dematit uocatur, ab alijs Cretica. Omnes colore buxo, caulibus paruis, flore purpureo. Ferunt baculas paruas uelut capparitis. Valent radice tantum. Est & quæ pistolochia uocatur, quarti generis tenuior quam proximè dicta, densis radicis capillamentis, uinct plenioris crassitudine. Hanc quidam polyrhizon cognominant. Odor omnium medicatus. Sed oblonga radice, tenuiorque gravior. Carnosi enim est corticis, unguentis quoque nardinis conueniens. Nascuntur pinguius locis & campestribus. Effodere eas mellebus tempestiuum, ita disquam to terreno seruantur. Maxime tamen laudatur Pontica, & in quocunque genere, ponderosissima, quæque medicinis aptior. Rotunda contra serpentes. Oblonga in summa tamen gloria est etiam modo. A conceptu admota uuluis in carne bubula, mares figurat, ut traditur. Piscatores Campanie radicem eam quæ rotunda est uenenum terre uocant, coramque nobis contusam, immixta calce in mari spargere, aduolant pisces cupiditate mira, statimque exanimati fluitant. Quæ polyrhizon cognominatur, conuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, utilissima esse traditur. Semine pleuriticis & neruos confricare, exalfacere. hæc Plinius. Secundas.] Quod partum statim sequi debeant ex nature ordinatione, secundas dici uolunt. Putredine.] Quod maxime intelligitur de rotunda: oppilationem enim & crassitudinem, uel spiritus incosti dolorem curat, putredinibusque medetur. Et tabida purgat hulcera, dentesque, & cicatrices in oculis illustrat. Asthmaticis.] Opitulatur asthmaticis, grauemque anhelum trahentibus, & uacillatibus morbo comitiali, & podagricis, pota cum aqua, & fracturis, et lincatis membris, si quod aliud medicamen, idoneum est. Irim.] Herbam, de qua sequitur. Spasms.] Cōtractionibus neruorum. Paralyticis.] Qui neruorum patitur resolutionem. *resolutio* enim græcè resolutio neruorum dicitur. Inde, paralyticus. Exhilarari.] Hilares fieri. Fistula.] Quam græci *lyringa* uocant, de quo malo etiam supra. Illa.] Rotunda aristolochia, quia longa minus partium tenuium est, at uim ab stergeri calefaciendi que habet: ideo carnem hulceribus superinducit, utiliorque existit. Plinius hæc.] Lege Plin. de aristolochia lib. 25. cap. 8. & cap. 13. & 17. Et iterum lib. 25. cap. 9. ac cap. 17. & 16, & undecimo, & 12. & 13. & 16. capitibus.

Hoc potata modo fertur compescere mirè. Sic etiam spasms super omnia subuenit hausta. Et sedat diram sic sapius hausta, podagram. Et morbum curare solet sic sumpta caducum. Et ueneris nimium sic mingat illa dolorem. Sic quoque sic sumpta lenior paralyticus illa. Dematit fumus depellere dicitur eius. Infantes fumo ducunt hoc exhilarari. Fistula curatur fumus radicibus herbe, Si bene purgati eius loca concana farch. Singulis sumpta sedari dicitur illa. Omnia longe potest, quæ dixi posse rotundam. Longa tamen uires habet illa debiliores. Vnde quidem si defuerit quandoque rotunda, Par pondus longa ponatur, dimidiumque. Fomeno longe prodest decoctio mirè. Matricum morbis, humores excremando. Pingues, & purgat, eadem si sumitur, illas. Plinius, hanc formare mares, cum carne bouina, Apposuiam uulua, postquam conceperit, inquit. Tertia necat pisces admixta calce rotunda. Hanc ideo quidam terra dixere uenenum.

AE MILI VS MACER

DE INVLA

INVLA, quam vulgus elnam vocat, elintumq;
Dicitur à medicis: est forma cognita cunctis.
Humida vis eius, & fervida dicitur esse.
Humor habere gradum primum, feruorq; secundum,
Dicitur. illius decoctio, menstrua purgat:
Si bibitur, movet urinam, depellit abortum.

INVLA quam vulgus. Est hæc herba humida in primo gradu, & calida in secundo. Purgat menses, cit urinam, abortum quoque pellit, uentrem laxat, dolorem coxendicum fugat, nephreticis ulque ad miraculum prodest, sanat tussim, & orthopnoicos, rupturasque curat.

Dicitur hac eadem stipatum solvere uentrem.
Radix trita fugat schiasim superaddita coxa.
Ex eius folijs cum uini neclare coctis,
Mire nephreticis renes involuere prodest.
Eius radicem pulvis cum melle uoratus,
Tassum compescit, orthopnoicisq; medetur.
Cum succo ruta, succus si sumitur eius,
Affirmant ruptis quod prosit potius talis.

DE HYSOPO

ST hysopum succum, calidum quoque. tertius illi
Est in utroque gradus: eius decoctio facta
Sit, ut multa simul sint met, sic ut quaque sicca,
Prodest non modicum patientibus hausta catarrhum.
Subuenit & noci uanca uersata palato.
Et prodest cunctis pulmonum sumpta querelis.
Lumbricos uentris eadem potata repellit.
Et peccus, capitis si distillatio fiat, & hy. in pectus
Que per sepe solet tussim, phthisimq; creare, & ad
Prodest hac eadem decoctio sumpta frequenter.
Omnibus his prodest pulvis cum melle iugatus.
Contrito utridi si iungitur oxymel illi,
Sicq; datur bibitum, stipatum molliet aluum.
Potio si uiridis uel succi saepe bibatur,

Vulubus eximium fertur prestare colorem, nota
Cum uento nocuo, uiscolum phlegma repellens.
Cardia si iungas, his folijs fortius aluum.
Cum nitro & sicca si conteris ipsum,
Et superapponas spleni cataplasma tumenti,
Hydropicis ue, solet succando repellere morbum.
Cum uino bibitum, praecordia tersa relaxat,
Et quicunque nocet tumor interiora, recedit.
In quo decoquitur, si dens sonatur aceto, son.
Fertur ab immodico cito saepe dolore lenari.
Accense fumo, sonitus compescitur auris.
Elixum appositum, humores lymphat omnes.
Sic inuat ictericos iniectione naribus idem.
Auriculæ: grauem dicunt curare dolorem,
Hoc mixtum roseo si fundis intus oliuo.

EST HYSOPVM. Malè & contra naturam produxit mediam huius nominis. Pueris igitur in hoc non est imitandus. Est autem hysopum calidum & sicum in tertio gradu. de hysopo lege Plin. lib. 25. Catarrhum. Malum quod fit ex distillatione humoris ex capite. Distillat autem humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdum etiam in pulmonem, quod pessimum est. Si in nares distillat, tenuis per has pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia stertutamenta sunt: si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet: si in pulmonem, præter stertutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, fitis, æstus, biliosa urina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) grauedo est. hæc nares claudit, uocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem salsa est salina, sonant aures, uentis mouentur in capite, turbida urina est. Hæc omnia xoplas Hippocrates nominat. Phthisimque. Tabem, uel sanguinis reiectionem. Oxymel. Si comiscetur oxymel uiridi cōtrito hysopo. Stipatum. Duritiem alui. Phlegma. Pituita. Hydropicis. Aqua intercute laborantibus. In quo decoquitur. Remedium notatu quidem dignissimum aduersus dentium tormenta. Lymphat. Extenuat & purgat. Istericos. Ictero, hoc est malo regio correptos.

DE ASARO

ST asarum graecè, uulgago dicta latine.
Hæc calide & sicca uirtutis dicitur esse:
Tertius est illi gradus, ut dicunt, in utroque.
Promouet urinam, potatq; menstrua purgat.
Hocq; modo iecoris medicatur sumpta dolori.
Hydropicisq; inuat, schiasim fugat, hausta frequenter.
Et multus morbis decoctio subuenit eius.
Dicitur ictericam potata repellere morbum.
Helleboriq; modo uomitu praecordia purgat.
Sed non est huius purgatio tam uiolenta,
Nec metuenda quidem, si fiat saliter illa.
Aetatem & uires eius circumspecte primum,
Quem purgare uoles, & tempus quale sit anni,
Et si sit regio feruens, uel frigida ualde,
Aut si temperiem mediam tenet inter utranque.
Nam senibus pueriq; parum donare licet:
Aetatis media plus his, iuuenesq; requirunt.
Pinguibus & ualidis plus dandum, quam macilentis.

Debilibusq; uiris magis in gelida regione
Dandum, quam calida: duris quocunque labore
Plus illis tribues, quos redunt otia molles,
Hæc circumspectis, & cetera talia tractans,
Non solum tutus dabis hanc, sed quaslibet herbas,
Quæ purgant uomitu, uentrem, stomachumq; resoluunt.
Sed quia de cunctis dixi communiter herbis,
Quo sit danda modo proprie uulgago, docebo.
De folijs eius triginta recentia tollens,
Adde meri tantum, quo possint cuncta recondi.
Tota nocte mero facias macerantur in illo;
Manè terens, uino, quo sunt macerata, resolis.
Tunc olus excoctum cum pingui carne recentis
Porcina, prius ægroti da sufficienter,
Et sumat uini, uult quantum, fortis & albi;
Sic asari succum colatum trade bibendum.
Fortibus & magnis est hic numerus foliorum,
Sufficiens, reliquis (ut diximus) est minuendus.
Iuxta quod uires, ætas, & cetera poscunt.

EST ASARVM.

EST asarum.] Hanc herbam Græci *asarum* uocant, quoniam in coronas non addatur. auctor Plinius libro uigesimo primo. Asaron, quidam crocum hortensem uocant. Plinius bacchar uocat. Huius radices utiles ferè, ut acori, sed magis explicantur; & perinde quod de illo iam dictum, id de hoc intelligatur, auctor Placentinus. Tertius.] Hoc est asarum calidum & siccum est in tertio gradu. Hydropicos. aqua intercute laborantes. Schiasm.] Ischiam, ut sæpe aliàs, intelligit, hoc est coxarum dolorem. Vuluz.] Hysterz, id est matricis. Ictericum.] Arquatum & morbum regium. Hellebori.] Veratri. Macilentis.] Qui sunt macilento & macro corpore. Macerentur.] Extenuentur, siue mollescentur. Macerata.] Extenuata.

DE MENTHA.

IM calidam, succamq; gradu fert mentha secundo.

Illius potu uis digesta iuuatur.

* Cofortat stomachum, uomitu quoque destinet hausta.

Embricisq; modo depellere fertur eodem.

Diuerso morbis occurrat testiculorum,

si foueatur aqua, qua mentha cocta sit herba.

Concreta soluit lac mammis addita trita.

Instillata fugat auris cum melle dolorem. *mirum.*

Asperitas lingua fugit illa sæpe fricata.

Haustaq; cum sapa partum solet accelerare. *ly. Cury, sapa, potu &*

Tritæ canis mortem superaddita cum sale curat.

Hæc hæmorrhoides mixto succurrit aceto. *ly. hæmorrhoides*

Matrici succus si subditur illius ante.

Quam fuit coitus, mulier non concipit inde.

Cæcos succus putrescere non sinit eius

Admixtus, uel si uiridis superadditur herba.

VIM CALIDAM.] Menthae nomē suauitas odoris apud græcos mutauit, cum aliquin *mintha* uocaretur; unde ueteres nostri nomen declinauerunt. Grato mentha mentas odore percurrit in rusticis da-

pibus. Semel satur diutina ætate durat. Menthae ipsius odor animum excitat, & sapor auditatem in cibis;

ideo in mammarum mixtura familiares ipse accelerare, ut coire, dentareque fac non patiantur. Quare lactis

portionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem uis resistere &

generationi creditur, cohibendo genitalia densari. Acque manibus & foeminis sistit sanguinem, & purga-

ones foeminarum inhihet. Cum amylo, ex aqua pota, coeliacorum impetus. Syriation & uomicas uuluz

curauit. Illa & iocinerum uitis ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem excreantibus in sorbitio-

nem. Vlcera in capite infantium mirè sanat. Arterias humidas ficit, siccas astringit. Pituitas corruptas

purgat in mulso & aqua. Voti succus sub certamine utilis duntaxat, & qui gargarizatur una tumente,

adfecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cum alumine, linguz asperæ cum melle. Ad

conuulsas intus per se, uitijsque pulmonis. Singultus & uomitiones sistit cum succo granati, ut Democri-

tus monstrat. Recentis succus narium uitia. Spiritus subductos emendat. Ipsa trita choleras in aceto

quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta, & si mammæ tendantur.

Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras & scorpiones marinos, & ad

serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis uitijs. Impetigines quo-

que, uel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & hien mederi eam in

horto gustaram, ita ne uellatur, si is qui momorderit, dicat se hien mederi per dies nouem. Aridæ quo-

que farinæ tribus digitis apprehensam, & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersa in potio-

nem, uentris animalia expellere. Fert mentha.] Hoc est, mentha est calida & sicca in secundo gradu.

Illam.] Mentha, & est casus auferendi. Sapa.] Est sapa, mustum usque ad tertiam, siue dimidiam

partem decoctum. Hæmophth.] Sanguinem spuentibus.

DE CYPERO.

IM cypero medici calidam succamq; secundo

Dicunt esse gradus. potu depellitur eius

Calculus, uisina purgat laxatq; meatus.

Dicit Apollodorus, quod pellere possit abortum, *ly. Apollodorus*

Si mulier foueatur aqua, qua toxerit illum.

Asperit hic idem consumere posse lienem.

Uitæ sumus si sepius ore trahatur.

Si se sanu homo fumo suffumiget illo,

Dicit eum fieri formæ magis & leuiorem.

Subleuit alium uitijs, admixtus olio /

Succus sic uitijs fugat intertriginis unctum. *ly. uitijs.*

Humores nimios depellit sepius haustus.

Illius solus puluis, melli uel iugatus

Vlcera misceat, uel uulnera putrida purgat.

Præcipue puluis hic ulceribus ualet oris.

Si bibitur, stomachum confortat debilitatum.

Hydropici multum succurrit sepius haustum, *ly. xij dropi*

Atque per urinas humores purgat aquosos.

Concreta uatidum cypero si iungas acutum, *ly. confuso, uatidum si iungas acutum,*

Vlcera qua serpunt, cohibes medicamine tali.

VIM CYPERO.] Cyperum calidum & siccum est in secundo gradu. Cyperi utiles admodum ra-

dices, calefacientes & arrefacientes absque la cinatione; unde per humiditatem multâ hulnera misceat iuuat:

habent nâque quiddam acerbescens, stypticumque: ob hoc hulneribus oris multum accommodatum, secan-

dique uim habent quandam, calidiusque medentur, & urinas & menstrua ciunt. Cyperum Plinius gra-

diolum uocari ait. Laxat.] soluit & aperit. Cyperi] (inquit Plin.) uis in medicina pilothri. Illinitur

peritygijs, ulceribusque genitalium, & que in humore sunt, omnibus, sicut oris hulneribus. Radix aduersus

serpentium ictus, & scorpionum præsertim, remedio est. Vulus aperit pota. Largiori tanta uis, ex-

pellit eas. Vnam diem & calculos; ob id utilissima hydropicis. Illinitur & ulceribus que serpunt, sed his

pellit eas. Vnam diem & calculos; ob id utilissima hydropicis. Illinitur & ulceribus que serpunt, sed his

AE MIL I V S M A C E R

præcipue quæ in stomacho sunt, ex uino uel aceto illita. Oliuo.] Oleo. Intertriginis.] Hoc malum est, cum membra simul intereruntur, & confricantur, accedente sudore. Hydropicis.] Quos hydrops tenet. Medicamine.] Medicamento, medela, medicina.

DE PAEONIA.

AEONIAM medici calidam seccamq; faciunt.

Hancq; tenere gradum dicunt in utroque secundum. Splen, secur, & renes cum mulla sumpta iuuabit.

Si iungatur ei uolenter amygdala trita,

Menstrua sic purgat, & fluxum detinet alui.

illius in uino decoctio sepius hausta,

Vesicae duros sedat sic sumpta dolores.

Et scotosim, sic illa iuuat, stomachiq; dolorem.

Calculus infantum potu depellitur eius.

Nephreticos eadem multum iuuat, & leucicisq;

Pressuras, inferre solent quas somnia nocte,

Paonia semen bibitur si sepius, arceat.

illius radix pueris suspensa caducis.

Non modicum prodest, uelut asserit ipse Galenus.

Quendam se puerum narrat uidisse caducum,

Aetas cuius erabannorum circiter octo:

Paonia puer hic radicem ferre solebat

Appensam collo: quadam uice concidit illa,

Moxq; puer cecidit: solito qua more ligata,

Protinus euasit. rem uero probare Galenus

Hanc plenè cupiens, radicem densè dempsit.

De collo pueri cecidit, uiguitq; resumpta,

Cognita uis herba fuit huius sic manifeste.

Ipse Dioscorides cunctis ait esse caducis

Aptam, si bibitur, uel si suspenditur illa.

Seminis illius ter quinq; rubentia grana

Cum uino fluxum matricis sumpta coarcent.

Nigra solent uarios matricum pellerè morbos,

Si totidem dantur cum uino nocte bibenda.

Huius sunt gemina species: mas dicitur una

Altera, qua minor est species, est femina dicta.

Radix maioris est palmis longa duobus,

Grossaq; ceu digitus: radix diuisa minoris

Dicitur in plures radices: hac bene purgat

Post partum potest fieri uina sociata:

In cunctis reliquis similis uis dicitur illis.

PAEONIAM medici.] Vetusissima inuentu pæonia est, nomenque auctoris retinet, quam quidam pætorobon appellant, alij glycyfiden. Hæc quoque difficultas est, quod eadem aliter alibi nunc-

patur. Nascitur opacis montibus, caule inter folia digitorum quatuor, ferente in cacumine ueluti græcas

unces quatuor aut quinque. Inest ijs semen copiosum, rubrum, nigrumque. Hæc medetur & sanorum

in quiete ludibrijs. Præcipiunt eruere noctu: quoniã si Picus Martius uideat, tuendo in oculos impetum

faciat, auctor Plin. lib. 35. 4. tenere gradum.] Hoc est, pæonia calida & ficca est in utroque gradu. Sco-

tosim.] Oculorū obtenebratione, quæ fit ex uertigine, uel alio uitio capitis. Nephreticos.] Renum

morbo obnoxios. Vidisse caducum.] Morbo, comitali laborantem; & magnum est naturæ & opifi-

cis Dei miraculum, quod solum docere possit, quantus sit dominus Deus noster, quamque infinite poten-

tiz. Fluxum matricis.] Alui seu uuluz. Huius.] Pæoniz sunt duæ species. Steras.] Hylleras

proprie & recte, atque iterum uuluz intelligit & matricis.

DE BORAGO.

ERBAM, quam Græci dixerunt melissophyllon,

Boragum nostri dicunt uulgariter illam.

Præ cunctis apibus gratissima dicitur herbi,

Nec gaudere magis ullius flore uidentur.

Contineat floris apium si uasa perungas,

Non fugient, meliusq; facis si lac sibi iungas.

Vnguine cultores retinent examina tali,

Auxilium præstans apium fert ictibus illa,

Ictus detrita tegitur si protinus herba.

Hocq; modo, quas uespa nocet uel aranea, curat.

Tritæ solet uerres compescere cum sale, strumas.

Hocq; modo, utijs dicunt succurrere fordis.

Ecceina purgatur decoctio cum sale succo.

Tali discutitur, infusio noxia potu.

Eius si uiridis decoctio sepe bibatur,

Antiquos dysentericos tuat & citiacos,

Asthmaticis eadem prodest, orthopnoicisq;

Ulcera depurgat, morbos lenat articulorum.

Herba canis morsus superaddita cum sale curat.

Eius fomento decoctio menstrua purgat.

Ore retenta, solet dentis sedare dolorem.

Lumina purgare caligine, Plinius inquit,

Eius si succo fuerint cum melle peruncta.

HERBAM quam.] Melissophyllū marthubio confimile est potentia, sed multo inferius, ob hoc

eo quisquam ferè nō utitur. Cum enim in omni terra sit melius marthubium, eo uti malunt: nisi marthubium desit, ubi eo utendum sit, tum hoc utendum. Alio nomine dicitur apiastrum, putaturque ea esse, quæ

melissam uocant. Lege de melissophyllo Plin. lib. 21. cap. 9. Et lib. 20. & cap. 12. & iterum lib. 21. cap. 20.

Apibus.] Inde apiastrum, quia nullo flore apes magis gaudent. Apium uasa.] Aluearia intelligit, et

est modus examina retinendi, minimè negligendus. Dysentericos.] Torminosos. Ciliacos.] Qui a-

ex stomachi uitio uentris profluvium patiuntur: de hoc malo lege Celsum libro 4. Asthmaticis.] dif-

ficulter spirantibus. Orthopnoicis.] Hos intelligit, qui, nisi recta ceruice, spirare nequeunt.

DE SENECIO.

RIGERON Græci, nos Senecion uocamus;

Quæ canis similis uideatur flore capillis.

Nascitur in muris, & in hortis, & tabulatis.

illius herba sals frigida dicitur esse.

in medicinali radice non ponitur usu.

Floris cum folijs tundens, infundito uini

Permedicum

per modicum dulcis, sic tepefacta, cumori sic &

Hec simul apponit, et, ut reficidiorum.

Addit etiam istis, nervos et vulnera, quous

Curabit facile, posito cataplasmate tali.

Hec eadem trit facient etiam capitelli.

Potari prohibent, quia suffocare bibentem

Quidam confirmant, ac contra Plinius auctor,

Ictericis quondam potum donasse salubrem

Cum vino dicit: saliq; modo medicari

Morbis vesicae plures ait ille probasse:

Et cordis atque illam, iterumq; dedisse.

Torminibus quoque cum passo, iussisseq; potu

Hoc ut rios morbos praecordis quae patiuntur.

Et viridis facit hac si trita ueretur aceto.

Trita solet duras hac cum sale stargere strumas.

Hanc circumscripam si quis fodiat sine ferro,

Et tangat dentem uicibus tribus inde dolentem,

Vnaquaque stueni vice, postq; reponat eodem,

Quo fuit orta loco, sic rursus tuiet ut herba;

Plinius ut dicit, non amplius ille dolebit.

ERIGERON Graeci.]

Erigeron à Graecis, quae à nostris uocatur senecio. Hanc si ferro circumscri-

ptam effodiat aliquis, tangatque ea dentem, & alterniter despuat, ac reponat in eundem locum, ita ut ui-

uat herba aiunt dentē cum postea non doliturum. Herba est trixaginis specie & mollina, cauliculis sub-

rubicundis, nascitur & in tegulis & in muris. Nomē hoc Graeci dederūt, quia uere canescit. Caput eius nu-

meros adiuuatur lanugine (qualis est spinæ) inter diuisuras exeunte. Quare eam Callimachus acanthida

appellat, alij pappum. Nec deinde Graecis de ea constat. Alij cruca folijs esse dixerunt, alij roboris, sed mi-

nonbus multo. Radice alij superuacua, alij neruis utili, alij potu strangulante. E' diuerso quidā regio mor-

bo cum uino dederunt, & cōtra omnia uetifica uitia. Item cordis & iocineris. Renibus extrahere harenam

dixere. Ischiadicis drach. cum oxymelite ab ambulatione propinquare, torminibus quoque in passo utilis-

simam, praecordijs etiam cibo & aceto eam praedicantes, serentesque in hortis. Nec defuerunt qui & alte-

rum genus facerent. Nec quale esset demonstrarunt; contra serpentes in aqua bibendam, edēdamque cō-

initialibus dātes. Lanugo eius cum croco ex exiguo aquae frigidae trita illinitur epiphoris. Tosta cum mi-

ca salis, strumis. auctor Plin. lib. 26. Canis capillis.] Canescere enim uidetur. In medicinali.] Radix

eius medicis nulli usui est. Cataplasmate.] Emplastro. Ictericis.] Ictero, hoc est morbo regio com-

prehensōs. Hanc circumscripam.] Id quod supra ex Plinio adscripsimus.

DE CHELIDONIA.

SSE chelidoniae species geminae referuntur

A' medicis: species est maior prima uocata,

Altera uero minor oculis medicatur utraque.

Cetero pallio hac lumina mater hirundo.

Plinius ut scripsit, quamuis sine cruce, reddit.

Hanc noster dicitur subter peragantibus illis,

Et defecari solito dum more recedant.

Indeq; nomen habet chelidonia, namque chelidon

Dicitur hac uolueris Graecorum more uocari.

Florentis succus cum melle coquatur in are,

igne leui, spumam donec proiecerit omnem,

Et quasi crassitiam mellis decoctio sumat.

Vtitur nullam dicam oculis medicamen, &

Quos caligo nocet, se sine hinc sepe peruenit.

Conteritur iuncto sibi radix eius anetho,

Et sic ictericis cum uino sumitur albo.

Dentibus affirmant, prohibet contrita dolorem.

De folijs eius conuersus si cataplasma

Cum uino fiat, maculas abstergere dicunt.

ESSE chelidoniae species.]

Quidam ineptē hāc herbam uocant coelidoniam, quasi domum coeli,

inter quos est Simon Genuensis: de qua re sic loquitur Antonius Codrus Vrcus, homo utriusque linguae

impensē doctus, in eo sermone, quem in laudem literarum graecarum habuit: Quid dicam (inquit) de me-

dis, qui chelidoniam ab hirundinis dictam, interpretantur coeli donum? Simon ipse Genuensis, & genti-

les alij plures huiusmodi sciant erroribus. Chelidoniam ab hirundinibus dictam cōfirmat Plin. lib. 25. di-

cens: Animalia quoque inuenere herbas, in primisque chelidoniā. Hac enim hirundines oculis pullorum

in modo refutunt usum, ut quidam uolunt, etiam erutis oculis. Geminæ species.] Genera eius duo, in-

quit Plin. Maior fruticoso caule, folio pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudine duum cubitorum. Co-

los albicans, flos luteus. Minori folia hederæ rotundiora, minus candida. Succus croci mordax, semen pa-

paueris. Florent aduentu hirundinū, discessu marcescunt. Florentibus succus exprimitur, & in aereo uas-

le cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio cōtra caligines oculorū. Vtun-

tur & p se succo in collyrijs, quæ chelidonia appellatur ab ea. Auibus ueniētibus.] Hirūdinibus. Rece-

dunt.] Discedūt hirundines. Aere.] Aereo uase. Hoc.] Medicamine, Ictericis.] Arquatū morbum

(habentibus.)

DE CENTAVREA.

VNT centavrea species maiorq; minorq;

Ve supradictis dixi de pluribus herbis

Sed quia perpaucis species est cognita maior,

Hanc praemittens, nives narrabo minoris,

Quam notam cunctis credo uulgaribus ipsi.

Defecatione uirtutis dicitur esse.

Non modicum plagas conglutinat inde recentes,

Inq; cicatricem ueteres superaddita ducit.

illi qui schiasum patiuntur, decoctio mira

Prodest, illius si sit subiecta per animum:

sanguine detractio sedat mox illa dolorem.

Fomento neruis eadem me dicabitur agris.

Illius succus deducit menstrua sumptus:

Pellis abortiuum, me dicamina cuncta maligna

Cum uino sumptum, dicunt purgare per. album.

Melle sibi iuncto, caligine lumina purgat.

Illius exprimitur autumnus tempore succus,

Quem defecatum feruenti soli reponunt.

Ad renum curam, quam diximus ante salubrem.

AE MILIVS MACER

SVNT Centaureae.] Centaurea curatus dicitur Chiron, cum Hercules exceptus hospitio, pertra-
stanti arma, sagitta excidisset in pedem: quare aliqui chironion vocant. lege Plin. lib. 27. Plagas congluti-
nat.] Ingentia uulnera adglutinat uiridis herba superimposita: & quae difficillime in cicatricem coeunt,
superinducta in cicatrice cogit. & arefacta, conglutinantis ac arefacientis potentiae rebus admiscetur, quae
cunque sinus & fistulas curare possint. Caligine purgat.] Claros facit oculos, fugata caligine.

DE COLUBRINA

ERBA, draconitiam graecorum quam uocat usus,
Hae eadem, uulgo lingua colubrina uocatur:
 Quod colubra similis, maculoso cortice surgat.
 Ex quibus antiquis expertum credimus esse,
 Quod quae a summi colubrina uenena fugare.
 Quisquis se trita radice perunxerit eius,
 Tunc ab incursu serpentum dicitur esse.
 Moribus illarum cum uino sumpta, medetur.
 Si iungas oleum cum succo seminis eius,
 Auribus infundens, poteris sedare dolorem.
 Hoc succo tantam madidam si naribus addas,
 Compescet morbum, qui polypus est uocatus.
 Sic etiam canceris magnum solet esse iuuamen.
 Succo radice eius caligo fugatur,
 Et narium morbi quae lamina perpetuuntur,
 Ex ipso puro si sine lita, melle uel mixto.
 Et prodest oculis radix si manditur asse.
 Cum posca grauis terdenis seminis hausta.

Lumina munda ferunt, pulsa caligine, reddi.
 Si marcescentis illius floris odorem
 Nare trahat, praeponat, deponere fertur abortum: Mirum.
 Vel si sit radix matrici subdita trita,
 Pulvis radice eiusdem melle iugatus,
 Tassum compescit sumptus, sedatque catarrhum,
 Et confert haemorrhoidibus hoc sepe iuuamen.
 Pectoris humores exaurit non redituros.
 Omnibus his prodest radix si sumitur asse.
 Istud idem faciet eius decoctio sumpta.
 Eius cum uino radix uenerem mouet hausta.
 Prouocat urinas, phagedenica uulnera sanat,
 Si sit ei trita cum melle bryonia iuncta.
 Vulneris hoc mundat fordes, syringia curat.
 Sola sibi iuncto maculas depellit aceto.
 Est eadem uitiis dicunt, cui pernio nomen
 Est a perniciis membri patientis id ipsum.
 Plebs dicit mutam; solet hoc de frigore nasci.
 Amne draconitiae radices decoque, tali
 Pernio deletur, si sepius amne fouetur.

HERBA dracon.] Draconitiam lingua latina colubrinam uocat. **Colubrina.]** Colubrorum uirus.
Illarum.] Serpentum. **Polypus.]** πολυπους, est caruncula modo alba, modo subrubra, quae narium ossi
 inhaeret: & modo ad labra pendens narem implet, modo retro per id foramen quo spiritus a naribus ad
 fauces descendit, adeo increscit, uti post unam conspici possit, strangulatque hominem, maxime austro aut
 euro flante. fereque mollis est, raro dura; eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, quae fere
 est. Itaque attingi non debet, auctor Corn. lib. 6. cap. 8. **Lumina.]** Oculi. **Marcescentis.]** Putrescentis.
Catarrhum.] Destillationem, de quo malo supra. **Confert.]** Conducit. **Haemorrhoidibus.]** Sanguine
 spuentibus. **Phagedenica.]** Quae phagedena facit. Est autem phagedena, exulceratio usque ad ossa cele
 nter depascens cum inflammatione, saniem male olentem emittens, & mortem inducens. **Columella ue-**
ro accipit phagedenam etiam pro morbo, quem in iumentis uermem appellant. Bryonia.] Vitis ge-
 nus. **Syringia.]** Fistulas. **Pernio.]** Est hic morbus pedum ex nimio frigore proueniens, & cala-
 neum infestans. Per diminutionem perniunculus.

DE GAISDONE

ISCHAS a Graecis, est uulgo gaisda uocata,
 Non modicum quæstum præbens tinctoriis herba.
 De folijs eius tritis factum cataplasma,

Vulnera, magna licet, conglutinat: atque cruorem
 illorum sistit, reprimis, quosque tumores.
 Si cum melle teris hanc, serdida uulnera purgat,
 Emundat maculas: & sacro subuenit igni,
 Qui si iungens albumen, eam superaddas.

ISCHAS a Graecis.] Ischias lego apud Plin. Perotus tamen etiam cum alijs legit ischas. Est autem
 hæc herba muleorum nomen. **Leucacantha** (inquit Plin.) quam alij phyllon, alij ischiada, alij polygona
 non appellant, radice cyperi, quæ comanducata, dentium dolorem sedat: item laterum & lumborum, ut
 Hicelius tradit, semine poto drachmis octo, aut succo. Eademque ruptis conuulsisque medetur. Non
 modicum. **Maximum. Quæstum.]** Lucrum. **Illorum.]** Vulnerum. Ego tamen credo hic de
 scribi herbam quæ Græce dicitur ισχίς, & ideo debere legi non ischas, sed isatis. Nam isatis est qua utum
 turtiniores, & est lactuce genus, ut docet Plin.

DE ELLEBORO ALBO

ELLEBORVM geminas species testatur habere:
 Album, quod sursum purgat, nigrumque deorsum.
 Vim siccam calidamque tenet: & tertius illis
 Genera. Est in utroque gradus: nigro uolentius album.
 Dicitur: unde prius dicam de uiribus eius.
 Suppositum quocunque modo, depellit abortum.
 Naribus utraque sternuntamenta mouebit

Illius pulvis, capitis pellentia morbos.
 Miscetur confecturis, quæ lumina purgant,
 Et multum prodesse ferunt uirgaculorum.
 Pulvis admixtus, nates pulvis uocat eius,
 Et cum lacte datus est, muscis perniciosus.
 Dicitur per uomitum narios educere sumptum
 Humores, ueterisq; ferunt sic pellere morbos.
 Purgatur tali uomitu uentigo uetusta.

infans melancholicus valet, atque caducus.

Sepq; curatus sumpto lymphaticus isto.

Hydropicis in principio vixit medicatur.

Emundat lepram, tetanum fugat, atque podagram.

Confirmat tremulos, redeuntia tormina curat.

Diversis vitiis stomachi, sciasq; medetur.

Et tussiteri, febribusq; per omnia prodest

Quarum, annis iam pluribus inueteratis.

Impeti cura sumpturum Plinius ipsum

Admonet, ut septem se prepararet ante diebus,

Humectisq; cibus corpus bene temperet omne.

Nec sero carnet, qui debet sumere mane.

Et quando sumes, iubet explorare serenam

Et calidam etiamq; diem, venticq; carentem

Obseruare iubet: curam si spreuerit istam,

Passurum nimis affirmat eum cruciatus.

Hellevatorumq; iubet in pulvisbus ante coctum,

Aut in lente dari, sic dicit non nociturum.

Utiq; dari prohibet senibus, puerisq; tenellis,

Molibus et timidis, animisq; uiris muliebris,

Es macris nimium dicit non accipiendum.

In succo prifane, uel mulsâ, pane uel coctum

sumere precipiunt alij, sic uide dicunt.

Philosopos, fertur scripsisse libello,

Qualiter hellevatorum sit nobis accipiendum.

Inq; suis Hippocras Aphorismis istius herbe

Solius meminit, quam nonerat utiliore.

Plures scripserunt huius de uiribus herbe,

Et quo sit sumenda modo, docuere, quibusq;

Non tamen inueni, per plura uolumina uolens,

Vllum, qui certum pondus donare iuberet.

Illius dixisse satis se, credo, putabam,

Cum tanta uires, etates, tempora, dandum

Iussissent: mihi uero satis non esse uidetur.

Tutam rem, subitumque confert sepe periculum,

Commendare dari cuiquam sine pondere certo.

Plinius ut scripsit, Themison donare solebat

Hellevatori drachmas geminas, tribuisse sequentes,

Bis binas etiam conformat: non tamen ipse

Pondere quo iubeat sumi statuisse uidetur,

Cum tamen hellevatori nigri iubeat dare drachmam,

Quatuor aut scrupulos: mihi significare uidetur,

Albi dimidium pondus tantummodo dandum:

Quod longe nigro uiolentius esse fatetur.

HELLEBORVM geminas.] Hellevatorus uterque albus ac niger, abstergendis calefaciendi que potestis est ideo curant uirilgines & impetigines, & scabies, & lepras, fistulamque callosam; atro curaueris intra biduum aut triduum, abicit callum. Ponuntur in tertio ordine calefacientium & arefacientium. Purgat autem niger humorem melancholicum peruentum in primis inferiorem. Albus autem per superiorem, per uomitum eraslos glutinososque humores purgando, mouet etiam inferiorem. Geminas.] Duas, album & nigrum. In tertioque gradu habent siccum & calidum. Pulvisbus admixtus.] Notandum hoc contra mures. Est muscis.] Contra muscas hoc seruandum. Lymphaticis.] Furiosus. Nam creditum est ab antiquis, qui in fonte imaginem nymphæ uidisset, furore perepi. Tetanum.] Ceruix grauius admodum morbis obnoxia est. Neque tamē alius importunior, acutioreque morbus est, q̄ is, qui quodam rigore nentiori modo caput scapulis, modo mentū pectori annectit, modo rectā & immobilem ceruicem intendit. Vltimum Græci appellant tetanum. Lege Celsum lib. 4. cap. 3. Plinius ipsum.] De Hellevoro lege Pliniū Naturalis hist. lib. 25. cap. 5. & cap. 13. & lib. 27. cap. 2. & 3. & 32. capitibus. Prifanæ.] Ab hoc sit prifanarium, de quibus supra. Nigro.] Hellevoro, quod ueratrum dicunt latini.

DE HELLEBORO NIGRO.

HELLEBORVM nigrum non est adeo uiolentum,

Nec formidandum, quantum quod diximus album.

Hoc quoque precipiunt ueteres in leni coquendum.

Aut in uisellis; sic infans medicari an infans.

Assumptum dicunt, & sic prodesse podagra.

Hydropicis, mora febris, dicitur auxiliari.

Minam sentit opem sumpto paralyticis illo.

Et uariis bibitus morbos tenet articulorum.

Educit choleras uarias, & phlegma per aluum.

Elixatque potis caligo fugatur.

Duritas suppuratas factum cataplasma

Concoquit, & purgat, uacuat syringia collo.

Infusus modicus radicis surculus eius,

Postq; dies geminos sit surculus ille remotus.

Ordea quam dederint, contrito iunge farinam,

Hydropicis tumor appositus sicabitur illis.

Menstrua suppositum purgat, depellit abortum.

Audium reddit, si fuerit auribus illud.

Imponas; & post triduum, biduum uel repellas.

Appositum tollit maculas tunc cataplasma,

Emundat lepras, scabies quasque repellit.

Ore dia centum, quo coxeris illud acetum,

Dentis non modicum dicitur sedare dolorem.

Hellevatori nigri precepit Plinius unam

Donari drachmam, leuiter sic promouet aluum.

Plus quam bis binos obolos uetas accipiendum.

HELLEBORVM nigrum.] Veratrum nigrum minus uiolentum est albo. Podagra.] Pedum dolori. Hydropicis.] Quibus hydrops est oneri. Choleras.] Biles. Phlegma.] Pituitam. Suppuratas.] Id est, apostema factas. Suppurare enim est apostema fieri. Dentis.] Contra dentium supplicia.

DE VERBENA.

VERBENA, hierobotanem, peristeryon;

Appellat Græci. species hac fertur habere

Binas, effectus est idem penē duabus.

Cum uino iunget iſtericus, si sape libatur.

Pestiferos morsus curat superaddita tria.

Cum uino renouanda quidem per quatuor ista

Est medicina dies, oris bene uulnera purgat.

Illius succus repidus si notuitur ore,

Hoc quoque facta recens herba decoctio prestat.

Hæc etiam quæuis potredo repellitur oris,

AE MILI VS MACER

bella peribulsi
strepit facta diu uoluntur fance sonora.
Glucinas herba recens uinum superaddita tria.
Occurrit cunctis cum uino sumpta uenenis.
Qua fuit alterius felis accedendo diebus.

Pellitur hac, tribus sumptis radicibus eius.
Cum totidem folijs potentur aqua resoluta.
Ista prius, patiens quam frigus senserit ullum.
Hocq; modo febribus quartana illa medetur.
Bis binis folijs cum tot radicibus haustis.
Iltus in uino si fit decoctio facta.
Communis salares inter communia sparsa
Reddere narratur, ut iam praescripta buglossa.
Hanc herbam gestando manu, si queris ab agro,
Dic frater quid agis: bene si responderit ager,
Vivet: si uero male, spes est nulla salutis.
Ex hac compositum quidam iussere coronam
Apponi capiti causa quacunque dolenti,

VERBENAM.] Verbenam in aquis locis nascitur, aliqui trigonum, alij bunion, alij sacram her-
bam, alij philtrodoten, Aegyptij pepsepte, prophetae Iunonis lacrymam, alij felis sanguinem, alij Mercu-
rij sanguinem, Romani cristam gallinaceam uocant: auctor Dioscorides. Hierobotanen. Quasi sa-
crum herbam, quo nomine Plin. Verbenacam uocat. Periste. Quasi columbariam. Quartanis.
Qui quartanam passus conuulerit, uiresque integras recuperauerit, fidelius, constantiusque postea ualitu-
rum scripsit Plato. auctor Gellius Noct. Artic. lib. decimo septimo, capite duodecimo. Si quartis ab-
gro. Si agrum interrogas. Spes nulla. Si hoc uerum est, longe praestat multas herbas uerbena, ma-
ioresque uires habet, quam unquam fortassis ab aliquo percipi potuit. Videtur tamen commentum
anile, sicut interdum de alijs quoque herbis ridicula narrantur. Nihil tamen derogo diuinis potentis,
quae in omnibus rebus mirifice operatur. Celerem conferre. Celeriter mederi. Querelis. Dolo
ribus. Phthisi. Pulmonis exulcerationi, quae fit, cum pituita ex capite desillat. Parotidas. Apo-
stemata, secus aures.

DE GAMANDREA. HAM AEDRYS Græce, quæ gamandrea Latine
Dicitur. hanc herbam calidam succamq; fatentur.
Tertius est in utroque gradus. depellit abortum,
si mixta poterit aqua, tussiq; medetur. Si
Conquassata inuas si mixta libatur aceto.
Splen siccatur, purgat cum uino mensura sumpta.
Hydropicis in principio sic sumpta medetur.

CHAMAEDRYS Græce. Chamædrys Græce dicitur. Est autem (ut scribit Plinius) Chamædrys
herba, quæ latine trifago dicitur. Aliqui eam chamædropen, alij teuction appellauere. Folia habet ma-
gnitudine menthae, colore & diuisione quercus. Alij ferratam, & ab ea ferram inuentam esse dicere, flore
pene purpureo. Carpitur prægnans succo. In petrosis aduersus serpentium uenena potu, illituque ef-
ficacissima. Item stomacho, tussi uetusta, patitur in gula coherescenti, ruptis, conuulsis, lateris dolori-
bus. Lienem consumit, urinam & menses cit. Ob id incipientibus hydropicis efficac, manualibus scopis
eius in tribus heminis aquæ decoctis usque ad tertias. Faciunt & ex ea pastillos, terentes eam ex aqua
praedicta. Sanat & uenenas, & uetera ulcera, uel fordida cum melle. Fit & uinum ex ea pectoris uitijs.
Foliorum succus cum oleo caliginem oculorum discutit. Ad splenem ex aceto sumitur. Excalcit per-
fusione. Conquassata. Conuulsa. Licet. Quamuis. Frigorem. Frigus.

DE MAURELLA. HERBAM, quam Graeci strygnon dicere, Latini
Maurellam dicunt. uis eius frigida ualde est. Ma-
ditur auriculae mirè sedare dolorem
Illius succus, si sensum funditur intus.
Aegilopis strygni dicunt cataplasma mederi.
Iltud idem dicunt capitis sedare dolorem.
Una cum strygo si sal panisq; terantur.

HERBAM quam. Strychnon & strygnon quidam uolunt esse eadem herbam quam maurellam uo-
cant. Aegilopis. De his supra, & apud Celsum libro 7. cap. 7. Parotidas. De his saepe diximus.
Hepeta.]

ste dicunt illam celerem conferre medelam.
Plinius affirmat hanc omnibus esse salubrem
Visceribus, lateris morbis, icterisq; querelis,
Pectoris & utrip, & præcipue medicari

Palmonem causis hanc asserit ille, phthisiq;
Parotidas reprimat adipi commixta uetusto.
Herbam, cui nomen folijs de mille deditur
Betoniamq; pari uerbena pondere iunge:
Hac mixta poterit aqua. nullum medicamen
Vellina credunt illis, quos calculus angit.
Non modicum laudare magos hanc asserit herbam
Plinius. hanc cunctis dicunt obfistere morbis,
Et quod quisque petet hac impetrare peruntum.
Sic & amicitias capiri posse potentum:
Et peli febres, & plurima talia fingunt.
Quæ quamuis natura potens concedere posset,
Vana tamen nobis, & anilia iure uidentur.

Sic quoque pestiferis occurrit morsibus illa.
Cunctis praedictis prodest superaddita tria.
Sordens purgabis uulnus licet inueteratum,
Si cum melle teras, & triam desuper addas.
Chamaedreos oculi succo cum melle peruncti,
Dientur clari, dempsit caligine, reddi.
Si triam mices oleo, corpiq; perungas,
Pellit frigorem, reuocabit & ipsa calorem.

Parotidas reprimet cataplasma addita more.
Strychni prurigo depellitur illius succo.
Succus suppositus fluxum stringit muliebrem.
Contritis eius folijs conunge polentam,
His superappositis, sacer ignis, & herpetia mordax
Dicitur expelli: si uero iunxeris istis
Argentum spumam, cerussam, oleumq; rosarum,
Fortius & melius praedictum sit medicamen.

Parotidas reprimet cataplasma addita more.
Strychni prurigo depellitur illius succo.
Succus suppositus fluxum stringit muliebrem.
Contritis eius folijs conunge polentam,
His superappositis, sacer ignis, & herpetia mordax
Dicitur expelli: si uero iunxeris istis
Argentum spumam, cerussam, oleumq; rosarum,
Fortius & melius praedictum sit medicamen.

DE HERBIS.

144

Herpetia. Et hoc supra declaratum est pueris: quibus qualiacunque bono animo congesimus, nihil curantes supercilioforum sciolorum ronchos.

DE IVSQUIAMO.

VSQUIAMVM Graci, qui nostri canticulata

Dicunt: huius herba virtus est frigida valde.

Tres habet hac species: semen profert prior album:

Alteria subruffum producit, tertia nigrum.

Notabilior reliquis est, semen quod gerit album: Ly. quae

Pro quo, si desit, mos est apponere ruffum.

Nigrum vero frequens medicorum refertur usus.

Iusquiami solis coneritis, adde polentiam:

Hoc adhibendo, potes quosvis curare tumores.

Sic mirè calidam potes in frigidare podagram.

Aspidem infusus uermes succus necat eius.

Illarumq; solet uarios lenire dolores.

Ore diu tepidum si contineatur acetum

Quo sine decoctis radices illius herba,

IVSQUIAMVM

Graci.] Hanc latini uocant canticulata. Habet autem hac herba tres species.

Prima producit semen album, secunda subruffum, tertia uero nigrum. Quod Iusquiamum

Re spuit.] Contemnit. Ore diu.] Aliud contra dentium carniſices remediū. Rheuma.] Eruptio-

nem seu fluxum: à se, quod est fluo. Rheumatismus pro eodem. Miconis.] Lactuce genus: de quo

lege Plinium libro uigesimo, capite septimo. Comella.] Manducata. Maniam.] Infaniam, unde

maniaci, furoris morbo correpti dicuntur.

DE MALVA.

IXERVNT maluum uetres, quod molliat aliu.

D Essecacostomacham sextus figer, asserit illam,

Aequè Dioscorides. tamen interioribus ambo

Sampram sicut otus, multum prodesse fatentur:

Et sic uesica dicitur illam medicari;

Sicq; uenenosis occurrere potibus illam.

Hi quoque confirmant malua folijs, salicisq;

Ex equo tritis, citius, meliusq; cruentum

Sanari uelut, emplastris quam pretiosis. Et sic, quam emplastris

Addunt auctores ipsi, quod malua potenter

Conquassata iuuat, adipi commixta uetusto.

Vniuersalis radix admodum dolori

Denis, sed et cum: uenerem stimulare refertur

Hanc eadem, semori si limo annexa geratur.

In lana nigra uetlam, si gesserit illam

Malua, agrestis quidem, distrahendi, & molliendi clementer

particeps est potentia. Hortensis uero, quatenus plus aquosa humiditatis admittit, eatenus potestate

imbecillior est. Agit uentrem, non ob humiditatem modo, sed ob glutinosam uim, praesertim, cum

profertur cum oleo, & garo, pauculo uino asperso, quo tempore manducatur. Fructus autem eius

eouſque ualidior est, quatenus est aridior. & quæ nominatur dendromalache, huius est generis: uerum

magis distrahit, quam quæ dicta. nominatur uero althea. hac Placentinus. De Malua lege Plinium

libro uigesimo, capite uigesimo primo: & libro uigesimo primo, capite tertio decimo: & libro deci-

mo nono, capite quarto: & libro decimo, capite octauo. Molliat.] Quod aluum mollicet. Ca-

costomacham.] Stomacho incommodam. Venerem.] Pro petulcis: quamuis huiusmodi reme-

dia sint: quærenda ab his, quibus omnino uenus irata est. Languens maritus rectè confugit ad reme-

dia, ut debitum soluere possit.

DE PARATELLA.

ERBA solet lapathi uulgo paratella uocari.

Illius species dicuntur quatuor esse. At

Par tamen est ferre uis omnibus in medicina.

Omnibus est illis feruens, austeraq; uirtus.

Unde quidem stomachum confortat, sumpta, solicq;

In stomacho clausum per ructum pellere uentrem:

Sumpta, sicut otus, ferunt restringere uentrem.

Pruritus mordax, scabieq; cutis laceratrix.

Illius tepido cedunt apocimare foras.

In uino coctæ radices, et bene trita.

Appositaq; scrophas compescunt, parotidæq;

Et saepe tepens si coctio gargaretur.

Collis si uis tepens, si ampa uolueris.

H iiii)

AE MILI V S M A C E R

Nota Vnus sedabit tumidas, dentiūq; dolorem.
Hoc dysentericos potu iuuat, & citiacos.
Uis. Pellitur hac tepida dolor auris si foneatur.
Decocta ualido radices eius aceto,
Et trias spleni superaddito sape tument;

Quemuis non modicum reprimunt sicando tumorem.
Cum uino uel aqua radicum coctio facta.
Mensura restringet potu, lapideiq; repellit.
Hac eadem iuuat ictericos, suspensaq; collo
illius radix, scrophas nasci prohibebit.

HERBA solet. Lapathum potestatis est mediocriter distrahendi, particepsque caliditatis est, & in remibus calculos terit. Radix ipsius curat scabies, asperitatesque corporis cum aceto cocta, & illinendo. Oxylapathum autem mixtam uim habet: nam cum ui distrahendi, etiam expellendi uim habet. At semē quiddam manifestum acerbescens habet, quod torminibus medetur, & profumius alui, praesertim oxylapathi. Hippolapathon in paludibus nascitur, eiusdem autē potestatis est, sed imbecillioris. Agrestis autem lapathi radix, quam myten, hoc est motam uocant, cocta cum aceto uel uino, diluta dentes confirmat, doloresque ipforum lenit. hanc Valla. Restringere uentrem. Ventris fluxum sedare. Apoximate. Aqua cocta cum uarijs condimentis. Et nota puer, quod duplam corripuit in apoximate. Gargarizetur. Corripuit & hic duplam, in quo non est imitandus.

DE LOLIO.

FRUMENTIS nocua Lolium Graecus uocat herbā, Quam nostri dicunt uigari more nigellam. Cancros emundat, pascenda uulnera curat, Cum raphano modicoq; salis superaddita tria. Zernas & lepras cura compescit eadem. Sulphure cum uino; purgamentisq; columba Admisce lolium; semen quod lilia praebent His iungas; hac cocta mero superaddita scrophis.

Sic scrophas spargit, sic apostemata rumpit. Duritiaq; alias emolliet hoc cataplasma. Mulla decocta cum uino, thure, crocoq; Apponas coxae fistulae quam uexat iniqua. Pariteriem mulier si se suffumiget illa, Asseritur citius uentris deponere pondus. Argenti spuma commiscens hanc, adipiq; Apponas calide cataplasma salubre podagra, Et per se tali mulcum prodesse probauit.

FRUMENTIS nocua. Frugibus inimicam dixit Plin. quem lege de lolio dicentem lib. 18. cap. 17. & lib. 22. cap. 25. Cancros. De hoc malo lege Celsi lib. 6. cap. 17. & lib. 6. cap. 18. Zernas. Impetiginem sedationem cutis serpentem cum pruritu, uel siccam & asperā scabiem. Quidam dicunt hoc malum serpiginem dici. Schiafis. Ischiam intellige, ut semper. Asseritur citius. Dicitur citius parere. & est elegantissimus uersus. Prodesse probauit. Expertus asserit hoc.

DE CICUTA.

RIGIDA lethifera uis nescitur esse cicuta. Vnde necat gelidi potantes more ueneni. Qui perit hac herba, cutis eius fit maculosa; Vnde genus mortis ualet hoc per signa probari. Publica poena reis hac esse solebat Athenis. Hac sumpta magnus Socrates fuit exanimatus. Qualiter hoc fiat, non astito dicere nostrum. Cum nil, quod noceat, sed quod iuuat, est referendum. Hac sumpta, si quis mori sit proximus, herba Fortē merum tepidum bibat, eiusdemq; periculum. Sed quamuis potu solet hac assumpta nocere, Magnifice tamen apposita solet illa iuuare. Aestus mire iuuat, epiphoras oculorum,

si frons contritis folijs sit operta uirentis; Vel si sint eius circumdita lumina succo. Hac quoque pelluntur sacer ignis, & herpetes mordax. Tradit Anaxilaus; si succo sapius eius Virgo linat mammas, sibi cum turgescere primum Incipient, modicas semper, stantesq; manere. Extinguit uenerem, fluxum quoque feminis omnem; Si pectus trita cataplasmes sapius illa. Argenti spuma commiscens hanc, adipiq; Apponas calide cataplasma salubre podagra, Et per se tali mulcum prodesse probauit. Singula quid memorem? nocuum quemcunque calorem, Apposita trita poteris curare cicuta.

FRIGIDA lethifera. Cicuta uenenum est, publica Atheniesium poena inuisa: ad multa tamen usus non omittendi. Semen habet noxium. Caulis autem eius & uiridis estur plerumque, & in patinis. Lenis hic & geniculatus ut calami, nigricans, altior saepe binis cubitis, in cacuminibus ramosis, folia coriari tenuiora, graui odoratu, semen aniso crassius, radice concaua, nullius usus. Semini & folijs refrigerato ria uis: quz si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est; priusquam perueniat ad uitalia, uini natura excafactoria. Sed in uino pota irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs floribusque: tunc enim maxime tepestius est, & melior. Semine trito expressus, & sole defatus in pastillos, necat, sanguine expillando: hac altera uis. Et ideo sic necatorū macule in corporibus apparēt. Ad dissoluēda medicamēta utitur illo, p aqua. Fit ex eo ad refrigerandū stomachū malagma. Praecipuus tamen est ad cohibēdas epiphoras & itius oculorumque dolores sedandos circūlitus. Miscetur collyrijs, & alios oēs rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem, doloremque & epiphoras sedant. Anaxilaus au tor est, mammas a uirginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mammas imposita extinguit: ueneremque testibus circa pubertatem illita. hanc Plin. lib. 25. cap. 13. Lethifera. Mortifera, quam Socrates bibens, exstinctus est. Vnde Persius ille Satyrus salissimus: Barbatum crede magistrum Dicere, sorbitio tollit quem dira cicuta. Publica. Sicut apud nos uel laqueus, uel gladius, aut rota

toti. Magnus.] Hoc non ad corpus sed ad animum Socratis referri debet. intrepidus enim & magno animo bibit cicutam. Venerem.] Coeundi appetitum, quem etiam cibi & potus abstinentia solet domare. Legitur in Decretis distinct. 35. ministris templi uinum prohiberi, ac siceram bibere, ne grauentur ebrietate corda eorum, ut uigeat perpetuo sensus & tenuis sit. Vel quia uenter mero astuans, facile desumat in libidines. Vnde Noe femora ex ebrietate nudauit. Eodem autem, quem Sodoma non uicit, uina uicerunt. Hinc in Apostolorum canonibus, Episcopus aut presbyter, aut diaconus, alius atque ebricitati deseruiens, aut deficiat, aut damnetur.

DE PIPERE.

ARMINE. descriptis paucis uulgaribus herbis, Nunc species illas, quas iam cunctis prope notas vsus medendi fecit, tenebo referre.

Atque prius piperis, quod notius ipsa coquina, Quam medicina facit, uires puro discutendas.

Virtutis sicce piper efficitur, calidæq; Virtutis esse gradus conceditur huic in utroque.

Tres sunt huic species, album, longumq; nigrumq;.

Sed quia sunt geminae medicæ tantummodo nota,

De specie nigra dicam quædam mihi nota.

Crisum uel coctum sumptum cum melle iugatum,

Vim digestiuam stomachi, iecoriq; iuuabit;

Morsus pestiferos curat, fastidia tollit.

Occurrit uariis thoracis sepe querelis.

Quodq; mouere solet frigus periodica febris

Compestat, febris si sumitur ante tremorem.

Cum lauri bacis, uel cum folijs bene tritis,

Cumq; mero tepido potatum, tormina sedat.

Et scrophas reprimat admixtum cum pice dura,

Et superappositum: recte quoque iungitur illis,

Que purgare solent oculos catigine dira.

Admixtum nitro, maculas cataplasmate delet.

Vsi stercoris humani cum putare tritum

Vna iunge piper, & sic superaddito cæteris:

Expertis nihil uilius hoc putare dicunt.

Nemo potest omnes piperis describere uires:

Namque piper ferme medicamina cuncta requirit,

Antidotiisq; solet pretiosus pluribus addi.

Hinc puto tam paucas laudes de simplici dictas

Innumeris quod sit hoc dignum laude medelis.

CARMINE descriptis.] Dicit se nunc scripturum de speciebus. Virtutis.] Hic incipit com-

memorare uirtutes piperis. Piper (ut scribit Placentinus) cum primum germinans, longum est, ideo hu-

midius hic uelut omphax fructus. Quod album est piper, acutius quam nigrum: nigrum siquidem ueluti

despectum iam, ac iam supra quam satis sit arefaciens. utrumque admodum calefacit, ac arefacit. De pipe-

re lege Plinium lib. 12. cap. 7. & 32. & 16. capitibus. Et lib. 6. cap. 23. Virtutis sicce.] Hoc est, piper sic-

cum & calidum est in utroque gradu. Huic.] Piperi. Vim digestiuam.] Virtutem pepticam.

Thoracis.] Pectoris. Periodica.] Quæ certo tempore abit & redit. De febrium speciebus atque

earum curatione lege Cornel. Celsum lib. 3. cap. 5. Antetremorem.] Quod frequens dicit antetypus.

Cancris.] Malo serpenti. Nanque piper.] Notandum hoc præcipue.

DE PYRETHRO.

ST pyrethrum calidum, secum quoque quartus in istis

Est gradus. excruciat dentes si frigidos humor,

Masceret hoc patiens, teneatq; diutius ore.

Et uires admixto si gargarizetur aceto.

Hocq; modo humidam reprimat de phlegmate linguam:

Sic uiam releuat humoris pandere pressam:

Et multis alijs utiq; sic subuenit oris.

Non modicum prodest sumptum cum melle caducis:

Sicq; lenare soles morbum qui membra resoluunt.

Superfuso collo pueris prodesse caduce-

Dicitur, et solo succurrere fertur odore.

Ex oleo quo decoquitur, si corpus inungas

Ante febris motum, tollet, minuetq; rigorem.

Remum sepe grauem fugit unguen tale dolorem.

Miram sentit apem paralyticus inde perunctus.

Non leuiter manibus fuerit si sepe fricatus.

Vngue si totum corpus mulcebitur isto,

Carus per poros sudor procedet aperius,

Membrorum solet hoc quemuis curare stuporem,

Et corpus seruari potest a frigore tutum.

Et medicamento solueret utaq; isto:

Tanrudem prodest firmitum solui olui,

Sicq; fricanda locum, quem uis medicare, perungas.

EST PYRETHRVM calidum.] pyrethron græce est, cuius radice maximè utuntur, urendi habens

te potentiam, qua dentium refrigerantium dolores mitigat, aduersumque rigores ambitiosarum febrium

conteritur cum oleo ante iniectiones, & stupentes soporatosque iuuat. de pyrethro lege Plin. lib. 18. cap.

9. Quartus in istis.] In quarto gradu calidum est & ficcum. Excruciat.] Aliud remedium aduer-

fus carificinam dentium. Gargarizetur.] Iterum corripit duplam, & hoc quidem non ignorantia nec

tamen est imitandus. Qui membra resoluunt.] Paralytum intelligit. Unguen tale.] Tale unguen-

tum. Poros.] Qui sunt in corporibus foramina, per quæ sudor exitum habet. Tetanus.] De hoc

malo supra.

DE ZINZIBERE.

ZINZIBER atque piper.] Zinberis radix

ualidè calefacit, non iuxta primam iniectione, ut pi-

per, ob hoc particeps est crassarum partium, supflui-

tatis aquosæ, ideo facile laudat. hæc Georg. Valla.

INZIBER atque piper aequalis in medicina,

Dicunt; hac causa racco de uiribus eius.

+ 8. uires fortissimæ aquas

malas, cariem sanat. Ita Plin. lib. 12. cap. 7.

AE MILIVS MACER

DE CYMINO.

col. sic. 2. **S S E** putant medici calidum siccumq; cuminum. Tercius est illi gradus in uirtutibus istis.

Assumptum quocunque modo depellere tradunt

vis. Viscera uexantem uentum, stomachumq; grauantiem, Et digestiuum stomachi iecorisq; calorem

refus. Excitat, & ueneris credunt inhibere furorē,

ESSE PVTANT. Cumini semine præcipue utuntur. est autem calefaciendi potentia, mingen-

di uim habens, & exhauriendi. in tertio ordine calefaciētium est. lege Plin. lib. 10. cap. 14. Tercius est.

Calidum & siccum est, dicit in tertio gradu. De gradibus ferè ad principium quidpiam adscripsimus,

pro literarum candidatis, sicuti reliqua. Veneris credunt.] Cuminum sine dubio aspernabuntur hirci

istis foetidissimi & Satyri petulci, quibus magnum Venus numen est, qui uel nihil die noctuque cogitāt,

quàm quo modo nihil temporis consumant citra foetentis libidinis prælio. Sæpe audiui senes aliquot di-

centes, hoc uel illud non edo, quia dicitur uirum reddere imbecilliozem ad certamina ueneris. O mores,

o Christianos.

DE GALANGA.

col. sic. 2. **PHLEGMONEM** stomachi sumptum galanga resoluit.

Et si phlegmaticus fuerit, corroborat ipsum.

PHLEGMONEM. Relaxat, inquit, galanga pituita & uiscosos humores stomachi. Phlegmati-

cus.] Pituitosus. Corroborat.] Confirmat. Vim digestiuam.] Quam pepticam uirtutem uocat,

ut diximus antè. Colicis.] Colicam passionem habentibus, quod malum primus in Italia Tyberius ha-

buiffe legitur. Veneris.] Ob hoc grata hircis, in Venerisque ministeria iuratis.

DE ZEDOAR.

col. sic. 2. **D PRIME** sumptum zedoar obstat ueneris

A Affirmant, & reptilium morsus lenat haustum.

Sumptum confortat stomachum, ructusq; salubres

Commonet, & crebro fastidia reprimis usu.

AD PRIME. sumptum.] Adprime, id est ualde. Ieren. Nam id arbitror adprime in uita esse utile,

ne quid nimis. Reptilium.] Serpentum. Allia.] Est & hoc notatu haud indignum.

DE GARIOPHYLO.

col. sic. 2. **GARIOPHYLV** dicitur calidum, siccumq; secundo

G Esse gradu; iecur & stomachum corroborat ipsum,

Et ferme cunctis ualet interioribus haustum.

VIM DIGESTIVAM. Quæ est ipsius stomachi, & peptica uirtus dicitur. Accendit.] Stimu-

lat, irritat, & prouocat. Vim memorem.] Remedium ad confortandum memoriam. De gariophylo le-

ge Plinium libro 12. cap. 7.

DE CINNAMO.

col. sic. 2. **CINNAM** tres species dicuntur habere; sed haru-

Est pretiosa magis, quæ plus subtilis habetur:

Et quæ plus mordet, mixta dulcedine linguam.

Humores stomachi siccat, corroborat ipsum,

Et facit acceptas ut digerat ocyus escas.

Sumptum curat epas, lotiumq; & menstrua purgat.

Humida suffus eo sedabitur, atque catarrhus.

Hydropicis speciem, cui præbent tympana nomen, De specie geminas hæc querit potio drachmas.

CINNAM tres species.] Cinnamum cum cinnamomo putant esse idem. Et tres species habere

dicuntur. Hydropicis.] Aqua intercute laborantibus. Huius morbi tres sunt species. Nam modò ue-

tre uehementer intento, creber intus ex motu spiritus sonus est. Modò corpus inæquale est, tumoribus

aliter aliterque per totum orientibus. Modò intus in unum aqua contrahitur, & moto corpore ita mo-

uetur.

Et fluxum uentris in aceto stringere coctum.

Hoc orthopnoicis miram præstare medelam.

Experti dicunt cum posca sæpius haustum.

Atque uenenosis cum uino morsibus ipsum

Præbet opem: tritumq; fabæ cum polline, inactis

Melle, repente solet testes curare tumemes;

Appositum: sistit cum posca menstrua sumptum.

Dicunt pallentem dare mansum sepe calorem.

Fig. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

uerur, ut impetus eius conspici possit. Primum *τυμπανίτης*, secundum *αλκοφραγμετίαν*, tertium *αδονίτην* Graeci nominant, auctor Celsus lib. 3. cap. 21. Et modo darum est, quod dicit, cui praebeant tympana nomen.

Lentigine.] Macula. Impete.] Impetiginem intelligit, hoc est foedationem cutis cum pruritu ferpentem. de hoc malo in libro de medicina sic Serenus Sammonicus:

Si uero uitium est, quod dicitur ab impete nomen,
Hoc matutina poteris cohibere salina,
Seu folio platani, quod mansum mane uorabis.
Foeda fluunt curui quae purgamenta cameli,
Vrentur, cineremque dabunt, iungentur aceto
Mascula thura, simul diuinaque cura ualebit.

Curatio, Remedii.

Hemorrhoidarum.] Hoc malum supra diximus esse in sede, quando uenarum ora sanguinem effundunt. Drachmas.] Constat drachma XVIII. filiquis, id est tribus scrupulis.

DE COSTO.

Formina: sic etiam uulue sedare dolorem

Dicunt, aut ex his sibi si pessaria subdat. Refur.

Lumbricos pellunt, purgant lentigine uultum,

Si tritis cum melle linas: ueneremque mouere

Dicuntur, si sint cum melle sumpta tepenti.

Ex oleo, costum quo coxeris, illine quemuis

Ante febris typum, reddes a frigore tutum.

Subuenit hoc schiasti, membrique stupentibus unguen.

Antiquum uulnus cito purgat pulvis eorum.

OSTI sunt gemina species: grauis una, rubensque
Est, et amara nimis. haec indica dicitur esse.
Altera uero leuis, nec amara, colore subalba.
Hanc Arabes mittunt, prior utilior medicina.
Urinas purgant, et eis obstancia pellunt.
Splen curant plene, laterique fugare dolorem
Dicunt, cum uino tepido si sumperis ager.
Mentrua purgabunt si se suffumiget illis

COSTI sunt geminae.] Radix costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliis inutili. Primo stim introitu annis Indi in Patale insula, duo sunt eius genera: nigrum, & quod melius candicans. Pretium in libra XVI. Auctor Plin. lib. 12. cap. 12. Geminum.] Duos. Indica.] Ab Indo flumine. Hanc.] Subalbam, quam Plinius candicantem dicit. Arabes.] Horum regio Arabia ultra Pelusiacum ostium est, ad rubrum pertinet mare. Et est triplex: una felix, alia petraea, alia deserta. Pessaria.] Pessarium genus medicaminis. Ante febris typum.] Ante tremore febris. Schiasti.] Ichni. Nec hoc docti agnosunt uocabulum.

DE SPICA.

Cum gelida si detur aqua, sedare tremorem

Dicitur hac cordis, et nausea sistitur inde.

Ex hac uenerem, cum cepe sumpta liquore.

Duritia sterica elixatura resoluat,

Eius fomento per partes inferiores.

Lumina si tepida foueamur sepius illa,

Affirmant acri pruriginis libera reddi.

Palpebraeque pili bene confortantur eadem.

Est nardi species, quae celtica spica uocatur,

Celtarum tantum qua nascitur in regione.

Omnia quae nardus ualet indica, dicitur ista

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

Posse, licet uires uideatur habere minores.

ESSE gradu primo.] Nardostachys, nardi spica, calefacit quidem in prima (ut scribit ex Dioscori de Placen.) distantia arefacit aut in secunda completa constat autem ex acerbescence aliquantum essentia, & circa non admodum calida, & quodam subamaro breui: unde congruit admodum tum iecori, tum stomacho pota, & extrinsecus apposita, & urinam mouet, morsus ac uellitationes dimouet & curat stomachi arefacit quoque in uentre & intestinis fluctuationes. Preterea confert & capiti, & thoraci. Validior autem est indica, quae syriaca nigrior est. Est nar.] Nardus celtica propemodum eiusdem potentiae est, quae etiam memorata, nisi quod in cunctis imbecillior, nisi ad mouendam urinam: calidior siquidem alijs, minus uero acerbescit.

DE THVRE.

Affirmant auti multum prodesse dolenti.

Tritum cum creta cimolia, siquae rosato

Pernixtum, mammas dicunt curare tumentes.

Nil credunt hamophthysia magis auxiliari,

Admixto uino si sumatur, uel aceto.

Thus cum lacte terens muliebri, si superaddas

Vlceribus, fieri quae sepe uidentur in ano,

Aut alio quocunque loco, medicabitur illis.

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

Huic alor iungens, lacrymamque albuminis oui,

HVS calidum, secumque gradu dixere secundo.
Lumina clarificat, lacryma si soluitur oui,
Constitutum uel foemineo cum lacte tepenti.

Acri cum uino tritum, pice, lacteque mixtis,

Vulnera praecipue curare recentia dicunt.

Pinguis porcino mixtum, medicabitur ists.

At mixtum melle planariis decuit unguis.

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

Thus bene constitutum, uinoque tepente solutum,

STRABO GALLI POETAE ET

THEOLOGI DOCTISSIMI, AD GRIMALDVM

(Cape e manuscripto.)

COENORII S. GALLI ABBATEM, HORTIVLVS.

Praefatio.

Capitulum.

Prima tranquille cum sint insignia uitae, Non minimū est, si quis Pestanae deditus arti, Nōuerit obsequi quae tractare Prius. Rursus enim quae cunctae datur possessio, seu sit Pignus, harenoso qua torquet glare tractu: Seu pingui montis graues uirgine foetus, Colibus erectis alte sita, sine iacenti Plurima facili diuis, seu uallibus horrens. Non negat ingenuos olērum progignere fructus: Simodo non tua cura graui compressa ieterdo, Multiplices olitoris opes contemnere stultus. Ausibus affuecit, callosasque re diurno Detrectat fuscare manus, & stercora plenis Virat in arenis disponere puluere qualis. Hec non sola mihi patefecit opinio sania: Vulgaris, quae sita libris nec lectio pulcis: Sed labor & studium, quibus otia longa dierum Postposui, expertum rebus docuere probatis.

De Cultura inuio.

PRIMA senectutis uerna, quia totius anni Veniet, & amplius consumptis saeuat laboris: Veris ubi aduentu terrarum pulsa sub imas Delitescit latebras, uestigiaque horrida auaræ Ver hyemis, reducti rerum delere pararet Seminate, & antiquo languentia rura futori Reddere; uel orbis primum caput & decus anni. Purior aura diem cum iam referat ferenum Inciperet, zephyrosque herbae, floresque sequuti Tenuia poringerent radices acuminata, & cōlecta diu genio, calasque exosa pruinas. Cum rursus solis, montes quoque gramme pingui Praeque conspiciunt uerarent laeta uiridis; Amorum, quod pro foribus mihi parua, patenti Area uestibulo folis conuertit ad ortum Vriue implerunt, campique per zequora parui Illic ferenti crederunt tela ueneno. Quid facerem? tam spissus erat radicibus infra Ordo tatenatis, uirides ut texere lentis Viminibus rates stabuli, soler arte magister, Vngula cornipedum, si quando humore nocetur Collecto putres imitatur marcida fungos. Ergo moras rumpens Saturni dente, latentes Aggredior glebas: torpentiæque arua, reuulsi Sponte renascentum complexibus uiscarum. Ergo, & umbrae habitata cubilia talpis Diuio, lumbricos reuocans in luminis oras. Inde noticoquantur stabris, folisque calore Areola: & lignis, ne diffuset, obrita quadris, Altius a plano modicum resupina leuatur;

Tota minutatim rastris contunditur uncis; Et pinguis fermenta sum super inlinuatur. Seminibus quædam tentampus oluscula, quædam Stirpibus antiquis prius reuocare iuuentæ. Denique uernali interdum conspergitur imbre Parua leges, tenuesque fouet præblanda uicissim Luna comas, paruos si quando licca negabant Tempora rotis opem, culturæ impulsus amore. Quippe sit metuentis graues torpescere libras Flumina plura cadis inferre capacibus acris. Curat studio, & propriis infundere palmis Guttatim; ne forte uelocior impetus undas Ingereret nimias, & femina lacta moueret. Nec mora, germinibus uestitur tota tenellis Areola: & quanquam illius pars ista sub alto Arescat recto, pluuiarum & muneris expers. Squallat æteri, pars illa perennibus umbris Diffusgat solem, pars hæc quia celsior, ignei Sideris accessum lateris negat obice duri: Non tamen ulla sibi fuerant quæ credita pridem, Spe sine clementi pigro sub cespite clausit. Quin potius quæ licca feret translata subactis Suscepit scrobibus, rediungo plena uirore Restituit, reparans numeroso femina fructu. Nunc opus ingenuis, docili nunc pectore, & ore Nomina quo possim, uiresque attingere tantæ Mellis, ut ingenti res parue ornentur honore.

De Salvia. Cap. III.

(rum.

ELELIFAGVS prima præfulget honore loco Dulcis odore, grauis uirtute, atque utilis haustu. Pluribus hæc hominum morbis prodesse reperta, Perpetuo uiridi meruit gaudere inuenta. Sed tolerat ciuile malum: nam leuā parentem Progenies florum, fuerit in dempta, perurit. Et facit antiquos defungier inunda ramos. De Ruta. Cap. IIII.

Nec minus abrotani proprium est mirariet alte Pubentis frutices, & quas inspicat aristas.

Hunc Strabum cum suo commentario Admonitio capite libro meo manuscripto, auctoris uetus, & nostror commentarios completente.

Ramorum libertas, semper imitata capillos.
Huius odoratum lento cum uimine cinem.
Pronis capsum prodest miscere medelis.
Festibus oblat enim, telum fugat, adiuuat artus.
Quos necesse premit fortitudo inuicta gutta.
Præterea tot habet vires, quot ilia comarum.

De Cucurbita. Cap. VI.

H A V D lecus alupetax, semente cucurbita uili
Assurgens, palmistoliorum suscitatur umbras.
Ingentes, crebrisque lacu retinacula ramis.
Ac pelut ulmum hederæ implicuit cū frontibus alta.
Ruris abulque iūta toti sua brachia circum.
Laxa dedit ligno, summumque secuta cacumen.
Corticis occulit uiridi turamine rugas.
Atque bullas in ramis genus arboris cum se
Explicuit quauis, ramorumque alta corymbis.
Vellit, & propria sursum se sponte leuauit.
Visitur et go rubens aliena in sede racinus.
Dependete, premit tabulata uirentia Bacchus.
Pampinus & frondes discernit labor altas.
Sic mea sic frangit de stirpe cucurbita surgens.
Diligit appollitas sua sustentacula furcas.
Atque amplexa suas uicinas tenet unguibus alnos.
Ne uero infano diuelli turpine possit.
Quod generat nodos, totam retinacula trudit.
Et quoniam duplicem producit singula pincem.
Undique fulguram dextra lauaqueprehendunt.

Et uetor intulsum neqies cum pensa puella.
Mollia traiciunt, spiritusque ingentibus omnem
Filorum seriem pulchros metantur in orbes.
Sic uaga torulibus stringunt amara cathenis.
Scalarum, teretes inuoluunt que illico uirgas.
Vincibus & discunt alienis, recta calcarum.
Ardua porticum uolucti superare mata.
Iam quis poma queat ramis pendentia passim
Mirari dignè: quæ non minus undique certis
Sunt formata uis, quam si tornatilis lignum.
Inspicias medio rasum, quod mi miphure, constat.
Illa quidem gracili primū demissa flagello,
Oblongo, tenuique ferunt in gentra collo
Corpora tum ualium laxat in illa pondus.
Fortum uenter habet totum alius, & intus aluntur
Multa cauernofo sequeuntur carcere grana.
Quæ tibi consumilem possunt promittere messem.

Ipsi quinetiam teneri sub tempore fructus.
Ante humor quam clausa lateus, per uiscera sero.
Autumum aduenturarescit, & arida circum
Relucent citis, inter opes transire ciborum.
Sepe uidemus, & ardenti satagine pinguem
Combibere arumam, & placidum segmenta sapore
Ebria multoties mensis prestare secundis.
Si uero estui finitur spiramina solis
Cum genitrice parit, & matura talce recidi;
Idem totus in assiduos formatur usus.
Vasorum poterit, nullo dum uiscera uentre
Egerimus, sacris radentes in toro.
Nonnunquam hac ingens sextarius abditur alio,
Clauditur aut potior mensure portio plene.
Amphora: quæ piceo limitur dum glutine, seruat
Incorrupta diu generosi dona Lyci.

De Peponibus. Cap. VII.

H O C simul in spatio, campi quo hgitur unis.

Hec tam leta seges, uili quam carmine pinki.
Vultur alterius uitis genus acce, per equos
Serpere pulybreum, & fructus nutrire rotundos
Pomorum, hæc species, terre super arida uulgo
Tecta iacens, crementa capit pulcherrima, donec
Solibus eluiis flauos intincta colores.
Messoris calathos matura fruge replent.
Tum uideas alijs oblongo stemmate uentrem
Demissum, nucis aut durisclatilis intar.
Vet quales mambas quondam suspensa lupinis
Lucet, agens circum lomenti billa saluam.
Ante recens maceratur aquis quam spoma reclusa.
Dum lentescit adhuc digitis luctantibus, & se
Alternis uicibus, studioque incantibus uno.
Inter utranque manum, paruq; sit parius hiatu
Exitus: huius trito lenis meat ore non uis.
Distenditque cauum uirga sub imagine pondus.
Et centrum medio confingit labre fundo.
Undique conuenit emitti quo inflexio tech.
Ergo chalybs huius penetrat dum uiscera pomi,
Elicui humores largos cum semine fluos
Multiplici: tum deinde cauum per plurima tergis
Frustra manu spargens horrorum letus opimas
Delicias conuiua capit, standoque lapoque
Oblectant fauces: nec duos illa molares
Esa stupere facit, facili sed mania uoratu,
Vi naturali frigus per uiscera nutrit.

De Absinthio. Cap. VIII.

PROXIMVS absinthii frutices locus erit acris.
Herbarum matrem simulantes uimine lento.
In folijs color est alius, ramisque odor alter
Puberibus, longeq; saporis amarior haultus.
Feruente domuisse lumen, depellere febres
Hoc solet auxilium clata uirtute probatum.
Si tibi præterea caput acris sorte dolore
Pulsetur subito, uel si uertigo fatiget;
Huius opem uimare, compens trondentis amaram
Absinthii syluam, tum iura sebete capaci
Effunde, & caput perfunde cacumina summi.
Quo postquam abluens graciles humore capillos,
Deuinctas trondet, super imposuisse memento,
Tum mollis lotos contringat fascia trines,
Et post non multas elapsi temporis horas,
Hoc inter reliquas eius mirabere vires.

De Marthubio. Cap. IX.

Q V I D referat iuxta posui, nimiumque potens
Marthubij non uile genus; licet acris ora
Mordeat, & longe guttū diuingat odore.
Dulce enim olet, nō dulce sapit; sed peioris æros
Comprimat angores, tristi dum sumitur haultu;
Præcipue talis caleat si potus ab igni,
Et coenam cyathis cogatur claudere crebris.
Si quando infente quæsit uenena nouerre
Potibus immiscet, dapibus ue aconita deolis
Tristia conuolunt; exremplō sumpta salubris
Potio marthubij, suspecta pericula prelat.

De Fanculo. Cap. X.

N E C marthubij taceatur honor, quod supere forti
Tollitur, & late ramorum brachia tendit;
Dulce satis guttu, dulcem latus addit odorem.
Hoc oculis quos umbra premit, prodesse loquitur.
Huius item semen, forte cum lacte capellæ,
Absumptum

Absumptum, uentris fertur mollire tumorem,
Cunctantisque moras dissoluere protinus alui.
Præterea radix marathri commixta liquori
Lenzo, fuffum percepta repellit anhelam.

De Gladiola. Cap. XI.

TE neque tranferim, latæ cui libera lingue
Nomine digladij nomen facundia finxit.
Tu mihi purpurei progignis floris honorem,
Prima estare gerens uide munda nigellæ
Munera: uel qualis mensa sub Apollinis alta,
Infectis pueri pro morte recens Hyacinthus
Exijt, & regis signauit uertice nomen.
Radices ramenta tuæ ficcata fluenti
Diluuio contusa mero, seuumque dolorem
Vesicæ premimus tali non secius arte,
Pignore sullo tuo, lini tandem texta
Efficit ut nigeant, dulcesque imitentur odores.

De Libystica. Cap. XII.

INTER odoratam memorare libystica syluâ
Fortis, suadet amor parui diffusior horti.
Hoc germen succo quamuis & odore gemellis
Orbibus officere, & tenebras inferre putetur;
Semine sepe tamen quesitis addere curis
Parua solent, tamamque aliena laude mereri.

De Carefolio. Cap. XIII.

QUAE tot bellorum, tot famossissima rerum
Magnarum monumenta sacro pia conficis ore,
Exiles Erato non dedignare meorum
Diuitias olerum uersu perstringere mecum.
Infirmis diuisa licet Macedonia ramis
Spargitur, & crebris ignobile semen aritis
Sufficit, illa tamen toto reparabilis anno
Pauperiem largo solatur munere plebis.
Indigne, nec non restringere languinis undas
Corpore diffusas, facili solet obuia gustu.
Illa quoque infecto uenter dum forte dolore
Turbatur, somenta super non irrita ducit,
Potum subimet frondesque papaueris addens.

De Lilio. Cap. XIV.

LILIA quo uersu tandem, carmine quo ue
leuunc macies satis effert arida muse?
Quorum candor habet nuiui simulacra nitoris
Dulcis odor, syluas imitatur flore Sabæas.
Non parius candore lapis, non nardus odore
Lilia nostra premis: nec non si perdidit anguis
Ingenitis collecta dolis ferit ore uenena
Pelutero, cecum per uulnus ad intima mortem
Corde teram mittens: pistillo lilia prestat
Commacerare graui, succosque haurire, falerno:
Siquod contulium est summo ludentis in ore
Ponatur punctum, tum iam dinoscere uires
Magnificas huiusce datur medicaminis ultro.
Hæc & iam laxis prodest contulio membris.

De Papauere. Cap. XV.

ET cereale quidem nugarum in parte papauer
Hac memorare placet, quod capta moesta puellæ
Mater, ut immentis optata obliuia mentem
Exuerent curis, fertur Latona uorasse.
Hoc simul auxilio carbunculus later ab imo
Pectore, qui ructus minimum conuehit amarus
Oris adusque fores, reprimi per sæpe uidetur.
Huius ad alta caput, granorum semine foetum,
Protento fragili que solet se follere collo,

Inque modum mali regio cui Punica nomen
Indidit, unius patulo sub pellis amicu,
Grana celebranda uirtutis plurima claudit;
Deque sono mandentis habet formabile nomen.

De Sclarea. Cap. XVI.

HIc umbrosa nonos inter Sclarea uirores
Stipite prauialido allurgens, ramosque, comasque
Altiùs extollit: quæ quamuis rariùs ulli
Quæsitæ auxilio, medicorum penè putetur
Effugisse manus; ductis tamen indita caldæ
Et uires & odorati fermenta saporis
Præstat; eam iuxta hortensis non extrema colli
Sylua latet, stomachique moras uetremque salubri
Prouocat auxilio, radices munere coctæ.

De Mentha. Cap. XVII.

NEC mihi defuerit uulgaris copia menthe,
Multa per & genera & species diuersa, coloresque
Et uires, huius quoddam genus utile uocem
Rauicisonam claro rursus redhibere canori
Posse putant, eius succos si fauce uorant
Ieiuna, quem crebra premens raucedo fatigat.
Est aliud præpingue genus huiusce fructu
Quod iam non parui diffundat germinis umbras;
Celsa ebuli sed more petens, à stipite forti
Vndique maiores foliorum prorogat alas;
Quis odor alter inest, pauloque immittitur haustus.
Sed si qui uires, species, & nomina menthe
Ad plenum memorare potest; sciat ille necesse est,
Aut quot Erythreo uolent in gurgite pisces;
Lemnius aut altum quot in aëra Mulciber ire
Scintillas uastis uideat fornacibus Aetne.

De Puteo. Cap. XVIII.

NON patitur cunctas angustia carminis huius
Putei uirtutes celeri comprehendere uersu.
Hoc apud Indorum tanti constare peritos
Fertur, apud Gallos quanti ualeat Indica nigri
Congeries piperis, quis iam dubitare finetur,
Hæc herba plures leniri posse labores?
Quam pretijs inhiante erit ditissima tantis
Gens, hebenoque auroque fluens, & mira uolenti
Queque ferens mundo, & magis laudanda totantis
Virtus & ratio, nullis que muneribus terris
Larga suæ non pandit opis: que rara sub isto
Axe uidere soles, alijs in partibus horum
Copia tanta iacet, quantam uilissima tecum
Efficiunt: rursus quedam que spreta uidentur
Fortè tibi, magno mercantur ditia regna;
Altera ut alterius potiatur fœnore tellus,
Orbis & in toto per partes una domus sit.
Puteum quam decoctum curabit amice
Et potu & fotu stomachum (mihi crede) morantem.
Dum canimus que certa graui ratione teneamus;
Quedam audita, & iam uero miscere cothurno
Fas usque finit: ramum coniungito putei
Auriculæ, ne forte caput turbauerit æstus
Solis, in aërio si te perflarit aperto.
Quod nisi me currens deponere uela Thalia
Cogeret, ac tandem portus intrare moneret;
Hinc tibi multiplices poteram decerpere flores.

De Apio. Cap. XIX.

QUAMVIS in nostris apium uisceret hortis,
Et solito id multi prodesse sapore notarent,
Plura tamen proprijs medicamina uiribus, ac

STRABO GALLI

Exhibet auxilio; cuius si trita capellas
Semina; torquentes utinam tringere tricas.
Dicitur ipsum etiam tenero cum germine māsūm,
Concoquit errantes stomachi peneralibus escas.
Corporis hunc regem turbans si gausa pexet
Mox apum lymphā tristigū bibatur aceto,
Passio tūm celeri ceder deuicta medelz.

De Betomca. Cap. XX.

MONTIBVS & syluis, pratis & uallibus imis
Bettonicz preiusta licet collectio cunctis
Pene locus superet passum; tamē hāc quoque noster
Hortus habet, cultaque docet mansuescere terra.
Hāc tantum meruit generali nomine laudis,
Vt si quid mea mīsa uehi super addere, tandem
Mole operis deuicta sui, iam sentiat, illa
Vilitate minus quidquid deprompserit, esse.
Hanc uiridem si forte tuos coneris in usus,
Carpere, sicut am ue hyem deponere pigra,
Turbida subie tuas oblectant potula fauces,
Seu potius longo tibi defecata labore
Dona placent, huius uirtus mirabilis herbz
Omnia lutiēt: quam quosdam pendere tanti
Nouimus, ut contra, totum si iniuria corpus
Impetit interius, muniti uiribus eius,
Sese posse rati, solcant haurire digitus
Continuis hōc acce genis medicaminis almi.
Præterea caput insecto si uulnere fractum
Tabuerit, tum crebra terens imposito sacra
Tegmina bettonicz, statim mirabere uires
Illius, in solidum fuerit dum claua cicatrix.

De Agrimonia. Cap. XXI.

HIC quoque Sarcocolam, camposque plurima
Vestit, & efficit sylvarum inuenta sub umbris
Nascitur, ordinibus facile est discernere pulchris.
Hāc præter paruum late uirtutis honorem,
Trita domat uentris prædium & pota dolorem.
Si quæ forte dialybs intentus uulnera membris
Indiderit nostris, huius tentare iubemur
Auxilium, partique imponere tōsa patenti
Germīna, maturum nacturi hac arte uigorem;
Si tamen addatur mordens cataplasmati acetum.

De Ambrosia. Cap. XXII.

HAVD p̄cul Ambrosiā uulgō quā dicere mos
Erigitur; laudata quidem, sed an ita sit illa,
Cuius in antiquis creberrima mentis libris
Fit, dubium est multis. Medici tamen arte suapte
Hanc utrinque colūt, tantum uē sanguinis haulta
Absumit, quantum potius ingerit aluo.

De Nepeta. Cap. XXIII.

HERBARVM in numero, quas hortulus ille re
Semper prole creat, nepetz non seznior exit
Surgit, utricam folijs simulantibus, alto
Vertice pergratum late largitis odorem.
Hætuariis olim morborum accommoda curis,
Non extrema alias inter decernitur herbas.
Huius enim succus roseo commixtus oliuo
Efficit unguentum, læz quod uulnera carnis
Atque quætricum deformia signa nouarum
Pōsse abolere aiunt, p̄isco reparare nitore
Et reuocare pilos, plagæ quos forte recentis
Pellis hulca tulit, sanietaboque perosos.

De Raphano. Cap. XXIV.

HINC raphanū radice potes, latoque comarum.

HORTULVS.

Tegmine sublatum, extremus facit ordo uideri.
Cuius amara latus, quatuor uiscera iulium,
Mansuipremi radix; triti quoque seminis haultus
Eiusdem uirid pellis perlepe medetur.

De Rosa. Cap. XXV.

1. K. M. nifi the ressum uia longior indupediret
Strupeus atque noui teretetur carminis ordo;
Dehuerant uiridina rose pretiosa metallo
Pictoli & niuels Arabum circumdare gemmis.
Hæc, quia non Tyrio Germania tingitur olstro,
Lata nec ardenti se Gallia murice uetat,
Eutea purpureus reparat clementia quotannis
Vbertum floris; tantum qui protinus omnes
Herbarum uicisse comas, uirtute & odore
Dicitur, ut merito florum flos esse scatur.
Inficit hic oleum proprio de nomine dictum;
Quod quam sepe fit mortalibus utile curis,
Nec meminisse potest hominū, nec dicere quisquā.
Huic famosa suos oppōnunt lilia, flores
Longius horum & iam spirans odor imbuit auris
Sed si quis niuel candentia germina, fructus
Triuerit, aspersi mirabitur illicet omnem
Nectaris ille fidem celeri perisse meatu.
Hoc quia uirginitas fama subnixta beata
Flore nitet, quam si nullus labor exagitant
Sardis, & illi non tregeat ardor amoris,
Flagrat odore suo. Potro si gloria pellum
Integritatis eat, fateor, mutabit odorem.
Hæc duo nanque probabiliū genera indyta flori
Ecclesiæ summas signant per secula palmas
Sanguine martyri catpuit que dona rosarum,
Liliaque in hodi gestant candore nitentis.
O mater uirgo, fecunda germine mater,
Virgo fide intacta, sponsi de nomine sponsa
Spansa, columba, domus, regina, fidelis amica,
Bello carpe rosas, lata arripelilia pace.
Elos tibi sepi uigero, uenit geperamine Jesse,
Vnicus antiquæ reparator itipis & auctor.
Lilia qui uerbis utraque dicant amena
Morte rosas tingens, pacemque & p̄zha membris
Liquit in orbe suis, uirtutem amplexus utranque;
Præmiaque ambobus seruans æterna triumphus.

1. Picatio, Opusculi.

HÆC tibi scripsit munificula uilia parui
Strabo tuus, Grima de pater doctissime, seruus
Pectore deuoto, nullius ponderis offert.
Vt cum conspectu uiridis confederis horti
Super opacatas trondenti, germine malos, suar
Perliquis imparibus crines ubi diuidit umbris;
Dum tibi cana legunt tenera lanugine poma
Ludentes pueri, ichola letabunda tuorum,
Atque uolis ingentia mala capacibus indunt,
Grandia conantes includere corpora palmis:
Quo monere habes nostri pater alme, laboris,
Dum relegis, quæ dedo uolens, interque legendum,
Vt uitiola seces, de posco, placenta firmes.
Te Deus æterna faciat uirtute uirchem
Immarscescibilis palmam contingere uite,
Hoc pater, hoc natus, hoc spiritus annuat almus.

F I N I S.

Commentarios nostros in hunc Strabonem habes manu
separatim descriptos, & paratos ut eudantur,
omnino deo.

CAELII AURELIANI SIC

CENSIS IN QVINQVE LIBROS

CHRONION PRAEFATIO.

PRÆSCRIPTIS celerum passionum libris, tardarum placet curationes ordinare, quæ solo suprapositionis tempore superioribus similes, in lenimento uero uaria recorporatione formantur, & peritis medicinae claræ eternamq; gloriam quærunt. Celeres enim, uel acutæ passiones etiam sponte soluiuntur, & nunc fortuna, nunc natura fauente. Quo fit, ut ignari homines elati sæpe medicos fugiant, cum hos prouentus incantationibus nouis ac ligamentis adscribant, aut fortunæ, cum quoties repentino nuncio læti aut territi ægrotantes, mutatione quadam corporis morbos excludunt, uel ea per intemperantiam gerunt, quæ ratione occulta sibi profutura nescientes, duce desperatione committunt: in utrumque enim faciles celeres passiones accipimus: pelluntur enim aut fluore sudoris, aut sanguinis per nares, aut uentris. Chroniæ autem uel tardæ passionis morbi, qui iam præiudicio quodam corpora possederint, solius medici peritiam poscunt, cum neque natura, neque fortuna soluantur. Podagram denique, uel phrethisin, aut elephantiasin, uel similes tarditate passiones resolui, nulli sectarum principes meminerunt, sicut sæpe febres acutæ soluiuntur. Hinc denique Græci ASCLEPIUM nomen sumpsisse dixerunt, quod dura curando primus superauerit uitia. Scribentium igitur medicinam nullus ante Themisonem tardarum passionum curationes principaliter ordinauit. Alij uero has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles iudicantes, uel incurabilium passionum: alij aliptarum officio transmittendas crediderunt: alij disperse atque de alijs passionibus scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropismo, paralyti, alopecia, uel quartanis typis, ut Erasistratus & Asclepiades. Themison autem tardarum passionum IIII libros scripsit. Item Thessalus secundo libro Regulari earum curationem ordinauit. Dehinc Soranus plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturae formauit, de passione capitis initia sumens: quod nos quoque faciendum assumimus.

Admonitio.

Aurelianum {unc, altera parte sui auctum, à me multis correctum locis, reperies in minori volumine excusum. Huc ergo transfer.

Admonitio.

Cape è paruo exemplari
Lugdunensi à me correctum
& auctum altera parte
De acutis morbis

De Capitis passione, quam Græci Cephalæan nominant. Cap. I.



P A R T E corporis quæ patitur, passio nomen accepit : nam cephalen Græci caput uocauerunt . Generatur autem sæpius perfrictione aut frigiditate , aut e contrario solis excussione, aut continuatione uigiliarum : sed uehementius forminas tenet ob diligentiam capillorum . Sequitur in passione constitutos dolor uehemens capitis totius, aut dimidij, quæ consueto nomine hemicraniam uocant : uel certe temporum, quem dolorem crotaphon appellant . Occupat etiam oculorum radices, & occipitium atque colla, tendens usque ad spinæ partes : ut, cum sedere & grotantes uoluerint, uertigine adficiantur ; atque oculorum caligine cum nausea & fellis uomitu . Ac si passio uehementer coeperit, rubri atque prominentes oculi fiunt, deiectis & conclusis palpebris euitantes lumen, cum lacrymarum fluore, cibi etiam iugi fastidio, & obtusione uisus, aurium tintu, & difficili auditu . Sequentur etiam uigilæ iuges, aut frequentes, dentium dolor, & accessionis initio sanguinis e naribus paruissimus guttarum fluor, nihil releuans . Erit igitur locandus ægrotans, si totum caput doluerit, supinus : si autem ex parte, ea parte quæ patitur : mitigatur enim quodam blandimento straminum pars in dolore constituta . Peiorante passione sequitur uultus deprauatio, pulsus obscuritas, & omnes sensus obtusione afficiuntur . Hac passione alij celeriter atque cum febribus : quem dolorem proprio nomine sectarum principes capitis uocauerunt . Alij tarde atque sine febribus per interualla temporum admoniti solo dolore capitis oppressi, quam passionem ueteres cephalæan uocauerunt . Pati autem aliqui membranam cerebri dixerunt, alij eam quæ testam circumtegit, alij omnem cutem capitis, alij temporum atque buccarum musculos, quos siagonas appellat . Nos uero aliquando istorum aliqua, secundum quod se sensus doloris extendit : aliquando omnia, secundum quod fomenta uel accessionis passionum ordinate se ingerunt : similiter etiam sicut dimissiones atque delinimenta conuariat, & nunc longiores & puras, nunc angustas & sordidas accidetium malorum reliquas in accessionem reliquerint . Itæ secundum suppositionem tempore accessionis . Itæ secundum quod nunc diurnas, nunc intercapedinas, interpositis diebus uno uel duobus, sicut quos typicos, aut periodicos appellamus, aut hemitriticos, pro responsione temporum habuerint uariates . Igitur de dolore capitis in acutis febribus accidenti prius de febribus memorauimus : de illo uero qui sine febribus, atque tardus, & suæ passionis est, nunc dicemus . Cum itaque adhuc paruus fuerit sensus, oportet ægrotantem iacere loco mediocriter frigido, atque obscuro, paulo leuatiù capite collocato, adhibito silentio, atque corporis & animi rege, cum abstinentia cibi usque ad primam diatrium . Adhibenda etiã articulorum leuis frictio, cum capitis fometo ex oleo frigido atque uiridi, uel succo quolibet admixto, qui sine repulsu ualeat astringere, ut polygoni, arnogliffe herbarum, aut intybi, aut portulacæ, aut rubi, quem Græci batum appellant : aut annulorum uitis, quos helicas uocat : uel uiz lupinæ, aut anagallidis, uel sideritis herbarum, aut murtæ . Hinc etiã cataplasmata adhibenda ex horum singulis, aut admixta polenta, uel compositum ex multis eius uirtutis medicamen fronti apponendum, ut est diatheon . Si uero uehementior fuerit dolor, erit locandus ægrotans loco amplo, atque calido mediocriter, & neque plurimum lucido, ne nimius splendor officiat . Apponenda etiam lanæ lenes, ac tenues & limpide ipsæ partibus, cum iugi fometo ex oleo dulci atque calido . Ac si coegerit dolor, ptygmata erunt uicissim lanæ æque mollia apponenda, ex oleo calido expressa temporibus sub buccarum musculis imota . Tunc etiã uesticæ semiplenæ ex oleo calido, uel sacelli ex pollinibus calidis confecti, manu etiã calida, atque digitis molli tactu loca dolentia contingenda, cum omni silentio ac requie ægrotantis . Si autem dolor ad dentes tetenderit, mullum calidum uel oleum damus, quod in ore sine ullo motu contineat : nisi quis hoc horrefcens in nauseam fuerit, prouocatus . At si uehementius dolor conualuerit, & maiora exegerit, diu etiã permittentibus uiribus in ipsa diatritho, uel ante ipsam sanguis erit detrahendus, phlebotomia scilicet : sed totum caput dolentibus, ex eo brachio quod facilius fuerit detractio facienda . Ac si altera pars capitis doluerit, ex eius contraria detractio nem faciemus, quo longius adiutorij comotio à parte patienti remota uideatur . Tunc os colluere permittimus, & aquæ calidæ potum damus . In ipsa uero diatritho unctionem adhibemus ex oleo dulci atque calido . Tunc faciemus foueri faciem ex aqua scilicet calida . Dehinc potum atque cibum damus, ut est panis aquæ calidæ elutione purgatus, quo difficultate deposita politus fiat . Vel cere aliqua similiter fiat, aut cum mulla mediocriter cocta, aut ex panis pulicula confecta, quam torineton Græci uocant, cum paruissimo anetho, aqua, sale, & melle : item oua sorbilia . Quæ quidem cibatio erit alternis diebus adhibenda, donec dolores declinent . At si passio durauerit, erit tondendus æger usque ad cutem . Hinc etiam patientes partes leuantur, cum ex alto reflatio quædam uiarum nuditate permittitur, & localibus interea adiutorijs preparantur . Tunc nouacula radendum caput, atque cataplasmatibus, & leui cucurbita in accessione, sine scarificatione autem & dimissione releuandum, ex illis scilicet partibus quæ plus patiuntur, uel fortiore dolore uexantur . Atque ita sanguisugæ apponendæ, quas hirudines appellamus, & magis si locorum inæqualitas cucurbitæ

cucurbitæ non fuerit capax, quo inhzere minime possit. Tunc uaporationes spongiarum ex aqua calida expressarum adhibendæ, uel calida aut oleo, aut decoctione hybisci, quam althean uocant. Ac si uenter non fecerit officium plurimis diebus, tunc calidæ, & oleo rutæ admixto melle erit iniiciendus ægrotās: sic enim & intestinorum fatus fiet, & stercorum detractio caput releuatur: quorum motu ac expiratione ascensu amplius grauabatur. Quapropter etiam pridem, si officium uenter non agnouerat, oportuit adhibere dysenterem, priusquam cucurbitæ usus accesserit: dehinc cataplasmatum genus nunc laxatiuum conuenit, ut est ex lini & foenigræci seminibus, atque polline ex aqua & oleo admixto melle cōcocto, uel ex panico diligenter emollito. Declinante passione, cerotarijs atque malagmatis simplicibus utendum, ut est diachylon. Tunc cibus uariis dandus, prædictæ simplicitati uicinus, ut est cerebrum porcinū, uel hoc dinum, piscis teneri, turdi, columbarum pulli, uel domesticarum gallinarū: olera quoque cucurbitæ, malugæ, betæ, nunc ex aqua cum oleo atque garo curata, nunc concisa atque trita, & interius condita: magis enim ex ijs facilis uenter efficitur. Quod sæpe etiam sanitatis tempore omnibus profuit, quibus unius diei uētris dilatio caput impleuit. Ante cibū præterea erit adhibenda gestatio, portatoria scilicet sella, sine uehementi motu, quo partes uehementer patientes releuentur. Tunc etiam deambulatione utēdum, & post perunctionem capiti adhibendus fatus, cum toto corpore supradicto motu laxatum spiramētis facilibus agitatum sit: etenim densa laxantur, & retenta tenuantur. Dehinc cum declinatio firmior esse cœperit, lauacrum adhibendum. Tunc in alia diatrīto quiddam uini aquæ offerendum. Ita cum capitis pausa erit dolor, longo tempore horæ solitarum accessionum erunt euitandæ, atque e memoria eiiciendæ: quibusdam etiam temporibus in requie seruemus ægrotos. Declinandum etiam omne, quod potest accessio nem in commemorationem reducere, ut est adustio, indigestio, uenus, meratus potus, uel plurima masticatio durioris cibi, aut curiose conditi, necnon etiam uapores uehementes atque ignea lauacra, exclamatio uehemens, iracundia, uel uenter nimis adstrictus, & magis post cibum, aut spiritus retentio, & eius ad illa descensus: sic enim oppressio quædam omne caput extendit, dein tardante passione, & nunc superpositionibus exasperata, nunc lenimentis leuigata. Oportet igitur super positione temporis animaduersionem habere, ijs denique quæ supra scripsimus uti. Etenim quæ mitigant celeres uel acutas passiones, ea tardarum superpositioni non conueniunt. In lenimento uero paulo audacius resumendi sunt ægrotantes, & non, ut nuper, timoris adiuncta cautione tempore quo superpositionis asperitas declinabat. Adhibenda igitur uectatio pro uiribus ægrotātis, fertorio uel sella procurata: ac si purius occurrerit lenimentum, & neque æger fuerit uiribus præuexatus, tunc hominum manibus, aut animalium actu uehiculum adhibemus, æquali uidelicet motu, sed perfecto atque æquabili, lucido & mediocriter calido loco. Ac si tēperata & sine flatu aeris fuerit qualitas, tunc etiam sub cœlo erit adhibenda gestatio. Sed necessario longitudo loci curanda, ne frequenti reuersione uehiculi circulatus gressus uertiginem ingerat ægrotanti. Tūc etiam deambulatio adhibenda, sed primō tarda, dehinc medio tempore fortior, atque paulo erectior extentis curibus. Iis uero quibus caput fuerit plurimum releuatum, etiam lectio ante deambulationem erit adhibenda, si studiosi fuerint ægrotantes, sed leui exercenda uoce, tunc exercitium atque unctio, quæ æqualiter corpus moueant atque curent, ut uestitos faciamus currere: nudos uero cum defricatione perungi. Tunc manus suo motu exerere, uel certe luctationem iugem facere, adhibito doctore, cuius præceptis pareat. Adhibitis sane ijs rebus quæ implere atque commouere caput ualent, ut sunt ea quæ cum obiectione plurima corporis fieri iubentur: necnon etiam circulatos ductus, atque retrogressus cum salubus. Tunc ora lauanda, atque articuli fouendi, uel lauacrum per interualla dierum adhibendum. Deposita autem corporis turbatione, erit aqua præpotandus ægrotus. Tunc cibus sumere succi facilioris, id est mediz materiz, quam mesen hylen uocant Græci. Dandum etiam uinum tenue paruum. Sed eo tempore quo cibamus adhibēda quoque animi laxatio, quā diachysin uocāt. q̄ fiet aut ludicris rebus, aut ioculari faceta, q̄ singula artis moderatione adhibita, cyclorū ductu augeri atque minui debēt: prædatio initio, cui perfectio consummata respondeat. Est autem resumptiui cycli ordinatio formanda hoc modo. Prima die paruo cibo atque aqua nutritus ægrotans, uel si ferre ualuerit, ab omni nutrimento abstentus, alia die leui motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc & cibo nutriendus, id est, totam accipiat partem solitæ quantitatis, quam facile percipere atque digerere solebat. Sed panem dabimus limpidum, fermentatum: pulmentum autem oua, uel holerum betas, aut cucurbitas, uel maluas, aut lapathos, aut bulbos, uel pisces teneros, ut sunt scari: & auiculas, ut sunt turdi, aselli, iulidæ, ficedulæ: uel cerebrum porcinum aut hoediniū. In hac perseverantes qualitate atque quantitate duobus uel tribus diebus, iuxta uirium possibilitatem, quo neque parua dando debilitentur, neque adiectionibus perturbati opprimantur. Tunc detractæ partis partem tertiam adijcientes, pulmentum: damus turdorum, ficedularum, aut ex pullis columbarum uel gallinarum. Tunc rursum post tres uel quatuor dies aliam tertiam partem panis adijciemus, & agrestia dabimus pulmenta, ut leporis, aut capreæ. Atque ita æquali numero dierum peractō, ultimam partem panis addemus: pulmentum dabimus porcinum tenerum ex aqua, uel non curiose conditum ex anetho & sale. Præterea simili modo erit etiam uini facienda partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adiectio: ac si plus ægrotans bibere quàm datus uoluerit, aquamumat. Simili modo etiam gestatio, atque exercitium, siue motus erit augendus aut minuendus, ad comparationem quantitatis ciborum. Perfecto resumptiui cyclo erit metasyneriticus adhibendus, primo ex parte, dehinc perfectus. Est enim passio facilis in motu, & naturā caput iniurijs aptissimum: siquidem non facile rerum repentinas per-

ferat mutationes. Prima igitur die erit cibo abstinendus ægrotans: tunc alia die parua adhibita gestatio ne, atque unctione corporis, uel si passio permiserit, lauacro. . . Rursum panis dabimus partem solite quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere atque perferre solebat. Pulmentum dabimus falsum, assum, uel coctum: dabimus etiam cappares sinapi madidatas, atque oliuas ex uiridi nouitate messas, quas colimbadas uocant: præcauentes ea quæ facile caput implent atque grauant, ut est porrum, allium, cepe. Potum dabimus uinum: & si perferre uoluerit æger, in iisdem duobus uel tribus perseverabimus diebus: sin minus, secunda die falsamentis admiscemus cerebrum uel piscem. Tunc sequenti die panis detracti partem tertiâ addemus, pulmentum damus, holus, cerebrum, piscem tenerum, hoc tribus uel quatuor seruantes diebus. Tunc rursum aliam tertiâ partem panis addentes, transimus ex medice qualitatis materia ad uolantum qualitatem, atque in eadem simili dierum numero perseverantes, ultimâ partem panis addemus: pulmentum dabimus porcine carnis. Sed si multas mutationes facere uoluerimus, in quatuor partes medietatem panis diuidimus, ut singulas singulis mutationum pulmentis adijciamus: hoc est, unam medice qualitatis materie applicantes, aliam uolantum, aliam agrestium, aliam porcine carnis. Sed ne quid odiosum est quantitate multorum dierum fiat ægrotanti, hoc est pulmentorum similis oblatio, erit in communi qualitate specierum diuersitas uarianda, ut quibus diebus falsum damus, Græci drimyphagian appellant, eiusdem speciem uariemus. nunc, exempli causa, dâtes piscem, nunc sardam, nunc cordulam: atque ita in usum medice materie, quam mesen hylen appellant, nunc turdos, nunc ficedulas, siue quas miliacas uocant, nunc columbarum pullos ac gallinarum. Hoc denique etiam in alijs qualitatis pulmentorum, siue materiarum erit seruandum, ut eiusdem uirtutis pulmenta specierum mutatione uariantur. Erit præterea pomorum quiddam adiungendum, quod inflare non ualeat. Sed tempore, quo porcina utemur, erunt etiam olera offerenda: solum seruandum, ne modum quantitatis excedamus, siue qualitatem rerum datarum. Augetur enim oblatio non solum si plurima fuerint diuersarum specierum, sed etiam si plus nutrire ualuerint. In omni igitur mutatione, hoc est transitu ex qualitate ad quantitatem, prima die oportet curandum aqua uiuere, adhibita perunctione. In alijs uero diebus etiam uinum accipere, & lauacro corpus recurare. Sed non omnibus necessario diebus: siquidem facile caput iugi lauatione ad passionis uestigia reuocetur. Similiter autem oportet etiam motus corporis augeri atque minui. Tunc isto cyclo perfecto erit alius adhibendus solo ex uomitu, detracta drimyphagia. In quo oportet prima die paruo cibo, & aquæ potu ægrotantem referuare. Tunc alia die leui deambulatione motum uomitum exagitari, ex radicibus raphani, uel ijs similibus speciebus, si loci aut tēporis causa defecerit copia. Oportet igitur radicis cortices in frusta minui paruissima ad libræ pondus, quod excedere fas non est. Tunc infuso mulso, & aceto confecto simplici, uel scillino hauriendum, atque medendo dare ægrotanti. Sed paulo prius quàm cibum libero tempore accipere solet, ut neque supinus adhuc stomachus, hoc est cibi appetitu non admonitus, sine ulla commotione reuomat: neque rursum appetentia soliti temporis excitus digestionem incitet accepta. Tunc tenuiter masticans iugiter ex illo mulso ex aceto confecto sorbens transuoret: atque, cum omnem modum sumpserit, leui deambulans motu requiescat, donec rursus stomacho est retento spiritu mordicatione quadam, siue feruoris sensu sentiat altiora pulsari. Quod quidem interposita hora occurrere probamus. . . Tunc aquæ repide sumens cyathos duos, ne plurimo potu acrimoniam radicis obtundat, immixtis digitis uomitum prouocet: atque, cum omnia reddiderit accepta, aquam superbibat plurimam, ut & stomachum lauet, & reliquias feruoris extinguat: atque ita prouocato uomitu reiecto potu rursum bibat. Hoc cum tertio aut quarto fecerit, & potum liquore limpido reddiderit, capiti leuis fons est adhibendus, atque ora aqua calida fouenda. Tunc leui deambulatione mouendus est ob tranquillitatem capitis faciendam, nisi sit soluendi corporis ex nocumento uomitus illati causa perungendus: hoc est, ex superioribus ad inferiora membratim ductis manibus defricandis. Sic enim capitis densitas, quæ uidebatur illata, soluetur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit effecta. Tunc, epotis duobus cyathis aquæ calidæ, lecto recollocandus, & ab omni cibo uel potu abstinendus summa cum requie animi atque corporis. Dehinc, laxata capitis strictura, solo dimittendus: quoniam prius quàm densitas ex adiutorij commotione illata soluta est, in somnum facile deueniunt, non solum suæ causa capitis grauationem seruauerunt, sed etiam maiorem fecerunt, cum nullo spatio interiecto somnum adiutorio iungentes densitatem corporis iunxerunt. Est igitur, ut dicimus, cibo abstinendus, ne sumpta corrumpat ex corporis remanente torpore post agitationem uomitus atque feruorem: quippe cum sæpe manentibus in stomacho squamulis uel folliculis radicem, requie superaddita, atque cibo nouo commixto, eius necessario faciant corruptionem: ex qua consequenter caput impletum, etiam si sua passione præuexatum non fuerit, necessario constrictum grauescit, cum ex illa putredine corruptionis exhalationes ascensu quodam caput obsidunt. Sicut enim The-mison ait, est natura caput carnis pauperum & neruosum, & duris cutibus & capillis obtectum, & spiramentis difficilibus natura: tum sensibus quoque uniuersis formatum, infidens corporibus, atque accipies eorum cunctas exhalationes, cum spiritus naturaliter superna petes ex inferioribus trahit corpora ea per artem atque stomachum, quæ sunt corporis ueluti maiora fumaria. Dehinc alia die lauacro utemur, atque pulmento medice qualitatis. Tunc post duos uel tres dies ceteras cycli partes adhibemus. Ac si radices loci aut temporis causa defuerint, adfestandus ordine supradictio uomitus ex granis sinapis madidati, uel ex liquido sinapi potu, aut mulso ex aceto & pipere confecto, uel cardamomo, aut eruce semine, aut decoctione thymi, uel origani, aut hyssopi, aut falsamenti, & multis ossibus, cum aceto, uel mulso ex aceto.

aceto. Tunc profectus cedente, atque limpidio lenimento perspecto, praesumpto etiam aegrotanti in grauescentem perferre nunc uomitum, nunc drimyphagiā, audemus integrum atque perfectum cyclur metasyntriticum adhibere: ut initium a uomitu sumentes, drimyphagian iungamus, ac deinde per cetera cycli materias decurramus. Ordinantes praeterea etiam localia adiutoria, quorum prima sunt adhibenda leuiora: & quae longe remotis partibus admota transmissa patientibus ingerant curationem, tunc etiam uehementiora. Erit igitur radendum caput, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam, donec citis rubore adficiatur. Ac deinde in balneo nitri puluere aspergi, & confricari paulo antequam in solium descendat aegrotans. Tunc etiam paroptesis adhibenda erit ex carbonibus aequali uapore medicamentis. Alia etiam die cucurbita infigenda plurimae cum flamma, & primo dorso atque ceruici, uel ceteris nervis, quos tenentis appellant: tunc capiti. quae quidem capiti erunt magno raptu detrahenda. Dehinc dropax adhibendus, primo cruribus, tunc thoraci, & dorso, ex primo ceruicis sphondylo usque ad clunes, uel earum ultimum sphondylum: plurimi etenim nervi inferiora quaeque communi naturae complexi iisdem paria faciunt superiora. Tunc partium propugnentibus pilis capitis, atque buccarum, uel temporum musculis, quos siagonas appellant, collo uel mento cum subiectis gutturis, quae ante rumam uocant, dropacem apponemus. Sed ne ceteri corporis partes nudae interea perfrigescant, erunt a duobus ministris mediocriter unctione fricandae: atque ita, cum dropacem detraxerimus, totum perungi corpus oportebit. Ipso quoque capite manu leuiter pertractato, & lauacro dabimus aegrotantem. Iis itaque adiutoriis relaxatis, atque lentescens capitis partibus, uocis quoque exercitium adhibemus, quod Graeci anaphonesin uocant. Tunc frequentius sinapismum, ac deinde ptarmicum utile est. Plurimum denique prodest post deambulationem sinapi adhibitum in gargarismum, madidatum prius quam lauacro aeger utatur, uel aridum, ac masticatum, ac deinde aqua calida sumpta, & in ore paulisper retenta, uel piper cum melle. Non quidem haec humoris, siue phlegmatis detrahendi causa methodus ordinauit, sed ut etiam oris interiora adiutoriorum agitatione capiti beneficium tradant, quippe cum dolor saepe ipsas quoque partes afficit. Ista igitur regula consequenter etiam in betae nigrae, uel cyclaminis herbae succo in cochlearis quantitate reclinato capite aegrotantis pollicis sinistrae minus impressione inflatis narium cauernis infuso uti possumus. Etenim fit mucilenta humoris excussio, qua aegrotans releuetur, non ob detractionem, ut supra diximus, materiae: sed quod adiuncta agitationi utilitas capiti beneficium tradat. Est etiam ex localibus adiutoriis usura corporum, ut sunt ea quae consueuntur ex euphorbio, uel adarce, opobalsamo, aphronitro, murra, uel alijs similibus uirtute rebus. Utendum etiam malagmatibus, quae ualeant ex alto causas inductione propria detergere, quae Graeci Minythica uocauerunt. Meminerimus tamen, non prius esse ab adiutorio locali ad aliud transseundum, prius quam turbatio corporis fuerit delinita, atque patientes partes aliam recte poscere commotionem adiutoriorum fuerint uisae. Quapropter si plurimum uexata corpora uiderimus, sufficere intelligimus uno in cyclo unum locale adiutorium. In ijs uero quae minus uexata noscuntur, uel uiribus depurgata, etiam secundo uti licet. Singula igitur adiutoria adhibenda esse meminerimus sequenti die, quam mutatio facta fuerit materialium, hoc est, qualitatis pulmentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex antecedenti abstinentia ductile atque aptum corpus adiutoriis fiat. Specialiter autem erit dropax adhibendus tempore quo mediae qualitatis utimur materia. Paroptesis uero & sinapismus, & ptarmicum, quod sternutamentum dicere poterimus, tempore quo uolantum utimur pulmentis: etenim neque adhuc corpus post usum falamenti debile, neque rursus plurimum nutritibili qualitate uidetur esse confectum. Cauenda etenim uehementer est capitis commotio, quae saepe corporis plenitudine fit, quippe cum sanos homines plerumque uinolentia, uel indigestione confusos, capitis motu uexatos in catarrhum, atque coryzam uenire uideamus. Solo igitur tempore, quo drimyphagia utemur, omne erit locale adiutorium prohibendum. Vel si quisquam omni ex parte fuerit uiribus plenus, leue quiddam addiderit. Sufficiens quippe, cum drimyphagia uehementia atque recorporatio altiorum eo tempore totum pene habitum mutare uideatur: & sit timoris, ita corpus adiutoriis exercere, ut eodem tempore superficies cum altioribus agitetur. Utendum etiam fomentis, siue uehementioribus illusionibus aquarum, quas Graeci cataclysmos appellant. Et primo calidarum, deinde frigidarum. Ordinanda etiam mutationes earum ad usus naturalium aquarum, scilicet earum quae non odore percutiant. Natationes uero sub diuo fieri reprobamus. Ceteris enim corporis partibus aqua complexis, solum supernatans remanet caput: quod necessario perfrigescent, inaequalitatem corporis facit. Ac si minus cedere passionem uiderimus, post frequentiam eiusdem, iterataque curatione & fortificato corpore, aegrotantis quere monia permanferit, hellebori usus adhibendus: sed primo ex eius insertatione radicibus penetratis, uel mulso ex aceto confecto infusus. Dehinc etiam coquis utendum est, atque diuersis ciborum pulmentis, quod quidem latius tertio Responsum libro iandudum docuimus. Vehementi enim motu corpus apertum despuat, ut ita dixerim, passionis carne: qua depulsa, naturalis atque noua succedit. Dehinc si etiam ijs gestis passio permanens erit, secundo uel tertio utendum helleboro: sed praesumptis uiribus ex corporis refectione. Tunc etiam naturalibus aquis utendum, uel ficcis uaporationibus, & longa per maria nauigatione. Etenim fluminales uel portuosae, atque stagni nauigationes incongrue iudicantur, humectantes caput infrigidant exhalatione terrena: maritimae uero latenter atque sensim corpus aperiunt, & salae proprietatis causa corpus adurunt, atque eius habitum quadam mutatione rescindunt. Affectandus etiam in aeres teneros atque aquilonios transitus, uel con-

trarios ijs qui passionem asperare ualent. Adhibenda præterea animi laxatio, & magis post cibum: omnis enim mentis intentio caput implet. Hæc est secundum Methodicos ordinata curatio. Plurimi autem diuersarum sectarum principes fomenta probauerunt ex oleo rosaceo, atque aceto, & ruta, & herpyllo, peucedano, castoreo, sylphio, atque semine herbæ quam agnon appellant, samisco, hederarum coma: ex quibus in accessione caput impletum augmentis asperimis agitatum atque grauatum, totius passionis duplicat modum, est enim supradictarum materiarum percussibilis usus, & eo adhibitis tempore, quo mitigatio conuenire perspicitur. Vtuntur etiam purgatiuis medicaminibus, quæ catartica uocauerunt, hoc est, uentrem deducenibus, ex quibus stomachus inficitur, & omnis neruositas uitatur. Item arteriotomiam probant, & uisuram ex cauterijs ferratis, duorum digitorum spatium super ipsas uenulas effectam. Tunc longo tempore uulnerationis seruata ferri materia purulenta, ex alto atque superficie passionem releuare promittunt: quod nos in accessione noxium atque exitiale iudicamus ob uehementiam motus. In lenimento uero inutile atque adiutoriorum medelæ contrarium, siquidem prohibeat eorum beneficia penetrare. Non enim fricationes uel cucurbitæ, uel dropaces, aut sinapismi, aut ptarmica, aut catadysmi, quos nos aquarum illisiones appellamus, uulneratis locis adhiberi aut perferri aptissime possunt. Vtuntur etiam frigido lauacro, quod Græci psychrolusian appellant, quod necessario neruos indurat, ac congelare consuevit obdensatione cutis ac totius corporis. Vtuntur etiam locali uenarum diuifura, ex qua patientes partes implentur. Dant quoque mastichen mastilandam, ex quo in passione constituta densatus costrictiue uirtutis cassatur. Item Themison primo libro tardarum passionum, quas chronias uocant, phlebotomat, atque costrictiuis fomentis utitur ad laxamentum phlebotomiz, frustratus errore sequenti ex fomentis incongruis. Item imminente augmento, duas præcauens horas, unctiones adhibet accermas, & durissimam fricationem atque costrictionem articularum. tunc sinapismum adhibet ultimis membrorum partibus, siue summatibus articularum, ob auertendam materiam. Plurimas etiam fronti sanguifugas apponit, atque humeris & temporibus capitis, quod est contra sectæ rigorem. Affectandam igitur corporis laxationem, non auersionem materię eius dicimus: quippe cum non concurrat, neque conueniat quod faciendum putat, ut eodem tempore articularum costrictione, & sanguifugarum appositione utamur præseruatis horis duabus, antequam passionis implicent augmenta, cum illo tempore sit requies adhibenda: & sæpe cõtingat, ut præueniens corpori occupato querela accessione denunciās, ipsum quoque tempus quod elegisse uidetur, turbare noscatur: sitque nocēs appositio sanguifugarum, ex quibus perfricatio atque commotio, uel ex earum moribus amentia: aut si aliquò sanguinem detrahunt, grauis ægros uexatio consequitur. Probat etiam apponenda malagmata dolori contraria, quæ anodyna uocantur uel castoreum, aut rutam, aut sphodylion herbam, cum cerotario ex oleo rosaceo atque pice liquida confecto. Ex iisdem iugiter iubet odorem capere ægotantem omnifariam caput implens: atque ita si dolores, inquit, mitigati non fuerint, ex calidis rebus frigidæ spongiæ apponendæ, ad empiricorum consilia deuolutus: qui ex contrarijs ad contraria transeundum, causis resistentibus, probauerunt. Vtuntur etiam scaroticis, hoc est quæ cutem extendere uel corrumpere ualeant, & cessante accessione, imperat fricationem adhiberi atque fomenta: quorum item usus non declinantis est accessionis, sed in toto recedētis. Denique peccatis indulgendum, Methodicorum princeps Soranus dignissime iudicauit. Adhuc enim, inquit Themison, Asclepiadis erroribus & rudimento temporis Methodici fallebantur.

De Scotomaticis. Cap. 11.

SCOTOMATICA passio ab accidēti nomē sumpsit, quod repētinas oculis ingerat tenebras. Afficit frequenter uacuos homines, hoc est sine aliquo exercitio uitam ducentes, & uinolentos, uel consuetos uentrem purgare medicaminibus potis, & ab eorum usu repente desistentes. Item hæmorrhoidis longo tempore affectos, & post earum amputationem nulla recorporatione curatos. Vehementescit autem hæc passio hyeme, uel uerni temporis initio: præterea sæpe futuram denunciat epilepsiam. Veteres denique paruam epilepsiam uocauerunt. Nam in passione coñstitutos repentina uisus tenebratio atque nebula cum capitis uertigine consequitur, ut omnia secum moueri existiment. Item ante oculos quosdam sentiunt marmorum maculis similes tractus, quos marmarygas Græci uocauerunt, cum tamen conuersis oculis omni ex parte non deserant uisum. Item capitis atque oculorum grauatio, & sedere uolentibus timor: siquidem secum omnia putent impelli, uel cadere: aurium tinnitus, superiorum corporis sudor, aut repentinus casus cum celerrima surrectione. Asperatur præterea passio, si ex alto aspexerint ægotantes uel meatum fluminis, aut rotæ uertiginem, siue ignis. Item si proni quidquam gesserint, uel maiorem uocem auribus acceperint. Discernitur ab epilepsia hæc passio, siquidem neque sensibus priuat ægotantes, neque spasmus, id est diuerso raptu adficit. Item à capitis passione, quæ cephalæan uocāt discernitur, quod dolorem non faciat. Separare autem ab ista passione uertiginem, siue obscuritatem, necessarium non est: siquidem ex ijs ueluti partibus scotomatica passio confecta esse uideatur. Est denique istius passionis affectio saluti innoxia, hoc est sine ullo periculo, nisi quis maretenus, aut ex alto cadēs, ratione casus potius quàm passionis uiolentia perire uideatur. Curationem uero eandem adhiberi conuenit, quæ nuper passioni capitis est ordinata, non solum generali, sed etiam speciali ratione.

De Incubone,

Cap. I I I.

INCUBONEM aliqui ab hominis forma uel similitudine nomen ducere dixerunt, aliqui à phantasia qua patientes afficiuntur: siquidem ueluti ascendere atque insidere suo pectori sentiant quidquam. Themison uero in epistolarum libro Pnigaliona uocauit, siquidem præfocet ægrotantes. Item quidam ueteres ephialten uocauerunt: alij epibolen, quod utilis patientibus perhibeatur: afficit crapula uel indigestione iugi uexatos. Accidens igitur semel ita, ut nullam uigilantibus querelam aut displicentem lanitatem faciat, sed solius somni turbatio noscatur, minime passio dici potest. sicut neque semel effectus per somnum seminis lapsus, quem Græci onirogonon appellant, passio nuncupatur, nisi iugiter, atque cum corporis incommoditate fuerit effectus. Est autem supra dicta passio epilepsiz tentatio. Nam quod neque Deus, neque semideus, neque Cupido sit, libris causarum, quos Aetiologumenos Soranus appellauit, plenissime explicauit. Ista igitur passione possessos sequitur corporis tardissimus motus atque torpor, & magis per somnium grauedo atque pressura, & ueluti præfocatio, qua sibi quenquam irruisse repente existiment, qui sensibus oppressis corpus exanimet, neque clamare permittat. Quo fit, ut sæpe erumpentes non articulata, sed confusa uoce exclament. Quidam denique ita inanibus addiuntur uisus, ut & se uidere credant irruentem sibi, & usum turpissimæ libidinis persuadentem: cuius si digitos apprehendere nixi fuerint, fugatum existiment. Tunc, cum somno surrexerint, faciem atque transforationis partes uiuidas & humectas sentiunt, attestante grauedine ceruicis, cum tussicula leui, molli stimulatione commota. Plurimum autem possessis accidit pallor, & corporis tenuitas: quippe cum somnum timendo non capiāt. Apparet igitur structura passio ex grauedine, tarda autem ex temporis tractu, & non semper sine periculo salutis. cum enim uehementer impresserit præfocatio, quosdam interficit. Memorat denique Similichus Hippocratis sectator, contagione quadam plurimos ex ista passione ueluti lue apud urbem Romam confectos. Quapropter curandos oportet iacere loco lucido, atque mediocriter calido, adhibita requie animi, & corporis abstinencia, usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocauerunt. Tunc colla tegenda atque caput, & stomacho lanis limpidis ex oleo calido præcincto. adhibenda etiam oris collutio ex potu aquæ calidæ. Ac si plurima stomachi, uel capitis, uel colli fuerit querela, adhibenda phlebotomia, & post detractionem perunctio ex oleo calido. Tunc ora fouenda, cibus dandus simplex, succi facilioris, paruus, sorbilis: & si passio perseuerauerit, cataplasmata adhibenda: cucurbita quoque nunc simplex, nunc adiūta scarificatione ex utraque parte gutturis, quam Græci anthereona uocant, nos rumam. Tunc uaporatio utendum, & alternis diebus cibus dandus. Illa uero adiutoria, quæ adhibenda diurnis erunt diebus, adhibenda: sed longe remotius à nocturno tempore. Tunc etiam gestatio atque uarius cibus, & lauacrum, & aquatum uinum. Illis uero partibus, quas curamus, erunt primo cerotaria apponenda: tunc malagma ta, ut diachilon, aut diamelilotum, aut diasamscum. Fricatio etiam capitis, & deli pectinis capillorum decursio, suspiciones etiam siue metus imminentium somniorum auertendi procul, fabularum lenitate robore adiecto. Plerique enim sibi fingentes uel formantes futura, uoluntarios penè causarum motus efficiunt: ac si passio tardauerit leuioribus admonita monitis, conuenit etiam radicum uomitus atque drimyphagia: capitis quoque detonsio, ac corporum usus acriorum: item dropax. sic enim aut ex supradictis adiutoriis egritudo soluetur: aut, si peiorauerit, epilepsia necessario sequetur.

De Epilepsia.

Cap. I I I I.

EPILEPSIA uocabulum sumpsit, quod sensum atque mentem pariter apprehendat. Appellatur etiam puerilis passio, siquidem in ipsis abundet ætatibus: & sacra, siue quod diuinitus putetur immissa, siue quod sacram contamine animam, siue quod in capite fiat, quod multorum philosophorum iudicio sacrum atque templum est partis animæ in corpore natæ: siue ob magnitudinem passionis. maiora enim uulgus sacra uocauit: sacrum dictum mare, sacra domus, uelut tragicus poeta sacram noctem, hoc est magnam. Fit plerunque uel nascitur ex uinolentia, aut indigestione, aut conclusionē: uel, ut Asclepiades, percussu atque diuisione membrorum quæ cerebrum tegunt, aut nimio timore. Sed eius passionis species due esse probantur: una, quæ somno similis altissimo uideatur: alia diuerso raptu corpus afficiat. Quarum prima grauior iudicatur, siquidem sit similis apoplexiæ: quarum quidem commixtio tertiam facere speciem potest. Plerique enim raptu atque contractu corporis adfectu, uel adprehensi, secundo in altissimum soporem deuenerunt. Sed horum differentia generaliter inutilis curationi inuenitur. Pronos autem seu dediuēs, aut uenturos in ipsam passionem, sequuntur communia accidentia etiam cæterarum passionum quæ ex membrana cerebri oriuntur, ut grauedo atque uertigo capitis, & interior sonitus, consensus etiam occipitij, oculorum intentio, aurium tinnitus, aut difficilis auditus, & cum uertigine uisus obtusio, uel quædam præ oculis quasi propendentia, macularum marmoris similia, quæ Græci amarygmata, siue marmarigas uocant: uel araneorum cassibus, aut nubibus tenuissimis similia, aut paruulis uolantibus animalibus, ut sunt culices. item uelut scintillarum micæ, aut circulos igneos circumferri præ oculis sentiunt ægrotantes: linguam quoque inflexibilem cum saltu musculorum, & dolorem à tergo inter scapulas. Sequitur etiam gutturis durities, atque præcordiorum iugis inflatio cum oscitatione, sternutamento, & saluarum fluore, & cibi fastidio, aut immodico appetitu, uigiliæ iuges, aut plurimus & inanis somnus, insomnia turbata, & ciborum difficilis egestio, uel nulla, & manifesta causa ueretri tentigo, & frequens Veneris delecta-

I iiii

rio. Aliquando etiam per somnum seminis lapsus, quem Græci onirogonon uocauerunt: mens suspensa cum anxietate, & nullis ex maioribus causis facilis iracundia, atque paulo ante gestorum obliuio, & eorum quæ caliginem facere ualent facilis sensus, obtinente passione occupato corpore, sensuum priuatio accessione dominante. Sequitur & quibusdam immobilitas perfecta cum ore demisso, attestante pallore cum aspiratione tarda & pulsu magno, atque alti soporis simili oppressione. Alios uero raptos diuersa diductio, atque saltus, & uultus contortio, uel oculorum sequetur: quæ sæpe perseverans etiam post accessiōem strabos fingit ægotantes: atque contrario quibus tarda fuerit correctio, naturalis uisus simulæquitatem. Sequitur etiam gutturis stridor, & singultus, cum rubore uultus, & uenarum inflationes, & aliquando pulsus atque spirationis cessatio, tunc per interualla resumptio, palpebrarum quoque suspensa positio, & illisio dentium atque stridor, & linguæ prolapsio, quæ sæpe quassatione, sæpe incisura uexatur. Sequitur etiam præcordiorum ad superiora raptus, uel stercoreum & urinz inuoluntaria emissio, sudor roridus rigenti corpore. Aliquibus etiam confusa uocis emissio, & ante dimissionem per os atque nares spumare fluor, accessione cessante omnium gestorum ignorantia, atque corporis demissa uolutatio, cum moribilia uultus ægotantis. Sequitur tunc oscitatio & distectio corporis ueluti uoluntaria, & insolitus uisus. Præter motus & totius corporis marcor: oculorum etiam permanens turbatio, atque uenarum frontis exantia. Aliquibus etiam mentis alienatio, & nulla notorum agnitio. Alio autem tempore plurima ex antecedentibus consequuntur quæ supra memorauimus: hoc est, tenebratio uel caligo, cum proni quidquam gesserint ægotantes, aut nauem, aut rotam figuli celeri motu ferri cospexerint: aut aquam fluentem, uel altitudinem, aut rupem uiderint, aut strepitum uel clamorem audierint, aut uehementer refrixerint, uel ignis la-uacris usi fuerint, aut odoribus nimium bonis uel malis adfecti, ut storacis incensi, aut thuris, aut bdellii, aut gagatis lapidis, uel bituminis, aut ceruini cornu. Præterea accessiōum motus nunc ordinatos, nunc inordinatos ægotantes accipiunt: & nunc interuallis longioribus, ut mensium duodecim: nunc angustioribus plurimum uel parum, ut eodem mense uel die frequenter agitentur. Noctibus quidem inquietati, & quidam antecedentibus signis accessiōem fore denunciant: quidam sine ullo denunciatiuo motu, quo fieri ut magis periclitentur. Alij enim prænoscentes futura, motibus solitis admoniti, in domibus se continendo tutantur, accessiōem præuenientes: quam cum sentiunt propinquare, eligunt locos quibus tuto, & sine ulla turpitudine iacentur. Alij uero istorum ignari publicis in locis cadendo foedantur. Adiectis etiam externis periculis, quæ passionis non esse uideantur, loci causa præcipites dati, aut in flumina uel mare, cadentes, aut in balneis uentris solutione coacti. Signa autem sunt post lenimentum futuræ rursus accessiōis, ex quibus affici in passione uenturos memorauimus, somnus turbatus, uel cibi corruptio sine ulla manifesta causa. Item ueretri sine ratione tærito, & Veneris appetentia, uel seminis per somnum iactus, quæ onirogonon Græci uocant: iracundia, morositudo, & cetera quæ nuper posuimus. Item segnitie cum pigro motu in officia solita, & grauatio cum quodam somnifico mœrore uultus, decolor atque maior inflatio, oculorum quoque ueluti deprauatio, cum deiecto quodam uisu. Nam suspicere difficile est ægotanti, hoc est aerem supernum attendere. Quod si tentauerint, facile rursus abducti uicinas quoque oculorum partes ad inferiora conuertunt. Vel si repentino motu caput in alteram conuerterint partem, uertiginem sentient cum tremore atque corpore, cum digitorum contractu uel dolore, aut crurum grauedine, & summitate manuum uel pedum. Ex quibus multis uel cunctis interrogatione acceptis passionem dicere poterimus, nisi præsentibus in accessiōe facilius nobis cognitio fuerit declarata, uel ætatis, aut aliquolibet causa eger sua narrare non potuerit accidentia, quæ superadiecta ratione apprehendere poterimus, & accessiōnem futuram prænoscere: conijcentes etiam temporum responsionem, quanquam summam accessiōnum ordo sæpe seruetur. Communiter autem hæc passio frequens est in pueris, & magis tempore quo dentium natiuitates habentur. Accidit etiam primæuis, atque medijs ætatibus: senibus uero difficile: nam uehementius afficit proximos natiuitati infantes, quam pueros, aut uergenti ætate atque seniores: siquidem uiribus inualidi passionum impetum tolerare non possint. Solet denique hæc passio pubertatis tempore siue nouæ purgationis in sceminis, aut primi partus quadam naturali nouitate facile detergeri corporis mutatione suffecta. Quod si minime uenerit, plerumque patienti consenscit: nisi aut longo tempore natura pugnante, aut medicinæ diligentia fuerit superata. Irruit autem omni tempore corporibus, sed magis uerno. Frequenter simile pati epilepticis, & à matrice præfocata mulieri inueniuntur: siquidem non aliter sensibus priuantur, sed discernuntur quod in ultima accessiōis parte per os atque nares spumarum fluore afficiantur. Hæc est passionis cuncta specialis significatio. Curationis autem adhibendæ causa erit necessario adhibendum genus, quod sit passio stricturæ, atque uehemens, & difficulter frequentans, tarda, superpositionibus atque lenimentis uariata. Cuius quidem superpositiones nunc plurimis tempora temporibus accessiōis generalia superpositionis occurrerunt. Sed quæ forte superpositiones plurimis ex accessiōibus fuerint confecta, nunc quotidianos, nunc tertianos, nunc hemitricos faciunt typos. Difficile est enim hanc passionem in continuationem uenire: siquidem præuentu mortis interueniente minime continuatio intelligi possit, & sit impossibile, iugibus diebus aut sensibus priuatum, aut motu carentem, aut diuerso raptu affectum in uita manere. Item lenimentorum aliqua pura ac limpida, aliqua turbata concurrunt: & aliqua latiora, aliqua angusta, aliqua horum mediocria. Patitur enim communiter omnis neruositas, sed principaliter caput, sicut ex antecedentibus conijcere poterimus, & ex ijs quæ post accessiōem remanere uidentur. Curandum autem oportet primo cum tenebricositate uel uertigine uexatur, iacere loco lucido atque mediocriter calido, altioribus sita

mentis capite subleuato. & si raptus fuerit consecutus, digitis erūt palpbrę differendę, atque iugiter ab omni motu seruandus ob spasmı passionem. Iubendū etiam ministris manibus calidis nunc caput atque frontem cum blanda fricatione, nunc collum atque gutturi partem, quam anthereona uocant, contingere. Alijs etiam manuum summitatem atque pedum tenere iubemus. Pręterea frigescencia corporis uaporari, corrigi etiā ea quę forti raptu torquentur. Ac si minime consenserint, erunt in eodē schemate seruanda ne ulterius torqueantur. Tunc quodam laxamento captato corrigenda, ne nimio occurrentia certamine superare cupientes, neruorum quassationes faciamus. Linguam quoque relocare curabimus, atque mentum corrigere, uel coęquare. Tunc calidis pannis thoracē uaporare, atque inter scapulas, quod Gręci metaphrenon uocant. Laxatis enim diaphragmatis partibus, quod nos thoracis atque uentris discrimen dixerimus: laxato etiam hypodymate, siue membrana quę latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo poterit collectus spiritus exhalari. Apponenda etiam uestica oleo calido semiplena pubetenus, atque uesicę partibus, ut ipsę quoque mitigatę conquiescant. Ac si dentes conciderint, ut pręfocationis excitent meatum, immisione digitorum sinistrę compaginem, quam Gręci chalinon uocant, hiscentes dimittemus, ne spumarum emissio tardetur. Tunc per interualla egrotantem inclamantes excitamus, & eius ora spōgia ex aqua calida expressa detergemus, dehinc caput fouemus iugiter. Cum statum sumpserit accessio, plurimo atque dulci oleo calido, & lanis mollioribus infuso omnia contegimus: magis autem occipitium, & maiores neruos, quos tenontas appellant. Tunc gutturi atque rumę partes, quas anthereonas appellant, cum temporibus & buccarum musculis, quos siagonas appellant. Sudores etiam si fuerint, ingruentes raptim detergemus, ne corpora perfrigescant. Tunc collectum humorem detrahimus appositione digiti, aut lanę, aut spongię melotę inuolutę: perseverans enim longioris temporis facit accessionem. Ac si minime resumentem uiderimus, erunt cucurbitę leues apponendę, quas Gręci ficyas appellant, stomacho atque thoraci, & inter scapulis atque pręcordijs. Sed si infans ætas fuerit patientis, erunt maiora prohibenda ob debilitatem uirium. Sed eum nutrix amictu contegens, oleo fouens, conclusu corporis corrigere meditetur. Aut si spumarum quidquam comparuerit, quod in ore teneatur, mulsum tenue destillet paulatim, & neque iugiter, quo commorationem faciat spirandi. Tunc lac offerat dimissione perfecta, siquidem sit crassius, atque maioris nutrimenti. Dehinc, cum forte potuerit, post accessionē mamam sumere: erit melle papilla linienda, quo facilius sumptio fiat, atque neruorum laxatio celebretur. Corpus quoque necessario nutriatur: tenuatur pręterea etiam liquidorum crassitudo, & uenter mollitur: conijcientes etiam singula passioni accidentia, quę ita corrigere debemus, ut à generali regula nihil dissentire uideamur. Tunc etiam curationis diligentiam per nutricem ægrotanti pręstare tentabimus, iubentes & à lauacro abstinendū, atque sine uino atque esu perseverare. Tunc de ambulationibus atque exercitio leui gestari, quo humeros magis exerceant, ut est sphærę ludus, uel exultationis cuiuspiam. Item iubendum cibum sumere succi facilioris, uel interea mulsum. Ac si forte ipsam quoque hac passione uexari uiderimus, erit ab officio remouenda. Non aliter etiam si qualibet passione affecta malo succo atque corpore habituari uideatur: nam hoc Gręci cachexian uocauerunt. Erunt igitur ijs perfectis alię nutrices exhibendę, ex quorum sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem sanum lac, uel communiter nutrices bonę probentur, muliebribus libris, quos Gręci gynecion uocant, docebimus. Interea ipse quoque infans erit à lauacro seruandus. Tunc post tertium diem in domo locandus, & primo oleo calido, tunc oleo & aqua calida fouendus. Vitanda pręterea quorum timore infantes afficiuntur, ut sepe fite formidines. In ætatibus uero quę ferre maiora adiutoria possint, accessione transacta, erit phlebotomia adhibenda. Aliqui enim medici statim phlebotomandos probant, sicut etiam Thessalus se uelle demonstrat. Aliqui prima diatrıto seruandum existimant, quo speculentur utrum post unam accessionem passio soluta recessisse uideatur. Sit pręterea non solum inane, uerumetiam noxiū phlebotomiam adhibere. quippe cum prędicendum probent ex accessione secunda, utrum passio augeatur, & hoc phlebotomię exigat adiutorium, & phlebotomatus cibi refectiōe toleretur. Alij uero discernenter aiunt hoc adiutorij genus adhibendum, ut qui forte iam consueti passione afficiuntur, reseruato ordine lenimentorum, statim accessione facta phlebotomentur. Hi autem qui in prima incurfione passionem accipiunt, in tertium diem, siue ut Gręci uocant, diatrıton differantur, siquidem sit incerta accessionis recursio. Nos uero, ut Soranus docuit, neque omnes intra diatrıton phlebotomamus, & magis eos qui primo incurfu passionis afficiuntur. Plurimi enim ægrotantes corrupto cibo admonentur: & est pręcauendum, indigestione sauciato phlebotomare. Neque rursum omnes in tertium diem probamus reseruandos. Cōgente enim passione, nullo subiecto indigestionis obstaculo, erit arripienda phlebotomię commoditas, nō solum ijs qui iam sepe admoniti passione uidentur, sed etiam in illis qui primo inuasu afficiuntur. Cessante etenim accessione, inesse passionem conijcimus: siquidem generaliter sit maligna, & frequentius tarda quā celer, nisi adiutorijs medicinalibus destructa à corpore depellatur, aut ullo naturę, aut fortunę beneficio: nisi tardando corpus tenuerit, ut solius medicinę diligentiam poscat: iudicare enim est incertum, utrum passio post accessionem primam inesse corpori, an soluta uideatur: siquidem ex occulta ueniat apprehensione causarum. & oportet methodicum sine ulla falsitate regulas intendere curationum. Videmus denique phlebotomię conuenire. Nam passionales coenotetes argui uidebuntur, si, utrum passioni conueniat, fuerit dubitatum. Sed quia sola temporum quęstio flagitari pręspicitur, erit conijcendum ante secundam passionem adhiberi posse phlebotomiam: siquidem initium uehementię atque magnitudinis causa passio transcedat, ut sepe contusio corporis, aut fracturā, uel ignis uisura: stare autem

nec declinare poterit passio : horum enim difficilium morborum proprium est, sine ullo destructiuo adiutorio non celeriter temporum nequitia transire. hoc est accessionis augmentum . Sed neque propter abstinentiā cibi, quam necesse est post phlebotomiam adhibere, erit hoc adiutorium declinandum , quando corporis vires ferre ualuerint : hoc est, ut & sanguinis detractionem , & abstinentiæ tolerant. Denique etiam alijs passionibus affectos: ut, exempli causa , synchricos sine ulla ratione phlebotomamus. Quare, sicut superius diximus , post casum rectos epilepticos , cessante accessione, paruo tempore differimus, quo turbore spiritus, atque liquidarum materiarum deposito tranquilentur. Erit enim speculandum, ne qua indigestio siue corruptio cibi subesse uideatur . Quod ita intelligere poterimus, si nauseantem uel ruentem fumosas exhalationes egrū uiderimus, attestante mordicatione atque tormētis, intestinorumque inflatione : quæ si non fuerint , perfecte digestum iudicabimus : quippe cum forsitan, preoccupato corpore, iam dudum futuræ accessionis causa aut paruum sumpserit cibum, aut in totum abstinerit . Sed si, ut supra dictum est, corruptus extiterit cibum, erit phlebotomia in tertium diem differenda, fouendum caput cum ceteris partibus, his adhibita collutione cum uini abstinentia . Tunc erunt somno dimittendi, atque à cibo seruandi usque ad primum diem . Sed si quidquam corruptionis ex indigestione superare uiderimus, erit per uomitum depurgandum: ac si nulla fuerit corruptionis uel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda phlebotomia moderata detractione, ex brachio scilicet, sed cum præcautione defectus, quæ Græci lipothymian uocant : siquidem facile passionis accessionem imitetur . Tunc post phlebotomiam erit adhibendus potus, atque oris collutio cum paruissimo potu , & somno abstinentus . ac si accessio in secundum diem durauerit , prædicto periculo eius propinquis uel ministris, atque adiutoriorum ex ratione uenientium exitum incertum , ne nobis quidquam male gestū imputetur , si forsitan uel passionis superatus egrotans uitam finierit, & intemporaliter nos quisquam adiutorium adhibuisse arguat, phlebotomiam adhibemus, tanquam in continuationibus paruam indulgentiam pro dimissione accipientes. Ut si, exempli causa, parum requieuisse agitatione seposita egrum uiderimus , ut nullo raptu tentetur : uel contrario , si forte oppressis sensibus motu caruerit, aliquas partes corporis mouere uideatur, ut palpebras , quæ iandudum motus similitudine possesse siluerant. Dehinc post detractionem sanguinis procurata facie, ex spongia calida erit mulsum in os egrotantis distillandum : tunc secunda die dandi mulsi cyathi duo, uel tres: tertia uero die ante horam solitam erit perungendus oleo calido atque dulci, toto corpore sub stramentis. Tunc defectus aqua calida ora foueat , & post æquatam corpus accipiat succum paruam, luculentum, mollem, lenem, calidum, digestibilem, ut est panis, uel alica ex aqua cōfecta , aut pulicula, ex pane, quam torfiniton uocant, ex oleo, aqua, sale, uel melle condita, ex prima diatrīto usque ad declinationis tempus : quod probare poterimus ex minutione accessionum siue accidentium . Alternis diebus cibum summat, ne passione affecta neruositatis etiam illatione cibi graua indigestionis officium sustineat, sed magis laxamentum ex abstinentia consequatur. Tunc, si uenter reuerberetur, uel si suum officium non impleuerit, ob detractionem grauatam quo corpus releuetur, erit iniiciendus calidæ & oleo per clysterem. Tunc, præsentato uentris officio, erit tondendus, atque nouacula omnis capillatura radenda . Ita in alia diatrīto cucurbita occipiti apponenda collo, uertici & temporibus capitis, cum scarificatione, & communibus cataplasmatibus utendum, quibus omne caput cum neruis maioribus, quos tenontas appellant, contegamus. Tunc buccarum musculos, quos siagonas appellant, atque omnes inter scapulas partes cum stomacho, usque ad locum quo discernitur uenter, quem diaphragma uocant, ac deinde præcordia, atque uesicam simili curatione laxamus. Singula etenim passione raptus uexata, accessionis tempore accipimus : ac si aliqua in parte corporis querela extiterit, cucurbita imponenda . Sed neque coaceruatim , neque uno tempore omnes erunt partes curandæ, sed partiliter, atque diuerso, ut nunc stomachus, nunc uesica, nunc inter scapulam releuetur, quo necessario caput relaxatum adquiescat. Tunc spongiæ euaporationibus, qui curationem labori sustinuerunt recuramus : atque ungentes oleo communi, siue, quia iam licitum est, cyprino uel irino. Tunc cerotarijs mollibus, ac deinde scarificatis locis inducta apponimus cerotaria. Conuenit etiam enuasin adhibere, de qua Adiutoriorū libris docuimus. Dabimus cibum plurimum atque panosum . Si aliqua in parte capitis grauedo, uel dolor, aut punctio, aut torpor occurrerit, erunt sanguifuge circulatim apponendæ : quæ, si sufficientem fecerint detractionem, adiutoriorum modum dabunt : sin minus, ijs detractus cucurbitas infigemus, ut per earum uulnera detractio procuretur . Tunc rursum cataplasmatibus utemur, atque uaporationibus spongiarum: dehinc cerotario partes contegimus. Profectu accedente dabimus olera non aciora, atque ita gestationem adhibemus sellarem : etenim uehīculi motus rotarum uertiginem caliginemque facit egrotanti, quæ passionis imaginem ferat. Tunc deambulatione mouendus pro temporis aere , atque loco lucido, & longo ductu, ne iugi conuersione uertiginem sentiat. Dehinc, si ferre ualuerit, etiā uocis atque corporis exercitio utemur: monentes, ut neque spiritum retineat, neque pronus uel circumflexus, aut sæpe conuersus aliquid gerat, sed pingui unctione defricatus stanti exercitio moueatur. Tunc, cum facilitas corporis fuerit accepta, lauacrum adhibemus, caput fouentes sine ullo percussu manibus subterpositis : implet enim sensum eius demersio. Tunc etiam in aqua calida, quæ pygolithon uocant, deponendi sunt egrotantes, ne percussu frigoris neruositatis afficiatur. Post lauacrum uero parum differentes, quo feruor ex capite releuetur, dabimus aquam præbihendam. Tunc cibum uarium, simplicem, media qualitate confectum . Et post primam uel secundam diatrīton dabimus quedam in cibo, quæ uinosæ sint qualitatē, ut sunt poma: quo corpus uinum daturi prætentemus, ut tuto dare possimus . atque ita seruandum, ne ijs gestis somnus suspensus, uel concisus, aut adiuncta phantasia sequatur, & infomnia

& insomnia faciat turbulenta, quod ex relatione patientis discere poterimus. Item si grauedo uel torpor in aliqua parte corporis fuerit, ut dolor, aut punctio, uel saltus, erit in aqua calida perseverandum: atque illa prohibenda, quæ uinosa qualitatē danda præcepimus. Sin uero ex ijs nulla fuerint profecuta, dabimus lauacro remoto mediocriter uinum lene, parum: ut, exempli causa, semunciam uel unciam, medio scilicet cibo, aquatissime temperatum. Tunc in alia diatrīto lauacro uinum iungemus. sed præ cæteris erit animi laxatio procuranda, quo corpus consentiens nullis obstantibus curis facile sanitatis repetat qualitatem. Aci resumptio recurrens, nihil uirium perficere permiserit, quo etiam carnatum corpus ostendat bono attestante colore, erit consuetudini dimittendus ægotans. Eadem sanè curatione utendum etiam in ijs, qui cum nondum sunt epileptici, eò tamen ferri uideantur. Hoc enim solum seruabimus, cum signis ad passionem minantibus fuerint absoluti, eos consuetudini reuocemus: facilius est enim imminuentium auersionem, quàm præsentium depulsionem facere. Sin uero passio tardauerit, & propterea plurimis fuerit accessionibus uariata, erit partienda curatio secundum superpositionem & lenimentum: ita ut superpositionis tempore ijsdem utamur adiutorijs, quibus acutas passiones curari perscripsimus. neque enim phlebotomum reprobamus, permittentibus uiribus: siquidem longo interstitio superpositiones occurrere uideantur. In lenimento uero resumendos dicimus ægotantes, cum re corporatiua curatione dirigendos iuxta cyclorum regula, sicut latius, cum de capitis passione diceremus, scripsimus. Quapropter ob resumendum corpus adhibenda gestatio, sella uel cathedra, aut deambulatio, aut uocis exercitatio. Itē lectio-nem, perunctionem aliptarum præceptis ordinatam, sine ulla capitis inflatione geramus, ne immodico labore affectum corpus uexare potius, quàm reficere uideamur. Tunc lauacrum languorum interuallis adhibendum, uariis dandus cibus, panis limpidus, atque studiose elaboratus. Pulmentum uero ex medice qualitatis materia, ut oua, pulres, olera, quæ non sunt acerrimæ uirtutis. Item uolantum leuiores, & piscium teneriores: dehinc post resumptiui cyclum adhibendi re corporatiui, & primo ex parte, tunc perfecti, in quibus esse uomitus ex radicibus debet, uel similibus materialium rebus, ut nuper docuimus: atque ita drimyphagiā, exinde contiguas sibi pulmentorum materias ordinamus. Item adiutoria localia, ut exempli causa, primo capillos decurramus ex pectore, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam: tunc totam adhibentes, dehinc nouacula caput radentes, & cucurbitas alijs atque alijs partibus re corporatiuas imponamus. Tunc tropacis raptum adhibemus, sed longe primo remotis partibus, tunc uicinis, dehinc patientibus: dantes etiam mastigandum sinapi, uel piper, aut staphysagriam. Item sternutamentum ex helleboro uel astrutio, & pipere, & castoreo, uel ijs similibus adhibemus. Narium quoque apophlegmatismum adijcientes, atque fricatione balnearum natri pulueris, & cæteris sympasmatibus, quæ ruborem facere ualeant, ut sunt ex pyrethro, staphysagria, adarce, euphorbio, pipere, calcis gleba, & pumice. Tunc cataplasma ex sinapi, atque malagmata, quæ detergere & pabulis afficere corpus ualeant. Item acopia acriora, sed quæ tetri odoris non sint, toto corpore illinienda: magis tamen capiti atque ori, conclusis palpebris: quæ immitenda sunt etiam aurium cauernis. Gargarizandum sinapi, adhibenda etiam aquarum illisio, quæ patientes partes percussæ mutari cogantur, quod Græci cataclysmum appellant. Iis deinde perfectis cyclis, resumpto corpore, helleborum adhibemus, sed longe superpositionis seruantes occursum. In omnibus quidem adiutorijs exercitijs adhibendis, tunc magis in helleboro monemus præcauendum. Denique si nullam accessionem denunciauērnt signa, ijs qui ordine seruato admonentur, ante decem uel duo decim dies, uel generaliter, per longitudine lenimenti porrectius erit adiutoriorum regula dirigenda. In ijs uero qui ordinate admonentur, eo tempore adhibenda curatio, quo conijcere possumus medium præteritæ atque futuræ accessionis. Sic igitur hoc genus diligentē intueundum, ut cum æger somnum decusserit, primo requiescat paululum iacens, nō solum suspicans indigestionem cibi, uerumetiam donec persecutione quadam propria corporis fuerit facta digestio, ne ex uigilatione sequenti, atque laxamento membrorum, & tenuitate, uel purgatione spiritus iandudum somno turbati atque crassi fiant: quo etiam sæpe officia impediri noscuntur, cum nondum totum recurrens occupauerit corpus. Vnde sæpe factum est, ut ex perrectis ijs quæ illico intueantur fallantur, nisi perfrictis oculis intenderint. neque clamare uel currere facile possint: siquidem ui quadam somni nunc arteria, hoc est gutturis uia, asperetur, & raucos faciat: nunc fatigata corpora densitate neruorum, irruente spiritu crassiore, afficiat percussione uel quassatione similes plagas ingerendo. Has igitur ob causas æger plurimo tempore, somno deposito, tardare debet, præcauēs lucis auctoritatem: quam, mox discusso somno, intueri minime potest, ne repentino percutiatur uisus. Itē disputationibus uehementibus animum exercere declinet. Tunc resumptus atque releuatus somni plenitudine, sub stramentis leni unctione tangatur semel, uel secundum corporis singulas partes laxamenti mediocris causa, atque frigoris cautione leuem & delectabilem gestationem, ut fertoria sella, uel cathedra. Sed prohibenda erit exclamatio, siquidem uehementer moueat partes patientes. Tunc deposito turbore motus, unctione olei fricetur, conductis & extentis brachijs, flexo atque extento motu releuans singula crura commoueat, quo fortioribus motibus faciat aptiora. Fouenda etiam ora aqua calida: nunc enim erit lauacrum prohibendum, atque ita post perunctionem cibum accipiat paruum, succulentum & leuem, ut oua, pulres piscis teneri, quæque ex uolantibus paruæ ætatis atque formæ, ut ficedulæ, turdi: de cunctis omne quod fuerit acrioris uirtutis, siue inflare ualentis, aut carnosæ, uel grauis. Quapropter etiā à uino erit abstinendus, uel per interualla ab omni cibo seruandus: releuatur enim hoc genere corpus inuitate reflatum. Sin uero aliqua signa accessionis futuræ apparuerint, ut somnus turbatus, uel cibi corruptio, uel iracundia inanis, ac sine ratione, item moestitudo uel sternutamentum, aut aurium tinnitus, uel

prae oculis scintillarum fingibilis uisus, aut inflatio praecordiorum, & per somnum seminis inuoluntarium
 iactus, quem onirogonon uocant, & horum similia: non solum ad uitae regulam transeundum est, uerum
 etiam initium ex abstinentia sumendum. Tunc leuis adhibendus motus, atque perunctio, & cibus, quo ce-
 pus salutaribus officiis non deseratur. Ut enim iisdem ciborum regulis perseverare, tutum non est, sic
 contrario iugis immobilitas, atque cibi abstinentia, uacuato corpore solitis nutrimentis, uires extinguunt
 turis temporibus necessarias. Quaesitum est, utrum contradicentibus signis accessionem fore, an praesentem siue
 esse iudicemus. Sed tunc erit accessio iudicanda, quoties ceciderint in ea aegrotantes: quo discere poterimus
 quo tempore diatrixi tempus sit numerandum, ut recte possint curationes suis reddi temporibus. Nam
 denunciata signa iam praesentia accessionis esse contendit. Nos uero praetangi nervositatem, atque in ac-
 cessionem urgeri, recte probamus, ut augmenti indicia tanquam praescludere uideantur, ut sunt in hemi-
 tritacis febribus frequenter accessione imminente corpora praecipitata, cum noctis anxietate pulsata, die
 fore asperitatem significant. Ita igitur uel simili ratione praemonitus epilepticus, tanquam si accessio eu-
 xaretur, erit usque ad primam diem abstinentus, & neque similiter agendus, ut pridie cum fuisset in leni-
 mento purissimo. Quapropter abstentus una die, sequentibus leui motu, antecedente unctioe, atque
 paruo cibo nutriatur, aquam bibat. Tunc si rectius habuerit, ut laudabilior sanitas appareat, augend-
 oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualitate, nunc quantitate. Tunc nisi ex omni parte signa supe-
 dicta, erit rursus abstinentus una die. Sin uero fuerint expulsa uel depugnata, non erit illico reddend-
 aegrotanti consuetudo, tanquam nihil sit quod sollicitudini remansisse uideatur. Neque rursus inani su-
 spicione, tanquam iam imminetis superpositionis metuentes aduentum, in tenui uitae regula retinere de-
 bemus patientem. ut enim opportunitas adhibita, abstinentiae futuras amputat superpositiones, atque
 earum occasiones detrahit: sic importune adhibita, corpus uexat, atque fatigatione affectum tarde surget.
 facit in solitas uires. Quapropter cum summa cautione, & sine ulla nimietate seruati, blanda regula resu-
 mendi sunt aegrotantes, quo asperatas accessiones fore metuamus. Tutius autem esse probamus, ut super-
 dictum est, longe ante futuram accessionem ad hellebori usum accedere: quo accepto si irruerit accessio
 erunt omnia mitigatiua adhibenda, quae accessionem ualeant temperare. In stridura enim constitutis al-
 tioribus, hoc est stomacho & uentre, mitigatiua laxatione adhibita, etiam medicamini excludendo prae-
 rat uiam, & praefocationis amputat metum. Sin uero post purgationem nullum periculum subierit praefo-
 cationis, causa refecutionis adhibenda resumptio est, cum iis quae ualeant accessionem temperare, ut odo-
 ramenta sine ullo percussu medentia, atque nutritilia, ut est panis calidus, melo, cucumis, & iis similia. De
 stillandis etiam helleborismus, sed ex melle decocto. Ac si initio uomitus ex accessione emerferit, cucur-
 bita multa cum supposita ori uentri infigenda, tunc sequenti parti, secundum quod medicamen ad infe-
 riora teneatur, donec accessio leuigetur temperamentis supradictae rationis, ne concursus passionis & adiu-
 torij praefocet aegrotantem. Erit igitur sustollendus aegrotans subiectione manuum ex utraque alarum par-
 te cum capitis sustentatione, atque leuiter inclinandus. Tunc si medicamen ad superiora cucurrit, &
 transuorationis coeperit partes, quo spiramenta obstruere uideatur, illis dentibus, atque ore clauso, uel
 erumpens per naturales uias, quae ad fauces de capite feruntur, in nares defluerit, ac rursus decurrens gut-
 turis meatum clauserit, praesens praefocatio metuenda. Quapropter immixtis digitis, ex utraque parte buc-
 carum circa maiores dentes oris facienda distantia. Tum imponenda ptygmata multiplicia: quae si forte de-
 fuerint, cuneos ex ferulis scissis mittere poterimus, quod scientes aegrotantem seruemus, atque medicamen
 ad faucium partes ueniens spatio quodam exceptum facilius excludatur. Seruanda etiam tempora, quibus
 medicamen faucibus occurrit, adiuuantes eius exclusionem, in faciem inclinantes aegrotantem, atque eius
 ora calida spongia detergentes: distillantes etiam in os mulsum: sic enim ueluti despumans resumit, aut
 deponit accessionis pressuram releuatus aegrotans. Ac si non sufficiens hellebori fuerit agitatio, quam
 Graeci sparagmon uocant, & paruo euentu successerit perseverante passione, erit etiam secundo uel ter-
 tio hellebori usus adhibendus, sed praesumpto uiribus aegro: quippe cum non iisdem uti omnibus necesse
 sit, & destruendae passionis causa una sola sufficiens & perseverans exhibitio approbetur. Utendum etiam
 aquis naturalibus, hoc est naturali uirtute medentibus: sed quae nulla odoris uexatione adfiant aegrotan-
 tem. Adhibenda igitur natatio, & sole corpus torrendum, quod Graeci heliasin uocant, sed praetexto capi-
 te. Utendum etiam potabilibus medicaminibus, uel electarijs ex hyssopo, & origano, & thymo confectis.
 Principaliter enim corpus mutant recorporationem faciendo ob acrimoniam, dehinc etiam corpus succo-
 rum naturalium tenuant qualitate. Emolliendus nanque uenter, & peregrinatio imperanda terrena at-
 que maritima, si ferre nauigationem potuerint patientes. Tunc etiam exercitia uehementiora, quae la-
 bore corpus afficiant affectanda, quo magis fortitudo quam corporis robur augeatur. Est enim semper
 grauabilis carnatio, & magis si tenuibus fuerit imposita uiribus, & in iis passionibus, quae in neruis esse no-
 scuntur. Vnde neque facile curationis est credendus effectus, quo depulsam passionem iudicemus, nisi legiti-
 ma accessionum tempora soliti concursus sine ulla inquietudine, atque plurima transierint aegrotantes.
 Somnos quoque sine ullo impedimento duxerint, & uigilias placidas, ac liquida sanitate moderatas, nulla
 etiam difficultate officiorum animae uel corporis impeditas, attestante cibi sufficienti appetitu, cum dige-
 stione congrua, & corporis nutrimento mediocri, uel egestionum naturalium moderato exitu, bono atte-
 stante uel immutato colore. Seruanda praeterea multo tempore omnis nimietas ut frigus, infusio, indigestio,
 uinolentia, libido, lauatio, & magis ea quae specialiter passionem in commemorationem ducunt, ut odores
 percussibiles, aut splendor nimis lucis, aut resultantium materiarum. Item strepitus, clamatio, circulatorius
 cursus,

curfus, extentio, aut ex alto despeſtio, ſiue fluminum celerrimus fluor. Vt enim ulcerum recentes cicatri-
ces facili occasione ſoluuntur: non aliter hæc paſſio, uel alia quæque ſimilis nequitia paruo impulſu repe-
tit corpus: quippe quod proxime dimiſſiſſe uidebatur. Ac ſi forte neque ita fuerit æger ab epilepſia libe-
ratus, nihil minus adhibendum, ſed magis perſeuerandum curatione probamus. Dabit enim hæc diligen-
tia uel ex parte beneficium, quo neque frequentius admoneatur egrotans, neque longioribus acceſſioni-
bus opprimatur, neque turpiter in furore, uel publicis in locis apprehenſus etiam poſt paſſionis impetū
animi luſtatione uexetur. quibus enim prima uel optata non proueniunt, erit ſecunda mitigationis cau-
ſa capienda. Hæc eſt ſecundum ordinem methodica epilepticorum curatio. Aliarum uero ſeſtarum
principes uaria rerum temperatione, ſiue experimento curationis adiutoria cumularunt, caput ſouentes
aceto atque oleo roſaceo puro, uel immixto caſtoreo, in acceſſione frigidis utentes. Articulos quoque o-
mnes ligatione coſtringentes, ſternutamento commoto ex aceto, naribus interius flato cum ſinapi uel ca-
ſtoreo oleo irino infuſo cū calchanto, uel ſulphure uiuo, aut aſtrutio incenſo, uel ijs quæ ad matricis præ-
ſocationes incendenda poſuerunt. Item hyſopum & origanum, & thymum, uel ignis flammam oculis of-
ferentes, cum titillatu quodam & oppreſſione præcordiorum ad inferiores partes. Iubent præterea motū
corporis adhibere, geſtationem uel deambulationem, aut ſupra ſindonem uolutari: ſinapiſandas etiam ma-
nus egrotantium atque pedes, & ante acceſſionem perungi thapſia caput, & ſpiritum continere. Alio uero
tempore, hoc eſt dimiſſionis, uini atque carnis imperant abſtinentiam, & magis porcinae uel bubulae, & ca-
prinae. Prohibent præterea ſupra pellem caprinam dormire ſiue iacere egrotantem: ſiquidem paſſionis
faciat motum. Adhibent etiam clyſterem iugem atque acerrime uirtutis, & medicamina diurinalia, quæ
diuretica uocant: atque purgatiua per uentrem, quæ catartica uocant: & horum magis cui nomen eſt hie-
ra: quæ non erunt, inquit, tertio minus ſingulis menſibus offerenda. Tunc capitis diuiſuram accura-
tam, quam chiaſmum, dehinc ſcaroſin uel medicamine, ſiue ignis uſtura. Item terebrationem teſtæ, uel ar-
teriotomiam, uel uſum uenereum, aut è contrario eunuchiſmum faciendum probantes. Dant etiam bibē-
dum lac aſininum, cum ſale uel ſanguine teſtudinis marinae uel humano, aut uituli marini: & non ſolum
ſanguinem, uerum etiam coagula quæ lacti miſcentur. Item mandendam muſtelam, ſed longo deſiccata
tempore: & tunc corda hominum atque equorum, quorum crura quaſi impetigines habent, ſiue aſino-
rum, uel mulorum. Item teſtes uel ueretrum marini ſiue fluminalis cancri, & porcellionis: hoc eſt, anima-
lia quæ humectis & aquoſis locis ſepe naſcuntur, à Græcis appellata onifci: dehinc ſquamulas ferri, cum
aqua in qua fuerit candens ferrum prætinſtum. Dant etiam cameli cerebrum fumo ſiccatum atque conci-
ſum, ſed infantibus uel pueris odorandum: perfectis autem ætatibus bibendum ad modum cyathi cū mul-
ſo & aceto tribus cyathis. Similiter etiam leporis cor, & cerebrum gaudiæ. Alij uero etiam ligamenta pro-
bauerunt, & magos adhibendos, atque eorum incantationes: quæ quantis ſint uexationibus confertæ, etiā
per ſe probantur, ſicut latius Adiutoriorum libris docuimus, nunc tamen paucis memorauimus. Conſtrin-
gens igitur fomentum, atque tetri odoris, uel aceto & oleo roſaceo, & caſtoreo percutit & grauat, & tumo-
res conſtringit: & ſi, ut putant, materiam redarguit, abactum tamen cutibus ad cerebrum, & eius membra-
nas reuocat. & ſunt hæc exteriorum comparatione magis ſalutaria. Præterea eſt uehementer noxiū,
frigidat caput acceſſionis tempore ſouere: quæ enim dimiſſione releuata miteſcunt, eadem frigida denſa-
tione magis grauantur. Item ligationes neruos denſant, atque corporis oppreſſio, quam fieri iubent. De-
ſiccatio intemporalis, hoc eſt acceſſionis tempora geminat paſſiones. Accidentia enim ſi temporaliter qui-
dem uidentur laeſis ſenſibus in reſumptionem uenire, totam tamen paſſionem peiorant, nō aliter quā
ſi quiſquam turbatos oculos manutigio, quod Græci chirapſiam uocant, temporaliter fricando releuare ui-
deatur. Item non aliter ſternutamenta medicaminibus commota acceſſioni non conuenire probamus:
quippe cum neque in linimento paſſionis conſtitutos hoc adiutorio facile inquietare liceat: niſi certo
regulæ ductu præparatos, quo caput releuetur geſtatione tenui, ac deambulatione: ſiquidem hoc adiuto-
rij genus initio impleat caput, dehinc medeatur. Quod ſperandum in ijs, qui acceſſione agitati, earum par-
tium plenitudine uexantur, ſi etiam ſternutamento fuerint conuictiati, cum magis oporteat paſſionis illa-
tam ſoluere turbationē. Eſt præterea acetum moleſtum naribus inſufflare, ſine ſolū, ſiue cū alia qualibet
percuſſibili materia. Conſtringit enim atque denſat tumentia, & turbata perturbat, & ea concurrere
compellit, quæ acceſſionis uiolentia excludi coguntur. Item non aliter mutiles atque ſatiabiles ſunt incē-
ſiones, ſiue ſumigationes & odoramenta ex pice, bitumine, ſpōdilio, caſtoreo, galbano, acerrimæ atque gra-
uabilis uirtutis cauſæ, & iniucundioris: adeo ut etiam recte ualentium impleant caput, & eorum qui nun-
quam, aut difficile earum partium querelam prodiderint. Nunc tamen ijs odoramentis acceptis uertigine
atque grauedine urgeantur, & non aliter tumentes oculos ſumigatio adſiciat, quā etiam tumentes cere-
bri membranas: neceſſario enim cogit in ſimilem uenire paſſionem. Percutit etiam ignis flamma, ſiue
eius affectatus ſplendor multus. Denique etiam in linimento epilepticos conſtitutos, lucis importuni-
tas, atque eminens percuſſio in commemorationem facit acceſſionis uenire. Noxia etiam præcordiorū
preſſura, quam adhibendam probant, iudicatur. Mitiganda enim ſunt acceſſione commota, & non ui-
olenter atque contrario conatu reprimenda. Grauis etiam ſine dubio uidetur ſupra ſindonem iuſſa uolu-
tatio: quippe cum leui conuerſione corpus affectum, non ſolum lenimenti tempore epilepticos in uerti-
ginem mittat, uerum etiam recte ualentes ſimiliter afficere uideatur. Articulorum quoque ſinapiſmus
acceſſionis tempore tumorem geminans, etiam paſſionem neceſſario peiorem facit. Eſt item intempera-
bilis ante acceſſionem punctio ſerulaginis, quam Græci thapſiā uocant, cum oporteat motam paſſionem,

atque in peius coactam mitigare potius,quàm prouocare: & quoties eius necessarius est usus lenimenti tē pore,roties,atque melius suz uirtutis impleat beneficium: cum importune adhibitus, partes faciat emori. Has denique Græci necroses uocant. Item spiritus retentio,quam faciendam probant accessionis initio, sensus implet: non,ut quidam uolunt,percussio spiritu,futuram prohibet accessionem. Premittit etiam potius quàm discutit ea quæ iam suo motu densari uidentur. Abstinentia uero uini atque carnis,quam uigiter fieri iubent,uel unius anni spatio,impedit recorporationes faciundæ profectum,quem augere necessario mutationum uarietas potest. Quod facile ignaris notum fiet ex uitæ consuetudine. quæ,si eadem fuerit,procul dubio corpus infirmat: quippe cum iugis potatio aquæ demissum faciat corpus,& neque numero,dierum,uel mensium curandi regula sit constituenda, sed passionis temporibus,quorum mutatæ regulæ commutantur,ut sub eorum rigore damnum aquæ uel uini ministretur.hoc etiam de carnis usu erit coniiciendum. Caprina uero pellis odoris tetri causa noxia capiti iudicatur,non speciali atque priuata ratione. Item iugis atque acerrima clysteris iniectio intestina contradit,atque neruos uitiat. Urinalia quoque medicamina,quæ diuretica uocant,uesicæ infectione capitis membranas commouent. Item purgatiua medicamina,quæ catartica uocant,defluxionem corporis facient,atque stomachum euertunt, capitis etiam accuratam diuisuram,quam chiasmum uocant,& testæ perforatio, & uisura cutis medicamine uel igne suffesta,quam scaroticam uocant,& arteriotomia patietes partes insumit, & utilibus renititur rebus: siquidem nulla te comparatiua adiutoria iisdem locis adhibere permittat. At uero concubitus,sive Venus quam adhibendam probant, ab aliquibus parua epilepsia nuncupata est: siquidem similem faciat membrorum motum diuerso contractu,anhelatione & sudore attestante,& oculorum conuersione cum rubore uultus: ac deinde post effectum displicere faciat sibi met corpus cum pallore, & quadam debilitate uel mœstitudine. adeo neruos afficere male uideatur,ut sæpe imminente accessione per somnum iactu seminis ægri præpurgentur,quod Græci onirogonon uocauerunt. Item eunuchismus uires amputat, non epilepsiam soluit. Lac quoque sumptum facile acescit, & propterea grauians epilepticos male probatū uidetur. Non aliter etiam potus sanguis testudinis,sive hominis,atque uituli marini,& sumptio coaguli; quod Græci pityan uocant. Mustelæ quoque,sive hominum caro siccata,& equorum impetigines, uel ueretrum,atque testes canis aquarij,uel porcellionis supra memorati, quos oniscos appellant, & aqua de squamulis siue tinctionibus ferri,& cor leporis & cameli, siue gauiz cerebrum male probatur. Etenim neque ex occultis causis, quas Græci ἀόρατοι αἰτίαι uocant, rationes ducunt: neque ex alia contagione siue tentatione, ut empirici uolunt, approbata in usum uenerunt medicinæ. quippe cum intelligi, uel apprehendi naturali aut fortuita rerum dominatione minime possit, uti ijs maxime ita insuetis atque nouis, & odiosis generibus materiarum, quarum nihil usu grauius esse uideatur, ipsius quoque cōparatione passionis, sitque admirandum quod de aere atque uigilijs, uel somno & potu, & cibo, uel ijs quæ necessario sumuntur, nihil experimenti utile collegerint: de ijs uero ita execrandis, & crudelibus, atque inhumanis, plerunque etiam periculosis curationes ordinare uoluerint. Non enim sanguinem tauri potum interficere, ut Themistoclem: lac coagulatum, uel caseum coctum, aut oratorem, & imaginem recte reprobauerunt, si quisquam humanum sanguinem facere minime crediderit, quo falso memorata à ueteribus cetera uideantur. Accusatis igitur, siue nudatis summam ueterum curationibus, non est absurdum etiam cum nominibus errores arguere singulorum. Hippocrates de epilepsia scribens communiter ait: Quisquis in humano corpore agnouerit siccandi uel humectandi, aut frigidandi, uel calefaciendi causas, idem etiam istius passionis poterit uidere rationem: & neque quo modo, neque ex quibus, neque quando uel quousque hæc fieri debeant, tradere curabit. Item Diodes libro quo de passionibus scripsit, in ijs qui ex uinolentia, uel carnali cibo istam passionem conceperint, phlebotomiam probat, antecedentes potius quàm præsententes intuens causas. In ijs uero qui ex corporis habitudine in istam uenerint passionem, humoris crassitudinem probat adhibendam, quem appellauit phlegma. Uritur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica uocant: item deambulatione ac gestatione. Quæ, si etiam uera essent adiutoria, ob paruitatem tamen numeri & magnitudinis suæ, magnæ passioni difficile possent paria pronounciari, aut eius destructioni sufficere. Item libro Curationum phlebotomans utitur medicamine catapotio, quod stomachum euertit, atque post cœnam uomitum facit, exhalationibus implens caput. Potat etiam aceto, sternutamentum commouens prius quàm in somnum ueniant ægrotantes, profecto intemporaliter commouet sensuales uias. Dat etiam absinthium, centaurationem, & lac asininum, & equorum impetigines, uel mulorum, neque tempus adiiciens factis, & odiosis ægrotantes afficiens rebus. Praxagoras uero secundo libro Curationum caput imperat radendum, adhibens fricationes & cataplasma ex aceto sine Venere, dolentibus speciebus etiam sternutamentum commouens, & ieiunium uomitum per singulos dies, utens etiam potio lacte cum mulso atque sale. Item deambulationibus plurimis atque uehementi motu, celebratis & potionibus urinalibus, & cibis uarijs, & agninx carnis, siue hœdinx, atque porcinx & catulorum, dans acetum bibendum atque uinum, & post uomitum sternutamenta & odoramenta probans, spiritus retentionem. Item uisuram atque incisuram partibus, adhibens etiam uentrisque medicamina: & cum accessionem uiderit cōmoueri, deprimat partes quæ fuerint in querela, atque defricat castoreo, & uituli marini ueretro, siue uirilibus hippopotami, aut testudinis sanguine, uel rhombi marini, omnia confundens. non enim initio ratio capitis est adhibenda, nec aceto denudandum corpus, neque diurno uomitu uexandum, siquidem fortitudinem tollant: neque plurimo sternutamento, implet enim sensus: neque urinalibus medicaminibus, siquidem corpus nimium laxent: neque purgatiuis, siquidem non aliter uexent: neque catulorum carnibus,

bus, propter suæ qualitatis horrorem: neque detentione spiritus accessione imminente, tunc enim tempus est requiescendi: neque compressionibus, asperant enim tumores: neque curiosis odoramentis, siquidem caput impleant: neque incisura, ob inutilem dolorem: neque unctionibus, superpositionis enim tempore asperant ob tumorem passionem. In lenimento uero resumendos uexatione doloris fatigant, & usui recorporatiuorum adiutoriorum obfistunt: neque coagulo uituli marini, uel ueretro, aut testibus hippopotami, uel testudinis sanguine, aut rhombi marini. Hæc omnia experta neque ratione, neque regula, sed ratione probantur. Item Asclepiades primo libro Celerum uel acutarum passionum, eos qui corporis ratione afficiuntur solos imperat phlebotomari: non aduertens, quia ex eadem adstrictione generales quæque species epilepsie formantur, sed accessione grauior altera comparabitur. quapropter magis exigit phlebotomiz beneficium. Item phlebotomatos iniici iubet clysteri, uel collyrio, quod balanon appellant, odoribus tetrīs adhibitis, & fumationibus, & naribus aceti insufflati insufflatione, atque uolutatione in sindone præstita. Prohibet sanè carnales cibos & uinum, sed imperat Venenum, quorum accusationem atque improbationem ex ante scriptis accipe poterim. At Serapio primo lib. Curationum multis ex rebus diligentiam curandi confundit. Vngit enim residuum corpus oleo, colla uero aceto cum oleo rosaceo, constrinxit, ut laxatione indigeant. Tunc exercitio adhibito dat mulsum bibendum, ex aceto confectum: ac deinde nihil accipere iubet ægrotantes, sed quiescere. Tunc deambulare circa uesperam, ac rursum conquiescere, & deambulationem repetere. Tunc lauare, & adhibita requie bibere hyssopi decoctionem cum aceto, atque mel in trium heminarum quantitate, tunc cibum sumere, erroribus mille stomachum uexas, ut semel cibo reficiat. Vritur etiam ante unum uel duos dies, si ordine certo accessionis occurrerint, nunc sanguinis detractione, nunc purgatiuis medicaminibus: sed nunc per superiora, aut albo helleboro, nunc per inferiora, aut scamonia, uel nigro helleboro, & ijs similibus perniciosis turbationibus corpus adiciens eo tempore quo requies adhibenda est, ne ulla occasione accepta accessio generetur. Ordinatur præterea quæ specialiter passioni congrua medicamina nuncupauit, ex castoreo & equorum impetiginibus. Sunt autem squamulæ anteriorum crurum sub armorum partibus in ipsis animalibus natæ: has Græci lichenas uocant, siue chelidonas: nos uero, ut supradictum est, impetigines uel hirundines. Dat etiam cameli cerebrum atque fella, & coagulum uituli marini. Item dat medicamen quod ex crocodili terreni stercore confectum probat, & leporis corde, & lumbis, & testudinis marinz sanguine, uel testibus apri, uel arietis, aut galli galinacci. Adhibet etiam odoramenta, & iniectiones clysteris, non minus ab epilepticis in curationibus cadens. Item Heraclides Tarentinus secundo libro Interiorum curationum eadem medicamina conscripsit. Multi quoque uetustiores istam curationem ordinantes uarijs erroribus conciderunt, quos memorare superfluum est: quippe cum eorum uires proditione temporis expirasse uideantur: ex quibus est Menecrates Zeophletensis, item Tryphon, Philotimus, Chrysippus, Demarchus, & horum plurimi. Quod est indubium atque probabile ex conscriptione curationum Apollonij Citienensis secundo libro de epilepticis: item Nicandri tertio libro. Themison uero libro primo tardarum passionum Asclepiadis erroribus. Nondum purgatur ante accessionem phlebotomandus, inquit, si ordo fuerit augmentorum præseruatus: sin uero errans fuerit perspectus, post accessionem imperat phlebotomiam adhibendam. Modum autem detrahendi sanguinis eius approbat mutationem. Quæ sunt uanissimæ inuentiones: sicut libris Specialium adiutoriorum docuimus. Tunc si in brachijs, uel in cruribus, inquit, aliqua querela extiterit, earundem partium uenas diuidendas. Sin minus, interiorem uenam distringendam lino, coniiciens melius esse ex partibus: non patientibus sanguinis coaceruatam facere detractionem: siquidem patientes magis grauentur ob irruentem materiem lapsum, qui detractæ superet modum. Tunc post phlebotomiam deambulatione utitur, & defricatione alienis manibus adhibita, quo corporis motus conquiescat. Dat etiam cibum ex mediz qualitatis materia, & nulla cogente ratione rursum sanguinem detrahit. Sed si ordinem seruauerint accessiones, intra quinque dies secundo uel tertio detractionem facit. De alijs quoque multis atque omnibus corporis partibus, & talis & brachijs, nil metuens defectionem, sanguinem detrahit. In lenimento uero, ut exempli causa XXX dierum, post accessionem helleboro utitur, post quatuor uel quinque dies. Tunc sequenti initiet, atque alia die adhibet lauacrum, & tribus uel quatuor diebus cæteris curibus cyclum complet, ac deinde rursum adhibet helleborum post accessionem tractam, uel certe radicem adhibet phlebotomum dissecans corpus: quod erat melius ordinare ante usum hellebori, quo leuiora maioribus præponerentur: quippe in recorporatiuis curationibus. Adhibet præterea clysterem, qui uires detrahat ægrotantis, & propterea sequi non debuerit. Supra dicta utitur etiam localibus adiutorijs, & quidem multis pro differetia, & quibusdam falsissimis, ut est sub occipitio accurata diuisura, quam chiasmum uocari diximus: & ferro circumscripta in capite cutis uestura, qua testa squamulis despumatur. Itæ medium testæ, quod Græci bregma appellant, terebri perforatione, & in accessione constrictione articularum, & odoribus tetrīs atque male olentibus, ex pice, atque ex spondilio castoreo, galbano, sinapi cum aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus refellenda.

De furore siue infamia, quam Græci Maniam uocant. Cap. V.

PLATO in Phædro duplicem furorem dixit: unum fieri mentis intentione, ex corporis causa uel origine: alterum diuinum siue immisum, eiusque Apollinem inspiratorem esse, atque nunc uocari diuinationem: ab antiquis uero appellatum furorem. Magna Græcorum uetustas maniam appellabat,

quæ nunc mantice dicta est. Item alium, inquit, ex Libero fieri patre: alium ex amore, & appellauit eroti-
con: alium ex Musis, quem appellauit protrepticon, quod carmen instruere uideatur. Item Stoici dupli-
cem furorem dixerunt: sed alium insipientiæ genus, quo omnem imprudentem insanire probant: alium
ex alienatione mentis, & corporis compassione. Item Empedoclem sequentes alium dicunt ex animi
purgamento fieri: alium alienatione mentis, ex corporis causa, siue iniquitate: de quo nunc scripturi sumus.
Quem Græci, siquidem magnam faciat anxietatem, quam appellant manian. uel quod animum siue men-
tem ultra modum laxet: manon enim dimissum siue mollem appellant. uel certe quod polluat ægro-
tantes: nam pollui Græci lymænin uocant. uel certe quod desertam, siue solitudinem cupientes faciat æ-
grotos: nam Græci desitui, atque solitudinem petere, monusthæ dicunt. uel quod perseverantius cor-
pus teneat, & difficile pellatur, & ob id Græci ueluti moniam dixerunt. uel certe quod duos atque per-
ferentes faciat ægrotantes, quod Græci hypometicos uocant. Est autem alienatio tardans in febribus,
quo à phreneticis discernitur. Siquidem neque celer, neque cum febricula esse uideatur. . . . Vel si quis-
quam furiosus febricitauerit, discernatur à phrenetico temporis consideratione: nam præcedit in furiosis
furor sequenti febricula, & non ita paruo pulsu afficiuntur, quæ utraque necessario phreneticos sequen-
tur. Generatur autem frequentius in iuuenibus, ac medijs ætatibus, difficile in senibus, atque difficilius
in pueris, uel mulieribus: & nunc repente inuadens, nunc paulatim increscens: & nunc ex occultis, nunc
ex manifestis causis, ut est uisio, perfrictio, indigestio, uinolentia frequens atque immodica, quam Græci
crepalen uocant. item uigiliæ iuges, & amor, uel iracundia, aut mœstitudo, uel timor, uel superstitio nimia.
Item concussio, siue percussio, & intentio nimia sensuum & intellectus ob cupiditatem disciplinarum, uel
questum pecuniam, aut gloriam. item pota medicamina, uel magis ea quæ amorem facere uideantur, à
Græcis philtropota appellata. item detractio hæmorrhoidarum ueterum, siue uaricum, aut abstinencia in
fœminis solitæ purgationis. Sequentur autem eos qui non repente hac passione afficiuntur, priusquam
morbus enitescat, ea quæ etiam epilepticos futuros afficiunt, & apoplectos. Signa denique ex ante dictis
sumenda memorauimus: sed hæc quidam discernunt, ut communibus propria iungentes: graues etenim, in-
quiunt, somni magis epilepsiam fore significant: atque è contrario leues atque parui, furorem. Sic etiam
in iracundia constitutos capitis implemento affici atque estimare se in furorem deuenisse, & rursus silen-
tio opprimi ex inani timore. item mœstitudo, uel animi anxietas, & iactatio, uel plurima ciborum appe-
tentia, & oculorum frequens palpebratio, cordis saltus, & somni cum timore terribili uel turbato effecti.
item uentris extantia, & frequens descensus uenti per podicem, pulsus paruus atque creberr, & uehemens:
etenim in epilepsiam decliues ac pronos maior atque rarus pulsus sequetur & imbecillus. Intuendam
etiam, inquiunt, qualitatem aduenientium morborum: sæpe enim quadam contagione ingeruntur, quæ
uniuersa secundum nos non tutissima atque certam faciunt discretionem supradictarum passionum: et-
enim futuris epilepticis, uel in passionem pronis uigiliæ irruunt, & anxietates, & cetera. Item in aduen-
titijs morbis aliqua ex ijs eueniunt, necessario omnia, uel certe aliqua quæ non enumerauerint signa.
Emergente enim siue prodita passione, alienatio mentis fiet sine febribus, & quibusdam uehementibus, qui-
busdam leuis, & alijs alia specie atque uisu differens, uirtute tamen atque genere uno confecta: nam furor
nunc iracundia, nunc hilaritate, nunc mœstitudine, siue uanitate occupat mentem: nunc timore commi-
nante inanum rerum, sicut quidam memorauerunt, ut nunc speluncas timeant, nunc lacunas, ne in eas de-
concidant, uel alia quæ terrori esse possunt. Item esse furorem cum quadam uaticinatione ueteres pos-
fuerunt. Demetrius etiam parui temporis mentis extensionem furorem appellat. Item turbine re-
pentino expauescentes atque percussos quosdam, ut etiam obliuione prægestorum afficiantur. Sic de-
nique Artemidorum grammaticum Apollonius memorat nitente gressu crocodilum in harena iacentem
expauisse, atque eius motu percussa mente, credidisse sibi sinistrum crus atque manum à serpente comestâ,
& literarum memoria caruisse obliuione possessum. Item melancholiam inquit speciem furoris esse nun-
cupandam: nos uero ipsam quoque discernimus à furore. Est autem infania siue furor nunc iugis, nunc
temporis interiecti requie leuigatus, efficiens ut egi nunc non meminerint sui laboris, nunc obliuionem
nesciant suam, & nunc omnium sensuum alienatione uexentur falsitate possessi, nec aliarum specierum
errore fallantur. Sic denique furens alius se passerem existimauit, alius gallum gallinaceum, alius fictilem
alius laterem, alius deum, alius oratorem, alius tragœdum uel comœdum, alius stipulam ferens mundi se esse
sum tenere, alius se sustentandum manu poscebat, uagiens ut infans. Horum plurimis accessionis tem-
pore oculi sanguinolenti fiunt atque attenti. Accidunt etiam uigiliæ iuges, uenarum extensio, genarum
rubor, corporis durities, atque aliena fortitudo. Patitur autem omnis neruositas, ut ex ijs quæ sequun-
tur uel accidunt conijcere poterimus, magis tamen caput: etenim antecedentes plurimæ querele eius par-
tis existunt, cum grauedine atque dolore afficiuntur, singulis quoque sensibus patientibus, quos in capi-
te nouimus constitutos: & præterea passio magna atque tardissima superpositionibus ac lenimentis ua-
riata, ex constrictione confecta: etenim ijs, qui Mnaseam sectantes alium putant, adquiescendum non est,
suspicientibus eum furorem, qui hilaritate affecterit ægrotantes, solutionis appellandum. Falluntur et-
enim nominis uoce: siquidem Græci diachysin animi laxationem dixerunt, siue diffusionem, cum hoc ani-
mi, non corporis ostendat qualitatem: nam quod omnis furens strictura afficiatur, manifestum atque pro-
babile est ex oculis sanguinolentis, qui inlato constitutam stricturam denunciant. Item quod ipsos oculos
atque uenas in uultu extantiores habeat, totius corporis attestante durities, cum fortitudine præter na-
turam adueniente obstricturæ consensum: denique lenimenti tempore fatigatos se sentiunt ægrotantes.

Est

Est item coniectura facienda ex ijs quæ mentis alienationem præcedunt, ut capitis grauedo, uel dolor, & tardus membrorum motus, spinæ uel scapularum, uentris inflatio. Peccant denique etiam ij qui animæ passionem principaliter, dehinc corporis esse concipiunt, cum neque quisquam philosophorum eius tradiderit curationem, & antequam mente falluntur accidentia substantia corporis habere uideatur. Hæc sunt quæ ad apprehendendum uel discernendum morbum methodus ordinauit. Curationem uero similem epilepticis accipimus adhibendam. Etenim principio conuenit iacere loco mediocriter lucido atque calido, & nullo turbore pulsato: nulla quoque picturæ distinctione, neque fenestris humilibus luminato, neque in superioribus potius quàm in solo: plerique enim furore correpti sese præcipites dederunt. Est etiam lectus firmissime, atque auersus ingressum cubiculi locandus, quo ingredienti minime uideant ægrotantes, ne uultus uarietate lacerati furoris augeant uanitatem. Stramina præterea mollia sunt approbanda cum defricatione ac retetione articularum, blando scilicet tactu: & si qua pars corporis saltu fuerit agitata, tepidis uaporationibus erit mitiganda, appositis lanis mollibus ac limpidis, atque capiti, collo, & thoraci circulatim. Fotus quoque adhibendus olei calidi, admixto aliquando mitigatiuæ uirtutis causa scenigræci liquore, & eius decoctione confectio, sed minime pingui, uel certe hibisci infusione aut lini seminis: tunc oris collutio, atque potus ex aqua calida. Erunt præterea multorum ingressus prohibendi, & maxime ignotorum. Mandandum quoque ministris, ut eorum errores quodam consensu accipientes corripiant, ne aut oibus consentiendo augeant furem, eorum uisa confirmantes, aut rursus repugnando alperent passionis augmentum: sed induciue nunc indulgeant consentientes, nunc insinuanda corrigant uana, recta demonstrantes. Ac si exilire cœperint, ut difficile teneantur, uel solitudine potius exasperantur, oportebit plurimis uti ministris, & præcipere ægros latet retineri, ad articularum fricationem, quo minime prouocentur: si etiam uisu hominum fuerint commoti, erit adhibenda ligatio sine ulla quassatione, prætectis articulis ex lana. Tunc fasciola ligatur, ac si quidquam timere uel reuereri consueuerint, non erit itidem frequenter inducendum: continuatio enim contemptibilitatem parit: uel cum causæ coegerint, uel adiutorio adhibendo non succubuerint ægrotantes, tunc erit necessario inducendum, quo ægri terrore uel reuerentia opprimantur. Ac si etiam lucem animo contraria commouentem uiderimus, erunt eorum oculi adumbrandi, quo cæterum corpus luce tangatur. Adhibenda cibi abstinentia usque ad primam diatripton, ac permittentibus uiribus phlebotomia, si passio coegerit intra diatripton, & si ulla obliterit causa detractionis congruè faciendæ aliquoties adhibita detractione modus implendus. Si horum nihil obliterit, in ipsa diatripton erit phlebotomia adhibenda, tunc perunctio: ora fouenda, dandus cibus leuis, paruus, digestibilis, ut panis ex aqua calida, uel alica ex melle leuiter decocto confecta, uel forbile quidquam, aut tenerum. Exinde usque ad passionis declinationem alternis diebus æger nutriendus, si uires eius permiserint. Proluendus denique etiam clystere simplici, si passio poposcerit. Tunc etiam præcordia cataplasmatibus relaxanda, ob digestionis qualitatem, quo nulla contractio spiritum abstentum capiti transmittat. Attendendæ etiam species alienationis, cuius accidentia contrariorum coniectura erunt mitiganda, ut eum hilaritate relaxent, nunciantes quidquam quod animum resoluat. Dehinc cum status passionis apparuerit, det oculo capite atque naso, cucurbitâ infigimus, adiuncta scarificatione, & primo ex præcordijs, tunc inter scapulas, quas Græci metaphrenum uocant: consentiunt enim facilius istis superiora. Dehinc etiâ occipitio ac uertici, & temporibus capitis. ac si uultus uel ora fuerint affecta plurimū, totū corpus erit sanguisugis releuandum, quas hirudines appellamus. Tunc cataplasmadum ex pani cæteri laxatiuæ uirtutis: dehinc spōgijs uaporandum: & si passio iisdem permanserit, secundo uel tertio iisdem perseverabimus, adiutorijs. si uigiliæ fuerint cōsecutæ, adhibenda gestatio primo ex lectulo pēdenti, tunc ēt fertoria sella. Adhibenda etiam aquæ destillatio crebra, cuius sonitu sæpe ægrotantes inducunt somnos capiūt. Tunc etiam spongijs calidis oculi uaporandi, atque palpebrarum duritia relaxanda, quo etiam per oculos usque ad cerebri mēbranas beneficiū pueniat, curatione: ac si passio declinauerit, & propterea mini me uigilare, atque alienari cœperint ægrotantes, dabimus uariū cibum ex mediæ materiæ qualitate. Tunc si doloris sensum ægrotantes acceperint, adhibenda embasis ex oleo, uel admixto aliquāto liquore, quo fuerit hibiscus præcocta. Tunc capiti atque scarificatis locis cerotaria apponēda, & ex eis liquefactū corpus omne perungendum miti defricatione. Tunc acopis atque inalagmatibus ueterū, q̄ nulla nimietate percutiāt, motum quoque gestationis adhibentes: & primo gestatoria sella, tunc uehiculo manibus actō, atque toto fortificato corpore erunt in deambulationē cogendi: & uocis exercitium quod cuique conuenerit: nam literalis etiā lectio: adhibenda est, & quæ sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem exerceant ægrotantes. Quapropter interrogationibus quoque erunt fatigandi, ut nunc mendacij causa, nunc promēdi quod quærimus exerceri uideatur. Tūc sibi dimittēdi, data lectione quæ nō sit intellectu difficilis, ne plurimo labore uixēt: hæc enim, si supra uires fuerint, nō minus afficiunt q̄ corporis immodicæ gestationes. Item post lectionem aliqua cōposita uel mimica sunt offerenda, si molestitudine furentes laborent, aut rursus tristitiā uel tragicum timorē habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. Oportet enim cōtrarietate quadā alienationis corrigere qualitatem, quo animi quoque habitus sanitatis mediocritatem agnoscat. Tunc proficiēte curatione erunt pro possibilitate meditationes adhibendæ, uel disputationes: sed nunc quoque similiter ordinatæ, ut principia leui uoce promātur: narratio uero & demonstratio extēta atque maiore: tūc epilogus dimissa & indulgenti, sicut ij qui de exercenda uoce, quā Græci anaphonesin uocāt, tradiderūt. Adhibēdi denique auditores sunt ægrotantibus, q̄ fauore quodā atque laude dicta, psequētes dicētis aīum laxent: etenim iucūda exercitiā cōpōsita corporis adiuuāt sanitatē. Tunc post meditationē uel disputationē deducēdus: mox est, atque perungēdus leuiter ægrotās, & deambulatione leui mōuēdus: ei aut qui literas

nesciat immittēde quæstiones erunt, quæ sint eius artis propriæ, ut rustico rusticationis, gubernatori nauigationis: ac si ex omni parte iners fuerit curandus, erunt uulgaria quædam quæstionibus tradenda, uel calculorum ludus: habet enim quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior ægrotati colludat. Tunc post requiem adhibita deambulatione erunt diligentius perungendi: & primo parua atque simplici defricatione mulcendi: dehinc profectu apparente etiam deuexo ductu post humeros atque colla defricatione potiore, & leui deductione, quam Græci catapasmōn uocant: ultimo fricandum etiam caput, quod fuerit releuatum, lauacrum erit adhibendum: & sicut de epilepticis dictum est, uarius dandus cibus inhibito uino. Tunc addendum quidquam pomorum, quo corpus prætentemus: dehinc uinum dandum tenue, leue atque paruum medio cibi tempore: & primo inter quinque dies, tunc inter quatuor, dehinc inter tres atque duos: item alternis diebus: ita quotidie interiecta uel uariata aquæ potatione eodem cōtrario ductu quo uinum uariabamus. Tunc cum nulla cœperit æger nouitate seruari, & perferre singula didicerit, erunt addendæ aeris mutationes. Et si quidem philosophorum disputationes audire uoluerint, erunt adhibendæ: etenim timorem, uel mœstitudinem, aut iracundiam suis amputant dictis, ex quibus nō paruus profectus corpori commodatur. ac, si passio permanserit, & corpus tarditate possederit, superpositionibus ac lenimentis uarianda erunt: & superpositiones mitigandæ eisdem adiutorijs, quæ initio furentibus sunt ordinata. In lenimento uero prius adhibendus resumptiuus cyclus per uariam gestationem, atque uocis exercitium musico monitore compositum. Tunc deambulatio atque gestatio, & cibus uarius, & ijs similia: secundo recorporatiuus, sicut superius docuimus. Utendum etiam localibus adiutorijs, hoc est cucurbitis recorporatiuis, & rasiōe capillorum: item sternutamento, & dropace communi, atque composito ex nitro, galbano, māna, pyrethro, euphorbio & pipere: tunc paroptesi atque catadysmo, & aspergine pulueris nitrei. Torrendum etiam corpus feruore solis, prætesto capite: dehinc sinapismo & exercitio uario ac uehementi. Sed hæc omnia cum adhibentur etiam localibus adiutorijs prius erunt prætangendæ ac renouandæ, longe remouendæ à patientibus partibus. Tunc secundæ ac uicinæ, dehinc ipsæ: etenim quoties longe remota præmouentur, transmissa commoditas sine partium curandarum commotione latenter aduenit, & nullam facit capitis inflationem. Dehinc adhibendus uomitus ex albo helleboro radicibus inserto: & magis, si quisquam ex radice pura noluerit digitis uomitum prouocare: fit enim ut inserto helleboro sponte uomitus nascatur. Tunc etiam ipsum helleborum dabimus: & si oportuerit, non semel, sed sæpius per interualla temporum. Item aurium cauernis iniicere debemus aquam nitro aspersam, uel mullum cum semine urticæ, uel sinapi liquido, quo etiam per sensuales uias ad membranas cerebri recorporatiua uirtus adueniat: quippe cum etiam aurium tinnitus sæpissime ægrotantes afficiat. Dehinc erunt rursus resumendi aliptarum diligentia. Utendum quoque naturalibus aquis, ut sunt nitrosæ, & magis si odoris non fuerint tetri, quo membranæ capitis quatiātur. Utendum etiam peregrinatione terrena atque maritima, & animi auocamentis, quibus mentis laxatio fiat. Erit etiam coniiciendum, ex mœstitudine quantum permaneat passionis, quanquam soluta uideatur, non aliter quàm si terebratis oculis, quod Græci paracentesis uocant, ob tardam suffusionem quam sit perfecta curatio, uisus impedimenta perseuerant, quæ quadam consuetudine potius, quàm passionis præsentia fieri uidebantur. Solutam uero uel conuictam passionem intelligere poterimus ex ijs quæ de epileptica curatione memorantes docuimus. Hæc est secundum methodum furioforum, siue insanorum curatio. Aliarum sectarum ueterum methodicorum plurimi, obscuris in locis habendos inquirunt ægrotantes, neque accidentia passionis coniicientes: siquidem sæpe quidam obscuritatem odisse uideantur, neque ipsam passionem, quod sit ex strictura effecta. etenim densata corpora aeris obscuritas minime reflari permittit: abstinentis denique naturalibus officijs impletum caput magis grauatur. Adhibendam etiam immodicam abstinentiam, quam Græci lzmanchiam uocant: non aduertentes, quia immoderata cibi abstinentia uires corporis uexat, & ægrotantem naturali fortitudine desertum adiutoria ferre non patitur. Perdit etiam cibandi tempora, ex quo densata corpora sæpe laxantur. Non enim uere admittenda aut credenda sunt ea quæ suspicantur, quibus ipsi insanire potius, quàm curare uideantur: aiunt enim ferarum similitudinem intuentiam, quæ deductione cibi, posita ferocitate mansuescunt: non aliter etiam furētes posse iugi abstinentia mitigari: quippe cum inter sanos homines facile sapere ieiuni uideantur: post cibum uero affici hilaritate facilius, aut furore. Tubent præterea uinculis ægrotantes coerceri, sine ulla discretionē: cum necessario deuinctæ partes quatiātur, & facilius ægros ministrantium manibus, quàm inertibus uinculis retinere. Cupiunt etiam certis medicaminibus somnos altos efficere, papauere fouentes, & pressuram potius atque grauationem capitis, non somnum ingerentes fouent. Etiam oleo rosaceo aceto admixto, serpillio & castoreo, & cæteris simillimæ uirtutis caput obsidunt, constringentes ea quæ laxatione indigeant. Item alij frigidis usi sunt rebus, passionis causam ex feruore uenire suspicantes, ut Aristoteles & Diodes: nescij, quoniam feruor innatus sine dubio tumoris est signum, & non, ut existimant, passionis est causa: quare peiorare necesse est, & maiorem furorem fieri, cum frigida curatione corpora densantur. Alij uero phlebotomiam adhibendam probant ex duobus brachijs usque ad animæ defectionem, ut sæpe faciant mori cupientes: etenim defectio, aut uirium amputatio sequuntur immodicam sanguinis detractionem, quam non oportebit ex utroque brachio fieri. Dicunt præterea usum esse clysteris addendum, ex acerrimæ uirtutis liquoribus iniectione frequenti. Ex quibus nihil utile, sed potius dysenteria sequatur: dantes etiam urinalia atque nentisflua medicamina potanda, quæ diuretica uel cœliotica Græci uocauerunt. Auertendam etenim è superioribus ad inferiora materiam dicunt, ex quibus corpora tabescunt, neruofitas uitatur. Item alij inebriantur

dos aiunt ægrotantes, cum sæpe ex uinolentia furor atque infania generetur. Alij flagellis aiunt coercendos, ut quasi iudicio mentis pulso respiciant, cum magis tumentia cæde læcessendo faciant a superiora, & adueniente lenimento passionis cum sensum recipiunt plagarum dolore uexentur. Vel certe sic ut ratio possit uicinis magis ac patientibus locis adiutoria sunt adhibenda: coguntur ergo ut ori uel capiti plagas imponant. Vtuntur etiã decantationibus tibiarum uaria modulatione: quarum alterã phrygiam uocant, quæ sit iucunda atque excitabilis eorum, qui ex mœstitudine in furore noscuntur: aliam duram, uel quæ occupata mente pudorem suadeat, iniecto rigore, ut in bello, quam dorion appellant: in ijs qui risu, uel puerilibus cachinnis afficiuntur, cum cantilenæ sonus caput impleat, ut etiam recte ualentibus apertissime uideatur: uel certe, ut plerique memorant, accendat aliquos in furore, quo sæpe uaticinãtes Deum accepisse uideantur. Alij uero amorem furentibus aiunt procurandum, quo mentis intentio conuersa furoris asperitate purgetur, non intuentes nudissimam ueritatẽ, quod plerisque furoris amor fuerit causa. Sic denique alius amore Proserpinæ petit inferna, & sibi licitas aliene ac diuæ coniugis credidit nuptias: alius nymphæ ob desiderium Amphitritis sese deditum mari proiecit. Ferunt Græcorum commenta loquacia & hiereproliis foeminam humanis exercitatum fatis, & sæuo poenitudinis dolore commotam, sua manu suos extinxisse successus: Neque aspernandos ceteros accipiamus, qui ipsum quoque amorem generaliter furorem uocauerunt, ob similitudinem accidentium, quibus ægrotantes afficiuntur: & est impium atque absurdũ passioni adiutoriorũ in id ipsum probare quod curas: omitto quod sit impossibile, amorem furentibus persuadere: siquidem iudicio carentes pulchritudinem probare non possunt: nam sæpe homines feras existimant, uel ea quæ uiderint, fingendo præsentia putant. Dehinc etiam si amor fuerit acquisitus, quid magis probemus erit incertum, utrum ne prohibendus sit usus ueneris, an admittendus. Sed prohibitus indignari magis cogit ægrotantes, cum desiderata producuntur: item permissus uexat, cum corpore eurato animæ quoque substantia turbatur. Item alij arteriotomian probauerunt, inutiles uexatione caput afficientes. Iis igitur omnibus experimentis inanibus conferta est furiosorũ curatio: quæ ne falsa putentur, erunt denunciandæ personæ, atque librorum nomina designanda. Asclepiades autem secundo libro adhibendam præcepit cantilenam. Quo etiam eius discipulus Titus adductus, secundo libro de animæ memorat flagellandos. Sed idem etiam officijs solitis amoueri iubet ægrotantes, & uinculis constringi, & abstinentia ciborum nimia coerceri, & siti affici, tunc uino corrumpi, uel in amorem induci, cætera primo libro tardarum passionum supradicta compleuit. Item Themison phlebotomos constrictius curat fomentis, qui se sua lege tenere non potuit: adhibens etiam lauacrum, atque uinum plurimum, & amorem suadens adiuncta ciborum copia: alijs quoque incongruis utens rebus, quæ magis Asclepiadi, quàm Themisoni sunt adscribenda: nondum enim sese eius liberauerat secta, sic hæc ordinasse perspicitur.

De Melancholia. Cap. V.

MELANCHOLIA dicta, quod nigra fella ægrotantibus sæpe per uomitũ ueniant: Græci enim nigrum melan uocauerunt, sel autem cholen appellant: & non, ut plerique existimant, quod passionis causa uel generatio nigra sit fella: hoc enim est æstimarium magis quàm uidentium ueritatẽ, uel potius falsum, sicut in alijs ostendimus: nam Tullius atram bilem dixit, ueluti altam iracundiam. Item Vergilius, Hercule alta iracundia moto, Hic uero, inquit, Alcide furis exarserat atro Felle dolor. Siquidem melancholici semper tristes, ac nulla penè hilaritate laxati esse uideantur: Frequenter autem in masculis magis, & medijs ætatibus: difficile uero in foeminis, uel alijs ætatibus: sed eius antecedentes causæ sunt hæc, indigestio, iugis uomitus, post cibum medicamina pota, acres cibi, mœstitudo, timor, & cetera quæ etiã ualent sufficere. Sequuntur autem in ipsam pronos uel uenturos ea quæ etiam insanos fore demunciant. Eos uero, qui iam passione possessi sunt, animi anxietas atque difficultas tenet, attestante mœstitudine cū silentio & odio conuiuientium. Sequitur etiam nunc uiuendi, nunc moriendi cupido, cum suspicionibus uelut insidiarum sibi paratarum. item inanes fletus, atque murmura uacua, & rursum hilaritas, magis post cibum cum inflatione præcordiorum, & articulorum frigore, & leui sudore, atque stomachi mordicatione, uel oris uentris usque ad interscapulas, quas Græci metaphrenum uocauerunt. item capitis grauedo, color utridis cum nigrore, aut subliuidus, corporis tenuitas, uirium debilitas, & accepti cibi corruptio cum rusticationibus odoris tetri, hoc est fumosi, uel bromosi, uel piscosi. item intestinorum tormenta, uomitus, tunc inanis, nunc fellofus, uel ferrugineus, aut niger, & eiusdem qualitatis per podicem egestio. In lenimẽto uero eorum mitigatio, uel multorum depurgatio. Sed hanc passionem furoris speciem alij plurimi, atque Themisonis sectatores uocauerunt. Differt autem, siquidem ista principaliter stomachus patiatur, in furiosis uero caput. Et est communiter stricturæ passio magna: aliquando etiam complexa, ob plurimas egestionẽs. Præterea est ex numero tardarum passionum, quas Græci chronias appellant. Curatio autem adhibenda est, quam furiosis ordinauimus: non enim phlebotomiam reprobendam attestante dolore, aut hellebori purgationem attestante passione approbamus: sed exterius localia adiutoria, atque mitigatiua, siue corporatiua magis ori uentris, atque inter scapulas sunt adhibenda. Ac si forte aut uomitus immodicus, aut egestio uentris coegerit, constrictiua sunt cataplasmata apponenda uentri atque stomacho; ut ex palmulis thebaicis infusus uino uel posca admixtis etiam malis punicis, uel cydonijs, & œnanthe, & alumine scisso, aut hypocistide, uel acacia, siue galla, & ijs similibus. Dandi etiã cibi constrictiui, atque apponendæ eius uirtutis cucurbitæ. Alia uero medicarum sectarum præfectis relinquamus, & ijs qui de furiosis scripserunt. Adhibent etiã bibenda medicamina, hoc est, aloen & absinthium iugiter, quæ propter uim suã, quã habent plurimã, excludenda probamus: quippe cum sit possibile ex consuetis perficere sanitatẽ.

Aloes & absinthij



IN SENIBVS atque hiemis tempore frequentat hęc passio: difficile autem in calidis ætatibus; sed generatur nunc ex occultis, nunc ex manifestis antecedentibus causis, ut quassatione, uulneratione, uel alia qualibet passione: item frigore profundo, uinolentia, indigestione, luxuria, atque libidine frequenti, extenta: item medicamentibus potis. Sed est uel fiet paralyfis nunc sensus, nunc motus, nunc utriusque. Et intelligitur sensus paralyfis, quoties seruens atque frigidum non sentiunt ægrotantes manifeste partium naturalium motu: motus autem, quoties seruens atque frigidum sentiunt motu partium carentes: utriusque uero paralyfin etiam accipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item hęc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius corporis cum apprehensione mentis, quam apoplexiam uocantes, acutarum passionum libris tradidimus. Sed plurimis species duæ paralyseos uisæ sunt: alia conductione effecta: alia extensione. Sequuntur autem pronos & decliues in passionem, hoc est, qui non repente fuerint percussi, si totum corpus passurum denunciatur, ea quæ epilepsiam uel furorem denunciant. Si uero ex parte, grauedo partis passuræ sequetur, ut tardus motus cum stupore & pallore, & torpedio cum sensuum debilitate, quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedentia intelliguntur, ac rursus recurrentia: dehinc effecta passione torpor atque stupor gelidus partium fiet plurimus, & paruus: & nunc uoluntario motu cessante, nunc ex parte manente, & nunc sensu amisso, nunc paruo remanente, nunc etiam dolore attestante, obscurato pulsu, & per profectum cessante pallore, & tenuatione partis uitiatur, nutrimento cessante, quod Græci atrophian uocant. Sequentem etiam rugationem cum adductione partium, uel extensione. Aliqui præterea paralipsin uocauerunt eam, quæ ex omni parte naturalem motum abstulerit: paralyfin eam, quæ ex plurima parte uitiauerit motum. Quibus minime consentire, maiorum auctoritas iubet. non enim passionum differentiam ostendunt, sed magnitudinem generaliter passionis, ut sunt quædam partes duobus uel plurimis officiis aptatæ, quæ nunc omnium, nunc certorum amputatione uexantur. Lingua etenim transuorationis officium sustinens uerba distinguere non ualebit. Hęc sunt communes paralyseos significationes: sed ob singularem partium atque particularum, quas supra diximus, communiter apprehensionem, specialiter locorum impedimenta tractabimus. Supercilium igitur paralyfi uitiatum laxius propendebit circa superius palpebrum, uel certe sustollitur, ut etiam ipsum suspendat. Item palpebrum superius paralyfi uitiatum laxius fiet, atque motu caret, & oculi pupillam contegit, uel è contrario extensum sustollitur, & oculorum pupillam nudat. Item interius palpebrum paralyfi uitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in semet uel exterius refunditur, & motu caret, atque oculum non contegit. Sequitur etiam inuoluntarius lacrymarum fluor, quod est utrique palpebrorum uitio commune: & si in risum uenerint ægrotantes, contortum uel conductum simulant uultum. Oculorum uero tunice, siue membrana paralyfi uitiata uisum impediunt latitudine facta pupillarum, quæ passio uocatur mydriasis: ac si conductione fuerit paralyfis facta, angustior pupilla fiet, cessante nutrimento, appellatur phthisis. Lingua paralyfi uitiata uocem non differit, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis uocem reddit, nunc amputatione facta medio tempore oppressis conatibus, conticescit. Demonstrata tamen uerbi intelligibili prolatione, nunc imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed discernatur ab ista passione qui forte ex alia uoce amiserint, cum neque colore, uel superficiem lingua mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyfi uitiata. Item odoramenti officium paralyfi uitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab ijs, qui narium uitio officium odoris amiserunt, quod appellant ozænan: quod neque torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian uocant. Labium superius paralyfi uitiatum inuertitur forinsecus proditum magis cum risu aduenerit, aut locutio conducitur enim sano cum inferiori. Item potio sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidam caninum raptum esse dixerunt nescij, sicut principaliter futuro docebimus schemate. Item siagon paralyfi uitiatum, siquidem nos musculum qui buccas colligat dicere poterimus, conducitur aut laxatur. Vicinus denique oculus non ualebit perfectam facere reclusionem conducto inferiore palpebro. Mentum paralyfi uitiatum amisso motu laxatur, aut uehementer sustollitur. Fauces paralyfi uitiatæ transuorationis difficultate faciunt. Gutturis summitas paralyfi uitiata, siue ut rheuma, siue ut Græci bronchos, mortem facit, & partem transuorationis tussiculam: siquidem non perfectam eo tempore faciat inductionem, ne superet radicem linguæ, quam Græci epi-glottida uocant: quo perfecto, accepta conuiuantur. Videbitur denique eius extantia plurimum relaxata. Item stomachum paralyfi uitiatum difficultas transuorandi sequetur, uel omnino impossibilitas: unde etiam præsens periculum. Videbuntur etiam difficulta transuorantibus accepta, ueluti aciora, aut immaturo tempore comesta. Item sequitur præfocationis sensus cum frigore, in quacunque eius parte

parte fuerit paralyfis : illic nanque etiam trāsuorata sistuntur. Sed discernuntur ab ijs qui facilem paralyfin ex difficultate transuorandi patiuntur : siquidem etiam decolorationes nutrimento cessantē, ac frigus, etiam immobilitas faucium necessario concurrat. Item ijs qui ex stomacho sunt humores supra dictis querelis si fuerint adfecti discernuntur, quod etiam dolore atque feruore partium uexantur. Si cor uel eius summitas paralyfi uitiatum, quod nos commune dicere poterimus, quod arteriæ atque stomacho interpositum uideatur, locorum grauedinē faciet : atque, sumpto cibo uel potu, in præcordijs permanebunt, cum torpore sensuum ac tumore manuum, aliquando & crurum attestante singultu & inani timore : aliqui etiam reuomunt accepta nulla corruptione mutata. Perulo paralyfi uitiato cibus nulla digestionē mutatur, sed tanquam per infundibulum ad inferiora descendit, & circū uentrem laxior locus efficitur inferius inflatioque : quæ per uentrem egerūt, aspera atque plurima erunt, & neque fluida : nescide paralyfi uitiato & typhlotero, quod nos cæcum intestinum dicere poterimus, erunt ea quæ per uentrem excluduntur plurima, & minus fluida : uidentur enim nesciui, cum naturam seruauerint, uel nullo fuerit morbo tentata, tunc plurimum excrementorum acceptorum facere. Colo paralyfi uitiato inordinato motu atque inuoluntario stercorea descendunt, sine ulla humectatione, uel cum foetore maximo eorum fiet egestio sine ullo dolore. Longanone cum sphynctere atque podice paralyfi uitiato, erit inuoluntaria egestio stercorum, nisi ex aliqua hoc fuerit circumcissione confectum. Aliquando etiam præcedit, uel certe egestionem stercorum non sine tumore, uel aliqua simili causa fieri permittit. Vesica paralyfi uitiata, inuoluntarius urinæ exitus fiet sine ullo dolore, neque incisura, neque circū incisione antecedente. Aliquando etiam per interualla prohibitus, uel paulatim retardatus, aut omnino negatus, & sæpe etiam pubetenus extantia partium fiet, extenta uesica, sed ex tumore, uel sanguinis gelati corpusculis, quæ Græci trombos appellant : aut lapide, uel uulnere difficultas fuerit mictus, aut in toto negatio discernitur, quod sine dolore atque partium liuore, atque sanguinis mictu, apposita manu oppressa pectine urina in paralyfi excludatur. Præterea etiam peritoneo paralyfi uitiato, ut Erasistratus ait, urina abstinetur, & neque excluditur, nisi adhibito catheteri : non enim uesicæ ambitus naturali consuetudine peritoneo imbuente opprimitur, neque concluditur ad exprimendum liquorem radix uirilis paralyfi uitiatus, sed multo maior aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur. Seminales uræ, quas Græci spermaticos poros uocant, paralyfi uitiatæ, si laxatione fuerit paralyfis effecta sine ulla tentigine inuoluntarius fiet seminis lapsus. & uocatur hæc passio gonorrhœa, quam nos seminis lapsum dicimus. Ac si conclusionē fuerit paralyfis effecta, iugis tentigo ægrotantis sequetur, sine ullo dolore atque seminis lapsu. & uocatur hæc passio priapismus. Crus paralyfi uitiatum aut conductione breuius fiet, aut extensione longius, ut plerique putent articulorum delocationem hic factam. Sed discernitur hoc : siquidē cōcunitas atque distanti à loco motos aut eiectos articulos sequatur. Est autē ratione credibile, ceterorum quoque interiorum singula paralyfi uitiari, ut pulmonem, cor, uel discrimen thoracis atque uentris, quod Græci diaphragma uocant, aut hypozygon, uel splenem, aut iecur præueniri adprehensione morientis : quæ sæpe latent facta, cum non propria possint adprehensione signari. Herophilus denique repentinam mortem nulla ex manifesta causa uenientem fieri inquit paralyfi cordis. Item Erasistratus memorat paralyseos genus, & paradoxon appellauit, quo ambulantes repente sistuntur, ut ambulare non possint, tunc rursus ambulare sinuntur. Est autem passio generaliter grauis atque difficilis, sed grauior curatione fiet, quoties toto sensu caruerint partes atque motu, & in corporibus iandudum debilibus, uel senibus, aut ex alio morbo præuitiatis, ut epilepsia, febre : item si plurimas tenuerit corporis partes, uel uitiatæ necessarias. De nominibus autem specialiter elogiatis paralyticæ passionis, ut mydriasis, phthisis, priapismo, gonorrhœa, & ijs similibus singula præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hæc ergo passionem multi sectæ nostræ principes stricturnā dixerunt, ob duritiam uitiatarū partiū, atque siccitatem, & grauedinē, & torporē. Mnaseas uero cōductione factā paralipsin uocat, fierique etiā aliquā extensione, aliquā solutione. Nos uero iuxta Sorani sententiā illā uocamus solutionem, cum plurimæ egestiones corporis fuerint uisæ : etenim manū, uel pedū, & horū similitū extensione facta, nulla egestione at testare, & in ligni similitudinē duratis partibus, stricturnā dicimus esse passionē : quippe cum frigescere, uel quadam rugatione crispari corpora commune contrarijs passionibus esse uideatur. Est autem passio generaliter tarda, & accessionibus atque dimissionibus uariata, & superpositionibus ac lenimentis, cuius prædata atque demonstrata significatione, necessario curationem ordinamus. Mox igitur effecta paralyfi, lucido loco atque mediocriter calido locandi sunt ægrotantes, & usque ad tertiam diem permittentibus uiribus abstinenti. Tunc nisi uinō fuerint pleni uel cibo, mox phlebotomandi : si copia fuerit, ex brachio : si minus, ex qualibet patienti parte contraria, quo laquei constrictione, & phlebotomi diuisura in passionē constituti non afficiantur. Si autem pleni fuerint cibo, alia die erunt phlebotomandi. Sed partes paralyfi uitiatæ fricatione atque calefactionibus recurandæ, & lanæ limpidæ ex oleo dulci atque calido expressæ, & circumtegendæ, & fomento relaxandæ. Tunc oris collutio permittenda, atque potu aquæ calidæ erunt prouidendi. Præterea accessionū ac dimissionum diligentius tempora obseruanda, quæ apprehenduntur ex ægrotantium pallore nunc aucto, nunc minuto : uel sensu earundem partium, quibus plus aut minus inesse uideatur. Item ex motu uel imobilitate, aut grauedine & leuitate, aut frigore & feruore. Tunc diatrixi tempore adhibenda perunctio ex oleo calido. Ora quoque fouenda ex aqua medio-criter calida, & dādus cibus paruus forbilis, ut alica lota ex aqua calida infusa, aut oua. Ac si trāsuorationis faucium partes paralyfi fuerint uitiatæ, erunt cucurbitæ obliquis partibus gutturis atque ceruicis appo-

CAELII AVRELIANI SICCENSIS

nendæ. Tunc cibus offerendus: etenim extant transpirationis officio facile seruire coguntur: exinde donec passio declinet alternis diebus dabimus cibum. Sequenti denique die post diatritum abstineto ægro cataplasmatibus utemur ex polline lini seminis & fœnigræci. Tunc alia die, nisi passio creuerit, patientibus locis cucurbitas infigentes scarificabimus: ac, si plurimæ fuerint partes passione uitiatæ, cogentibus magis atque urgentibus ordine præponimus curationem, uel ijs locis, quæ facile poterunt ægros in periculum deuocare, aut ex quibus cæteris partibus facile possit curationis beneficium dari. Sic denique stomacho laxato plurima certe conlaxantur, utpote e contrario oppressis principalibus partibus cæteræ necessario comprimuntur. Tunc cæteris trinis diebus, quas diatriton Græci uocauerunt, alias quoque partes cucurbita releuamus. Si siagon, uel mentum paralyti fuerit uitiatum, erunt cucurbitæ temporibus infigendæ, atque musculus buccarum, uel sub aurium lamnis. Ac si fauces fuerint uitiatæ, uel transpirationis partes, prædictis utemur adiutorijs. Item, manibus paralyti uitiatæ, erunt humeris uel eorum summitatibus atque palis, & brachiorum musculis, aut cubitorum nodis hæc adhibenda. Item cruribus paralyti uitiatæ, uertebis atque genibus cucurbitæ infigendæ, quarum quæ partes non accipiunt usum, ut supercilia, labia, digiti, sanguisugis erunt releuandæ. Item si nimia tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque sanguisugarum morsum tolerare potuerint, ut in palpebris, uel lingua, præfecta uaporatione scarificamus, & generaliter cataplasmatibus utimur. Tunc, si exegerit passio, secundo scarificamus, & spôgiarum uaporatione utemur, ex aqua & oleo solo expressis, uel ex oleo aut decoctione lini seminis atque fœnigræci, uel hibisci, aut malæ communis uel agrestis. Iis uero qui secundum linguam, uel transpirationis partes paralyti fuerint uitiatæ, tempore cataplasmatum atque uaporationum iubemus in os dari oleum calidum, uel aquam calidam, & oleum continendum, aut mulsim: simul enim atque eodem tempore ex utraque parte uaporata uehementius relaxantur. Si uenter fuerit retētus, clystere utemur prius quam partes cucurbita releuamus, ut primo ex aqua mulsæ. Tunc si oportuerit, etiam diurnis diebus ex oleo calido iniectiones adhibemus. Si intestina, uel eorum uicinitas paralyti fuerint uitiatæ, ac si etiam urina fuerit retenta, adhibitis cæteris adiutorijs atque perfectis, encathismata sunt adhibenda. Tunc catathetismus faciendus, quo urina detrahatur, ac post detractionem oleum calidum iniiciendum, atque adnexo folliculo catathetæ ex ea parte quæ cystophilus à Græcis est appellata, uel orico clystere, quem nos auricularem dicere poterimus, tenui exabilisco formatum, quo possit cauernam inuadere directum catathetæ. Tunc cucurbitas prædictis adhibemus locis, atque uaporationibus & cataplasmatibus eas partes cum podice & uetris uicinis releuamus. Si stomachus fuerit paralyti uitiatæ, omnia sorbilia dabimus, quo facilius transuolentur: ac, si ea quæ sumuntur aliqua ex parte subsisterint impedito meatu, ægrotatium manus in aquam calidam mittimus, uel parua uascula aqua calida plena tenenda offeremus. Tunc stomacho leuem cucurbitam infigemus sub ea parte quæ premi uel impediri uidetur: atque ita sensim, uel paulatim eam detrahimus, quo stomachi partes deferendo accipere, uel transire faciamus illata, uel uacuum officium in memoriam reducamus: ac, si uomitus irruerit paralyti facta, nihil dentibus interponamus, si uero conductio, immittimus ceram, uel tabellam alearem, aut feruleam, & ductu contrario fasciolæ corrigere tentabimus deprauata dedinante passione: etenim ante id tempus difficiles in consensu partes esse perspiciuntur: & propterea quassatio potius quam effectus sequitur. Vtemur præterea eodem tempore etiam cerotarijs qualibet paralyti uitiatæ: & primo simplicibus, ut ex cera & oleo pingui, uel sabina, & squinanto, admixta hibisci decoctione, uel fœnigræci semine confuso, atque trito. Tunc ex oleo ueteri & resina terebinthina adhibemus etiam embasin ex oleo calido. Tunc calidam & oleum, cibum dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, atque piscibus petrensis, & uolantum paruoribus. Vtemur etiam acopis, ut est diasamscum & diamelilotum, uel omnibus quæ ex adipibus conficiuntur, & medullis, & irino oleo, uel malabatrino, & quirino, & ijs similibus, & malagmatibus talibus, ex quibus est diachilon, atque mnaseum, & diamelilotum, & meline simplex. Tunc gestatione corpus mouebimus pro uirium modo, fertoria sella, siue cathedra, longiore tunc uehiculo manibus asto, dehinc animalibus: sic enim consensu persuasæ altiores in corpore materię ad exteriora concurrunt, cum in embasi ex oleo fuerint constitutæ, motus beneficio prælatato ægrotante. Dehinc lauacrum adhibemus atque uinum paruum: & consequenter singula, quæ passione fuerint uitiatæ, suo officio exercemus: explorantes etiam, uel intuentes, si quid aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo paralytis uidetur effecta, ut hoc quoque destruamus: non hæc quidem quod antecedens causa esse uideatur, sed quo etiam eam ipsam passionem necessario intelligamus. Quapropter si uulneratio ei fuerit congrua, gerere debemus sicut in Chirurgumenis, uel Responsorum libris demonstrauimus: reminiscens, siquidem ex uulneribus facta paralytis sit, diuisura partium necdum proprio nomine uocabulum teneat, sed appellari claudicationes uel tardationes possunt, siue alienationes. Sin uero cicatrix fuerit clausa, hanc mollire tentabimus. Item si spinæ contortio uel conuersio ex causa effecta, hanc corrigemus. Item si febricula, aut nimia capitis passio, quam cephalæan uocant, aut epilepsiam, ex iisdem eas quoque destruemus. Item si euersio, uel inclinatio fuerit matricis, eidem consequenter ordinata adhibebimus, sicut Muliebrium passionum libris docuimus. Sin uero articuli fuerit electio, quanquam longi temporis eum recolamus. Item si quis humoris fluor per quodlibet officium naturale ultra modum fuerit dimissus, cataplasmata constrictiua probamus, ut ex palmulis thebaicis, malis citronijs acacia, hypocistide, alumine, & ijs similibus: apponentes etiam emplastrorum ea quæ constrixiuæ uirtutis à Græcis enzma appellata: uel si qua ualent concludere atque siccare fluentia, ut sunt uulnerum

nerum medicamina quæ appellantur melana. Nunc similiter ægros resumemus: ac si passio permanse-
rit, cyclo ductu, resumptionis regula dirigemus per uariam gestationem, deambulationem, uocis exerci-
tium, lectionem, unctionem, lauacra. Tunc post hæc omnia partium adhibemus fricationem, dantes ua-
rium cibum atque uinum, iuxta præscriptam disciplinam omnia augentes atque minuents: & nunc uis-
que ad piscium qualitatem ordinamus cyclum, nunc usque ad uolantum, tunc etiam agrestium, ultimo
porcinæ carnis, sicut superius De capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhibemus etiam me-
talyncriticos cyclos, & primo partiles, tunc perfectos, nisi ex initio uires ægrotantis eos perferre non ua-
leant. Denique nunc drimyphagia utemur antecedente cibi paruitate, nunc uomitum prouocamus
drimyphagian linquentes, & cæteras quoque cycli regulas complemus, & nunc uomitus adiungentes dri-
myphagian. Ipsum quoque uomitum primo ieiunum probamus, nunc ex radicibus, uel ijs similibus
qualitate materijs. Atque ita post frequentem radicem uomitum helleboro utemur, primo radicibus
infecto, uel aceto infuso: quo detracto, radices immixtæ concisæ ipso cum liquore sorbeantur. Vtemur
etiam localibus adiutorijs in ijs partibus quæ sunt paralyti uitiatæ, ut dropaci primo, tunc composito,
quem Græci pharmacoden uocauerunt. Psilothro quoque, & cucurbitis reëorporatiuis multa cum
flamma admotis, atque uiolenter remotis, aut circumtractis nunc ex superioribus ad inferiora: etenim
spiritus iamdudum motu uacuatus ex alto adducetur, & quadam prouocatione excitus uel accurrens sua
cubilia cognoscit, singularum uiarum motus inuadens, passionis deturbato languore. Hoc igitur fa-
cere tentabimus: ex multis cucurbitis per spinam, recto scilicet ordine post inuicem adfigentes, atque suf-
ficiens tempus adductioni largientes, primo primarum faciemus detractionem, tunc sequentium, quo sibi
adductum spiratum tradunt, atque insolitos prouocent motus, atque uerso ordine inferiores primo affi-
gentes easdem detrahemus primo. Post cucurbitationem atque dropacis usum, puluere nitri partes
aspergi facimus, & fricari uel sinapi, uel ex utroque. Tunc etiâ ijs pulueribus quæ sunt ex calce uiua,
feda, pumice, pipere, pyrethro, & ijs similibus uirtute rebus. Ordinamus etiam unctiones, gestationes ua-
rias, acopa quæ mordicatione quadam corpus afficiant, uel accendant, & emolliant: ut sunt ea quæ con-
ficiuntur ex oleo sicyonio, syriaco, castoreo, aphronitro, sulphure uiuo, agresti cucumere, ammoni-
aci gutta, squilla, quam uulgo uuluum pluriosum uocant, urticæ semine, pyrethro, pipere, helleboro al-
bo, nigella, galbano, & illyrica, lemnida carie, & ijs similibus. Non aliter etiam malagmata sunt adhi-
benda, quæ corpus ualeant papulare laceffendo, ut sunt ex flore salis, uel ex nitro, & illud quod nileos
appellatur, uel diadaphnidon, uel apollophanos, & caphysophontos: quorum compositiones Responso
num tradidimus libris, pro modo magnitudinis passionum adhibendas, atque lenimentorum alias au-
gentes, alias indulgentes. Ordinamus etiam sole corpus torrendum, uel paroptesin ex carbonibus, aut
parietibus calefactis, uel pauimento: item lapidibus ac testis hoc faciunt. Etiam ceromata sub sole igni-
ta, uel terga præuncta, simili modo calefacta, quæ substrata accipiunt ægrotantes uolutione quadam
conuertendi, ac defricandi, & mutandi: etiam loca quæ deseruerint repetenda, ut ueniant feruentiora:
quippe cum naturaliter tergora oleo ac sole facile feruescant. Vtemur etiam ob similem corporis cu-
rationem, quam Græci phoenigmon uocant, harena litori uicina, quæ sit sole ignita, ut circumtecta
gremio foueat ægrotantem. Tunc etiam fomentationibus ex aqua salsa, uel marina, aut decoctione
baccarum lauri, uel omnium quæ ita corpus afficiunt: manente passione etiam cataplasma ex sinapi
adhibemus, uel contusam atque liquatam ferulaginem, quam Græci thapsian uocant, corpus unguemus
usque ad cutis ruborem, atque mediocrem partium inflationem: etenim uulnerari, siue uexari quos-
dam ex istius herbæ usu immoderationis est uitium, tanquam sinapisimi usus immodicus. Generali-
ter autem similiter medentur etiam uaporationes ex saccellis sale torrido repletis, atque in lauacro
igneo usus flabrorum. Ordinamus etiam, si quid partialiter loco patienti poterit adhiberi, ut capiti
passione uexato rationem capillorum, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam. In mulieri-
bus uero, quæ id fieri non facile permittunt, densa pedine exerceri capillos imperamus, supradicta
scilicet diuersitate, & cum uehementi conatu atque primo aliorum manu, & raro pedine: tunc magis de
lo, & ægrotantis manu. Ac si odorandi officium fuerit paralyti uitiatum, erunt adhibenda aciora odo-
ramenta, ut ex aceto & sale, aut adinactio origano in aceto extincto, quo ex eo acriorem profecto exha-
lationem naribus sapiant ægrotantes. Nunc etiam sinapi, uel castoreo ex aceto soluto per interualla,
uel lasare, quod Græci opon cyrenaicum uocant. Sed hæc erunt naribus quoque immittenda, uel si-
napi cum aceto, donec prouocentur iubemus eos uolenter emungere. Probamus denique betæ
nigræ, uel cydamini herbæ succum cochleare plenum naribus infundendum, utentes ptarmicis uehe-
mentioribus, quæ nos sternutamenta uocamus, ex pipere, helleboro, castoreo, astrutio, & horum si-
milibus. Post sternutationem uero magis odoramenta utenda probamus: hæc enim uehementius
odoracionis mouent officium, & solas capitis partes in passione constitutas quadam mutatione re-
formant. Ac si lingua fuerit paralyti uitiata, uel transuoracionis partes, aridum sinapi dabimus
masticandum ante lauacrum. Tunc aqua calida os colluere præcipimus. Aliquando etiam lique-
factum ex aceto sorbere ægrotantem imperauimus, & gargarizare. Hoc quidem etiam de similibus
liquoribus faciemus, ut ex fico, hyssopo, draganto, origano, thymo, pipere, pyrethro, staphysa-
gia: hæc etiam masticanda dabimus. Ipsam quoque linguam lasare fricantes ex aqua soluto.
Tunc etiam cornu cucurbitæ in modum adhibemus: adducit enim non aliter quam hæc spiritum, &
insolitas prouocat uias, quæ sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ. Item stomacho patie-

te atque uentre, magis frequentabimus drimphagian : dantes etiam lasar cū aceto, ex quibus panis erit madidandus, adiuncto quolibet pulmento. Ac si podex fuerit paralyti uitiatus, aut eius uicina, acriora facimus uel mordicantia iniici collyria, quæ Græci balanos uocant : uel sinapi plurimum fico admixto, atque in collyrium collectum lōgitudine aptum partibus iniicimus, ut ea quæ in alijs ordinauimus fomēta, nunc pro encathisimatibus adhibemus, uel per clysterem iniicimus aliqua ex acrioribus, ut aquā salſam, uel marinam, uel garum, quod appellamus liquamen ex pisce siluro confectum, & si qua fuerint similis uirtutis : quorum omnium dexteris usus, atque confectionis genus, & adhibendi rationem libro Adiutoriorum specialium docuimus. Oportet præterea singulas partes in passione constitutas, suis ac naturalibus motibus admonere, ut supercilium leuando ac deponendo, palpebrā concludendo ac distinguendo, linguam producendo atque conducendo. Hæc sunt ægrotantibus imperanda. Hortandi etiam locutionem tentare : quod si minime facere potuerint, ex omni parte officio linguæ cessante, erunt suadendi, ut animo concepta uoluant quæ proferre nō possunt : sæpe enim quæ loqui uolentes mente per ceperint, in alto formans spiritus accepto motu rumpit in uocem. Vel certe docendi sunt unius exprimentæ literæ curam suscipere, ut intra se exercendo manifestius probent, & magis ex uocalibus, ne difficultate sonitus multarum literarum uocis organa concludantur potius, quàm referantur. Tunc, cum implere ualuerint, dabimus lexes, atque nomina, quæ sint ex multis uocalibus conscripta, ut est Pzan, & ijs similia : sic etiam numeros dabimus, & ex ijs exclamare prouocabimus ægrotantes. ac deinde lectionem offeramus, uel disputationem. Hæc adhibenda sunt etiā, si buccarum partes circa labiorum confinia, quem Græci chalinon uocant, fuerint in passione constitutæ. Dandum etiam mastiche mastica-da, uel cera indulgentior mordenda, tunc ferulæ particula, uel per profectum tilia tabella : plus enim illorum singula quodam cum certamine partes faciunt exerceri. Tunc danda etiam frangenda arida fabarum grana, uel amygdala molliora, ac nuces auellanae primo, tunc etiam glandes paulatim aucto numero quantitatis. Ac si digiti fuerint in passione constituti, erunt commouendi oblatione ceræ emollientis, & malagmatum suprascriptorum : quo non solum motu, sed etiam tactu medicamina propria uirtute medentur. Præterea eodem exercitij tempore, & in illis quibus tota manus paralyti fuerint uitiata, uel earum quælibet partes, altheres erunt offerendi : at enim pondere pro modo uirium ægrotantes, quodam labore mortes exercent. Sed erunt prædictis malagmatibus commouendi, ut primo te neant uel baiulent ægrotantes, tum demum ex ipsis simili ratione feriendi manus exerceant. Ac si crura fuerint paralyti uitiata, si fieri potuerit, per seipſos : sin minus, aliorum impulsu extensione atque con- clusione exercent eas partes, non tamen sine suasionē, qua non solum motibus exercentur, uerum etiam ipsi conuitantur. Erunt denique ob uarietatem motus artis industria partes commouendæ hoc modo : iacente ægroto, cruribus imposita fasciola superpendenti rotulæ, quam Græci trochilion ap- pellant, alterum ex sinibus fasciolæ inferendum, hinc tenendum dare : nunc ministro, nunc ægrotanti demonstrato motu, ac partili, qui nunc adducta fasciola subleuet crura, nunc indulta deponat. Sed cum non solum leuare ac deponere uoluerimus, sed etiam extendere, aut inflectere partes paralyti uitiatas, duz erunt fasciolæ imponendæ : altera genibus, altera talis : tunc per supradictam rotulam traiciendæ, & apprehensis initijs similiter offerendæ patientibus uel ministris ut uicissim adducant, quo ea quæ ge- nu continet adducta, & ea quæ talum continet indulgente, hoc motu crura flectantur : rursus talia ad- ducta, & indulta ea, quæ genu continet, cruris fiat extensio. Ac, si sedere potuerint ægrotantes, erit fas- ciolæ medietas pedibus submittenda, cuius initia eidem tradita cogatur labore proprio per seipſum ad- ducendo atque indulgendo suis cruribus motum præstare. Simili etiam modo manus in passione con- stitutæ moueri posse noscuntur, ut ex altera fasciola iubeat quam oportet arteriam articulis digitorum uicinam, quam Græci carpon uocant, altera cubitum circumdari. Præmotis igitur, uel exercitis, ut su- pra dictum est, dabimus ut sella tonsoria sedeant ægrotantes, quæ sit obliquis anconibus fabricata, qui- bus incumbentes sese leuare nitantur : & nunc fulciti ex utroque alarum latere ministrorum officio de- ambulationē tentent, uel incumbentes baculo, aut uehiculo manibus actō, quod infantibus sæpe motum discentibus fabricatur : sed magnitudine tamen ægrotantibus coequandum. Dehinc cum gestationis au- gmenta sufficimus, conficienda sunt ligna, quæ transgredi pedibus nitantur ægrotantes : tunc etiam, per- fectis in terra lacunis, deambulationem imperabimus : ac deinde calceamentis adiuncto plumbo prius par- uo, ut exempli causa uncia, tunc plurimo, atque pro augmentorum gradu usque ad libram deducto, tum etiam itineris celeritas erit augenda : habet enim maioris laboris officium. Varianda etiam omnis regu- la, ut nunc resumptiuos cyclos in metasyncriticos deducamus, nunc è contrario uersa uice gradum reuo- cemus. Præterea perseverante passione ad hellebori usum probamus accedendum : non solum semel, sed & cogentibus rebus secundo uel tertio : tunc resumendos, atque naturalibus aquis dandos, & magis calidioribus, ut sunt in Italia Pantherinæ, Veseuinæ, & Senanæ, & Caritanæ appellatæ : etenim Albæ, siue Albulæ quæ sunt appellatæ, quod sint frigidæ uirtutis, solutione laborantibus, uel fluore quorum libet officiorum naturalium à ueteribus sunt approbatæ. Utendum etiam natationibus marinis, uel supradictarum aquarū, & primo partibus passione uitiatis inflatæ uesicæ sunt adiungendæ, quo natadi labo- rem minuāt. Itē aquarum ruinis partes in passione constitutæ sunt subiiciendæ, quas Græci catadysmos ap- pellāt : plurimum etenim earū percussiones corporū faciunt mutationē. Peregrinatio quoque adhibenda, atque maritima : necnō castoreum poto damus, si qsq̃ eius odoris difficultatē perferre ualuerit : recorpora- tiuam curationem, quam Græci metasyncriticam uocant, utilem approbamus, partibus in passione con- stitutis.

stitutis. Hæc est secundum methodon paralyticorum curatio. Veterum autem medicorum Hippocratis atque Erophili sectatores, memorant ea quæ in passione constitutos sequuntur, curationem uero nullam tradiderunt. Item Diocles libro quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, eandem dicit conducere curationem, quæ epilepticis est ordinata. Dehinc Praxagoras secundo libro Curationum primo uomitum probat, & ijs præsertim qui caput fuerint paralyti uitiati, nunc ante cibum, nunc post cibum. Tunc reuocationes atque uentrisflua, & urinalia medicamina, quæ cœliotica atque diuretici appellantur. Adhibet etiam clysterem iugem & acriorem: bibendum etiam cum aceto asininum atque bubulinum lac probat. Tunc cataplasmata, & malagmata, & sudoris prouocationes: & si quis uomere facile potuerit, parum hellebori pulmentis interiectis diebus admiscet. Neque mox factam paralytin curans, neque recta à uomitu incipiens, & in ijs magis qui caput paralyti uitiati uidentur, priusquam ex alijs adiutorijs partes fuerint releuatæ. Dehinc sensibilis post cibum omnis est uomitus, & multo grauius ingis. At Praxagoras iubet, quotidianis aut alternis diebus adhibitos suis dogmatibus sublati erroribus, quamquam uentrisflua atque diuretica, & clysteres iuges approbauerit: non enim, quod mutationem corporis hæc facere ualeant, existimauit: sed quod materiarum facere detractionem, atque corpus liquidis uacuare. Item aceto potu dato lac repugnat, cuius magis grauis, dehinc qualibus cataplasmatibus, uel malagmatibus sit utendum, dicere negligit. Sed neque tempus adhibendi discreuit: non enim, quando mitigatis utimur cataplasmatibus, tunc erit malagmatibus utendum. At iste pariter utraque composuit. Item sudores laxatis corporibus fiunt, non ipsi laxamentum faciunt: sed neque quemadmodum sint prouocandi docuit, aut memorauit: item album helleborum paruum datum præfocationis ingerit periculum, & multo potius quoties sunt in uomitum difficiles ægrotantes: mitto, communiter eum dixisse interpositis diebus offerendum, & tempus non memorasse, cum passionem necesse sit superpositionibus ac lenimentis uariare. Item Erasistratus de paralyti scribens, differenter curandos ait eos qui conclusionem sunt paralyti uitiati, ab ijs qui extensione uidentur affecti: etenim neque cataplasmata, neque malagmata secundum inquit conuenire: non aduertens, quoniam etiam strictura densata quædam corpora ui maiore, non aliter quam chordæ tenduntur: laxata denique medicinalium uirtute, sæpe retenditur. Item initio curationis clysterem probat, phlebotomiam negligens potentiam: quo adiutorio maius nihil maioribus approbatur. Tunc, inquit, effecta febricula detrahendum cibum, & dandum mulsam ex aceto confecto: profecto densata constringent. Tunc obseruatis temporibus accessionum uel dimissionum, dandam ptisanam probat aut olus: quorum alterum inflat, alterum facile corrumpitur. Dehinc aromaticas approbat potiones, & alias mites, alias uehementes. Ventræ quoque facilem cupit, ex quo stomachus necessarius uitiatur: & neque quanta, neque quando, neque quæ danda sint, memorauit. Prohibet etiam unius anni spatium, uana intentione tempus definiens. Dat etiam lac cum melle, atque sale: quod est contrarium supradicto mulso ex aceto confecto. Utitur præterea uomitu post cibos: quod iam superius fieri damnauimus. Vitiat etiã deambulationibus harenosis in locis, ex sola intentione sui dogmatis: etiam uentrem facilem cupit, caduca suspitione deceptus. Asclepiades uero principaliter de paralyti nihil scripsit, sed Erasistrato respondit, epi inquit, qui non graui dolore in ista passione afficiuntur, phlebotomiam non oportere: eos uero qui priuatis sensibus peiore strictura uexantur, abstinendos primo, tum initiandos probat: adhibet etiam purgatiua medicamina, quæ Græci catartica uocauerunt: cum sint hæc corruptiui uirtutis, & propterea corpus eliminando consumant potius, quam relaxent. Sed specialiter à laxatione paralyti uitiatis aduentia inquit medicamina conuenire, & fomentationem paruam paulo feruentius temperatã: non aduertens, quia plurima extenta conclusis similem exigunt laxationem, atque indulgentiam tensionis, & non, ut existimant, conscriptionem: utraque etenim hæc passioni subiecta sunt, ut etiam stupor corporis, uel frigidus torpor, quem non semper necessario uaporationibus, uerum etiam frigore adhibito releuamus: siquidem contrarijs inter se passionibus hæc subiecta monstrantur. Ordinatur præterea idem in harenæ spatio deambulationem, quod appellant scamma, atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum uinum. Item Themison primo libro Tardarum passionum in quibusdã peccare cognoscitur, nondum rectam methodon respiciens: etenim phlebotomia ex ea parte quæ passio ne uitiata est, si, inquit, sensu non caruerit: non curans, ut supra demonstrauius, euitanda omnia, quæ adiutorio quadam necessitate ueluti uexabilia uideantur esse coniuncta. Dehinc lanam succidam, quam celsypon appellant, capiti iubet imponi, aceto atque oleo rosaceo infusam. Neruis autem ceruicis atque spinae, & cruribus, & brachijs, uinum atque oleum cum sale imponendum iubet, constringens atque lacerans incongrue ea, quæ phlebotomia miti releuatione laxauerat. Tunc tertia die cibum probat, atque quarta die cucurbitam imponi adiuncta scarificatione: non interrogans passionis tempus, solum numerum dierum imprudenter attendens. dehinc sequentibus gestationem probat: & neque in eo definiens tempus, atque audaciter secundæ diatriæ expectationem spernens. Dat etiam aloem in potu, & ex aqua calida, & oleo intestinis dare laxamentum ordinat. Præterea anatresin testem faciendã, quam nos perforationem uocamus, iã dudum quidem & in alijs methodicis explosam: & harenæ deambulationem conuenire existimat, atque plagis ferulæ cédendas partes in passione constitutas, profecto quæ saltem aque mitigatione atque re corpora uidentur esse curandæ. Item Lusius primo libro Tardarum passionum cum ijs omnibus, tum medicosis quoque fomentationibus utendum probat. Plurimi etiam alij aceto, atque oleo rosæ fountes cum herpillo, & ruta, & hederâ, & castoreo. Probant præterea iuges clysteres, atque purgatiua medicamina, quæ catartica uocauerunt, & magis hieram, cuius usum græco libro Epistolarum ad

CAELII AVRELIANI SICCENSIS

Prætextatum damnauimus scribentes: sunt enim ea quæ stomachum uitiunt fugienda, ut sunt corpus infumentia, & quæ moderationis nostræ careant potestate. Item Thessalus secundo libro de Regulis scribens, plurima recte dixisse probatur: quædam uero proterua fellinatione caduca: etenim post phlebotomiam usque ad tertium imperat abstineri, solum potum diurna cum luce offerendum. Tunc transacta tertia die, atque hora qua sunt ægrotantes paralyti uitiati, cibum portat. Quibus respondere facile quicquid poterit, si quærat, qua intentione Thessalus oriens luce potum iubeat dari: etenim si continuationis causa id fieri responderit, oportebat etiam cibum eodem tempore approbare: sin uero accessionum frequentia id existimat declinandum, uel suspicione futurarum, & propterea post tertium diem cibum transferendum, quo transacta hora passionis illatæ tertia die recte ægros nutrire uideamur, oportebat etiam potum non communiter, sed generaliter diurnis diebus, uel initio lucis offerre, sed horarum dimissione captata. Dehinc non semper, ac necessario tertio die cibum oportet dari, sed etiam quarta continuationis, quæ initium ex die sumpsisse uisa, uel ob typum eadem ratione currentem. Idem post hæc similiter ut Themison, quarta inquit die cucurbitas infigendas, non interrogans utrum passio sumpserit statum, quod est maxime seruandum. Ait præterea alternis diebus cibandos usque ad centum numerum dierum, quod infinitum reliquisse perspicitur. Audaciter etiam atque inuidiose acopa quædam, uel malagmata probat excludenda, solius moderationis neglecta arguens uitiata. Hæc sunt quæ etiam Thessalo Sorani diligentia uidentur esse responsa.

De Canino raptu, quem Græci Cynicon spasmus uocant. Cap. I. I.

IN ISTA passione constitutos sequitur conclusio, siue contractio repentino motu ueniens, ac recedens sine ulla corporis turbatione, & nunc utriusque labij in ultimo fine, siue oris angulo quæ Græci chalinon uocant, ut etiam buccas adducat in posteriorem partem creberrime, tamquam ridentibus, nunc palpebras, uel supercilia ac nares, ut etiam colla atque humeros rapiat, & ita patientes faciat commoueri, tanquam onus humeris baiulantes transferendi ponderis causa. Differt autem à spasmis, & paralyti musculorum qui buccas conligant: siquidem spasmus acuta atque celer passio perspicitur, caninus uero raptus etiam tarda. Item paralytis supradictorum musculorum, non, ut Demetrius ait, Attaleus, eo differt quod non sit in canino raptu partium conuersio: (hoc enim contra manifestam rationem intelligitur dictum) sed quod ipsa conuersio coacta celeritate prius facta, quam fieri sentiat. Curationem uero ex ante scriptis accipiendam ducimus, & magis quam de paralyti monuimus, oris partibus.

De Auriculæ dolore, atque humoris fluore per auditorias cauernas. Cap. I. I. I.

SENSVALES aurium uiz, siue auditoriæ caernæ, quos Græci acusticos poros appellant, difficilimis sæpe doloribus uexantur, ut etiam occipitium teneant, & oculos atque buccarum musculos, & per ueratione quadam tardissima, tempora teneant & caput. Aliquando etiam humoris fluore per eandem cauernas fiat, quem Græci rheumatismum uocant, & ita iugis, ut sæpe uulneret altiora, atque corrumpat, & ossa contrebret, & propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet igitur actionis tempore discernere curationem in lenimento communem magis, hoc est recorporatiuam, quam Græci metasyneriticam uocant, adprobare: ut, cum dolor fuerit in initio, adhuc nouam passionem iudicantes, quidquam destillari faciamus in has cauernas, constrictiuum medicamen, uel ex lana limpida sumentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, uel roseum oleum, uel acetum, & ijs similia. Utendum etiam requie corporis, atque abstinentia, & silentio suo: etenim officio accepta uoce aures necessario commouentur, & propterea maiores dolores efficiuntur. Ac si passio fuerit augmentis asperata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac mollibus lanis prætegenda exteriora, atque uicina. Locandi præterea ægrotantes calido in loco: & si dolor coegerit, phlebotomandi, atque tertia die leui atque sorbili cibo reficiendi: & ob mitigationem doloris exterius admouenda uaporatio tepidi uaporis, uel sacelli ex polline tenero confecti. Tunc cataplasmata laxatiua, & cum dolor sumpserit statum erunt admouendæ sanguifugæ, quas hircines appellant, circa fines auriculæ, hoc est, circulatim auditoriam cauernam, habentes cartilagineam prætermittam, uel certe eius posteriora cucurbita admota scarificanda, adhibita uaporatione spongiarum calidarum. Ipsam quoque cauernam inuoluta lana per melotida oleo calido rinctam paulatim penetramus, atque illic lana derelicta ferramentum detrahimus. Tunc declinante passione cerotaria apponemus, dantes uarium cibum & uinum: ac si humoris fuerit fluore, quem rheumatismum uocant, eadem adhibemus, quæ initio doloris adhibenda probauimus. Dehinc eorum augemus potentiam, ut cauernæ ipsi faciamus infundi collyrium, quod appellamus diaglaucium ex uino solutum, uel aceto, uel illud medicamen quod appellat heren, uel mulsum ex uino factum: quod sit præcoctum in mali punici cortice, cum nardo, uel amygdalis amaris, & aceto, croco, & myrrha, & alumine, & uel ex herbarum succis constrictiue uirtutis, tum auriculæ uicinantia circulatim cataplasmata, ex cydonio malo, ac simili medentiu uirtute cōtegemus, uel medicamine quod appellatur diaiteo, quod est siccatiue uirtutis, uel icesio, aut diadictamno, & ijs similibus. Dehinc si passio coegerit, radendum est caput, & constrictiuis cataplasmatibus contegendum. Dandi etiam cibi constrictiui, & lenimenti temporibus, siue dolorum tardantium, siue humorum fluentium resumptiuus adhibendus cyclos, tunc recorporatiuus. Et localiter ipsis cauernis per clysterem modicum iniicienda, nunc destillatio

destillatio aquæ cineribus liquata, quam uulgo lixiuium uocant, Græci coniam: nunc sinapi liquido, atque etiam admixto fico, erunt exteriora cataplasmanda, donec rubor maximus fiat, quem Græci phoenigmon appellant. Item eundem immixtione medicaminum ex garo confectorum, quod uulgo liquamen appellant, uel ijs uirtute similium materiarum. Tunc etiam totius capitis curationem ex illusione aquarum supercadentium, quam Græci catadysmum appellant. Quibus etiam aurium uicina sunt maxime curanda. Dehinc acopibus & dropacis, & malagmatibus acrioribus, & aquis naturalibus utendum: sic enim intardata corporibus emoueri, atque excludi mutatione poterunt curationis.

De dolore dentium. Cap. IIII.

FIVNT dolores dentium nunc omnium, nunc aliquorum, nunc unius, cum sibi uicinantibus gingiuis, ut etiam contumescant, ac sæpe ora faciant subinflari, uel eorum aliquas partes crescente passione tebrari. nam sæpe dentes & gingiue computrescunt, corruptis ossibus quibus natura inserti sunt, recedentibus tumore cogente gingiuis. Sed etiam nunc erit curationis diligentia partienda, ut initio doloris, uel certe si ita passio recurrendo tardauerit, superpositionis alia adhibeatur curatio, alia lenimenti. Quapropter adhuc recedentibus passionis motibus, uel in asperitate superpositionis doloris constitutis, conuenit abstinentia cibi, atque requies corporis, ut initiorum causæ aqua quæ uirtute constringat collutioni oris adhibenda sit, ut est à plerisque conscripta decoctio in aqua & uino herbe syderitis, uel acacie, uel leuces, quam etiam polium uocant, aut mandragoræ: sed non sine cautione, ne quid ex ipso liquore transuorent egrotantes. Item pentaphylli herbe, aut papaueris, necnon personatiæ, aut herba phlomon in posca decocta, uel ex cornu ceruini drachmis quinque, & aceti hemina usque ad sui medietatem decocta, uel de pinis cum aceto decoctæ, aut alteri radices cum uuæ lupinæ succo, & uino sufficienti simul coctæ. Erunt præterea ex ijs, aliqua parte in doloribus constituta, apponenda uel lenientia, uel simili uirtute medentium materiarum. Tunc cum dolor uehementescere coeperit, lecto tradendus est eger, atque blando tempore calefacientibus supino capite collocandus, sed paulo prominentius à cetero corpore subleuato. Tunc articuli frictione calefaciendi, atque musculi buccarum lana oleo calido infusa circumtegendi, appositis faccellis ex pollinibus calidis confectis. Tunc oris collutio ex oleo adhibenda dulci atque calido, uel foenigreci succo, aut alica, aut ptisana, uel glycyrrhiza, aut lacte cum melle. Et, si nimius fuerit dolor, phlebotomia adhibenda. Tunc tertia die, qua sanguinis facta detractio est, forbilibus atque calidis cibis egri nutriendi, sed plus perungendi. Alia quoque die, si dolor steterit atque durauerit, & officium cessauerit uentris, erit amouendus ex simplici clystere: & loca in dolore constituta ferro laceranda, appositis cucurbitis secundum buccarum musculos, atque gingiuarum locos. Aliquando etiam ipse gingiue scarificandæ, uel circumsuperandæ à dentibus ferramento, quod pericharactera uocant. Est etiam mitigatiua ex oleo uaporatio, quæ fiet ex feruenti oleo, lanam melotidi inuolutam tingimus, tunc gingiuis alitrinsecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori parti, & ipsis quoque dentibus, quantum eger ferre feruoris poterit: sed prætegenda uicina sunt, lana præmissa, ne facile pustulentur. Alia quoque uaporationum genera, quæ sunt à ueteribus tradita, erunt adhibenda, ut thuris granum igne calefactum tunc tenui linteolo inuolutum dolentibus dentibus apponatur, & ita mordeat egrotantes, ut ex ipso uapore resumantur. Item thuris triti puluerem singulatim linteolis pluribus illigamus, tunc eorum singula oleo calido prætinctoria egrotantibus offerimus mordenda, dentibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam scyllæ paruum modum aiunt oleo concoquendum: quod nos differendum probamus, ac lenitatis tempore adhibendum: siquidem ob acrimoniam scyllæ recorporatiuam habeant uirtutem. Oportet præterea etiam mentum uaporari exterius, & spongijs expressis ex aliqua coctione laxatiuæ uirtutis ad mitigandam materiam, uel ex ipsa adhibere fomentum. Tunc cerotaria apponenda probamus ex oleo cyprino, uel irino: item malagmata sensim calefacientia: tunc lauacro atque uino, & cibo uario utendum. Ac, si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut chronia passio uideatur, & nunc superpositionibus asperata, nunc lenimentis emollita, oportebit superpositionis tempore iisdem adiutoriis perseverare: totum uero corpus resumere, sicut frequenter docuimus. Præterea tempore exercitij erit offerenda cera, quam ægrotantes mordendo dentes exerceant, sicut nuper demonstraui de paralyti scribentes. Ultimo autem tempore gestationis erit adhibenda fricatio capitis atque oris, sed ipsius manibus ægrotantis paruissima, plurima uero ex alienis, sed longitudine temporis potius quam uehementia, ne caput nimietate moueatur. Tunc, ne partes refrigerent, uel impleantur etiam, à plurimis erit corpus confricandum, ut duobus ministris ab humeris latera, & alij duobus ab inguinibus curata. Tunc resumptione paulo fortius erunt partes recorporatione curandæ, ut post frictionem strigili non obtuso uel aspero pannis buccarum musculos usque ad ruborum fricari faciamus, & nunc dropacem illiniri, tunc etiam ipsos dentes atque gingiuas uehementius fricari. Dantes præterea iugiter oleum calidum sorbendum, atque continendum & despuendum. Item aqua frigida tunc interpositis duobus uel tribus diebus, ex humore in quo fuerit decocta mali punici cortex adhibemus oris collutionem, uel in quo sit prætinctoria ignita galla, uel ex aquis sua uirtute medentibus. Item dentium confricamentis utendum, quæ constringere atque fortificare ualeant, sicuti libris medicaminum ordinauimus. Vomitus uero post cibum factum omnibus est contrarius, & maxime in ista constitutis passione. Item non aliter Venus obesse probatur, & uinolentia. Multi autem uereturum medicorum accessionis tempore ea medicamina adhibenda iusserunt, quæ anodyna Græci uocauerunt, nos in-

doloria dicere poterimus, quæ aiunt nocturno tempore adhibenda, profecto sensum non dolorem auferre. Adhibet etiam fumigationem dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ uino conspersa, mollibus prunis imposita. Tunc iubentes ore aperto ægotantem fumum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationem capitis prohibere, & offerre mullum calidum, uel quenquam mitigantium liquorem continendum, uel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta solatium capiant ægotantes. Item iubent circundandos atque inuoluendos dentes ex opio, galbano, pipere, uel lasere, & peucedano, & herba quam tithymalon uocant. Hæc quidem etiam corruptis dentibus adhibenda probauerunt. Necnon tenuelinteolum apponendum, prælinitum oleo cocto, uel sale, & cedria, uel ex croco atque pipere longo, & rosa recenti, & illyrica, galbano, cocco cnidio, styrace, nitro, cum melle medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniam lenimenti tempore locum potuerint inuenire: quanquam sit etiam fugienda satietas medicaminum plurima. Omitto quod tithymali succus appositus dentes infringat. Non aliter etiam ferreici altheres exhibiti, qui dentium dolores mitigent locorum mortem faciunt, & ipforum dentium laxitatem, qui aiunt ungendas gingiuas accessionis tempore amurca, cum simili modo infecta lana ex oleo ueteri & myrrha, cum uino & oleo resoluta, atque crassitudine mellis deducta, cum secudum methodon aliud sit tempus medicaminum lacescentium. Item alij præsentem dolorem in contraria partis auricula aiunt balsami succum mittendum, cum succis supradictis simili modo uel folio. His omnibus resolutis, uel oleo decoctis, aut in quo decocta sint edere nigræ folia decem, & squille medium in olei uel magnitudine spe auocandæ materiæ, deprauati, uel maioris doloris illati causam anteriorem auocantes, obscurantes auocatis sensibus ægotantes. Item alij eius partis, quæ dentis dolorē sustinet, nari edere succum infundentes, cum olei parte dimidia, ex ferramento quod rinenchyton uocant. Adhibentes etiam sternutamenta & apophlegmatismos, & odoris medicamina, quæ iugiter aiunt apponenda, & sint uirtutis lacescentis, quæ stomatica uocant: quorum singula tanquam recorporatiua non mitigatiua in lenimento adhibere probamus. Item alij statim ad auferendos dentes dolore pulsatos accurrunt, nescij quoniam detractio amissio partis est, non sanatio. Quapropter sicut alias quoque partes in tumore constitutas non detractione, sed mitigatione curamus, sic etiam dentes concurrendos accipimus. etenim si quisquam dentium fuerit exesus, exigit primo mitigationem, tunc sui detractioem faciendam. quippe cum non sit à periculo remotum doloris tempore dentes auferre, & maxime integros, hoc est, qui non fuerint exesi, uel corrupti, aut mobiles: consensus etenim superiorum partium necessario sequetur & musculorum, & oculorum. Erophilus denique & Heraclides Tarentinus mori quosdam detractioe dentis memorauerunt: nam Erasistratus plumbeum inquit odontagogum, quod nos dentiducum dicere poterimus, apud Delphum in Apollinis templo ostentationis causa propositum: quo demonstratur, oportere eos dentes auferri, qui sint faciles, uel mobilitate laxati, uel quibus sufficiat plumbei ferramenti conamen ad summum. Sic autem putant, quod omnis dens dolore uexatus, & qui necet sanos, est detrahendus, oportet etiam omnes auferri, si omnes fuerint dolore possessi. Quomodo autem sint auferendi dentes exesi uel moti, nisi seruari potuerint, libris medicinalium Responsionum docuimus. Ac si aliquando ex humore gingiuarum uisi fuerint commoueri, oportet constrictiuis uti collutionibus, quarum materiæ ex parte superius diximus adhibendum oleum lentiscinum, & aquas coelestes, & lac asininum: est enim densabile: item decoctio mali punici, uel gallæ, aut acaciæ, aut rosæ, aut murte nigræ, aut mali cydonij, uel platani baccæ. Vngendæ præterea gingiue medicamine, quod appellamus diamaron. Item diaporos & diaroos, & diomiphacion, & cœnanthio. Item si quædam emerferit gingiuarum sanguinatio, corallij tusti pulvis cretus, atque intus ponendus & alumen cum melle. Item eruca cum aceto apponenda. Sed hæc sunt primo concoquenda iugi motu uersata.

De Apprehensione, siue Oppressione, quam Græci Catalepsin appellant. Cap. XIV.

HANC passionem ueteres tanquam specialem, uel propriam tradiderunt, quasi nullo ex genere uenientem, ut Chrysippus memorat, quod de ipsa Niceratus conscripsit librum, probans scilicet etiam ueteribus medicis cognitam, quod nos confirmamus. Sed quia nunc tarda, nunc celer à methodicis approbatur, quanquam sit à nobis celerum passionum libris plenissime tradita, etiam nunc erit ordinanda: quippe sæpe in tardum ueniens motum, & propterea chronia nuncupanda. Sequitur autem patientes febricula, & uocis amputatio cum oculis patientibus, atque impalpebrationes: difficilior eo tempore quod statum sumpserit accessio, & omnis immobilitas, cum palpebrarum impossibili atque horreti positione, quæ declinatione facta aliqua ex parte accipiat motum: etenim admota manu ac digitis, circumtractis oculis tenus palpebra recognoscitur ægotantis, atque obtutu inter nota translatione manus in qualibet parte declinata sequetur conuersio scilicet uultu. Dehinc inclamati intendunt, lacrymantes sine ulla responsione: & si odoramenta iucunda fuerint admota, declinatione quadam moueri intelliguntur, frequenter adductes spiritum hauriendæ exhalationis causa. Ac si terra odoramenta fuerint admota, recusare uidentur ac fugere. Inter dulcia atque amara ori admota labijs uel linguæ illita sentiunt: non aliter si ulla fuerint punctione pulsati, ex nostro officio tentam manum suo replicant uel colligunt. Item lacescenti collugent, ingemunt, attestante uultus rubore cum pulsu magno ex uehementibus atque fortioribus saltibus confecto. In declinatione uero plurimus sæpe sudor sequetur, ac feruens, & in dimissione limpida sinceritati proximi efficiuntur. Ac rursus in accessionem si redeunt ægotantes, peiorante passione plurimus seruen accedit

accedit cutis, & spiratio celer rima, quam Græci tachypnoëan uocant: oculorum conuersio, manuum con-
tractio, sudoris ignei defluxio, maculis emergentibus in thoracem atque uultum, & primo rotundos in fi-
militudine ulcerum, quæ iontus appellant. Item ab apoplecticis hæc discernitur passio, quod in ip[s]is
paruis atque creber pulsus inueniatur, & non ut in catalepticis maior atque percussibilis: & neque iucun-
dum, siue tetrum odorem accipiant, neque dulcia & amara consapiant. Item ab ijs qui ex stomachi pas-
sione obmutescunt. Siquidem in ijs rursus paruus atque imbecillis pulsus inueniatur, attestare singul-
tu cum manifesto tumore in stomacho apparente. Hæc est discretio similium passionum: sed ei curatio
adhibenda est, quæ epilepticis dicta est.

De uocis amputatione, quam Græci Phonē apocopen uocant. Cap. V I.

VOCIS amputatio fiet ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore, siue uisura faucibus asperatis,
uel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio sonitus emissæ per spiritum uocis, atque hirta, uel aspiratio-
nis tractu grauata locutio. Recenti denique passioni, atque eius initio conuenit adhibita requies, cum
abstinentia cibi, & spongiarum cum aqua frigida expressarum admotio gutturis per ambitum faucium,
quem anthereona uocant. Ac si passio uehementescere coeperit, ut maiora deposcat adiutoria, adhiben-
da phlebotomia. Tunc forbilibus cibus nutriendi, adhibitis etiam gargarismis ex oleo dulci atque cali-
do, siue calida ex oleo uel aqua mulsæ, aut decoctione uuarum, cantabri, ficuum pinguium, palmularum, gly-
cyrrhizæ, necnon etiam succo alicæ, uel ptisanæ, ut ex eorū uaporatione, siue exhalatione accensum spiri-
tum rapiant ægrotantes. Tunc etiam spongiarum adhibenda uaporatio, atque usus electariorum ex mel-
le decocto, & nucleis, & lini semine, & ouorum uitellis, & draganto ex mulso & uino præmolito. Dehinc
forbili ex amygdalis medicamine utendū. In declinatione uero lauacro atque uario cibo, & uino, deam-
bulatione, uel gestatione. Ac si querela tardauerit ægrotantium, erit in lenimento adhibenda drimypha-
gia, dropacismus, defricatio. Tunc etiam uomitus ex radicibus, atque uaria gestatione, & uocis exercitatio-
ne, quod Græci anaphonēsin uocant, adhibito præceptore, sicuti iamdudum docuimus, temporum ordine
seruato. Adhibenda etiam & arteriaca medicamina, quæ partes in passione constitutas exercent, à Græcis
amyctica appellata. Quorum compositionem libris Medicaminum conscriptam dedimus.

De influxione, quam Græci Catarrhon uocant. Cap. V I I.

FIET influxio nunc ad nares, quæ appellatur coryza: nunc ad fauces, quæ appellatur branchos:
nunc ad thoracem uel pulmonem, quæ appellatur phthisis. Sequitur autem eos, qui coryza uexantur,
grauedo narium & frontis, constrictio florum oris tenuissimi primo, tunc crassi atque uiridis, sternutatio
iugis, cum lacrymatione oculorum, acrioris qualitatis uel mordentis. Aliquando etiam tussiculæ impar
atque obtusa apprehensio. Item consensus sessionis oculorum, cum capitis atque uultus inflatione.
Eos autem qui faucium influxione uexantur, siue quod Græci branchos, quam nos rauicitatem uocamus,
sequitur pruritus quidam secundum fauces, atque titillatus, uox obtusa & grauis, & impedita locutio, ut
se præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam tussicula, & transuoratio difficilis: ac, si ad pulmones
fuerit facta defluxio, thoracis grauedo sequetur, & tussicula uehemens, cum sputis spumosis atque crassio-
ribus, tum saniosis, attestante difficultate spiritus, quam Græci dyspnoëan uocant. Aliquando etiam fe-
bricula, quæ noctis initio sumat exordium, cum uocis obtusione, & uomitu cibi. Sed hæc passio à peri-
pleumonia discernitur. Siquidem sit una ex tardis passionibus, & neque celeri atque acuta febricula cor-
pus afficiat. Item discernitur à rheumatismo thoracis, siue influxione, quod ceteris communibus si-
gnis sequentibus dolor etiam inesse uideatur in ea parte thoracis quæ pati perspicitur. Sunt autem ante-
cedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur, ut sepe probatur perfricatio profunda, uel extensio
uomitibus. Veterum igitur methodicorum alij stricturem hanc passionem uocauerunt, uelut expressis
humoribus atque coactis, in alia uenire loca eam fieri asserentes: alij solutionem, ut Thessalus manifestat,
atque eius decessores, ut Themison. Mnaſeas uero & Soranus, cuius etiam nos amamus iudicium, com-
plexam inquit esse passionem, & nunc stricture superante, nunc solutione: etenim constrictio atque
dolor accidentia sunt stricture, quæ Græci symptomata uocant. Multorum uero liquidorum egestio
solutionis est signum. Quapropter obtinente stricture, conuenit ægrotos iacere loco lucido mediocri-
ter, atque calido, adhibita abstinentia usque ad tertium diem, quem Græci diatriton uocant, cum requie cor-
poris atque animi, appositis lanis limpidis ac mollibus, oleo dulci atque calido prætinctis, colla circumdantes
& thoracem. Tunc oris collutio adhibenda, siue fotus ex aqua calida. In ipsa autem diatrito perungi
ægrotantes oleo calido atque dulci, fouenda facies ex aqua calida. Cibus dādus forbilis ex alica uel farre,
oleo, & anetho, uel paruo sale confecto, uel ex melle, aut alica ex mulso confecta forbilis trāsuoratio non
sine cautione atque coniectura utriusque passionis, ne alterā faciat superiorem. Ac si passio permanse-
rit, alia die cataplasmata laxatiua adhibemus, ijs scilicet partibus quæ fuerint in querela. Tunc cucurbi-
tam infigentes scarificabimus, ac deinde spongijs uaporantes loca relaxamus, aut calidis lanis contegemus
narium partes. Tunc gargarismum dabimus calidum mulsū, aut decoctione cantabri, & palmularum
pinguium, & noxarum, & glycyrrhizæ, uel eius succo resoluta ex aliquo liquore laxatiuo. Item electa-
rium dabimus ex lini seminibus & sesami frixi acetabulis singulis, & oui elixi uitello, & nucleis nume-

ro uiginti, & amygdalis amaris ex politis decē ampli drachma una, traganti drachma una, passo cretico de-
mollito, & mellis decocti sufficientis: quod medicamen in auellane modum sumptum sub lingua teneant
egrotantes: tum defluens ac deficcatum sensim atque paulatim transuorent, uel mel oleo concoctum.
Multi autem sub fabam fractam, quod Græci etnos acton uocant, idque linguae suppositum ac defluens
transuoretur, quo asperitas arterie liniatur. Vel ex amylo, & ex menta, & amygdalis amaris confectum
medicamen, quod habeat palmularum dulcium contritarum drachmas octo, & nucleorum drachmas qua-
tuor, & amygdalæ purgatæ drachmas duas, glycyrrhizæ succi obolum unum, hoc est drachmæ partem sex-
tam, draganti drachmam unam, collectis omnibus atque infusis ex uino protropo. Ac, si uenter officium
non agnouerit, simplici uentris laxatiuo utendum: & si fuerit caput grauatum, adhibenda detonsio, ap-
positis deinde laxatiuis medicaminibus. Tunc cibus alternis diebus dandus. Cum autem passio mite-
scere coeperit, danda olera, ut malua, lapathum, atriplex, quam Græci andraphasin uocant, beta cum pisa-
næ succo, uel alica, aut mulso, & pisces teneri, & uolantum teneriora. Ipsi etiam locis apponenda ceto-
taria ex meliloto concocto confecta, uel malagmata simplicia. Tunc lauacrum atque uinum adhiben-
dum. Ac si superans fuerit defluxio, quam Græci rheumatismum uocant, simili abstinentia utendum est
frequenter: sed frigido atque obscuro mediocriter loco ægrotantes iacere iubemus, & abstinendos a po-
tu, quo sitiendo siccentur. Cuius usus cum fuerit permittus, uel oris collutio frigida ex aqua paulatim
atque parua probatur. Tunc appositio spōgiarum ex aqua frigida expressarum, uel posca iisdem par-
tibus quæ fluore uexantur, hoc est thoraci atque gutturis summitati, quam Græci anthereona uocant,
nos rumam, aut lanæ limpide infusæ oleo uiridi conueniunt. Dehinc dabimus ore continendam, uel gar-
garizandam aquam frigidam, uel poscam, aut succum herbe calidaris, quam Græci helxinen uocant: aut plā-
taginis, quam iisdem arnoglossan uocant: aut uuam lupinam, quam strychion nominant: aut intybi, aut ene-
diuic decoctionem, aut buxi, aut rosarum. Item lenticulæ palmarum thebaicarum, lentisci uirgultis aut
rubi, quam baron appellant, singulis uel in unum mixtis pro passionis magnitudine. Aliquando etiā
diamoron, siue diasycaminon, cuius nota compositio, atque Medicaminum libris tradita comprobatur, ex
aliqua supradictorum liquore soluta. Tunc etiam epithemata constrictiua adhibemus, ut est mel deco-
ctum cum alumine schisto æquis ponderibus, uel aceto & aloë, aut ex palmulis, & malis cydonijs, & ijs simi-
libus. Item cucurbitam constrictiuam, & electaria, uel catapotia, ut est diacodion simplex, & uinum sci-
uelliticum coctum, donec mellis habeat crassitudinem, solum, uel cum melle admixto etiam cumino. Item
creticum uinum, uel passum similiter decoctum, aut tyrrheum, uel protropum, & omne quod adiuncta
dulcedine constringit, ut arteriam leniat, atque deficcet humorem. Item mel admixto modico cumino
concoctum, uel perlicæ lacrymo, uel plantaginis aride contusæ, atque cretæ puluere, uel rosarum aridarum,
& aluminis. Item troscisci medicaminis trigoni appellati. Tunc cibi ordinandi supradictis iandudum
temporibus, sed constrictiue qualitatibus, ut est oryza, uel alica ex posca, uel aqua frigida confecta, aut deco-
ctio palmularum thebaicarum. Item oua hapala, uel pulres paruissimo atque uiridi oleo confecte, oryza
uel milio, aut pulmēto frixo, aut alica, aut farre, aut ex amylo, uel ex ges asteros, & melle decocto admixto
quiddam supradictis, quo coagulentur, & uirtutem medendi maiorem sumant. Item thebanarum pal-
mularum decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, uel ex aridis palmulis pane cōfecto, & oleo
uiridi, atque rore syriaco, uel aceto, & galla. Ipsa quoque pulmenta, aut cibos aridos dare debemus.
Tunc hapala oua, uel lac, decocta cum amylo ad modum cotylæ, uel duarum, quod est pondus unciarum
decem uel uiginti. Dehinc danda olera constringentia, ut intyba, plantago, cauliculi. Sed hæc omnia co-
cta, atque aceto condita. Tunc pisces durioris corporis, atque uolantia non pingua, sed magis torrida,
uel ex aceto & aqua cocta. Tunc declinante passione uinum dandum est asperioris nature. Dehinc
adhibenda gestatio præfecto ore, quo spiratio nulla tangatur iniuria, dehinc lauacro utendum. Ac, si pas-
sio tardauerit, superpositionibus ac lenimentis uariata, erit in lenimento adhibenda deambulatio, & uocis
exercitium mite. Tunc leuis unctio ac defricatio, & cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate pas-
sionis solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi aut minuendi per regulam
cycli, usque ad uolantum atque agrestium, & porcine carnis percoctam partem tertiam: sicque panē an-
te pulmenti oblationem, si obtinens fuerit fluor, cum aqua. Dabimus etiam uuarum fabrilium uel pen-
silium siccatarum acinos, uel intybi thyrsum aceto prætinctum, adhibito lauacro, longo dierum intervallo,
tum drimyphagia. Dandum etiam lasar cum aceto atque liquamine ac deinde locis patientibus adhi-
bendæ cucurbitæ recorporatiuæ, quas Græci metasyncriticas uocant, & maxime anthereoni, hoc est tho-
raci, uel gutturis circulo, quem rumam uocamus. Tunc resinæ cabialis, hoc est dicaminis illinimentum
uel dropacis. Dehinc etiam ex puluere nitreo lacera fricatio, quam Græci mixin appellant, uel smegma
ta, quorum compositionem Responsorum tradidimus libris, uel lemnida cum oleo, aut pyrethro cum pi-
pere. Item unctiones ex syriaco, & opobalsamo, & laurino, atque irino oleo, & butyro, & pice liquida
apponenda naribus, atque narium cauernis. Tunc etiam sinapismus, & gargarismata ex sinapi, uel aqua
marina, aut decoctione thymi, origani, hyfopi, glaucij, quod nos pulegium uocamus, & horum similibus.
Dehinc mutatio locorum appetenda, & magis maritimarum: tum usus aquarum naturalium, ex quibus
erit caput fouendum. Decessores uero medici, nondum rigore methodico obtinente, in quibus est Era-
sistratus, secundo libro Salutarium præceptorum, & Asclepiades tertio Celerum passionum, item Them-
ison Salutari libro, atque primo Tardarum passionum, quas chronias appellant, meratum potum dari ius-
serunt. Ait enim Asclepiades, duplicandam uel triplicandam quantitatem uini solitæ temperationis,
adeo

adeo ut uni cyathum unum admisceri iusserit, quo uini & aquæ quantitas coæquetur. Sed hoc facit in tardante passione: etenim recentem atque nouam curans, libris quos ad Geminium scripsit salutarium, uinum prohibendum tradidit. Erasistratus uero etiam pileum uini calidi infusione inflatum capiti imponendum iubet. Lateribus uero ac præcordijs lanæ apponendas, uino atque oleo calido madefactas: quo primo neruorum uitibilis est merata potio, atque capiti faciens inflationem: dehinc etiam abstinentis uino, uel solutæ consuetudinis grauius atque noxius est usus pilei uino calido præfusi, uel lanæ tinctæ lateribus ac præcordijs circumpositæ ob dolorum uehementiam. Item Lufius secundo libro Tardam passionum, cum de ijs quæ faucibus accidunt disputaret, hoc est de supradictis floribus, etiam aridam siccam torridam, atque uino infusam ante cibum dari iubet: siquidem rudis atque noua difficilior sit digestionis. Sed hinc ait mixtum calidum sorbendum, hoc est uinum cum aqua supradicta meratum. Idem admixtam sandaracham, quæ sit ex oui albore conspersa, in quantitate oboli unius igni imponendam iubet, uel radicem herbæ tunficularis, quam uehion appellauit. Tunc per infundibulum ore raperesumum adducto uento imperat egrotantes, cum sit capiti uehementer contraria supradictorum inflammationis. Generaliter autem, atque communi repulsionem arguendos Erasistratum & Asclepiadem arbitramur, primo quod non uiderint pro passionis motu in curationibus urgentiora nimis præponenda. Themisonem uero & Thesalum, memorantes constrictiuam curationem libro hæc * demetico atque secundo Regulari, quem dieteticum uocant, culpandos arbitramur, quod non uiderint aliquando stricturam fieri superiorum. Item plurima sulphureosa admiscenda quod satis sit probauerunt, & lanis quibus thorax circumdatur aspergenda. Ordinantes etiam odoramenta iris illyricæ aridæ contusæ, atque eius oleum. Item opobalsamum, & melantium linteolo ligatum naribus aiunt frequenter admouendum, & anisum, & cuminum, & rutam, & antiflorum, uel distillationem amaracini olei, & samfucum, & styracem, uel ex eo oleum confectum, quod styracinum dicitur. Item hedicroum, uel murræ cum thiure & sulphure, & radicibus sylphij, quæ omnia caput implent, & propterea sunt euitanda magis accessionis tempore. In lenimento uero ratione recorporatiue uirtutis, atque interiecto tempore per interualla adhibita poterint iudicari.

De Tussicula. Cap. VII.

TUSSICULA nunc arida, nunc humecta corporibus irruit, multos ac pingues humores excludens: & quibusdam sola, quibusdam adiuncta respirationis difficultate, quam Græci dyspnoeam uocant: item cum sanguinis egestionem, aut phthysicam passionem, uel horum similibus affectis corporibus. Sed de ijs tussiculis quæ aliarum fuerint appendices passionum, singulatim scribentes docebimus. De ijs uero quæ suæ sunt, atque propria uexatione corpus afficiunt, nunc tradimus curationem: quæ ita erit adhibenda, ut de catarrho scribentes docuimus: discreta scilicet specie, quo possint electaria, atque pota medicamina, uel catapota, siue alia quæque sub regula medicinali recte mederi corporibus. Monendi etiam egrotantes, ne ultra modum competentem retinendo spiritum alterent potius tussiculam, quam mitigent. Quod quidem si fuerint moderati eius motum, facilius amputare quantum datum datur spiritum continendo. Tum apponendum, per quod eger adducto spiritu accipiat uaporem ex mulso, uel alica, aut succo ptisanæ: uel eorum quiddam sorbeat, aut ex aqua calida uaporem accipiat. Videnda etiā uua, ne ob tumorem sui aut indulta laxitate tussiculam prouocet: tum gargarismatibus, uel inunctionibus utendum, circa thoracem atque gutturis summitatem, quam Græci anthereona uocant. Epithemata etiam apponenda, & nunc laxatiua, nunc constrictiua: quorum species ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere uideamur.

De sanguinis fluore. Cap. VIII.

SANGVINIS fluor occultis ex locis ueniens uelut sæpe salutaris est, ita uehemens ingerit periculum, & quibusdam extemplo ob redundantiam floris celerans mortem corpore dissecto, & quibusdam in postremum effecta phthysica passione, uel uulnere non coeunte: siquidem primo tumeat, dehinc excorietur, atque fluidum ex uapore fiat. Sunt autem quæ conuentum siue glutinationem uulnere impediunt plurimæ, uel innumerabiles causæ: etenim natura altiora plurimum feruere necesse est, atque fluida qualitate manare, & multo uel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occulta atque alta, atque celata sint uisu, & à uicino medicaminum tactu remota. Frustrantur etenim frequenter eorum illatæ qualitates, priusquam locis patientibus aduenient itineris detrimento, cum non statim, uel extemplo illibata partibus patientibus admouentur. Sunt autem passionis antecedentes causæ, ut sæpe approbatum est, periculus uel casus: item exclamatio, uel ponderis perferendi conatio, uomitus uehemens, aut Venus pluri, & tussicula perseverans: item abstinentia hemorrhoidarum ueterum, quæ fuerint inertia amputatæ, nec iuxta methodicam rationem curatæ: item catarrhus. Sed non erit secundum has differentias curationis regula commutanda. Nominatur autem sanguinis fluor duplici significatione, propria, & abusua: nam propria est, qua ex supernis partibus labens fluor significatur, ut de capite per sensuales uias: abusua est, qua etiā ex inferioribus ascendens, fluor significatur, ut expulmone uel stomacho, nausea aut tussicula exclusis: improprium est enim fluorem uocare id quod ascensu quodam, non lapsu, fertur. Sed hæc Græci uersa uice posuerunt, derivationem nominis intuentes: ij enim anagogen uocant, quod magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat. Differt præterea fluor sanguinis à sputo, quod ne

que fluor sanguinis sputus dici potest : paruum enim materiae significationem sputus refert, fluor plurimz : neque sputus sanguinis fluor, supradicta ratione . paruum enim materiam sanguinis ex gingiuis, aut uua, aut faucibus emissam, sputum magis quam fluorem recte nuncupamus.

Quot, uel quae sint differentiae floris sanguinis. Cap. *XXII*

D I F F E R E N T I A S etiam floris sanguinis ueteres quæsierunt. Et quidam aiunt unam solam esse uel intelligi, hoc est uulnerationis, ut Themison libro Tardarum passionum. Alij uero eruptiones, ut Hippocrates, Euryphon. Sed Hippocrates solarum uenarum, Euryphon uero etiam articularum. Alij duas differentias posuerunt, eruptionis & putredinis, ut Asclepiades. Alij tres, eruptionis, & putredinis, & osculationis, quam Græci anastomosis uocant, ut Erasistratus. Alij quatuor, adijcentes expressionis, siue sudationis, ut Bacchius, adserens ex gingiuis sanguinem sine ulla uulneratione, uel in curationibus fracturarum sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri. Item Demeetrius Erophili sectator duas inquit esse principales differentias floris sanguinis : unam incisuræ, aliam siue ulla incisura. Speciales uero plurimas, quas principalibus subiiciendas ordinauit : etenim quam memorat incisuram fieri, in duas diuisit partes : quarum alteram uocauit eruptionis, alteram putredinis. Eam uero quæ sine ulla diuisura est, in quatuor diuidit partes : quarum unam uarietate fieri dixit, aliam expressione siue sudatione : tertiam defectione uel debilitate corporum, quam Græci atoniam uocant : quartam osculatione : uult enim eam differre à supradicta, id est expressionis, quam tertiā nominauit : osculanti enim inquit corpora nimia plenitudine, siue uirtute medicaminum osculantium, quæ Græci anastomatica uocant : & magis inquit uenarum ultimos fines, exprimi etiam sanguinem, siue excludi per uenarum latera. Item alij Asclepiadis sectatores unam esse dicunt differentiam floris sanguinis, hoc est eruptionem : siquidem omnem sanguinis solutionem eruptione fieri Asclepiades memorauerit, negantes eam osculationis differentiam : siquidem sit impossibile sanguinem crassum tenera fieri per oscula uel excludi. Item putredinis esse differentias negant : siquidem ex iisdem, non ex alijs, locis acrior humor fieri uideatur. Alij uero eundem Asclepiadem non naturaliter putredinis differentiam ab Erasistrato constitutam expugnasse dixerunt : non enim ex alijs locis acrior ueniente liquore pulmonem fieri in putredine accepimus, sed eundem quadam passione in putredinem, uel acerrimos transire liquores. Nos autem iuxta Sorani iudicium hac quæstione nullis commodis curationes adiuuari probamus : sed dicimus tres esse differentias floris sanguinis, hoc est, eruptionis, uulnerationis, & putredinis, siue lacerationis ex tussicula uenientis, sicut operantium manus iugi frictione lacessiti uulnerantur. Item sudationis siue uulnere, siue ex uarietate uiarum effectus fluor osculationis differentiam tenet, siue expressionis, uel cuiuslibet alterius causæ.

Quomodo intelligamus differentiam floris sanguinis. Cap. *XI*

Q U A E S I T V M etiam quomodo supradictæ differentię intelligantur, uel apprehendantur. Sed discernuntur hoc modo : nam eruptionis esse intelligimus florum, quoties repente egrotantes atque limpida sanguinem fluunt, nulla querela uulneris præcedente. Uulnerationis uero differentiam dicimus, siue putredinis, uel defricationis, cum adiuncto humore purulento sanguis excluditur, & non repete uel coaceruatim : præterea antecedente longi temporis, uel multorum dierum tussicula uel catarrho. Item sudationis dicimus esse, cum nullus fuerit uulneris sensus, aut acceptorum cibo uel potu acriorum materiarum mordicationis affectio. Qui sunt loci ex quibus sanguis fluit? Loci sunt plurimi, summitas faucium, arteria asperior, quæ etiam faux nuncupatur, pulmo, thorax, hoc est membrana quæ interius latera cingit, à Græcis hypozygos appellata. item membrana quæ thoracem à uentre discernit, à Græcis diaphragma appellata, quæ nos discrimen dicere poterimus : item stomachus, uenter, & secundum aliquos iecur, ac lier, & uena maior, quæ spinæ coniuncta. Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? Intelligimus locos ex quibus sanguis, fluor, uel lapsus fertur : quod erit aptissimum, ob adhibendam curationem iisdem, uel eorum uicinis partibus : & non, ut quidam existimant, commutandæ curationis causa, cum generaliter eadem cunctis adhibenda probamus. De ijs igitur qui ex supernis faucium sanguinem fluunt, primo paruus intelligitur ferri, aut si plurimus, non spumofus. Præterea cum quodam excreatu desputatur, ipse quoque partes sumpto cibo uel potu, aut gargarismate mordicantis materiae dolore pulsantur, & insipientibus nobis expressa lingua uisu locorum probatur asperitas. Plerumque etiam, ut Erasistratus ait, tubercula, quæ Græci condylomata uocant, uisibus occurrunt, quæ sint similia hæmorrhoidis, ex quibus sanguis fertur. Iis uero qui ex arteria sanguinem fluunt, paruus atque flauus sanguis ferri perspicitur : & sæpe saluus uel humoribus complexus in imaginem capilli unius aut multorum. Sequitur etiam pruritus uel mordicatio, & magis circa extantiam gutturis, cum quodam tiellatu & tussicula leui. Tum deinde plurimus sanguinis fluor, uox hirta cum dolore, qui nunc tactu moueatur, tunc tussicula uehementi plurimus, tenuis, & spumofus. & plurimum feruens sanguis excluditur, attestante thoracis grauedine, & aliquando dolore cum uoce. Et sæpe cibo quodam cum infracto somitu eo tempore quo sanguis excluditur. Iis uero qui ex diaphragmate, quod iamdudum discrimen uocauimus, & cætera prædictos sequuntur communia. Sed dolor inferius à pectore fiet rotunditate quadam thoracem pungens. Eos autem qui ex hypozygo sanguinem fluunt, multa similia supradictis sequuntur, sed dolor secundum latera

latera uel pectus, aliquando etiam inter scapulas fiet: ipse quoque sanguis minus flauus minus excluditur. In eos qui ex stomacho sanguinem fluunt, sine ulla tussicula uomitus sanguinis sequetur nigri atque gelati, & nunc solius, nunc cum admixtione cibi, attestante dolore inter utraque scapulas ad superiores tendentem, & magis eo tempore quo quidam remordentia transuorauerint ægrotantes. Accedit etiam animi desponsio cum fastidio cibi, & saluarum fluor, & corpore frigido, & pulsu obscuro uel demerso. Iis uero qui ex uentre sanguinem fluunt, cum supradictis, quæ sunt cunctis communia, sequetur etiam dolor & mordicatio, uel tormentum inter præcordia, & aliquando sanguinis particula per officium uentris excludetur. Item ijs qui ex iecore uel splene sanguinem fluunt, uel ex uena magna, quæ spinæ coniuncta est, ut quidam memorant, sensu loca designantur: nam in dextera parte præcordiorum dolorum dolore aurigineo sequetur eos qui ex iecore fluunt. Item in ijs sinistra parte præcordiorum hæc accidunt, quoties ex liene sanguis ferri perspicitur: uel secundum spinam, quoties ex maiore uena ferri dicitur. Sed hæc Soranus alta consideratione ex ijs locis per uentrem, uel per eius officium ferri sanguinem magis, quam per os posse credibilius approbavit. Iis uero qui ex gingiuis, uel uua, uel faucium lateribus, uel tonsillis sanguinem fluunt, supradictorum nulla sequuntur, sed locorum uulnerationem ore aperto oculorum approbat uisus. Item ijs qui ex capite sanguinem fluunt acceptum primo, uel exceptum internis uisceribus, atque ita redditum, si in arteriam defluerit, excludunt. Deinde cum tussicula uehementi etiam, quam de pulmone feratur similitudinem dabit. Sin uero in stomachum defluerit, uel uentrem, commota nausea uomitur, etiam quam ex iisdem locis ferri uideatur similitudinem dabit. Sed discerni hoc facile potest, siquidem ægrotantibus feruor igneus ora pertractans antecedit, & capitis grauedo uel dolor, & extensio uenarum, & magis earum quæ tempora uel frontem cingunt. Sequitur etiam faucium titillatus, & aliquando per narium quidam sanguinis distillatio, uel per eas cauernas quæ ad fauces ex capite descendunt. Quod aperto ore, atque experta lingua uisu probatur, & uicina loca quoque sanguinolenta apparebunt. Aliquando etiam remeantis materię causa laxiora transuorationis efficiuntur loca, & ægrotantes excreatu quodam sanguinem respuunt accipientes ex supernis adducto spiritu, ut sæpe mulculenta consueuerunt dormientes. Præterea in ore collectus excitat sanguis, uel transuoratus, & in stomachum, uel in uentrem ueniens premit permanens ægrotantes, aut reiectus releuat. Et ij qui passione afficiuntur, acceptis uel transuoratis remordentibus materijs nullam interiorum mordicationem sentiunt: quod necessario eos qui ex stomacho fluunt sequitur. Ac si in arteriam fluxerit, tussicula rursum excludetur. Quo reiecto ægrotantibus tussicula mitigatur: siquidem nulla inesse uideatur interioribus remanens causa, quæ tussire prouocet ægrotantes: nisi forte, quod est rarissimum, aliqua corpuscula gelati sanguinis inhereant interioribus locis. Item de pulmone fluens discernitur, quod iam præcedente tussicula in fluorem ueniant, inde tussire non desinant. Communiter autem, cæteris inter se paribus signis, ex arterijs ueniens sanguis tenerior, ac rubri coloris, & spumofus esse perspicitur: ex uenis uero crassior, & atrii coloris. Hæc est locorum singulatim posita significatio.

De effectu siue exitu supradictarum passionum, quem Græci apotelesma uocant. Cap. XII.

QUÆSITVM de euentu, siue exitu, uel effectu passionum: nam Erasistratus facile curabiles succulentos homines dixit atque fortes, & paruicolles, quos microtrachelos appellauit, hoc est qui minime longitudinis habeant colla. Difficile autem curari posse tenues ac debiles, & porrecta collorum longitudine formatos: in ijs enim, inquit, summa cum difficultate sanguis & tussis plurimam per longitudinem tractus, & quod obsident uuida plurimo tempore habitudinem gutturis siue cannae, quam arteriam uocant, & ob hoc graues atque tardas tussiculas faciunt. Item Asclepiades difficile curabiles inquit succulentos atque carnosos, ob uehementiam spirationis. Eadem ratione etiam ætates medias, & pueros: celerius etenim inquit spiritum ferri, & in sputis perficiendis offensione carniū retardari. Plurimi deinde etiam affectiones uitæ quæsierunt, & regiones, & temporum annales partes. Item per putredinem factum fluorem difficile curabilem dicunt, ab eo qui eruptione fuerit effectus: siquidem putrefactæ partes non coeant. Nos uero iuxta Sorani sententiam fluores sanguinis alios dicimus esse nouos corporibus atque recentes, alios tardi temporis atque inueteratos, & alios solos, alios cum tumore, alios etiam cum febricula & tussicula, & alios iuges, alios dimissionibus intercapedinos, ordine seruato, aut inordinatos, & insuper positionibus aut lenimentis magnis, aut paruis, & detracta uirū fortitudine, ac seruata. Hæc sunt enim urgentioris differentię, secundum quas diligentiam uariamus curationis, siue seruata, siue incerto motu existente passione. Sed difficile curabiles fluores præ cæteris dicimus tardos, magis recentibus, ob iugem perseverationem. Item cum tumore uel febribus, ab ijs qui soli esse perspiciuntur: etenim supradicti spem futuræ conglutinationis negant: & ob hoc cõplexioni contraria sæpe adiutoria poscunt, quæ sint diuersis aduersa. Item iuges fluores ab ijs qui dimissionibus mitigantur: etenim graue, atque minime tutum omne quod nulla fuerit mitigatione uariatum. Item inordinati ab ijs qui ordine seruato corpus afficiunt: est enim insidiosa curationi temporum inopinata uarietas. Non aliter etiam superpositione asperati fluores curatione difficiles ab ijs qui in lenimento constituti sunt iudicantur, ob prædictam rationem uulnere. Item ij qui plurimum corpus affecerint, atque uires ægrotantis insumpserint. Dat, etiam adiutorijs medicinalibus fortitudo corporis uiam. Hæc denique etiam in uulneribus nudis,

hoc est, in exterioribus partibus corporis constitutis fieri cernimus. Cum iuuenibus, uel, ut specialiter dixerim, athletis, & laborantibus hominibus facilia uulnera fieri uideamus. Senibus uero, & omnibus imbecillibus difficilia. Quapropter etiam uacuis, uel in exercitatis corporibus Asclepiadis dicta minime conueniunt. Item ulceratione facti fluores, difficiles curatione ab ijs qui eruptione fuerint affecti iudicantur. Siquidem transceso atque prætermisso initio nouitatis fructu caruerint, quo facilis glutinatio fieri solet: negat enim tarditas facultatem. Item eruptione facti fluores ab ijs qui sine eruptione fuerint difficiles sunt curatione: eius enim factæ glutinationes, alterius passionis initium referunt. Item ex partibus multis modis factos fluores, ab ijs qui paruo motu agitantur, difficiles curatione accipimus: est enim motus cohærentium partium disiunctio. Item ex occultis partibus uenientes ab ijs qui proprias tenuerint partes: etenim adhibita adiutoria occultis uel celatis partibus uitata suæ uirtutis synceritate perueniunt, sanis primo locis excepta, ac deinde transmissa. Ii uero qui ex primis locis fluores indomita adiutoriorum uirtute curantur, denique à stomacho, uel uentre, aut faucibus uenientes, facile curabiles approbamus: etenim pota medicamina patientibus primo locis adueniunt, & non nimio, aut iugis naturæ motu exercitatis. Ii uero qui ex hypozygo membrana fluores uenerint, difficiles curatione iudicantur: & magis si ex diaphragmate, quod nos iandudum discretorium diximus: item ex arteria, hoc est pulmonis calamo. Omnium præterea difficilis atque grauior curatione ex pulmone fluens accipitur, ob iuge spirationis officium: his enim qui omnem fluorem de pulmone uenientem incurabilem dicunt, assentiendum non est: sed iuxta Sorani sententiam difficilis est eorum curatione iudicanda: quippe cum uulnerationibus thoracis sæpe pulmo penetratus non intulerit mortem, ut ijs exclusis uel cadentibus, febri adhibita decisio in cicatricem uulnera fecerit conuenire, ut omnes approbant chirurgi, memorantes in bello quendam sagittatum penetrato pulmone conualuisse, sanguinem à sagitta uomuisse, nec tamen mortem fuisse consecutam. Hæc sunt quæ de effectu, siue de euentu fluorum credidimus ordinanda: etenim ex capite ueniens fluor generaliter est curatione facillimus: siquidem non multos sustineat motus. Nunc nobis necessario dicendum remanet, ne cui cœnotetesi sanguinis fluor adscribatur. Aliqui etiam Thessali sectatores recenti incisuræ, siue uulneris passione subigi dixerunt: non enim oportet locorum differentia cœnoteton mutare uirtutem externam. Igitur corporis eruptionem recentem dicimus incisuram, quo erit consequens, ut etiam interiorum eruptio huic cœnoteti subiiciatur. Sed ijs respondemus, quoniam passio non chirurgia, sed diæticarum traditur curatione: omne etenim adiutorium, quod adhiberi uidetur supradictis fluoribus, est diæticæ partis, non chirurgiæ. Quapropter diæticæ scriptores libris regularibus, quos diæticos uocant, de hæmoptycis scripserunt, quos nos sanguinem spuantes nuncupamus. Chirurgi uero in chirurgumenis hoc memorare non ausi sunt. Ipse quoque Thessalus secundo libro Diætico de fluore sanguinis scribens, nihil in chirurgumenis memorauit, & improprium, quod sola diæta curetur, in adiutorijs adhibendis chirurgiæ cœnoteta scribere. Nos uero iuxta Sorani iudicium, siue in exterioribus, siue interioribus corporis eruptionem factam recentem diuisuram recte dici probamus, atque etiam solutionem cognominamus, sed in exterioribus attentionem recentis uulneris iudicamus: hæc enim nos necessario rapit, siquidem solutioni diuisura dominetur, & figmentorum uel fabularum coniunctionem ex initio deposcat, atque hæc diuisura aptissima uideatur, quæ non in omnibus sunt congrua solutioni: etenim sagittarum diuisuræ laxatiuæ necessario accipiuntur. Interiorum uero eruptionum diuisura surgente solutionis cœnotetam ipsam magis cogimur iudicare: siquidem prior oculis occurrat solutio, ac deinde diuisura ratione atque intellectu mentis apprehendi uideatur. Secundo, quod cum sint multæ differentię fluoris sanguinis, omnes uni subiici solutioni, hoc est eruptionis & ulcerationis, & sudationis, quæ non cogatur. Hæc causa fluoris differentias querere, aut alicæ cœnoteti eruptionem adscribere: aliz ulcerationem, & non eidem sine ulcere uel ruptione, uel emissionem emissum fluorem. Tertio, quod nullo adiutorio chirurgiæ uti cogamur, sed omnibus congruis solutioni, quæ sæpe consequenter etiam glutinationem partium perfecerunt. Ad summum quidem, est recens incisura siue uulnus cœnotetes, sed ex medicaminum regula, quam Græci pharmaciā appellant, diæticæ parti ingesta apte curatur: quibus etiam supradicta passio concutatur, oblinente iudicio solutionis. Hæc sunt fluoris sanguinis cœnotetes: eas enim, qui ijs cognominari atque conscribi possunt, præscripta lectione tradidimus. Nunc curationem necessario ordinamus.

De curatione. Cap. XXXIII.

OPORTET igitur ex qualibet parte sanguinē fluentes iacere loco mediocriter frigido atque obscuro, lecto immobili, & schemate declinato, ut paulo promptius caput leuatum habere uideatur, stramentis non nimie cedentibus, neque calidis, & ut potuerint uno atque eodem schemate perseverantes, hoc est immobiles: præterea animi intentionibus resolutos: uehementer enim motibus corporis animorum uiræ sæpius turbationes addiderunt. Erunt etiam solo consternenda folia atque rami lentisci, uitis, mali punici, thalliz, muriz, salicis, pini, & horum similium, & quibus sine capitis iniuria constrictiuus aer adnatus atque confectus congrue ægotantibus inspiramentis inseratur: non enim cibi atque potus ratio ac diligentia curanda est, quæ interuallis distantibus adhibetur, quo constrictionis faciant commodum, uel fluentiam retineant, potius quàm aer, qui in pausibiliorem inspirationem adductus, omni parti atque particulæ

particulæ corporis ingressu suo fluentia faciat cohiberi, miti densitate persuasa. Conuenit præterea, ægrotantes delatiores leſti ſeſſione declinari, ut omnifariam immobiles curandi perſeuerent. Prohibere etiam occaſiones, quæ poterint paſſionem in commemorationem perducere, ut locutionis uel uisus: ne aut eadem plurimis fabulis reuoluendo, aut inſpiciendo quæ excluſa ſunt, uiſo admoniti commoueantur. Conuenit denique etiam ſanguineos colores parietum, uel ſtraminum, ſiue operimentorum declinare. Adhibenda præterea cibi abſtinentia, permittentibus uiribus, uſque ad tertium diem: non ob relaxanda corpora, ſed quo altiora, quorum eſt officium accepta digerere, immobilia perſeuerent: omnis etenim ciborum appropriatio motu quodam neceſſario perſpicitur: quo fiet, ut ea quæ ſunt aptiſſime conglutinanda, motu reſoluta differantur. Quapropter ob acceptorum digeſtionem ciborum ſumi prohibemus, & abſtinentiam utiliſſimam iudicamus. Prohibendi denique ægrotantes ab officio locutionis, ut ſi quid uoluerint, uſibus nutus, uel ſcriptura dari ſignificent: magis quando ex pulmonis cannula, quam Græci arteriam uocant, uel ipſo pulmone, aut thorace ſanguinis naſcitur fluor. Conuenit etiam articuloſum tenacior ligatura, ſi uehemens fuerit: denſitati etenim articuloſum patientes conſentiunt partes. Item ſpongiarum mollium ac limpidarum, & leuium, ex aqua frigida, uel aqua & aceto, uel decoctione mali punici, uel rubi, aut lentiſci, aut myrtæ patientibus partibus appoſitio, hoc eſt ex quibus ſanguinem ferri agnouerimus. Et erunt hæc iugiter commutanda, ne naturali corporis uapore tepelcant. Ac ſi ſpongiæ uiſæ fuerint ægrotantibus graues, erunt apponenda ptygmata ex ſupradiſtis liquoribus inſuſa, aut ſucco plantaginis, uel intybi, aut herbæ calicularis, aut uuæ lupinæ, quam Græci ſtrychnon uocant: uel ſemperuiuæ, quam aizoon appellant, aut polygoniæ, & acaciæ ex aceto ſolutæ. Ac ſi ex capite fuerit ſanguinis fluor, erit pſilothro expoliandum. Tunc fomenta adhibenda ex oleo uiridi, aut roſeo, aut lentiſcino, aut melino, aut murtino. Sin uero plurimus fuerit fluoris lapſus, radendum caput, atque gypſo illiniendum, uel acacia ex aceto, magis frontis atque tēporum partes. Perſeuerante fluore cucurbita quoque apponenda, ſubiecta flamma plurima occipitio. Si autem etiam per nares ferri uideatur, erunt ſtypteria immittenda ſicca, uel aceto inſuſa, uel alia qualibet ex liquoribus ſupradiſtis. Ora quoque ſpongia ex aqua frigida expreſſa iugi tactu detergenda. Tunc etiam cataplaſmatum adhibendus eſt uſus ex rebus conſtrictiuis atque epithematibus: quæ paulo poſt cum ſuis nominibus ordinabimus. Danda etiam aqua frigida, uel poſca frigida, aut gargarismus ſine ullo percuffu, quoties ex proximis partibus gutturis ſanguinem ferri uiderimus: ac ſi per inferiora, uel altiora ferri ſanguinem uiderimus, ſorbendos dabimus cyathos duos uel tres. Quod ſi minime mēderi ualuerint, etiam ſuccus plantaginis, aut intybi, uel uuæ lupinæ, aut polypodij, aut herbæ calicularis, aut roſæ erit offerendus, & neque plurimus iugiter, ne percuffu partes noceantur, aut liquidoſum inſuſione, quæ quidem ſunt conſtrictiuæ uirtutis, redundantia tamen laxare uideantur: neque ruſum longioribus interuallis: ſic enim frigus à nobis illatum naturali uapore obtuſum parui temporis medullam dabit uitiatam. Tunc tertia die tranſacta, hora acceſſionis ſolitæ articulos leuiter ungemus frigido atque uiridi oleo. Dehinc detergemus faciem quoque, ſpongia aqua frigida expreſſa retangentes: cibum dabimus paruum conſtrictiuum, ut panē ex aqua frigida, uel poſca, aut alica ſimiliter, uel oryza, decoctione Thebaicarū palmularum coſecta, uel caſdem ex aqua recenti coſectas. Aut ſi plurimum ualere hæc uoluerimus, aqua coeleſti, donec liquor mellis habeat craſſitudinem, aut ex malis cydonijs: tūc etiam danda oua tremula ex poſca, aut rore ſyriaco aſperſa. Dandus etiam panis ſimplex, aut inſuſus. Tunc interpoſito ſpatio temporis dandus potus aquæ frigidæ paruæ. Dehinc permittentibus uiribus alternis diebus æger nutriendus, etiam ſi nondum reſpreſſus fluor uideatur, uſque ad id tempus, quo cicatricem firmatam ſenſerimus. Quod quidem Themilonis atque Theſſali ſectatores uſque ad ſeptimum diem ſeruari dixerunt, hoc eſt trium diatritorum ſpatium: ut enim Antipater ait tertio Epistoſtarum libro ad Gallum ſcribens: Naturalis eſt ratio trini numeri, non ſolum in diebus, ſed etiam omnibus diatritis. Sed eſt melius, ut Soranus ait, quoniam non æquali tempore, nec dierum numero cunctis poterit cicatricis firmari ſoliditas, ob alias cauſas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali uariatam: neque nos unum atque eundem ſignare poterimus finem. Dehinc ſequentibus diebus aliqua erunt emplaſtrorum apponenda, aut epithematum conſtringentium atque frigidantium: quæ ſunt plurima particulariter. etenim Thebaicæ palmulæ uino acriori inſuſæ, uel aceto contritæ, admixtis malis cydonijs decoctis, aut mali punici corticibus, aut alumine, uel acacia, aut hypociftide, aut galla, aut cenanthe, aut aloe, aut cerotario ex oleo roſeo coſecto, uel melino, aut myrtino, aut lentiſcino, aut cenathino, aut mixto etiā maſtiche trito, aut melle decocto, galla cōtrita, aut aſpera, aut puluere mali punici, uel mānz thuris admixto alumine Liparo, quo malagmatis ſumāt omnia qualitatem, tum linteo, uel panano illinita patientibus partibus apponenda. Vel illud medicamen, quod libris Celerum paſſionum memorauimus, de cardiacis ſcribentes, & appellauimus diaroos, uel ex polento, & uirgultis rubi, uel arnogloſſæ, aut herbæ fideritis, uel uuæ lupinæ, aut caliculariæ, aut anulorum uitis, aut ſemperuiuæ. Item intyba cum pane ex aceto, aut palmulis, aut murtæ mollibus folijs, aut eiſdem ſemine uiridi ante cibum offerenda, uel ante cibum elixum aut non coctum panem, & plantaginem ex aceto coctam, & uiridi oleo, aſperſo rore ſyriaco. item bulbi ex aqua & aceto, & rore ſyriaco coſecti dari poterint cibo. Non aliter etiam cochleæ erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturalis utraque, & compaginandi uirtutem, cum proficiente curatione. Danda etiam pomorum quædam, ut mala cydonia cocta recenti mulſo: uel torrida, præſumpto tegmine, farina conſperſa, aut ſorba, aut mali punici grana, aut fabrilium

uuarum, item uolantium non pingua, ut sunt pectora turdorum, uel pullorum matrem sequentium. item columbarum, aut phasianorum, aut atragenarum, aut perdicum, quarum erunt murta pectora penetranda. Tunc etiam porcinæ carnes, cerebrum, pedes, auriculæ, ora, uel auricularū summitates, quæque uel fuerint nutritibilia, nec tamen difficilia digestionem. Dandum etiam catapotium ex melle decoctum, sub lingua detinendum singulare, aut admixto gummi, uel draganto: etenim sufficienter decoctum mel glutini in externis corporum glutinat diuifuras, non aliter etiam interioribus mederi necesse est, atque iam glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus etiam uinum, & magis illud quod fuerit mordicantis uirtutis, hoc est quodam sensu linguam remordentis. Tunc ad summam paulatim erunt ægrotantes refumendi, cum præcautione uehementium commotionum: sunt enim leuiter atque sensum mouendi, portatoria scilicet, uel cathedra longiore, & firmato corpore lauandi: etenim lauacra feruoris causa atque motus illati, quod corpora celerato spiritu agitantur recentium glutinationum, atque mollium uulnere redulcerantia probantur: cum enim oporteat coerceri atque densari patientia loca contraria qualitate, necessario ueuantur feruoris illati causa: inflata etenim parua ex occasione, atque turgentia redulcerantur. Præcauenda denique etiam uehementia exercitia, & magis retento spiritu peracta: tunc utendum peregrinatione terrena atque maritima: & si corpus uiderimus non attestante fortitudine augmenta carnis accepisse, erit abstinentia cibi imperanda. Tunc sequentibus diebus paruus dādus est cibus uino detractio: etenim cicatricis nouitas: quippe ex uenarum uasculis confecta, atque nondum fortificata, si carnis pondere fuerit prægrauata, necessario rumpetur. Semper autem oportet uentrem mitius emollire: aciores etenim dycteres incongruis motibus lacerant cicatrices, atque recursum faciunt passionis: ac si uehemens atque plurimus fuerit sanguinis fluore, erunt extendendæ adiutorij uirtutes. Acetum denique sincere dabimus ore retinendum, uel gargarizandum, aut sorbendum, spreto quorundam iudicio, qui asperum, uel tussiculam commouens, atque fluorem prouocans acetum dixerunt: siquidem etiam gelatum sanguinem soluat: etenim asperat, uel tussiculam commouet, si iugiter atque immodice fuerit datum. Solutum autem eius percussibilem uirtutem distantia temporum oblatione uariata, quæ non sensibili tactu, sed remissibili quadam digestionem longioribus actibus immoratur. item quod fluorem non prouocet, demonstrandum non est: siquidem sit manifestum, in externis corporibus uulnerebus constitutis necessario fecisse densitatem: & propterea conducibilis atque glutinantis uirtutis fuerit approbatum. Danda etiam acacia aceto soluta, aut posca, aut ex supradictis liquoribus: non aliter etiam hypocistis, uel licium indicum, aut omphacium, uel balauitium, aut cenanthe, aut polios herba, aut gentiana, aut macis, aut ponticum, uel ægyptia spina, quam acanthan uocant: quarum nunc sunt radices infundendæ, uel decoquendæ, nunc earum succi uel lacrymæ admiscendæ: siquidem sint frigidæ atque constrictiue uirtutis conuenientia obturamenta. Item corticis uasculi uetustissimi uini exusti triti puluerem asperum tribus cyathis poscæ frigidæ, aut decoctionis, de qua supra diximus, bibendum dari, in modum cochleariorum duorum: etenim constrigit cortex inueteratus, & magis antiquissimi uini commutatus tarditate temporis aucta uirtute. Utendū etiam trochiscis confectis ex supradictis speciebus. Item ex rosæ seminibus trochiscos, quorum compositionem Responsum libris de medicaminibus dicentes tradidimus. Item quod appellatur dielectrum: item cœnocraton, & alia similia: quorum compositionem, ut supra dictum est, Medicaminum libris tradidimus. Ac si coaceruatus perseverauerit sanguinis fluore, utendum etiam uehementioribus, quibus obturentur altiora, sua & teneritudinis causæ, tamen erunt ocyus adhibenda, ne passionis ipsius impetu in manibus nostris uitam linquere cœgantur ægrotantes. Prædicto igitur periculo eorum proximis aut ministris, uel quod producta uita spem sæpe dederint sanitatis, erunt hæc adhibenda supradicti corticis cinis exustus cum liquida pice spongiæ impressus, decoctio lentisci, & roris syriaci, & elygmaticum supradictorum suorum: nam hæc conficiuntur hoc modo: agmine uitis ustis uirgultis, atque ex eorum cinere confecto liquamine, scilicet aqua imbrali admixta, quam uulgo cisterninam uocant, dabimus ex ipsa bibēdos cyathos tres uel quatuor, nullis alijs speciebus admixtis: nam quidam in ijs, si febribus adficiantur, etiam uinum immiscuerunt uiuidum, uel spongiæ ustæ cinerem, qui conficitur hoc modo: spongia expressa aceto, atque pice liquida madefacta, uasculo nouo includitur testeo: tunc circumtegitur luto, & usque eo inuritur, donec carbonescat: dehinc trita in puluerem, ex quo cochlearis unius quantitas aquæ uel poscæ frigidæ mixta datur bibenda. Vel si uirtutem medicaminis augere uoluerimus, cinctam, ut supra diximus, spongiam liquidæ picis puluere bituminis aspergimus. Decoctio autem lentisci conficitur hoc modo: eius uirgultorum fumentes sufficientem modum aquæ imbralis infundimus sextarijs duobus. Tunc decoquimus: & cum semel uel secundo scitere uiderimus, expressas detrahimus lentisci comas: tunc liquorem decoquimus, donec ad tertiā partem deducatur, cuius cyathum admixtum duobus cyathis aquæ bibendum propinamus. Non aliter etiam electariorum decoctio conficitur. Ob electarium autem conficiendum erunt sumenda mala punica recentia uel infusa, nisi fuerint mollia: quibus contusis atque compressis, aliquantum detrahimus succum, atque decoquimus, donec mellis crassitudinem sumat. Et quantum medicaminis uirtutem tendere uoluerimus, tanto ualentius mala exuccamus, quo expressa ultimum atque crassiorem succum dimittant, ut etiam eorum cortex, si quid humoris habuerit, sudet. Conuenit etiam medicamen, quod Themison ordinauit hoc modo: mali punici partibus duabus aloë admixta pari cochlearis quantitate cum aqua frigida offerendum. Ac si solutio perseverauerit, addenda etiam constrictiua cucurbita patientibus partibus: tum dixiteon emplastrum, quod uehementer astringit, superimpositis spongijs aqua posca infusis, ut supra scriptum, ciborum qualitate permanente. Dādum etiam non

his initio medicamen, quod diaporon appellant, uel diasycaminon, siue catapotia, quæ Medicaminum libris prædiximus. Nunc autem perficienda conscripsimus hoc modo: gummi & acacia æquis ponderibus, admixto alumine scisso ad duplex pondus, quæ sunt colligenda decoctione papaueris, & danda quibuscumque in duplicem modum. At si quisquam non plurimum sanguinem fluxerit, nec tamen materia ferri cessauerit, conuenit etiam tertia die phlebotomiam adhibere. Etenim ex eo, quod sanguis ferri non quieuerit, manifeste conijcimus glutinationem partium non fuisse perfectam diuisuræ, siue uulneris: & propterea in tumorem uenisse perspicimus: omne etenim uulnus, quod usque in tertium diem glutinatum non potuerit, necessario tumescit. Thessalum denique indigna accusatione appetitum Sorani sententia recte purgauit: tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit, nutriendos constrictiuo cibo, non inconsequentia ordinans adiutoria, sed tanquam complexis passionibus apta, ut contrariis contraria obijcere uideantur. Ac si etiam intra diatriti tempus fuerit attestata partium grauedo uel dolor, aut spiratio difficilis, uel tussicula sicca, phlebotomare conuenit, atque aerem loci paruissimi trepidare, & ipsam partibus lanæ oleo calido uiridi expressas opponere, uel ob sanguinis fluorem ea ordinare, quæ glutinare ualent, sed uirtutis frigida non sint, neque transuorationis asperent loca, nec tumorem commoueat. Plurima dabimus etiam famæ terræ, quam ges astra uocant, unciam partem tertiam cum duobus uel tribus cyathis aquæ tepidæ. Non aliter etiam amyllum, uel argallicam radicem, atque foliorum eius succum. Conuenit denique sub lingua retenta eius radice particula, siue amyli, siue terræ supradictæ. Danda etiam ex gummi siue draganto, & thure, & opio, & ijs similibus confecta electaria. Tunc tertia die accepta diatriti temporis obseruatione, non solius floris, sed etiam febrium, erunt ægrotantes oleo calido atque plurimo, & uiridi perungendi. Facies quoque aqua tepida fouenda: cibus dandus complexionis passionis aptus, & pulvis ex oryza uel alica frixa, siue simplici, uel milio, & decoctio calida, sed non oleosa, ac potius sicca, uel ex oleo uiridi confecta, aut cum palmulis, uel amylo, admixto ges astra, aut argallicam radicem incoctam. Cæteris uero diatritis, hoc est interuallis dierum trino numero seruatis congestibus doloribus erit utendum fomentis, atque cataplasmatibus laxatiuis: nunc etiam cum scarificatione cucurbitis, siue hirudinum appositione, quas sanguifugas uocant: tum uaporatio spongiarum apponenda. Sin uero etiam fluor periculosus fuerit sanguinis, cum tussicula uel asperitate gutturis, erit utendum quidem constrictiuis epithematibus, sed calidis: dandum etiam sorbendum mulsum ex melle decoctum, & a uino abstinendum. Danda denique aqua potanda calida, sed paruo modo, tum sorbilia, quæ passioni uirtute apta mederi possunt, ut est amygdala ex posca in mulso decocta, quæ abijcienda, & admittendum amyli quantum ualeat mulsum in quandam crassitudinem redigere. Deinde similibus electariis atque sub lingua continendis medicaminibus utemur tempore amissionis, ut est mel atticum admixto gummi, uel draganto decoctum, aut glycyrrhiza, uel eius succo: nisi quisquam ægrotantium hoc improbauerit nausea commotus, quo eius stomachus facile moueatur. Item ex lini semine trito, & draganto drachmis duabus, & amygdalis expoliatis x x v, & strobilorum granis x x x, & oui unius tosti uittello, & amyli drachmis duabus, infuso passo sufficientis quantitatis, quo medicamen electarij crassitudinem sumat. Sin uero etiam rauci fuerint ægrotantes, erit mel decoquendum cum cæteris speciebus singulatum, resolutum draganto, ex infusione passi confecto: terminatur etenim asperitas faucium, uel transuorationis partes leniuntur, & tussicula mitigatur, sputa sanguinolenta reprimuntur. Danda etiam noctis initio, nisi febrium obstiterit accessio, simplex diacodion. Continuum uero medicaminum usum, quæ tussicula sunt appellata, siue eorum immodicam quantitatem necessario fugiendam mandamus: est enim melius simplicibus atque consuetis mederi rebus: illa enim temporaliter quidem mitigare uidentur tussientium motum, sed passionem totam faciunt deteriores. Ac si attestante tumore fluor perseverans produxerit tempus, in ipsa perseverare conuenit, quæ supra memorauimus, admixto etiam lacte. Si minui tumorem uiderimus, dandum quoque lac amyllum, & panis laganum, pulvis infusus, sed ex fermento confectum, quo panis habeat qualitatem, faciat etiam medellam meliorem. Strobilus denique cum suis fructibus, quod in semet habeat resinale, ptisana decoctus. Dehinc profectu cedente erit panis cum malua decoquendus, sed non exquisitus conditus. Danda etiam ptisana cum lenticula, quam Græci psyfanon uocant, & apponenda extrinsecus cerotaria ex murtino uel lentiscino, aut melino oleo confecta: tum urgentius augenda resumptio, ut supra demonstrauimus: atque ita abstento sanguine, quoad fuerit glutinatione perfecta, at irruente tumore erit conijciendum, uel aduertendum, utrum glutinatio fecerit retentionem, cum neque grauedo, neque dolor, aut punctio; uel pulsatio, uel saltus partium, aut extensio, uel febris cum arida tussicula, aut stridor, aut singultus, uel quæpiam sanitati impedita faucietas ægrum sequi uidebitur: sed sit æqualis atque ordinata spiratio, perseverans. Tum si tumoris causa fuerit retentio sanguinis temporaliter effecta, quæ necessario sordidum atque humidum uulnus efficiat, phthisicorum fluorem pronunciamus. Tum cum producto tempore sanguinis fuerit ruptio uariata, erit curatio pro motibus temporum uarianda, ut superpositionem emergentem eadem curatione curemus. In lenimento uero leues atque quietos adhibemus motus, sub magisterio aliptæ uel musici, quo etiam uocis exercitium artificis præcepta moderentur, cibus dandus ex mediæ qualitatis materia, adhibitis resumptiuis cyclis, in quibus non erunt repentinæ mutationes faciendæ. Sed nunc ex mediæ qualitatis materia primus ordinandus est cyclus, dehinc ex uolantum secundus: tunc ex agrestium tertius, atque ex porcinis carnibus ultimus: & coniunctis deinde duobus contrariis ordo dirigendus, atque ita omnibus, sed singulis materiarum speciebus erunt magis constrictiui.

gentia procuranda, ut in oleribus intybum, plantago : in marinis squillæ, nulli : in uolantibus perdices, phasiani, artagenæ : in agrestibus, lepores, caprez : & si celeriter ægros crassificari uiderimus, erit abstinentia intercalanda : tum uenter emolliendus . Vrendum præterea partiliter nunc aquæ potu, nunc uini leuiter remordentis : deinde ueniendum ad recorporatiuæ curationis materiam latenti motu adhibita drymyphagia, ex pisce gobione admixto melle . Dandi etiam pisces & cerebrum una tantummodo die, atque interuallatis diebus adhibitis localibus adiutorijs recorporatiuis, ut dropace, partibus primo quæ fuerint remotæ patientibus : tunc uicinis . ac deinde ipsis addendus etiam ex sinapismo rubor, quem Græci phœnigmon uocant, atque sicca frictio . Tunc torrendum corpus sole, quod Græci heliosin uocant . Adhibenda quoque paroptesis, & aliquando sicca cibatio, aliquando cum pane palmulæ offerendæ, & imitanda consuetudo frigida lauacri, atque potus paruus scilicet primo, ac deinde auctus suggestionem, quo possint etiam ijs ægotantes uti partiliter : facit enim duriora corpora, atque ualentia, acceptorum uel gestorum differentiarum contrariorum mutatione uariata : quanquam sint ex eodem genere uenientia . Vtilis præterea nauigatio approbatur, & peregrinatio comprobatur : inde enim res salutare uenienti . Præcauenda etiam Venus : facile autem hæc passio refricatur . Hæc est secundum methodicos ordinata curatio . Apud ueteres uero dissonantia sunt ordinata . etenim de schemate iacendi, atque phlebotomia, & ligatione, & constrictiuis, uel frigidis cataplasmatibus, & aceto bibendo uaria disceptatione pugnatum est . de schemate inquam iacendi : siquidem alij supinos iubeant ægotantes iacere : uel super eas partes quæ non patiuntur . Item Asclepiades consequenter approbat supra partes quæ patiuntur esse locandos ægotantes : siquidem cum scriberet necessarias esse curationes adprehensa causa sic fuerit elocutus, etiam sanguinem inquit fluentes ita esse locandos . Siquidem Erasistratus phlebotomari præcepit patientes . Alij uero eius sectatores etiam fieri principaliter damnauerunt adiutorij genus tanquam uinum uexabile . item plurimi nostrorum tanquam laxatiuum, & propterea inconueniens fluori sanguinis ex solutione uenienti, & indignum ad constrictionem . Alij adhibendum probauerunt, ut Hippocrates de morbis scribens, Diocles libro quo de passionibus, causis uel curationibus scripsit, Praxagoras libro tertio de curationibus . Item Asclepiades libro, quo de clysteribus scripsit : dehinc Themison secundo libro Tardarum passionum : & Thessalus secundo libro regulari, sed adiecta discretione : etenim si tertia, inquit, die rursum sanguinem fluxerint ægotantes atque plurimum, quod intelligitur tanquam in complexis passionibus, hoc est strictura obtinente, faciendum approbasse : alij uero omnes statim, atque sine ulla dilatione phlebotomandos dixerunt : & magis si ex thorace, uel pulmone sanguis fluxerit, uel plurimus auertendæ materiæ causa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum feratur, hoc est ad eas quæ non patiuntur, uel ob educendam materiæ multitudinem . Denique sæpe inquirunt faciendam consuetudinem, si oportuerit semel, & secundo, uel tertio, quo recurrens ex brachio post abstinentiam sanguis iterum auocetur, uelut Themison ait, secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium tons efficiat . Item ut alij ob euacuandas uenas, quo exeant late celerius concedant atque coeant diuifuræ, uelut Asclepiades, ad minuendum cursum siue spirationem, quibus passio adiuuatur . Item de ligationibus pugnaverunt : siquidem Xenophon & Dionysius, & Erophilus primo libro Curationum, & Erasistratus probet articuloꝝ faciendam constrictionem . Erophilus uero capitis, & brachiorum, & femorum : Erasistratus magis inguinum & alarum : etenim laxationem sensus sanguinis approbat fieri retentionem . Asclepiades uero ad ipsum scribens libros Parascualisticos ligationem excludit, eamque neque Erasistrato congruam : dicens, osculari non posse sub discrimine uenulas, quod Græci diaphragma uocant, uel misceri eas quæ supra diaphragma esse uidentur . Omnes etiam nostræ sectæ principes id approbasse uidentur : impressa etenim inquirunt ligaturæ uexat, non impressa inutilis esse perspicitur . Item Antipater tertio libro Epistolarum ait teneri materiam quidem ligatione, sed cum fuerit indulta uel relata, in repentinum atque immodicum fluorem ueniat : siquidem abstinentiæ causa altiora pendendo latere potius quam teneri uideantur . Item de constrictis cataplasmatibus plurimi dissenserunt : nam si Erasistratus hæc approbauit, Asclepiades excludit, tanquam materiam imprimentia, uel coercendo in latum reuocantia . Item acetum alij tanquam tussiculam uel fluorem commouens expulerunt, uel quod duras partes densando faciat . Themison uero ijs repugnans adhibendum iudicauit, attestante etiam Thessalo . Alij aiunt eius acrimoniam uel nimietatem temperandam admixtione aquæ . Plurimi uero contrariarum sectarum etiam clysteres, atque urinales aiunt uirtutes adhibendas . Item Diocles taurinum gluten bibendum dicit, farinæ concoctum & rubo, uel cum nepita amyllum uel marrubium, uel rosmarinum in aqua posca dandum . Motus uero alij adhibuerunt, non solum fricantes, sed etiam deambulationem imperantes post cibum, ut Erasistratus . Asclepiades uero de communibus adiutorijs scribens, gelitationem in hæmoptoicis prohibet . Utuntur quidam præterea etiam purgatiuis medicaminibus ex papauere uel helleboro, aut diagridio, quod Græci scammonian uocant, ut Diocles . Item sudorem mouentibus & uomitum, ut Praxagoras, qui etiam plurima urinaria ordinauit . Sed hæc facile iudicantur ex ijs quæ secundum methodicos tradidimus . Demonstranda tamen eorum contradictio, & breui ratione formanda . Peccauerunt igitur, qui supra patientes partes ægros iacere uoluerunt : omnis enim impressio siue affectio incongrua glutinationibus approbatur . Ceciderunt etiam falsa intentione decepti, qui non addita discretione phlebotomiæ memorauerunt usum : non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum fluorem sæpe fuerit uehemens strictura complexa : etsi secundum Erasistratum osculatio uenarum ex redundantia materiæ ueniens fluorem faciat, conuenit uti detractione : facile enim

enim corrigi uel reparari parua uirium uexatio potest : plurima tamen ex adiutorio patientibus utilitas fuerit . neque item in omnibus erit approbata phlebotomia : nam nullo tumore apparente uexabilis iudicatur : etenim corporis fortitudo necessario depurgatur, & stomachus uitiatur, atque debilitate irruente difficile coeunt diuisuræ, & eadem patienti uidebimur ingerere, quæ prohibenda suscepimus : quippe cum non auersio, sed potius partitio sanguinis fieri intelligatur, & duplici egestione celerata, nullam moris habeat dilationem. Dehinc erit anceps, utrum irruente rursus tumore phlebotomandi nec ne sint ægrotantes : sed phlebotomati apertissime interficiuntur, non phlebotomati magno adiutorio priuatur. Ligationes uero non tantum ad diuertendam materiam adhibendæ sunt, ut supra memorauimus : quantum ad densitatem uero faciendam adhibendas adprobamus : siquidem imprimendo coerceant : sed mediocriter adhibere, ne moderatione cessante uexare potius, quam curare uideantur. Peccat etiam Asclepiades, frigida uel constrictiua epithemata recusando. Sunt etiam inconsequentia Erasistrati placitis, sed officio congruæ curationes efficacia : nam solutionem constringunt, diuisuras conglutinant : quod ex uulneribus in superficie constitutis, & sub uisum uenientibus usu approbatur : quibus apposita apertissime profuerunt. Peccant etiam non aliter, qui bibendum acetum negant : non enim in omnibus fluoribus sanguinis dandum probatur, sed in ijs qui approbato atque largissimo fluore uexantur : in paruis enim aqua frigida sufficere potest, aut admixto paruissimo aceto. Ac si tumor fuerit attestatus, ut complexam passionem demonstraret, procul dubio constringentia fugienda, quantum res pati uel admittere possunt. Est igitur impræ proprium, uti ea quæ incongrue adhibita nocere demonstrantur, etiam cum necessario conuenire fuerint uisæ, prohibenda existimentur : etenim aduersantia solutioni tussiculam ex fluore uenientem mitigant, atque ipsum fluorem constringunt, & sanguinem retinēt cohibendo, & neque inurunt : siquidem sæpe reddita per digestionis uias patientibus partibus adueniant temperata atque admixta, liquida in alto constitutis : & propterea obtusa uirtutis uolentia perdurant. Sunt etiam clysteres contrarij : siquidem commoueant corpus, eo tempore præterea, quo conglutinationem faciendam nitimur. Hac ratione etiam urinaria medicamina atque uentrisflua magis noxia iudicantur : siquidem turbent atque uexent, & uertant stomachum. Item proterius omnibus uomitus, & propterea contrarius iudicatur : rescindit enim uulnera, nisi quis eum iam solidatis cicatricibus ob recorporationem adhibendum probauerit. Est præterea affectatio sudorum, quam Græci aphydrosin uocant, contraria : cum enim superflua atque redundantia tollere uidetur, laxatiuæ uirtutis causa coeuntia disiungit. Item taurinum gluten tensionem atque duritiam facit. Motus uero corporis neque excludendos generaliter approbamus, neque approbandos : siquidem prius quam passio declinauerit, requiescere debeant ægrotantes. In declinatione uero sint mouendi, sed non post cibum : tunc enim ob digestionem celebrandum tempus est quiescendi : quo fiet, ut prius quam cibum sumpserint ægrotantes, gestatione sint mouendi secunda, etiam deambulatione : etenim parua adiectione neque ulcerare fricantur, & in resumptione uirtus corporis excitatur.

De phthifica passione. Cap. XIII.

PHTHISIS, siue, ut plerique appellant, phthoe, quod corporis faciat defluxionem, siue corruptio nem, fit frequentius antecedente sanguinis fluore : aliquando etiam longi temporis tussicula, siue catarrho thoracis cum altiora lacerantur, & primo leuius, tunc ulcerata, facientia collectionem intrinsecus : quæ cū siccata non fuerint, citius sumat passionis initium. Sed non secundum has differentias erit efficacia curationis mutanda : siquidem antecedentes causæ, quanquam diuersæ, unam facere passionem uideantur. Sequitur autem ægrotantes febricula latens, & sæpe quæ initium declinante accipiat die atque ueniente luce leuiget, attestante tussicula plurima initio noctis atque sine cum sputis saniosis, ac paruulis, primo in ijs, qui non ante sanguinis fluore uexantur : quæ quidem admixta salua latere uideantur, secundo etiam plurima ferri uideantur. Iis uero qui ex fluore sanguinis in istam ueniunt passionem, primo sanguino lenta sputa efficiuntur, hoc est cruenta, quæ Græci hæmalopa uocauerunt : tunc feculenta, dehinc liuida, uel prasina, & in ultimo alba atque purulenta, dulcia uel falsa, cum uoce rauca aut acuta, & difficultate inspirationis, atque genarum rubore, & cæteri corporis cinereo colore. Item sequitur oculos exoletus aspectus, & corporis tenuitas, quæ nudatis membris proditur magis, quam ex aspectu uultus. Quosdam etiam sibilatio uel stridor thoracis sequitur, crescente passione sudor superiorum partium usque ad pectoris finem, cibi fastidium, & maior appetitus sitis, & quibusdam grauedo uulnerati pulmonis, ut etiam eius expuant fibras. Quibusdam punctio, ulcera thorace, pulsus debilis, densus, ac deinde formicalis, quem Græci myrmezonta uocant : digitorum summitates crassescunt, obuncatis unguibus, quod Græci gryposin uocant. Sequitur præterea inflatio pedum, & nunc frigus, nunc feruor articularum, nasi summitas pallefcit, atque aurium laminæ frigescunt. Tunc peiorante passione uentris efficitur fluor albidarum egestionum, & indigestarum, debilitatis, naturalibus digestionis officijs. Discernunt præterea plurimi purulentum liquorem, phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur : nam tetri odoris esse necesse est omne quod natura fuerit mutatum, uelut ex defluxione carnis ueniens. Item in aquam mittunt ægrotantium sputamina : etenim naturalia facile soluuntur : uitiata uero atque mutata perseverant, quadam tenuitate coacta, & subsidunt : siquidem sint grauia, & contra naturam ex defluxione carnis uenientia. Vicinæ atque similes passionem sunt phthicæ, syntetis, quam nos defluxionem dicere poterimus : atrophian, quam nos nutrimenti cessationem uocamus.

Item empyica passione, siue anaphoretica, quam nos purulentam, siue uomifluam dicere poterimus, quod ex uomica interioris collectionis purulenta per tussiculam excludunt sputa. Sed hæc discernuntur: siquidem ex ijs atrophica longo tempore faciat tenuari, nullis etiam attestantibus sputis: sæpe etiam sine ulla tussicula: etenim longo tempore febricitantes, atque tussientes limpida adhuc sputis affecti, necdum phthysici iudicantur, in phthysicam uero passionem prout ac decliues esse noscuntur. item empyica passio, siue, ut supra diximus, anaphoretica discernitur à phthysica, non aliter quam ulcerum collectione: quippe cum empyicos sæpe antecedit pleuretis, uel peripleumonia, & tumor immensus, & febres uehementes cum horroribus frigidis, & inordinatis. Dehinc quod sæpe coaceruata puris copiam excludant repente, ac deinde egestionem facta febribus atque horroribus præteritis liberentur, ut aut omnino ijs careat, aut ex parte afficiantur: in phthysicis ea quæ supra diximus antecedant, & liquida paulatim non coaceruata excludantur, & pro modo auctæ passionis etiam febres augeantur. Communiter autem hæc passio stricturæ atque solutioni erit adscribenda, & subiacentibus passioni temporalibus cœnotetis. In quibusdam etiam ulcerum differentias monuimus promouendas: sunt enim necessario intuendæ: siquidem complexa sit regulæ, quam diætan uocant, medicaminum ratio, quam pharmacian appellant. Denique si tumens ulcus fuerit, quod intelligitur ex dolore consequenti, & cæteris tumoris signis, conuenit ægrotanti calidus locus, & abstinentia unius diei. Tunc fomentatio laxatiua, atque cataplasmata, & cucurbitæ appositio cum scarificatione, & uaporationibus spongiarum, & totius corporis perunctione. Cibus quoque sorbilis, calidus, & magis panosus, obseruatis temporibus singulorum adiutoriorum, ut sæpe docuimus: ac, si tumens non fuerit ulcus, ob purgationem sordis erunt aquæ mulsæ cyathi duo uel tres offerendi ante cibum, uel fœnigræci sæpe torti decoctus succus, sed non ita ut uiscosus fiat, quod seruabitur: si secundo uel tertio mollius scatere cœperit, deponatur, quod sit colore uinosus, ac deinde uni cyatho liquato admiscemus mellis cochleare: habet enim uirtutem fœnigræci semen mitissimæ defensionis. Vel certe mulsum dabimus ex lini semine frieto, atque trito, admixto puluere, aut liquato linteolo limpidio, uel farina meregmi. Si autem maior purgatio fuerit facienda, irin illyricam atque herbum dandum probamus. Oportet etiam herbum rubrum aquæ infundere donec infletur. Tunc testa calefacta atque ignita molere, terere, ac deinde tum tenuissimo cribello eius pollinem mulso aspergere in cochlearij quantitatem, uel ex melle decocto electarium facere, admixto scilicet polline supradicto. Sed propter uehementiam herbi erit coniicienda sordis magnitudo, ut si fuerit putruosa, quam Græci dysoden appellant, tunc solo herbi polline utemur. Sin uero non ita fuerit cogens causa, admixto sesamo iri illyricæ æqualis ponderis aut superantis, pro passionis magnitudine: ac si plurimum putruosum apparuerit ulcus, ex ijs quæ feruntur, non solum per os conuenit herbi pollinem dari, sed ex ipso confectum etiam cataplasma aceto atque melle extrinsecus apponere. Tunc etiam lenticula simili usu adhibenda probatur: & præterea purgatiuæ uirtutis aristolochia & draconia herba, siue quæ appellatur aron: eius generis etiam marrubium approbatur, quanquam sit stomachi uexabile, purgatiuæ tamen uirtutis. Oportet autem eius manipulum tribus aquæ sextarijs decoquere, donec ad partem redeant. Tunc marrubium detractum proijcere, atque admiscere mellis boni libram, & rursum decoquere, donec ad suam ueniat crassitudinem. Ac si marrubium uiridius fuerit, tundendum atque exuccandum, & in unum cyathum succi libra mellis miscenda, & ita decoquenda, aut aquæ sextarij tres decoquendi, siue admiscendi, donec crassitudinem sumant. Faciunt etiam ex strobilis & amygdalis, & lini semine, uel supradictis electaria confecta. ite ex amygdalis, & prisana cum melle & lacte sorbile medicamen, & primo cum pane acceptum infuso melle. Tunc etiam singulare sorbendum paruissime, ad modum unius cyathi uel duorum: dehinc plurimum, longe ante tempus alterius cibi: quanquam sit in quibusdam hoc solum cibo sufficiens: etenim corpus nutrit, & uulnera reterget, & cruentos, uel purulentos: dehinc cum tenuia sputa ferri uiderimus, facit etiam strobili decoctio, quæ conficitur hoc modo: uiridem strobilum sumentes fructuosum, qui in semet habeat quædam resinalia, quem tribus sextarijs immixtum decoquimus, donec pars liquoris infumatur. Tunc detractio strobilo erit residuæ parti liquoris miscenda mellis libra, uel glycyrrhiza. Tunc decoquendo donec crassitudinem sumat. Conuenit etiam ex squillitico uino electarium confectum, ex quo erit sextarius unus libræ mellis admiscendus, & gummi uino perfusi selibra: tunc decoquendum mel, donec uinum infumatur. Potest præterea etiam melilotum linteolo ligatum tempore decoctionis immitti. item succus glycyrrhizæ similimodo, atque eodem tempore misceri probatur. Conuenit etiam diocodion medicamen cochlearis quantitate sumptum, uel butyrum cum melle electario datum: & præterea purgatiuæ uirtutis atque siccatiuæ hoc medicaminis genus marrubij succi uiridis sextarij tres, mellis libra una: quæ cum fuerint coctione crassificata, iris illyricæ immittendæ sunt drachmæ duæ. Sed oportet neque semel, atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus dari: uarias etenim materias posuimus: siquidem iugis speciei unius oblatio satiat ægrotantes, & propterea recusetur. neque accessionis tempore hæc danda mandamus. Quapropter uni etiam cætera in curationibus monemus intuenda, quo purgato ulcere humanioribus cibis utamur, hoc est ex mediæ materiæ qualitate. Conuenit interea motus latens pensili primo lectulo cathedra longiore, atque in uicina porticu. Adhibita etiam perunctione primo sedenti, ac deinde recepta fortitudine stanti, purgato ulcere dabimus uinum album, atque lene mediocriter remordens. Tum lauacrum adhibendum, quando etiam sicca conueniat cibatio singularis, uel cum palmulis thebaicis, & pulmento in cibum dato, uel arnoglossa herba, & uolantum non pinguis. Item sub lingua amyllum datum, quod retentum in defluxionem ueniens subiectis partibus patientibus irruat, & paulatim

paulatim adiuuet cicatricem, uel mel decoctum simili modo datum, aut paruo ex amylo admixto: tum
 etiam trochiscum, qui appellatur trigonos, uel mel uino remordenti admixtum parti suæ quâtitatis & de-
 coctum, donec incoquatur uinum. Tunc etiam antidotum, quod appellatur theriaca mithridatios, quæ
 in semet habeat siccandi atque recorporandi uirtutem. Item zopirios, & dierisimus. Apponenda
 præterea extrinsecus emplastra, quæ in cicatricem ducere ualeant, ut est melinon, ac deinde siccantia magis.
 Tum cum firmum apparuerit, lenimentum erit amithaoniô imponendum, uel polyarcon malagma, ad-
 mixto cerotario ex oleo cyprino confecto parte tertia: siquidem hæc singularia primo tempore ægrotan-
 tes ferre minime possint. Tunc cyclica regula adhibenda, sed quæ non repentinas habeat ordinem mu-
 tationes. Denique nunc uinum, nunc aquam potare permittimus, iuxta cycli rigorem. Danda etiam
 demyphagia, quam despuentibus sanguinem memorauimus. Adhibenda etiam localia adiutoria, simi-
 liter cucurbita, dropaces, & sympasmata, & paroptesis, & sinapismus, & bibendum medicamen, quod dia-
 pipereon appellatur: ualet enim callositatem ulceris tenuare, atque siccare. Fugienda præterea biben-
 di medicaminis satietas, & eligendus consuetorum usus: magis siquidem insueta materia uexatos stom-
 achus, atque fastidio supinatus prodat ægrotantes: & propterea uehementer utilis naualis gestatio, atque
 longa nauigatio, lectio, uocis exercitatio, & omne quod dare corpori fortitudinem potest. Veteres au-
 tem medici alij nihil de ista passione memorauerunt. Sed Diocles libris, quibus de passionibus atque cau-
 sis, & curationibus scripsit, iubet initio cibos detrahi, nihil de fine abstinentia significans, quousque sint æ-
 grotantes retinendi: tunc sudores commouendos, quibus necessario uires auferantur, & neque hoc, quæ-
 admodum faciendum sit, ordinauit. Vitur etiam anacoeliastmis, quorum qualitates non memorauit,
 adijciendos uerendum, siue deducendum à pulmonibus humorem, quando fuerat mitigandum potius ulcus,
 quam depurgandum. Item uomitum ex oxymelle adhibendum, quo corpus disijciendo ulceratas lace-
 rat partes: atque hoc iugiter, & post coenam faciendum probat: dehinc proterua mentis cæcitate dece-
 ptus etiam psichrolusian imperat adhibendam, & allium dandum, quod necessario uexet ægrotantes infla-
 tio: tum uino flauo utendum siue nigro, & propterea duro: atque post prandium deambulatione uexan-
 dos imperat ægrotantes, & nulli adiutorio sua tempora reddenda perspexit. Item Praxagoras secundo
 libro curationum, ijs qui pulmonis ulcere afficiuntur initio helleborum probat, atque sitim faciendam: tunc
 resumiendos: non aduertens primo resumptione, tunc helleboro utendum, quo possint eius laborem per-
 ferre ægrotantes. Ad summam, non resumpto uiribus deficienti helleborum non conuenit. Resumpto
 autem, uel fortificato exclusa phthifica passione comprobatur, & propterea usus hellebori recte prohibe-
 tur. At Themison secundo libro Tardarum passionem quædam recte, quædam caduca proteruitate cõ-
 posuit. Ex quibus est etiam pendentis thori gestatio, quo plurima parte diei ac noctis motu exercean-
 tur ægrotantes, cum necessario accessio uespertino tempore asperetur, atque luce surgente leuigetur: quo
 non solum laboriosus, uerum etiam intemporalis, & inordinatus motus ab eodem adhibitus approbatur.
 Etenim initio lucis, & dimissionis tempore nutriri cibo conuenit ægrotantes: est etiam noxium allium,
 quod imperat dare: siquidem inflationem maximam faciat. Vntio item ex feruentibus adhibita uir-
 tutibus, quam circa uesperam probat adhibendam, cruribus atque brachijs contraria iudicatur: tunc enim
 febres ardescunt. Imperat præterea inter duos uel tres egros lauandos, cum corpus elimatis uiribus de-
 biliter lauacri frequentia, & sordidet atque humectet ulcera. Præterea herbum, dehinc intybum, & plan-
 taginem, cum sit horum usus differentia temporum separatus: herbum enim purgationis adhibetur cau-
 sa: frigerantiam uero cicatricis obducendæ. Item imperat ulcera facienda extrinsecus iisdem quibus in-
 tus inesse senserimus, quod est perniciosum: putat enim auersione humoris facta ad exteriores par-
 tes altiora ulcera præficari: & propterea diutissime differendam sanitatem exteriorum ulce-
 rum, donec illa clauduntur. Imponenda nanque ait emplastra, quæ humoris prouocant
 defluxionem: cum humoris defluxio iuxta sapientia placita nullius commodi te-
 neat fidem: sic etiam plurima localia adiutoria adhibenda conscripsit, quæ ta-
 men multo tempore magnificas ulcerationes, hoc est, quas nos extrinse-
 cus infiximus, in cicatricem uenire cohibeant, impediens plu-
 rima quæ congrue adhiberi possunt, ut defrica-
 tiones, dropaces, cucurbitæ, sinapismi
 paropteses, et alia quæ cum
 uehementissime
 profunt;
 ulceratione cutis præfecta adhiberi non possint.

De suspirio, siue anhelitu, quem Græci asthma uocant. Cap. I.



ANHELATIO, siue suspirium ab accidenti nomen sumpsit. Vocatur præterea secundum aliquos spirationis difficultas, quam Græci dyspnœan uocant, siue orthopnœan: siquidem sese præfocari sentiant, cum iacuerint ægrotantes, atque erecti facilius spirent. Item, ut alij dicunt, contrario uocabulo suæ uirtutis nomen accepit: nam cum sui ratione conuertat ac deprauet, tanquam corrigat orthopnœa nuncupatur, quam nos spirandi dicere correctionem poterimus: multa enim contrariæ interpretationis uocabulum sumpserunt, ut fella, quæ Græci glycea uocant, uelut dulcia, cum sint amarissima: Grauat autem atque premit hæc passio magis mulieribus uiros, & iuuenibus senes, atque pueros, & durioribus natura corporibus teneriora, hyberno atque nocte magis, quam die uel æstate: in quibusdam ex initio generatur: in quibusdam perfectis irruit passionibus: sed magis ex profundo frigore sequitur patientes spirationis difficultas, & frequenter natura celerior magis quam tarda. Item præfocationis sensus secundum thoracem, atque grauedo, & feruor igneus. Item enteron ad superiora conductio, & cum passio uehementescere cœperit, stridor atque sibilatio pectoris cum uocis debilitate. Tum extensio colli atque uultus cum rubore, & oculorum suspensio attentu, & iacendi potestas schemate supino, tussicula nunc arida, nunc uuida, cum sputis tenuibus & spumosis, aut crassis & uiscosis, & sudoribus, & colore morbo, atque pulsu humili. At si grauior impetus superpositionis fuerit, ora ægrotantium liuescunt: & quidem excluso per nares humore mucilento releuantur, atque præfocationis carent metu: quod non aliter cedit, etiam si super oculos lacrymarum fuerit fluor. Variantur autem tempora passionis superpositionibus & lenimentis, & nunc limpidis atque synceris, nunc sordidis, & passionis tractibus implicatis, ut etiam tunc leuis difficultas inspirationis inesse uideatur: quæ facile prodietur, si ægrotantes itinere ascensibili gradiantur, atque ocys pergant: uel indigestione, aut usu uenerico affectu, uel frigore, atque puluere, siue fumo grauentur. Differt autem hæc passio à peripleumonia, quod neque cum febribus necessario fiat, & semper tarda esse uideatur. Itæ secundum aliquos discernitur ab orthopnœa: siquidem hæc cum stridore atque præfocatione asperetur: orthopnœa uero cum thoracis euerfione atque singultu, aliquando etiam cum sanguinis fluore. Item secundum aliquos magnitudine discernitur: uehementem enim dicunt orthopnœan supradictis passionibus. Sed est melius, ut uno atque generali concursu passionum potentiam iudicemus, ut nunc uehementem passionem dicamus, & magis accessionis tempore, nunc leniorem & magis dimissionis tempore. Est autem passio stricturæ, quapropter conuenit, ut mox corpus inuasit, siue cum repetendo superpositionem alperauerit, iacere ægrotantes altioribus stramentis, thorace atque capite subleuato, loco lucido atque calido, mediocriter adhibita requie, & abstinentia cibi usque ad tertium diem. Et si uires permiserint, pectus regendum lana, atque fouendum oleo dulci calido: adhibita quoque articularum blanda calidarum manuum fricatione, ut etiam tenendo medeamur teporibus admotis tempore quo accessio uehementescit, & cucurbitæ lenissimis raptibus detrahendæ. At si præfocatio coegerit, & uires permiserint ægrotantis, adhibenda phlebotomia, & diatrixi tempore unctione antecedente sorbilis atque calidus & uariis in dimissione offerendus cibus, atque alternis diebus, donec passio declinet. Sin uero imbecilles uiribus fuerint ægrotantes, diurnis diebus dabimus cibum: sed ea die, qua abstinere oportuerat, paruum: ea uero, qua dare licebat paulo, plurimum. Sin uero officium non agnouerit, simplex clyster adhibendus, et ante cibum mulsæ ex melle despumato duo uel tres cyathi præbibendi. Tunc cataplasma laxatiuum atque cucurbita cum scarificatione adhibenda thoraci, & in utraq; scapulas, ac magis paulo inferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium eius raptus efficiatur. Tum uaporatio spongiarum, atque cerotarium, & malagma quod diachylon appellant, uel mnaseum: atque ita lauacrum, & uinum, & uariis redendus cibus. In lenimento uero, si corpus passio tardauerit, erit adhibenda resumptio, gestatione, uocis exercitio, deambulatione, unctione, fricatione, corporis retento spiritu: tum lauacrum, atque cibum ex pulmentis mediæ qualitatibus. Dehinc ad re corporatiuam curationem transeundum. Adhibenda drimiphagia, atque ceterarum transitus mutationum, quas sæpe cyclos ordinantes docuimus. Tum etiam ex radicibus uomitus, uel si passio coegerit, etiam helleboro prouocatus. Iubemus præterea acetum scilicet ægrotantes ante cibum sorbere, uel cum aceto nitrum, siue laser, aut hyssopi decoctionem cum fico contritum, uel nucleo pineo, quem Græci pityda uocauerunt admixto mulso. Item abrotonum tritum cum sulphure, atque aceto ex mulso confectio, uel urticæ semine, aut radicem, & horum similium electarium, ut est melli admixta resina terebinthina, aut cartamum, quod nasturtium uocamus, aut sesamum, cum aloë, & amygdalis amaris. Aliquando etiam pipere, uel oui uitello: uel illud electarium quod diascyllis appellamus, cuius confectionem de Medicaminibus scribentes tradidimus. Tum etiam cucurbitæ re corporatiuæ adhibendæ thoraci, atque inter scapulo: dehinc dropax, paroptesis, heliosis, sinapismum, acopa, re corporatiua

recorporatiua malagmata, ut est diadaphnidon, uel dialoe, uel diaeuphorbio : dehinc nauigatio atque peregrinatio terrena, & potio theriacæ antidoti, & aquarum naturalium usus, quarum præstant in Italia cotyliz appellatæ, siue albæ, uel nepefinæ. Tum etiam catadysmus, hoc est aquarum illisio superne, iisdem locis qui patiuntur : utilis denique maritima, & plurima mare tenus conuersatio, atque consuetudo frigidi lauacri, quam psychrolusian appellant. Aliqui autem aduersarum sectarum principes etiam dauco cum aceto & melle ægros potauerunt, siue iri cum mulso, & uentrem plurimum deduxerunt, dando de diagridio, quod scammonian Græci appellant, obolos tres, cum duplici pondere aloes siue hieræ, quam catarticā uocant, uel ammoniaci salis obolum, siue opoponacis simile pondus, uel cneoron, aut polion herbam, uel peplion, aut calchantum, uel thapsian, aut asininum lac, & castoreum, non solum lenimenti tempore, sed etiam in augmento, siue superpositione passionis. Alij uero etiam urendum thoracem, uel caput crediderunt. Themison quoque secundo libro Tardarum passionum in quibusdam eisdem compeccasse uidetur, cum plurimum uentrem depurgandum credidit ex diagridio, atque in ipsa accessione. Utitur præterea cōstrictiuis, atque ijs acrioribus : & imperat dari thapsiæ succum cum opoponace, aut sagapeno, ex quibus stomachus necessario uexatur. Hic denique erit memorandum, quia potis medicaminibus non sine cautionibus utendum est, ut neque eorum plurima satietate uexandi ægrotantes. Item in impetu uel asperitate passionis recorporatiua adiutoria prohibenda : erit enim coenoteta consideranda, qua facile medicamina qualitatis ratione accedente correctius approbamus.

De stomachicis. Cap. I I.

A PARTE corporis quæ patitur stomachica passio nomen accepit : sed non omnis stomachi quærela illico passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum concursu signorum, & perseverantia cōfecta, atque corporibus tardans, repetendo superpositionibus lenimenta. Plurimi igitur singulatim speciales curationes eius tradiderunt : nunc de stomachi duritia dicentes, nunc de uentositate, de rheumatismo, & debilitate, & horrore ciborum, & fastidio. Themison quoque primo libro Tardarum passionum solutionem circa stomachum, quam appellauit rheumatismum, secundo libro uentositatem. Item Thessalus secundo libro regulari curationem separauit soluti stomachi atque inflati. Nos uero communiter sub una propositione de omnibus dicere curabimus, qua uentositatem uel ex tumore duritiam cōfectam strictura iungimus : fastidium uero, siue horrorem ciborum, & corruptionem ambiguam utrisque principalibus passionibus subijcientes. Antecedentes causæ quæ stomachi passionem faciunt, ceteris quoque passionibus generandis communes esse probantur, sed magis ista iugis indigestio parit, siue post cibum gemitus, & perfrictio profunda : item mœlirudo & medicaminis insueti potatio. Sequitur autem in passione constitutos accessionis tempore animi defectio, articularum frigidus torpor, aut uariatus per membra acrior naturali feruor, qui magis medias teneat manus : tum roscidus sudor, & animi angustia, iactatio, anxietas, siue concatenatio mentis, & desponsio, coloris mutatio, pulsus paruus, celer, imbecillus, corporis tæbes, cibi fastidium, uel maior ciborum appetitus : tum corruptio acceptorum cum acore in bromosam uel fumosam transeuntium qualitatem. Quibusdam etiam uocis amputatio, & dentium confrictio, siue concubitus, in separabilis capitis grauedo, aurium tinnitus, & quibusdam fitis insatiabilis : cum in accessu tumor maior fuerit excitatus, oris siccitas, & saltus sub præcordiorum partibus : tum dolor in eadem parte, aut etiam inter palas tenens, siue latius, cum se tumor uberius infuderit : dehinc transuorandi difficultas cum præfocabili sensu. Quo denique commoti quidam nostræ sectæ principes, Epistolarum libris hoc accidentiæ genus stomachicam synâchen uocauerunt. Durescente autem stomacho sine ullo feruore atque dolore, cetera communia signa sequuntur : tunc ligneus earundem partium sensus, & magis inter palas, si omnis aruerit stomachus : sin uero in superioribus erit transuorandi difficultas, donec ad eius fundum accepta perueniant : aut si in eodem fundo, quem Græci basin appellant, fuerit durities, erit transuoratio facilis : sed post eius perfectionem grauatio sequetur, tum durities, atque extantia in interioribus præcordiorum. Ac si uentositas fuerit stomachi, tensio sequetur inflatione coniuncta : tunc capitis plenitudo cum oppressis atque iugibus ructationibus, testante grauedine, quæ magis accepto cibo sentiat. Tum sonus in interioribus liquidorum tanquam semipleni folliculi, errante uento per inania : atque ita tensione laxata, erunt ructatione releuandi : & si etiam intestina fuerint conflata, rugitus interiorum sequetur, quæ Græci borborygmon appellant. Ac si solutio fuerit stomachi, quam rheumatismum uocauerunt, sequitur saluarum fluor, & quibusdam iugis sputus, & oris humectatio nauseabilis, cum mordicatione interiorum quibusdam plurimus uomitus crassioris, uel tenacis, aut fellei, & præsini humoris, uel alterius cuiuslibet substantiæ circa supradictos colores. Sin uero occulta fuerit solutio, quam Græci adelon appellant, aut imensa signa uideantur, quæ Græci logothoreta uocauerunt, sequitur debilitas pulsus ægrotantis, & ueluti stomachi pendentis atque tremantis sensus, marcor ac defectio animi, quæ Græci lipothymian uocant, quæ sumpto cibo temporaliter depellatur resumptione suffecta, nec tamen perseverabili : sed rursus in eandem relabent defectionem, in imagine ultimæ passionis. Quo fit, ut nisi quis celerius sumpserit cibum, summa defectione iactetur. Sic denique plurimi impausabiliter tota die atque nocte cibum sumpsisse ueteribus traduntur : nanque Asclepiades memorat, Praxagoræ famulum ternos bilibres panes per singulos dies accepisse : quibus comestis non aliter passione afficeretur, quàm si nihil acciperet. Sed ab ista passionis phagedæna discernitur : siquidem in ipsa non insumantur, uel digestionem tradantur accepta, sed gra-

uatione sequente euomatur. Hæc sunt quæ stomachi rheumatismo occurrunt: sed circa regulam methodicam discernentes superpositionis tempore contrariarum adiutoria passionum stricturæ ac solutionis, quæ suis speciebus signis approbantur, in lenimento communi sèpissime curatione utemur, quam re corporatiuam dicere poterimus, à Græcis metasyntericam appellatam. Cum igitur primo stricturæ passio corpus inuaserit, atque noua temporis causa fuerit ægrotantis, siue in superpositione constituta turbando, aut dolore, aut uentositate affecerit patientem, conuenit eum iacere loco lucido, atque calido mediocriter, adhibito straminum atque operimentorum calidorum usu: & si uires permiserint, adiuncta abstinentia usque ad tertium diem, & accessionis tempore omnifariam requiem: tum articularum blanda conuenit defricatio, cum quodam calidarum manuum amplexu, ut etiam tenendo medeamur. Dehinc uaporationes inter scapulas, siue palas adhibendæ: pectori quoque saccelli calidi ex cantabro confecti, siue polline: nam Græci omphacomeli uocant, & harum similium materiarum. Conuenit etiam multiplicati linteaminis uaporatio, siue pannorum, uel plagellarum, quæ Græci ptygmata uocant, oleo tinctarum, cucurbitæ igni externo uaporatæ, atque leniter appositæ iugi atque frequenti mutatione. Aliquando etiã testea uascula, quæ Græci amphoras uocant, siue uitrea: tum fomentatio studiosa ac iugis, ex oleo calido atque dulci, uel in quo maluæ agrestis radices decoctæ sunt: si singultus fuerit, sicyonio: si inflatio, ruta uel anetho. Ac si uocis fuerit amputatio, in accessionis affectu decumbentibus erunt spongijs aqua calida expressis ora uaporanda, & distinctio dentium facienda digitis immixtis, quibus lenius gingiuas depri-mamus. Tum capitis fomentatio, & resumptionum moderamenta adhibenda, ut panis calidus, uel cucumis, aut melo, uel terræ gleba aqua calida infusa, & oris collutio ex aqua calida, & accessione uergente parua potatio: ac si in uehementiam passio uenerit, adhibenda phlebotomia: qua perfecta, si tertia fuerit dies, quam Græci diatriton uocant, erit ægrotans unctione curandus, calido scilicet ac dulci oleo: tunc oris adhibenda collutio: cibus offerendus paruus, leuis, calidus, sumptione facilis, ut sorbile quiddam ex pane atque melle, & sale, & anetho confectum, siue pultrícula molli, uelut ex pane, aur alica, & oua sorbilia: tum alternis diebus permittentibus uiribus eger nutriendus, donec passio declinet. Potus præterea dandus est plurimus, sed neque maioribus haustibus haurientibus, neque coaceruatim atque eodem tempore, quo potius ignotos impleri, quàm relaxari faciamus. His autem partibus quæ fuerint in tensione constitutæ, cataplasmata conueniunt laxatiua, ut est præ cæteris ex fœnigræci pollinibus, & semine maluæ ex solo melle, & paruo oleo admixto confectum, quod plurimo tempore corporis possit sine ulla grauatione immorari: tunc cucurbita adiuncta scarificatione, siue hirudinum appositio, quas uulgo sanguisugas appellant: deinde cataplasma, & uaporatio spongiarum expressarum liquoribus sæpe memoratis. Declinante passione si ulla durities fuerit consecuta, erunt cataplasmata apponenda, ut nuper docuimus, admixta resina, siue in olei uicem liquida pice, uel ex radice hibisci, & adipe porcino, recenti primo, tum ueterato confecta, siue ex hordei pollinibus, aut lolij semine, & arido fico & hibisco: tum etiam ex oleo calido embasis, siue ex uarietate eiusdem per diuersa uirtutis fœnogræci decoctione, uel radices maluarum, aut lini semine. Dehinc cibus uariandus, sed qui nullam faciat inflationem, neque digestionem tardius approbetur, sed omni facilitate conueniens, ut cerebrum porcinum, pisces teneri, atque olera quæ uentrem molli-re ualeant: tum lauacra conuenit adhibere, atque uino ægrotantem resumere leni. Utendum etiam malagmate quod diachylon appellamus, siue maseum, uel diamelilotum. Et si uentositate fuerit stomachus affectus, adhibendum diasamnicum, siue diaspermation: quorum compositiones de medicaminibus Responsorum tradidimus libris. Si rheumatismus fuerit, quem nihil aliud quàm solutionem accipimus, conuenit ægrotantem iacere loco mediocriter frigido, supino schemate, attritis ac teneribus stramentis utentem, adhibita requie & abstinentia, sicut superius diximus, permittentibus uiribus, tum tenacior ligatio articularum: uel si causa coegerit, constrictio facienda apposita cucurbita stomacho, plurima flamma subiecta: dehinc solutione cogentes spongia frigida: atque odoramenta quæ percutere minus ualeant caput, ut exhalatione sui frigus ingerant ægrotanti, ut mala cydonia, pira, sorba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, uel pulentum infusum, & ijs similia, oris collutio ex aqua frigida siue posca. Ac si plurimus fuerit saliuarum fluo, expuere iubemus ægrotantem: siquidem retentus stomachum soluat: transfluoratus autem humectet atque obducatur, & propterea gemitet solutionem. Sed hoc conuenit facere urgenti tempore, ne meditatio potius expuendi fiat, atque exinde prouocatio fluoris augeatur. Perseuerante passione gargarismata sunt adhibenda ex supradictis, uel ex aliquo succo ad fluorem sanguinis præscripto, qui ualeat frigore, atque propria uirtute mederi: uel si res coegerint, ex iisdem spongiæ expressæ, sicut in alijs docuimus, gutturi admouendæ, siue pectori, & interscapulo. Lenius autem atque idem faciunt ptygmata ex supradictis expressa liquoribus: constringunt enim saliuarum fluorem, & nauseam releuant, quod non minus etiam masticata conyza, atque exputa, siue mastiche contrita, & lactucæ albæ semen facere ualent. Possunt etiam potio dari ea quæ congrue medeantur, ut duobus aquarum frigidarum cyathis seminis aspergantur cochlearia duo, siue masticis cochleare unum, uel plantaginis, siue mali punici dulcis, uel acidi succus, cum particula menthe paruißima, uel cucumeris semine contrito. Dandum quoque medicamentum confectum, quod diaporon appellamus: item diamoron, siue diaroon, & ijs similia: quorum compositionem Medicaminum docuimus libris. Cauendæ præterea horrentium materiarum fabulæ, quæ quadam commemoracione uomitum commouere uideantur: utendum cataplasmatibus, quæ nuper de fluore sanguinis scribentes docuimus: diatriti tempore adhibenda perunctio ex oleo Hispano, siue lentiscino, uel murtino, qua præcuratus ægrotans, ora fouenda aqua frigida, uel spongijs ex ea expressis detergi: tunc cibo resiciendi

ficiendi constrictio, sicut de fluore sanguinis conscripsimus; atque ita parua interposita dilatione frigida parum aquæ paulatim bibat. Quod si quisquam non ualuerit sustinere, calidam dabimus, ut nimio ferore constringat: imitatione enim uelut uisuræ partium perficit densitatem. Ac si cibum sibi in stomacho natate senserint egrotantes, conuenit articularum impressam ligationem facere, ita ut in aquam fermentem manus ægrotantium mittere, uel si maiora cogunt, etiam constrictiuam adhibere cucurbitam: & primo ori uentris, dehinc inter scapulas, siue palas, quod metaphrenon Græci uocant: & aliquando tertiâ inferius à prima conuenit adhibere. Ac si cibus fuerit reiectus, secundo nutriendi sunt ægrotantes: & si permiserit ut diatrixi rigore seruemus, erit alternis plurimis paruus cibus offerendus, quo quidem diurnis diebus, sed non simili modo ægri nutrirî uidentur. Sin uero stomacho collectus humoris fluor moridicationem fecerit, ilico excludendus, si plurimum superare fuerit uisus: non quidem digitis immisissis, quo uomitum prouocemus, ne magis influant acriora, & ex partibus sanis, uel quæ passione contaminate non fuerint patientibus aduenire liquida faciamus: quippe cum consuetudo sapissime transeat in naturam. Ac si plurimum edax fuerit humor, nec tamen ita superfluous, ut ex sua sponte per uomitum excludi uideatur, ob facultatem reiiciendi, quo minus euersio fiat stomachi, dabimus potum: & perseuerante solutione, cataplasmatum, siue medicaminum uirtutes augemus. Tum si orexis, siue appetitio cibi fuerit impedita, dabimus ea quæ naturam ualeant excitare, ut intybi thyrsus, uel lactuce, & magis albæ, atque acetato tinctæ: tunc albas oliuas, & panem posca infusum, cum paruo pulegio, & sale, & Hispano oleo. Item pulsem ex pane, uel tragoptisana, atque posca, & oleo, & sale paruo confectam, & anetho, uel porro capitato, uel tragoptisana, quæ ex lenticula atque alica conficitur: sed erit assanda lenticula. Tunc immittenda mala cydonia, uel orbiculata, siue scaudiana, ut plerique uocant, uel mala pira, aut sorba, aut pira duracina, quæ crustumina uocant, uel folia plâtaginis mollia, aut intybi. Aspergenda etiâ alicæ siue oryze, grana mali punici, uel uuæ fabriles: dehinc etiam uina quædam infundenda, ut murtinum, malinû, uel ex malo pinico confectum, aut hydromel inueteratum, uel quod melimelon appellant, aut hydromelon. Danda etiam damascena, & malum assum uel elixum, uel quidquid ex supradictis. Sic etiam uolantum, quæ nulla pinguedine accipientem grauent, ut passerum pectora, uel perdicum, aut attagenarum: tunc etiam quadrupedum leuia, deinde porcina crura. Item maritima, quæ non sint contraria solutioni, ut squille, mulli, carabi, bucini, spondylia, conchylia. Ac si cibus in acorem trãsierit, iisdem erit perseuerandum, atque eodem potu, cui erunt aspergenda coriandri seminis drachmæ duæ: tunc etiam asperiori uino utendum, quod Græci hypausteron uocant. Perseuerante fluore, erit etiam trochiscis utendum, quos hæmoptois & coeliacis potâdos scripsimus. Lauacrum interea tardius ac serius ordinandum, & multo atque longo tempore prohibendi egrotantes bibere, priusquam cibum sumplerint, nisi aliqua forte maior necessitas intolerandæ sitis occurrerit: erunt nanque dâdi cogentibus rebus ex uino asperiore aqua commixti duo uel tres cyathi. Sed si forte complexionis passionum aliqua fuerint signa perspecta, erunt urgētiora conijcienda, quibus ordo magis seruiat curationum. Plurimi uero medici stomachicos putant eos, qui durtia laborauerunt, & singultu, castoreum ex aqua mulsa solutum quâtitate pleni cochlearis tribus cyathis aquæ miscentes. Eos autem qui fluore stomachi, hoc est rheumatismo laborauerint, aquâ potât, miscentes aloes cochlearis pleni quâtitatem, uel infusione, uel decoctione, aut succo. Sed erit præcauenda medicaminum dandorum satietas, ac magis inlocandæ qualitatis, quam non solum egre perferant egrotantes, uerum etiam officio appetendi cibi deserantur, & propterea passionis augeatur perniciēs. Hæc etiam de illo potando medicamine, siue antidoto, quod hieran appellant, dixerimus. Facienda etiam laboriosa, atque dolore grauissima ignis uisura: sed in lenimento oportebat egrotantium fortificare corpora, atque resumere uaria gestatione, & pro modo uirium sub diuo deambulationes adhibere, siue lectionis exercitium, si fuerit literatus egrotans, uel ut communiter dixerim, uocis: tum unctionem ac defricationem, & eos motus qui magis humeros ualeant exercere retento spiritu, & nunc palæstra corpus agitare, tum laacro rarissimo, in ijs qui fluore uexâtur stomachi: iugi autem ac frequenti in ijs qui strictura laborare uidentur. Vinum uero, atque uarium cibum constrictiuum prioribus, laxatiuum sequentibus ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & olera mollia, accedente regula methodicæ disciplinæ, minuendæ augendæque quantitatis. Dehinc adhibenda recorporatio, quam Græci metasyncriticâ uocant, ex acriori cibo, quem Græci drimyphagian appellant, ex aqua capparis confecto, & aceto, & sale, & cepe: sed ex depositis, quæ temporis requie accepto marcore inflabilis uirtutis careant qualitate. Dandæ etiam rapæ sinapi madidatæ, atque salsum ex aceto & oleo conditum: uel aceto, & mulso, & sinapi: aut mulso ex uino confecto: quæ quidem erunt uarianda. Admiscendum etiam piper pro ratione uirium, atque passionis magnitudine, ut nunc uno, nunc duobus, nunc tribus acribus pulmentis utamur. Conuenit etiâ fifica fricatio cum aspergine corporea facta. Tunc frigidi consuetudo lauacri, quam psychrolusiam appellant, & cibi ficiores magis in ijs qui fluore, hoc est rheumatismo laborauerunt: tum rubor cutis faciendus inter scapulas, & in thorace usque ad uentrem, nunc ex feruentis resinæ lenimento, nunc ex picis, nunc ex dropacis, primo communis ac lenioris, deinde compositi ac uehementioris: atque ita nitri fricamento utendû, & sole torrendum corpus, quod Græci heliosin appellant: aut paroptêsis adhibenda ex carbonibus, uel parietibus ignitis, & ceromate: aliquando etiam ex fico calefacto: tunc defricatio ex nitro, atque oleo, & adarce. Adhibenda quoque acopa ex euphorbio, & diagridio, & pyrethro, & pipere, & sinapi, uel succo ferulaginis, quem Græci thapsian uocât: ungenda corpora, uel admixta cera imponenda, donec sufficienter inflari ui medicaminis partes uideantur. Conuenit etiam uomitus arte affectatus, quo cor-

pora dissecentur: & primo ex aqua mulla, uel ex aceto squillitico melli admixto singulari, uel adiuncto semine eruce, aut cardami, aut urticæ, aut sinapi, aut fassamenti multi ex aceto & melle: tum etiam ex radicibus: ultimo quoque helleboro lenticulæ admixto, uel oryza, in ijs qui rheumatismo fuerint affecti: cum sorbilibus uero succis qui stricture. Adhibenda etiam ptarmica, quibus stomachus commotione capitis contremiscat. Item sorbendus, aut infundendus rhinenchyto ferramento naribus succus cydamini, aut eruce, aut anagallidis herbæ: gargarizandum sinapi ex aceto & melle, decoctio thymi, aut origani, uel pullegij, aut hyssopi, aut squillæ succus cum aqua mulla, & cetera similia eius generis quæ fuerint, & magis cum initia atque summitas stomachi callosa uidebuntur, uehementiore modo curationis indigentia. Tunc etiam adhibemus quædam aciora, uel horum exhalatione egrotantes haustu suo hortabimur adducto spiritum recipere, quo etiam altiora agitatione medicaminis demutentur. Sumpto igitur fistili uasculo immittimus poscam: tum admixto nitro, origano, cardamomo, mastiche chia, carbonibus subiectis decoquimus. Sed erit primo os uasculi prægypsandum, immisso utraque ex parte forato, cuius summitatibus oui uacua imponimus testam, ex utroque suo uertice perforatam: cuius altera cauerna calamo inferatur, altera uaporem fumet acceptum: tum egrotantem iubemus ore aperto supradictam cauernam labijs amplecti, siue oui, ut supradiximus, uerticem, atque ita eius exhalationem excipere: cuius quidem feruor erit moderandus, ne nimietate partes exurat. Atque ita si plurima & perseverans mordicatio affecerit egrotantem, erit mitiganda simplicibus gargarismatibus, ut aqua calida, & oleo, siue lacte, aut decoctione cantabri, aut succo ptisanæ, uel noxarum decoctione, aut amyli cum aqua. Oportet præterea etiam partibus in passione constitutis apponere medicamen, quod polyarchion appellamus, uel diadaphnion, & horum similia, quorum compositionem Medicaminum tradidimus libris. Dandum quoque medicamen theriacum bibendum, quod diechidnon appellamus: cuius quoque compositionem Responsionum dedimus libris. Tunc egrotantes maritima natatione exercendi, atque catadysmo curandi, hoc est aquarum illusione, suppositis partibus patientibus. Animo præterea securo atque facili esse conuenit curandos, & aquarum naturalium usum adhibere, ut sunt in Italia quæ Cotylæ sunt appellatæ, & Nepefinæ: lauacro atque potu aptissimo utendum, adhibita aeris mutatione longa, terrena, maritima: exercitationibus uarijs palæstrarum, adhibito præceptore, utendū: atque ita iisdem resumptionibus corpus conuenit recurrere. sic enim perseveratione & uentofitas excludetur stomachi, & aliæ quoque supradictæ passionibus depellantur.

De Phagedæna. . . Cap. . . I I I.

EST etiā phagedæna ex stomachi passionibus, qua affecto sequetur cibi uehemens appetentia, quæ Græci orexin appellant, & coaceruati accipiendi cupiditas, & immaficata transuoratio: tunc grauedo atque tensio, & propterea uomitus, quem sibi coacti atque oppressi prouocent egrotantes, corporis macies, pallor. Aliquando etiam uultus inflatio, oris pendor: quibusdam etiam gingiuarum putredo, cum scabro dentium detrimento tritus, uisus obtusio, sed passioni genus philonij in problematicis non daturus nos iterum pollicemur: interposito enim tempore digestionis rapiuntur accepta, atque repletis uis quos Græci poros appellant, obtunditur appetitus. Erit præterea curandum, tempore quo cibamus ea ministrare quæ parum nutrant, sed quanta ui queant appetentiam obtundant: ut sunt olera quæ non relaxent, ne uomitum moueant, sed constringant potius. sic enim sui quantitate famem sentiunt, atque uirtutem propria digestionem non grauando perficiunt. Bibere autem non prius, quam solidus sumitur cibus, ijs qui fame urgentur utilissimum iudicamus: siquidem potu impleti minus solidos appetunt cibos: phagedænicis uero hoc conuenire negamus. humectatus etenim stomachus in uomitum facile prouocatur: & liquefactus atque supernatans cibus facilius nauseam prouocat egrotanti. Erit igitur sensim uomitus differendus, atque eius consuetudo mutanda, ut interpositis diebus parum demus aliquando cibum, & appositione cucurbitarum eius adiuuemus descensum, qui solitis suis insertus teneatur. Alia uero uomitum permittamus, ac deinde paucis interpositis diebus prohibeamus, uel iterum adhibeamus, sed in adiutorij uicem, hoc est ex radicibus: tum etiam ex helleboro, quo regulæ curationis adiutorijs localia concurrant recorporatiua uirtute medentia, & partes ad fortitudinem naturalem ducant: quorum usum ex supradictis, atque in alijs passionibus ordinatis accipiendum ducimus.

De iecorosis, quos Græci Epaticos uocant, & lienosis, quos splenicos dicunt. . . Cap. . . I I I I.

UTRAQUE passio à locis patientibus nomen accepit: siquidem sit in iecore, uel in liene constituta, tumore scilicet effecta siue collectione, uel duritia atque saxitate, quam scirrhopin uocant. Sed de tumoribus libris febrium docuimus. De collectionibus uero, siue uomicis specialiter docemus. De duritia uero aut saxitate, quæ cedente tumore efficiuntur, nunc prosequemur: sequentur enim quædam communia iecorosis atque lienosis, quædam specialiter propria, sed communia, grauedo, spirationis difficultas, & magis in itinere ambulationibus diuosis. Tum piger motus, atque anhelatio, & sitis, & oris siccitas, coloris mutatio, pedum inflatio. Aliquando etiam febricula latens, & hydropismi suffusio, cum continua cibi corruptione. Propria autem, uel specialia iecorosos hæc sequuntur, extans durities, siue scirrhopis in dextera parte præcordiorum, schemate rotundo costis ex aliqua parte subiecta, & propterea ueluti decisa. Ex alia uero parte circumscripta atque rotunditate terminata, color sæpissime æruginosus, sine

siue arquati similis, quem Græci icteron appellant, urina turbata, uelut sandarachæ colore. Et accessio-
nis tempore dolor tendens usque ad dexterum iugulum, atque palam, & difficilis supra latus sinistrum ia-
cendi copia: siquidem adducantur dexteræ partes suo pondere pendentes, & propterea grauedine atque
doloris punctione ægrotantes afficiant. Tum fellofa stercoreum egestio. Lienosis uero extans durtia
atque laxa sub sinistra parte præcordiorum inuenitur schemate longo porrecta, & ueluti pectus inuadens,
uel umbilici sæpissime transgrediens finem, atque latitudine superans, nunc minime, nunc uehementer, ut
omnia conata uideantur, & insipientes eo falluntur, ut membranam tumere, siue extare putent, quâ Græ-
ci peritoneon uocant, colorem plumbeum, atque accessionis tempore dolor tendens ad iugulum sinistrum,
& palam, & difficilis supra dextrum latus iacendi copia. Memorant plerique, etiam multitudine pedicu-
lorum ægrotantes affici, & grauiore per somnum sudore, attestante ueretri in officium uentris erectione,
& assidue è naribus sanguinis fluore: præterea oris foetor ægrotantes afficit, cum gingiuarum putrefactio-
ne & defluxione. Sæctarum principes meminerunt, tenuari etiam cutem uentris, & uenas nigras appa-
rere, atque crassiores, & in cruribus ulcera difficile in cicatricem, uel indecenter uenientia. In ijs igitur
communiter oportet superpositionum tempore tanquam in tumore curando calidum iacentibus prouti-
dere locum: tum fomentis & cataplasmatibus, & cibis laxatiuis uti tempore, quo sæpissime docuimus,
sed tenuibus ac sorbilibus: tunc cucurbitæ atque scarificationes, & sanguifugarum conuenit appositio;
quas hirudines appellant, & uaporationes: ac si uehemens fuerit, adhibenda phlebotomia ijs omnibus an-
teposita: tunc clyster, si uenter officium non agnouerit, sed ex decoctione fici singularis, impressi patien-
tibus locis: flectetur enim, & exercitio quodam durties resoluetur. Conueniunt etiâ frequentes cyclo-
rum mutationes: denique inter paucos dies adhibenda drimyphagia: tum radicum uomitus cum aceto
squilletico, uel certe helleboro erunt disijciendi: tum alia mutatione resumendi ægrotantes, adhibito usu
aquarum naturalium, atque natatione maritima, & uaporatione locorum natura spirantium, quo etiam
sudores moueantur, non ob uirium fatigationem, sed quo possit calida spiratione ac naturali corporatio
fieri patientium partium. Conuenit præterea etiam in litore sicco ex harena soleignita paroptesis.
Tunc malagmata quæ corpus ualeant papulare: & primo leuiora, ut est polyarthion, ex caphiso fonte &
salibus confectum, quod diahalos appellat. Item ex tribus resinis, quod diaretismum uocant: tum etiâ
ut est quod appellant diamyrepficon balanum. Item diaoriganum, & diacardamum, uel diathaphias, &
diabellum: quorum omnium compositiones Responsum libris explicauimus. Sed ijs quæ sunt
uehementia, ut est diathaphias, ita erit utendum, tanquam sinapismo uti solemus. Hæc est secundum nos
curatio eorum qui durtiam, siue scirrhom in iecore uel in liene habuerint. Apud ueteres autem medi-
cos plura, atque dissonans & turbulenta curationis ordinatio inuenitur: alij enim phlebotomiam reci-
sarunt in lienicis, ut Apollonius Citienis: alij probauerunt. Atque horum alij ex dextro brachio ieco-
rosos, & ex sinistro lienosos phlebotomandos dicunt: alij ex talo eius partis quæ patitur: alij ex medio
digitorum omnifariâ uarijs extimationibus tentati: sumit enim atque deposcit ex ijs partibus, quæ facile
diuidi possint, phlebotomiâ faciendâ, hoc est brachiorum uenis, nisi forte ipsæ tumuerint, & ob hoc opor-
teat longe à patientibus partibus phlebotomiam adhibere, quod iniuria lateat adiutorij. Item alij de
ustionibus adhibendis certauerunt, & quidâ solis aiunt lienosis conuenire: quidam autem iecorosos ex
medicaminibus scaroticis adhibitis, siue cauteribus, & horum alij urenda, alij superurenda probauerunt, at-
que altius in lienicis cauteris infigendos: quorum quidam simplices, quidam trifulcos, quidam serratos ap-
probant frigidos: tum uustionis ulcera humectantes, atque in fluore humoris longo tempore prouocan-
tes scirrhom defluxionibus auferendam crediderunt, ex quibus tumores atque indignationes & consen-
sus cum uehementibus febribus necessario sequuntur: siquidem peritoneos membrana, quæ est natura
neruosa, ignis uustione uexetur. Fit etiam secundo impossibile plurimis atque uehementibus adiutorijs
uti medicatæ, ut sinapismo, cucurbitis rapidis, forti raptura motis fricationibus, dropace, & ijs similibus,
cum cicatrices cecitate uig. & hebetudine torpentes, tãquam mortuæ uim nullam medicaminum accipiunt.
Diuiserunt præterea plerique etiam curationis officium, ut alia iecorosis, alia lienosis conuenire probarunt.
Hinc denique quidâ lienicas uocauerunt: iecori etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex abrotono & se-
samo: Item bibenda medicamina, ut theriacâ quam dioscoridian uocauerunt, diapatorion, uel diapy-
non. Item anodyna, quæ nos indoloria dicere poterimus, ut ea quæ scribunt diadion, pipereon, & lexy-
pyreton, & chamæpityn, uel uiridis pini decoctionem singulatim, uel cum melle. Item urinaria medica-
mina quæ diuretica uocant, ut est mulsum cum dauci decoctione, uel foeniculi radices, aut petroselinum, aut
absinthij, aut mali cydonij cum œnanthe. Utuntur etiam oleribus, ut lactucæ costæ uel incoctæ, aspara-
go, radicibus olusatri. Ventrem quoque deducentes antidoto quod hierâ uocauerunt. In lienicis ue-
ro epithema aiunt specialiter conuenire ex cappare & myrobalano & aceto, sale admixto, quod oxyalmô
uocauerunt, & herba cui nomen asplenos. Dant etiam bibendam aquam. Dicunt specialiter lienem
deducere, uel defluxionem purgare, ex quibus est ad nutriendum noxiæ curiculæ, & aquæ ex lacu, in quo
sæpissime candens ferrum fabricatores tingunt: de qua iubent dari cyathos tres, cum aceti cyatho uno.
Item polion herbam, aut formini semen in cotylæ quantitatem, aut capparis radicem cum squillæ drach-
ma dimidia, aut chamædryos, uel herpilli acetabulum, & ex aceto mulso cyathis tribus, uel hipposelini se-
men cotylas duas, cum uini cyathis tribus: aut libanotida herbam, quam nos rosmarinum uocamus, cum
foeniculi semine in cotylæ quantitate ex uino mixto. Item ammoniaci guttæ drachmam unam, cum
mulso ex aceto confecto cyathis tribus, uel tamarisci ligno. Item cibum uel potum sumere iubent ægro-

antes in uia sculis tamarisci ligno confectis. Quidam etiam decidendum, uel auferendum lienem ordinare ausi sunt: quod quidem uoce dictum, non officio completum accipimus. Sequentibus autem atque diuersis sese implicantibus potionibus, medicaminum uariorum stomachum uexant, uesciam commouent, atque totum corpus communiter in cachexiam mittunt, nescij quod quædam ob acrimoniam propriæ uirtutis, laceratione quadam communi potentia medeantur, & nos per quasdam inerrabiles proprietates, & neque alia iecoris, alia uenis esse medicamina, recte senserint: omnia etenim omnium corporis partium sunt communia, quando simili fuerint affectu passione. Regulantur enim siue diriguntur eorum uirtutes, non natura patientis loci genere passionis extenta atque indulta pro modo morborum, hoc est peccantium iudicium, sed eorum causa, qui rerum magis historias amant. Cætera quoque à quibusdam probata, breui atque concinna oratione subiiciam. Diocles igitur libro quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, phlebotomat iecorosos, & dextero brachio: tunc uentrem resoluit helleboro nigro, atque papaperis succo. Dat etiam cum mulso rosmarinum, quem Græci libanotida uocant, & murræ, & pini folia. Adhibenda quoque cataplasmata ex phœnico balanis cum uino atque lini semine, & sesamo, & pollinibus, quos omphacomeli appellant. Dat præterea aquam bibendam, in qua sit cætabrum prælotum, & prifana extritico: quæ omnia sunt infantia, atque stomachi uexatiua, & digestionem difficilia. Lienosos uero, quorum gingiuarum sudauerint sanguinem, phlebotomat: & similiter uexat medicaminibus felliducis, quæ cholagoga uocant, atque urinalibus, quæ diuretica appellant. Item Praxagoras primo libro Curationum iecorosis adhibet uomitum, & uentris sua medicamina, & sudorem mouentia, & urinalia, & phlebotomiam, atque fricationem. Vitur etiam uino non aquato, & uestione cauterii, & ijs similibus: lienicos uero phlebotomat, & cataplasmatibus curat, ut res digestibilibus cibis, & uino potat redolenti, & aceto, adhibita fricatione atque unctione, & lauacro. Dat præterea bibendam mulsam aceto admixto, daucio, aut hyssopo, uel thymo, aut capparis radice, uel folijs, aut semine, aut ætheris herbarum semine, quam eryngion appellant, aut chamæleæ, uel chamæpitys, aut absinthij, aut marrubij: adhibens etiam uomitum. Erasiltratus autem in iecorosis præcedens superpositas iecoris cutes atque membranam uirtur medicaminibus, quæ ipsum iecur late amplectantur: tunc uentrem deducit, audaciter partem patientem nudans. Item aliqui Asclepiadis sectatores gestationes & lauacra, & uaporationes cataplasmatum atque malagmatum excludunt in iecorosis, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore consensum hoc est spiritus, quem leptomerian eorum Princeps appellauit, atque in egestorum constrictione falsitate causarum adiutoria magna recusantes. Themison uero secundo libro Tardarum passionum plurima in ijs methodico rigore ordinauit, sed proterua atque caduca intentione, etiam ex talo eiusdem partis phlebotomari iubet egrotantes, atque alternis uel interpositis duobus diebus sanguinis interea fieri detractionem: uulnerandam quoque iecoris partem ex superficie medicamine uel cauteribus existimat: & concedit esse quædam propria lienis adiutoria, ob eius firmitatem, hoc est, quæ fuerint uehementia, ut cataplasmata, uel uestiones, eo concedens, ut etiam ipsum quoque lienem igneo cauteri transpungendum probet tribus uel quatuor locis: non aduertens, quia pro magnitudine passionis ac uirum corporis extenditur, atque indulgentur adiutoria, & non pro specie patientis partis: siquidem quædam quæ natura difficilem habuerint sensum, & propterea non facile tactum accipiant, morbo tentata sensibilia ceteris fiant, ut est plantæ cauum, quod tumore dolidum, atque omnino sensibile & attentum fiet: atque rursum ea quæ natura facile sentiunt, difficilius sensus passionis efficiuntur causa. Quo fiet, ut sit iuxta regulam methodicam explosum, ut qui intentione cœnotetarum ducitur, corporis facile ne aut difficile sentiant curent, sicut latius de cœnotetis scribentes docebimus. Thessalus uero secundo Regulari libro omni ex parte immutatam, atque eandem iecorosis & lienosis formam tradidit curationis. Sed quia plurimæ atque uariæ ijs uisceribus irruunt speciales passionēs, ut arquatus, siue aurigo, quam Græci icteron uocant, & cachexia, uel atrophia, atque hydrops, de ijs nunc ordinare curabimus.

De aurigine siue arquato morbo; quem uulgo morbum regium uocant, Græci icteron appellant. Cap. V.

PASSIO uocabulum sumpsit secundum Græcos ab animalis nomine, quod sit coloris fellei. Fit autem ex antecedenti iugi indigestione, uel medicaminibus uentris suis potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Sequitur in passione constitutis mutatio coloris in fellis qualitatem, quæ primo appareat, ac magis uideatur in albidis partibus oculorum, atque platarum talis uel uenis quæ sub lingua sunt. Ventris quoque abstinentia, uel egestio albida atque argillosa. Urina etiam crassior & crocea, oris amarior sitis, cibi fastidium, grauedo, & piper atque segnis uisus, insolitus motus, animi difficultas, pruritus & ariditas corporis, & ueluti exustione solis aspera cutis superficies. Sepe etiam iecoris tumentis inflatio, siue laxa durities. Difficile autem ac rarissime splenis, uel stomachi consensus etiam: ex ijs enim plerisque uisum & istam fieri passionem, quæ sit quidem facile sanabilis, ceterum neque ita felleum faciat corpus. Fit præterea nunc cum febribus, nunc sine febribus, & nunc celeriter circumscripita, nunc corporibus intardans, & propterea chronia appellata. Conuenit igitur cum primum corpus inuaserit siue tardauerit, & in superpositionem ueniens fuerit apprehensa, eam adhibere curationem quæ de tumoribus in corporibus in torpore constitutis sæpe memorauimus. Denique si uehemens fuerit, etiam phlebotomiz usus non reprobatur. In lenimento uero, corporis exercitio, atque cibis digestibilibus resumos ducimus egrotantes: tum ad recorporatiuam uenimus curationem, prouidentes ut adiutorijs localibus,

bus, si qua durities in uisceribus fuerit, hoc est, in iecore, uel stomacho, aut liene, sicut superius docuimus, destruat: sic enim cum passionis genus fuerit amputatum, etiā color naturalis corpori reddetur. Coniicienda sunt eius præterea accidentia, quæ Græci symptomata uocant, cum generali congrua curatione, id est, ut fel diffusum recorporatione adhibita detergens uarie deducamus, nunc clysteribus acerrimis, nunc absinthio poto dato, uel intybi agrestis succo uno uel duobus cyathis singularibus. Ac si declinationis tempus permiserit, etiam cum uino aliquando ipsa quoque intyba comedenda probamus cocta uel incotta. Item asparagum uel daucum, aut fœniculum, & ob plurimam oculorum infectionem erit sternutatio commouenda, medicaminibus scilicet, quæ Græci ptarmica uocauerunt. Item naribus infundendū, priusquam in lauacrum ueniant egrotantes, ut quidam probant, struthium cum lacte, & ad speciem referentes, asinino uel humano. Similiter etiam elaterium quod appellant, hoc est cucumeris agrestis succum. Item cydamini cum eodem lacte: fertur enim statim per nares, quæ uultum tenuerat fellis infectio, & magis si æger ingrediens calidas cellas feruens descenderit solium, atque requiescens diurno tempore aqua calida fuerit uaporatus, adhibitis aliquando etiam apophlegmatismis, quorum materiā sæpe memorauimus. Itē ijs quæ superficiem corporis laceffendo iaculare uidentur, quæ appellata sunt anastomatica, & propterea recorporatiua, in sudore prouocantia fellis infectionem, hoc est, dropax iugiter adhibitus, uel solis feruor torridus, quem Græci heliosin appellant. Item naturalium aquarum exhalatio, uel medicaminū sudorem mouentium usus. Aspergendum denique corpus struthio, nitro, sulphure, & ijs asperfusionibus quæ ob pruritum corporis adiuuentæ sunt, à Græcis sympasmata appellata, feruentiore aqua fouendi ægrotantes: sic enim seruata regula generali etiam accidentia passionis curabuntur: non enim hæc solis in acutis erunt passionibus obseruanda, uerum etiam in tardis, quas Græci chronias uocant. Utendum etiam aeris mutatione & gestatione uaria, & litoraria moratione: animi quoque laxamento ac iucunditate, & aquarum naturalium uoluptate, natatione uaria, & assiduo uomitu, simplici, atque radicibus commoto. Item drymiphagia, in qua præ cæteris capparidis magis usus approbatur, & acetum squillicum, in quo sit infusa anchusa herba, & bulbi, & squilla igne torrida, id est subassata, cum melle electario data. Vinum præterea tenue probamus, & perseverante passione helleboro decocto corpus agitandum: uel si oportuerit, bibendum damus medicamen ex herbo & ceruino cornu, in cotylæ quantitatem cum tribus cyathis mullæ: in ijs qui adiuncta febre uexantur, uel conditi in ijs qui sine febre afficiuntur. Sed uitandam probamus frequentem & uariam medicaminum potationem, quæ fella deducere promittuntur, siue uen trisua, siue urinaria: etenim sitis extenditur, & solidioris cibi fastidium duplicatur, & corporis fortitudo minuitur, atque cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis materia adulterio medicaminū deterior fit, cum habitudo, ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod facere uidemus eos, qui sæpissime ac iugiter herpillum dari probauerunt, & absinthium, & aloen, & diagridium, & coloquintida, uel ex aloe & coloquintida hieram cōfectam. Item ex amygdalis, & absinthio, & aniso trochiscos cōfectos, & decoctiones recentis mulli ex uino cōfecti, cum hyperico, uel aristolochia longa, uel herba adianto, quam Latini capillum Veneris uocant, uel cicere albo: aliquando etiam hæc mandenda probauerunt. Item rubea, quam Græci erythrodanon uocant, uel struthium tritū cum fico arido, uel palmulis, aut sulphure in ouis forbilibus in parui cochlearis quantitate: aut certe ceruini cornu elimatū puluerē crachmā, unam, cum cyatho uno, & aquæ cyathis duobus, uel nepete, quam Græci calaminthen uocāt, aut radicibus pastinacæ, quā staphylen appellant, decoctis in uini heminam, & dimidiā, donec ad tertiæ partis liquoris ueniat quantitatē. Ex quo dandū probant cyathum unum cū aquæ cyathis tribus aut quinque, cum dauci semine: aut apiū aut zingiber, meu, uel asarum, aut radicē herbe brioniæ. Itē seseli & libani herbe infusionē uel decoctionē & trochiscos ex herpillo uel fœniculo cōfectos, uel ex aristolochia, quos diherpillum, uel diamaratū, & diaristolochia appellant: horum enim uaria multitudo, uel usus frequens, causa sæpe ipsius fuit faciendæ passionis: non enim quoniam fellis detractio facta, illico curationis est causa, nisi totius quoque passionis fuerit destructio cōsecuta: sic igitur ijs utendum erit, ut supra demonstrauimus. Itē quidam Veneris probauerunt adhibendum usum, laxationem carnis faciendam æstimantes. Ex quibus est Titus, Asclepiadis sectator, & Themison. Sed est hoc neruositatis uexabile: quippe cū fortitudinem corporis tollat, quæ magis est ægrotantibus adquirenda. Item alij aurum iugiter aspicere uel intueri ægrotos præceperunt, siue aureos colores. Iis denique etiam operimentis utendum laudauerunt: siquidem similia rapiantur, & propterea morbi, siue colorum, aut fellis migratiā in alias possit transire materias earū concordantes colores: non coniicientes, quod sit magis credibile, externa in ægrotum facilius transire: quippe cum uiarum tensitate superficie corporis clausa interiora teneantur, uel certe similitudo magis passionis possit prouocare uirtutem occultæ suasionis admonitione superata. semper enim memoratiōe passionum tristes ac moesti necessario sunt ægrotantes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem maximum adiutoriū, & magis utilis ægrotantibus animi purissima laxatio, siue serenitas. Erit præterea perseverante passione etiam longa nauigatio curanda, & unctio, adhibito præceptore, quo assidua defricatione & plenissima fies resumptio possit.

De cachexia. Cap. V I.

CACHEXIA, nomen sumpsit à quodā corporis habitu malo: cacia enim uitiū uel uexationem Græci uocauerunt, hexin habitudinem. Sed principaliter eius curationem ante Themisonem nullus

M

ordinauit : ipsam nanque secundo libro Tardarum passionum, itemque primo atque quarto Epistolarum memorauit. Item Thessalus secundo libro regulari. Fit autem siue nascitur hæc passio intemperantia ægrotantis, uel curatione mala medicantis, aut post ægritudinem tardā resumptionis causæ. Item ex medicaminibus sæpissime potatis, uel ex faxea duritie iecoris aut lienis, hæmorrhoidis longissimi temporis, aut uomitu. Item ex febribus longo tempore corpus affectum, aut collectionibus, aut uomitu post uespertinos cibos, & ijs similibus. Est autem ipsa quoque passio sæpissime hydropismi antecedens causa, aut macularum simili in superficie corporis accidētium. Sequitur cachecticos pallor subalbidus: aliquādo etiam plumbeus color, debilitate tardus ac piger corporis motus, cum inflatione inani. Aliquibus etiā uentris fluor cum febricula in plurimis latente, quæ circa uesperam magis augeatur. Pulsus creber ac densus: cibi fastidium, & uini magis appetentia, urina fellea, & extensio uenarum. Est autem passio sæpius stricturæ, sicut ex supradictis conijcimus. Aliquando etiam complexa solutione ob plurimum uentris fluorem, uel simili quolibet fluxu. Quapropter conuenit complexa passione laborantis primo abstinere fluentia, & intemperantiam ægrotantis corrigere, uel curationes malas, aut medicaminum potationes prohibere. In iecore uero aut liene si qua fuerit durities, siue saxositas, destruere, ut nup demonstrauimus: aut si fluor sanguinis fuerit plurimus, abstinere: hæmorrhoidas uero auferre, febres quoque soluere, ut de febribus scribentes docuimus: collectiones congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare, & consuetos eis post uespertinum cibum uomitus paulatim detrahare. Ac si horum nihil fuerit accidens, & sola in corpore uisa fuerit cachexia, erunt eius superpositiones ac lenimenta prouidenda, & uigilante sine ulla ratione egrotare, aut cibo corrumpente, animi attestatæ difficultate, cum pigro ac segni corporis motu superpositionem cognoscere: & propterea in requie retinere egrotum, cum abstinentia cibi, quo turbatio corporis resoluatur. Item ea, quæ fuerint extenta, lanis contegenda, atque oleo calido fouenda: ac si uenter fuerit fluens, abstinendus. Item si plurima fuerit corporis tensio cum grauedine, erit adhibenda phlebotomia ex brachio mediocriter: sed non necessario in ijs qui hæmorrhoidarum causa inanes uidentur: ac deinde retentione facta constricti, sed non in omnibus qui communiter tanta, ac tali fuerint strictura possessi, tunc perunctos conuenit refici cibo digestibili ac leui, usque ad declinationis tempus, seruatō genere, accidentium, alia cataplasmatibus, alia cucurbitis recurrere: cum declinatio apparuerit, plurimus ac uariis cibis erit adhibendus, & similibus superpositionem uergentem adinuare, atque ita lenimento ueniente, quod facile approbamus, exercentibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, ijs quæ superpositionem designant, erunt corpora resumenda atque fortificanda: tum re corporatiuis utendum curationibus, quo reformata corpora, uel, ut ita dixerim, relictis uitiosis carnibus, ac renascētibus nobis reparata ad memoriā redeant sanitatis. Quapropter æger, somno discusso, semet in lecto continere, iubendus etiam iacere paulisper, tum etiam neque repente cōsurgere, sed prætentato motu discere, utrum se leuem ac digestum sentiat. etenim si fuerit occurrens indigestio, erit requies adhibenda plurimo temporis spatio, donec grauedo digeratur: dehinc mediocri gestatione, atque paruo cibo utendum, si non ex accessione, sed ex aliqua causa manifesta temporalis acciderit corporis displicentia, quam Græci diarescēsin uocant. Ac si nulla fuerit ægrotantis querela, erit à lecto leuandus, & ob expugnandam frigoris iniuriā oleo leuiter perungendus: tunc gestatio adhibenda: & si uires permiserint, uel aeris temperies, sub diuo, & magis intra muros motu uehiculo. Sin uero aliqua fuerit obstans causa, erunt hæc sub tecto adhibenda, & pro uirium modo aut uehiculo manuali, aut sella, aut cathedra exercendus ægrotus: tum gestatione perfecta parua deambulatio adhibenda, uel uocis exercitium, atque ad unctionem ueniendum, sed præcalefacto intra uestes ægro. Quoties calidum habuerit corpus, tum deposita ueste erit linteolis leui defricatione tergendus, atque statim oleo paruo ungendus, & summo tactu fricandus: primo ab alio, postea à semetipso, retēto spiritu: ut etiam alia teneantur: dehinc rursum ab alijs defricandus, tenacius quidem, sed non impressius, quo possit carnis inflatio coagulari. Sed hæc erunt adhibito unctionis præceptore facienda, quo secundum proprias mutationes omnium partium motus æqualiter, ac totius corporis integret exercitium: tunc permittentibus uiribus etiam raptorio machinamento gestetur, ac deinde recussabili fera, quam Italicam uocant: aliquando etiam harena asperso corpore, quā amon appellant, defricetur per interualla dierū adhibito lauatō. Conuenit etiā psychrolusia nullis obstantibus causis, quæ eam prohiberi permittant: tum uinum dādum austerum album, leue: dehinc iubendus superbibere, atque siccum sumere cibum, uel certe quartā partem panis, siccā manducare, adhibito usu assorum pulmentorum, & neque curiose cōditorum, ut pisces, clunes, uel agrestium leuiora, & ijs omnibus iuxta regulam methodicā auctis aut minutis, interiecta uini abstinentia, & cibi parua sumptio: utendum etiam locorum atque aeris mutatione: tum heliosin, quā nos corporis torporem dicimus, ita dropacis adhibendus usus, & pulueris nitri fricatio, & sinapismus specialiter, & usus aquarum naturalium, uel natatio maritima. Item harena litoraria ignita circumtecto corpore torrendi sunt ægrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies, ut uires permiserint: tum nauicalæ exercitium atque peregrinatio, quemadmodum in præcedentibus ordinauimus.

De nutrimenti cessatione, quam atrophian Græci uocant. Cap. VII.

NUTRIMENTI cessatio, quā Græci atrophian uocāt, ab accidēti nomē sumpsit: & cōtigit in passione cōstitutis plurimus cibi appetitus, tum corruptio, quibusdam fastidium: item tenues atque latētes tepore sunt, neque febricula iugiter, & quibusdam inter plurimos dies soluta. Ducitur præterea quædā etiā per

per urinam corporis defluxio, quam syntexin uesicæ uocauerunt, cum plurima fuerit poti liquoris egestio, atque corporis subinde per dies singulos extenuatio etiam: nunc igitur cōuenit, sicut in Cachecticis diximus, providere, ne qua pars corporis principaliter patiatur, & oporteat congrua eidem morbo localia adhiberi adiutoria, ut iecoris, uel lienis duritiei, uel fluiori uentris, aut intestinorum, uel uesicæ, uel ulceri in interioribus constituto, aut collectioni, quam specialiter uomicam diximus. Ac si etiā febres fuerint cōsecutæ, isdem quoque adhibenda medela. Si horu nihil in corpore uiderimus, sed sola fuerit atrophia cōsecuta, conuenit ægrotum fortificatione rationabiliter, atque resumi gestatione pro uirium quāritate, scilicet quibus sepe memorauimus generibus & unctionibus ordinatis, plurimo oleo superfuso, adhibita fricatione, & ministris corpulentis, & mollibus, uel quales esse fricatores Salutaribus præceptis docuimus, quo cōtactu corporum laxiore ægrotantis exercitata membra soluantur: tum temperato utendum lauacro, atque uino tenui, & pane limpido fermentato, & pulmētis ex media materia, atque iuxta cycli regulam eorū augmenta ac detractiones uariare non repetitis, nec perfectis ilico cyclis, sed unius tantūmodo qualitatis, ut de cataleptico scribentes docuimus. Denique cum ex uolantibus solis adhibemus, initium ex paruulis ordinamus: tum autem ex agrestibus, ex teneribus, cum porcina ex membrorum summitatibus. Conueniē præterea locorū atque aerum commutatio, & aliquādo drimyphagia, uel simplex uomitus: tum etiā ex radicibus confectus, & localia alijs atque alijs locis adhibenda, & magis medianis partibus: non enim sine plurima uexatione partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus atrophia potest. Ipsi igitur, frequētius adhibendus est dropax, & cucurbitæ, uel paroptesis, aut sinapismus, & sympasmata acriora: hæc à nobis aspergines nuncupantur. itē malagmata eiusdem quantitatis. Vtilis præterea litoraria nauigatio, & natio maritima, uel naturalium aquarū: tū post cibum animi laxatio, quam diachysin uocant, & articularū complexio adhibitis ministris, qui mollibus hoc manibus efficiant. Themison uero secundo libro Tardarum passionum plurima recte ordinasse probatur. Aliqua uero caduca intēione dixisse intelligitur. Iubet etenim ægros non equaliter ægrotantes duodecim stadiorum spatium gressu conficere, æqualem modum cunctis definiens. Item igneo in loco uel feruenti fricari iubet præfatigatos sudoribus ægrotantes: item sole torrēti. atque ita per interualla leuiter defricari, & in calida, atque oleo calido eorum manus infundi, ex quibus periculum perfricationis necessario sequetur. Item post interdianum cibū deambulationē probat adhibendam, atque fricationem, & lauacrum. Tū post uespertinum cibum iungenda crura, atque brachia, quod est dormituri anxiosum. Præterea post cœnam imperat uomitum prædato passo, aut uino dulci, uel succo ptisanæ. Tum frequentato uomitu, oua duo danda forbilia cum panis uncis duabus, ex quo incēsa altiora, atque exercitatis uomitu uisceribus facile corrumpuntur accepta. Hęc igitur recusantes, alia, quæ recte ordinasse perspicitur, amplectenda iudicamus.

De hydropē. Cap. VII.

HYDROPS ab accidenti nomen sumpsit: siquidē aquosus humor hanc passionem necessario committitur: nam Græci hydor aquā uocauerūt. Generatur autē ex accidētibus plurimis, atque diuersis causis, ut cachexia, febribus corpora tardantibus. Item duritia, uel saxeæ densitate iecoris, uel lienis, aut stomachi, uel peritonei membranæ aut matricis. Item spirationis difficultate, quam Græci dyspnœan uocant, uel uentositate stomachi, aut coli, aut uentris passione, quam Græci cœliacen diathesin uocant. Item longi temporis dysenteria, uel in foeminis menstrualis fluioris retentione. Item hæmorrhoidarum ueterū repentina atque incondita curatione, facta abstinentia, uel coaceruata bibentium transuoratione, & magis si falsa fuerit aqua. Item medicaminū frequentata potione, & horum similibus. Græci igitur, uel aliarū sectarum principes eius potestatem, uel differentiam nominibus uariandam crediderunt. Vocant enim hanc passionem etiam hyderon uel parechysin, origini locorū specialia nomina tribuētes: nam parechysin appellant sensibilem, & manifestam liquoris superfusionem, quæ fiet inter peritonei membranā, & intestina. hyderon autem, dispersum siue infusum per uiarum raritatem, atque carnis spiramenta liquorē. Itē dicūt hyderon ex renibus generari: hydropē uero ex duritate iecoris. Quod quidem nos iuxta sectæ regulā reprobamus: etenim infusio, siue superfusio liquoris est passioni communis: & neque antecedentes causæ passionis facere discretionem recte creduntur: siquidem etiam ex plurimis alijs partibus patientibus hydropes generantur. Eius igitur differentiam Hippocrates & Diodes duplicem dixerunt: aliam enim hypofarcan uocauerunt, aliam asciten. Item Heraclides Tarentinus secundo libro Internarū passionū totius corporis inflationem, siue humoris infusi perforationem catafarcā uocat. Inter peritoneum uero & intestina asciten uel tympaniten appellauit. Item Demetrius Erophili sectator undecimo libro de passionibus scribens, alium dixit hydropē constitui sine ulla humoris infusione, sed sola inflatione turgēte: aliū ex humore diffuso, & eum nunc per totum corpus, nunc inter peritoneum & intestina: cuius differentia nunc plurimo uento tradidit. & est uanū atque intellectu carens; sine ullo humore superfluo laborantē hydropem uocare. Item plurimi tres differentias tradiderunt: aliā enim catafarcan, aliam ascitē, aliam tympaniten uocauerunt. Asclepiades autem alium celerem dixit, ut eum qui repente constituitur: alium tardum, ut eum qui tarda passione uexet: & alium cum febribus, alium sine febribus. Hoc quidē cōmuniter etiam alijs specialibus passionibus adscribens, nō aduertit, quoniā proprio nomine celer dicitur passio, non sola quæ repente conficitur, uerumeriam ea quæ celeriter solui posse monstratur. Hydrops autem sit quisquam repente ex coaceruata bibendi transuoratione, uel falsi liquoris potu. Celerem autē passionis

CAELII AVRELIANI SICCENSIS

solutionem nullus ægrotantium meruit. Item Proculus Themisonis sectator secundum plurimos inquit
 hydropis differentias temporibus passionis adscribendas. Initiū enim atque augmentū esse leucophlegmā
 tian, cū adhuc secundum carnē fieri mutationē uiderimus: statum uero tympanitē, cū summa tensio secū-
 dum uentrem fuerit facta. Declinationē autem asciten, cum quadā indulgentia fuerit inflatio relaxata: nō
 secutus ueri regulam, neque aduertēs quia omnis species passionis sua quæque tēpora percurrit. Denique
 etiam catafarca usque ad statum, uel declinationem perseverat. At tympanites & ascites ex initio facti in
 augmentū uenerint, & statu sumpto declinauerint. Item Apollonius Mēphites aliū dixit fieri hydropē
 cum retentione, ut si quid biberit, sine dilatione tanquā per fistulam transiens egeratur: eius autem quem
 cum retentione fieri dixit, secundum plurimos tres esse differentias affirmat. Sed melius Demetrius Apa-
 meus ab hydropē discreuit, cum qui sine dilatione potum liquorē per urinā egerit, diabetē appellās, sicut
 specialiter de ipso scribentes docuimus. Melius igitur, quantū ad species hydropis, quanquam nō generali-
 ter, mutemus curationem, alium dicere in toto corpore constitutum, tanquam in papyro uel spongia in-
 ter uiarum raritatem insertum, à liquore uocari leucophlegmā tian, quā Latino nomine etiam intercutē
 recte dicemus: alium in parte corporis inter peritoneū & intestina, subiecto liquore solo, uel admixto uē-
 to plurimo uocari, alterum asciten, alterum tympaniten: sequuntur quædam cunctos præterea commu-
 nia, quædam singulis propria. Communia autē, ut inflatio, uel extātia tumoris, & piger aut difficilis corpo-
 ris motus, spirationis difficultas, quam Græci dyspnœan uocant, somnus difficilis uel anxiosus, & magis
 post cibum sitis, & urina comparatione sumpti potus paruior, fastidium, & aliquando febricula latens
 in plurimis: item quibusdam etiam uesiculæ, uel fistulæ, quibus eruptus humor feratur, ac deinde uulnera
 difficilia sufficiant, uel quæ in cicatricē uenire possint. Specialia uero, uel propria singulos sequuntur, ut leu-
 cophlegmantian, uel intercutē mollis atque humida inflatio uentris ac uultus, & crurum, & folliculi geni-
 talis, uel præputij, relucente liquore per cutē albedo colore. Itē cum oris uel spiratione, siue anhelitus for-
 tore totius corporis grauedo, & impressioni digitorū cedens tumor, ita ut paululū caua permaneant loca.
 Aliquibus etiam alborū atque crassorum humorū uomitus, uel per uentrē egestio: unde etiā nomen pas-
 sio sumpsisse à græca deriuatione uidetur: leucō enim albidū, phlegma humorem crassum uocauerūt: uel
 quod ægrotātis color albidioris imaginem ferat. Alij uero tāquam ex superfluo humore generata passio-
 ne, penetrans humor singula quæque spiramenta possederit: uos uero intercutem nominamus. Asciten
 denique sequitur uentris inflatio, uel extantia, & pro corporis motu liquoris conliti sonitus, uel ad cōcus-
 sum palmæ resonus, tanquā semipleni utris, ex quo nomē sumpsit. Itē proschematis mutatione, uel digito-
 rum impressione demersio, uel resurrectio liquoris, & conclusio superiorum partium, atque tenuitas tan-
 quā extantæ cutis secundum ora uel colla, aut iugula, uel pectora. Iacentibus præterea ægrotantibus diffu-
 sa, atque elatior tumoris extantia fiet: surgentiū uero uel stantiū maior atque extenta, & crescente pas-
 sione corporis frigus atque torpor accedit: aliquādo etiam tussicula, & stercoreū uel urinæ abstinentia, et per
 uentrem fluidior exitus, & apprehenso folliculo, atque uirili ueretro extās inflatio reduplicata, & aliarū
 partium surgens tensio, sicut in leucophlegmantia. Vocatur autē hic hydropismus, ut Diocles, etiā epatias
 aut splenites à patientibus partibus nomen ducens, hoc est iecore uel liene. Item tympaniten sequitur
 rotunda atque extans inflatio secundum gastera cū tensione plurima, & ad percussam palmæ resonus, ue-
 lut tympani, unde etiam nomen accepit. Item ructationes, & aliquando intestinorum tormenta, quæ in-
 clusæ uento per podicem digerantur, atque grauedinis detrahant quidquā. Est autem passio communiter
 stricturæ omnis hydropismus, sed complexa aliquando solutione ex alijs accedētibus, ut uentris fluore.
 Præterea est naturaliter tarda passio: siquidem nunquam celeriter soluta uel emota corporibus uideatur.
 Item generaliter magna, siquidem & difficultatem, & indecentiam, & periculum inferat ægrotanti. De-
 nique semper difficilis curatione, nunc uehementer, nunc minime comprobatur: etenim magnitudinē
 uehemens, & uarietate accidentium, & corruptione uirium magis incurabilis iudicatur. Parua uero ma-
 gnitudine comprobatione supradicta, atque paucis & simplicibus accidentibus, quæ Græci symptoma-
 ta appellant, & sine nimia uirium læsione minime curationi difficilis approbatur, & quæ secundum alia-
 rum sectarum principes de effectus uel exitibus passionum scripta sunt, ut etiam secundum causas ex quib-
 us efficiuntur, & patientes locos, & naturas, & ætates, & annalia tempora, ut hiemis, uel æstatis, & eo-
 rum medijs temporibus generationes passionis: alij difficiles curatione, alij faciles curatione, alij faciles hy-
 dropes approbantur. Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribenda sunt, ne infinitus mo-
 dus differentiarum uideatur accidentium numero uariatus: etenim secundum causas difficiles aiunt cura-
 tione hydropes, qui ex laxitate magis quā ex durtia fuerint facti. Item eos qui ex dysenteria, uel co-
 li passione, ab ijs qui ex coaceruato hauſtu bibendo uitium conceperunt. Item secundum locos dif-
 ficiles inquirūt eos qui ex iecore, faciles uero: eos qui ex liene. Item secundum naturā uel sexum difficilio-
 res inquirunt curatione semper fœminas maribus. Item secundum ætates faciliores inquirūt curatione pue-
 ros, uel pubentes: difficiles uero, ætatis mediz, uel senes: non solum quod natura crescere uel augeri, alia
 minui uel declinare uideantur: sed etiam quod alij prohibeātur, alij cogantur, alij neque suadere, neque cogi
 posse probentur. Item secundum annalia tempora, quæ Græci horas appellant, difficiles inquirūt cura-
 tione æstatis tempore laborantes: siquidem multa sibi afficiantur: alij uero è contrario faciles inquirunt
 curatione: siquidem exitum liquorum fieri prouocet feruor æstatis, & corporis præterea faciat ficitatem.
 Difficiles uero hiemis tempore, ob corporum densitatē uel frigus. Item uerno tempore: siquidē humidio-
 ra, atque liquorum redundantia fiant corpora. Autumni uero prima, similia æstati, ultima hiemi dixe-
 runt.

runt. Item secundum generationē, siue fabricationem passionis difficilē inquirūt curatione leucophlegmā
 tiam, faciliē uero asciten, & horum mediū tympaniten. Dissenserūt pręterea etiā de patientibus partibus
 quę principaliter afficiantur. Erasistratus nāque iecur inquit pati: in apertionibus enim saxeū semper in-
 ueniri cōfirmat: alij uero colum, sed consentire iecur: alij splenē, ac iecur, & colum: alij etiam peritoneum:
 alij renes quoque & matricem principaliter pati dixerunt. Et apparet, omnia necessario prętangī: quod
 quidē, etiā si latuerit, nullus timor curationis mutandę medicantibus accedat: neque etiam ob localium
 adiutoriorum ordinem quidquam obesse monstretur, cum hęc eadem oporteat ceromate sole seruēfacto
 inchari, uel pellibus sole ignitis inuolui. Adhibenda etiam acopa feruentia, & sudationes ex naturali mate-
 ria prouocare: habet enim recorporandi uirtutem ex quacunque metallorum materia exhalatio natura-
 lis. Item ex harena litoris sole ignita torrenda corpora. Hiemis uero tempore igne prętorrēda, atque ita
 corpori admouēda, ut ex ipsa, excepto capite, cetera corporis omnia contegantur. Itē sinapismus usque
 ad cutis humorē adhibendus, qui maxime uehēmētē fortitudinem locis humore corruptis, atque ut ita
 dixerim, habentibus admonet ac ministrat. Itē locorum & aquarum mutatio adhibenda, & peregrinatio
 magis maritima: est enim lacerantior, atque corporis apertionibus efficax ob salitātē maritimus aer. Con-
 ueniunt etiam uaporationes spongiarū ex aqua maritima expressarum, uel aqua falsa decocta. In tympa-
 niticis uero specialia, ut plerique uolūt, iuxta communem uirtutem recorporatiuę curationis, etiā decoctio
 centaureę herbe, & absinthij, & origani, & hyssopi, & marthubij adhibenda, & similis uirtutis epithema, ut
 est quod appellatur dianitrū, ex fico atque nitro, & absinthio confectum. Tundendū igitur aridum ficū,
 sed quod sit pingue ac succidum. itē singulatim absinthium & nitrum admiscendum duabus partibus fi-
 ci, & quarta pars origani. Aliquando etiā rutę admiscenda particula: facit enim medicamen, quod appella-
 mus diahyssopum. Item uua passa cum cumino, uel farre, cum adipe ueteri, & uino. Hoc quidem plurimi
 magis intercutibus cōuenire probauerunt. Itē bubulo stercore ungendos cum aceto ægrotantes dixe-
 runt: Apponēda etiam malagmata, quę fortificare, ac recorporatiua uirtute mutare ualeāt corpora in me-
 liorem habitudinem. Intercutes autem & ascitas ijs curandos probant, quę ficare atque exiccare ualeant
 corpus, uel sudorem commouere. Sed erit cauēdum, ne immodico usu medicaminum corporis superficiēs
 ulceretur. Est autem nostrum medicamen quod ex herba chamæleonte nigra conficitur. Item ex sterco-
 re caprino, quod appellatur diacapregias. Item diacentaurēam, & dioriganum, quę ab herbarum nomi-
 nibus uocabula sumpserunt. Item icesion emplastrum, quod magis post humoris detractionem adhiben-
 dum probamus, quo partes roborentur. Item diaycon emplastrum, & diadictamnū, & barbara, & dia-
 scaminum. Oportet autem interpositis quinque diebus, uel eo pluribus detractio iandudum posito me-
 dicamine perspicere profectum, ac rursus imponere omnibus locis ex anterioribus ac posterioribus cor-
 poris partibus: singula enim medicamina erunt illinienda pellibus teneris, atque ita corpori addenda, su-
 perposita lana molli cum leuibus fasciis colliganda, & pro uiribus corporis adhibenda gestatio, atque
 unguēta congrua, & defricatio. Tympaniten uero recorporatiua curandum probamus curatione, &
 coniicienda etiam inflationis medela, quam Gręci empneumatofin uocant. Adhibenda denique ressi-
 tia, ut est quod appellamus diaspermaton, uel polyarcion, aut diartymaton, aut diasamsucum, aut diameli-
 lotum: hęc enim ualent etiam uentositatem tollere: adhibenda pręterea in ijs ea quę superius ordinaui-
 mus. Tum profectu accedente regula cyclorum adhibenda natatio maritima, uel aquarum naturalium. Alij
 uero non absurde etiam aquę marinę uaporationem probant adhibendam, quo sudores prouocantur;
 inquirunt enim implendum solum aqua marina feruenti: tunc quadrangulam compaginē immitten-
 dam pręligatam loris, in quam erit includendus ægrotans: sed pręliganda compago pelle, ut aquę prohi-
 beant ingressum, quo exhalatione uaporis calefactus ægrotans in sudorem uenire cogatur. Sed erit aqua
 calefacienda in nouatione frequenti ferri candentis immisione massarum. Oportet autem semper ægrum
 adhibito animi laxamento curari, quam Gręci diachysin uocant. Quęrenda denique animi desideria, quę
 siue uexatione corporis pręueniant uoluntatem, & amicorum conuiuia, quę ciborum paritate, animi
 tamen lasciuitate frequentent. Vtile etiam, si longi fuerint dies, partiri modum sumendi cibi: facilius
 enim accepta digeruntur duorum temporum oblatione diuisa. Ac si iuxta ordinem datum leuigati in-
 dulgentia passionis rursus fuerint accessionibus typicis ægrotantes affecti, quo iterum impleri uideantur,
 erit melius uti prius radicum uomitu: dehinc ante diem radicum usus, album ueratrum immittere. tunc se-
 quenti die hoc detractio radices dare, uel certe hellebori decoctionem. Sed horum usum uel confectiōē
 dexteram, atque adhibendi modum Responsonem libris de adiutorijs scribentes docuimus. & nunc ex-
 inde hęc accipienda monemus. Hęc est mundior, atque uera hydropum curatio: etenim potui me-
 dicamina danda cauere decet: alia enim uescicam commouent, alia intestina lacerando ulcerant, uel dysen-
 tericam faciunt passionem: alia stomachum uertunt, & fastidium generant cibi, & sitim extendunt.
 Quapropter si cogentibus rebus utendum uiderimus quibusdā aquiducis medicaminibus, quę Gręci hy-
 dragoga uocauerunt, ea dabimus ijs qui plurimo humore infusi aquoso corpora laborare uidentur.
 Habere etiam conuenit curam, ne rursus corpora repleantur: ex quibus est euphorbium mulso cō-
 mixtum potio datum, uel ouis sorbilibus aspersum, duorum uel trium cochleariorum quantitate, uel de-
 coctio radicum, aut squillę. Oportet autem squillę libras duas omni purgamento absolutas, quod ad
 unam libram redigatur, concisas in uas fictile nouum pręlitum mitti, tum adiectis uini sextarijs tribus,
 quibus ad tertias decoctis, ex ipso liquore erunt ad duo cochlearia ægrotanti dāda: & proficiente curatione
 usque ad uncie unius accedere modum. Sed hoc erit post gestationem adhibendum, uel post perunctionē

corporis, & ante sumptionem cum plurimo interiecto tempore. Ex decoctione autē radicū drososel tres cyathos dando probamus. Sin uero etiā urīnā quis uoluerit cōmouere, erūt omnia aromatica prohibenda, quę nō curiosa, sed magis simplicia esse uideātur, ut est decoctio seminis cucumerū, uel fœniculi, aut dauci, aut apij, anisi, petroselini. itē mentę, asari, nardi, squinanti, zinziberis. Hęc singula uel cū uino, uel ex ipsīs cōfecta erunt offerenda. Ac si ex ijs humor detrahi non potuerit, oportebit tanquā alienum paracentesi auferre. Sed nunc decet priusquam ipsius officij usum doceamus, ijs respondere qui istius curationis adhibendę dissonantia iudicia posuerunt. Antiquorū igitur aliqui cōgruam paracentesin dicunt, ut Euenor libro quinto Curationum, Erasistratus libro quo de hydropē scripsit, & eius sectatores, Thessalus secundo libro regulari. Alij uero cōgruam laudauerunt, ut Asclepiades libro quo de hydropē scripsit, & Themison secundo libro Tardarum passionum: quibus etiam nos iuxta Sorani sententiam cōsentimus adsertores tamen primę sententię, hoc est istius reprobandę curationis, hęc dicunt: peritonei membrana à natura nervosa esse perspicitur, & est omne quod nervosę fuerit qualitatis punctionibus inimicum, siquidem consensus ingerat. Pręterea spirationis naturalis causa, qua nos aerē recipere, atque reddere haustu potili necesse est, intestina quoque cōmouentur, quibus superficies corporis consequenter tangitur. Et est periculum, hanc paracentesin uulnerare loca: quippe cum nō solum corruptus humor detrahi uideatur, uerū etiam naturalis sępe spiritus excludatur, quod est uehementer corporibus noxium. Dehinc etiam post effectum punctionis, aliqui ægris sua uulnera resoluentes uoto prius torporis deponendi uitā quoque liquerūt. Itē neque tempus sibi conueniens hoc genus adiutorij habere uidetur: etenim passione cōstituta uel superpositione, siue lenimento aliud tēpus mitigationē demonstrat, aut aliam resumptionē, uel recorporationē. Paracētēsis uero cōturbat, atque uires corporis tollit, & nō recorporatiua uirtute medetur, sed usum recorporatiuum impedit. Ad summā, nemo, inquit, saluatus est eorum, qui per paracētēsin curati sunt: quapropter adhibenda negatur. Item Erasistratus ait, quo iecore in duritia constituto obesse paracētēsis uideatur: siquidem grauatio iecoris tumentis toleretur humoris substantia subleuata, atque natās in liquidis, quibus effusis omnis grauedo partiū tumentium, quę diaphragmati sunt natura connexę, atque uenę maiori, atque contendit, quam Gręci quilen appellant, adductione sui tumores ingerant uicinarū, ac deinde celerem faciant mortem. Item Ptolemęus Erasistrati sectator ait causam passionis esse iecoris duritiā, supercreatam uero humoris infusionem. Paracētēsis igitur liquorum detrahens passionem minime detrahē agnoscitur: siquidem non auferat causam, ex qua humor creatus esse uideatur. Sed sunt hęc omnia facile expugnabilia: tunc enim uulnerata nervositas in tumorem uenire recte iudicatur, quoties naturalis habitu fuerit constituta. Nunc autem morbo uitiata, peritonei membrana contra naturam habere perspicitur, & non similia, atque eadem sequentur naturaliter, uel contra naturam constituta. Itē intestinorum uulnerationē metuere, inanis timoris est: etenim exercitatis atque prudētibus hoc genus officij cōmittitur: dehinc plurimū peritonei membrana distabit interiecta humoris causa submota: spiritus uero etiam phlebotomatis sanguini iunctus excluditur. nec ilico tamen reprobāda phlebotomia, cum sit ab omnibus rectissime adiutorium comprobātū. ferendum est enim leue damnum naturalis officij, quoties maior utilitas excludendę passionis promittitur. Soluere uero ligationem ægrotantes, & immoderato fluore acuto deponendę passionis in mortem uenire, simile quiddam est, tanquam phlebotomatū ligaturā medicī soluere, ac deinde plurimo sanguinis fluore uitā finire: hęc enim nō adiutorij est curatio, sed stultitię ægrotātis. Habet pręterea paracētēsis etiam aptissimum tempus, quod illi inueniri negāt, sicut cucurbita scarificatione adiuncta, atque hirudinū appositio: quę non in accessione aut lenimēto, sed in dimissione superpositionis recte adhibēda probātur, sicut in alijs docebimus de adiutorijs specialibus scribentes. omnes enim paracētēsi curatos, ut aiunt, mori apertissime mentiuntur: nos enim quosdam uidimus euasisse. plurimi uero moriuntur: siquidem medentiū tardantes consilia serius paracētēsis adhibeatur, ut quę alij adhuc tumentes peritonei membrana, & neque usu dextero operātes diuisuram faciendo mortis periculū incurrunt. Ex quibus est etiam Asclepiades, qui diuiso loco fistulam relinquendam putauit. Ex qua stirpis in modum impressa, uel per puncta peritonei membranę graues cōsensūs, atque indignationes adferat: quippe cum sępe etiam gelati sanguinis corpuscula irruentia uulnē diuisuris, uel quęque externa magnos tumores atque indignationes commouerint. Erasistrato uero causanti, quod post detractionem humoris ex iecoris duritia in passionē uenerūt superiores partes, ac magis salutare, adductione quadā pōderis indigentur, erit respondendum, quia plurimi hydropes sine ulla iecoris duritie in passionem uenire probantur: etenim ex alijs causis fieri posse, superius demonstrauimus. Plerisque etiā, quanquam iecur duruerit, nō necessario in hydropem uenire cōtingit: ac sępe adductione partium, uel indignatione superiorum uexari perspicimus, quo sępe tumor etiam perdiderit ægrotantes. Omitto quod iuxta eius sententiā oportebat supinis iacentibus ægrotis nullam querelam partium attestari: siquidem iecur nullo pōdere superiora distendat, hoc est discrimen, quod Gręci diaphragma appellant. Asclepiades uero repētina effusionem atque coaceruatam cum periculo fieri testatur: siquidē uia, quas Gręci poros appellāt, interiecta mora blando tactu cōtingāt, & propterea illasi maneant ægrotantes. Detractione autē facta liquorum, aspero tactu cōtingant, atque concidētes angustentur: ac simili ratione etiam spiritus uehementer in uēs carni dolorē faciat, atque inflationē, & tormenta intestinorū. Est pręterea facile expugnabile Ptolemęi dictū, quod paracētēsis humorē detrahens passionem nō auferat: etenim primo, neque ex alio quolibet adiutorio singulari hęc passio solui posse perspicitur: quippe cū sit magna atque perseuerans, dehinc quędam adiutoriorum obreleuanda accidentia passionum, quę Gręci symptomata uocant, adhibenda probentur: quanquam

quamquam non totum solvere morbum uideantur, ut phreneticis luce commotis oculorum præfectio. Item alia quædam, quæ quâquam nihil per se medeantur, alijs tamen adiutorijs præparent corpus, uel patientem locum, quo facile adiutorij beneficium sumat. Ac tonsura uel rasura capitis fluore quolibet affectis, quo detractis capillis illinienda medicamina constrictiua, uel epithemata, aut cucurbitæ appositione nullis obstantibus medeantur: quanquâ sit detractio capillorum, laxatiua: at uero paracentesis etiam per se plurimum medetur: releuat enim detractionem plenitudinis tensionis, atque spirationis difficultatem, quam dyspnoeam uocant, & alijs adhibendis adiutorijs præparat partes: non enim potuerunt medicamina illinimenta, uel appositio sincera uirtute ad uiscera, uel patientes partes peruenire, cum interiecto humore peritonei membrana plurimum à cutibus distet, transeant autem facile ad ea, ad quæ destinata erant humoris interiecti ablatione permixta. Quapropter paracentesin adhibendam probamus, sed non ijs qui uiribus fuerint fatigati, aut adhuc in tumore peritonei membrana constituti: addentes etiam, uel prædicentes periculum. plurimi enim quanquam alterius superesse uitæ potuerint, & sine ullo dolore mortem capere, paracentesis cura celerem mortem pertulerunt.

CÆLII AURELIANI SIC

CENSIS CHRONION

LIBER QUARTVS.

De Elephantiasi. Cap. I.

Deest principium capitis

heliosis, dropacismus, & lixiui calidi perfusio, & psychrolusia, atque cataclysmus, hoc est, aquarum ex supernis illisio, natatio maritima, & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quæ aluminis naturam exhalent, quas stypteriazas uocauerunt: siue ferrugineas, quas sideriazas appellant. Item adhibenda smegmata alia, donec maculae albescant, quas supra memorauimus: uel cymolia terra subassata, cum hordei polline, & nitri, quippiam, uel alia quæ lacescere ualeant magis, ac leuius, ut est cinis uistarum bucinarum, uel halcyonum: aut cum eodem pumex assatus, uel sulphur uiuum, uel sepium testa exusta cum pumice & nitro, & cymolia subassata, atque gummi, & galla, æqui hæc omnia pōderis. Item acopa & malagmata mediocriter lacescentia, præter cutis ulcerationem, & ijs unguenta similia, ut myrobalani cum aceto: aut uinum cum ammoniaci gutta, & alumine. Ac si ulceratio fuerit locorum consecuta, erunt cōgrua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapropter ea, quæ serpere per corpus uiderimus, amputabimus. Tumētia uero mitigatiuis temperamus & laxatiuis uirtutibus. Itē humēta atque fluida densamus, & sordida purgamus, caua replemus, & equalia in cicatricem ducimus, sicut. Responsum libris chirurgiam scribentes monuimus. Ea autem, quæ in cicatricem uenerunt, sinapismis roboramus, prælatis metasyncriticis cyclis, & radicum uomitu, & ceteris quæ sua sunt. Tum resumpto corpore uehementer utilis hellebori albi datio probatur, quo corpora dissecantur: quæ non semel adhibēda, sed etiā sepiissime per interualla præroborato corpore. Item nauigatio, & in aeres meliores transitus: sic enim passio soluetur, aut non ex ea deformatus egrotas ad finem uitæ perueniet. Veterum autē medicorum nullus istius passionis curationē ordinauit, excepto Themisone, atque ex philosophis Democrito, si uere eius de elephantiacis cōscriptus dicitur liber, quo sanguinis corruptionis causas cōscribēs phlebotomados imperat egrotantes: & potados decoctione herbe, quā in Syria memorat nasci & in Cilicia: sed neque hæc dicere possumus, neque passio tā difficilis ijs duobus adiutorijs solui creditur posse. Themison uero secūdo lib. epistolarū ad Dimā tē scribēs phlebotomari iubet, recte quidē, sed nō stricturā considerās potius quā conuiuante causam sanguinis detrahendā: quod est æstimabile, atque, ut ita dixerim, dogmaticum, sicut secūdo libro de cœnoretis scribens Soranus docuit. Utitur præterea uomitiuis ieiunus, itemque radicū eorum confundens tēpus: oportet enim superpositionis tempore adhibere phlebotomiam, in lenimento uero uomitum. Itē uentrē inter paucos dies leuiter deducendum iubet, atque superficiem corporis constringendā unguento myrobalani, cum aceto & oleo rosaceo paruo, uel myrtino, & ammoniaci gutta cum alumine. Deponit etiam ægrotantes in decoctione frigida ex herba perdicia cōfecta, uel plātagine, aut murta, aut rubo, bis in die, atque sufficienti tēpore quadā tarditate ægrotantes imperat immorari. Dat cibos facile resalabiles, & potum magis aquam: quæ sunt incongrua. phlebotomia enim similiter laxatiuum genus est, & cibus resalabilis, & singula unguēta quæ imperat adhiberi, constringunt. Item embasis, quā fieri ex decoctione herbarū iubet supradictarum. Item unguenta condensant corpora. Sed hoc passus est, cum nondum limpide methodicā perspiceret disciplinam, & Asclepiadis secta circumseptus, passionis causam in extasin æstimaret, quam præstabat fieri per ensem siue cutem: & ob hoc quærebat materiam à superficie ad altiora, uelut latius patientia, reuocare. Utitur denique constrictiuis extrinsecus, & rapit ad interiora ea quæ fuerint appositum uirtute depulsa. Prouocat etiam uentris fluorem, & uomitum, utitur hellebori purgatione,

CAELII AVRELIANI SICCENSIS

adhibito psilothro in tres uel quatuor dies, uel alio quolibet urenti medicamine usque ad cutis ruborem, quo magis perseverantem faciat passionem. Adhibet præterea cataplasmata, ex quibus etiam succos adhibuit arnoglossæ, uel perdicij herbæ. Item malagmata adhibet constrictiua, ex quibus nunc plurimi laudant argagation appellatum medicamen. Item exercitium probat, & defricans cutem: declinat ungere: sed adhibet græcum, non coniiciens hoc quoque esse laxatiuæ uirtutis. Adhibet etiam ammoniaci guttam cum aceto uel uino, aut quæ sunt intra se contrariæ qualitatibus. Item post exercitium sudationem faciendam igne uicino, sed aqua frigida fouendos imperat ægotantes: & usum hellebori geminum probat: quæ sunt quidem uera adiutoria, si tempora quoque seruentur, ut Responsionum docuimus libris. Item quidam Themisonis sectatores initia quoque passionis præuisa, coercentes pronos ac dediuos, uel uenturos in eandem, quos uiderint, phlebotomant, & helleboro purgant: eos autem, quos iam possessos acceperint, ipsi negant curandos adiutoriis: siquidem corruptione quadam uel laxatione extremæ cutis in corporibus hæc passio generetur, et sit arifica carnis, atque mollica corporis phlebotomia. Quapropter inquiunt esse frigorandam uel siccandam corporis superficiem, quo possit eius humor ad intestina uel uentrem recurrere, ac deinde clysteribus, uel purgatiuis medicaminibus, quæ catartica uocant, detrahendo cibum. Præterea præpotandos probant ægotantes succo nepetæ, seruata moderatione quantitatis, quæ neque minuenda, neque superanda sit tribus cyathis usque ad sex. Cibus etiam dandum frigidum, atque constrictiuum & paruum: potum frigidum, sed meratum, ex uino uehementioris acrimoniæ, atque albo, uel ueteri: & sæpe tenendos ægotantes, uel siccandos abstinentia bibendi, siccioribus reficiendos cibis: quæ sunt utraque incongrua ac dissonantia siccandæ cutis, secundum eorum intentionem. sic enim, ut aiunt, è superficie transmittendus est humor ad altiora, atque eò prouocandus, ut clysteribus ac purgatiuis medicaminibus excludatur per uentrem: erit enim contrarium, siti atque siccioribus cibis, & uino super prædicto altiora siccare. Item aliqui horum multitudinem intuentes frequenter adhibendam phlebotomiam, atque clysteres, & uentrisflua medicamina, quæ catartica uocant, iubent: & magis diacameleos appellant: quibus necessario corrumpentes ægrotos, in peiorem habitudinem corporis uertunt, quem Græci cachexiam uocant. Item alij corruptione hoc fieri, atque mutatione ex uenenis effecta estimantes, temperatiuis uti medicaminibus decreuerunt: ex quibus magis asinino lacte ægotantes potandos imperat simplici, uel accurato, quod schiston appellant. Item uino dulci, & cibis similibus, quibus foeda digestione corruptis maior efficitur corporis corruptio. Ordinant præterea theriacam dandam, quam cuncti Mithridatium appellamus: quæ quidem re corporatiua uirtute mederi posse, perspicitur. Dant etiam uiperas mandendas, sed amputato capite atque cauda, mensura digitorum quatuor: cætera coquentes, atque obdulcantes sale & oleo, ægris offerunt comedenda. Alij etiam aqua ex labris, quibus candens tingitur ab operantibus ferrum potandos dicunt: cum sit hæc passio secundum plurimos scriptores ex aqua graui, quæ aut natura, aut aliqua corruptione foedata sit, sæpius generata. Alij quoque etiam cutis uulnerationem affectandam probant, qua corpus exhumoretur: neque cunctis commune iudicium, & ignaris cognitum providentes, quod peiorante passione superficies corporis ulceretur. Item alij ægotum in ea ciuitate quæ nunquam fuerit isto morbo uexata, si fuerit peregrinus, cludendum probant: ciuem uero longius exulare, aut locis mediterraneis & frigidis consistere ab hominibus separatum: exindere uocari, si meliorem receperit ualitudinem, quo possint ceteri ciues nulla istius passionis contagione fauciari. Sed ij ægotantem destituendum magis imperant, quàm curandum: quod à se alienum humanitatis approbat medicinæ.

De phthiriasi.

Cap. I I.

ANTECEDENTE cachexia etiam hoc symptoma generatur, quod nos accidens dicere poterimus. Sumpsit igitur nomen non à genere, sed à multitudine pediculorum: plurimi enim creantur nunc per totum corpus, nunc per eas partes quæ capillatura conceptæ sunt: & nunc consueti atque simplicis formæ, nunc ignoti, hoc est latiores, & duri magis ac sequentes moribus uehementer, quos quidam feræles appellant: nam sæpe etiam sub capillis inueniuntur corpora penetrasse. Sequuntur autem ægotantes uigiliæ, & pruritus corporis, atque pallor, cibi fastidium, & stomachi debilitas, & caluities: & est passio solutionis cholæræ rubæ egestione plurima per tenues uias emergente, qua hæc animalia generantur. Denique superpositionis tempore iacere oportet ægrotos loco mediocriter frigido, atque cibis constrictiuis, & temporibus iam sæpe demonstratis refici. Fomenta uero & perunctiones, & cataplasmata membratim erunt adhibenda, qualia Themison elephantiacis curas ordinauit. Sed ea loca, quæ capillatura uestita sunt, erunt præterea radenda, superpositione resumptio adhibenda, atque re corporatio, sicut in cachecticis, uel elephantiacis ordinauimus: sed iugia adhibenda smegmata, quæ nos lacescentes, atque purgatius uel ueres nuncupamus. Item unctiones magis, cum mox fuerit capillatura derafa præfortis partibus aqua marina, uel aceto salso. Sunt hæc denique plurima speciatim posita, ut bulbi cum nitro atque oleo contriti, quo mellis faciat crassitudinem, ex quibus corpus erit illiniendum. Item staphysagria cum aceto atque oleo trita, uel infusa aceto & oleo, nunc contrita cum salis fluore, quem Græci halos anthos uocant, donec liquidi mellis similitudinem faciat. Nunc etiā cum sulphure uino atque aceto: uel ita ponderibus composita medicamina, staphysagriæ drachmas duas, sandaracæ drachmas duas, nitri obolos duos, admixto oleo & aceto, donec in mellis crassitudinem ueniat. Vel sandaraca cum oleo, & nunc staphysagria, & abrotonum æquis ponderibus admixta calce, quam Græci conin uocant, & ijs similibus. Palpebris autem.

autem erunt adhibendi ficci pulueres, atque collyria, quæ Græci blepharica uocant, nos palpebraria dicere poterimus, ex ære usto, atque aneso asso: sed & lapide scisso, & pipere, & staphysagria confecta. Hæc etiam in ijs, qui præter phthiriasin pruritu uexantur, sunt adhibenda, adiectis magis feruentioribus aquis in usu lauacri, & asperginibus pulueris ex thure & nitro, & sulphure confecti. Item solicationes, quas Græci helioses uocant, adhibendæ sunt: dropaces quoque, & uomitus radicum, & ea quæ iâ sæpe de alijs memorauimus scribentes passionibus, quæ corpus recorporatiua uirtute fortificare, atque in meliorem habitudinem commutare ualeant: sic enim detracta corporis cachexia, quam nos malam habitudinem dicere poterimus, eius quoque comitantia depellentur.

De uentriculosis, quos Græci coeliacos uocant, & de cæteris defluxionibus. Cap. III.

VENTRICULOSA passio, quam Græci coeliacen uocant, à parte corporis, quæ patitur, nomen accepit. Generatur ex antecedenti digestionem continua, uel tumore uehementi, aut dysenteria. Sequitur in hac passione constitutos uaria stercoreum egestio qualitate atque colore, nunc tenuis ac soluta, nunc aspera & inæqualis, uel constricta, & nunc alba, nunc similis urinæ camelorum, nunc flaua & spumosa, nunc præsina uel liuida, aut nigra, aut purulenta, aut sanguinea, cum graui foetore & rugitu intestinorum, quem Græci borborysimum appellat, atque in exitu sonitum, & post effusionem factæ uelut scatentis stercoreis uesiculæ: & nunc iugiter nocte atque die, nunc coaceruatim, sed interiecto spatio, ut per diem bis uel semel, aut interpositis uno uel duobus diebus, aut eo amplius: & nunc cum tensione atque uentositate, & tormento, uel dolore aut singultu confidente, atque conducta cute quæ uentrem circumtegit, attestante si ri, & ipsius uentris feruore, & leui in interioribus torpore frigido: sequuntur etiam uigiliæ, fastidium cibi, & aliquibus plurimus appetitus, niriū debilitas, pallor subalbidus, & nunc febres, dehinc corporis odor teret plurimus, ut etiam quæ suis manibus tetigerunt computrescant, & difficile careant odore concepto. Tum uultus inflatio atque pedum: quibusdam etiam dysenteria congeneratur, cum facile fuerint intestina ulcerata, ob defluentium acrimoniam. Est autem passio solutionis, & aliquando stricture complexa: siquidem aliqua eius uideantur esse coniuncta, ut ex supradictis conijcitur. sed discernitur à speciali rheumatismo uentris: siquidem plurimæ in ipso fiant egestionis, sed non uariatur supradictis concursibus. Quapropter cum adhuc noua, uel emergens fuerit passio, nec plurimi temporis, sed in superpositione constituta, quam Græci epitasin uocant, erit eo tempore locandus ægrotans constrictiua ratione, ut sæpe docuimus, adhibita requie: & quantum uires permiserint, abstinentia: etenim ad perferendum atque corpori adpropriandum cibum sumptum, nunc uenter patiens indignatur, tanquam oculi patientes uisus officio: in qua ætati somnus etiam plurimus curandus, atque sitis, & lanis mollibus uenter contegendus, leuiter oleo Hispano prætractus, uel melino, aut rosaceo, aut murtino, aut lentiscino oleo. Ac si uentositate quoque, uel tormento affecti fuerint ægrotantes, dulci oleo dimissionis tempore lanæ tingendæ sunt. Perunctio uero ex oleo uiridi adhibenda: facies quoque aqua tepida releuanda. Tunc cibus dandus, ut alica ex aqua frigida ita curata, ut sua caruerit difficultate, quod fiet ex farris tepore, aut decoctione palmularum Thebaicarum. Dandus etiam panis solus, aut cum eo oua hapala. Item pulles ex oryza, uel alica, aut farre, aut milio, ex paruo Hispano oleo confectæ, & paruo salis grano. Vel si dolor admonuerit, adhibenda cucurbita longior: procurandum tamen, ut si quid partis spongia ceperit solitæ, damnum moderationi non sit: tunc leuiter oppresso liquore, quo folliculi reflatio fiat, erit tentandum, ne clysteris caueria fuerit clausa. Dehinc apponenda podici fistula dextera manu usque ad eius uerticulum, quem Græci aspidiskon uocant, impulsu leui, & neque recto ductu contra oppositas partes, neque superiora repentino, uel cum plurimo conatu: tumores etenim exinde atque collectiones efficiuntur. Quapropter sensum atque paulo inferius inclinato ductu, injectio fieri debet ad illam partem, in qua constitutum est os sacrum, quod Græci quoque uocant hieron osteon. Tunc illic enim spatium latius longaonis cum appositione facta erit digitis detrahendus, quo caueria fuerat obstrusa, atque sinistra manu continenda immobilitate seruata clysteris fistula, & dextra comprimendus folliculus leniter ac moderate, quoties inferiora intestina ulcerata noscuntur. Erit denique parua longitudinis, atque altioris cauernæ fistula procuranda, qua possit facili effusione patientibus locis medicamen tradere, ne suspensum ab ijs quæ patiuntur non solum nihil afferat commodi, uerum etiam sanis irruens officiat. Erit autem folliculi impressio uehementius faciendâ, atque fistula longior procurandâ in ijs, quibus superiora intestina fuerint ulcerata, quo medicaminis liquores eo ualeant peruenire. Et hortandus ægrotans, ne retento spiritu quodam recursum referiat medicamen. Ac si magna fuerit putredo, quam menomen appellant, non erit immodicum etiam ex utraque parte clysteris fistulam cauernare, quam Græci amphitreton uocant, quo possint medicamina liquida per utranque partem intestinorum lateribus aduenire: tum cum omnis fuerit folliculus complicatione uacuatus, siue oppressionem manus refusus, quo medicamina peruenisse sentiamus, erit detrahenda fistula suspensa manu, & distentis cruribus ægrotantis spongiæ commodatæ podici expressæ ex decoctione calidi liquoris, in quo præcocta sint mala punica, quo constrictione quadâ uirtutis herbarum quæ Græci stylin uocant, atque feruido tactu densatis partibus longaonis injecta teneantur. Tum modico temporis spatio intermisso, erunt etiam illa, quæ clunibus fuerant supposita, detrahenda. Et si fuerit æger in uentris officium prouocatus, in inferioribus ulceratione constituta, & magis si in longaone fuerit perspecta, erit hortandus paulisper resistere, & injecta continere, tangentibus nobis easdem partes, quæ pati

noscentur, quoties prouocari ægrum in egestionem medicaminis uiderimus. Ac si in superioribus fuerint ulcera, erunt permittendi egerere, cum uolent: etenim medicamen iam returrens atque defluens ad inferiora, longa onem sanum inutili uirtute adducendo exulcerat: nam quibus alienatæ sordes detrahuntur, iisdem non ulcerata uitiantur exusta, cum admodum corporibus tardius fuerint immorata. Excludis igitur cum medicamine post sufficiens temporis interuallum muculentis humoribus, atque rametis, & uariis defluxionibus intestinorum, sufficienter operatum medicamen accipimus: quanquam non de perfecta curatione tuto pronuntiare possimus, cum sæpe ulcerationis particula in superioribus constituta minime ualeat medicamen accipere, & propterea non omnibus commodata curatio uideatur. Vel si cõmixtum putredini medicamen cuncta purgauerit, hoc adprehendimus, cum solum præter aliqua purgamenta fuerit exclusum: At si hoc egestio secuta fuerit quædam aliena, minus quidem purgata, tamen accipimus ulcera, & propterea sanitatis spem pollicentia. Item si nihil fuerit exclusum, neque ipsius iniectionis quidquam, erit credendum necessario medicamen inhaesisse, quantum sua ualuit potentia: & propterea sui operis integrasse uirtutem, quanquam non perfecisse uideatur. Nec recte culpanda uirtus est, quæ una iniectione non dederit sanitatem, cum plenam fecerit futuræ perfectionis fidem, perseveratione sui persuadens. Vnde si omnino nullum fuerit redditum, medicamen erit impauide accipiendum: atque è contrario si eius nulla particula fuerit retenta, & statim effusum, nullum sui demonstrauerit effectum, omnia desperanda: est enim plurimæ debilitatis, atque alienatarum, uel mortuarum partium signum. Coniiciendum præterea, ne ut sæpe contigit, uetustate medicaminum efflata uirtute nullus sequatur effectus: & propterea sicut iniecta sunt limpide reuocentur: quapropter etiam hoc intuentum esse mandamus. Tum post egestionem factam spongijs erit postea detergendus: uel si nihil fuerit exclusum, in teriecto spatio unius horæ perunctum reficere ægrotantem cibis congruis, atque stomacho aptissimis, ut lactucæ thyrso, uel intybo cum aceto, quod sit ex murta confectum, aut oliuis fractis uel natantibus, quas colymbadas appellant, & ouis hapalis, & uolantibus nuper memoratis, quæ sint nutrita constrictiuis, ut murta, rosa, lentisco: etenim eorum pinguedo sic defluxit, atque caro constrictiua sufficitur: magis in eorum pectoribus quorum plus ossibus uicina aptiora probantur: sunt enim teneriora cæterorum. Danda etiam pomorum quædam constringentia, atque olerum cocta, quorum superius, atque de alijs scribentes passionibus memorauimus, potui dabimus aquam frigidam: quod si minime tolerauerint ægrotantes, dabimus feruentem plurimum aquam cisterninam: & si sine febribus fuerit ægrotans, dabimus unum exercitioris paulo uirtutis, ut supra docuimus. Omnino enim inuitantes appetitum, siue suscitantes, quem Græci orexin uocant, stomachi robur debemus custodire, nisi cum nausea etiam uenter fuerit resolutus. Oportet etenim curare, ne rursus plurimum cibum demus aut potum: uel priusquam solidum cibum sumplerint ægrotantes, bibendum credant: nam conuenit neque grauata, neque humecta intestina seruari. Si igitur medicaminis iniectio aliquo fuerit peccato uitata, ut non omnibus adiutorij partibus informata uideatur, mox medicamenti monstrabit errorem: nam quidam iniectione aliqua ex parte uomuerunt, aliqui stomachi ac uentris dolorem senserunt, singultibus atque nausea affecti, cum anxietate ac siti, & immitigabili ardore, & articularum frigidus torpore, & pulsu maligno, atque sudore uel defectu, aut pressura capitis, siue grauatione, quam carosin uocant: siquidem sit nimis uirtutis medicamen iniectum in febribus uel uiribus uitatis, aut in alto tumoribus constitutis. Vomitus autem medicaminis iniecti si ex tumore uentris fuerit factus, uel teneriorum intestinorum, tanquam in iliaca passione, sæpius ægrotantibus intulit mortem. Si autem nullo tumore subiecto fuerit effectus, ingerit uexationem atque metum: aut, ut sæpe contigit, passionis significat depulsionem: siquidem nulla pars ulcerum in intestinis à medicaminis contactu uideatur immunis. Tardate passione etiam recorporatiuis conuenit uti rebus. Quapropter oportet ea, quæ feruntur per uentris officium, celeriter auferre, & ora ægrotantium spongijs ex posca frigida siccatis reficere, articulos ligare, & stomacho cataplasma constrictiuum imponere, quod diaphnidon dicunt, uel similis uirtutis. Odoramenta quoque resumptiua adhibere, & frequentius cibo nutrire ex supradicta materia. Ac si accepta non tenuerint, erunt secundo offerenda, adhibita articularum fricatione, cucurbita ori uentris infixa: uel, si potuerit, etiam à tergo inter scapulas. Ac si dolor occurrerit, & singultus ob ardorem atque sitim, fomentis utendum est, & cataplasmatibus, & spongiarum uaporatione, & olei iniectione, quo possit medicaminis uexatio celerius obtundi. Perseuerate incendio, et calida, & oleo, & lacte sunt iniiciendi: & si nulla fuerit humoris significatio, eorum frigidus adhibendus est usus: & ob mitigandam sitim iugis adhibenda oris collutio, dandus interea potus. Item propter articularum frigus adhibendi tepores cum blanda manuum tenacitate, quæ diacertosin uocant, item unctio: sudores autem si expressura fuerint apparentes, erunt detergendis ex diaphoresi, & asperginibus cohibendis, & cõgruo cibo, & cæteris quæ de caroticis scribentes docuimus: quibus depulsis, hoc est presentibus periculis euadentibus ægrotis, si forte rursus in priscam dysenteriam uenerint, erit tentandum multo tempore simplicibus uti iniectionibus, hoc est, ijs quæ sine calce, quam asbeston uocant, uel auri pigmento, quod arseni con appellant conficiuntur. Tum si perseuerauerit passio, ad uehementiora transeundum, sed ex simplicibus rebus confecta, sollicitam habentes calcis uel auri pigmenti iniectionem: oportet enim putredini etiã cataplasmatibus occurrere: quorum sunt erui pollines posca decocti, & lentiscinũ oleum acacia immixta, donec mellis sumat crassitudinem. Item lenticula molita, cum melle, uel rosaceo uel lentiscino oleo decocta. Ac si putredinis causa sanguinis effusio fuerit consecuta, erunt spongiæ expressæ ex aceto calido pubetenus, uel sub umbilico & coxarum summitatibus, quas Græci ischia uocant, admouendæ: dehinc

iisdem locis etiam cucurbitæ feruefactæ adfigendæ, articuli ligandi, dandus digestibilis cibus, & qui facile cor-
 pori insinuetur: tunc uinum quod sit præcoctum in cortice mali punici. Inijciendum autem acetum,
 nunc solum, nunc cum thure masculo, uel eius manna contrita, uel quod ex confectioe superat diatheon
 emplastri, cum sibi eius materiæ miscentur. Imponenda etiam similis uirtutis emplastra, uel acacia aceto
 soluta: tunc donec scatere tætet coquenda, aut in amplo mali punici cortice supra tepentem cinerem sen-
 sim calefacienda, & ex ipso liquore partes contegendæ. Dehinc cerotaria apponenda ex oleo murti-
 no aut melino, aut uiridi contrita acacia atque consoluta, uel ex omphacino, aut œnanthino, cum ruta aut
 balauftio, aut aliquando iis omnibus: uel ut Themison composuit, acaciæ partem unam, rosæ aridæ par-
 tem unam, ammoniaci guttæ partem dimidiam, ceræ partes quatuor, & olei rosacei quod sit sufficiens.
 Hæc contrita in uino amineo, & soluta cera cum rosaceo oleo miscēda: ac si sanguis fuerit retentus, quod
 fiet aliquando cum gelatur, aliquando densitate putrescentis uenæ, erunt discernendæ causæ hoc modo:
 nam densatâ intelligimus uenulam, quoties pulsus exurgit, atque frigus corporis resumpto feruore mite-
 scat, ægrotantis animus melior, atque spiratione corpus facillime releuatur: ac si gelatus obstitit sanguis,
 quod Græci thrombolin uocant, & propterea fuerit fluor celatus, supradictis contraria sequentur, ut pal-
 lor, iactatio, pulsus paruitas, uel amputatio, quam Græci asphyxian uocant, grauedo, inflatio, frigus, torpor
 pubetentis, ac paulo superius: tum defectio cum sudore. Quapropter erit acetii iniectio facienda tunc,
 cum fluor fuerit abstinendus, diurnis diebus cibo reficiendus ægrotans. Si autem plurima ex parte retē-
 ti putredine parua excluderint ægrotantes, quæ sint languinolenta & ramentosa, & propterea profectu
 apparente melior esse curatione, adiuncto tamen metu ne retenta soluantur, oportet etiam secunda uel ter-
 tia die eundem trochiscum iniicere, sed solita, uel certe succū plantaginis, aut acaciæ cum aqua. Sin uero qui-
 busdam diebus sine officio uentris fuerint ægrotantes, ac rursum iniectionibus asperati, conijcimus in ijs
 non cicatricem ulceris factam, sed medicaminum supraducto cortice fuisse obruta: & propterea post ef-
 fectum uentris nuda atque sordidata, rursum humore fluere ordinabimus. Item tribus diebus lenticu-
 læ decoctionem crassioris succi iniiciendam: etenim intestina ui propria medicaminis coercentur, quæ Græ-
 ci styplin uocant, & ulcerum mitescit asperitas, & ex anterioribus medicaminibus facta conglobatio, siue
 cortex in saniem prouocatus cadit, & subiecta ulcera in cicatricem uenire coguntur. Ac si plurimo tē-
 pore ulceratio perseverauerit cum corporis debilitate atque fastidio, erit frequentia medicaminum euitā-
 da siue iniectionum, siue potionum: maior enim ex ipsis uexatio fiet, cum cibi appetitus extinguatur, &
 in fastidium ueniunt ægrotantes, nisi parua insuetorum multis fuerint consuetis admixta. Decoctionem
 autem lenticulæ secundo uel tertio per singulos iniiciemus dies: ex ipsa enim sufficienter intestina coer-
 centur, & latenter corpus nutritur, cū quadā particula digestionis usurpata uiribus profecerit ægrotantis:
 tum cum limpida ulcera senserimus, erunt cohibenda ea, quæ uehementius conficcare ualeant, quæ Græci
 styphonta uocant, & iniicienda mediocriter constringentia. Ac si quisquam eorum non tulerit uirtutem,
 erit diachylō medicamē oleo roseo soluendum, ac diligenter liquefactum iniiciendum, uel plūbeo morta-
 rio plūbeo pistillo circumducto imisso oleo rosaceo conterendū, donec in succū ueniat, atque crassius fiat.
 Horum quoque similibus utendum monemus. Tunc uino leni, atque carne uolantum uel marinorum
 utendum, ut squillæ, mulli, carani: & pro modo uirium gestatione resumptionis causa. Dehinc cum o-
 mnino tuta uiderimus, lauacrum adhibemus: sed non properatè, & magis cum forte iniectio fuerit facta
 trochisci, nisi primo uentrem egerint ægrotantes. Tardatè passione superpositionis tempore, iisdem
 uis conuenit. In lenimento uero erit fortificatio adhibenda corporibus per uariam gestationem, & uo-
 cis atque corporis exercitium. Post singulas egestionem adhibenda ex oleo & aqua calida, & decoctione
 lini seminis, aut foeniculæ, aut malux agrestis, iisdem partibus, hoc est sessioni, quam Græci hedram uocant,
 & specialiter admouenda uaporatio ex pollinibus cataplasmate calido, uel faccello. Dehinc etiam radix
 agrestis malux decoctæ atque contritæ, & calida testa calefacta erit apponenda. Ac si iugis fuerit dolor,
 immittendus digitus usque ad altiora, præunctus adipe anserino cum foeniculæ semine cocto atque con-
 trito, aut aliquo medicamine ex ijs quæ appellamus lipara. Ac si hæc minime fuerint inuenta, erit hoc
 cerotario faciendum simplici atque limido: & cum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda perunctio
 stricturæ congrua. Tum nutrimento dandus panis ex aqua calida, aut alica lota, aut pulicula ex melle
 confecta, aut oua forbilia cum pane. Potui autem aqua calida offerenda. Perseueratè autem tumore
 adhibenda cucurbita adiuncta scarificatione locis tumentibus, & uaporatio spongiarum: declinatione oc-
 currente adhibenda cerotaria, & resumptio cauta: sic enim sedatur iuges egerendi uentris delectationes,
 cum tumor mitigatione conquiescit: atque ille qui putatur rheumatismus indulgentia tumentium facilius
 abstinetur. Ac si equalis tumori fluor occurrerit, utriusque erit conijcienda curatio. Quapropter si
 fomentum ex oleo hispano, uel melino, aut murtino, aut lentiscino adhibuerimus, & cataplasmata erunt
 ex aceto atque melle, uel stymmatibus præinfusis coquenda. Item præscriptis iadudum iniectionibus
 concoquenda quædam constrictiua, ut murta, uel rosa, aut mala punica: lacte autem & cæteris admiscen-
 dum amyllum, & enatis matibus aliqua decoctio, stymmatum adiungenda, aut mali punici: & apponenda
 rursum sessioni uaporatio stymmatum, aut catabri conligati, uel in aceto decocti, uel quæ omelisin uocant
 ex pollinibus panno couligatis, atque ex stymmatibus confectis: perungenda etiam digito interiora lon-
 gæonis ex cerotario oleo roseo confecto, aut adipe cum oleo roseo. Tum post peruationem ora lauā-
 da aqua tepida, cibus dandus pulicula calida, ut de uentriculosis scripsimus, quos Græci celiacos uocant,
 ex alica uel farre, aut oryza, aut milio, aut olyra, aut pane Alexandrino: hæc singularis uel aliquando amylo

admixto, aut lacte, aut melle ex fauo expresso. Potus parvus dandus, sed calidus: tum effecta reclinatio: ne resumptio adhibenda. Ac si solutio fuerit urgentior, uel sola, frigidus conuenit locus: ægrotanti, & supina iacendi positio, paulo lenius capite locato, & suppositione lanarum, clunes uel inferiores longæonius partes subleuandæ. Adhibenda etiam requies, & impressus articulis manuum amplexus, uel ligatio paulo tenacior. Deponenda etiam omnis animi intentio, & magis cogitatio passionis auertenda: admonet enim egestionem, ac prouocat inquietudinem in memoriam reducta conscientia. Erit denique persuadendum, ne, quoties fuerint ægri in egestionem commoti, ilico uentrem facere festinent: sed, quantum potuerint, resistendo differant motu. sit enim quædam meditatio, atque frequens egerendi consuetudo, & oportet effugere laborem motus, ac nutandi corporis frigus, nisi forte acrior, aut incendiola fuerit defluxio: retenta enim sessionis in locis, quam Græci hedran uocant, longæonem exurit. Conuenit denique, si possibile fuerit, ægros ad sessionem egestionis deportari, aut humiliter à lecto scaphia posita ad egestionem produci faciendam. Vel si plurima fuerit corporis defectio, quæ iacentes non ualeant fluentia retinere, erunt egestionem spongij suppositis excipiendæ, & medijs partibus apponendæ lanæ, nunc oleo constrictiuo prætinctæ, uel decoctione buxi, uel murtæ, aut mali punici, & horum similium stygmatum, uel succorum constringentium, nunc asperfo ruthergerinario, quem Græci byrsodepicon uocant, uel trita galla erunt media siccanda: hæc enim constrictionem sine ullo frigore fore promittunt. Dehinc apponenda ex palmulis epithemata, & malo cydonio, & balaustio, & alumine, & horum similium, sicut de coeliacis, uel sanguinem spuenteribus, aut stomachicis scribentes docuimus. Inijciendus etiam per dylsterem succus plantaginis, aut polygoni herbæ, uel intybi, aut uiz lupinæ, aut herbæ caricaræ, uel semperuiuæ, aut mespilæ, maluæ, aut oryzzæ, aut decoctione mali punici, uel eius caduci, quod Græci cytinonrhoas appellant, nos ampullagium. Et aliquando hæc ipsa erunt conterenda, uel rosa, aut rubus, quam Græci baton appellant, aut lentiscus, aut galla, aut thallia, aut rubi uirgulta, uel uitis anuli, quos helicas uocant aut salicæ folia, aut ex uino bunito ijs qui sine febre adficiuntur: ex aqua uero ijs qui febricitant. Item ros syriacus, aut omphacium, aut acaciæ succus, uel hypocistidos herbæ, aut balaustij drachmæ duæ, in quatuor uel quinque cyathis coniiciendæ: est enim ea quantitas iniectionis redundans, hoc est siquidem plurima grauedine quadam prouocet uentrem. Item lenticulæ decoctio, aut licium indicum cum lacte. Sicut autem amyli drachmæ quatuor, sicij drachmæ duæ, lactis cyathi septem uel octo: extendenda enim hæc singula atque minuenda sunt pro magnitudine solationis, ac uirium ægrotantis. Ac si plurimus fuerit in ulceribus sensus, ut medicaminum constrictione lacessita indignantur, erunt iniicienda ea quæ cum dulcedine admota partes ualeant præficcare, quo neque ulcerationem prouocemus, neque fluorem negligamus. Ex quibus est in febricitantibus succus ptisanæ cum adipe caprino, contrito atque commixto tracanto, uel gummi, aut argillyrici radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix autem coquenda, aut rosa ceo oleo ouum commixtum, aut lac coagulatum, uel cum amylo concoctum ad tertiam partem. In ijs uero qui sine febris fuerint, passum conuenit Creticum, & uinum squilliticum supradictis speciebus. Tum refecutionis tempore unctio adhibenda ex oleo hispano, ac deinde ora lauanda posca tepida. Cibus autem specialiter, ut in coeliacis ordinauimus, dandus. Similiter etiam potum conuenit dare Lac quoque bibendum præcoctum, quod appellant diacochleon, siue singulare: etenim fluores crassificando cohibet, & ulcera deterget, & acrimoniam humorum temperat, & sine ullo labore corpora nutrit. Est autem coctionis hic modus: lac sumendum ex agresti pastu perfectum: etenim in ciuitate nutritorum animalium reprobamus: siquidem capræ è falsiore pascua sitientes plurimum atque coaceruatim bibant, & multum lac, sed aquatum faciant, quod est constrictioni uentris incongruum. Quapropter magis ex caprea, quæ lentisci pascua, uel murtæ, aut rubi, aut uitis folijs, uel quercus, aut salicis, uel hederæ, aut terebinthi, aut herbæ calicaris, uel polygonij, aut plantaginis, & horum similibus fuerit nutrita, erit lac accipiendum: confluxit enim constrictiua qualitas herbarum in lactis qualitatem: nam sæpe diagridium, uel helleborum mandentes, purgatiuæ uirtutis efficiunt lacem, sicut procicolum comedentes lac generant, quod uisum præstet accipientibus abunde. Denique erit primo probandum, atque eligendum quod sit albidius, atque sine ullo odore, & neque globosum, hoc est, frustis coagulatis uariatum, quod Græci thrombodes appellant: neque in urinæ similitudinem mutatum, quod iidem uroides appellant: sed quod possit in guibus destillatum manere sua tenacitate collectum. Boni igitur, ut diximus, lactis quatuor uel quinque sextarios oportet in uas fictile mittere siue cœneum: immittendæ & cochleæ, quas nos lapides marinos, uel fluminales accipimus, non marinæ igitur ob falsitatem, sed fluminales inustæ: primo quo sint igne pellendæ, tum auferendæ: & ex sufflatis omnibus, quæ de se forte dimiserint, ac depurgatis supradicto uasculo immittendæ, ac ferulis lac cum iisdem cochleis mouendum, donec ad mediam ueniat partem, siue tertiam: dehinc refuso lacte proijciendæ priores cochleæ, atque alię innouandæ similiter exustæ, sed per p̄fectū numero atque forma minores longa per interualla. Hęc confectio lactis diacochleon appellatur. Sine ijs uero confectio erit longe simplicior, quam Græci aperiergon uocant: uas enim lactis erit imponendum igni molliori, & immissa ferula metienda mensura totius ac dimidiæ, & tertie quantitatis, quo nō coniectura, sed uera dimensione coctionis quantitatem sumamus. Tunc ex ipsa ferula circūlato ductu mouebimus coquentes, ne lateribus uel fundo iugi mansionem insidant: dehinc ultimo coctionis tempore plurimus detrahendus est ignis: & cum ad partem dimidiam, uel tertiam uenerit, erit in aliud uas refundendum: exinde egro dandum, non frigidum, sed leuiter gelatum, quod galactodes appellant. Ac si forte stomachi fuerit euersio commota, cum accipere egrotantes horrescunt, erit frigidum dandum, præfecto uasculo niuibus: ut enim

ut enim mel decoctum fit constrictum, sic etiam lac deposito atque excocto tenuissimo liquore, quem Græci orrhon appellant, & uapore concepto constrictum fieri necesse est. Conuenit denique etiam supra dictus ex regula motus. Est enim uirtute cōstrictiua, & sui corporis raritate, tenuitate lactis, uel aquarum à liquore ebibens. Accipere autem ægrotantes debent pro passionis magnitudine, & sumendi uoluntate, quam Græci orexin uocant, quidam plurimum, quidam paruum, & primo ex ea decoctione, quæ fit ad dimidiam partem redacta. Tum ex ea quæ ad tertiam uenerit partem: siquidem fit paulo plus cōstrictiua uirtutis. Sed erit eius usus comparatione prioris minuendus. Tunc post bibitum lac nullū potum sumere debent ægrotantes: est enim ratione carens lac decoctione constrictum, supermisso liquore in aquam uertere. Præterea in ijs qui sufficienter, uel quantum uoluerimus sumpserint, nihil erit omnino superdandum: ijs uero qui minus accepisse uidebuntur, sicut de coeliacis ordinauimus, erit superdanda pulicula ex lacte confecta, ut destinatus impleatur modus. Tunc post intermissionem mediocrē si quisquam nauſeauerit, erunt dāda mali punici grana, uel acinæ uuarum siccarum, quas fabriles appellant, aut melpila, uel sorba. Quidam igitur primam decoctionem probauerunt secundæ præponendā: siquidem lac in semet uelut calcis qualitatem accepisse uideatur, qua possint putredines ulcerum abstineri. Alij uero secundam magis probauerunt, quibus etiam nos consentimus: non enim admixtæ supradictæ qualitatis causa est abstinendæ passionis: potest enim etiam quiddam calcis uiuæ, quam Græci asbeston appellant, lacti admisceri. Sed est incoctio siue insumptio aquosi liquoris, quo amisso syncerior lactis qualitas fiat, quæ neque curiosa confectio, neque nidorosa, uel fumosa sufficitur, si simplici coctione fuerit procurata: cum enim lac se à suo humore separauerit, quam Græci orrhon appellant, crassius effectum ac uiscosius insidens uentri, atque intestinis, & multo tempore immoratum liquida concrassat, & ulcera mitigāter amplectitur. Item alij tertiam partem aquæ lacti miscentes decoquunt, adserentes quod sit decoctio melior, ne ullo nidore siue fumo, aut uisione lactis natura uitietur, ob aquæ admixtionem. Si autem si usque eo coquendum iubent, donec ad modum præmixti redeat lactis, qui fuerat prius, quā aqua misceretur, & liquidius conficiunt, & non sine suo naturali liquore, quem Græci orrhon appellant, ægrotantibus dabunt, præca lactis quantitate seruata. Sin uero ad partem dimidiam uel tertiam decoquent, non solū plurimum decoctionis tempus insunt, uerum etiam tarditate coquendi diutina fumosum faciunt medicamen. Hæc sunt quæ in ipsorum erroribus respondemus: eius autem datio erit discernenda: nam primo gelatum bibi debet, siue tepens, quod Græci galaodes appellant: tum feruens. Sed cum primo fuerit profectus aliquis ex ante dato: hinc enim perfecta passionis fiet abstentio. Ac si quisquam ægrotantium lac sumere noluerit, aut horrido uisu, aut stomachi supinatione recusans, erit alijs adiutorijs adiuuandus. Et si ulcus fuerit in superioribus ac densioribus intestinis, utendum medicaminibus potis, quæ Græci anoerica uocauerunt: etenim quæ inferioribus clystere iniiciuntur, hæc magis patientibus aptanda sunt locis. Et cum cibi fuerint adpetentia seruati, nec ullo fastidio ægri uidebuntur adfecti, erit medicaminum consueta magis eligenda materia: ac si fastidium fuerit, sola probanda. Sed eorum compositionem atque ordinem ex ijs quæ de coeliacis ordinauimus sumi mandamus. Licet præterea cum ijs etiā acaciæ, uel crenanthes ex aqua cisternina contrita; donec collyriorum faciat crassitudinem, rotundata frusta dare bibenda, aut resoluta cum uixello oui assi in quantitate dimidij cochlearij, aut aqua resoluta: in ijs, qui febre afficiuntur, tribus cyathis: in ijs uero, qui sine febris sunt, cum uino erit offerendum. Præterea communiter etiam hæc quæ sanguinem expuentibus dantur probamus: quorum est succus plantaginis, uel una die ac nocte rhus syriaci infusus uino uehementiori: quo detracto, oryza immissa uino coqueamus: dehinc lenticulæ pulmentum decorticatæ atque subassatæ in puliculæ modum cōficere. Item oua aceto cocta, uel ouorum uitella, quæ sint carbonibus assata. Item decoctio ex plantagine, aut agrestis, & intybo, quod cicorion Græci uocant. Sed hæc singula erunt duplici coctione curanda: nam post primam coctionem erunt in aliam aquam transferenda cum alijs nondum coctis: quorum coctione perfecta priorum secundum probamus effectum. Erunt præterea hæc condienda oleo uiridi, & aceto, & paruo sale, uel quod est melius, rhos. Et si sordidum tardauerit ulcus, iniectione mulsi perseverandum probamus, nisi solutio fuerit adiuncta: uel decoctione mali punici etiam, si crebræ temporaliter uentris egestiones: quæ quidem erunt terendæ. Item corticis pini, aut subassatæ interioris tunicæ, siue corticis glandis, quam sardianam uocant, aut pulenti, aut cuiuslibet materiæ uehementius astringentis. Ac si quisquā harum uirtutum recusauerit usum, horrens oblata, siquidem sensu torqueant acriore, erunt hæc mellis decocti atque durati latitudine cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil eorum uirtuti derogetur: siquidem etiam mel coctum constringat. Item malorum punicorum trium mediæ magnitudinis corticem sumētes, admixto uino lymphato, hoc est, aqua temperato coquemus, in ijs qui sine febris afficiuntur, uel declinante causa melius habere uidentur: cū cisternina uero heminas sex, quas cotylas Græci appellant, in ijs qui etiam febris afficiuntur, donec ad tertiam partem liquor deueniat. Tum ex ipsis duos uel tres cyathos ante cibum dabimus ægrotanti, uel eadem mala omnia contusa atque colata, uino aut aqua immixta erunt offerenda non plus cyathis duobus. Item mala cydonia cum malis punicis decocta in uino dulci, aut squillitico, tunc frictione siccata atque crassificata cum lacte dato conueniunt, uel aquæ cyathis sex. Item ges aster cum aqua ducta curationi conuenit. Alia quoque plurima simillimæ uirtutis infinita specie concurrunt. Item cibo danda alica cum uino melino aut murtino, aqua temperato. Tūc plurimo profectu accedente dandi turdi, atque pulli gallinacii, uel columbarum atque uolātum, quæque sicciora, ut phasiani pectora, uel perdices, aut attagenæ agrestis: quæ singula erunt postea ap-

te coquenda, aut mediocriter assanda, ne lignosa fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt hec animalia reclusis pectoribus uirgultis murtæ penetranda, aut eis magis replenda. Tunc mediocriter coquenda, ac deinde farina conspersa tegenda, & cinere calido maturanda. Item maritima quæ sunt densioris carnis. Agrestium quoque, hoc est, leporis uel capræ conueniunt pulmenta, uel pomorum, quæque uiuida uirtute constringere ualent, ut mala cydonia cocta uel assata. Item pira, sorba, mespila, quæ nōdum fuerint maturitate dulcia, pruna agrestia, mali punici grana cum exterioribus membranis excata. Item uua, & magis fumi uapore siccata, quam fabulem appellant. Omnis præterea cibus erit diligenter masticatione exercendus, quo digestibilis fiat, ne uenter debilitate segnior plurimo laboret. nixu appropriando corpori quæ sumperit. Melius autem partibus erit apponendum diatheon medicamē, & omne quod fuerit siccantium malagma, uel aceto confectum. Tunc etiam unum dandum, quod fuerit natura plurimum constringens, ac pro regionibus cognitum, ut in Italia Preñestinum appellatum, uel Surrentinum, & magis Signinum ac Mariscum: ex quo oportet etiam alicam myro curatam dari. Ac si forte hoc uini genus minime fuerit repertum, erit quiddam aquæ calidæ admiscendum, quod eandem ualeat imitari uirtutem, ut rhaponti cum, uel illud quod Græci appellant inter corticem quercus inherens, pertetam neruorum fila teneriora. Item rhus linteo ligato, uel galla uiridis, quæ appellata est omphacine, aut uitis amyli, quas elicæ appellant, aut uirga rubi, aut cerasia, aut mala punica, aut fabæ græcæ folia: nō hec quidem erunt iugiter adhibenda, sed medicaminis uice. Tunc apparente magis profectu, adhibendum lauacrum, & corporum motus per gestationem, uel deambulationem insinuandus. Ac si passio perseverauerit transacta superpositione, erunt iisdem quæ supra memorauimus resumendi egrotantes, adiecto uocis exercitio cum corporis uehementi defricatione, & magis uentris in locis. Item cyclus iuxta regulam, quæ aut qualitatis solius habeat ductum, ut equali quantitate seruata descensus uel transitus ad parui nutrimenti mutationem ueniat, ut à tardis uel paruis uolantum animalibus ad palumbos uel perdices, & ijs similia. Aliquando per quantitatem solam, ut eodem pulmento seruato, exempli causa, perdices, & paruo modo ueniant ad plurimum. Tunc erunt utraque iungenda, ut etiam qualitate ac quantitate uariatus formetur cyclus, cum uires egrotantis ualentes uiderimus. Quomodo autem initium sumendum sit, uel panis fieri partitio: uel quia in pulmentorum mutationibus uinum uel lauacrum detrahimus, & iandudum dictis accipiendum probamus: sed lauacra rara atque calida magis inuenimus aptissima. Tum confirmato corpore, ac resumptis uiribus uomitum conuenit adhibere: & primo ex simplici potu, secundo ex radicibus, quo partialiter locale adiutorium uētri præstemus, & quodam uehementi motu, ueluti purgatione per uomitum effecta, omni impedimento digestionis officij liberetur. Tum transendum ad mediæ qualitatis pulmenta, & cætera cyclorum ordine suo reddenda usque ad porcine pulmentum. Itaque agrestium, hoc est, leporum atque capræ danda iandudum docuimus. Dehinc adiungenda drimiphagia, quæ sine uomitu erit adhibenda uno uel duobus diebus, ac deinde cæteræ cydi partes integrandæ. Conuenit præterea oliuas nigras aceto decoctas, cum mali punici cortice contritas, admixto pipere albo, & oleo hispano modico, atque recenti ieiuno ægrotanti dare: nunc nulla addita specie, nunc adiuncto pane. Ordinanda etiam cætera resumptiua atque recorporatiua uirtute medentia, ut gestatio uaria, deambulatio, uocis exercitium, perunctio, defricatio, quæ nunc exercitij tempore, atque uincto nunc arido uel sicco erit aptissima. Item sicca cibatatio, & cucurbita recorporatiua uirtutis secundum medias partes, dropax illitus usque ad uentris confinia atque uertebrorum, psilothra, sinapismi, & paroptes usque ad cutis ruborem, cum defricatione ex oleo atque nitro. Item arena sole ignita, acopa actiora, ut ex euphorbio, & opobalsamo, & simili uirtute medentibus confecta. Item malagma secundum uentrē, quod appellatur diathapsias, uel diacapanecos, & diacuphorbium, & aliquādo parua sumptio medicaminis poti, quod appellamus diatrion pipereon. Et sunt hæc cuncta medicaminum libro conscripta Responsum. Item peregrinatio atque natatio maritima, & naturalium aquarum. Ac si fortificatum corpus rursum fuerit humoris fluore tentatum, quod Græci rheumatismum uocant, conuenit hellebon dati decoctum, uel radicibus inserti, quod cataplaston appellant: dissecat enim corpus, & quadam nouitate confirmat. Culpandi præterea etiam nunc ueteres medicinarum conditores. Hippocrates enim libro quem ad sententias Cnidias scripsit, helleborandos principio ægros ordinauit, ultimum adiutorium cæteris anteprensens. Dat præterea panem ita curatum, ut neque ab hominibus recte ualentibus posse digeri facile uideatur. Item pulentum, atque foenigræci semina, cum sint hæc qualitate contraria: alia enim astringunt, alia relaxant, & nulli adiutorio tempus adiunxit. Diocles quoque libro quo de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, prouidens siccandum corpus urinalibus medicaminibus, utendum iubet quibus non solum humor uentris ficcari minime posse perspicitur, uerum etiam uesica in morbos cogi uenerit. Item Erasistratus tertio libro de uentre prohibet cibos digestibiles ac nutritibiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, non coniciens quoniam omni ægrotanti digestibilium rerum usus conuenire perspicitur: quo minime & in laborem medice partes, quibus digestionis celebrantur officia, cogi uideantur offensa. Prohibet præterea specialiter lenticulam, atque mala cydonia, & si quæ similis fuerint uirtutis, quo una uoce omnem congruam uideatur recusare curationem: nutritibilia etenim, quæ ob resumendas uires principalem tenuerunt locum, superfluum est, ut æstimat, adhibere. Lilius etiam quarto libro. Tardam passionum principio adhibendum uomitum post cibum probat. Sed cum noua ac recens in corpore fuerit passio, sine dubio dupliciter nocens: primo quod intemporaliter, etenim nouellæ passionis suauis quodam, & non agitatione uehementi sunt depellendæ: dehinc quod incongruæ, siquidem sit uomitus post

post cibum grauiabilis capiti. Inquit præterea: Si humoris perseverauerit fluor, atque longo tardauerit tempore, & typico motu uentrem fecerit humectari, occursibus periodicis tribus uel quatuor interpositis diebus uentrem conuenit prouocare. Vnde plurimi etiam lac offerendum probant, quod schiston appellatur, siue catarticum, quo in acutum potius, ac periculosum ueniant morbum: exinde possit medicina tanquam celerem facilius curare passionem.

De uentris debilitate. Cap. IIII.

ETIAM hoc quidam symptomatis genus, quod nos accidens appellare poterimus, scripserunt: & auiunt debilitate uentris acceptum cibum plurimo tempore in eodem permanere: aliquando corrumpi: & magis cum intestinum, quod Græci nestin uocant, fuerit quoque debilitate uitiatum. Fieri etiam inflatione secundum uentrem existente, attestatè paruo dolore, & rugitu intestinorum, quem borborismò uocant, cum plurimo sputu ac ructatione iugi. Sed erit accipienda curatio ex ijs quæ cum dolore, atque intestinorum tormento ægrotantibus adhibenda scripsimus.

De uentris tumore ac duritia & uentositate, inflatione, ac saltu. Cap. V.

TUMOREM uentris extantia sequetur secundum præcordiorum media, resistens atque dolorosa attestante seruire & iugi saltu, & aliquando febricula, cum fastidio & siti, anxietate, & iactatione. Sequetur etiam uigilia, & cibi corruptio. Sed discernitur à superiorum tumore, hoc est peritonei, siue cutis superpositæ. Primo, quod transuoratus cibum uelut percussum præstet circa stomachi finem, uel uentris initium. Secundo, quod adducta cutis digitis, conduplicata sequatur: duritiam uero uentris sequetur extantia, plurimum resistens sine ullo seruire atque pulsu, uel dolore, sed sola spiratione difficili, & digestionis impedimento paruissimo. Item uentositatem sequitur tensio cum rugitu intestinorum, quæ facile relaxetur, ac rursus colligatur: & si palma fuerint partes pulsatae, ut tympani resonum fingant: impleta uero recessum faciant tardum, & detracta manu facilius surgendo concaua repleant loca. Inflationem uero, quam Græci œdema uocant, sequetur extantia partium. Sed facile atque plurimum impressioni cedens, & neque tympani resonum fingens, neque seruiris ingerens sensum. Itæ saltus comotos iugis sequetur, sicut etiam cor salire perspicimus, cum nimio uel timore, uel gaudio afficimur. Sequitur etiã sensus tanquam uolantis interius ab ijs omnibus, attestatè inani tusculula longa per interualla, & thoracis pungente tensione: sed erit accipienda curatio ex ijs quæ de strictura stomachi conscripsimus.

De dysenteria. Cap. VI.

A DIFFICULTATE officij passio nomen accepit dysenteria. Est autem intestinorum rheumatismus cum ulceratione. Sed fit antecedente fluore, quem Græci diarrhoeam uocant, aut cholera, aut tumore uentris. Et est difficile celer, frequentius tamen tardans passio. Sequitur in passione constitutos muculenta uentris egestio, atque è ramentis innexa, & humore crasso: primo, cum naturalis intestinorum defluit corpulenta soliditas: dehinc uaria, atque sanguinolenta, & fellofa, aut faniosa, atque feculenta, aut cum gelati sanguinis corpusculis, quæ thrombos appellant, & liuida, aut carnosæ, & membranis plurimæ longitudinis innexa, attestante graui foetore, cum dolore ulcerum, & fastidio, & siti, atque interiorum ardore. Sequentur etiam uigiliae, & aliquando febricula, anxietas, iactatio, hebetudo, & aliquibus intestinorum rugitus, & tensio cum uentositate, & impedimento urinæ reddendæ. In quibusdam etiam uomitibus, & saltus præcordiorum, aut torpor frigidus, lingua humecta, aut plurimum sicca, aut aspera, colore cinereo, aut liuido. Item corporis defluxio, & accepti corruptio cibi feruens, cum iugi atque incessabili egerendi uentris desiderio, & in eadem admonitione mordicatio intestinorum omnium, uel podicis, aut uicinarum partium. Fit autem ulceratio aut in tenuissimis intestinis, ut pyloro, nestidi, typhlotero: aut in crassioribus, ut in colo, uel longaone: in omnibus enim eodem tempore fieri, uel esse ulcerationem minime posse accipimus: siquidem mors præueniat ægrotantes. Interioribus igitur intestinis factam ulcerationem adprehendimus ex doloris sensu supra umbilicum constituto, siue ex eodem loco initium sumemus, & egestionibus uentris semper tenuissimis. Ac si in crassioribus intestinis fuerit ulceratio constituta, sensus doloris secundum umbilicum efficitur, & egestionibus uentris carnosæ apparebunt, & frequenter coagulata magis atque coacta stercora egeruntur, cum solus fuerit passione longao uexatus, & magis eius inferiora: præuenit enim, atque non finit cibi digestionem in stercoris uenire qualitatem. Aliquando denique ultimo egestionis tempore ulcerum tactu sanguinatio fiet, ut guttarum distillatio appareat, & insignia tenesmi demōstret. Quod iuxta sessionis finem, quam Græci hedran appellant, longæonis pars ulcerata intelligatur, manifestis atque promptis concurrentibus signis: nam delectationes frequentem egerentes afficiuntur uentris egerendi, atque ipsa egestio cum quadam uoluntate, & labore nimio efficitur tensio clunium, & pectinis pubetenus cum sensu, tanquam quiddam corporis solidioris inesse putetur. Ipsa quoque stercora, uel eorum egestio parua, atque leuiter muculenta uideatur, & humore crassiore cōfecta. Nos denique tenesmon dysenteria adiungendam probamus: siquidem fit ulceratio partis intestini, nisi quis uoluerit ante

ulcerationem solum tumorem appellare tenesmon : quod est quidem inconsequens omnium scriben-
tium dictis, quibus tenesmus necessario fuit prouidendus, ut sola proteruitate medicamina pota danda ala-
cri temeritate confingant : sed etiam nobilium multi, ut Dioscorides libris quos de passionibus atque causis,
& curationibus scripsit, lac ordinat cum melle bibendum, uentrem prouocans in fluorem. Item mur-
rham cum ouis atque uino commixtam, cum necessario stomachum murrha euertere uideatur. Item
utitur ptisana cum adipe sorbenda : item galla cum opio, neque discretionem qualitatum, neque tempo-
rum memorans usum. Praxagoras libro primo Curationum statuit uentrem deducendum pepilio & la-
cte plurimo, cum mulso, potans & aqua salsa, & succo betz, & oleo cum mulso. Hoc condimento ini-
ciens, & oleo, & liquido cerotario cum aqua, quibus uenter magis in fluorem prouocatur. Item nutrit
bis cocto pane, qui sit necessario digestionis difficilis, cum plurimum torretur. Item piscibus saxatilibus,
& carnibus teneris, cum debuerit densioribus magis obstringendam solutionem : dat aquam bibendam,
& uinum dulce, quod etiam sanos inflare perspicitur. Offert farinam cum lacte coctam, quae indigestibi-
lis probatur : sic etiam tritici ptisana cum cantabro. Ordinatur etiam secundam & tertiam curationem,
nullam adiiciens discretionem. Item Erasistratus secundo libro de uentre plurima recte componens, so-
lis utitur constrictiuis, cum sint plurimi dysenterici laxatione indigentes. Themison primo libro Tar-
darum passionum plurima recte memorauit, aliqua uero correctione indigentia : laxamenti enim causa,
atque lapsus faciendi aquae, & arnoglossae succo iniectionem faciendam probat, & hoc aptum etiam tu-
moribus memorat, quod ob constrictionem siccare perspicitur. Adhibet etiam naribus atque auribus,
& angulis oculorum sanguinis detractionem, nihil propositis profuturam, & post cibum unctionem, quo
tempore quies est adhibenda, ob digestionis perficiendae facilitatem. Dat etiam uinum asperius, cum
fluorem uehementescere uiderit atque febrem. Et meratum probat offerendum, quo tempore ob
augmentum passionis aqua uino infecta conueniat, maxime cum merata potio uexare nervos approbe-
tur, quos Graeci cremasteras uocauerunt.

De colicis passionibus. Cap. VI. K. 115

Principium huius capitis desit.

Concurrit praeterea grauedo, sitis fastidium, & incessante passione, siue accessionis tempore articularum
frigidus torpor & liuor, attestante sudore, & mentis hebetudo, cum pulsus paruitate ac densitate. Item
sequitur singultus, & uentris abstinentia, aut cum dolore egestio urinae reddendae difficultas, capitis gra-
uedo, intestinorum rugitus scatens, quem Graeci borborigmon uocant, & augmento passionis uomitus
humorum crassorum, quos Graeci phlegmata uocant, tum felineorum, cum tensione membranae quae uen-
trem intra cutem circumtegit, & appellata est peritoneon, quae perseverans faciat inflationis causa resonant
tympani, cum palma fuerint loca pulsata : tum extantia, cum rugitu plurimo, & dimissionis tempore uen-
ti per podicem egestio cum magno sonitu. Ac si tumor fuerit insidens atque roboratus, erit extantia
durior, ac puluoso attestante feroce, cuius circumscriptio simplex, sed inequalis esse uidebitur : quod discer-
nitur a iecoris ac splenis, uel peritonei tumoribus, qui in peritoneo sunt aequales : in iecore uero ac liene
quadam circumspectione finiti. Est autem passio aliquando continua, ut plerisque tanquam ileicos in-
terficiat : aliquando deficiens, ut saepe tarditate perseverans difficile curabilis fiat. Sed eius curatio etiam
nunc strictur conueniens probatur. Quapropter si acuta, uel celer fuerit passio, uel in superpositione
constituta, conuenit aegrum iacere loco calido, contactis partibus in passione constitutis lana limpida at-
que calida. Adhibendus etiam fons olei dulcis calidi, & saepe memoratae uaporationes cucurbitae appo-
nendae leues, quas Graeci cuphas appellant. Item uascula, quae ambigas uocant, & sunt materia testea, uel
uitrea confecta : tum requies atque abstinentia cibi usque ad tertium diem : & si causae poposcerint, adhibe-
da phlebotomia. Ac si sumpto cibo quisquam dolore fuerit affectus, uel nausea, erit uomitus prouoca-
dus sumpta primo aqua tepida, uel aqua & oleo, quibus potis immixtis digitis accepta reddantur : uexatio
nem enim uomitus, sumptorum perseverans pondus atque tensio, & mordicatio tumentium grauior ue-
xatio iudicatur. Adhibenda etiam clysteris iniectio ex olei calidi cyathis quatuor, admixto & consolu-
to adipe anserino, uel gallinaceo, uel ouorum uitellis, aut decoctione lini seminis, uel hybisci radices, aut
maluae usualis, aut foenigræci succo. Inijciunt autem aliarum sectarum principes etiam rutatium, aut
anethinum, aut panacium, uel ex cymino atque castoreo, & bitumine. Secundum Themisonem uero
etiam cum absinthio : castorei, namque uel bituminis duae drachmae cyathis olei quatuor miscentur. Ru-
ta uero & anethum, & absinthium, & cyminum linteolo illigata oleo coquantur. Sed sunt haec acerrima,
& propterea tardis passionibus congrua, quas Graeci chronias uocant, uel uentositate laborantibus, & non
causa tumoris dolentibus. Bitumen autem saepe etiam fastidium ingessit euerso appetitu, quem Graeci
orexin uocant. Cibus dandus conueniens dimissionis tempore, atque alternis diebus, donec passio deci-
det, & sorbilis, leuis, calidus. Dandus etiam potus non plurimus, ne intestina grauentur, etiam ipse cali-
dus : tum post fomenta cataplasma adhibendum ex lini atque foenigræci seminibus, & polline, quod Graeci
magton appellant, aqua mulsa coctum mel decoctione fici pinguis, & hybisci radices, & maluae usualis,
uel horum similia, cucurbita apponenda adiuncta scarificatione, uel hirudines admoventes omnibus par-
tibus in tensione constitutis : ac deinde uaporatio spongiarum expressarum in aqua calida, & oleo, & de-
coctione

coctione foenigræci, & maluz. Tunc post unctionem ex iisdem etiã encathismata adhibent. Quidam medici in ijs qui uento fuerint inflati, ex decoctione stercoreum cum aromatibus coctorum uaporationem adhibendam probauerunt, ex quo liquorem etiam oxymelitos miscuerunt cataplasma cõficientes, admixtis etiam tunc aromatibus, uel nepeta herba, aut pulegio, aut hyssopo, aut cymino. Sed hæc in tardis passionibus adiuncta ratione locum sumunt perseverante morbo. Cõuenit in accessionis statu etiam bibere cyathos duos uel tres calido oleo diligenter admixto: etenim incendia leuiat, & uentrem mollit, & tumorem mitigat. Quapropter magis hoc melius mulso probamus: siquidem sæpe conflammet atque inflat. Dantur etiam plurima alia bibenda composita uel simplicia, ut est Zenonis diasticon appellatum codicum medicamen. Item Cassij ex gingibere confectum, quod diagingibereos appellant: & mille præterea, quæ concurrenti tempore lacessendo medeantur: præter tempus uero grauatiorem ingerentia aliquos in periculum grauius mittant, aliquos errore releuationis fallant, ob præsentis temporis perditum sensum, quod Græci anæsthesian appellant, hebetudine partium suffecta. Item simplicia, ut decoctio apij, uel nardi celtiberici, aut herbæ saluiz, aut polij, aut cymini ægyptij, uel rutæ, aut dauci, magis cretici, aut petroselinij tribus cyathis aquæ calidæ admixto cochleari, uel asperso succo polij, aut cymini Aegyptij, aut petroselinij, aut cochleari castorei, itemque fœniculi. Sed est semper horum datio in tumoribus uitanda: siquidem sint acria uel lacessentia uirtute. Conuenit præterea cum totius passionis fuerit status, folio oleo calido pleno ægros dare, & firmata dedinatione gestationem adhibere, aucta moderatione ciborum. Tum uinum, atque communiter refumptionem, & medijs partibus cerotaria ex oleo sabino, uel cyprino, aut si cyonio, uel glaucino, aut amaracino, aut laurino, aut panacino, aut rutino, aut anethino, samolucino, uel quod diateffaron appellatur, resina terebinthina, cera, iri illyrica, hyssopo, omnibus æqualibus: siue quod diapente uocant, pice, nitro, alumine, sulphure, cera. Sumendæ denique picis liquidæ hemina duæ, & ceræ libra: quibus solutis atque leuiter refrigeratis aspergendum nitrum rubrum tritum, & alumen scissum, & sulphur uiuum singulæ selibræ. Cum autem in lenimento tardauerit passio, conueniunt ea quæ fortificare ualeant corpus sine recorporatione demutare, ut uaria gestatio, & deambulatio, uocis exercitium, atque perunctio, adhibito monitore, siue fricatio cum retentione spiritus, & sphærz lusus, uel cursus, & humorum additus motus. Item cibus qui inflare minime possit ex mediæ materiæ qualitate, & tenue uinum, atque lauacrum longa per interualla: hinc enim facile corpora perfrigescunt. Item rubor faciës uentris in partibus, atque inter scapulas & clunes ex dropace, uel sole, & flammæ paroptesi, uel parietibus, uel ceromate, aut pelibus, uel arena litoris sole ignita. Item strigilis ratio adhibenda corporibus, & sicca defricatio ex asperis pannis, & cucurbita recorporatiua apponenda. Item unctio acorum feruentium acriorum, ut sunt diaeuphorbium, aut cactitum, nitri fricatio, & sinapismus, & uaporatio feruens ex aqua marina, uel salsa, uel supradictarum acriorum uirtutum decoctionibus, uel saccellis sale repletis: quibus præstitis, uel corpori admotis, erunt aliquando cauteræ superponendi, & circuminuoluendi: item farina circumclaudendus locus in passione constitutus, & implendus item cauliculis, & oleo: tum immit-tendi cauteræ igniti sensim, non usque ad loci scarificationem, siue uestionis effectum, sed usque ad ruborem faciendum. Tum malagma quod appellatur diaspermation, uel polyarchion, aut diadaphnidon, diachylon, aut diaeuphorbium. Item aquarum illisio patientibus locis, quam cataclysmos Græci uocauerunt, & iniectio clysteris rutacij, aut anethini, aut panacini olei, uel extenta uirtute aquæ salz. Et cum olim futuram inperpositionem uiderimus, uomitus ieiunio adhibendus ex radicibus. Tum perseverante passione etiam ex helleboro radicibus inserto: tum infuso, ac deinde cõciso iuxta ordinem cycli partium ceterarum. Dandum etiam potui medicamen, quod Græci theriacen antidotum uocant, uel diagingibereos. Peregrinatio quoque adhibenda, & longa nauigatio, & usus aquarum naturali uirtute medentium, & magis sulphuris ac medicaminis uirtutem redolentium. Item maritimarum, & primo feruentium, tum frigidarum. Ac si retentio uentris fuerit, ob egestionem faciendam adhibenda iniectio ex melle atque sale: quæ si minime compleuerit effectum, etiam ex aloe admixto succo coliculi agrestis uel usualis, uel lapatij: ex quibus erunt catapota facienda in erui magnitudinem, quorum quatuor uel quinque dabimus trans-bibenda. Item marini coliculi offerendi. Erunt præterea præcauenda magis quæ passionem ualeant refricare, ut frigus, indigestio, libido, uel quæ inflare ualeant cum sumuntur: item frigida plurimo scilicet tempore. Veteres autem, & magis Erasistrati sectatores uentrem mouere medicaminibus certauerunt uentrisiliis, quæ catartica uocant, uel pessulis, quos balanismos dixerunt.

De lumbricis. Cap. VIII.

ITEM alij ad aciores clysteres confugerunt ex initio adhibendos, uelut Asclepiades: & ali-quibus etiam fluor uentris efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando attestante fastidio & debilitate, & pallore cum tenacitate corporis: & nunc tussicula arida leui ex occasione commota: nunc solutione atque defectu corporis & animæ, quem lipothymian appellant. Pueris uero dormientibus turbatio membrorum efficitur, gemitu attestante cum iactatione, & stridore dentium, & sæpe contra solitum morem prona positio iacendi: tum clamatio sine manifestatione, exiliente cum uocibus egrotante. Quibusdam etiam repentinus casus occurrit, ut oppressi obmutescant, nunquam similiter affecti. Item aliquando conductione uel contractu membrorum rapiuntur, & quidam per interualla conticescunt, & in febribus demersione lethargorū simili premuntur. Itē totius uultus paulatim

nimia insinuat, nunc detracto rubore mutantur, & aliquando articulorum frigore cum difficili responsione, siquidem interrogentur, manibus elatis iactantur, attestante sudore. In pueris uero lumbricorum uersio, siue connexio sæpe occurrit, ut etiam tactu sentiantur durities in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ultima tenuitate. Tum denique eorum eversione ægrotantes interficiuntur. Pulsus uero ut etiam Themison libro nono Epistolarum designat, est inæqualis ac plurimum deficiens. Excluduntur autem nunc per uentrem, nunc per stomachum atque os, uel nares, & aliquando sponte connexi in sphaeræ similitudinem: plurimi amplexu mutuo uinculati, aliquando singulares. Item sanguinolenti, uel fellofi, aut cum stercore per podicem, uel humore felleo, uiui aut mortui, pleni aut inanes, & omnes, aut ex parte albi, uel fului. Alia denique plurima sequuntur ægrotantes, quibus designari supra memorata necesse est: & nunc parua, nunc plurima pro quantitate animalium ac forma: uel quod nunc plurimum, nunc parum noceat, locorum differentia uariante, cum nunc ad stomachum ascendunt, nunc in intestinis perseuerant, & ægrotantium uires nunc debilitate, nunc fortitudine habituantur, & nunc cum febribus, nunc sine febre. Sed quoniam multa ex accidentibus alijs quoque similia passionibus inueniuntur, ut alienatio mentis furor, atque phrenetidi, uocis amputatio, lethargo, & præfocationis matricis, & apoplexiæ, & epilepsiæ, atque apprehensionis sensuum. Qui autem ex lumbricis patiuntur, nunquam spumas excludunt. At uero præfocatio ex matrice cum ascensu matricis efficitur, quem Græci anadromen uocant, & magis in ætatibus perfectis, antecedente matricis egritudine. Ex lumbricis uero facta uocis oppressio magis ætatibus imperfectis adscribitur, antecedente uentris atque intestinorum querela. Item à catalepticis discernuntur lumbricis laborantes: siquidem illi in febribus obmutescant maiore atque percussibili pulsu testantes. Qui autem à lumbricis id patiuntur, etiam sine febribus uocis amputationem sustinent, cum pulsu paruo atque crebro. Item ab ileicis discernuntur, qui lumbricorum tormento uexantur: siquidem neque uentris officium in ijs abstineatur, uel pallor antecedit, aut contra consuetudinem iaceant proni, uel dormiant cum gemitu, & irrationabili exclamatione. Item à stomachicis discernuntur, cum nullus fuerit humor in stomachi partibus inuentus, & intestinorum tormenta sustineant. A syntecticis uero discernuntur, quod nulla querelatorum, uel conuersionis, aut doloris in intestinis, uel uentre afficiantur: quod necessario lumbricis laborantes sequetur. Item ab ijs qui naturaliter, uel ex multitudine cibi per somnum labia conducunt in similitudinem sorbentium, uel sine ulla ratione aut exiliunt, quod moderatione accedente, atque cibi facta deductione releuantur. Ii uero qui lumbricis afficiuntur, magis uexentur paritate ciborum. Hæc est similitum discretio passionum. De exclusionem siue egestionem lumbricorum ueteres medici præciam significationem posuerunt, & appellauerunt prognosin: in quo diuersa senserunt: nam Hippocrates libro Prognostico significare inquit lumbricos interfectionem ægrotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter mortuos lumbricos aiunt graua denunciare: siquidem ostendant inesse corpori ruptionem. Diodes libro Prognostico euomitos inquit lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per inferiora uero excludi quoque lumbricos non admirandum, sed mortuos & inanes esse melius ac salutare: uiuos uero atque plenos & sanguinolentos perniciosum. Item libro de egestionibus scripto, uiuos uel plenos, ac sanguinolentos febribiles dixit. Erophilus uero libro quem ad Hippocratis Prognosticum scripsit, siue uiuos, siue mortuos excludi negat incongruum. Apollonius Glaucus libris quos de Interioribus scripsit, reiectos rotundos lumbricos initio significare indigestionum frequentiam, ultimo uero ægritudinis properare iudicium, quod crisin appellant. Item uiuos ac plenos, & sanguinolentos non recta portendere. Appollonius Memphites perductatio, siue uniuersali modo, quem Græci catholicon uocant, omnia inquit in intestinis animalia nata in morbis graua significare, & magis mortua, quam si uiua excludantur. Item Antiphanes libro quem Panopten appellauit, melius esse per inferiora, quam per uomitum lumbricos excludere, & solos magis quam cum stercorebus. Chrysippus Asclepiadis sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celeribus causis, siue periculis mortuos inquit lumbricos egestos interfectionem ægro portendere: ostendunt enim mortui aciem uehementem inesse, quando magis ægri periclitantur. Sic inquit denique Hippocratem ferri, dicentem suo libro, eos qui in ægritudinis declinatione cum stercorebus egerunt, nihil graue significare. Sed neque inquit Dioclem Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos uel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse uideatur: Hippocrates autem mortem significare, sed in febribus stricturæ. Nos uero communiter significari aliquam ex lumbricis dicimus corruptionem, quam lientericis irruentem bonum quidquam portendere iudicamus, de ipsis scribentes docuimus: in omnibus uero cæteris noxiam. Item sanguinolentorum exclusio etiam debilitatem significat: albi enim, & nondum mutata aut corrupta materia nutriuntur: sanguinolenti uero uellendo ex ipso sanguine nutriuntur. Item in augmento accessionis febrium exclusi turborem altiorum partium ostendunt, & magis si fuerint sanguinolenti: declinatione uero laxamentum, sicut cætera, hoc est stercoreum uel urinæ, uel quorumlibet officiorum egestio: etenim laxatis corporibus reddi uidentur: quippe cum quorum adiectio grauet, eorum detractio necessario releuet. Hæc est lumbricorum significatio, sed ob curationem in ijs quos ascaridas uocauimus, si tumor in longaone fuerit constitutus, oportet iniectionem olei adhibere: quæ cum fuerit reddita, erit infusio aut decoctio centaureæ, uel absinthij iniicienda: ac si ramenta fuerint exclusa sanguinolenti coloris, decoctio mali punici corticis, uel gallæ conuenit iniectioni. Aut si perseuerauerit, chartæ exustæ, & auri pigmenti, quod Græci arsenicon uocant, æquali pondere, quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo arnuglosse. Ac si putredo apparuerit, quam Græci me-

nomen appellant, erit aqua lassa iniicienda, atque congrua medicamina, sicut nuper docuimus: ex ijs enim & animalia interficiuntur, & alij trochisci prohibentur, & ulcera cicatricantur. Ac si rotundi fuerint lumbrici, qui nunc stricturne accidunt, nunc solutioni, nunc ulceribus intestinorum: & nunc in celeribus passionibus, nunc in tardis, quas chronias uocant: non ex supradictis, sed sua in corpore alienitate uacantes ex corruptione ciborum effecta, oportebit curationem pro supradicta curari differentia: & si ipsa animalia corrumpenda uiderimus, erunt medicamina adhibenda, aut tanquam aliena, atque indigentia detractioe auferantur. Ac si passionibus fuerint appenditia, quae saepe generandorum animalium fuerunt causae, erunt congrua iisdem passionibus adhibenda: ijs enim conuictis, etiam animalia interficiuntur. Quapropter si stricture fuerit in corpore, fomentatio competens est adhibenda, atque cataplasma laxatiuum: & si ratio coegerit, phlebotomia: quae singula suis temporibus aptanda probamus. Tum cucurbita adiuncta scarificatione medianis partibus admouenda: ijs enim laxatis sine ulla medicaminum uirtute, atque facile animalia decidunt oleo poto, aut aqua calida, & oleo uel decoctione noxarum, aut glycyrrhizae, cuius libra infusa in aquae heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda: & ijs praeterea cibi tempore dari potest forbile quidquam, ut illud quod Graeci appellant oleoptisanon: ex ijs enim & tumentia relaxantur: & animalia, quae inesse uidentur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa fundentur. Ac si solutio fuerit in corpore, erunt constringentia adhibenda, & exercitatus cataplasma, sed ex lupini poluibus confectum, & aceto cum melle tribus uel quatuor cyathis aquae commixtis, cum ceruini cornu ferragine aspersa, quam Graeci rhinen uocant, in cochlearis pleni quantitatem, si tarda fuerit passio, quam Graeci chronian uocant: quoniam indiget recorporatione, atque lacescentium medicaminum uirtute. Sed in lenimento constituta erit uaria coniectura facienda, quo animalia excludantur. Quapropter adhibenda medicamina, harum partium fomentatio ex oleo ueteri: & apponenda unctio fellis taurini egrotantis umbilico, uel lanx ex ipso tinctae particula: tum cataplasma ex polline lupini consperso ex decoctione absinthij, aut fantonici. Admiscendus denique etiam succus eadem herbarum. Si uero uehementius oportuerit animalia alia fauciare, conuenit etiam tanquam acriores cibos, & propterea aptos, uel ut in drimiphagia, dare cepam, allium, quae nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo minima eorum uirtus erit offerenda: nunc enim, urgente lumbricorum exclusione, ijs uti cogimur rebus. Facit idem sinapi exuccatum, uel adiuncto pani comestum. Item nasturtium cum aceto contritum, siue ut Graeci uocant, cardamum, immisso atque infuso pani. Item laser aceto solutum, siue sinapi, quo comedenda tinguntur, uel ouo forbili admixtus iste liquor detur in eui modo: item absinthium cum uino poto datum. Ac si ulceratio fuerit intestinorum, congrua probamus adhibenda pro ulcerum differentia. Ac si febres non fuerint, neque alia quaelibet passio lumbricis consuerit, nihil oportet conijcere, sed ex medicaminum uarietate eorum interfectionem atque detractioem efficere: sunt enim bestiolae, quae Graeci theridia uocauerunt, sed producenda atque extendenda erit magnitudo curationis pro accidentium modo: & quoniam aliquando sunt in uentre constitutae, quod probatur ex egrotantium querelis, cum locorum sensus tanguntur: aliquando in intestinis, & necessario quae in uentre sunt celerius afficit medicaminum cibus ac potus. Intestinis uero, quae per clysterem fuerint iniecta: nam & ex uentre ad intestina haec saepe animalia, & ex intestinis ad uentrem refugiant. Erit sanabilius ergo, ut ubi apprehenderimus esse copiam lumbricorum, usum primo adhibeamus congrui cibi ac potus, similiter epithematum usum seruantes, & cataplasmatum, deinde clysterem. Oportet igitur potum dari absinthij pontici decoctionem, siue marini, aut fantonici usque ad modum duum cyathorum uel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc oleo adiuncto, uel decoctione lupini, aut noxarum cum cornu ceruini ferragine, & laser aqua solutum uel aceto, & admixto sinapi, aut ouo forbili transuoratum. Item alica in qua fuerit infusa aloë, siue ipsa transuorata: necnon etiam trochiscus dandus, qui appellatur picros, uel illa hiera quae dialoes appellatur: quorum compositiones Responsorum libris de medicamine scribentes tradidimus. Item cardamum quod nasturtium uocamus, torridum ac tritum cum aqua uel mulso, aut cum melle in electario datum. Item lupini ficci decorticati atque transuorati cum melle quindecim numero, uel uiginti: quod si minime quisquam transuorare ualuerit, eorum polline conspersum atque tritum, quantum tres digiti capere potuerint aquae bibendum admiscemus, siue mulso aut decoctione noxarum, aut electario admixto melle dabimus. Item gentianae succum in cochlearij modum cum mulso conuenit dare, atque horum similibus uti uirtutibus. Item absinthium cum uino, & castoreum cum mulso. In paruis uero pueris, quo latere possint, nasturtium frictum siue tritum cum melle atque laser dabitur potui, uel comixtum pani. Iis igitur rebus erunt cibi ponendi: pulvis enim atque forbilibus conuenit absinthium concoquere, uel similes herbas. Hoc etiam si sicco fico atque pingui, uel palmulis, quas patetos appellant, quae concise atque immisse, & cibo date, mederi ualebunt. Faciunt praeterea mora cibos data, quae uulgo celsa Latini uocauerunt, Graeci uero sycamina. Iste ex amygdalis amaris forbilia coepta, quae Graeci trophemata uocauerunt, & communiter cuncta quae uentre deducere ualeat. Hinc denique etiam pinnae aridae uelutici atque trite potui sufficientem modum miscuerunt. Conuenit etiam urtica, siue sola, siue cum aliqua decoctione, confecta: nam ob celebrandam curationem uehementer utilia probamus cataportia ex squilla atque chamelea coepta. Sumpta igitur squilla erit aciori aceto concoquenda, ne fluida fiat. Tum terebenta diligenter, ac deinde chamelea, anchusa atque creta admiscenda squillae, quantum res patiuntur, ut ad emplastrum ueniat qualitate. Tum facienda cataportia in saepe magnitudine, & pro uiribus egrotantis danda, ut torribus octo uel noue imbecillis sex uel septem, pueris uero tres uel quatuor ex aqua calida. Potest etiam ipsius chameleae coepta atque contrita cum mulso quippiam dari transbibendum, uel cum lactule paruo modo. for

bendum: sed pueris obolus unus, maioribus uero oboli duo sunt dādi. Itē fortibus tres. Perfecta tamē portio drachmę unius cōtinet modū. Vtēdū pręterea epithemate circa medias partes ex lupini pollinibus aut melāthio, & decoctione absinthij, aut fuluo liliorum, aut cerotario cedrię admixtis lupinis tritis, aut absinthio, aut agrestis peponis iteriora, quę Gręci colocynthida uocāt, cū melle atque lupinis, aut cętaurę uel aloes partibus duabus, & diagridij parte una cū melle & felle taurino. Erūt pręterea omnia quę potui ordinauimus dāda, etiā per clysterē iniicienda, & magis adiūcto uel admixto oleo plurimo calido, & succis pręscriptis, quo plurima mordicatione itestina afficiātur. Ac si lati fuerint lūbrici, erit adhibēdus uomitus ex oleo, nō ex radicibus, & alia die clystere utendū, admixta nitri parte, uel salis. Danda etiā aqua salsa potui, aut glycyrrhizę radicis decoctio, aut similiter incocta glycyrrhiza. Alij uero tres drachmas glycyrrhizę cū nitro probauerunt. Alij diagridij obolos tres, cum polypodij herbę drachmis duabus. Alij ex pinis medicamen confectum. Sed erit semper tentandum, ubi res patiuntur, ut ijs utamur medicaminibus, quę minime stomachum afficiant. Tum cum sensum acceperint ægrotantes animalium carendorum, ut interpellatione uentris admoneantur, subiicienda erit aqua calida, quo & loca relaxētur, & animalia procedant, ne frigore percussa fugiant. Erit pręterea curandum, ne frequenter hęc animalia renascantur, ut unctione regulari corpora fortificemus, adhibito pręceptore, adhibita etiam recorporatione cyclica, quę fit uomitu radicum, et drimyphagia, & dropace, & sinapismo, & paroptesi, & horū similibus uirtute rebus.

De mollibus, siue subactis, quos Gręci malthacos uocant.

Cap. I X.

MOLLES, siue subactos Gręci malthacos uocauerunt, quos quidem esse nullus facile uirorum credit: non enim hoc humanos ex natura uenit in mores: sed pulso pudore, libido etiam indebitas partes obscenis uisibus subiugauit, cum nullus cupiditati modus, nulla satietatis spes est, singulis spartanum sufficiunt sua: nam si nostri corporis loca diuina prouidentia certis destinauit officijs. Tum denique uolentes ueste atque gressu, & alijs scēminis rebus, quę sunt à passionibus corporis aliena, sed potius corruptę mentis uitia. nam sæpe timentes, uel quod est difficile, uerentes quosdam, quibus forte deferunt, repente mutati paruo tempore uirilitalis quærunt indicia demonstrare: cuius quia modum nesciunt, rursus nimietate sublati, plus quoque quā uirtuti conuenit faciunt, & maioribus se peccatis inuoluunt. Constat itaque etiam hoc nostro iudicib, hos uera sentire: est enim, ut Soranus ait, malignę ac foedissimę mentis passio: nam sicut formiņ Tribades appellatę, quod utranque Venerem exerceant, mulieribus magis quā uiris misceri festinant, & eadem inuidencia penē uirili sectantur: & cum passione fuerint desertę, seu temporaliter releuatę, ea quærunt alijs obijcere, quę pati noscuntur, iuuamini humilitate duplici sexu confectam, uelut frequenter ebrietate corruptę in nouas libidinis formas erumpentes, consuetudineturpi nutritas, sui sexus iniurijs gaudent: sic illi comparatione talium animi passionē iactari noscuntur: nam neque ulla curatio corporis depellendę passionis causa recte putatur adhibenda, sed potius animus coercendus, qui tanta peccatorum labe uexatur: nemo enim pruriens corpus scēminando correxerit, uel uirilis ueretri tactu mitigauit. Sed communiter querelam siue dolorem alia ex materia tolerauit. Denique etiam à Clodio historia curationis data ascaridarum esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes uermiculos esse docuimus longaonis in partibus natos. Parmenides libris quos de natura scripsit, euentu inquit conceptionis molles aliquando, seu subactos homines generari. Cuius quia gręcum est epigramma, & hoc uersibus intinabō: latinos enim, ut potui, simili modo composui, ne linguarum ratio misceretur.

Fœmina, uirque simul Veneris cum germina miscent,

Venis informans diuerso ex sanguine uirtus

Temperiem seruans bene condita corpora fingit.

Nam si uirtutes permixto semine pugnent,

Nec faciant unam permixto in corpore dirę,

Nascentem gemino uexabunt semine sexum.

Vult enim seminū pręter materias esse uirtutes, quę si se ita miscuerint, & eiusdē corporis faciāt, unam congruam sexui generent uoluntatē. Si autē permixto semine corporeo uirtutes separatę permāserint, utriusque Veneris natos adpetentia sequatur. Multi pręterea sectarum principes genuinam dicunt esse passionem, & propterea in posteros uenire cum semine, non quidem naturam criminantes, quę suę puritatis metas alijs ex animalibus docet: nā sunt eius specula à sapientibus nuncupata, sed humanum genus, quod ita semel recepta tenuerit uitia, ut nulla possit instauratione purgari, nec ullum nouitati liquerit locum, sitque grauior mentis culpa, ut cum plurimę genuinę, seu aduentitię passionēs corporibus infractę consensescāt, ut podagra, epilepsia, furor: & propterea etate uergente mitiores procul dubio fiant: omnia etenim uexantia ualidos effectus dabunt firmitate opposita subiacentium materiarum: quę cum in senibus deficit, passio quoque minuitur, ut fortitudo: sola tamē supradicta, quę subactos seu molles efficit uirōs, senescenti corpore grauius inualefcit, & infanda magis libidine mouet, non quidem sine ratione: in alijs enim ætatibus adhuc ualido corpore, & naturalia uentris officia celebrante, gemina luxurię libido diuiditur, animorum nunc faciendo, nunc facie iactata. In ijs uero qui senectute defecti uirili Veneris officio caruerint, omnis animi libido in contrariam ducitur appetētiā: & propterea fœmina ualidius Venerem poscit. Hinc denique coniiciunt plurimi etiam pueros hac passione iactari: similiter enim scētib, uirili indigent officio, quod in ipsis nondum & illos deseruit.

C A E L I I A V R E L I A N I S I C

C E N S I S C H R O N I O N

L I B E R Q V I N T V S

De ischiadicis & psoadicis.

Cap. I.

A P O R T I B V S quæ dolore uertantur hæc passiones nomina sumpserunt. nam uertebro-
rum summitas ipsorum initio terminatur, Græci ischia uocauerunt. Item musculos clunium
sub spinæ finem ex interioribus atque exterioribus adhaerentes psoas uocauerunt. Ge-
nerantur istæ passiones nunc ex manifestis, nunc ex occultis causis, ut est perfrictio profun-
da, uel terrena cubatio, aut casus, uel repentinus percussus, aut iugis atque immodicis
usus ueneris; aut quilibet longissimi temporis morbus. Item uehemens abductio, uel raptus in exer-
cizio factus, aut longissimi temporis hæmorrhoidarum fluxus tentus, uel insueta humi fossio, aut cuius-
dam ponderis leuandi ex interioribus conatio. Fit præterea in omnibus ætatibus, sed frequentius in
medijs. Sequitur ischiadicus dolor uertebro-
rum: quam passionem multi duplicem ischiada uocauerunt, attestante grauedine & difficili motu, cōtra solitum morem, & quibusdam cum leui torpore ac formicatio-
nis: quibusdam cum uehementi atque pungenti, & seruido dolore, & ad sensum patientis, tanquam serpe-
tis conuolutus motus: aliquando etiā cum febribus; ut neque in lecto suam cōuentionem ferre ualeant æ-
grotantes, & primo in uertebro, dehinc partis sup̄ penetrās loca, & usque ad mediā natē, ac superius ad in-
guē, uel ad ancalen, perueniens atque surā, dehinc etiā talū, & pedis summitatē. Tum cū passio tarda ue-
nit, cessante nutrimento, cruris totius tenuitas fiet, quā Græci atrophian uocāt, incipiens à clunibus, siue ab
inferioribus locis, attestante debilitate, & sæpe cōductis partibus breuitate cruris, aut ultra naturā longitu-
dine passionis distensione suffecta, ut in paraly sin ueniat, aut ipsius uertebri duratę partes extāiores fiant.
Constringitur præterea sæpe ac retinetur uentris officium, aut cū plurimo dolore perficitur, ob tensionem
atque spiritus retenti percussus, & in itineris pressu, quibus forte permittitur, ut initia motus impediatur
seruore partiū attestante: ac si perseverans fuerit motus, facilius fiet: tum rursus subsidunt, uel intenti resi-
stunt repēte, tanquam fuerant nec dum gressu tentato. Tunc magis uehementem dolorem sentiūt, & am-
bulāt quidam capitibus digitorum gradientes: alij extenti quidem, sed sinuatis clunibus, ut neque se pro-
nos inclinare ualeant: alij contracti atque conducti, qui peius omnibus habere noscuntur: siquidē passio
apprehenderit etiā spinæ musculos, & propterea duritia quadam hæc inuasisse uideatur loca. Patitur au-
tem principaliter membrana quæ ossa circumtegit, quam Græci periosteon uocant: item musculorum capi-
ta, uel summitatis. Denique augmento passionis intercreatus humor, & frequēti dolore corruptus, in sa-
niem transiēs partes aliquas collectionis afficit. Sed quoniam plurima supradictorum sequuntur etiā eas
quæ matricis uexatione afficiuntur, & magis cum eius fuerit inclinatio facta, quam paradisin uocant, faciē-
da est discretio passionum: & primo, quod matrice patiente in eadem potius causā inueniantur, atque
ex ipsa initium sumant. Psoadici uero clunium dolore afficiuntur, & tardo motu, ut se renitente dolore
nec inclinare ualeāt, ac difficilius & dolentius subrigāt. Plurimis igitur dolor cito cōquiescit: aliquibus ue-
ro perseverat, partes durefcunt atque conducuntur. Iis denique usque ad pene cutem unicus sequetur
gressus. Si itaque exteriores musculi fuerint in passione constituti, etiā tactu tentati dolescunt. Interiores
autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquā in nephriticis cōtingit: quos propterea denique similes
discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrant, quæ de ipsis scribentes memorauimus. Psoa-
dici autem, atque ischiadici, quorum nunc curationem scribimus, dolor efficitur nunc iugis, nunc
deficiens, ordinatus aut inordinatus, ac lōgis uel paruis interuallis recurrēs, ac puris, limpidis lenimentorū
uariatus spatijs, aut mediocres reliquias seruans. Vtilem inquit Hippocrates ischiadicis dysenteriam: ha-
bet enim imitationis quiddam recorporationis faciēdæ: quanquam plurima uexatione corpus afficere ui-
deatur. Item hæmorrhoidas, uel uarices, ut alij dicunt, laxamenti causa. Sunt autem difficiles curatione ma-
gis, qui plurimo tempore fuerint passione uexati, & multis atque uarijs accidentibus signis affecti. In
ordine itaque curationis hæc erunt intuenda, ut cū recens fuerit passio uel ueterata. Sed in superpositio-
nis tēpore constituta, iacere faciamus ægrotantē mollioribus stramentis calido in loco, adhibita abstinentia
& requie usque ad primam diatriam. Tunc lanis mollibus ac limpidis oleo calido dulci prætinētis dolen-
tia loca contegenda. Adhibēda etiā fomentatio iugis ex oleo dulci calido. Item uaporationum commu-
tatio, sicut in multis docuimus scribentes, & phlebotomia tempore consueto, atque ex brachio dolēti par-
ti cōtrario, uel plurimum dolenti comparatione alterius. Ac si æqualis in utraque fuerit parte dolor,
ex eo in quo fuerit facilius uena, erit detractio faciēda. Si neque hoc occurrerit, ex sinistro brachio adiuto-
rium adhibēdum: siquidē minus officijs domini necessaria pars esse uideatur: nisi forte sinister, hoc est sczi-
um fuerint ægrotantes. Tum tertia die adhibenda perunctio ex oleo dulci atque calido. Dehinc ora lauanda;
cibus dandus nutritibilis, calidus, tener, tanquam stricte cōueniens, & potui aqua calida usque ad declina-
tionis tempus. Seruanda etiā cibi alterna dierū oblatio. Tunc cessante dolore resumptio adhibenda. Per-
seuerante uero alia diatriam tempore, adhibenda iniectio ex decoctione foenigræci feminis, aut lini, aut

hybisci, quam Græci althazan uocant : quo pariter fota atque uaporata interiora laxamento consentiant. Admiscendum denique oleum calidum. item succus alicæ uel ptisanæ, uel oleum solum, aut admixto adipe anserino, uel gallinaceo iniiciendum, uel iis quidquam simile consolutum. Ac si uenter fuerit abstentus, erit mulsum iniiciendum. Tentanda denique & properanda sequentibus diebus facilitas uentris: quo conuenit, si hoc minime perficere ualuerimus, etiam linzostin herbam nunc solam cibo dare, nunc adiuncta malua: item agreste colicolum. Sed fugienda prædicimus quæcunque fuerint uehementiora, quantum quidem res admittunt, ut diagridium, helleborum nigrum, chamæleæ semen, quod Græci coccum Cnidii uocant, agaricum, agrestem peponem, quem colocynthida dicunt, singularia uel coniuncta. Item hiera, quæ diascammonias appellant, ne plurima uexatio pro parua comoditate sequatur : nam post fomenta conuenit cataplasmata adhibere : quorum confectiones atque species sæpe conscripsimus. Ac si permanserit dolor, adhibenda scarificatio. Hirudines etiam adhibenda, quas Græci, bdellas appellant. Hoc quidem secundo uel tertio faciendum, si causæ poposcerint. Tunc uaporatio spongiarum ex aqua calida, uel aliqua decoctione laxatiua uirtute mitigantium materiarum adhibenda, quarum iam sæpe species memorauimus. Ex ipsis quoque encathismata facienda. Item cerotaria dolentibus apponenda partibus ex oleo pingui, uel cyprino, aut sicyonio, uel ex radice hybisci confecto, aut irino, aut malo batrino, singularibus atque comixtis. Ac si duritia emerferit ad miscendum adipem, aut medullam ceruinam, uel bubulam, aut melilotum, aut hybisci radicem percoctam in mulla, ac diligenter contritam, aut decoctionem eiusdem hybisci, uel foenigraci, & lini seminis triti in mellis crassitudine confecti. Ac si difficile passionem declinare uiderimus, erit embasis adhibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plurimum minutus dolor, uarius offerendus est quibus, ex mediæ qualitatis materia. adhibendum etiam lauacrum, dehinc lene uinum: tunc malagmata partibus in passione constitutis, ut diachylon, uel mnaseum, aut dioxeleum, uel nileos. Item unctiones quæ mitiganter emolliant, & neque perfrigescere partes permittant. Cerotaria quoque limpida, aut dialum, sicut acopum, aut irinum oleum, aut samisucinum. Ac si passio fuerit tarditate inueterata, & plurimum tempore perseuerans, & in lenimento constituta, si hoc limpidum uiderimus, lenimentum erit pro modo permanentis doloris curationis faciendum, moderatio: tunc enim conueniens motus quidem, sed fortior lecto, de hinc cathedra uel sella usque ad inanem penetrandus, sicut in phlebotomandis facimus: sed ab umbilico inferius iis qui leuius afficiuntur, præcauentes uenarum diuisuras, ac deinde muliebri cathetere liquorem detrahimus, qui sæpe aquosus, sæpe fuluus, aut sanguinolentus, uel spumosus excluditur: quod quidem etiam ante factam diuisuram plerique futurum signis apprehendere uoluerunt: quorum alij talem fore dixerunt, qualis urina fuerit ægrotantis: alij qualis color apparuerit cutis: alij quolibet uiscere patiente sanguinolentum: non patiente uero ex causa auarissimi potus hydropismo concepto, uel salis potu mundum atque perspicuum liquorem fore. Sed hæc præter quod falsissime sunt opinionis, etiam ad mutationem chirurgicæ inutiliter quesita uidentur, nisi solum quod recte probamus, per cathetere liquorem, si res patiuntur, semel atque eodem tempore omnem auferendum. Sin uero aliqua obstiterint, post primam detractionem motarium aqua infusum supra diuisuram res implicantes, spongiam desuper mollem apponemus: ac deinde leui fasciola amplexo loco paululum differimus, quo turbatio corporis resoluatur: ac deinde resumpto ægrotante eodem die residuum detrahimus humorem: sin minus, alia die manibus comprimetes subiectas partes congrue ægrotante locato, hoc est schemate competenti. Ac si forte rursum confluyente humore fuerit repletus, uel uirium debilitas prohibuerit, eodem tempore totum detrahi, tunc interiectis duobus diebus, uel quantum uires permiserint, residuum retrahimus, sed alio in loco diuisuram facientes: uel si rursum oportuerit, tertio: etenim prima diuisura seruata distans aut cohzrens soluta tumores uel consensus ingerit uehementes. Tum perfecta humoris detractione, neque abstinentia utemur, ut Asclepiades: neque plurimum damus cibos, sed pro modo uirium: etenim abstinentia omni ex parte adhibita uires uexat quippe post plurimam detractionem. Multi item oblatio cibi grauans opprimit corpus potius, quam refutit. Erunt autem ante cibum sensim perungendi atque reficiendi facilibus, & potio sufficiens. Ac si dolor res aliqui emerferint, uaporationibus soluendi atque cataplasmatibus mitigandi. Tunc indulgentia relaxatis, uel forte non emergentibus, adhibemus ea quæ tumorem fieri non sinant, & superimpositis spongiis conligamus. Transactio tumoris metu magis uentris folliculum uel cutem intestinis cogimur adserere, atque similiter cætera quæ in tumore fuerant constituta, ut nuper docuimus. Aegrotantes præterea nauicula exerceri hortamur, & paulatim recorporatiua subijcimus curationi. Ac si neque ita fuerint resoluti, utemur helleboro iisdem curationibus insistentes, donec corpus repetat fortitudo atque defior uel coacta noscatur attestante rubore. Hæc est secundum methodum hydropum curatio. Plurimi autem earum sectarum principes, atque nostræ ueteres, nihil ueri curantes, ac magis contemptu quodam astruções corporum aspernantes, solius detrahendi humoris intentione traducti, quoquo modo id perficiendum crediderunt, immensa siti atque fame ægros afficientes, corpore concauo pectine decurso: & mille præterea urinalibus medicamentis, quæ diuretica uocant, uescam commouendam probant, & uentris fluis potionibus, quæ catartica appellant, uentrē prouocandum dicunt cocco Cnidio, atque lepida cyprina, & chamæleæ & hippophae herba, & ex crotonibus confecto oleo cicino: item neoro. Ex quibus cunctis stomachus uexatur, atque cibi appetitum amittit, sitis inceditur, corpus defluit, sanguis corrumpitur, atque humor detractus renascitur, uires auferuntur: siquidem neque potestas moderandæ detractionis sit in artificis manu. Itē quidam tanquam scabibile humoris ophitē lapidem ligauerunt, expertis ægrorum salutem credentes. Singulatim denique nobiliū medicorum historiam ordinamus. Herodicus igitur, ut Asclepiades memorat, uentris adhibet purgationem,

nem, atque post coenam uomitus, qui sint implebiles potius, quàm siccabiles. Tunc uaporationibus tepidis aceti decocti exhalatione cōfectis utitur, uel aquę marine, admixta thallia herba, atque hyssopo, & ijs similibus, uescis bubulis repletis corpus uaporandum probat, uel alijs quibusque maioribus inflatis tumentia loca pulsari iubet: sic etiam antiquissimus Euryphon. Hippocrates uero libris, quos ad sententias Cnidas scripsit, magis utendum dicit egestate atque uaporatione, & continentia: & danda sicca uel arida quęque & aciora mandenda. si enim equibilis eger fiat, hoc est urina facilior, ac si spiratio difficilis fuerit, quā dyspnoeā uocant, & tempus estatis, & estas media, dicit ex brachio phlebotomandos: & post detractionē factam dat panem calidū uino infusum atque oleo, & carnem suillam ex aceto decoctā. Dat etiam cantharidas tres detracto capite, & pedibus, & pinnis in tribus cyathis aquę cōtritas: sed neque quo tempore exercitio utendum sit manifestans: neque usque quo mandenda sint aciora, uel quando uaporationes adhibendę. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solū æstiuo tempore, ac media ætate, sed etiā omni tēpori atque ætati conuenire probamus. Est præterea importunum uinum, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomię. Item cantharides humorē commouent: carnis quoque offerendę tēpus significare neglexit. Diocles libro quo de passionibus & causis, & curationibus scripsit, siccādos inquit, ac mediocriter uaporandos, & deambulationi tradendos ægrotātes, & plurimos sudores cōmouendos, uel uomitū & urinā prouocandam diagridio, & apij semine resolutu succo herbę saluiz. Itē cardamomū, quantum uentrē ualeat semel deducere, & in aceto panem, solutum, & piscem salsum, uel pisces elixos & assos, uel silurum piscem, olera, radices, allium, origanum, rutam, satureiam, uinum album, & non aquatum, & ferarum carnē in deambulationibus uentrem iubet contineri, ceteras corporis partes defricari, exceptis cruribus. Sed hic quoque communi cæterorum subiicitur accessioni: solum prædamnamus, quod humorem detrahens purgatiuis atque urinalibus medicaminibus, & uomitu, & sudoribus prouocatis: quibus ex rebus sudor mouendus sit, tacuerit, uel uomitus. Itē deambulatio sæpe laboriosa, & piscis silurus bromosus, & allium instabile, & plurima ferarum carniū malos habere succos probantur. Inde item, quę sint olera deligēda, memorare neglexit: & neque fortificari uentrificationē, uel crura aut totum corpus recte potest, cum nullū modum uel tēpus memorauit. Praxagoras secundo libro Curationū cataplasmatibus utitur, & malagmatibus sudorē mouentibus, & urinalibus medicamentis alijs atque alijs, & uentrē deducētibus. Similiter cono, & folijs hederę, & semine coliculi agrestis, aut nasturtij, aut centaurea, uel alio, pipere, & pseudodistamno, aut dauco, & chamępitys herbę, & petroselinī semine, uel graminis, uel quolibet horū similium, & sudorum diurna prouocatione corpus deducit. Vtitur uomitu non solū ieiuno, uerum etiam post uesperinū cibum, et egros plurimum potat, ex quibus sensuales uicę implentur. Vtitur etiā cataplasmatibus arōmaticis, quorum species non designat, sed solum cum moromeli, uel lini semine adhiberi iubet, uel malis cydonij, aut caricis, uel adipēs, & aqua, aut uiz lupinaz, uel apij succo: equidem uirtutis repugnatione omnia cōfundens: siquidem alia sint constrictiua, ut mala, alia laxatiua, ut plurima cæterarum specierū. Deinde post oris collutionem forbiles dat cibos, quibus uentrem facilem se facere pollicetur: item potum repugnante mordicatiuo: dat enim acetum uel poscam, uel ijs rursus contraria, ut mulfam, quibus consueta regula etiam secundū ipsum approbatur. Erasistratus libro quo de hydropē scripsit, deambulationē ordinat adhibendam prius, quàm aeris æstus ardeat, tanquam curans. Sed si uentris inquit facilitas nō fuerit, prohibenda medicamina atque legumina, & olera, cum sint plurima olerum quę molliant uētre, sine ulla corporis uexatione. Item plurimo cibo ægros nutriendos probat, cum sit ex paruo sæpe indigestionis metus. si neque, inquit, uenter fuerit motus, adhibendum clysterem, simplicē, hoc est, qui nulla sit acrior materia cōfectus: cibum partitur cibo uel coena, & ante uesperam egros deambulatione moueri iubet. Tunc initio noctis reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibum præterea perungit in lectulo, & certo numero utitur fricationum: dat catapotia medicaminū ante utrāque cibi refectionē in faui modo pro uiribus ægrotantis, neque plus decē, neque minus quinque, numero, & eorum materiam tacet, solū memorat quod iecoris hęc catapotia congrua uideantur, atque ad urinales partes uenientia plurimum faciāt mictum: tum post catapotia dari iubet cibo panem ex farina sesami, & salsum obdulcatum, ne sitim faciat, non discernens tempus drimiphagię: tum inquit dandos pisces, atque carnē gallinarū, uel ferarū, & agnorum, & hœdorum, & forbilia plurima cū melle uel lacte: non aduertens lactis & mellis qualitatem in corruptionē facile uenire: nunc dat potum paruum, & nō post prandium, sed post uespertinū cibum hoc conuenire dicit, ut etiam similiter memorat Philistionis frater: probat etiam ante alios cibos accipienda aidi siq̃ pingnia duo uel tria, mox contusa atque oleo tincta. Sed hęc omnino digestionē difficilia iudicantur. Prohibet præterea lauacrum, uel plurimo temporis interuallo permittit: & non designat, quod illud, uel quantum sit tempus. Vtitur etiam malagmatibus cataplasmatibus, cum somno cubauerint ægrotantes: non tamen designans eos, qui coaceruatam ac uehementem humoris detractionem reprobant, quam Græci cenosin uocant, & propterea etiam paracentesin, quod quidem congrue dictum superius docuimus. Item tumore in iecore constituto, attestantibus febribus ob tumoris medellam cataplasmatibus utitur ex malis cum uino, constringens ea quę laxamentum poscere uidentur, & a digestionē faciendā ex sicu atque chamælea & chamępity utitur cataplasmatibus. Item ad eliciendum quidquam in locis constitutum utitur diapegano, quod ex ruta conficitur, & nihil de temporibus memorat adiutoriorum. Asclepiades etiam libro quo de hydropē scripsit paruo humore collecto, siue plurimo, nec dū tamē pedibus aut cruribus infuso, athletarū regulam adhibendā probat, ex plurima deambulatione atque cursu, & refractione retento spiritu. Tunc cibo dandum panē diligenter elaboratū atque exercitiū

cum piscibus natura duris. Ac si inferiores humor occupauerit partes, plurimos prohibet motus, & medicamina uentrisflua atque urinalia. Vtitur autem paracentesi, sed omnino ex angusto atque paruo foramine. In leucophlegmantia uero fricationes & cataplasmata frigerantia ex malo cydonio, & murra, & uitis anulis, quos helicas uocant, & malo punico, & lenticula, & herbo, atque pulento ueteri, & alumine, uel ruta, & bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & caricis, & ex uescis illisionem adhibenda probat. Laudat etiam punctiōnem quatuor digitis a talo distantem faciendam superius ab interiore parte, sicut in phlebotomia seruatur, ut per eandem punctiōnem humore effuso corpora releuentur: si minus, scarificatione altiore utendū referens, scilicet uehementiore atque efficaci adiutorio, & neque declinans uulnerationes, quæ necessario in huiusmodi passionibus difficiles curatione probantur. Socrates Chirurgus omni ex parte diuisuras faciens easdem adussit, ex templo corporis ingerens raptum, quem Græci spasmus appellant. Themison secundo libro Tardarum passionum utitur gestatione & defricatione, atque exercitio, uel communiter regula exercibili, salibus ac nitro fricans corpus, & frigida perfundens: ex quibus non æqualiter adficit: membra quippe cum interpositis tribus uel quatuor diebus aqua manna feruenti perfundat. Item iubet post gestationem tribus uel quatuor cyathis uino mixto ægrotantes potari. In ordine, inquit, medicaminum, non designans quem esse uelit ordinem medicaminum, aut nutrimenta digestionem difficilia. In uespertino inquit cibo utendum, mediocri potu, ut nec sitis ægros afficiat, neque plurima liquoris ingestio, sed uinum eligat acrioris uirtutis, & neque confusum: sed temperandi moderationem tacet, ut mediocriter quidem dicat quod est improprie dictum: etenim extendit temporandi moderatio neruos, nocet, & ingerit sitim. Prohibet præterea idem uentrisflua medicamina atque urinalia, quæ catartica atque diuretica uocant, & per singulos menses ternos radicum ordinat uomitus: sed erat regula medicinali conueniens ad lenimentorum latitudinem, siue spatium uomituum designare quantitatem. Vtitur etiam in utroque talo scarificatione, ut Asclepiades. In ascite uero initium ex uomitu sumit, quæ helleboro faciendum probat: Si, inquit, metuerit quisquam radicum uomitum, & est præceps, atque ut ita dixerim, periculosum non medicatum corpus magno adiutorio discere: aliam quoque regulam similem dicit ordinandam, sed passionis initio neque ungentis tangi, neque fricari uentrem permittit. Cæteras autem corporis partes si multa, inquit, fuerit humoris infusio, defricandas, initium ex uentris finibus augendum curationis modum: sed oportebat ob æquandum corpus totum fricatione curari. Item interpositis quatuor uel quinque diebus aqua calida, & magis marina tribus uel quatuor uasculis foueri: sed neque hoc æqualiter. Item ante unctionem utitur sinapismo: post singulas gestationes lambendam dicit scillam in electarij uicem: & si plurima fuerit humoris infusio, utitur paracentesi. Sed primo die, si uires patiuntur, abstinet cibo. Quod si minime ferre potuerint ægrotantes, partem tertiam panis solitæ quantitatis aqua infusam offerendam dicit. Tum alia die articulos ungens, atque ora lauans, simili panis reficit modo, cum pulmento uolantum: cæteris quoque diebus omni æqualitate augens, atque ægros resumens. Thessalus autem secundo libro Regulari plurima Themisonis similiter probat, sed quinque uel tribus cyathis uini aqua temperati, ante cibum potat ægrotantes, & paracentesin prohibet, * tanquam Apollopheon, aut diaephorbium. Vtile plerique ueteres huic passioni etiam macerinos emplastrum memorant. Item icesion usque ad quinque dies imposita linquentes laudauerunt. Cōuenit recorporationi etiam solis igniti uaporatio. Oportet autem saccellum linteum implere sale torrido, & apponere patientibus partibus. Tunc superaspergere aquam salis calidam, & superimponere cauteris latos, aut ex igne repletum congruæ latitudinis: sic enim calefacto saccello instillans humor, & cum seruore acerrimo decedens, atque artus singulos inuadens, quos Græci poros appellant, laceffendo demutant, recorporatiua sine dubio uirtute: facit enim tanquam de sinapismo partium ruborem, quem Græci phœnigmon appellant. Prodest denique etiam ex oleo rubor effectus hoc genere farina conspersa, atque manibus exercitata, quo facilius fiat, erunt partes in passione constitutæ circulasim ambiendæ, cuius spatium, siue medium oleo replendum. Tunc cauteris longi atque igniti immittendi, qui quidem cutem tangere minime debent: hoc faciendum alterna uice, donec oleum calefactum seruorem corpori tradat. Iubendum præterea ægrotantibus se immobilem præbear, cum oleum summo seruore coierit, ne se mutando adurat. Tentandum denique etiam cauteris sine olei motu submittere, atque lauare supposita spōgia statim, ne distillatione cauteris uicinas partes adurantur. Tum cum mediocrem senserit eger unctionem, ei uas erit supponendum, uel adiungendum, ut se repente inclinando unam faciat olei refusionem, ne uicinantia uisa pustulentur: alij cacabuli, uel uasis fictilis fundum perforantes, labia uel ora pertusuræ patientibus locis adfixerunt, supradicto more farina conspersa circundantes, sic oleo cacabulum impleuerunt, cætera supradicto ordine gerentes: alij usque ad unctionem uaporibus igneis usi sunt: alij diuersis generibus pustulationem locorum faciendam probauerunt, uel ex templo escharas patientibus ingesserunt partibus aliquando solo sinapi cataplasmanes, quo superficies cutis pustulescant. Item sinapi admiscentes glebæ calcis æquis ponderibus & sulphuris partem, atque simul conterentes, paruo oleo & aqua admixta linteolo illita, prostrato alio linteolo tenui eidem parti quam curamus superimponemus illitum, quo sensim atque per triplicem materiam transiens uis medicaminis pustulationem faciat loci. Item non aliter etiam ex cinere salicis hæc facere poterimus: eius enim corticem inurentes, atque ex eius cinere puluisculum facientes in umbra ficcari sinimus, tunc locis præulceratis adponimus, super distillantes liquefactum calcem, quam uulgo colatam uocant, sed paulatim cum enim fuerint humectati puluisculi, cutis superficiem pustulabunt. Quod si quisquam plurimum perueuerit, etiam altiora inusta putrescunt, & ut Græci appellant escharam faciunt. Alij denique ex ra

dice herbae, quam struthium uocant, loca ulcerari præcipiunt: uita etenim radix concepta flamma cuti apposita pustulationem necessario facit. Sed alij hanc uisionem tanquam imbecillem reprobantes cauteribus aiunt faciendam: quos quidem primo tepidos probant apponendos, donec cutis pustuletur, tunc igneos: sed ijs omnibus interiecto spatio trium digitorum loca dicunt inurenda, & esse cauteris semper aduncos in modum gamma literæ. Sed alij hanc appositionem metuentes anchistris ex utraque parte cutem prætendunt, & inter eos cauteris imponunt, ne ulla uisione nerui tangantur. Alij ligneos fungos interius ac superius angustos formantes patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt cōcremari, donec cinerescant atque sponte decendant: est enim hæc uisio leni penetratione moderata. Item alij linteolum aqua tingentes partibus resimplicatum apponunt. Tunc tabulæ tiliari apponentes struthiū herbam concidunt in breues particulas, ac deinde ferramento igneo singulas partes oleo tingentes accenscat, atque pustulas cutis efficiat. Item alij, ex quibus sunt Demetrii sectatores, eius partis quæ patitur manum inter pollicem & demonstratiuum digitum, quem Græci lichanon siue dicticon iuxta inferiorem articulum inuolutis inurunt cauteribus: quos quidem nunc nudæ cuti apponunt, nunc præmisso linteolo oleo tinctos. Modum autem uisionis constituunt, cum in alia manu, hoc est quæ sit contraria parti patienti sudor emergens apparuerit. Tum post supradictas uisiones imperant ulcera reseruata in saniem prouocari. Alij denique statim lana succida eadem contexerunt loca: alij marhubij coma contrita cum sale uel oliua nigra, aut sesamo infuso, siue nucibus. Tum tertia die lenticula multa, atque mulso decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc oenomeli aiunt imponendum, uel ea quæ ualeant lacessendo puris exitum prouocare. Item florem æris cum nigro helleboro apponunt: & quidem aliqui releuantur interuenientis re corporacionis causa. Sed quoniam istiusmodi uisionibus plurima uexatio coniuncta est, erit melius alijs adiutorijs mederi. Ausi sunt præterea quidam etiam Venerem adhibere, in ijs qui non ex usu uenereō ischiadici facti uidentur, quo magis uexata neruofitas geminet causam. Item alij cantilenas adhibendas probauerunt, ut etiam Philistionis frater idem memorat libro XXI de adiutorijs, scribens quendam fistulatorem loca dolentia decantasse: quæ, cum saltum sumerent, palpitando discusso dolore, mitescerent. Alij denique hoc adiutorij genus Pythagoram memorant inuenisse: sed Sorani iudicio uidentur ij mentis uanitate iactari, qui modulis & cantilena passionis robur excludi posse crediderunt. Item plurimi ex talo atque ancala eiusdem partis quæ fuerit passione possessa, uenam diuidentes sanguinem detraxerunt: sed magis partes impletæ grauantur, cum repente uacuata loca in semet materiæ fluxum inuitant. Nobilium uero principum Hippocrates libro quo de locis cōscripsit, cucurbitam iubet sine scarificatione apponi. Utitur etiam feruentibus medicaminibus potis: quæ, si essent uere congrua passioni, minime tamen ad excludendam uetustatem ualere crederentur. Diodes libro quo de passionibus atque causis & curationibus scripsit, item secundo libro de curationibus, regulam dixit siccam & frigidam & nutribilem ægris conuenire, cum humida atque calida prodesse huic passioni demonstrauerimus. Utitur etiam urinalibus medicamentis, quæ diuretica appellauit, & probat conditum bibendum, quod plerique Latini mulsum uocant. Utitur etiam cibo è uisceribus asinorum, & clysteribus sanguinem prouocantibus, & uino nunc albo, nunc nigro, neque ordinis, neque temporum, neque congruæ qualitatis memor. Item Themison secundo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare perspicitur, phlebotomans talum uel ancalen, atque lanis succidis cum oleo & aceto, & sale statim patientia contegens loca, articulos astringens, & intestina per clysterem exulcerans, & os ipsum quod ischion Græci uocant. Ante hæc omnia & equitare imperat egrotantes, quod magis ob uehementiam motus partium faciat uexationem. Item alternis sinapizat diebus, quod est immoderatum, & in omnibus ulcerationem cutis existimat faciendam, qua plurima congrua prohibetur adiutoria adhiberi, cum partes ulceratæ apposita tolerare non possint. Theffalus uero uaporationem faciendum improbe recusauit: est enim re corporatiuæ uirtutis, neque initio recte constrictiua probat adhibenda: etenim ischiadica passio uehementi atque difficili strictura confecta perspicitur.

De articulorum passione, quam Græci arthritin uocant: et de pedum dolore, quem podagram appellant. Cap. II.

VITRAQUE passio à parte corporis quæ patitur nomen accepit: altera communiter ab articulis omnibus, altera specialiter à pedibus. Sed podagram Græci etiam ab impedimento, uel retentione pedum aiunt nominatæ, uel à ferali dolore: siquidem omne quod immite fuerit, abusiue agreste uocamus. Earum denique passionum discretio promptissima atque manifesta esse perspicitur: nam podagra pedum tantummodo dolor est. Arthritis uero etiam cunctorum articulorum, siue multorum, & aliquando à pedibus sumens dolor exordium ceteros articulos implicauit: aliquando in alijs incipiens pedes inuasit: nā quidam medici arthriticam passionem genus uocant, podagricam uero speciem: etenim quod Græcis hamarthriti recte nuncupatur: siquidem fit in articulis dolor, quāquam in pedibus constitutus: arthritis uero non ilico podagra dici potest: siquidem genua uel manus tenens gonagra aut chiragra, uel tenontagra dici potest, si maiores tenuerit neruos. Sed de ijs nominibus quæ locorum causa discreta uidentur, unius tamen esse uirtutis intelligantur, in curationibus certandum non est: sunt enim harum passionum antecedentes causæ uariæ, ut uinolentia, frigus profundum, cruditatio, libido uenerea, labor immodicus, uel repentina desertio solitæ exercitationis in ante actum morem: aut rursus non ex infantia, sed secunda & se-

ra ætate affecta, cum mollibus nervis atque insuetis fuerit illata quassatio. Item percussio antecedens ex palæstra forti exercitio: frequentat autem in uiris magis atque medijs ætatibus: difficile uero in mulieribus atque in eunuchis, & pueris, & iuuenibus fieri inuenitur. Videtur præterea plurimis antiquis medicis etiam genuino cursu in posteros migrare cum semine, & propterea succedentes inuadere, de qua re principaliter Responsum docuimus libris. Item per aliquas probatur frequentare regiones, ut Cariam, & Alexandriam Aegypti uicinam: nec non temporibus certis nasci, item magis asperari uidetur, ut primo uerno, secundo autumno, tertio hyeme, ætate uero difficile. Sequitur autem passione articulari tentos, torpor, atque fornicatio eorum articularum qui tanguntur, & difficilis flexio, atque rursum extensio. Item grauedo & uacandi dulcedo, & ad paruum motum uehemens labor, atque dormientibus sensus quidam resonantium articularum, & cum de somno surrexerint, ueluti saltu earundem partium afficiuntur. Tum horror uel rigor, atque tremor sine ulla manifesta ratione partium sequuntur. Dehinc cum passio se extollere coeperit, in podagricis dolor alterius pedis, aut utriusque cum punctioibus nascetur, incipiens à uestigio aut plantæ cavitare, uel sæpius à maiore digito, attestante torpore & grauedine, & difficili motu cum horrore rigido, atque inæquali per membra, & aliquando plurimo feruore, aliquando frigore: ut alij refrigerantia, alij calida desiderent ægrotantes, & propterea quidam alteram calidam, alteram frigidam podagram putauerunt nuncupandam. Item initio, ut sæpe contingit, similis color patientium atque sanarum uidetur partium, attestante æqualitate, nullo emergente tumore. Dehinc inflatio partium fiet cum rubore. Quapropter releuatio altiorum sæpe sequetur. Tum peiorante passione arthritica sufficitur passio, cum in unum omnium cogitur articularum consensus, & facile ex articulo in articulum uenit dolor, nec desinens prius, quàm cunctos inuaserit nodos. Sæpe denique prioris articuli dolore declinante secundus inuaditur, atque eodem similiter mitescens tertius sumit exordium, consentiente etiam uesica atque spinæ maioribus nervis, quos tenontas appellant, & in stomacho etiam nausea uel uomitu iactantur ægrotantes. Tunc articuli tumentes inflantur, ac deinde durescunt, & solidati saxeam faciunt qualitatem. Tum etiam nigriores efficiuntur, atque contorti, ut in obliquas partes digiti uertantur, aut reflexi supinentur, aut uicinis adfixi incumbant, & aliquando humore purulento uel mucilento collecto, aut uiscoso generet poros, quos nos transitus dicere poterimus: dehinc etiam lapides sufficiant, qui quidem articulos soluant, & cutem distendant, atque erumpentes promineant, & chirurgia detrahantur: aut exilientes cyathis, quo ferramenti tollantur, quod nos laureolum dicere poterimus, & rursum renascantur. Tum crura dolentium partium cessante nutrimento tenuata languescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea ægrotantes paruis ex causis mobiles atque iracundi, siquidem motum uel actum non sine querela accipiant. Principaliter autem hæc passio constituitur in nervis, uel eorum colligationibus, tum cætera morbo consentiunt, atque contiguos uel superpositos lacertos, & maiores nervos pati demonstrant. Est præterea passio non facilis curatione, & aliquando magnitudine insanabilis, non ut plerique putant naturæ: causæ autem difficilime curationis, uel ut sæpe contingit impossibilis, manifestæ atque plurimæ reperiuntur: est enim passio in nervis constituta qui sint natura densissimi, & inter articularum nodos constituti, quorum angustia comprimuntur, & ad omnem motum asperantur magis in pedibus: ij enim plurimas colligationes nodorum naturaliter habent, & totum corpus sustinendo laborat. Præterea hæc passio initio paruitatis causa negligitur, & contempta conualescit: quippe cum à multis minime credatur emergere. Alij denique digiti luxati, aliqui pedis uersionem, aliqui cuiusdam rei calcæ, uel offensæ duritiam aut feruorem queruntur: tum necessitate coacti augmenti temporibus in confessionem ueniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio perseverare, atque corpora possidere meditatur. Non autem minus etiam longorum lenimentorum causa, quibus recessisse putatur, cum sanos ægrotantes fingendo promittit, adiuuante etiam intemperantia, qua cum sæpe concipi passio perspicitur, manere posse non dubitatur: quod dicam diatribo, si uenter officium non agnouerit, clyster adhibendus simplex: atque ita totius passionis statu accepto, ut inflata uel tumentia loca uideantur, scarificatio adhibenda: & ubi permiserint partes, cucurbita figenda, uel hirudines admouendæ. Est autem omnium leuior præter cucurbitam scarificatio: siquidem nulla quassatio partium fiet, quæ necessario cucurbitæ coniuncta est. Item hirudinum moribus consensus adiungitur: & propterea, ut supra dictum est, simplex conflatio lenius probatur. Adhibenda etiam uaporatio spongiarum, tū aquæ calidæ fomentatio, uel aqua & oleo, aut decoctionis fœnigræci, aut lini seminis, uel hybisci. Item cataplasma mitigatiuum, quod iandudum minime posse adhiberi uidebatur: siquidem tumentia pondere grauari non debeant. Sit igitur panis diligentius emollitus, solus, aut admixta radice argallici, quod Græci symphyton uocant, uel hybisci decocta, uel cuiusquam similis uirtutis, quorum probauimus adhibendas uaporationes. Tum cum firma declinatio fuerit constituta, adhibenda lauacra, atque uariis cibis, & aqua potu danda, & propter passionis nequitiam adhibenda etiam cerotaria ex oleo dulci uel cyprino, aut ex adipe confectum medicamen, quod Græci diasteaton uocant: tunc malagma diachylon uel mnafeum, aut quod appellant diateleos, uel dioxeleon, uel diathalasseton: paulatim fortificandum corpus deambulatione liberis calciamento pedibus, & cum cautione aduersantium rerum, ut ne quid nimis, maxime uini, aut indigestionis, aut Veneris. Arthriticis uero conuenit etiam digitis ceram emolliendam dare, uel manipulos tenendos, quos palæstritæ alteres appellant: tum mouendos cereos, uel ligneos primo cum paruo plumbo interfuso: tum pro modo profectus grauiiores, & in tardante passione superpositionis tempore supradicta seruanda simplicitas curationis. In lenimento uero adhibenda fortificatio, tum re corporatio. Sit igitur primo gestatio pro modo uirium, tum deambulatio molli stramine coæquato solo,

adfecto uocis exercitio, cum corporis unctione: etenim uacatio crassificat corpora, adeo etiam & in ijs qui ex alijs forte plurimo tempore iacuerint causis, hac ratione articuli commoueantur, cum nerui non exercitio ualidiores efficiuntur. Adhibenda etiam lauacra per interualla dierum, & uariis cibis ex media materia qualitate, uinum paruum, liene, & semper post cibum: tum dropax simplex atque compositus, paroptetis ex igni uel ex sole, atque pellibus seruicatis, & ex arena litoris: tum aspergines, quas Græci sym-palmata uocant, ex nitro & adarce, & euphorbio, & sæpe memoratis speciebus: tum unguenta & acopa ex squilla confecta, & agresti cucumere: item euphorbio, & adarce. Dehinc malagma adhibendum, ut est quod appellant diahalon, aut diadaphnidon, aut diadarces, aut diastactes conias, uel quidquam simile. Item rubor cutis ex sinapi faciendus, quem Græci phoenigmon appellant. Item drimyphagia, & cydori regula, & radicum uomitus, & hellebori, & embasis facienda, sicut de ischiadicis scribentes memorauimus: uel fomentatio ex decoctione artemisiæ herbe, aut marinæ feruentis aquæ. dehinc natatio feruens uel frigida. Item usus adhibendus aquarum naturalium calidarum: tum frigidarum, ut sunt in Italia quæ appellatur sunt Albulæ, uel Cotilæ: & omnium supradictorum affectanda repetitio. dabit enim curatio alijs integram sanitatem, alijs raram doloris admodum, ne iugi superpositione uexentur. Veterum quidam annalia medicamina potanda probauerunt, ut est quod appellant diacentaurion. Item diascordeon bibendum anno continuo iudicantes in ijs qui non plurimo tempore fuerint passione uitiati, hoc est intra quinque temporis constituti, adijcientes quod bibi debeat medicamen prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito: sin minus, repræsentandum numerum dierum, quo integer compleatur annus, quamquam longo tempore porrectus. Secundum nos autem iuxta Sorani iudicium est metuenda diuturna medicaminis sumptio, cum neque soliti cibi iuges atque iidem utiles recte probentur. Sic denique legimus quosdam ueteres memorasse, ex iugi medicamine potu in celeres uel acutas uenisse passiones, & alios apoplectos, alios pleureticos, alios peripleumonicos interisse. Item quosdam continua difficultate spirationis affectos, quam Græci dyspnoean uocant. Ii uero qui se isto medicamine profecisse testantur, non aduertunt seruatur digestionis causa id fuisse permissum: quippe cum cæterarum rerum excessus declinatio qui dam seruauerint sanitatem, cum interrompere metuerint sumptionem medicaminis sui: & propterea ijs intentionibus occupati, alias sibi nesciuerint profuisse rationes. Item alij unctionem nodorum faciendam probant, quam nos reprobamus: siquidem consensus faciat tumorem. Item alij transeundum ex alijs in alia probant unguenta & cataplasmata, nunc specie, nunc genere, differentia, donec ægrotantes releuentur: siquidem alia pro alijs corporibus uideantur conuenire, & propterea doloris mitigatio, sequetur. Ordinauerunt denique etiam contrarias uirtute materias laxatiuas simul atque constrictiuas, & recorporatiuas, ut maseum malagma, uel diachylon. Item e contrarijs uehementius cōstringentia, ut diatylon, & cyzice-nem, & Erasistrion emplastrum. Item ex panici polline, & lini semine cataplasma, & ex coliculo agresti, uel herba erigeronte, & bramite, & mandragora, & alterco, & lenticula, & citri medio, uel peponis, & origani, uel thymi, aut uuæ lupinæ, aut portulacæ, aut betæ, aut mali punici folijs uiridibus, uel eius caduco, quod Latini ambulacium uocant, decocto cum aceto, aut ruta agresti cum aceto singulari, uel cum simplici alica, aut aceti sedimine, cum apio: aut uitis folia, cum simplici pulento, uel ex herbi polline, aut fabæ, uel hordei, aut lolij, aut lupini, cum fece uini uel aceti, uel ex fico decocto cum aqua & uino cōtrito, donec mellis sumat crassitudinem: ex quo detractis durioribus partibus imperant coquenda rursus residua. Item ex papaueris coliculis, quos Græci cocias uocant, uel eorum folijs, & malis cydonijs & punicis in uino decoctis, & bulbis cum melle, uel alterci radicem cum storace, uel iacintio, & marthubij. Item calce melli concoctum, & opio storaci, & amygdalis amaris cum cyprino oleo, & aceto iugiter coctis partes un-gendas docent, ex dissimilibus rebus sine ullo ordine materias admoventes, insanabiliter simul atque indocte descensum ab alijs in alias species faciendum iubent, donec ut æstiment iudicia reperiantur: siquidem fit pro corporibus alius ex alia specie liberatus. Et est hæc experimenti tentatio, quam Græci schediasticeu pirant uocant, quæ non destinata passionibus adhibeat adiutoria, sed probanda. Fit præterea ut accessiones tempora percurrant, & sua sponte leuigentur, atque ita occurrens declinatio, uel paulo proximius lenimentum euentum curationis afferat: quod si forte uere profuisse putaretur declinationi adhibuitur, rursus in initijs noxium necessario comprobatur: siquidem non suo tempore uideatur admotum. Alios igitur ex alijs releuatos rebus existimant. Sed hoc temporum fieri causa respondere debemus, quæ corpora urgentius obtinere necesse est: conueniunt enim in istis mediocriter constringentia. Augmentis uero atque itatui mitigantia uel laxantia, declinationibus emollientia, lenimētis fortificantia, atque recorporatiua: frigida uero uel coercentia, quæ agrostica uocant, etiam igne sacro uexatis admixta congrua efficiuntur. Sed aiunt aliqui nunc quoque tanquam laxatiua incensos, nunc frigerantia releuare. Feruori etenim ex tumore uenienti admota eius factu tepescita conueniunt, & tunc temperata mitigant, tanquam aquæ feruenti admixta frigida. Sed est hoc falsa conuisione collectum: quam Græci sophisma uocauerunt: oportebat enim, quantum ad hanc, ut putant, rationem omni tumori frigidas conuenire materias. Igitur secundum passiones ac tempora nos discretas aptamus. Alij uero acopum ex rana rubea in podagris admirantur, alij marini uituli, alij pedes unxerunt ex eius tergo calciamenta facientes, alij uiuentem beluam oleo coxerunt, alij lupum, & specialiter unctionis genus conuenire probauerunt. Multa enim fida sine ratione creduntur, cum forte passio non fuerit insidiosa, & cum corpus tardauerit, non in uno atque eodem tempore perseverans. Item plurimi uomitum post cibum laudauerunt, secundo uel tertio per menses singulos adhibendum: siquidem & materiam redarguat, & indigestos esse non sinat, non ad-

ueritētes quod magis uexabilis approbetur, cum hoc adhibito gingiue putrescant, dentes moueantur, oculi confundantur, & totum impleatur caput, stomachus quoque grauiter afficiatur, & propterea omnes consentiant nerui. Est igitur conueniens magis parua cibatio, atque initium ex abstinentia ciborum sumendum curationis. Multi autem medicinarum scriptores purgatiuis & acrioribus pollent clysteribus, & uiridibus medicamentis, quae diuretica uocauerunt. Sed oportet cauere stomachi uexatione, quae uarieta te facile medicaminum fiet. Item uescicam quae sit neruorum qualitatis prouocare: tradit enim necessario uniuerso corpori uexationem per sibi cognatam neruorum qualitatem. Specialiter autem ueterum praestando errores, uanum puto atque prolixum quod de podagricis scripserunt, & propterea fastidiosum maxime, cum sufficiat communis materiarum memoratio suprascripta, tacitis dominis qui nunc dicentur. Diocles libris quos de passionibus atque causis & curationibus scripsit: Praxagoras tertio libro de morbis: Erasistratus libro quo de podagra scripsit, prohibens tamen purgatiua adhiberi, quae catartica notauerunt, malagma uero Ptolemaeo regi promittens, cuius scripturam non edidit: quanquam quidam sibi uisum Erasistrati nominent medicamentum. Item Erophili sectatores multi, atque Asclepiades libris ad Erasistratum scriptis, & Heracides Tarentinus, & Themison secundo libro Tardarum passionum aliqua per methodicus, aliqua ut non methodicus decurrunt phlebotomat enim ex pedibus, & nihil approbat, & cataplasmatum qualitates confundit, non discernens constrictiuis laxatiua. Quibus respondere quid oportet? cum uiuolentia neruos amputet, phlebotomia patientes impleat partes. Thessalus autem secundo libro Regulari, imperfecte quidem, sed consequenter methodicis intentionibus curationem ordinauit.

De renali passione, quam Graeci nephritin appellant.

Cap. III.

RENALIS passio à patientibus partibus nomen accepit. Est autem intellecta passio tarda renis aut renum: passio inquam, tarda: siquidem cum insidenti atque perseveranti querela renalem intelligamus passionem, & non ex nouello atque recenti tumore, sicuti neque cuiusquam ossium coxae, nisi fuerit perseverans, ischiada intelligere poterimus. Item adieciuius renis aut renum, siquidem nunc alterum, nunc utrosque teneat renes tumentes ac duratos, & in saniem saepe uenientes, & ulceratos, & humore fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus uel uomitis communiter secundo dicemus: nunc de ceteris supramemoratis scribemus, & primo de tumore. Antecedentes itaque causas, quae renalem faciunt passionem, aliae manifestae, ut perfrictio, indigestio, percussus, casus uehemens super clunes, acres cibi plurimi contra consuetudinem, libido uenerea uehemens, uel urinalia frequentata medicamina, aut uenena, quae specialiter ipsas afficiant partes, ut sunt ex cantharidis confecta. Afficiuntur autem hac passione, iuuenibus magis grauioribus atque senes, & uiris mulieres, & habitudine plenis teniores: siquidem sit in ijs grauior, & generaliter curatio difficilis, ob angustiam locorum, quae passione uexantur, & ob acrimoniam urinae, quae insue aliquando renibus immorata in uescicam transit. Sequitur autem patientes, cum adhuc leuis fuerit tumor, dolor leuis, & magis cum prona fuerint inclinati secundum clunes circa ilia, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor uehementescere coeperit, dolor etiam plurimus fiet cum grauedine & seruire clunium omnium, atque iliorum, & pubetenus, uel umbilico cum consensu usque ad uescicam tendentem, ob tumorem urinalium uiarum, quas Graeci ureticos poros appellant, quae quidem à renibus usque ad uescicam sunt porrectae, attestante urina tenui & aquata, & ita subalbida, ut colaturae liquidus colorem fingat, quam Graeci charopon uocant, & primo parua, dehinc plurima, aut coacervatim effusa, quae nullam faciat releuationem, peiorante tumore in seculentum colorem ueniens, cum iam nimia tensione tenuissima uenulae fuerint ruptae. Item in uini transiens qualitatem uiscosae crassificationis causa: tum oleosum ueluti adipis qualitatem simulans cum renum fluor pinguis acceperit. Dehinc per incrementa etiam febres accedunt, cum consensu iecoris, ut quidam etiam fellis colorem sumant, attestante uentris abstinentia cum tormento & ructatione inflatione cogente. Tum hebetudo sequetur, & articulorum frigus & uomitus: & tardante passione corporis tenuitas nimia, adeo ut quidam uncati permaneant, & semper prona ambulare cogantur, nec unquam se erigere possint. Est praeterea signum dedinationis supradictorum in contraria mutatio, ut urina aquata in crassitudinem ueniens: crassior uero uel uiscosa in tenuitatem. Item quae paulatim atque cum mordicatione ferri solebat, sine labore adueniens, & si plurima, mediocris effecta, & ad summum omnia cum naturae solita uel similia fuerint, uisa aiunt, aliqui eos qui ex casu uel percussu, aut uehementi libidine fuerint tormenta, irruisse uideantur, colicos uero maior interior, uel uentri uicinarum partium dolor sequatur, atque inde sumat exordium, consentientibus uel compatientibus clunibus. Item renali uitio ex templo difficultas urinae coniuncta sit: colicis uero per consensum atque secundo concurret. Haec est similitum passionum discretio. Accidunt haec item similia etiam in urinalibus uis uisio constituto ex renibus, quae usque ad uescicam ducunt, quibus eadem quae supra diximus recte concurrunt, sed dolor uel eius sensus erit inter renes & intestina, & uescicae fundum, nulla inflatione uel extantia in externis renum partibus prominente. Haec est omnis atque perfecta significatio. Sed oportet sanguinis mictu adfectos similiter curari tanquam sanguinem spuentes. Alios uero qui ceteris fuerint passionibus adfecti, sicut de uescica scribentes demonstrabimus, pro suis concursibus uel accidentibus, quae Graeci symptomata uocant, partita curati ratione: non enim sola generalis, sed etiam specialis eorundem conuenit adiutoriorum curatio, solum differens, quod ea quae localia sunt adiutoria in ijs qui renalibus laborant uirijs magis clunibus adhibeantur. Illis uero qui uescicae, pectini, uel pubetenus, quod Graeci peritoneon uocant,

De tardis uesicæ passionibus. Cap. IIII.

IN uesica speciales plurimæ passiones eueniunt, tumor, collectio, ulcus, durities, phthiriasis, item pso-
 rias, quam scabiem, uel scabrum appellamus, capillatio, debilitas, paralyfis, calculatio, quam lithiasin uo-
 cant, sanguinis fluor, siue effusio, quam hæmorrhagian appellant, mictus tarditas aut difficultas, aut in toto
 guttæ aquatiles, quas hydatidas uocant. Sed ne porrecta longitudine fastidiosa curatio uideatur, una præ-
 ceptione omnia apprehendere festinandum. De paralyfi igitur superius docuimus; cum de ea specialiter
 diceremus. De collectionibus uero & ulceribus secundo dicemus, cum de singulis corporis partibus co-
 munem trademus curationem. Tumente igitur uesica, sequitur dolor secundum pectinem atque ueretri
 radicem, & ilia, & clunes, & magis initio ac sine urinæ reddendæ: tum feruor incendiosus: item pulsus &
 extantia partis in passione constitutæ, cum iugi ac frequenti urinæ reddendæ desiderio, & repentina ces-
 satio, ac rursus egestio fiet cum dolore intolerabili per singulos mictus, ut extenti ægrotantes etiam uē-
 tum per podicem reddant, aut ipse podex præcadens excludatur: & præterea ægrotantibus supinus ex-
 itus urinæ facilior. Quidam denique necessitate coacti defixo capite super latus pedibus sese locauerunt,
 ut lapis angusta deferens loca, atque uesicæ aditum repetens, mictus tribuat facultatem. Mulieres denique
 etiam digitis immisiss in muliebrem sinum sibi met ipsæ hortatione quadam lapidem prouocando dimise-
 runt. Pueris autem magis prominens uertrum fiet: sæpe etiam extantia quædam ægrotantibus occurr-
 rit, si suo digitum iniecerint podici. In ipsa præterea urina sedimina inueniuntur, aliquando crassiora &
 calida, aliquando arenosa & saxosa. Item quibusdam asper lapis, aut sanguinolentus excluditur, & sanio-
 sus. Sed quoniam signa communia sequuntur ulceribus uesicæ atque lapidibus generatis, & ijs qui gela-
 to sanguine impediti mictus difficultate afficiuntur, confirmabitur apprehensio lapidis generati, adhibita
 melotide, cuius rationem atque usum Responsionum libris chirurgiam scribentes plenissime tradidimus.
 In quibus etiam auferendi lapides opus docuimus: nunc enim correctionem demonstramus cuiusdam in
 corpore morbi, quo uesica lapidum generatione uexatur, & non ut alium masculum appellemus lapidē,
 alium foeminam, ut quidam leuium medicorum, sed quodam corporis uitio, non adhibita recorporatiua
 curatione, cum solius auferendæ alienitatis intentione medici capiantur, cuius plurimæ sunt differentie:
 Est præterea urinæ reddendæ impedimentum, quod Græci stranguriam uocant, mictus officium retarda-
 tum. Difficultas autem quæ iidem dysuriam appellant, quæ id adiuncto dolore ingesserit. Impossibilitas au-
 tem, quam urian uocant, perfecta eius officij negatio. Sed hæc tria accidentia quæ Græci symptomata uo-
 cauerunt, nunc stricturæ sunt appenditia, cum tumor uesicam tenuerit, siue durities, aut paralyfi, uel tēfio;
 ut quidam uolentes urinam usu solito ac naturali deponere, obstantibus causis longo tempore continen-
 tes officij dilatione uexantur: aliquando alienitatis obtrusione uesicæ impedito meatu, ut lapidis, aut are-
 næ, aut capillorum, aut squamularum cantabri similium, uel quocunque sedimine crassiore. Fluor autem
 sanguinis per uesicam, quem Græci hæmorrhagian uocantes manifestus, cum acruatim per urinæ meatum
 sanguis excluditur. Sed quoniam non solo ex ambitu uesicæ fluor iste fiet, sed etiam ex collo uel mi-
 nialibus uisco acruatus sanguis excluditur: aliquando etiam de renibus erit locorum discretio facienda:
 nam renibus patientibus dolor in clunibus demonstratur. Vesicæ autem ambitu patiente sub umbilico,
 uel pubetenus apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus sanguis excluditur. Item collo uesicæ patiente cir-
 ca ueretri initium, quod Græci peritoneon uocant, dolor sentitur. Mictuali autem uia patiente, ipsam ue-
 retri radicem dolor afficit, attestante sanguinis puritate, cum iugi ac nō intercapedinata emissionē, etiam si
 digitis loca, quæ iuxta sessionem ueretri sunt, presserimus, quo in loco est ultima mictualis uia, quam, ut su-
 pra diximus, uræam Græci uocauerunt: nam si ex alijs locis sanguis feratur, digitorum impressione magis
 abstinetur, cum supradictis locis, hoc est, peritoneo, uel podici uicinis renitur impressio. Tunc ex uesicæ
 collo impedimento repressus feretur; ex superioribus uero abstinetur. Aliorum autem medicorum signa
 de ijs discretionibus conscripta Responsionum libris chirurgiam scribentes elogiamus. Sunt autem uesi-
 cæ uitia, uel passiones generaliter curatione difficiles: est enim natura neruosa, & altioribus insita locis, at-
 que celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora. Sed ne rationem uariare uideamur, erit demonstnan-
 dum, quoniam flori siue solutioni uesicæ, quam Græci rheumatismum uocant, sunt adscribenda plurima,
 quæ specie discrepare uidentur, ut plurimus mictus cū arenoso uel capilloso sedimine: item sanguinis fluor.
 Stricturæ autem adscribendus tumor est, atque durities, uel saxeæ duritas, quæ Græci scirrhusin uocant.
 Horum duplicem generaliter in superpositionibus curationem demonstramus. Fluente igitur uesica, hoc
 est, solutionem patiente, locandus eger frigidus mediocriter in loco, adhibita requie: cum abstinentia & ar-
 ticulorum tenaci ligatione: & si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius subleuatis, & officio mictus
 adiuuante, quantum datur imperandum egrò, ut neque id retento faciat spiritum, neque ui quadam uel
 conatu excludi cogat aliena: apponenda etiam spongia noua aceto tincta secundum clunes uel umbilicū,
 ac pubetenus, quod Græci etron appellant, usque ad ueretri initium, quod iidem peritoneon uocant, addi-
 ta tenaci cum amplexu ligatione: tum epithemata iisdem locis, atque cucurbita constrictiua: potus dan-
 dus frigidus, paruus cibus: species de sanguinis fluore & sputo scribentes docuimus. Similiter etiam quæ
 præbibenda conscripsimus, eiusdem scilicet qualitatis, & sessionem ex uino uehementiori confectam, quæ
 encephalisma uocant, in qua sint præcoctæ murtæ bacculæ cum rosis, uel in posca, aut aceto facta decoctio her-
 bæ talliæ, uel rubi, aut mali punici corticis, & horum similium: uel per ferramentum, quod Græci cathetera

uocant, iniectione secunda, quæ similiter medendo constringant, acaciæ, hypocistidis, aut plantaginis succo, uel polygonij herbe, aut intybi, uel poscæ frigide singularis, aut adiuncta thuris drachma una cum equali pondere hypocistidis, uel gallæ, cum nigro uino, uel talliæ herbæ aqua cœlesti concoctæ: quæ cum fuerit expressa & abiecta, erit aqua coquenda, donec ad mellis ueniat crassitudinem. Mulieribus uero etiam pessaria adhibenda, quæ ad fluorem matricis Responsionum conscripsimus libris, muliebria uicia curâtes. Est autem curatione correctior, ac facilis eruptione factus, uel oscitatione sanguinis fluor, uel percussu, aut saltu confectus: etenim influxio abstinetur, & rupta conglutinantur: difficilis uero correctione ex putredine effectus fluor: retento enim sanguine, uel abstituto, ulcus permanebit. Est præterea ex putredine sanguis ater, & male redolens, atque purulentus ex ulcere præfecto, & dolore antecedente, qui putredinis causa aduenisse uideatur. In eruptione autem flauus, & non antecedentibus supradictis, sed exussu uel saltu, aut percussu effectus. Solent præterea sicut in podice uel sceminarum sinu, aut matricis collo etiam in uelica hæmorrhoides generari, quæ fluorem sanguinis præstent, quibusdam interuallis uariatum, quod oportet apprehendere prudentem, cum non coaceruata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interiectis deflectionibus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admonitione cessante cum tensione inguinum, & grauedine clunium, uel renum consensu: & cum sanguis eruperit, supradictorum relatione sequente: siquidem aliquando inflatæ actumens hæmorrhoides difficultatem, uel abstinentiam faciant mictus, quam Græci dysuriam uocant, uel uriam. Hæc sunt quæ de ijs necessario dicenda credidimus. Declinante autem passione conuenit adhibere cerotaria, ex murtino, uel uiridi oleo, & alumine, cibum uarium dare atque uinum, ac deinde lauacrum adhibere. Ac si strictura fuerit uentris uel uelicæ, conuenit iacere ægotantem loco mediocriter calido atque lucido, adhibita abstinentia usque ad tertium diem cum requie. Item locis in dolore constitutis manuum calidarum cum blando amplexu uaporatio adhibenda, uel pubetenus, ac ueretri initio & clunibus calida lintamina, aut uascula ex aqua calida, uel saccelli ex pollinibus calidis, aut uelicæ oleo calido plene admouendæ. Ac si uehemens fuerit dolor, phlebotomia adhibenda: & partes in passione constitutæ lanis limpidis oleo calido ac dulci infusis contegendæ, ex eo etiam totum corpus ungendum: tum ora fouenda. Adhibenda etiâ encathismata ex aqua calida, uel aqua & oleo, aut decoctione laxatiua ex ijs quæ sæpe memorauimus. Tunc cibus dandus sorbilis, & potui aqua calida moderatione dominante, & usque ad declinationem passionis interuallis dierum nutrimenta offerenda. Ac si dolor minime cessauerit, conuenit usus cataplasmatum laxatiui, & cucurbitæ appositio levis, quæ Græci cuphen appellant, cum adiecta scarificatione, & uaporatione spongiarum aqua calida expressarum. Ac si uenter retentus fuerit, clyster conuenit simplex: & secundo cucurbita clunibus adhibenda, ac pubetenus præteris capillis. Tunc hirudinum appositio, quas sanguifugas uocant, atque embasis adhibenda ex calida & oleo: sic enim laxatiuis tensionibus non solum dolores soluentur uelicæ, sed etiam consequens urinz difficultas, uel abstinentia. Cauendus præterea usus urinalium medicaminum, quæ diuretica Græci uocant: sunt enim quæ uelicam prouocant, & propterea tumores faciant commoueri. Ac si minutis doloribus urinz fuerit retentio, uel in toto conquieuerit dolor, tanquam factis superpositionibus repetant lenimenta, adhibenda fortificatio per uariam gestationem, & uocis exercitium. Vnctionibus quoque ac defractionibus admotis, quæ superiora corporis magis exerceant, interiecto lauacro, & uario cibo ac uino, & iuxta methodicum modum adiectiones cyclicæ ac detractiones faciendæ: tum ad recorporatiua atque uehementia redeundum adiutoria, ut ex resina uel dropace, ac paroptesi, & solis torrore, uel arena ignita, & appositione cucurbitæ, forti raptu atque tractu quodam circûducto remota corpora roboremus morborum pulsa segnitie, adhibito, usu asperginum, quæ sympasmata Græci uocauerunt. Tunc malagmatum atque acoporum laceffentium usus adhibendus, adiecto etiam sinapismo, & fricatione partium quæ passione afficiuntur. Tum encathismatibus utendum ex aqua marina, uel salsa calida, & magis ijs qui mordicatione quadam locorum in iisdem passionibus tanguuntur: tum cataclysmo utendum, cuius nominis uim præscriptis libris sæpius latinauimus: ita natatio adhibenda aquarum sua uirtute medentium, quibus magis erit in solutionibus utendum: eligendæ sunt nanque specialiter quæ aluminis habeant qualitatem, ut sunt in Italia Albulæ appellatæ, & Nephelinæ, & Cotiliz, & Auguriz: ijs uero qui lapidibus, uel scabro uelicæ afficiuntur, erunt eligendæ aquæ salz, uel quæ nitri habeant qualitatem, ut apud Tēnariam insulam, quæ potandæ, atque lauacro adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est cyclus, & acriora medicamina potanda, ut ex radice lapathi, & capparis, & struthij, uel polij herbe. Item quæ panacis, & horum similia, & lithotomia in ijs qui maiorem generauerint lapidem. Item in omnibus hellebori adhibendus est usus, si passiones supradictæ permanserint. Tum navigatio atque peregrinatio, & earum uarietas appetenda. Erit præterea longo tempore, ut cætera quæque nimia, Venus præcauenda: ijs enim qui ob uelicæ paralyfin propter officium sciscitandum usum uenereum probauerunt, consentiendum non est: trahit enim secum totius corporis uexationem: ob quam causam erit probanda etiam ferularum tenerarum uel tabellarum, usque ad ruborem cutis ab ijs probata percussio. Item quæ ustio & scarificatio faciendæ pubetenus atque clunibus, & circa initium ueretri circulatim, quod Græci peritoneon uocant, debilitate afficiens. Sunt præterea aquosa semina quæ excluduntur, & magis cum se pronos fecerint ægotantes, uel celeri ambulauerint gressu: Irruit autem corporibus, cum longa fuerint debilitate uexata, aut immodico usu uenereo affecta. Sed est accipienda curatio ex ijs quæ uelica sanguinem fluente memorauimus. Item ex ijs quæ in lenientis passionum fortificandi corporis causa, ac demutandis sæpius probauimus: est enim hæc passio seminalium uiarum paralyfis.

De somno ueneris, quem Græci onirogonon appellant. Cap. VIII.

PER somnos inanibus uisis affecti ægrotantes seminis lapsu uexantur. Nomen autem sumpsit ab accidente: siquidem effectum ueneris prouocando perficiat. Sed generaliter neque illico passio est, neque accidens passionis, quod Græci symptoma uocant: sed est consequens uisis, quam Græci phantasia uocauerunt, per somnum ægrotantes afficiens, ob desiderium ueneris uoluptatis, uel iugem atque continuam libidinem, siue è contrario longam usus dilationem uel continentiam. Sed hoc frequentius accidens in passionem sæpe deueniet. Itemque alterius passionis aliquando antecedens fiet, ut epilepsiz, furoris, quam Græci mania uocant, aut cuiusquam similis morbi: quoniam uexationem ostendere probatur, atque præmoueri corpus, siue prætangi accessione uentura. Item aliquando antecedens causa supradictæ passionis, quam seminis appellamus lapsum, fuisse probatur, à qua discernitur: siquidem illa passio etiã per diem uigilantibus ægris fluere faciat semen, nulla phantasia in usum ueneris prouocante. Somnus autem ueneris eo solo tempore quo dormiunt ægrotantes inanibus uisis concubitum fingat. Aliqui etiam aiunt oniroplefin ab onirogono discerni: siquidem oniroplefis illa sit quæ per somnum concubitum fingat, cum operantium sensu, sed sine seminis iactu. Onirogonos uero usque ad defectum deducit seminis lapsum. Sed Milesius nihil inquit supradicta differre: unum est enim, atque eundem fluxum dicit esse seminalium uiarum. Sed quod inquit nunc exclusio perficitur seminis, nunc impeditur, quanquam uisa per somnum eadem fingantur, ob alias inquit irruentes fieri causas, sed non est plurima discretio, nisi intentio adhibenda: quippe cum neque necessaria comprobetur. Eos igitur qui ratione futuræ accessionis epilepsiz, uel furoris, aut cuiusquam alterius morbi commouentur, ex ijs quæ suis sunt passionibus tribuenda mitigamus: eos uero qui specialiter hoc uitio afficiuntur, tanquam parua gonorrhoea affectos curamus: supradictorum enim augmentum in istam cadere passionem facit ægrotantes fluentium seminalium uiarum, uel paralyti uitiatarum causa. Quapropter conuenit primo ægrotanti ab intentione ueneris uisa metis auertere, quæ Græci phantasmata uocauerunt, atque aliorum applicare intentionibus externis admotis: siquidem facile quæ uigilantes accipiunt somniorum uisa ad actiua cum ijs motibus exerceant ægrotantes, & propterea corpus seminis discussione uexetur. Tum stramenta duriora atque frigerantia procuranda. Iubendi etiam supra latus iacere, cum se somno dederint, & ante se uel supponenda tenuis ac producta lamina plumbea clunibus, uel spongiæ circumdandæ poscæ frigidæ infusæ, uel injiciendo loca rebus frigide uirtutis ex anterioribus, ut balaustio uel acacia, aut hypocistide, uel psyllio herba, quæ sunt singulana, uel cum palmulis adhibenda. Cibus etiam constrictiui dandus, uel densabilis & frigidus, ut de sanguinis fluore conscripsimus. Poto quoque frigidum nutriendum, uel constrictiui, non quidem curiose confectis constringendi. Tum adhibenda fortificatio ex communi resumptione, & facienda consuetudo frigidæ lauacri, quod Græci psychrolusian appellat. Loca etiam in passione constituta forti impressione fricanda: sunt enim hæc sufficientia constrictionis faciundæ. Aliqui uero conuenire dixerunt etiam mictus dilationem tendere, ne frequenti officio causa refricetur. Sed completa uesica se somno ægrotantes dare, quo neque in altum somnum uenire sinantur, & intercessu frequenti excitentur, quo uisa ueneris uoluptatis quæ somno finguntur, amittant, & extenta uesica seminales uias sibi uicinas comprimendo semen retineant. Alij maiorem digitum ligandum atque constringendum forti filo uel lino iusserunt, quo dolore interueniente altior arceatur somnus: & neque animorum uisa in ueneris uoluptatem soluantur. Sed erunt hæc utraque à nobis excludenda: uexant enim uigilæ ægrotantem, & ultra modum urinæ retentio difficultatem mictus sæpe refecit, ut alterius passionis illatæ causa uideatur, ut supra docuimus.

De debilitate seminalium uiarum. Cap. IX.

MILESIVS debilitatem fieri dixit seminalium uiarum, uel sequi in usu ueneris pro semine sanguinis emissionem. Sed hoc commune est etiam ijs qui in osculo uesicæ, quam uretan uocant, ulcus habuerunt: & est harum manifesta discretio: in ijs enim qui ulcus habuerint, cum mictum fecerint, sanguis fluere, attestante mordicatione & dolore, & aliquando egestionem corpusculorum quæ ephelcydas Græci uocauerunt. In ijs autem qui debilitate seminalium uiarum afficiuntur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, attestante iucunditate, nullis corpusculis: & cum mictum faciunt, nulla mordicatione uexantur, sed etiam nuncuratio ex supradictis accipienda, ubi uesicam fluentem sanguine curari conscripsimus: constrictione enim atque densitate fluentia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde re corporatio, ut sæpe memorauimus.

De priapismo. Cap. X.

SINE ullo dolore uel consensu uertigo ueretri fiet, & appellatur priapismus. sed uocabulum sumpsit à similitudine priaporum, quod ita formentur, ut recto ueretro fingantur. Huius autem passionis meminuit Demetrius Apameus libro Signorum: ait enim semen in semet manu operantem nec quidquam potuisse peragere: tensionem autem fuisse ueretri nimiam cum paruo dolore, ut cornu putaretur, & ita perseverasse multis mensibus. Nullo quoque adiutorio medicinali cessasse, ac tarde atque longo tempore

quiescente : quo fiet, ut à satyriasi discernatur priapismus : siquidem illa celer sit, & non tardet in corpore, fiet sanè cum contractu neruorum, & stimulo desiderio ueneris uoluptatis : nam intelligitur priapismus paralysis esse seminalium uiarum, atque aliorum neruorum ad ueretri partes ducentium : quorum contractu ægrotantes afficiuntur. Sed etiam nunc curatio sumenda est ex ijs quæ de uescicæ stricture longo tempore tardante conscripsimus.

De uomica, sive internis collectionibus, quas Græci empyemata uocant. *cap. x.*

PLENA igitur de ijs tradenda est ratio : hæc enim sunt quæ in occultis nata collectiones nuncupantur, ut in splanchnis, ac membrana, quæ latera cingit, uel in pulmone, aut discrimine thoracis ac uentris, quod Græci diaphragma uocant. Item stomacho uel uentre, iecore, liene, intestinis, renibus, uescicæ aut miltiali uia, uel matrice, aut peritoneo. Sed de ijs quæ in matrice generantur libris quos de muliebribus uitijs conscripsimus Responsionum docuimus, de cæteris uero nunc dicemus. Harum igitur aliæ solo medicamine curantur, atque medicinali delectu gubernante usum chirurgiæ non exigunt : siquidem sunt occultis in locis, et plurimis superpositis membris, & sit impossibile atque illicitum plurimas incidere partes, ne sanguinis pomposus fluor periculum faciat ægrotanti : ut sunt quæ in pulmone generantur, uel diaphragmate intrinsecus, uel in ipsa altiore altitudine, aut in stomacho superius scilicet à diaphragmate, uel in uentris sessione, aut intestinis, excepto sine longaoniis. Item in posterioribus uescicæ, uel in renibus : alia uero accedente chirurgia curantur, quoties ad exteriora corporis collectionum liquorem erumpendo feruntur, uel magis ab altioribus recedunt, ut in hypozygo membrana, uel diaphragmate forinsecus, atque stomachi fundo, & uentris circa eius superiorem altitudinem. Item iecore & liene, & longaoni ad eius exteriora, atque sphinteri uicina, & uescicæ in anterioribus, uel sub umbilico pubetenus, quod Græci etron appellant. Item in uescicæ collo, uel in prima eius parte, quam Græci uretan uocant, & in peritoneo : communiter autem omnis uomica, uel collectio, antecedente tumore nimio, generatur denique empyicis, quos nos uomicosos appellamus, alij ex pleuretico morbo, alij ex pleumonico in supradictâ passionem deuenerunt, sequentibus signis, nunc communibus cuiusdam partis in uomicam uenientis, nunc specialibus pro singulis corporis locis. Sed ne longa hac oratione extimemus omnium communia simul ordinanda probamus : tum singulatim specialia designantes etiam munia adiungemus. Omnibus igitur collectionibus generatis, uel cum tumor in liquore ueritur, sequitur febricula uehemens, inordinata, & sæpe cum rigore & torpore frigido, uel iniquitate corporis. Tunc loci feruor incendiosus, grauedo, tensio : & exceptis quæ in pulmone sunt sæpe stimulant dolor, & pulsuosus. Tum celer pulsus, atque humilis, & sæpe sudor magis capitis, atque collorum. Dehinc perfecta purulentatione rigor corporis, atque tremor circumscribetur, & febrilis recedit inquietudo ac dolorum, sed specialiter ac proprie in communibus, si in membrana quæ latera circumtegit, hypozygos appellata fuerit generata collectio, difficultas spirationis sequetur, quam dyspnoeam uocauerunt, sed difficilis iacendi potestas supra contrarium patienti latus, hoc est, quod causa non tangitur, cum sensu quodam interno ueluti pendentium membrorum, & sæpe commotus corporis quasi sonus auditur, uelut inclusi atque collisi humoris : nam Græci hydatismos appellant. Sequitur etiam displicentia post acceptum cibum, quam Græci dysarescesin uocant, & plurima tensio medijs lateris, aut uentricosa inflatio impressioni digitorum cedens ac resurgens. In pulmone uero emergente uomica, spirandi plurima difficultas sequetur ægrotantes, tussis uehemens, uox obtusa uel rauca, & odoris tetri spiratio, thoracis grauedo, & adductio superiorum ad inferiora. Item grauatio atque tensio supinatis ægrotantibus, & releuatio sedentibus : denique se ipsi sustollunt ad partes lecti superiores, quo leuatiùs habeant caput. Sequitur etiam cavitatis oculorum, & genarum rubor, & albedo sub lingua uenarum : & si eruptio tardauerit, inflatio quoque articulorum sequetur, uultus pallor, & macies ora deformans. Item in diaphragmate emergente uomica dolor supra præcordia sequitur, penetrans per latera utraque usque ad posteriora, & aliquando inflatio uel tensio iuxta finem pectoris, uel sub extremis costis, atque ossibus ultimis perseverans usque ad alia : & si collectio forinsecus fuerit, sonitus aliquando humoris inclusi sequetur. Tunc tussicula, & in spirationibus difficultas plurima, ac respiratio longa, & forinsecus spiritu attracto dolor, quod nunquam sequetur eos qui pulmonis uomica uexantur : etenim pleumonici hauriendo magis spiritum releuantur. In stomacho autem emergente uomica rustationes tetra, atque difficultas spirationis, sed minor ægrotantes sequetur, & aliquando tussicula paruo sine ullo tumoris excreatu : tunc torpor frigidus articulorum, animi defectio, sudor in summitate cutis, pulsus paruus, & corruptio sumpti cibi, atque acidæ rustationes, & nausea, & aliquando uomitus, siccitas linguæ, uel asperitas sitis, transuoratio difficilis, plurima uel parua pro collectionis magnitudine. Quod si fuerit in superioribus stomachi, donec cibus transuoretur, pressuram sentient ægrotantes. Post effectus uero releuentur. Ac si in inferioribus erit facilis transuoratio, ac deinde dolida cibi perceptio sequetur, cum ad destinata peruenerint quæ sumantur, dolore ex anterioribus partibus in ore uentris attestante, cum inflatione uel extantia quæ impressione digitorum cedat ac resurgat. Si uero in superioribus fuerit collectio, nulla uidebitur prompta inflatio uel extantia, sed dolor atque grauedo inter scapulas, uel ex posterioribus ceruicis partibus sentietur. Ac si in uentre fuerit collectio, & magis in eius ambitu, erit inflatio inferius à diaphragmate, quod discrimen appellamus, circa medium præcordiorum sinistrorsus flexa, & impressioni digitorum cedens ac resurgens, attestante fastidio, nausea, siti post cibi sumptionem, cum rustationibus acidis, atque sumptorum corruptione, & aliquando liquidis

per uentrem egestionibus. Ac si in aliquo intestinorum fuerit collectio, erit extantia, uel inflatio uomica secundum eius positionem in pyloro: denique constituta in ultima parte uentris sub dextro latere, atque ilio, uel sub iecore. Sin uero in nestide fuerit collectio, erit in sinistra parte extantia supradicta atque inflatio ueluti sub liene. Alijs etiam intestinis tēioribus collectione uitatis inter umbilici atque pectinis regionem supradicta reperiuntur. Ac si in colo fuerit collectio, secundum ilium dextrum, circa umbilicum uelque ad sinistra loca, antecedentibus ijs quæ sunt solita colicos afficere, supradicta reperiuntur. Item in longaone collectione suffecta clunium dolor sequetur, cum difficultate mictus, & abstinentia uētris, & aliquando egestionē muculenta uel sanguinolenta. Inflatio autem uel extantia erit in superficie occulta: sed immixtis per podicem digitis sentietur, & ad inferiora uenientibus liquidis commixta stercore putria egerantur, adeo ut plerumque lateat, utrum ex pyloro uel nestide, aut tenerioribus intestinis hæc ferri uideatur. Sed erunt purulenta separata à stercore, atque discreta, cum ex colo referuntur, aut ex longaone. Item in iecore uomica constituta, inflatio uel extantia, & pulsiosa sequetur ægrotantes appositio, & tantis nobis sana principaliter occurrunt: & circa confinium interaneorum, quæ, ut supra diximus, Græci splanchna uocant, circumscrip̃ta collectio sentietur, cum nunquā tantum latens, atque ita submersa in peritoneo collectio comprobetur, neque ita circumscrip̃ta ac decisa uideatur, sed paulatim deficiens suos fines sanis partibus iungat, ut non deiecta atque decisa uideantur. Hæc est uomicarum omnium specialis significatio, sed earum eruptiones aliquæ ad thoracis inania fiunt, aliquæ inter regionem peritonæi & intestinorum, aliquæ ad stomachum uel uentrem, ut liquida atque purulenta euomantur: aliquæ ad pulmonem, siue arteriam maiorem, uel rhumam, quam Græci bronchon appellant, quo liquida & purulenta erussantur: aliquæ ad intestina, uel eorum spatia, quo per podicem liquida excludantur, uel purulenta: aliquæ ad matricem, quo per muliebrem sinum profundantur: aliquæ ad renes uel mictuales uias, ac uesicam, quo per mictum ferantur: aliquæ ad cor, ut Erasistratus ait. sed harum omnium eruptionum plerique aliquas rationabiles dicunt, aliquas irrationabiles: sed rationabiles aiunt, ut ad stomachum uel uentrem uenientes per os excludi: ad pulmonem uero per arteriam maiorem. Item ad intestina uel uentrē, uel podicem ferri, ad renes uero uel uesicam per mictuales uias. Item ad matricē per muliebrem uerētrum. Irrationabiles autem dicunt eas, quæ in diaphragmate, uel hypozygo membrana, aut iecore & liene generatæ rumpuntur per arteriam maiorem, uel stomachum, aut uesicam, aut matricem excludi credantur, cum nullæ sint ab ijs partibus quæ collectione affectæ sunt naturales uia ad supradicta loca ducētes. Alij uero etiam in ijs se repertos quædam uascula demonstrant, anatomica ratione adprehensa, quæ ad hæc penent loca. Alij aiunt uias esse latentes, quas logothoretas appellant, per quas limpida, uel purulenta quædam exudatione ferantur. Sed non oportet de ijs plurimum disputare: sufficit enim ad disciplinam significationis faciendæ manifesta comprobare. Item aliqui etiam in singula loca ex alijs factam susceptionem puris, quam metalepsin uocauerunt, signis explicare conati sunt: quæ quidem non necessaria, sed frequentia probauerunt: etenim ad arteriam maiorem, siue gutturis cannam, quam Græci brōchon appellant, facta eruptio spirationis ingerit difficultatem, & tussiculam: ad stomachum uero nauseam atque fastidium, & euerfionem, uel uomitum ingerit ægrotanti. Item ad intestina, uel uentrem tormentum facit partium cum inflatione ac uentositate. Ad uesicam uero delectationem facit frequenter urinæ reddendæ. Ad inania autem thoracis, atque inter peritoneon membranam, & uitalia interna nulla sunt antecedentia eruptionis signa, sed utranque factam intelligimus, sed pro ægrotantium motu, uel conuersione iacendi sonus quidam efficitur uelut inclusi humoris, quem Græci hydatismō uocauerunt. Præstantius autem, si inter peritoneon atque intestina id euenerit: sequetur etiam prominentia partium hydropem fingens, cum mordicationibus ac doloribus repētinis. Sed si inanis fuerit ruptio thoracis facta superiorum partiū à discrimine, quod Græci diaphragma uocant, cum difficultate spirationis, ac tussiculæ querela sequetur. Sin uero in regione, quæ intestinis atque peritoneo interiaceret, fuerit facta, inferiorum partium querela sequetur cum intestinorum tormento: nouitate enim repentinæ effusionis acriorum humorum, atque corrupti puris edacitate ea quæ naturali habitu custodita manebunt, uitalia uehementissime uexabuntur. Præterea repentina, atque coaceruata ruptio fit, aliquando paulatim, tenuatis primo uomica tegminibus, ut præliquatum, atque paruum liquorem mittant, quod apprehendimus, cum tussicula defuerit esse sicca, atque sputa pollui admixtione puris uiderimus: uel in egestionibus uentris quidquam saniosi liquoris fuerit repertū, uel in egestionibus urinæ sedimina purulenta fuerint inuenta. Sed post supradictas eruptiones, si omnis fuerit facta liquoris effusio, febres illico soluitur, atque loci prominetia reflatur, & grauedo circumscribitur. Sin uero ex parte fuerit effusa collectio, quod fiet debilitate ægrotantis, aut crassitudine liquidorum, aut nō in fundo uomica osculatione suffecta, sed è lateribus, aut supernis partibus paulatim liquidum inuenturum: sed erit approbata significatio nō in fundo factæ ruptionis, cum inter aliquos dies repleta uomica siue eruptio tensionem rursum atque grauedinē cum febre mouerit ægrotanti. Tunc post effusionem superflui liquoris omnia leuigantur, ac similiter per interualla dierum easdē difficultates repræsentet. Communiter autem omnium eruptionum turior est cōparatione ceterarum illa quæ in uesicam uenerit, atque mictuales uias: etenim naturaliter creduntur hæc partes iugē acrimoniā liquidorum excipere ac reddere. Quapropter neque nunc ulla nouitate facile uexari posse uidentur, cum in se aliena atque aciora susceperint, quæ eruptione uomica descendunt. Dehinc, quod naturali urinæ cōmixta purulenta, quæ collatione corrupta uidentur obrusa mitescunt: ultimo, quod neque coaceruatam, sed paulatim redditam ac requiescentem sumant egestionem urinæ per exitum tractum. Item facilitate secunda est

quæ ad intestina ruperit : hæc enim quoque creduntur transitum stercoreum sustinere, sed ad primam minus tuta iudicatur : siquidem possit coaceruata effusionis causa per podicem ægrotanti defectionem facere, & propterea mortem. Tertia est, quæ ad matricem ruperit, & magis in ijs quæ iam naturali lege purgatur : didicerunt enim loca materiz & transitum sustinere, minus quidem à prioribus tuta est : siquidem neque ex initio natiuitatis, neque per dies singulos naturalem meatum ipsæ sustineant partes, neque ita acra ferre consueverint liquorum : siquidem nihil in se sanguis habeat mordacissimæ qualitatis, omnium tamen periculosior iudicatur, ut Erasistratus ait, quæ ad cor fuerit facta, eius secunda quæ ad arteriam gutturis, quam Græci bronchum appellant, & eius repentina magis atque coaceruata ab ea quæ paulatim fuerit effusa. Siquidem defectiones ingerat ægrotanti, atque difficultatem spirationis, & tussiculam & præfocacionem, cum neque naturalibus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem transeundi uideatur : tertia quæ ad stomachum fuerit facta : siquidem præfocacionem minus ingerat, minus quidem à supradicta appetitum quoque cibi extinguat : & propterea fame ægrotantes afficiendo debilitet. Item post hanc secunda est, quæ ad inanitatem thoracis fuerit facta : siquidem circumfundatur pulmoni humor corruptus : atque cordi ultima est, quæ inter regionem peritonei & intestinorum uenerit : siquidem circumfundatur humor iecori & lieni, & uentri atque intestinis : quæ cum fuerint uexata, ingerant periculum. Cõmuniter autem, siue uniuersim dicendo, quod Græci catholicon uocant, omnium uomicarum, uel eorum qui ijs afficiuntur, salutarem intelligimus ductum fore, si post eruptionem factam febres cessauerint, & magis extemplo, uel eadem die, siti quoque recedente, atque perfecto appetitu cibi : uentris quoque officio parua atque congesta reddente, ipsius etiam puris albedo, atque eodem colore apparente : & cum lenitate, ac sine dolore suarum egestionum : & si per superna egeritur sine uehementi tussicula, neque coaceruatim, sed per partes excluduntur liquida : pessima autem aut difficulter, aut ut sæpe contingit interfectiua ferri iudicamus eis quibus post eruptionem febres annexæ perseuerauerint, attestante siti cum fastidio cibi & uentris fluore, uel ipsius puris felloso, uel liuido colore, coaceruatis egestionibus, cum uehementi tussicula uiribus depurgatis. Hæc est uomicarum significatio. Sed oportet ob earum generationem fugiendam congruam tumoribus adhibere curationem : horum enim augmenta collectiones faciunt generari, ut sæpe in pleureticis uel peripleumoniacis, uel similibus morbis, quibus ita formauimus curationes, ut minime finantur initia fieri uomicarum. At uero si iam perfectam uomicam uiderimus, & humore corrupto in toto aut ex parte tumoris caruerit nomine, oportebit similibus adhuc perseuerare adiutorijs, ut cataplasmatibus ex polline tritici, uel seminis lini, aut fœnigræci, uel hordeacij confectis, uel ex aqua mulsa, aut hybisci decoctione, cuius etiam radix erit conterenda, addita uaporatione spongiarum. Vel si in inferioribus corporis partibus fuerit collectio, encathismatibus quoque iugibus erit utendum ex aqua & oleo calido, ac decoctione cuiusquam ex ijs cataplasmatibus congrua quæ supra diximus. Ante cibum præterea olei calidi quidquam potu dandum : dehinc etiam nulli mediocriter cocti : tunc sorbilis offerendus est cibus, atque calidus : est enim improprium ex parte adhuc manente tumore quidquam acrius adhibere, quo magis labor ægrotantibus geminetur, scilicet tumore asperato, unde maiores collectiones efficiuntur. Pausante igitur tumore omni ex parte, & nondum erupta collectione, oportet eius adiuuari celeritatem, ut primum per scriptis cataplasmatibus sicum faciamus admisceri cum hybisco : tum resina terebinthina, adiuncto usu malagmatum, quæ congrua Responsum docuimus libris, ut est mnafeum : item ex tribus resinis, quod Græci diatriou retinon uocant : tum etiam diagalbanes, uel melinen, uel quam appellant serapionos, aut dictamnium, uel quidquam simili promissione conscriptum. Cibo autem dandus succus pitæne cum melle. Item porri capitati, uel atriplex, quam Græci andraphasin uocant : itemque urticam. Iubendi præterea ægrotantes magis supra latus iacere, si in superioribus à diaphragmate partibus collectio fuerit generata : Cauenda enim supina iacendi positio : siquidem extenta arteria angustetur, quo & magna difficultas spirationis fiat, & minima liquidorum exclusio perficiatur. Sed si ijs adhibitis collectionis non prouenerit eruptio, oportebit uehementioribus eam prouocare, ne humor inclusus plurima tardando membra corrumpat. Quapropter præpotandi sunt ægri decoctione fici, uel hyssopi, ac rutæ, & origani, & tragorigani, & thymi, uel satyreie, aut absinthij, uel centaureæ, aut marribij, aut semine radicum, aut sinapi, aut nasturtij cum melle, quorum aliqua etiam uiridia erunt mandenda. Item medicamen quod appellatur diatrion pipereon potu dandum, uel diascordeon, aut zopirium : multi tamen etiam hieram dandam probauerunt, & magis illam quæ appellatur diacolocynthidos. Adiuuat quoque eruptionis celeritatem sterutatio adhibita, & aliquibus etiam excreatus quidam hinnibilis iugiter affectatus. Ac si neque ita eruptio fuerit consecuta, erit ieiunus, uel dato potu, aut radicibus comelitis uomitus adhibendus. Aliqui uero in ijs quæ superioribus à diaphragmate partibus uexantur fumationes adhibuerunt : tardante eruptione, hyssopum uel thymum, aut origanum incendentes, uel sulphur, & sandaraca, aut aloe, uel storace impositis igni ægros hiscere iusserunt, & raptu quodam potili nidorem transuolare. Tunc dandum uel thymminum probant per diem bis uel ter : simile enim inquit curationis genus chirurgiz : sed uehementer caput grauatur implendo. Ac si in intestinis fuerit collectio, erunt per dysterem iniicienda ea quæ præbibenda nuper ordinauimus. Tum eruptione facta speculari, utrum per partes, atque deposito siquid excludantur : an uero coaceruata, aut omnino difficulter & paulatim. Sed si partim, & nullis obstantibus excludi uiderimus, erit à cibo abstinendus ægrotus, uiribus permittentibus. Tum alia die adhibita corporis unctione præpotandus ijs quæ supra memorauimus, cibus quoque adiuuare collectionem, quo omnia liquida detrahantur, dato mulso, uel solo melle bibendo, cum resina terebinthina, aut butyro non ueteri.

neri. Tum forbilem dabimus succum ex alica uel ptisana melle admixto. Item porros coctos cum oleo atque garo & ptisana. Tum etiam ex tritico ptisana confecta, aut cum protropo uino, aut squillitico: itē lac cum mulso. Et si eruptio liquidorum ad mistuales uias peruenerit, erunt adiungēda supradictis etiam mistualia medicamina quæ urinam prouocent, à Græcis diuretica appellata, ut asparagi, olus atrium, lactu- ce nunc coctæ, nunc incoctæ. Item radices & sorbilia, lacte quoque confecta. Sin uero ad intestina eruptio peruenerit, quo per podicem exitum habeat, cum supradictis communiter erunt adhibenda quæ uentris officium non densent, neque plurimū laxent: quapropter mistualibus prohibiti cibo ordinauimus mal- nam dandam, betas, cauliculos, cucurbitas. Sed si coaceruatim, ac nimis liquida ferri uiderimus, erit absti- nentia recusanda. Dandum mulsum potō sufficienter decoctum, & plurima sitis ægrotantibus indigēda. Dandus præterea cibus qui uentris teneat officium, ut oryzzæ succus sorbilis, aut lenculæ. Item pisces du- ri corporis, quos sclerosarcos Græci uocauerunt, & uolantum sicciora, & potō aqua imbrialis offerenda, quam uulgo cisterninam uocant, calida. Item medicamina quæ ad humectam tussiculam cōscripta sunt. Tum uinum mediocriter asperum. Sin uero difficulter atque paulatim liquida fuerint exclusa, erit inqui- rendā causa, utrum ne ob debilitatem ægrotantis id euenierit, quo minime ualeat excludere aliena: an ue- ro ob crassitiem liquidorum, uel ob eruptionem nō in febribus factam, uel in fundo collectionis. Etenim si ob debilitatem ægrotantis id aduerterimus fieri, erunt subleuandæ uires per resumptionem. Si autem ob crassitudinem liquidorum, tenuantia adhibenda, atque præpotanda quæ supra memorauimus, adiectis quoque similibus electarijs, ut sunt ex melle, resina, uel lini semine cum melle confecta, ac nucleo pineo, uel strobilis, & urticæ semine, præbibendum sinapi cum paruo pipere longo. Tūc hellebori adhibemus purgationem. Ac si ex uomitis ulcera tardantia perseverauerint, ea quæ supra diaphragma fuerunt, quod discrimen appellauimus, ita curabimus, ut est de phthificis scriptum: in stomacho uero uel uentre, ut de coeliacis: item in intestinis, ut de dysentericis: in renibus uero ac uesica, uel mistualibus mīs potis medica- minibus atque clystere iniectis, uel per cathetera immissa utemur: etenim si sordida apparuerint ulcera, lacte atque melle potamus, semine cucumeris præfuso, aut mulso, aut pinguibus palmulis cū passo, aut nu- cleis cum amygdalis & amylo. Similia etiam per cathetera immittenda, aut tetrapharmacum medicamen diligenter solutum. Sin uero limpida fuerint ulcera, erunt encathismata adhibenda, quibus præcocta fue- rint aliqua constringentia, atque extrinsecus apponenda emplastra, quæ cicatricem facere ualeant, à Græ- cis epulotica appellata, potui dandum lac cum amylo, & cucumeris semine, cum decoctione phoeniceoba- ni, aut papaueris fixi, atque constricti cum uino protropo, & amygdali decoctione, uel mali cydonij, sorba- rum, & palmularum thebaicarum, uel succo mali punici, uel ijs quæ in pharmaceutico Responsionum tra- didimus libris, ex quibus est quod appellatur carui, & ænocraton, & ex trachæro atque amylo, & glycyrr- hiza. Utendum etiam aquis sua uirtute medentibus, quas supra memorauimus. Item quæ in Aria insula, & Theanitorum prouincia esse perhibentur, ceterarum quoque resumptiuarum materiārum usum adhibentes, ut nitribiliorum succos. Vbi uero inter intestina & peritoneum eruptio fuerit facta, siue ex iecore, siue ex aliqua ueniens collectionis parte, quæsitū est quo modo puris detractio fieri possit: utrum- ne per tenues uias uesicæ ueniens, atque in intestina acceptum uideatur, & propterea per urinam, uel per uentris officium excludi possit: an uero secūs inguinum locis detrahi facilius uideatur, quod quidē Era- sistratus demonstrauit: Sed apparet nunc chirurgia exitum puris faciendum, incisa secundum inguen pe- ritonei membrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus aperte præbeatur. Tunc congrua ad- hibenda curatio: etenim incisa peritonei membrana, in cicatricem facile conducitur, & sine ullo pericu- lo ægrotantis sanitas datur, ut est conijciendum ex hydropum paracentesi, atque chirurgia ramicis, quam Græci enterocelen uocant. Neque impossibile putandum, etiam si quid remanserit, facta detractioe chi- rurgicæ per superficiem cutis, ac tenues uias, & per intestinorum cavitatem sudari: quippe cum etiā in hy- dropibus circumfusis humor intestinis sæpe fuerit exiccatus, quibusdam per uesicam, foeminis per matri- cem, sed omnibus cōmuniter fortitudinem conuenit per nutrimenta præstare. facile enim corruptio par- tium depulsa passione fiet, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

De superflua carne, quam Graeci polysarcian vocant.

Cap. XII.

ACCIDVNT corporibus superflua carnis incrementa, quæ Græci ob nimietatem polysarciam vocauerunt. Sed est hoc passionis genus contrarium nutrimento cessante: siquidem cessans nutrimentum tã bida facit corpora. Idem ultra naturæ modum uehementius elatum plurimam facit carnem generari, ex qua corpora grauata premantur. Præterea hoc quoque speciem accipimus cachexiz: siquidem indecens difficultas patientes afficiat: nam sequitur nimia ac superflua multitudo carnis, quæ in pinguem prominentiam erigatur cum tardo motu, atque grauatione, & debilitate, & ex paruo gressu anhelatione ac sudore, ut suo se corpore præfocari sentiant ægrotantes, quo neque leuia ferre ualeant uestimenta. Multi igitur medicorum atque aliptarum salutaribus præceptis adiungendam diligentiam detrahendæ carnis putauerunt, intuentes coenoteta, quam epidosin uel euexian uocant, hoc est, habitudinis augmentum: sed hoc à Sorano repulsum. Nos igitur solam habitudinem intelligimus, quæ fuerit cum modica carne fortitudo, & seruanda magis, quàm repellenda. Polysarcia uero, quæ nunc passione dicimus, recte cachexian nuncupamus, quæ multis accidentibus denunciât periculû: Etenim quæ sequetur animalia nutrimento dedita, uel custodia reseruata, ut flato atque extêto & prominêti corpore uideatur:

hec eadē cuncta patientes sequuntur: similiter accidentia corporibus ulceratis, quibus uana caro cōcreſcit, uel eorū labijs q̄ fuerit acie circūciſa renaſcantur. Sed iſtius paſſionis duplex traditur differentia curationis. Alia quæ colibeat fieri plurimum corporis nutrimentum: quæ quidem ponitur in geſtatione celeri, & cibis non multum nutritilibus, ac moderatis, ne plura corpus quā inſumit accipiat: alia quæ cyclica regula atque operoſa recorporatione formetur demutandi corporis cauſa. Sed ut docilis ſermo, ac manifeſta tradatur præceptio, partium erit memoranda curatio. Conuenit igitur corpus exercere geſtatione plurima ac perfeueranti, animalium iugo, uel curriculi motu, & equitatione ac nauicula. Item leſione & uocis exercitio uehementi, uel meditatione modulationis agoniflicæ, & celeri grefſu, quo magis labor ſuarum fiat. Item curſu, atque ſicca fricatione manibus puris, uel aſpero linteamine, & arenæ aſpergine. Tū uolutatio in palæſtra uaria, quam Græci celadian, atque choricomachian uocauerunt, quæ ſunt ſpecialiter ab ipſius artis præceptoribus imperanda. Tum hoplomachia, hoc eſt armorum ſicta confrictio. Item alienis laboribus exerciti, hoc eſt colluſtantium, uel coexercantium, quam Græci haterocopian uel trachelifimon uocant, atque longo uel raptorio machinamento, quod macron ſparton uocauerunt. Item Italica ſphæra, & luſtatione celeri, & dura atque multa uel ſicca fricatione: Etenim oleo labentibus manibus fortitudo ſoluetur exercitij. Conuenit etiam ſole corpora torrere, quod Græci helioſin uocant: tum paropteſi ex ſtāma, uel carbonibus, & ſiccis uaporationibus prouocatur ſudor: & nunc ſeruientia lauacra, quæ plurimum detrahant, nunc frigida, quæ corpus in denſitatem cogant: denique psychrolutarum corpora denſa, ac ueluti teſtea ſentiuntur. Conuenit etiam arenæ littorariæ adhibendus ſeruor: Tum natatione maritima, uel aquarum naturali uirtute medentium, & in lauacris ſudore perfectō aſperginem ſalis adhibere: qua ſepe condita caro animalium ciborum uoluntati ſicca ſeruatur, atque denſior, nec collecta marceſcit. Tum fricamentum adhibendum, quod Græci zegma uocant, ex nitro tuſo, atque in puluerem reducto, & poſt lauacrum longa cibi dilatio, uel potus: tunc enim appetitio minima marceſcit, & eius acies temporis obtunditur dilatione, cum etiam digeſtionis parata proteruitas detracto fomite languet. Erit præterea potus ſemper ante cibum prohibendus, uel in toto paruus dandus, & magis cum cibi ſumuntur: Etenim inmiſſo liquore plurimo fluidatur accepta, atque caro mollitur, & digeſtione facile ſolidiora propriantur. Sed ſi plurimum quiſquam ſitierit, paruus dabimus mediocriter aſperum. Pulmentum uero alicam, amyllum, lac, nucleos, cerebrum, oua: piſces autem teneros, uel pinguia quæque reprobamus. Panem dabimus frigidum, fermentatum, autopyrum: eſt enim mīnus nutriendus: & magis, ſi fuerit ueteratus. Specialiter autem ſiccus probandus eſt cibus. Item pulmento danda ſunt olera & piſces durioris naturæ, uel auium ſicciora, uel agreſtium, ut leporis, capræ, porcina ex depoſito, hoc eſt, longo tempore ſale ſiccata. Conuenit præterea unum cibum ſumere, & poſt ſumptionem plurimum uigilare: In requie quidem, quo multa corpus exhalatione inſumatur uigilando: additur enim plurimum ſomno: denique dormientium corpus ualidius fiet: Potus dandus frigidus: & perfeuerante carnis multitudine erunt initia cydi adſumenda, nunc ab omni abſtinentia, nunc à paruo cibo & aqua, nunc augmenta ordine regulari. Item à ieiuino uomitu ſumendum eſt initium, uel ex radicibus. Tunc ad drimphagian ueniendum, ac mediz qualitatis materiam. Tunc uolantum atque agreſtium: quæ quidem erunt celerāda per dies minoris breuitatis, quo urgentius initia repetantur: & in oleribus erunt urinalia prouidenda, ut aſparagus, paſtnaca, apium, foeniculus, daucus, porri capitati, & horum ſimilia: ſic enim communia ſeruantes corpus ualebimus demutare. Accidentium quoque conieſturam facientes, quo elimatio carnis atque diductio procedat. Aliqui medici phlebotomiam probant, atque purgatiua medicamina, quæ catartica appellant, & clyſterem, & poſt lauacrum illico Venerem adhibendam ante cibum, atque ipſa die paruus nutrimentum, poto aquam dandam. Item uomitum poſt ueſperinum uinum. Alij quoque ueluti paſſioni contrariam corporis expansionem ex thalamo fieri probauerunt, & appellant antipalon. Itemque nocturni roſis auram ante ſolis ortum bibendam. Sed horum deliratio manifeſtis proditur rebus. Nam phlebotomia uires depurgatæ uexantur, & corpora pallescunt: nam Græci raccoſin uocāt. Item purgatiuis medicaminibus ex clyſteribus, cum ſupradictis etiam liquida corrumpantur, cum aliis habitus corporis fiat: nam Græci cachexian uocant. Veneris uero uſus effeminat membra, atque fortitudinem tollit. Item aliquibus bis in die ordinatum lauacrum, & ſomnum prius quā cibus ſumatur: quod quidam uoluerunt: craſſificat enim ſomnus, non tenuat corpora. Item uomitus poſt cibum: uires enim tollunt: & quanquam corpori detrahant carnem, implent tamen neceſſario caput, atque ſenſuales uias uexant, & gingiuas in putredine mittunt, atque os odore foetant, retro ſtomachum limant, & ipſum hominem ſibi met faciunt diſplicere: nam Græci dyſareſceſin uocant, cum inæqualitate febribus uicina. Eſt & improprium, atque praua ratione æſtimatum, ob corruptionem paruorum maiores corporis uexationes inferre. Sed ſi forte uinorum fuerit exceſſa moderatio, tunc erit uomitus adhibendus: eius enim uexatione maior eſt immodicæ ſumptionis grauatio. Item præ ceteris uehemens, & maior quā ut oportet animi officiis ſiue curis adplicatio. Videmus ob has cauſas etiam ſtudentium corpora fieri tenuiōra, limatione quadā animi iugum cogitationum atque diſputationum. Eorum uero qui ſegni ac pigro ductu uitam trahunt, ſolidiora atque pleniora fieri corpora, ob contrariam rationem. Iſ de ſuperflua carne conſcriptis, omnium tardarum paſſionum curationes explicauimus, intentione neglecta.

F I N I S.

Aurelianum {unc ex altero volumine a me
reſtitutum, {ue reſer.

THEODORVS

THEODORVS PRISCIANVS MEDICVS
TIMOTHEO FRATRI.

NVPERRIME collega Olympij exhortatione prouocatus, confeci nonnullos presentaneæ libellos, quos uel mediocris fama retinet; sed græco stylo, quam medendi industriam sermone claro hæc natio publicauit. In his igitur uoluminibus non studium teneo gloriæ; neque enim eloquentiæ hic opus est, sed laboris. Quippe quia fragilitas humani corporis remedium efflagitat, & celeris beneficii natura consentit componi. Nō omnis enim uoletudo medendi patitur tarditatem. Quapropter amice charissime, quæ ornati nostri corporis, uel saluti procurandæ, custodiendæque conueniant ordinata remedia, nunc in tuâ gratiam nostro sermone digessi, non sine famæ lucro, ut arbitror. Ipsum enim in utroque genere opus plures testes habebit, quam iudices.

THEODORI PRISCIANI, IN PRIMVM OPE-
RIS SVI LIBRVM, QVI LOGICVS DICE-
TVR, AD TIMOTHEVM
P R A E F A T I O.

I MEDICINA minùs eruditi ac rustici homines, natura tantum imbuti, non etiam philosophia occupati essent, leuioribus ægitudinum incommodis uexaremur, & faciliora remedia caperentur. Sed hæc uia ab illis omiſſa est, quibus eloquentiæ studioſis, scribēdi ac disputandi gloria maior fuit. Nam ſcire uelim, qui fieri poſſit, ut cum quid rectum, aut contrarium, quid ſalubre, aut incommodū ſit, huiusce artis profeſſores inter ſe diſſentiant, diuerſorumque ſententias ſinguli ſeruare conentur, iactetur æger magna tempeſtate morbi: tunc noſtri collegij caterua concurrit, tunc nos pereuntis admiratio poſſidet: nec communis naturæ conditio conuenit, ſed tãquam in circo & agone, alius eloquentia, alius diſputando, alius adſtruendo, alius deſtruendo, quiſque inanem gloriam caprat. Interea dum hi inter ſe luctantur, atque æger ſic caſui proprio datus, nonne uidetur natura ipſarum hæc dicere? O fruſtra occupatum mortalium genus: occiditur æger, non moritur, & mihi fragilitas imputatur? Sunt infiniti morbi, ſed deſunt remedia? Latent in fruticibus uenena, ſed non germinant ſalutis officia? Abſit hoc. Neſcio quæ perturbat rerum diſputatio, atque iſte loquacitatis uanus amor. Hæc ego ſaluti mortalium remedia non dedi, ſed magna ſeminum, ac frugum, herbarumque potestates, & quidquid propter homines genui, certandi ſtudio, & inſtructuosa uerba deferimus. Hinc eſt, quod ego huiusmodi opus aggreſſus ſum, ut facilioribus potiùs, naturalibusque medicemur remedijs, ut diſputatione garrula careat medicina, quàm iactanti oratione miſeros & afflictoſ teneamus: hoc eſt, euporiſtis, ſuccis, tritico, farina, & hordeo, herbis que uarijs, uel metallis, & ſimilibus cæteris, quibus manifeſta remedia natura ſignauit. Neque enim cum ægrotus quiſpiam afficitur, adhibendus eſt Pontus, aut interioris Arabiæ oſtea, uel ſtyrax, uel caſtores, uel reliquæ fruges, quas orbis longinquus familiares habet. Ideo medicinam etiam in uilibus herbis parens natura diſpoſuit, ut nullo bello, uel tempore medendi deſit officium, cum ubique poſſit eſſe remedium. Hoc igitur uolumine bonam hominis ualitudinem expediui, & ut aiunt, ruſticis curationibus firmatam, in uulguſ expoſui. In quo gratioꝝ eſt ægris medicina, quàm celeritas ac faciliſ ſamulatur officij. Qua de re eſt nobis de capite, tanquam de capite, ad reliquam curam corporis deſcendendum: in quo quanto pretioſior eſt ſanitas, tanto eſt moleſtior ægritudo. Si quis igitur in ſene, & quantuſcunque ſcientiæ medico, hanc ſimplicem curationis uiam, illaboratamque miratur, nouerit me in utroque genere facere, quàm docere potius elegiſſe.

De infectionibus capillorum. Cap. I.



DE DENIGRATIONEM capillorum. Spumæ argenti terræ cimoliæ, calcis niuæ, ſing. ſe miuncia, trita cum aqua. Identidem conteri facies uſque in pinguedinem mellis, & capillos linies. Linimentum uerò cum ſiccare ceperit, loca fricando diſcuties, & lauabis ex poſca in qua terram cimoliā tritam commiſcueris. Ne autem uſtionem incurras, procura frequenter, ut cum lauare coeperis, loca ipſa oleo roſeo irrigentur. Aliud. Ferri purgationem, & raſuram plumbi uncias ſenas, in ſextarijs tribus aceti niſcidi coques, ut ad medietatem coctura perueniat. De hac coctione frequenter loca lauabis, et oleo anethino continges. Ciconiarum oua in uas plūbeum adijcies, & agitabis: ex hoc capillos unges. Cum uerò linimenta ſiccauerint, ex aqua, in qua betæ decoctæ fuerint, tepida delauabis. Aliud. Capparis radicem confringes, & tribus diebus in lacte infundes aſinæ: poſt uerò coques molli uapore, uſque in mediā partē, & frequenter loca coſfrices. Aliud. Fungos arboris nucis cōburi facies, ut carbo fiat: poſtea uerò terās, mixto oleo quoad libuerit. Aliud. Hoc utaris unguento diurno, ut ulterius albi nō naſcatur. Betarū rubearū cū radicibus ſuis lib. I. terās cū am- niaci ſalis unc. II. & admiceſ olei cedrini unc. III. ut conſectio ſiccari non poſſit: & ueris. Flauos uer capillos ſi facere ueliſ, lupinos amaroſ in aqua per dies XII. infundes: & poſtea ex hac aqua in balneo caput affidue lauabis. Aliud. Alumen, quo infectores utuntur, cum aqua conteres, & capillos ex his inſundito: quod permanere facies diebus tribus: poſtea lauabis ex aqua, in qua nitrū reſolueris. Sanè ſi tibi multū rubri uifi fuerint, ex

THEODORI PRISCIANI AD

*Ad corrigendum tu-
lorum capillorum.*
ea aqua lauabis in qua cimoliam terram resolueris. Si candidare autem uelis, hirudinum stercore, cum fel-
le taurino contrito, loca continges frequentius. Sed hæc superflue nos ordinare, certissimum est. Cæte-
rum albi prohibendi sunt potius, quam procurandi. Sanè si crispare intendis, Asphodeli radices in uino te-
res, & ex hoc frequenter infundes.

De capillis cadentibus. Cap. I I.

*Albi capilli potius
hibere, & procurare.*
INSTRVAM etiam de capillis cadentibus, qui aut longa ægritudine, aut abundantia uaporis ca-
dentes, ante senilem ætatem nudare caput consueuerunt. Ordinamus itaque confectionis genus, quo nõ
solum candentes retineri, possideri uel possint, sed etiam fortè qui ceciderint, reparentur accipies quam-
plurimas napas, & in uase fictili clausas incendes: & postea cum oleo conteres, & cap. ac illinies: sanè solli-
citus, ne frontem tangas, ob tumores emergentes: licet falsò tumore terrearis. Aliud. Melathion super
carbones cum torrueris, teres, & cribrabis, & cum aqua commixto, caput illinies. Hoc & alios innasci fa-
ciet quammaximè. Si supercilia curare uelis, Ladanum cum uino teri facies, & oleum myrteum admisce-
bis, & uteris ut pinguisimo linimèto. Aliud. Nuces uirides immaturas quassabis, & eas in oleo fremia-
li infundes, & aluminis humecti tertiam partem, & in uase fictili nouo repones diebus 40. in subduali: &
post uteris unguento probato. Aliud. Nigræ myrti foliorum uncia I. gallarum quassatarum unc. II. si-
militer in oleo infundes ut supra, & uteris. Hoc etiam supercilijs utile est, quod Græci *τρίχας* appellant. Aliud.
Herbam Peristereon cum radicibus suis siccatas teres, & cribrabis, & oleo commiscebis, & uteris.
De experimentis. Aliud. Adeps urfinus, cum ladano & adianto subactus, illitusque, capillos effluere
non patitur. Et sandaracæ cum aceto contrita, idem facit. Aliud. Capita mulcarum cum melle contri-
ta, par beneficium faciunt in continendo capillo, ut capilli etiam post combustionem exeant, si fieri uelis.
Ficus folia sicca tundes, & cribellabis, & ex eo puluere loca confricabis; aut cum aqua dulci decocta prode-
runt. Aliud. Alcyonij radices combures, & teres similiter, & præuaporatis locis asperges. Sed quoniam
aliquando supercilia, uitio imminentis elephantia, aut siccitate nimia corporis cadunt, ut in capite sæpe
contingit, hi sic constringendi erunt. Cedrinum *militrum* combures, & eius nidoris puluerem colliges.
Vnde hoc supercilia tangere debebis.

De cremenis capillorum. Cap. I I I.

Ad capillorum cremenis.
ALIUD generaliter omnibus ad capillorum cremenis. Polytrichi herba radices pondo duo, flores
eius pondo I I. cedrini olei pondo I I. oua gallinarum decem, olei hispani pondo triginta, gallarum pon-
do tres. Radices herbarum in aqua infundes, flores uerò supradictos in sole ficcare facies, oleum uerò
utrumque in uas mundum mittis cum ouis, & cæteris speciebus, & agitas, quandiu ueluti calefactum pro-
prium odorem exhalet, & similiter quotidie agitas diebus octo. Postea uteris unguento. Attamen gallico
sapone caput lauabis. Aliqui uerò consultis agentes, post capitis loturam hac usi sunt unctione. Olei
cedrini pondo I I. uini libra, ouis I I I. Nardini olei pondo V. commiscebis | his omnibus mixtis, & agi-
tatis.

Ad defectionem capillorum, quibus ægritudine proluxa carere sæpe contingit. Cap. I I I I.

*Ad defectionem capillorum
ex morbo.*
CORIANDRI seminis uncias I I. cimini anatolici uncia I. herba peristerei uncia I. Omnia in-
fundes in olei myrti, & uini cretici sextarijs I I. Et post tertium diem, molli uapore coques usque dum
materia consumatur, & ita uteris. Adipis urfini uncias I I. ueretri asini combusti uncias I I. polytrichi
unciam unam, polygoni uncias I I I. myrti olei pondo duo. Omnia tusa, & cribellata, comiscas, & ute-
ris psilothro. Capillos locis proprijs defugabis, si uespertilionum cerebra lacte muliebri contrita commi-
sceas, & adhibeas. Aut si marribus succo lac asinae commisceas, & similiter loca contingas. Hoc & thun-
ni piscis fel, ladani lacryma commixtum facit. Et si leporis sanguine recenti loca contingas. Sandaracæ,
& hyoscyami succo æquis ponderibus mixtis, loca continges, & capilli cadet, nunquam ulterius exituri.
Cicutæ herbae succum cum aqua diligenter contritum, euulsis ex oculis pilis, adhibeo diebus tribus, & ul-
terius non nascentur. Cimicis sanguine quammaximè mulieribus loca continges. Vespertiones quam-
plures uiuos accipias, & eos in uas cum cedria infundas, quandiu illo tempore putrefieri possint, & ex eo
loca contingas, quæ a capillis semper immunia esse uolueris. Agrestis urticae semine cum oleo contri-
to, loca contingit. Pini arboris las accipies, & cum melle conteres, & repones. Cum uero uti uelle ce-
peris, loca confricabis.

De pediculosis. Cap. I I I I.

*Pediculos cadunt
aphis agria, sandaracæ, aceto,
eboris, nitrum, tamarisci, mel, ouis,
lana, lupini, pyræto, galla, uita.*
STAPHYS agriae uncias I I. sandaracæ unc. I. cum oleo, & aceto postquam contriueris, omne cor-
pus perungendum est. Sic garatteros, & nitrum, & oleum facit. Folia tamarisci in aqua bullantur, &
ex ea decoctione fricentur. Et aliud. Postquam capillos abstuleris, aut melle, aut cedria loca continge. Lu-
pinos amaros in aqua infundes per plenum diem: alia uerò sequenti coqui facias, & ex ea decoctione lo-
ca frequentius delauabis. Hoc pyrethri, & gallarum puluis ex æquo comixtus, in balneis adhibitus, facit.
Post hunc uerò puluerem, succo betarum loca lauabis. Staphysagria tundes, & oui album admiscebis,
& commixtione loca fricabis.

De acris.

De acoris

Cap. V.

De alopecioſiſ. Cap. VI. De ſcal. cap. 8.

ACORAS, papillas dicimus, quæ per cauernas breuiſſimas, humorẽ pinguiſſimum mittunt. Hæ frequenter in capite, uel facie, & cæteris membris emergunt. Quibus & cæteræ papillæ ſunt ſimiles, quas **Ceniones** appellamus. Sed & diſtāt, q̃ **Ceniones** plures cauernas egeſtionis hñt, & humorẽ multo pinguiorẽ emittunt. **Acora** aut̃, unā cauernā hñt, & humorẽ egerit aquatiorẽ. Eſt nāque utriſque cā una, uitiorum naſcendi neceſſitas. Quæ cū ſe plenam mōſtrauerint, ordine tali curadẽ erunt. Primò purgatione totius corporis uti conueniet, ut origo quæ hæc effecerat, egeratur purgatione inquam, tali. Scammoniam, aloẽ, colocynthidam æquis ponderibus contritas, ſucco cauliculorum temperamus, & catapotia in modum enui graniſſimi conficimus. De quibus erit nobis plena datio, grana VII. Secundẽ V. & ut ſe ratio etatis, & cauſe quaſitas attulerit. Incipientibus uerò cauſis, etiam ſola unguentorum frequenter beneficia ſuffecerunt. Terra cinolia cum aceto contrita, ſeu creta argentaria ſimiliter. Sic pompholyx cum aceto adhibetur: ſic ſpuma argenti: ſic chartæ combuſtæ cinis cum aceto medebitur. Quibus uerò hæc uulnerario obuenerit cum dolore, primò ex aqua calida fouendi ſunt, in qua decocta ſint aut rubus, aut ſparagi radix, aut ſaluig folia. Hoc & lenticula cocta, & cum melle contrita curare conſueuit. Antè tamẽ lauanda loca erunt ſucco betarum, mixtis foenigræci pollinibus. Pini corticis cōbuſti cinis mixtus cerotario, & oleo roſeo adhibetur. Sic & cadmia, ſic & ceruſſa, ſic & ſpuma argenti adhibetur in balneis. Certum eſt nanque, in foeminis cauendam eſſe aceti adhibitionem. Vnde magis eis uino omnia medicamenta temperanda erunt. Item nitrum combuſtum uino ſtiptico extinguit, & cōtritum in balneis adhibebis. Similiter & microbalanum oleo coniungas: Quod apud Apollonium probatum eſſe cognouimus. Aliud. Olei roſei, uel myrtei unciam mittes in mortarium plumbeum: Accipies etiā piſtillum eiſdem metalli, & teris, quandiu oleũ pingueſcat & nigreſcat. Item in aliud mortarium cuiuſlibet metalli, mittes ſpumæ argenti libram unam, tantundem ex ceruſſa, & eorum puluerem combures cum oleo ſupradicto. Ex hoc omnes acoras, ubi fuerint, linimento curabis. Hoc medicamẽtum & in papulis, & in pudendis, ſagadijs, uel cōdylomatibus, quæ ſemper pro loci natura acrioribus medicaminibus commouẽtur, etiam prodeſt. Apud aliquos hoc genus medicamenti **Ricotia** appellatur. Aliud rutatum. Spumæ argenti uncias oſto, rutæ uiridis foliorum uncias quinque, olei myrtei uncias oſto, acori libram unam, miſceſ omnia contrita diligenter, & loca fricadõ curabis. Priũ ſucco betarũ ſimiliter ut ſuperiũ, loca lauanda ſunt. Ceruſſæ uncias tres, ſpumæ argenti uncias duas, olei myrtei quatuor, ſulphuris uiui unciam unam ſoluta commiſceſ, & ſimili modo uteris; non ſolum hoc capiti, uel quoquo loco emergentibus exanthematibus prodeſt, Apollonii iudicio comprobatum.

De alopecioſiſ. Cap. VI.

De ſcal. cap. 1. De alopecioſiſ. Cap. VI.

CONTINGIT dupliciter paſſio cadentium capillorum, ut aliquando defectu quodam cadant, & nudando partem capitis turpent: & aliquoties, ut illis ueluti uulnere horridus plerumque uiſus occurrat. Ergo defectus, ut priũ diximus, cum contigerit, caluitiem facit. At ſorditas illa, uulnere ſimilitudinem quandam exhibet: deinde etiam ſerpentis ſquammoſi ſuperficiem mētitur. Vtrunque genus paſſionis ſorditatem exhibet capillorum. Sanè hæc paſſio comparanda eſt fructibus ex malis ſuccis terre naſcentibus. Quorum cauſa aliquando eſſe poterit, qualitas nutrimenti: & ſi fortè ſterilis terra fuerit, fructus cum raritate degenerat: ſi uerò humor corruptus, etiam fruges degenerat. Ad hanc ergo formā, etiam in capillorum uitijs debemus aduertere. Talis enim erit eorum poſitio, qualem qualitas oſtenderit capitis. Eſt ergo utriuſque accedentibus uitijs, manifeſta & æqualis origo naſcendi; unde ſimili curatione uiuari debebunt; licet diuerſa cognomenta ſortita ſint, pro ſui accideris qualitate. ut alopecia ex cognomento uulpium; & ſerpentium ſquammis cognomentum acceperit. Eſt nanque huius paſſionis diſtincta, quæ proſecto ex humorum colore originem cauſarum atteſtatur: ut aliquando alba, aliquando rubra, aliquando etiam nigra uideatur. Purgantur adeo proprijs purgationibus ſuis. Nam ſua deo propriam totius corporis curam & diligentiam decernendam, quoad ulterius acerbi & corrupti humoris perniciem per inferiora depoſitam, à capitis haſtenus inquietudine deuocemus. Sūt itaque, ſi de phlegmate, cauſa uel origo peruenerit, apophlegmarismi adhibendi tales. Pyrethrum, & ſtaphyſagria, cum granis mallicis, æqualibus ponderibus mixta, & contuſa adhibeantur, & ſales cum pulegio contriti ſimiliter, & cum oxymelle mixti, ore diutius teneantur. Ergo quoniam ſingula accidentia proprijs ſuis purgationibus liberantur, ſuperaddo purgationis genus, quod in commune, ſine alterius humoris præiudicio, operetur: quo omne corpus diuerſis humoribus infeſtatum releuari poſſit. Colocynthidos interiorũ unc. I. aloẽ ſunc. I. scammonia ſunc. I. abſinthij ſunc. I. omnibus contritis & mixtis cum ſucco cytoniorum, catapotia conficimus, quæ pro qualitate corporis atque cauſarum adhibeo. Accipi autem debebunt, ſi breuitas accidit in modum lentis, aut VII. aut IX. aut certè XI. Si autem in ania, aut homine uerſto fuerit, maior cura exigitur, unde cum aqua calida competentĩ, intermiſſis etiā diebus, dabo quod poſt ordinabitur. Poſt beneficia itaque harum purgationum, quæ ſotò corpori prodeſſe priũ potuerant, etiam particulis, hæc ſunt adiutoria ſocianda. Euſorbij tritũ cū oleo, pro linimẽto adhibemus, aut oleũ ſolum laurinum, aut naſturtij ſemen cum oleo, aut ſulphur uiuum cum nitro combuſtum, æquis ponderibus cum aceto,

Post unguenta sequi debent

Tepida remedia

aut erucæ semine cum oleo, aut urfinis adipibus tantummodo confrigentur. Similiter etiam alcyonium combustum cum aceto, uel cedria, operabitur. Hoc etiam murium simus cum aceto, hoc amygdala amara, hoc cepæ tritum cum oleo, hoc raphani cortex cum melle contrita facit. Nam etiam ferri purgatio cum aceto, uel hordeum combustum cum murium simo, & aceto siccare potest. Omnes confectiones quæ mediocriter calefacere possunt, mediocribus & delicatioribus corporibus adhibendæ sunt. Prius ergo locale oleo usque ad ruborem, ante curam confricentur mediocriter, ne uulnerentur, Quæ si uulnerabuntur, oleo roseo, uel adipibus anserinis recuranda erunt.

De aurium causatione.

Cap. VII.

AURIVM dolor varijs frequenter ex incommodis excitatur. Nam & frigora, & lauatrum importunum, & quassatio eiusdem cauerne, uel sordium conspiratio, aut altior nervi tactus, aut si per longam ægritudinem humor vitiosus illic aggregatur, & quæ molestiam auribus faciunt. Si de frigoribus etiam dolentibus emerferit, in oleo cepæ coqui facias tepido, aut piper tritum cum oleo, similiter & rutaceum: Sic etiam laturinum curat. Si de humore balnearum aures fuerint inquietatæ, oleum tepidum infundito, & postea lana mollis. Sed & ceparum succum cum anserinis adipibus mixtum: similiter initio, & ovi alboris cum lacte muliebri. Et si dolor innatus fuerit, basilicon in nardino oleo solutum adhibeo, & castoreum cum lacte muliebri similiter. Utile est interea, ut spongia molli uaporetur ex aquis calasticis: & post lana detergatur. Sanè si cum illa indignatione doloris, etiam derivatio fuerit saniosa, alumen melle & oleo resolutum infundito. Et galbanum in oleo similiter resolutum inijecto. Vtositas uero si interclusa erit, aphronitris in aceto resolutis excluditur. Hoc & dracontæ herbæ succus, & centaureæ facit. Si uero sonare aures coeperint, oxyrhodon tepido curadæ erunt. Si autem idem ex ægritudine sonitus obuenerit, ex aqua primo uaporabis aures, in qua absinthium ponticum coques, & continuo oxyrhodonem infundes; aut raphanorum succum cum oleo, aut hellebori nigri puluerem cum aceto; aut solum acetum tepidum cum melle commixtum: aut porri succum cum lacte muliebri, & oleo roseo, aut amygdala amara cum aceto & oleo. Hoc & cepæ, & allium cum adipibus anserinis, uel porci felle infusum remedium procurabit. Si uulneratæ aures fuerint, glaucium cum aceto contritum infunde. Si tamen dolor non maior fiat, uel etiam humor, lamina ferri purgati cum aceto trita iuuat. Si audire tardius coeperint, quod difficile nouimus purgari posse, puluerem nitri marini contriti commisce, & antea caput purgabis. Deinde uentrem purgatione procurabis. Auribus uero absinthij herbæ decoctionem tepidam infunde. Lauri quoque folia, & betarum cocta superpone. Aliquando nitrum in posca resolutum infundimus, aut bouis, uel tauri, aut caprarum, siue porcorum fel, cum oleo roseo, uel laturino, uel raphanorum succo, similiter tepidum profuit. Quibus uermes innati fuerint, bouillas carnes in carbonibus superpone, aut humorem ex hinc manentem collige, quem auribus tepidum frequenter infundes.

De parotidis.

Cap. VIII.

TUMORES repentinos sub auribus innatos, Parotidas uocamus: quas aliquando ex ægritudine, aliquando etiam spontaneè apparuisse cognouimus. Eisdem frequenter per initia mollientes spongia in posca infusa compescimus, assidue humectando. Quæ uero ex ægritudine emergunt, & quæ per initia, cucurbita mediocri imposita, ad superficiem prouocandæ sunt. Si uero cum grauiori augmento minaces accesserint, tunc neque cucurbitæ, neque similia adiutoria, quæ ex altitudine aliquid euocare possint, adhibenda sunt. Frequenter enim ex doloris acerbitate, febres, & uigiliæ procuratæ, eliminatis uiribus uite periculum intulerint. Paragoricis uero iisdem adiutorijs, sic morigerandum erit, ut ex pane mundo cum oleo infuso, contritoque cataplasmentur: quod frequentius mutari debet. Similiter etiam de tritici pollinibus faciendum est, sic de hordei, superadditis tamen porcorum adipibus. Sic oryza mutata cum butyro. Si autem ijs adhibitis quæ mitigare cõsueuerunt, locis iam maturatis sanies apparuerit manifesta, (quod ille ait) continuo culpam ferro compesce. Post uero resecatis causis, uulneribus solenni diligentia seruiemus, curationibus tamen euacuatis, & extenuantibus. Ad hoc maxime etiam tunc medicinæ incumbat industria, ut frequentibus etiam fomentationibus, doloris illis penitus inquietudo quiescat. Sunt autem adiutoria hæc, quæ post doloris impetus adhibenda sunt. Arnoglossa contrita, cum salibus, aut lapidibus radicibus in uino decoctis, & rutæ folia uiridia, trita, ac mixta cum cerotario, & oleo roseo temperata, & sulphur uiuum cum cymolia, & quibus ponderibus iuncta æxungia. Sic fici pingues decocti & contriti, similiter causas latentes euocauerunt, quibus in principio hæc adhibenda sunt adiutoria, quando per sanem digestionem uolumus procurari, post fomentum aquarum calasticarum ex seminibus lini, uel fenogreci, & hordei pollinibus cum mellicrato facto cataplasmate seruiemus. Sunt namque adiutoria quæ & euocare, et ad maturitatē cogere parotidas uel apostemata ualeant. Hordei farina cum mellicrato, aliquando etiam cum aqua marina, & oleo roseo aut cyprino tepidum cataplasma adhibetur. Et fici similiter pingues, in muria, uel in aqua marina decocti, & contriti imponuntur. Et betæ coctæ in aqua, & contritæ similiter operantur, & agrestis cucumeris radix, in mellicrato cocta & contrita adhibetur. Aliud de experimentis. Rutæ & hyssopi teres & quibus ponderibus: & fici siccos contusos sub duplo pondere commiscet, mellis quippiam adijciendo, idipsum operabitur, ut apostema ex interioribus ad maturitatem prouocetur. Aliud. Capparis cortice in aqua

in aqua elixa, & cum uino commiscet, & cataplasma facit. Aliud. Irjos illyricę puluerem, cum hordei farina in mellificato coques, & uteris. Aliud. Guttā ammoniacam teres, & similiter cum farina hordei in aqua cocta adhibebis; hoc & alumen scissum, contusum, cum hordei farina faciet.

De furunculis. Cap. IX.

SULPHUR uiuum, tusum, cum resina terebinthina misces, & in lineo linteolo inductum imponis; aut uiam passam enucleatā ründis, & mediam quantitatem salis immiscet, & uteris. similiter ut. facilius erumpant, soli adipēs caprini, uel bubuli colati efficiunt: organum uero, myrrha, & sal simul: tusa, & commixta cum aqua, continuo ad maturitatem perducunt; & caricę contusę cum resina: deinde cum ijs adiutorijs adhibitis collectiones maturatę eruperint, ulceribus medebis his medicamentis, quę solennis edocuit consuetudo. Sin uero, magno phlegmate superueniente, solui nō poterit furunculus, uel paronida, sed callositate permanente, choeradas fecerit, ad duriores choeradas alia disputatione, pro sua difficultate, curā & operā adhibemus. Choeradas quas frequēter in collo, uel sub mento, uel sub ascellis nasci nouimus, hac cura uisitamur, quā durities indigestibiles soluere possimus: ut pręeuntibus catholicis adiutorijs, & capitis rheuma cōstringere, & corpus reliquum catartici purgare possint, sic easdē soluere ualeamus. Lenticulam coctam in aceto tritam, imponere perseueremus. Vtatur etiam caprificis in aqua decoctis, et contritis. Similiter etiam lupini in aceto cocti faciunt. Hoc si folia in aqua cocta, et trita, sicut cataplasma. Hoc asphodeli radices in uino tinctę. Scylla quoque, si contrita in uicē cataplasmatibus imponatur, quatuor diebus permanens continuis, duritias soluit. Et erui puluis, cum aceto, & cuminum conteritur, & similiter operatur. Immaturas uero, & in tarda duritie permanentes, per prasij uiridis folia, porcinos, aut bubulos adipēs, rutam æque uiridem, simul omnia contundi, & immisceri suadeo, ut in linteolo locis maturadis adhibeatur. Hoc etiam sordes de parietibus palęstrę collectę, in panno inductę faciunt. Hoc calcis flos, cerotano mixtus, facit. Hoc lapis molaris tufus & cribellatus, & resinę commixtus. Sic puluis ammoniaci, & manna thuris cum resina commixtus terebinthina, saniem maturius procurabitur. Sic sandaracę puluere cum adipibus miscentes adhibemus, aut calcem uiuam cum adipibus similiter. Quod si tibi durum emplastrum uisum fuerit, oleum competens misceamus, ut temperari bene possit. Sic puluis etiam puniciis, & asphodeli radices coctę, uel crudę, cum hordei pollinibus, ut cataplasma, adhibendę erunt; aut hyoscyami folia cum oxymelle, corrumpunt interea, uel putrefaciunt choeradas. Si allium tritum cum cataplasmate, seminibus mixtum coquas, & perseuerare permittas diebus quinque, hoc de expertis habemus. Aut si chamæleontis herbę radicibus tuis, puluerem locis asperferis; aut si betas, coctas cum oleo contritas imponis. Aliqui etiam unctionibus perseuerantes, choeradas frequēter fugant, sic, ut cineribus uitium aut fici cum oleo mixtis ungerent. Sed & ferri, uel zraminis purgamenta, contrita cum oleo. Ignoranti esca dabis lacertos uirides coctos, amputato caput & pedes. similiter & stercus bubulū, aut asini combustum, & cum oleo mixtum, commodius adhibetur. Et organi puluis contritus cum aceto idem facit. Hoc hyssopi, hoc thymi, uel absinthij, uel centaureę, uel abrotoni, chamæleę, aut singulę, aut certę coniunctę, & mixtę cum aceto, perficiunt. Iuuant sanē, ut superius memorauimus, ad hæc implenda, etiam totius corporis catholica beneficia. Nam & ciborum continentia, & potionis, exercitia quoque, & lauacrorum diligentia, & uomitus, uel purgationes, capillorum releuatio, sanguis de naribus prouocatus, hæc omnia choeradas duras, & difficiles, & in cura positas, adiuuerunt.

De oculorum causis. Cap. X.

OMNES partícula corporis, proprijs indigent curationibus. Oculi autem curationes multę, magnęque sunt. Si nanque cum primo leuiter, seu uapore, seu frigore, uel ceteris quibusuis originibus fuerint attentati, frequēter frigida pusilla, fomentatione nos conuenit obuiari. Si de frigore ergo obuenerint, uini mixti calida portione fouendi sunt. Quibus uero, commotionibus tam doloris, quam grauedinis, aliquando etiam uenę frontis inflatę, plenitudinem sanguinis attestabuntur, ijs phlebotomo subuenire conuenit: si tamen nulla aut ætatis, aut temporis, uel reliquarum causarum certa ratio prohibuerit. Si uenter contractus fuerit, clystere, seu purgatione prouocandus est. Iisdem uero oculis impatienter dolentibus, si non graui succus, palmarum indultus decoctione, aut oui recentis tenuis liquor tepidus infundatur. Similiter etiam lac muliebri infusum iuuat. Est etiam cataplasmatibus utilissimum adiutorium, quod de oui uittello, & mesiloti puluere, pane quoque infuso in aqua, & oleo roseo, simul mixto, adhibetur. Nos etiam croci, & opij quippiam coniungimus. Si uero collyrij experimento uti placet, cuius probationem habeas, in ipsis commotionibus, cum oui albore repidum infundendum esse suadeo: ita tamen, ut aut dilabanum, aut apto de libano, contra graues commotiones adhibeamus, pręmundatis interea oculis, molli, & tepido penicillo a pituitis ægrotis oculis inherenti, iuuatis ciborum continentia, & uini detractio. Sanē si capilli nimis onerosi fuerint, detondendi sunt: ut sub maiori beneficio, cucurbitarum adhibitione, & sanguinis detractio facilius liberentur. Aethias nanque perturbationes oculorum, etiam decoctio rosarum sola curat calida. Curat etiam gargarisma, cum per initia adhibetur. Organi in aceto decoctio. Si autem declinantibus quidam tumor circa interiorem oculorum angulum apparuerit, quem hypopium dicimus, hoc modo reprimendus erit. Post frigida frequēter infrigidetur: post uero pollinibus hordei ex

oxymelle costis cataplasmetur. Similiter etiam de lenticulę pollinibus fiat. Aeris flos tritus & infusus in lotio inuestis pueri per VII. dies, postquam siccauerit, ex eo puluere melle mixto imposito, competens beneficium præstat. Nam & caseus recens, tritus, & impositus, sæpe illum tumorem repressit; & absinthij herbę puluis, cum cerotario, hoc idem facit. Si ex moro pingui locum primo foueamus, etiam cyclaminū, cum uua passa commixtum, & cōtritum, curat. Et bulbi candidi cum melle contriti, similiter operantur. Sic raphanorum cortex cum uua passa medetur. Sic & rosę folia, cum felle taurino, uel porcino. Sic sic pingues, in moro costę sæpius profuerint. Ad repentinas autem sanguineas maculas oculis inherentes, flores, uel semen hyssopi herbę, in limpido linteolo colligabis, & in aqua calida infundes, & agitando exiccabis: qui succus uelut sanguineus fiet. Ex quo, infundendo, illas sanguineas maculas depurgamus. Postea thure masculo, & aphitā æquis ponderibus, carbonibus impositis, fumigandi sunt. Si uero cæsi aut percussi hanc maculam sanguineam cum dolore procurarint, ijs columbi matre subductū, repentinus sanguis infusus prodest quam maxime, si de penis mollioribus exprimatur: ubi liquor tenuis, tepidus infundendus est. Item si in eadem hora, ouium lana infusa superponatur. Idem puluis rosarum facit, uel semen earum cum aphitis, si in uino conteratur, & superimponatur. His etiam sulphuris uini amigium prodest, si idem fumus patētibus oculis hauriatur. Si oculi rheumatizauerint, quod grauissimum est radium oculorum, ijs uini & carniū paritas indicenda est. Ventris purgatio sequenter fiat, & postea frigida oculi foueantur, & æris flos in eadem posca resolutus, satis iuuat. Odores acres & putentes effugiant luccernarum, uel solis claritudines uitent. Fumi, uel pulueris declinent commotiones. In nocte uero aqua frigida, uel uino infusas superimpones fasciolas molles, ijsque continēdo oculos lauas. Si his adhibitis, rheuma cum dolore perseuerarit, phlebotomandi sunt. Ciborum, uel potus continentia custodienda erit. Si etenim omnibus rheumatizātibus satis prodest. Fronti uero peponum uiridia folia frequenter imponantur. Similiter & de rapi folijs. Nam & succus earum frequenter fronti illinitus & sambuci folia, & quoniorum, & portulacę similiter, & ex his cum aphitis & uini cataplasmate sæpe curati sunt. Et caseus recens cum apiorum folijs contritis impositus, sæpe oculos liberauit: & panis mundus uino infusus, & cum oleo roseo tritus, par beneficium præstat. Omnes species supradictę, generaliter quę oculis rheumatizātibus ordinatę sunt, cum uino & aphitis semper in cataplasmate profuerunt, & decoctiones earum: quibus sæpe oculi fomentandi sunt. Sanē si calidus fuerit rheumatismus, ex caulium folijs & aphitis, cum aqua cataplasmandi sunt. Sic de ocimo, sic de lę osuco, sic de agresti papauere, sic de cicuta succo, sic pulicaria, uel apiorum, uel strychni. Si uero siccitas spebrarum emerferit, linteolum mundum butyro infusum superimponito. Aliquibus uero humoribus conuenit procurare per lacrymas quas aut fumo, aut terrore, uel plagis extorquendas esse credimus. Sanē si in prima oculi tunica sanguinis ueluti caro apparuerit, quam Chemesin appellamus, hoc adiutorio curatur. Muscas quamplurimas, cum oui uitello cōterimus, & in linteolo mundo superimponimus. Licet etiam collyriis ijs causę competētibus sæpe curati sint. Derbiosos oculos, quos nos impetiginosos dicimus, asperit uitijs laborantes sic curare consueuimus. Allium accipimus, cuius interioribus melle contritis, oculis, postquā ex eo humore, uel succo rapuerit inungito: & ex eo pruritus & supradicta uiria depurgabis. Aliud. Grana tritici, in lamina ferri calida impones, & similiter ex succo qui manauerit, cum uino commixto, inungito. Aeris flos tritus cum melle, frō illitus, iuuat. Si pruritus maior partem occupauerit, ut etiam capillos amittant, has oportet ex oleo cedrino ungere, aut erugine, cum aphitinis, & melle contritis, aut aphodeli succo cum passo commixto. Nam & murtica decocta, & mixta cum oleo, aduersionem curat, & capillos reparat: & marium simus, & hircorum cornua, utraque combusta, cum melle, & eodem modo adhibita. Si pruritus simpliciter ex sole, uel puluere fuerit, aquę calidę fomenta sufficient, aut rosarum, aut rubi, aut lentis decoctio. Et rosa sicca, cū uino trito imponitur, & in nocte, oleo simplici loca tanguntur. Caligantes uero oculos hoc modo curamus, si uulneris aliquid non interfuerit præiudicium. Herbę paritaris succū, bitumine iudaico trito, æquis ponderibus miscemus, oculos inungentes. Et perdicum fel similiter facit. Et marthubij succus, cum felle taurino, & melle attico, æquis ponderibus commixtus ita curat. Et ursinum fel, cum aquę dupla mensura, similiter purgat. Si autem obscuritas hęc senectutis magis quam oculorum uirium fuerit, succum malignanti, melli attico æqua mensura commiscēs, & uteris uentilatum tamen magis operabitur: sanē si quamplurimum tempore uas sub diuo facias permanere. Hoc etiam scriptoribus & pictoribus sæpe profuit. Etiam uinum optimum uetus in nocte adhibitum, oculorum aciem reformauit. Aliud. In oleo mundo folia marthubij miscemus: & cū tempore illic macerauerint, proiectis folijs, ex solo oleo obscuritates expellimus. Hoc beluz fel mixtum melli facit. Hoc succus rutę cum melle similiter. Nam & chelidoniz succus, & feniculi lactuicę quoque agrestis, & mesiloti, cum æqua mensura, caligines & obscuritates, aliquando etiam suffusionem liberauerunt. Et taurinum fel mixtum melle, sic profuit. Nyctilopes uero, qui per noctē uident, & per diem obscuritatem patiuntur, sic curandi sunt. Accipies hirci iecur, & scarificabitur: humor uero qui ex fissuris emanauerit, oculis diebus duodecim infundendus est, & uitium corrigitur. Aut idipsum iecur in carbonibus ponitur: cumquē exsiccauerit, de eodem humore inungēdi sunt. Hoc item iecur coctum etiam inter cibos accipiunt comedendum. Et columbi sanguis infusus oculis, iuuat: & fimi asini recens succus proderit. Alboribus uero oculorum, nitrum bene tritum cum oleo infundendum est, aut anethi semen cum aqua tritum. Et succus cucumeris dulcis. Et raphanorum succus sic medetur: & ammoniaci cum aqua contrita. Nam & lactanti suo mater guttam ammoniaci masticando, & exhalando, alboris oculi, similiter & albas maculas filij, sanguinem femoris sui infundendo, sæpius permūdauit. Glau

cos uero oculos si denigrare uolueris, sic facies. Gallarum puluerem tenuissimum, cum aqua bene coctum milces & leporis fel, mixtum melle, glaucos oculos renouat in naturam. Si hordeoli in palpebris nascantur, hordei decoctione calida oculos fomentabis, & post cera liquefacta locum ranges. Et si muscarum capitibus locum confricas, hoc idem facit. Prætermisum fuerat item aliud: Erungium campanum unc. l. i. i. guttam ammoniaci unc. l. i. gummi unc. l. i. aqua pluuiali trita supradicta commiscebis, & teres, ut collyriū facias. Capillos uero contrarios sic non nasci facies: si his euulsis, loca sanguine cimicis tangas: & sanguisugarum combustarum cinis locis appositus, eodem modo curabit. Et chamæleontis herbe folia sicca trita in puluerem, & commixta sanguine ranarum uiridium, post euulsionem capillorum, pro collyrio inungimus; fel uulpis solum similiter. Staphylomata uero, hoc est, cum in modum unę crepantis, prioris tumor quidā erumpit, sic curabis. Alumen scissum ferri facies diligenter, & adipēs anserinos admiscebis, & uteris pro collyrio. Nam & melli commixti adipēs, supradicta staphylomata diligenter curant. Et soli adipēs bene colari sufficient.

De narium morbis. Cap. X I.

OZÆNIS, & polypis, uno eodemque modo cura est adhibenda. Cōstringendus in primis est dentis capillis rheumatismus. Post rasuram uero, emplastrum Diatheon, aut Barbarum. Et de cochleis simile est adiutorium. Accipias cochleas minutas, albas, nūducentas, tritas; admiscebis myrrhæ, & thus masculi uncias singulas, pro cataplasmate, raso capiti diebus nouem permanfurum. Naribus uero specialiter sic medeberis. Succum nepitæ, quam Græci calaminthen uocant, frequenter infunde, aut eiusdem siccæ & contusæ puluerem, per canalem exufflato: aut batrachii hæ succum, cum melle commixtū. Et succus rosarum, contusus usque ad pinguedinem, item prodest. Sic irios illyricæ, & sandaracæ pulueres ex æquo cum melle commixtos adhibebis. Polypis itaque eminētibus, æris florē, & synopidem ex æquo combures, & ex eo puluere sanabis loca. Et cornu ceruini combusti puluis, cum sandaracā similiter spargendus est. Sic bryoniæ herbæ radices combustæ; sic auripigmenti puluis cum melle. Ego uero sic e naribus polypos cecidisse probaui. Puluere ex calcite, admixto æris flore, æqua ponderatione confecto, & locis adhibito per cannulam, sicut supra memorauimus. Foetori uero narium succum hederæ frequenter infundas, & dracontæ succum cum melle similiter.

De fluxu sanguinis narium. Cap. X I I.

PRIMUM infrato melle, in extremo baculo, molli lana obuoluto, glebas sanguinis e naribus purgare nos conuenit, post lana idēdem obrutando procludere. Aliud. Linteolo combusto, & infuso in aceto, aut in succo polygoni herbæ, aut cymæ, uel porri sectiui similiter. Si perseverauerit, sine mora phlebotomandus erit; & fimi asini combusti puluere, cum oleo roseo mixto, collyria facta supponimus. Et de filiquæ mollibus folijs contusis facta similiter collyria profuerunt. Sic peritula, sic strychni, sic terra alexandrinæ cum succis supradictis puluis sæpe profuit. Caput eorum f. l. lini feminis frigido fouendum est. Circa frōtem uero, gypsum cum ouo, uel luto figulorum similiter mixtum, inlinire debemus. Sic æris flos, sic pini cortex combustus, sic fimus asini, ut supra significatum est. Si uero istis adhibitis adhuc perseverauerit fluxus, ignita cucurbita, si ex dextra nare manauerit, dextro lateri admouenda est: si ex sinistra, sinistro lateri: sin uero de utrisque, & utrisque igneas cucurbitas applicabo. Aliqui uero fasciis lineis naturam, & testes eorum alligando mollius constrinxerunt: si in foeminis femoralia.

De labijs crepitantibus. Cap. X I I I.

GALLAE tunfæ puluerem, resinæ terebinthinæ limpidæ admiscebis, & ut emplastro uteris, aut hyfopoceroto, cum melle, aut adipibus caprarum colatis tantummodo. Aliud. Sulphur uiuum, myrrham, & thus masculum, ex æquo, succo herbæ paritaræ commiscebis: & sic trociscos conficies, quos cum aqua resoluas, & linies. Aliud. Mel terebinthinum, adipem anserinum, oleum roseum, hæc omnia ex æquo mixta uteris. Si odor insuauis oris fuerit, posca frigida os frequenter colluere oportet, & cimoliæ pulueribus, cum salibus tostis, simul mixtis, & tufis, dentes & uicina loca fricare. Aliud. Hordeum & sal, in linteolo collectū, comburis æquis ponderibus, & teris, & cum melle commiscebis, & mundas. Siligo, cum illyricæ puluere similiter commixta operabitur. Aliquoties etiam cum uino melius commiscetur. Masticare autem frequentius his conueniet aut arboris pini folia molliora, aut anethum, aut glycyrrhizan, aut herbam quę Sonchora appellatur. Sed & cornu ceruini combusti puluis, & foetorem oris, & dentium semper compefcuit imbecillitatem.

De dentium curationibus. Cap. X I I I I.

DOLORES dentium finis. Siccatus, & tritus, pro dentifricio, sine dilatione cōpescit. Mixtus quoque cum aceto, ori diutius remanendo, æquē profuit. Et betarum succus tepidus similiter profuit. Et decoctio ex cucumeris agrestis radice in uino, similiter. Et nitrum cum oleo tritum, & decoctio rosarum in uino, uel rubi in aceto, & cypressorum fructus, tedæ pingues in uino decoctæ, sic etiam glycyrrhinum in uino decoctio, sine cunctatione dentibus relaxatis atque dolentibus profuerunt. Si omnes interea doluerint,

Ad dentium dolorem, doluerint, cedriam in ore teneat continuo mitigantur. Sin uero mala dolent, herbe paritarie radice succus, in balneo ore continetur, & statim medetur. aut si eiusdem radix coquitur. Similiter & pyrethri radix profuit masticata continuo. Item alcyonij radix, in carbonibus posita, dentes dolentes fumigando compescit. Physicum. Canis dens combustus, similiter profuit. Et si aris florem in oleo tritum, dentibus admoueat; & lac alinæ recens ac tepidum, constringit & mitigat. Similiter quibus putres cauernæ obuenerint, Melanthium elixum in aceto commixtum, & si solo puluere aluminis scissi easdem cauernas impleas. Hoc & gallarum puluis cum melle commixtus facit. Si uero percussus quidem dens, uel mala fuerit, resolutum coralli puluerem apponito, & continuo constringitur. Si longo uitio laborantes, spontaneos cadere uolueris, pyrethri, uel artemisæ puluerem, cum aceto commiscebis, & dente circumlinjes, & spontanei exilient. Aut succo tithymali cauernam adimple, & spontanei cadent. Physici. Lacerta solanæ, & coccum gnidium tustum in galbano similiter operatur. Lacertum solum exsiccet, & siccat, & eius puluere dentem, uel cauernam attinge, & continuo cadet. Post scarificationem coccus gnidius tustus, cum galbano, similiter operatur. Et apophlegmatismum hoc profuit. Si staphysagria ad masticandum detur, aut si cum pulegio misceatur, aut cera cum gallarum puluere confusa, aut salicis, uel myrti folia uiridia in aceto coquantur, & in ore contineantur. Postea uero si nausea consequatur, oleum tepidum roseum in ore contineant, & origanum in oleo coque, & ex hoc dentes calefacito. Et sacculus calidus impositus de salibus, uel milio, forinsecus adhibitus, prodest. Omnia hæc calida, secundum Hippocratis præceptum, dentibus profuerunt. Nam & dentifricia hæc, & saluti & ornatui, & semper uitiosis dentibus profuere. Salibus melle commixtis, & combustis, & contritis, quippiam myrrhæ miscendum est, & utimur, ut moris est. Hoc & marathri puluis solus facit. Nam & lanæ succidæ combustæ pulueri, tertiam partem salium combustorum commiscemus, & utimur similiter. Post uero, uinum in quo inim Illyricam decoxeris, os collue re conueniet. & Tithymalus in uino decoctus, multum proderit. Si ex hoc bis per mensem tepido collueris dentes, facies eos candidos, & semper sine uitio permanere. Gingiuas uero cum gargarismate ex aceto tepido, in quo herbe mercurialis radices decoxeris, sine mora mitigabis.

De uitij faucium, uel oris. Cap. X V.

PER iniria cum commoueri aliquid in faucibus senseris, generaliter omnibus ex decoctione ficiturum rosarum, uel dactylorum elixorum, aut lentis, aut cāabri, uel ceterarum stypticarum mediocriter specierum, conuenit tepidum gargarisma: cui etiam mellis quippiam despumati commiscemus. Nam & lac ouillum, uel caprinum, cum melle tepidum iuuat. Similiter rhodomel, similiter diamoron. Quod sic conficere consueuimus, ut ad duas partes succi mororum, una mellis adhibeatur. Sic etiam aliquid ex succo rubi & melle, uel utriusque diamoron confecerunt. Alij etiam de citoniorum succo eadem asserunt. Item de malo granato, sed styptico. Alij uero eadem mala quassantes, in passo coegerunt, quæ omnibus querelis faucium prodesse putant. Hæc omnia licet specie dissimilia esse uideantur, uirtus tamen una omnibus, idemque beneficium. Succos ptisanæ accipiant, & cibos, qui magis sorberi, quam masticari uideantur. Si his adhibitis, faucibus adhuc perseuerauerit molestia, sic ut ulcerare partes attentet, quæ etiam synanchen mineur: tunc nos fortioribus oportet occurrere cataplasmatibus, partibus è foris uel gutturi adhibitis, hordei, uel lini feminibus paragoricis, mixto aliquanto nitro, uel salibus: quo Hippocratis nostri præceptis custoditis, sic curando, ab interioribus euocare sollicitudines ualeamus. Præstant interea cataplasmatibus beneficio, etiam fomenta calastica ex similibus supra dictis, & sinapi confecta. Vlcera uero si faucibus apparuerit, sic à nobis sollicitè curanda erit. Fimus canum albus, citus cum melle, & tumorem reprimat, & ulcera delicatè permundat. Et hirundinum combustarum cinis, cum melle similiter proderit. Aliud. Omnibus ulceribus, & tumentibus, & sordidis, utilissimum multorum ueterum auctoritate probatur hoc, quod conficitur sic. Thus masculum, in Illyricam, herbam & radices aristolochiæ; omnia æquis ponderibus rudentur, & melli miscentur, uel melleficato, & sine molestia eduntur aliquoties pinna molli lini edo, aliquoties per gargarisma. Item, Athiræ, quæ omnibus nota est irios illyricæ, sandarachæ, cyperii uncias binas, aluminis scissi, myrrhæ, croci, crocomagmatis semuncias singulas, in uno omnia tunsa, & cribellata adhibebis: & cum necessitas coegerit, aut cum puluere, aut cum melle commisceas, & uteris liniendo. Nam & Musæ trosciscus, ubique diffamatus, cum succo rois syriaci, & melle, uel melleficato adhibendus est. Si uero uua dimissior fuerit, & faucibus indignatis rheumatizauerit, gargarismate ex speciebus stypticis confecto tepido mouebis, ut ex aqua uel melleficato gargarizet, ubi dactyli decocti fuerint, aut ros Syria cum, aut uirtutibus turionibus mollissimis, aut forba, aut mespila, uel certè galgæ, aut similia uirtutibus cetera. Raucos uero sic corriges. Tragacanthum mundum sub lingua teneant: & quod emaduerit, glutiant. oua uero recentia in costa frequenter accipiant, aut hac theriaca utantur, crocum, thus masculum, myrrham, & tragacanthum ex quo cum passo commiscantur, & teruntur, ut pro eligmatio adhibeantur. ego etiā succum glycyrrhiæ semper admiscui. In tumore uero positæ, cum amplius rheumatizauerint, sales triti cum melle multum profunt adhibiti, & dactylorum ossa: & si nubes uirides immaturas comburas, & ex his puluerem facias, & admisceas. Similiter aut modicum mellis, aut melleficatum, & alumen humidum, in uase fictili coquas. Sic de puluere radicum caulium combustarum. Sic etiam de anetho, & postea puluere facto, uam sicca bis: & continuo desiccata, si inflatum os fuerit, quod afatham appellamus, nimia uisione accedente, rosam siccam cum melle tritam, locis impone. & portulacam in melle similiter infundimus, & manducandam damus:

Sed & Gal. aphthas grandæulas, & blis. & 7.

mus: & olinz folia uiridia in uino decocta, ex quo tepido os frequenter colluendum est. Nam & auellana cum despumato melle contrita, pro electuario semper adhibenda est, ut oris uisio purgetur.

De papulis minutis ubique nascentibus.

Cap. XVI.

QVIBVS in facie quammaximè, ueluti leuissimus tumor repente innascitur, humorem aliquando pinguem, aliquando aquatorem mittens, pruritus & ulcerationes procuramus oxymelle, ex aceto aceti, & melle, & quis ponderibus confecto, & frequenti confractione curantur. Item amygdala amara cum aceto aceti contrita, similiter operantur. Nam & troscisci ex hoc confecti, & in aceto soluti, medentur: post uero etiam saponato lauare linimenta conueniet. Si uero ueluti exanthemata, quas scabies dicimus, in facie, uel genis, ex humorum acredine, uel plenitudine apparuerint, hederæ agrestis folia ex melle cōtrita, pro linimento adhibenda erunt: aut certè allium cum salibus tritum, mixto oleo roseo similiter adhibetur. Sic galbanum cum oleo resolutum. Sic fæces uini, & iris Illyrica, utraque cōtusa, & cum oleo roseo commixta medebuntur. Et cēdria cum resina, & cera, & quæ ponderatione commixta; & adipēs anserini similiter cum resina, & oleo, & melle operantur. Nitrum quoque cum porcinis adipibus. Nam & myrrha, cum tripla ponderatione albi mellis mixta, continuò id præstat. Et spuma argenti, cum folijs rutæ uiridibus, & aceto mixta, papulas suprascriptas & scabies totius faciei percurat. Si uero tumor permanserit posturationem, sales fossiles triti cum aceto compescunt; aut taurinum gluten cum synopide, & aceto. Si impetigo ex hoc faciem, uel cetera membra occupauerit, per initia tritum in lamina candentis ferri superimponito, & succo qui ex hoc emanauerit adhuc tepido, penafrequētius perungito. Et myrrha similiter operatur. Frequentius & gutta ammoniacæ, cum aceto contrita perungenda est. Sic succus menthæ. Sic thus masculum. Sic apium contritum cum salibus & aceto. Sic gluten taurinum in aceto resolutum: cui manna & thus admiscendum est, & puluis similiter adhibendus. Aliud. Sulphur uiuum, cum aceto & pice commisce, & utere. Si papulæ plures innatæ sint, aceto tepido primò foueto: postea nitro cum aqua coluito. Item de supradictis linimentis. Si autem longi temporis fuerint, aut acres, tunc plumbi rasuram, sulphur uiuum, gluten taurinum in aceto uiscido coctum, & solum inungamus. Aliud. Lilio agrestis, la-crymarum loca perunge; aut lapathij radices corticem cum aceto conterimus, & cataplasma adhibemus: antè tamen nitri puluere loca defricando. Aliud. Maluæ agrestis semen immaturum colliges, & ex hoc succum elicies; quo cum frequenter linieris, & antiquatas, & agrestes percurabis. Aliqui ex diuersis suprascriptis componētes trosciscos, ad maiores curas hoc modo composuere. Alcyonij combusti semuncia, chamæleontis nigre radices uncia I. asphodeli radices uncia I. sulphuris uiui, thuris masculi, pyrethri, afro-nitri ana semuncie singulæ: glutinis uncia I. omnia cum aceto coquantur, & operantur. Cum uero mundatæ fuerint & percuratæ, tunc asini adipibus loca perunge, ita maculis colorem restituēs naturalem. Hec omnia quò fieri possit, catholicis primò purgationibus releuandi sunt.

De uisione calida, uel ignis.

Cap. XVII.

VISIONES antequam uesticas erigant, murum oliuarum frequenter infunde, aut easdem oliuas salas contritas imponito. Et lactucæ tritæ cum salibus, pro cataplasmate impositæ, continuò curant. Et fel taurinum cum aqua plurima infunditur. Aliud. Alumine scisso cum aceto contrito omnes uisiones. ungo. Nam & thus masculum cum aqua tritum similiter operatur: & sales cum oleo roseo triti inliniuntur, & hederæ elixæ contritæ imponuntur: & pollines tritici, cum ouis crudis mixtis superimponuntur. Sic etiam hederæ agrestis folia in uino cocta curant. Si uero post easdem uisiones uesticæ inquietarint, myrrham cum uino tere, & imponito: aut calcis uiuæ puluerem cum cerotario tempera, & in linteolo linimentum impone. Si uero etiam ulcera fecerint, porros terito, & locis impone: aut maluarum folia elixæ, & cum oleo superintritæ impones: aut lenticulæ puluerem, cum melle commixtum induces. Sic & columborum stercora combures, & in linteolo lini cum oleo conteres; quibus omnes ex uisionibus uenientes procurabimus. Sic etiam stercus ouium curat incensa similiter cum cerotario mixtū, & canis ossa capitis incensa aspersa operatur. Sic cochlearum incensarum cinis, liquamine suillo post uisionem frequenter loca uisita lauare conueniet, & cancrorum fluminalium incensarum cinis cum oleo curat. Sic & tostæ cucurbitæ cinis cum oleo adhibetur. Et lenticulæ semicoctæ ex aqua bene contritæ cataplasma competentius adhibetur.

De carbunculis. Cap. XVIII.

GENERALITER his omnibus per initia phlebotomo subueniendum est. Specialiter uero locis superimponendum est cataplasma de arnoglossa cum pane mundo, & lenticula cocta. Vlceribus uero aciora & calidiora medicamenta ordinamus: ut Andronici trosciscos, aut Polybii: qui sollicitis cum dulci uino, aut pingui infusus, & in mortario confusus, sub cataplasmate ulceri imponatur. Aliqui uero è nobis probatis adiutoriis carbunculos curauerunt mollium salsamentorum combustorum cinis adhibitis iuuat. Rutæ uiridis folia cum aceto, erui puluis cum uino tritus: stercus ouium tritum, ulceri imponitur; ficus sicce & in uino coctæ & cōtrite imponuntur, ut ex altitudine euolare possint; nuces uetustæ contritæ imponuntur. Hec adhibita bene nouimus operata. Si uero his adhibitis, ulceris radix occupaue-

Papule faciei ab humore pingui aut aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Exanthemata, seu scabies in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Impetigo, seu scabies in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia impetigo faciei, seu scabies in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia papulæ acies, seu scabies in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

Alia uisiones calidæ, seu ignis in aut genis, & humore aquatili sunt & aliter. Curantur frequenter fistione: & saponato lauare linimenta.

rit altiora, cauteret admoventi eidem loco: si nullum obstitit præiudicium, ut loca uitalia periclitetur, quæ sunt in musculis, aut nervis, neque ignis poterunt sustinere tormenta. Qua de re frigido cauteret utimur, quod frequenter approbauimus. Aquam, in qua calx uiuæ puluerem extinguimus, miscemus seculæ, nitro, & saponi, æqua ponderatione: & ex eo linimus loca, quæ comburi placet. Super cataplasmata, loca tegenda sunt, quandiu sordes eius ulceris cadant, quæ altius inhærebant, & alia, quæ ex hoc ueluti da uos possunt euellere, ut uuæ passæ, enucleatæ, solæ contritæ. Aut ficus sicca in uino decoctæ, & trita. Sic lupini in uino similiter cocti & purgati teruntur, & imponuntur. Sic stercora columbarum cum melle contrita. Sic mentha cum aqua contrita. Sic nitrum cum ruta uiridi, & aceto tritum. Sic sapo, cum uua passa, & porcinis adipibus, admixta etiam pice liquida, omnibus sub æqua mensura temperatis, & adhibitis, ulcerum semper loca periclitantia liberata sunt.

De uulneribus uarijs casibus infixa. Cap. XLX.

SI TELO, seu morfu canum, aliarum uel ferarum, seu ex quolibet casu, nervo uulnerato, quos neuro trochos appellamus, impactus uulneribus omnibus, generaliter continuo hoc adhibendum erit, quod glutinare & curare ualeat membra uulnerata. Myrrhæ puluerem aspergo, quem permanere faciam sine aliquo humore: continuo etenim glutinat, & colligit. Et rabus elixa & trita, hoc facit. Hoc iris illyrica tunsa, & melli mixta, atque in panno lineo imposita. Et aristolochiæ puluis cum aqua mixtus hoc idem facit. Idemque ossa sepius colligabit. Et omphacium tritum cum uino sic curat, per initia adhibendum. Sic puluis thuris masculi. Et myrrhæ puluis, cum uino & melle coctus, & temperatus, continuo medetur. Sanè sub his adiutorijs, quæ semper futuris obstant feruoribus, utilis est sub uno schemate etiam patientia uulnerati. A lauacri uero, à foci, à solis calore, uel aeris frigore, à clamore, uinolentia, usu uenereo, iracundia custodiantur: ne quod iam aut collectum aut glutinatum est, his occasionibus soluat. Hæc etiam prætermittere non debui, amice, per omne corpus recentibus uulneribus frequenti approbatione laudata. Alij igitur combusti puluerem uulneri asperge. Sic etiam scyllam tritam imponi & sub utrisque adiutorijs quatuor continuis diebus penitus maneat iniquitatum, quo continuo perire non possit. Nam & myrrhæ, & lanarum succidarum combustarum cinis uulneri aspersus, similiter operabitur. Item aliud. Maligranati folia, cum melle trita, mixto uino, imposito, de superque linteolum infusum resina & terebinthina superaddito. Item lanis operiantur, uino & oleo diligenter infusis. Item aliud. Fabæ syriacæ radicem siccatundis, cribellas, & loca eius puluere aspergis. Item aliud. Oliuæ amurcam coques primum igne fortiori ad primam mundationem, secundo, & tertio molli uapore, quo pinguescere possit. Cum uero coagulauerit, reponis in uas mundum: & cum frigescente coeperit, linteola infusa loco percusso opponimus. Operabitur uero fortius medicamentum, si gallarum pulueres admisceamus. Aliqui eandem amurcam cum eodem puluere coquunt, & sulphuris uiui, & origani puluerem æqua mensura uulneri aspergunt. Qui uero ferro in altum uulnus suscipiunt, sel bouis unciarum II. & ficus nigra lacryma un. II. & adeps capri nus un. III. in uinum commiscetur, & temperatur, & hoc medicamento curatur. Aliud. Baccas laniatas cum resina tunfas, locis imponimus. Glutinantia uero adiutoria hæc sunt. Resinæ Syriæ puluis, capilli uero, æqua ponderatione cum thure masculo tunsi, & cribellati. sed cum puluerem aspergere coeperis, præungendum est uulnus picæ solutione. Particulam utris uinarij, & resinam ex æquo comburis, & utris puluere collecto, qui & sanguinis fluxus ualeat prohibere. Et mandragoræ folia trita cum uino, & aqua cataplasma bimus. Aliud. Maligranati dulcis grana cocta in uino diligenter terimus, & in uicem cataplasmatismatis adhibemus adiutorium approbatum. Sed & betarum surculos, exceptis folijs, elixi, & tritos imponimus similiter. Si canis morsus quis fuerit uulneratus, continuo spongia, aqua frigida infusa, aut oxymellice imponenda est, quæ frequenter ex hinc irriganda erit. Primum uero eiusdem uulnerati lotio uulnus, secundum phycos, fomentandum est. Et porri cum melle triti, & impositi, eodem modo medentur. Et lacryma arboris ficus continuo si ungas, hoc idem præstas. Et spongiæ rudis combustæ cinis cum liquamine mixtus, optimum beneficium facit. Sales triti, acin linteolo ligati, aceto infunduntur, & ex hoc uulnus tædiu apoximandum est, uel infundendum, donec sanguinem eliciat: Postea uero cum sanari coeperit, et uum tritum cum melle uulneri impone, aut lentis puluerem cum melle despumato similiter. Quæ uero in seniore fuerint, spuma argenti cum melle trita, & imposita, continuo mitigat: præfomentanda sunt interea uulnera aqua gelida. Etiam qui humanos morsus patiuntur, adiutorijs supradictis percurantur. Si uero his accidentibus uulneribus, etiam nervus fuerit uulneratus, in quo graue periculum frequenter euenit, cuiusque patetactio prius custodienda est, ad humoris ex uulnere ueniens digestionem: quo ex hoc impetius & dolores auerti possint. Frequenter etiam ferro hanc anastomiam procurare debemus. Conuenit interea præ omnibus, etiam his phlebotomum adhibere: conuenit etiam eos uentris purgatione iuuare. Aquarum sanè calidarum fomenta fugienda sunt, quæ putredines & indignationes sepe procurant: sed oleo sabinesi, uel dulci, tepido, aut certe uetusto, frequenter uulnera ipsa fouenda sunt. Viride uero oleum uel gremiale penitus uitandum est. Virimur tamen post fomentationem olei calidi supradicti, sola terebinthina resina, linteolis infusis & apposis: utilius, si terebinthinæ etiam euforbij, quippiam pulueris admisceamus. Forminis uero, uel pueris delatiora corpora habentibus, etiam solius terebinthinæ sufficit beneficium. Cæteris uero, ut superius comprehendimus, terebinthina cum euphorbio, & oleo miscenda est: addenda & cera propolis, addendum sagapenum, addendum laser, addenda & opopanax: quibus coniunctis beneficium

esperia.

Cataplasmata ad virores velicis
ex melle, aceto, oleo rosae, fabae p.

† In palato vultus ore, tumorem
proximum curat, & digerit.

*Pauis & probetis reme-
dij notandum.* *Frod*

Cap. X. X.

Ulcerae cauae, humoru a
plenitudo, istus.
Cirrhia sunt, impetria medico
aut adhiberi iropio.

Ad ulcera recentia,
Mal, resina turbinaria, sulfur,
cera, fuma argenti.

Ad locum aquaria,
una etiam, refina, oleum, cera,
et.

apud phrygijs, et purgamenta,

pulvis purgantium, erugo, aloë,
pulvis raminis, lepis, salustis, etc.

Adulcora scirginea,
- *artificialis*, maly, folia continua, conana
in sudore, oleo, maly, postea, (a

Ulcera colica insula ad curandum
& remedia.
flos zinis, tiffymali lacryma, u.

Ad ulcera malida,
al, mel, ficus, amygdala amara,
et pulvis, olivaceum folia, vin.

Cap. X X I.

*Ignis sacri diversa curandi
Et omnibus partibus communis
excepto capite & facie, ubi*

Am. ignis, serpens, ens, lingua
i. partes, pulsât, & prius sede r
inferna. unctis. animalia

Erysipelas si exteriora appetat

* *Psychosomia intra trid-*
uagium, puerilis, media, si po-
ssit, psychosom. per. ant. frequentis

Caerentia aetate, ut form
calidis, humidis, frigidi
Tuant lania iumenta, deo

ὁ ὑποτίσαν ἰσχυρία.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

THEODORIPRISCIANI AD

tia in aceto, cum oleo, & bulborum combustorum cinis cum melle. Oleum cyprinum cum melle mixtum, & cerussa cum aceto, & uasorum fictilium puluis cum aceto, & thus masculum cum cerussa: omni-
bus, aut singulis commixtis, aliquibus mixto pane: aliquibus ex aqua coctis, & contritis. Nam & folia
in uino cocta, & contrita, imposita sæpe profuerunt igni sacro. Si etiam post hæc ignis ille sacer adhuc in-
fanerit, & ruboris sollicitudo perseverauerit, iam cataplasmatibus de seminibus cum melle coctis immi-
nendum erit. Adhibeo etiam locis scarificatione: adhibeo fomenta aptiora, & ex eisdem desuper cata-
plasmatis frequenter requiro beneficiū. Periculosum est etenim, causa permanente, adiutoria uariare.

De apum percussibus, uel scorpionum, cæterorumq; serpentum.

Cap. XXXI.

A P V M percussus, maluarum folia imposita continuo curant: & issami folia, uel ipsum tritum, &
appositum. Et lauri folia molliora trita cum uino, potui data, sæpe curauerunt. Scorpionum uero
percussus, sales frixi, & cum oleo contriti, loco appositi. & cinis cum aceto mixtus, & impositus, simili-
ter & allium cum oleo tritum, & origanum cum aceto coctum, calido faccello, continuo medetur. Et por-
rum tritum impositum, & sardinia trita, & folia oliuæ trita cum salibus, & imposita, & scylla cruda trita
imponitur, & statim curat. Sed & his semper potionibus liberantur. Aristolochiam rotundam, gentia-
nam, myrrham trogloditen, baccas lauri, omnia tinsa ex æquo, & cribellata: aut puluerem, cum uino, &
calida identidem in tempore dabimus. Hoc etiam contra cæteros serpentes usi sumus. Aliud: Piperis
& papaueris semiunciam unam tundis, & cribellas: ex his cochleare cum aceto dabitur; & bacca lauri cum
folijs rutæ uiridibus tinsa, cum uino, aut aceto semper datur: & irios illyricæ puluis cum uino calido si-
militer. Quin & fraxini folia cum uino trita, bibenti dantur.

De turpibus receptis, & latentibus.

Cap. XXXII.

TITHYMALI mai nollēs & uirides ex acumine turiones tolles, & hos calidis cineribus subij-
cies: & postq; combusti fuerint, projectis sordibus in mortariolo contundis, & eorum pulueri aphitam fi-
militer immittis: & uino commixta, patefacto orificio, uulneri imponis, & continuo telum, aut aliud quod
diu latuerit, excludetur. Aliud. Aristolochiæ puluis patefacto uulneri similiter imponendus est, & uelo-
cius exiliet. Sic etiam de dictamni folijs, uel radicibus contusis, uelocius fieri consuevit, secundum uete-
rum testimonia. Et eufesami semen contusum unā cum calchantio, uulneri appositum, similiter opera-
tur. Et lacerti caput contusum, & impositum, secundum physicos, similiter facit. Si uero in fauces ali-
quid transuerit, aquam & oleum calidum contineant in ore, & spontaneum exibat sine mora. Sunt & a-
lia physicorum beneficijs publicata, sed suo loco & tempore conscribentur.

De testium indignatione.

Cap. XXXIII.

FERVORES testium, uel indignationes, cuminum cum melle & oleo tritum, et appositum curat.
Et semen lini frictum, & cum uino similiter uice cataplasmatidis temperata. Sic faba in uino cocta, aut in
melle, cum melle trita, operatur. Sic ex coriandro uiridi cum faba in aqua cocta, & simul trito cum
melle cataplasma bimus. Sic etiam de hyoscyami folijs. Similiter & uuam passam enucleatam, ex æquo
cum nitro adhibemus. Et nasturtij puluerem cum lini semine ex æquo cataplasma bimus. Sic rutæ, & lau-
ri folia uiridia in uino cocta, cum aphitis profuerunt. Et cymini puluerem mixto butyro, & resina, & pam-
pinos molles tritos cum aphitis adhibemus.

De ueretri, hoc est de natura uicis.

Cap. XXXIV.

VERETRI dolores, fel taurinum cum nitro contritum curat: & butyrum cum terebinthina ex
æquo mixtum. Similiter ex lini seminis puluere, & myrrhæ ex æquo, resina quippiam superadditum; in
aqua coctum cataplasma imposuimus. Quibus uero tumuerit, pampinorum folia molliora triginta, thuris
& cerusæ semiuncijs singulis commixta, pro cataplasmate imponimus, ante tamen ex aqua marina frigida
fomentabis. Nam & testes tumentes cimolia trita frequenter cum aqua perunges: post uero myrti sicca
pulueres, & myrrhæ similiter aspergendi sunt. Vulneribus uero in eodem cole, lepidos cyprinæ pulue-
rem satis confidenter aspergo. Et aphronitri solius triti puluis eodē modo operatur. Et alumen scissum
contritum similiter & myrrha cum passo trita. Si ueluti carbunculus innatus fuerit, scium cum melle tri-
tum suppono: frequenter per diem inspergo mel tepidum. Fomentandum est interea ex aqua de semini-
bus, quæ in aqua coqui debent, aut myrti uiridis, aut lentisci folijs, aut rubi, aut oliuæ, aut rosæ sicca:
cuius puluis si post fomentum aspergatur, continuo operabitur. Sic etiam de herbarum supradictarum
cataplasmate innuendum est, cum melle commixto. Nam & uini & mellis species prætermittenda non
est. Continencia uero ciborum, & uentris purgatio frequenter prouideri debet. Elaterij quoque pul-
uere tangendum erit. Aliqui minimorum piscium capita trita imposuerunt.

De heridofo.

De herniosis. Cap. XXVI.

HERNIA S uero infantum frequentius emergentes sic curabimus. Resinā pityinam siccam, nitru, cyminu, ex æquo cum melle miscemus, & sub emplastri temperamento imponimus, superaddita ligatura, quæ contineat medicamentum. Et uiam passam pingue purgantes, in uncijis VI. nitri unc. I. cymini unc. I. cum melle contriuimus, & ita usi sumus. Vitandi cursus, & saltus, & auster, uentris quoque conatus, & ciborum nimia præsumptio. Aliud probatissimum. Caduci malogranati unc. I. gallarū semiuncta, asphodeli radices unc. I. narcissi radices unc. I. hæc omnia in uino coquenda, & tundenda, & malaxata in primo adhibenda sunt. Hoc herniarum perseverantiam intus sub ligatura, etiam ueterum, percurabit: & hydrocelas, & sarcocelas, & enterocelas similiter. Item cinopoli emplastri expono maximum & probatissimum remedium. Spumæ argenti unc. V. I. aceti unc. X. V. III. olei & opij, spuma argenti pleniter comburis, & supradicto aceto restinguis, & teris diligenter. Omnia simul mixta coques, agitabis spatula holofidera, & ita ut diacylō coques, ac in linteolo adhibendum diebus continuis V. imponis. Hoc hydrocelas, & similes collectiones sine dilatione curabit. Carnes cochlearum teris, & his myrrhæ puluerē mices, & in linteolo inductum impones sub fascia, ut facilius reprimatur: & passum cum acacia tritum, & aqua similiter temperatum supponendum est. Item etiā cochleas ex arbore lauro collectas comburimus, & tritas imponimus, ut umbilicum in naturam propriam reuocemus.

De diuersis uitiis in ano nascentibus, uel syringis, hoc est fistulis.

Cap. XXVII.

DIFFICILES in his locis causæ enire consueuerunt, pro accidentium qualitate. Est enim loci natura delicatior, & qui ad omnes acerbos quammaximè contactus, faciliè commouetur. Nascitur ergo in hoc sæpissime indignatio, uel feruor: fit rhagadium, fit cōdyloma, erumpunt hæmorrhoides, nascuntur exocadia, fiunt & syringæ, frequenter etiam intestinorum effusio, & cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo. Quando ergo indignatio uel feruor locum attentauerit, pingues dactyli in passio uel mellisrato infusi teruntur, superaddito quoque de oleo roseo, e quibus factum cataplasma tepidum adhibemus. superimposita tamen ligatura, quæ adiutorium continere debet. Nam etiam de musteo similiter faciendum est, sed quod piper non habuerit. Sic etiam de bulbis albis, cum melle contritis, loca commota frequenter curata sunt. Et lycium inde contritum cum cerotario, & ex oleo roseo temperatum adhibuimus, & sæpissime sulphuris uiui quippiam triti superadijicimus. Est & hoc genus adiutorij utilissimum. Spuma argenti, & cerussa, uncijis singulis: thus masculum, & crocum in semuncijs singulis, cum uino & oleo tritum, & commixtum adhibendum est. & oui uitellum coctum, tritum cum melle & oleo, commixtumque, loca indignantia satis iuuat. Sic butyrum cum medulla ceruina, & sepum ceruinum, & thus masculum, omnibus ex æquo tritis, immixtis oleo & uino, similiter temperatis, curati sunt frequenter. Huic medicamento etiam lycium indicum admiscendum est. Si rhagadium factum fuerit, hoc medicamento uti nos conueniet. Oleum roseum solum, tritum in plumbeo uase, & ex pistillo simili, usque in pinguedinem, & caricarum pinguium combustarum cinis, uino tepido prælauatus, ac impositus, prodest. Sic rosæ flos, & pompholyx simul trita, similiter spargitur. Et molybdæna cum folijs rutæ uiridibus teritur, & cum oleo myrteo pingui temperatur, & similiter iuuat. Sic hyoscyami folia, sic corij puluis aspersus similiter loca curauit. Sic etiam linteorum combustorum cinis cum amylo, ex æquo succo foliorum oliuæ temperatur, ut subpingue fiat linimentum. Quibus condylomata fiunt, uel exocadia, hoc adhibendum est medicamentum. Ceræ libra una, picis unc. I. I. I. medullæ unc. II. adipis taurini unc. I. I. I. mellis unc. I. I. I. uini unc. I. I. I. guttæ ammoniacæ unc. I. thuris masculi unc. I. I. myrrhæ unc. V. sicca cum uino teruntur, & solutis calentibus commiscuntur. Aliud. Calcis uiuæ unc. I. I. I. nitri unc. I. I. utraque teruntur, & cum aruina miscuntur, & ex eo pingue facies linimentum. Quod cum siccauerit, identidem superaddis, & hoc modo perseverando, facilius consumuntur exocadia. Sic chalcāthum teris, & eius puluerē cum oleo dulci, molli uapore coques, & pinguefacto, loca frequenter tangantur. Nam & alumen missum in uase nouo, coctum, atque tostum, puluerem facit. Hoc tacta exocadia, spontanea frequentius ceciderunt. Hæmorrhoidas uero erumpentes sic cōpescere uel temperare cōsueuimus. Butyrum, crocum, cerussam, mel ex æquo omnia cōmiscenda sunt, & oui albore temperanda, & imponenda. Sic arnoglossa trita cum aceto facit. Sic pulueres cerussæ cum aceto cōtritæ. Fomentabis uero loca ex aqua, ubi alumen scissum tritum mitti facies, & æris florem excoques in tertiam partem, & ex hoc fouendi sunt ante linimentum. Sed ut etiam in tempore aliquando de phycis adiuuentur, in ea aqua coquenda sunt species supradictæ. Unde ægrotus is, qui hæmorrhoidas patitur, frequentius eleuatur, & ad supradictas species in uncijis sex aquæ sextarios decem mittis. Si uero conclusas resolvere uolueris, thapsiæ succum, & apij, similiter ex æquo conterimus, & loca contingimus, quæ solenni digestionē fuerint impedita. Laser cum aceto contritum imponendo, frequenter usi sumus. Nam & mūla troisco, omnibus approbato, in aqua in qua calcē uiuam extinximus, resoluto, imminuimus, & proficimus. Qui troiscus hoc modo à nobis conficitur. Aluminis scissi unc. I. I. I. aloe unc. III. croci unc. I. I. crocomagma unc. I. I. chalcāthi unc. I. I. I. caduci malogranati unc. II. uino omnia trita cōmiscimus, ut troiscos faciamus. Etiā hic puluis nobis experimēti dedit, omnes syringas & expurgadi, & glutinandi: qui ista ratione conficitur. Iris illyricæ unc. V. erui

Ad hernias infantum.

Resinā pityinā, nitru, cyminu, ex æquo cum melle miscemus, & sub emplastri temperamento imponimus, superaddita ligatura, quæ contineat medicamentum.

Vitandi cursus, & saltus, & auster, uentris conatus, ciborum nimia præsumptio.

Ansic! olei & ceræ q. s.

Spatula holofidera.

Umbilicum in naturam propriam reuocemus.

De diuersis uitiis in ano nascentibus, uel syringis, hoc est fistulis.

Am natura delicatior, & qui ad omnes acerbos quammaximè contactus, faciliè commouetur. Nascitur ergo in hoc sæpissime indignatio, uel feruor: fit rhagadium, fit cōdyloma, erumpunt hæmorrhoides, nascuntur exocadia, fiunt & syringæ, frequenter etiam intestinorum effusio, & cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo.

Ad indignationē & feruorē.

Pingues dactyli in passio uel mellisrato infusi teruntur, superaddito quoque de oleo roseo, e quibus factum cataplasma tepidum adhibemus.

Ad rhagadium.

Oleum roseum solum, tritum in plumbeo uase, & ex pistillo simili, usque in pinguedinem, & caricarum pinguium combustarum cinis, uino tepido prælauatus, ac impositus, prodest.

Syringia.

Ad cōdylomata & exocadia.

Ceræ, picis, medullæ, adipis taurini, mellis, uini, ammoniacæ, thuris masculi, myrrhæ, croci, aluminis scissi, troisci, molybdænae, rutæ, & cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo.

Ad hæmorrhoidas.

Butyrum, crocum, cerussa, mel, arnoglossa, & cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo.

Ad easdem resoluendas.

Thapsiæ succum, & apij, similiter ex æquo conterimus, & loca contingimus, quæ solenni digestionē fuerint impedita.

Comp. pistilli ad usum.

THEODORI PRISCIANI AD

unc. III. mannae thuris unc. III. lepidos calcis unc. III. aristolochiae unc. III. s. omnia tunduntur, & chelidonium, & fœtilis pulvis, cui nomen est cephalicu, commiscetur eodem modo, ad linimentum, quem admodum mûla trosciscus supradictus. Quibus uerò intestinum exierit, mori syluestris dolori fomentatio adhiberi debet: & post acacia trita cum aceto linimentum facit: & cyclamini succus cū melle ex æquo mixtus, & coctus usque in pinguedinem. Aliud. Pulvis hellebori albi, qui cum aceto coctus est, admixto cerotario ex oleo roseo, fatis inuat. Et hyoscyamus in aceto tritus, & similiter adhibitus, intestinum effusum similiter reprimat.

De permionibus. Cap. XXVIII.

PERMIONIBVS quæ cum pruritu sunt, aquæ marinæ fots satis prodest. Similiter etiam si uino calido styptico foueantur. Sic si etiam decoctiones betarum, quibus alumen scissum infuderis. Post quod fomentum, cera liquefacta linire conuenit. Nam & ex aluminis puluere, cum hordei farina, & uino cataplasma adhibendum est. Sic ceræ, & picis resolutæ sola unctione curatæ sunt. Et glutine solutum in aqua profuit liniendo. Sic oliuarum uiridia folia cataplasmate adhibita profuerunt. Sic gallæ cum aceto contritæ, sic uini fœces impostæ curauerunt. Quibus uerò iam uesicauerint, raphanos tundes, & ex eorum succo bene proderunt linimenta. Et lenticulæ coctæ, & tritæ cataplasma proderit. Et caduca maligranati in calidis cineribus tepesacta, & trita adhibita, conueniunt. Sic etiam scylla cocta, similiter contrita, profuit. Quibus uerò increpuerint, & uulnerati fuerint, his spuma argenti trita, mixto adipe porcinorum, pro emplastro apponi debet. Sic adipēs anserini cum cera & oleo tepidi adhibendi sunt. Et cochlea cum testa combusta, & trita, & in puluerem redacta, si aspergatur, continuo medetur. Eruum in uino coctum cum cerotario similiter curat contritum.

De rhagadijs pedum, uel digitorum. Cap. XXIX.

OMNES crepidines in calcaneis pix liquida illinita percurat. Et spuma argenti, cum cerussa, & alumen scissum ex æquo contusum, & uino mixtum, medebitur similiter. Quibus uerò pili inharentes molestiam fecerint, ferro subtili loca antè purganda sunt, & melantherium cum lotio pueri tritum apponendum. Et gutta ammoniaci cum aceto trita similiter adhibetur. Et myrsi, & aristolochia ex æquo coctum cum melle adhiberi debet. Hoc & rasura cucurbitæ trita faciet.

De paronychijs. Cap. XXX.

PARONYCHIAE in initijs lana ex aqua infusa imposita curantur, eaquæ frigidiore frequentius irriganda erunt. His etiam albita cum aqua trita adhibenda erunt. Sic & thuris masculi pulvis cum melle mixtus medebitur. Sic etiam gallarum. Si fanem sanè collegèrit, locum pungis: ad eius uerò digestionem, & lenticulam coctam cum melle coctam superimponis. Et myrti folia uiridia trita, similiter cum melle adhibentur. Sic etiam rosarum, & sic oliuæ folia similiter. Sic cadmiæ pulvis aspersus curat; sic erui, sic etiam thuris masculi. Quibus uerò etiam unguēs passauerint, folijs myrti uiridibus, uel malograna- ti tunfis cataplasmandi erunt. Quibus autem forte aliqua loca nigrescunt, farina tritici, cum pice soluta admixta curantur. Et sulphur uiuum hoc cum porcino adipe tunsum, & comixtum præstat, ne ipsi unguēs exiliant. Et lini seminis pulvis. Simul etiam & asturacus cum melle commixtus imponitur. Et cera sola liquefacta superimposita. Sed his omnibus adhibitis, diutius perseverandum est. Calefacti etenim perseverantia adiutorij unguēs, melius gubernantur. Scabiosos, ueluti elephantiosos, si quis forte unguēs habuerit, uini fæx sicca, trita, & cum cerotario imposita curat. Et ficus sicca, purgata, & tunsa, superimposita, æquè medetur. Et lapathi agrestis radix in aceto cocta, & contrita; & sulphur uiuum cum sandaracæ, & ex equo tritum, & aspersum, continuo curat. Interea sub his omnibus adiutorijs, unguēs ipsi primò ex pice liquefacta ungi debent: quos superiori medicamento & fasciola munire & gubernare oportet.

De pruritu, uel scabie totius corporis, uel uarijs maculis in corpore. Cap. XXXI.

SI IUVENIBVS hoc bene habentibus obuenerit, phlebotomo prius sub gemina detractio- ne subueniendum est. Item uentris purgationes frequenter deinde adhibendæ erunt. Cibis planè forbi- bus nutriendi sunt. Lauacris frequentibus uti conueniet, in quibus thuris masculi, sulphuris uiui, & niri puluere aspergendi erunt. Si hoc adhibito adiutorio, aut pruritus, aut scabies perseverauerit, lapathi agre- tis radix trita, & cum aceto commixta, in balneo similiter adhibenda est. Sic linimentum cum melle com- mixtum. Quo linimento frequenter etiam in sole adhibito liberati sunt. His frequenter etiam frigida la- uacra profuerunt: & postea oleo roseo, uel lentiscino, aut myrtino, admixto uino, se utilius perfuderunt. Scabies uerò si ulceratas habuerint, myrabolanium, & sulphur uiuum, ex æquo tunsum, cerotario ex oleo myrteo liquidiori commisceo, ut leui unguento, eorum in balneis uulnera pertractetur. His sanè calidum lauacrum aquarū dulcium procurandum est, in quo supradicta linimēta adhibēda sunt. Nā & thuris masculi, & pulegij ex æquo pulvis, ibidē in balneis comodissime adhibetur. Comodius, si et cum uino, capnitis succus; sic nitrum cum uino; sic capnitis succus, qui frequenter etiam cum aceto mixtus, plus profuit.

VSUNT quibus certis ex accidentibus, maculae in corporibus frequentius inhaerent. Sunt nigrae, sunt albae, uelut elephantiasin aliquando annunciantes: quibus hoc modo medendum erit. Myrti folijs uiridibus in uncijs duabus, nitri, & aluminis singulis, contritis, in balneis fricandi erunt. Aliud. Sulphuris, nitri, & aristolochiae puluis ex aequo contritus, in balneis adhibendus est. Sic gutta ammoniaci, trita cum oleo, profuit. Sic ficifolia cum sulphure uiuo, & cum aceto medentur. Nam & sub sole de hac confusione curantur. Et cuminum, cum aceto tritum, saepe sic profuit: & quinque diebus superaddendo linimenta, non delauatis prioribus. Sic cimolia, nitrum, & bacca lauri cum aceto commiscuntur, & similiter, ut priora, medetur. Aliud. Foenograeci puluis, aphronitri in uncijs binis, & alcyonium, & cuminum in uncijs singulis, similiter cum aceto adhibendum erit. Et ex betarum folijs coctis, & tritis, cataplasma his imponendum est. Et piper, cum myrtis folijs uiridibus tritum, & sub sole in balneis adhibitum, utrasque maculas permundabit. Saepe his perseverantibus maculis, ad elephantiae uitium, frequentius declinatum est, cui per tempora nunc ordinabo remedia. Per initia huius passionis, cum sanari plene uitium supplicet, orauerint, phlebotomandi erunt, & purgandi frequentius. Faciem uero, in qua huius uitij magis horret imago, mirabolano cum aceto, & oleo roseo, uel myrteo, uel lini semente fricare conueniet. Aquis naturalibus frequenter utantur, & marini lauacri. Contritientia sanè uitij his quamplurimum prodest. Cibus digestibilibus, & dulcioribus frequenter inuantur, lactis acceptatione, quam maxime si aqua eius accipiant quod Graeci ὀφείον appellant. Nam & succus neptae herbae frequentissime hoc uitium releuauit: & hac eadem herba, par beneficium praestitit saepe cibo data: & coagulum uerbosum, id est hinnuli, quem nos ceruum lactentem dicimus, cum oxymelle, ieiuno datum, uel temperatum, saepe profuit. Si isdem adhibitis, morbus ille adherescens, omnino fuerit publicatus, tunc neque phlebotomo, nec catartici uti conueniet. fieri enim non potest, ut humor corruptus infans, quique omne corpus suo horrore infectat, his adiutorijs purgationum adhibitis, ad interiorem originem identidem reuocatus, uenenati sanguinis geminaris effusionibus arceatur. Sed uoquant frequentius, & lactis beneficio per cibos, per potiones enutrantur, & educuntur. Locis uero contaminatione uulneratis, omnia styptica adhibenda sunt, quibus illa caro corrupta effoeminata, ualeat durari, uel stringi. His frequenter Cirostrochiscus profuit, qui coctus ex sinopi, umine scisso, ærugine, & cymino sub aqua ponderatione in aceto dispositus. Omnia etiam linimenta, & fricamenta, quae pruritus in superioribus, nec non etiam scabici conuenientia significauimus, etiam his apta, seu utilia asseneramus. Aliqui uero etiam illis carnes, uipereas ministrauerunt, quaternos digitos in mensura, tam in capite, quam & a cauda praecedentes, quae oleo & salibus coctae profuerunt. Addis de graeco quamplurima.

PER initia, ut moris est, primum auulsa reponenda sunt locis suis. Item embrocis uti necesse est. ex herbis pollinibus, uel certe cineribus, oleo, sapone, & ouis commixtis, lanisque mollibus, infusis succis loca munienda sunt, & pro locorum natura, fasciis continenda, & constringenda. Si sub hoc adiutorio, loca naturaliter custodita quieuerint, eisdem usque ad perfectam sanitatem imminendum nobis erit. Si uero aliqua aduersitate, locis proprijs auulsa, minime potuerint reuocari, tunc adiutorijs catholicis, doloribus crescentibus, subueniendum erit: ut est phlebotomus, uel catarticum, & cataplasmata paragonica. Quibus perseverantibus, si dolorum declinauerit inquietudo, fomento lauacri, cerotarijs, uel certe emplastris calasticis imminendum est. Postea uero malagmatibus perseverandum, quibus curanda loca possint perpetuo solidari.

Macula in corporibus
aut albae, aut nigrae
aliquando annunciant
elephantiasin

Remedia
myrti folia, nitrum, &
sulphur, aristolochia
gutta ammoniaci, &
cimolia, bacca lauri, &
foenograecum, alcyonium,
piper, &
cuminum

Cau. Si phlebotomia
nihil, & phlebotomia
bata, & phlebotomia
In facie, uel in corpore
Remedia Topica
myrtus, aceto, &
myrtus, lini semine, &

Cibus digestibilis, dulcis.
Lactis & sibi acceptatione
& sibi acceptatione
succus neptae, coagulum
qui fructus uerbosus,
alio Ceruus lactens,
oxymel.

Cau. Elephantiasis fit
in phlebotomia, & in
phlebotomia. Quia
si uero corruptus infans,
corpus suo horrore infectum
est, & infans, idem est, uenenatus
natis sanguinis effusionibus arceatur

¶ Iuuant vomitus, & cathartici
¶ Cuius uulneris, & catartici
¶ Symplicia adhibenda sunt, quibus
corrupta & effoeminata uulnera
uel stringi. &
¶ Insuper, alumen, cissum, & cissum
acutum. & cissum ad pruritum
¶ Ceruum uiperearum usus,
¶ Preparatio.

Luxata initio reponenda.
¶ Embrocis uti.
¶ Ex herbis pollinibus, oleo, sapone, &
fasciis continenda.
¶ Si loca quidam auulsa, catartici
fascia, phlebotomus, catartici
cataplasma paragonica, &
lauacri, cerotarij, malagmatibus
¶ Emplastrum calasticum

THEODORI PRISCIANI AD TIMO.

THEVM FRATREM LIB. II.

N. V. N. C. secundi operis partes aggrediar, quibus prodēdē, discutiendēque rationis delegauimus functionem. Quā quoniam oculis comprehendere non potest, quod officium liber superior occupauit, idcirco passiones interiora possidentes, in hoc uolumine, aut accidentibus conuincuntur, aut prodentur in dicijs. Studio quippe ueritatis nolui frustra disputationes ingerere, quin potius in utroque opere, certis, deprehensisque morbis remedia constitui, uel curis medendo facilibus, uel tuendo materiam uitiōri. Quandoquidem in Logico opere obscuris que periculis, non opus est assertore, sed iudice. Omnes acutę febres uel ægitudines, de quibus nunc dicere constitui, aliquando passiones præueniunt, aliquoties consequuntur, quę certa produunt indicia, quibus morborum possit materia comprehendere. De chronicis uero secundis partibus promissos sermones expediam. Hęc est itaque sub omnium ueterum auctoritate febrium diffinitio, quibus etiam nos assensum libentissime accommodamus. Inest nobis calor ignitus, qui cum se in altioribus præcordiorum locis, repentina aliqua necessitate commouerit, & uelut aduectus tēpestas, loca aliqua naturaliter quęta turbauerit, uaporem actiorem procurat, & tum quidem ex altitudine stomachi febrium serit originem.

LIBRI II. PARS PRIMA, DE OXYORIS.

SEV ACUTIS PASSIONIBVS.

De febribus. Cap. I.



SIC Igitur quammaximē omnibus in locis, siue climatibus, omniq̃ ætate, morbis omnibus certa ex necessitate uel imminētibz, uel præueniētibz, hęc sociantur. Febricitantibus itaque generaliter omnibus, unum magnum remedium, cunctorum cautum est auctoritate, præcipue seruire temporibus: ut per conditionem causarum, egi omnes adiutorijs competentibus releuentur, similiter etiam cibis congruis nutrantur. Cōueniens profecto, in utrisque aliquando, congruum bonum tempus. Possunt enim in ijs officere, quę æquę utilia iudicantur, si in competenti tempore suggerantur. Docuit enim natura omnium gubernatrix, initijs omnium exagitationum, sub quacunque sorte causarum aduenientium, quando præsentis commotionis tempestate, naturalis ille uapor turbatur, recessus interiores petient, & cum ex materia articulos frigus uel tumor quassauerit, uel occupauerit, tunc nihil penitus à medicis tentari, uel adhiberi debere. At uero imminēte declinatione, transactis augmentis, cum paulatim uapor exasperatus, omnia illa exteriora membra perfriderit, tunc adiutorijs potius competentibus seruiemus. Ergo quo modo aliquando sub certis accidentibus manifesta declarantur nomina passionum, sic aliquando simplex febrium imago conspiciatur, quę uetris semper constrictionem procuret, capitis dolorem, linguę asperitatem, aliquando infomnietates, cum leuibus mentis erroribus. Hęc etenim ex eadem febrium origine, uapore naturaliter superiora appetente, præcipue capiti sollicitata contingunt. Quę accidia licet etiam in ceteris passionibus, cum alijs signis plurimis misceantur, tamē cum per se sola fuerint, febribz sociata, febrium magis simplicium quā figuratarum speciem designare noscuntur. Ergo cum simplicium febrium causa constiterit, per initia commotionum, cum adhuc articulos possidet frigus, manibus calidis, uel uaporibus, cetera omnia membra calefacta continēdo: tunc etiam somnos inhibeo, nihilque aliud inhiberi permittam. Cum uero ex altitudine uapor exiliens, corpus omne calefecerit, & emergens inflammatio impatiens, uiscera uniuersa siccauerit, tunc post clysteris simplicis beneficium, etiā enemate, quod ex sicco lini seminis, & oleo roseo, uel chamæmelo temperatur, in uncijs tribus, igneis illis ardoribus succurrendum est. At uero quinta transacta die, & primis iam temporibus ægitudinis refrenatis, cum sub quadā maturitate qualitas causę humanior apparuerit, tunc post augmenta commotionis præsentis, lini semine, & hordei pollinibus, cum aqua & oleo, ut moris est, præcordiorum loca iuuanda sunt: ex quo, aut ignem illius commotionis temperemus, aut suadorem opportuno tempore procuremus. Monitum te interea uolo, ex urinarum inspectione, supradictę ægitudinis maturitatem, sic considerari debere. Aduertendum est itaque, ex urinis naturalibus & consuetis, quātum in cōtrariam partē natura deuiauerit: ut ex hoc, quid aut pñs status, aut futurus ægitudinis exitus allaturus sit, instruaris. Est autē urina naturaliter, quę corporis eius qui emittit, sanitatē manifestat, rubra mediocriter, & subpinguis, & tactu calida, hñs naturaliter nebulas, in aquam maxime appetentes. Quantitatē uero ex accepto nosse cōueniet. Hęc itaque cum inspexeris, de maturitate ægitudinis bene cōfidens, adiutorijs cōpetentibus uisita bis. Superueniente igitur declinatione, tēporales commotiones, et prioribus adiutorijs procurato. Tunc & linguę curationi, & ceteris, quę cibos impedire consueuerunt, seruiendum erit. Aliquando etiam lixoperita pro cataplasmatibus adhibita, quammaximē profuerunt, quę infundere ac nutrire magis, quā infrigidare corpora ardentia uideantur. Quę conficere hoc modo consueuimus. Spuma argenti unc. III. mellis unc. III. succi lini seminis unc. VII. cerę unc. III. olei rosei, uel chamæmelini lib. I. cōficis ut moris est, & uteris in uicē cataplasmatibus, cōmōtiones cōpetenti tēpore iuuaturus. His igitur adhibitis, simplices ægitudines sic uisitare consueuimus, usque in plenam uisitacionem: quo etiam lauacris adhibitis, & reparare sanitatem, & reparatam custodire possumus.

In declinatione, tempore cōmōtioni pñcipuē, inquit curationi, & uisitati.

Uisitatio ægitudinis, uisitati, uisitati, uisitati, uisitati.

Nota.

Uisitatio, uisitatio, uisitatio, uisitatio, uisitatio.

Conclusions.

Transitive adjectives
agreed.

*Præmisi, fibrinæ acutæ
nervitatis fluctat.*

Cap. 11.

De tremicorum signa
8. quibus.

feb. acuta, terribilis mentis
alienatio, ingis insomnia,
florum collectio.

Causa ingratia, et mentis
transio vel indignatio.

Desperatis nulla penitus adi-
toria admovento, & totum
importunis temporibus, de que
noceant.

Curatio.

Cubiculum lucidum temperatum.
Ciborum observanda continentia

Præbitorum intra triduum,
si nulla nos aut etatis, aut
temporis ratio remoretur.

anguis, ^{nam} comodi sumus elementis,
destruitur vel amissus, difficile
reparatur: Valis possunt inuari
remedij.

Utrius officii christi pueri
 & m. no. 2. p. 1. m. 1. m. 1.

fabricantib. collectiones manu
rum sociantur.

Vini vel aleti odor fugiendus.
Cibus humectans et lenis.

Caput oleo rosae infundendum.
In extensionib. vigilis, febrib.

Reformationib. Embrocha
refrigerans. Em.

Si impatiētiū se sustinendo quā-
sauerint, et immodicas vigiliās,
nulli similis erit.

Nam plus incumodi ex viâ q̃s
 quietis, q̃ si vinô. fatigatur.

Uultus amicis amor fovendus.

in calorem. Linguae instigatio
 sicutat. & m.
 ex tere.

me mentis oculis & mentibus oculis,
patris, semini dulcissimi.

Figurae hinc copiatas a gignit

*Detonso capillo admodum curv
ad digestionem caesse.*

Ratio t^{ra}s in usu raris d^octum.

Le charge & p^{re}sentide communis
capitis & meningis exterioris & co^{ri}

Comunul în viziune, ca și cum
ar fi un lucru

¶ placentia informis in aliena
tionis dignitas:

Chorici vigilas, grandemque
veluti somno legimantur, ac
maius periclitantur.

sed peremptori in sellargidos, mu
tus, & contra, sustinens.

Remedius quos a patientia mada
enda: l'ethargia vigilz.
C. Cursio.

foliis cap. & Scordiorum citranar.
p. 101. —
— aque licet visanda.

Inter officina curandae
Capiti cucurbit. cu. significatio

Сибалъ еodem ratio. $\frac{11}{14}$

Cap. III.

Сибалъ еodem ratio. $\frac{11}{14}$

ff. Si filius auct. possidet,
 frequenter strachmentz
 vultum.
 Auctor prarmis sue strach-
 mentz excedit.
 Lucian sic & temporis caridit
 Arctius inuigilz. Et m.
 Singulz in figiis.
 Singulz fons & temporis
 adfuerit sui aduocant.
 res varentz, vultum, & singulz
 compatione lantiz,
 vultu exegant, & m.
 Appropinquat, & m.
 Singulz sui vultum.
 Et m.
 Obvium vultu ad vultu.

et m.
 etiam autarum necessitas, eade
 exarguit adiutoria, quæ p^{er} frem
 tias accommodari solent, adiutores
 compellit.

stereo, & oleo ficyonio. Iam tunc etiam odores naribus adinuendi ex castoreo, pulegio, origano, thymo, & baccis lauri. Hoc & ex cornu ceruino, & galbano fieri, commodum probauimus. Hæc igitur grauis lethargicis adhibenda sunt, ubi febrium acutarum non interuenerit necessitas, quæ quidem uos omnia eis, quæ phreneticis accommodari solent adiutoria, uel illis similia adhibere compellit.

De pleuræticis. Cap. IIII.

PLEURÆTICORVM hæc est certissima definitio. Doloze insistentabili, & perseveranti, circa interiora lateris afficiuntur, febribus æquæ acutis minimè desistentibus: & tussi molestissima compressi, spumata uaria eiciunt. Super quod latius iacuerint, tolerabilius affueuerant. Nam loco dolente, ad saniores partes in tempore demigrat pressa materia, ac tum loca ipsa languentia releuantur. Febrium itaque temporibus ferientes, adiutoria & cibos congruos adhibebo. Cubiculum procurabo calidum & lucidum. Ex initio mellicraton ex despumato melle suggeram, omni ægritudinis tempore ministrandum. Interea si statim nos augmenta terruerint, retractantes ægrotantis ætatem, temporis qualitatem, prouinciarum naturam, intra tertium diem phlebotomo subuenire nos conuenit. Item uentris officium procurandum est, aut balanum supponendo, aut clysterem simpliciore. Lateri uero dolenti, ex oleo samfucino calido fomentum adhibeo, & ex samfuci puluere, uel rutæ ficæ, loca affatim aspergo dolentia. Post uero succidas, aut sulphuratas calefactas lanas appono, uarijs & frequentibus cæteris uaporibus loca mitigabo: & aliquando facellis ex cantabro: aliquando ex milio, uel salibus calefactis, aliquando oleo supradicto samfucino, uel rutaceo adiecto, uescam uaporamus. Adhibemus etiam uentofarum suis temporibus aptissimum adiutorium. Perseuerantibus uero doloribus, etiam cataplasmata calastica cum melle de seminibus addo, detrahens semen fornogæci. Febrientibus caput semper dolore & inflatione sollicitatur, quod expertus es. Cibus uero usque ad ægritudinis digestionem, commodis temporibus, matutinis quammaximè, sordiles ministrabo, & calidos. Semper enim naturæ certa ratione, uel pertina horæ crassiores accessus, egros animos ad tristitias quasdam adducunt, & uiria ueluti renasci cogunt, commotionem interea addentes. Eoque facilius ægritudinem refrenabis, si per dies singulos semel tantummodo cibos adhibeas. Sub hac igitur uisitacione, si nec dum ægritudinis augmenta recesserint, diebus pluribus ex mellicrato, aut hyssopum, aut rutam uiridem decoquam, & ex hoc frequenter eos potabo. Locis uero impatienter dolentibus, etiam thoracis uestionis impono. Ita enim frequenter ad peripleumoniacorum non permittetur æger uicina peruenire pericula. Dolentes uero latus sine febribus, & cæteris accidentibus pleuræticorum remotis, quos iam non pleuræticos, sed latus dolentes propriè appellabo, ex subiectis alia diligentiâ uisitamus. Piper, uel cyminum, uel castoreum, aut rutam siccam terentes, mellicratoque miscentes, potui dabimus. Oxypona adhibenda erunt. Item acopo calido, commixto opobalsamo, aut glaucino, aut laurino, latus ipsum est perungendum, & fricandum. Quibus adhibitis, si nec dum dolor quieuerit, super illam decoctionem, quæ superius ordinauimus, fraxini radicem, aut capparis admiscebo. Dabo interea etiam antidota apta frequenter pleuræticis, superaddens samfuci puluerem, iisdem semper adiutorium commodissimum. Nam & emplastra, uel malagmata, his sæpiissime profuerunt, ex rutæ foliorum uiridium contritorum, cum axungia, & cætera quamplurima, quæ sibi quisque in tempore causæ probatæ utilia esse cognouerit.

De peripleumoniacis. Cap. V.

Vnde est, per, peripleumoniacis.

PERIPLEUMONIA COS hæc accidentia manifestant. Febres acutæ, thoracis pondus, quod etiâ laterum sollicitet uicinitatem. Iacere supini non facile patiuntur, sed magis sedendo releuantur, facies atestantur infectas ueluti quodam rubore genas: Anhelitum tardum, & supirium patiuntur. Tussunt frequenter, sputa sanguinea & sordida digerunt, pulmonis periculum designantia. His primò lucidum, & calidum, utpote calasticum cubiculum prouidendum est. His febrium temporibus feruens, adiutoria, & cibos moderatius administabo. E succis ptisanæ, aut alicæ, mellis quippiam despumati habentibus, mellicraton faciendum est: sicuti etiam in pleuræticis ordinatum est: cui concoqui debet ruta uiridis, hyssopus, uel origanum, aut iris Illyrica, quæ quammaximè perseveranti tussiculæ mederi consueuit. Si uero digestio sputorum tarda & difficilis fuerit, uel si pectora eorum, uiscosa quadam pinguedine percludantur, ad mensuram cochlearis ieiunos recentis butyri frequenter acceptione iuuamus. Ventris officium assidue procurabo. Thoraci eorum, hoc est, pectori adiutoria omnia pleuræticorum adhibeo, tam in fomentis, quam in cataplasmatibus, cæterisque uaporibus constituta. Cerotaria quoque ex oleo cyprino, habentia sinapi puluerem adhibenda sunt: quibus ad exteriorem cutim, pulmonis laborantis, causa interior prouocetur. Nam & uentofæ impositæ, par beneficium etiam mitigando præstiterunt. In declinatione uero huiusmodi ægritudinis, emplastris, & malagmatibus amysticis pro tempore aptis uti nos conueniet, nec non & humanioribus lauacris, cæterisque, quibus ex tanta ægritudine, reparare membra lassiora, & robore possumus.

De synanchicis. Cap. VI.

Sipponet quidam, quod sit ægritudo.

DVPLEX synanchicorum species. Una, quæ cum tumore nimio, uel indignatione gutturis, & uiz,

& unaz, & faucium, & uicinarum partium efficitur. Altera sine tumore, iisdem tamē inhzrentibus signis, uel accidentibus: quæ plus periculi facere consueuerunt. Meatus utrisque in trāslutendo difficilis fiet, & de conclusionē eorum locorum, uel suspirio, uel etiam nauſeando periclitantur. Hi hoc modo curandi erunt, cubiculum maius, & calidum procurandum est. Clysteris ardore officium uentris cogemus: Et si ætas eorum adhuc calidior fuerit, phlebotomo liberantur ex uenis sub lingua apparentibus, eo sanē tempore, quo necessitas coegerit detractiōis. Vbi enim febrium timor defuerit, etiam post tertiā diem, sanguinis detractio non negatur. Gargarismatis uero has causas faucium, frequentissime tali modo nouimus releuari. Mellicrato, in quo aut cantabricum coquendum est, aut ficus sicca, aut galla quassata, aut rosa sicca, aut lenticula, aut omphacium, aliqua ex his, aut certē omnia, ut superius conteximus, concoquenda erunt. Nam andronici troscus omnibus merito approbatus, si cū passio, aut carentia teratur, & molipenna his locis adhibeatur, satis iuuat. Sic etiam de flore rosarum, & alumine fasso, & de phrygio lapide simul combusto, confectus puluis, similiter temperatus, & commodius adhibetur. & cætera medicamenta, ut anthera, & his similia, anteriorum compositione probata. Interea facellis, uel fomentis, cataplasmatibusque calafctis, & paragonicis, locis faucium periclitantibus, & pectoris uicinis partibus imminebo. Cibis uero, temporibus competentibus humidis, calidis, & tenuioribus nutriendi sunt. Acutæ enim ægritudines utilius gubernari non poterunt.

De apoplecticis. Cap. VII.

APOPLECTICI appellati sunt eo, quod ueluti ictu quodam repentino percutiuntur: uel quod frigidissimi cum totius corporis desperatione, & grauedine iaceant, sine sensu etiam. Hæc quidem passio acuta est, & nunquam penitus sociata cum chronicis, nimium sollicita, sine febribus tamen. De his igitur Hippocrates noster, huius professionis auctor, sic sua sententia iudicauit. Apoplecticos, inquit, grauius occupatos, nullo penitus pacto curari posse: leuius attamen, licet difficile, liberari. Huic etiam ego obediens, hoc si suadeo obseruari, ut eos quos sine sensu penitus iacentes inspexeris, & nimium frigidos, anhelantesque, tantummodò plena sub desperatione agere pronuncies. Quos uero leuius, ut dixi, & aliqua parte sensum proprium continentes, sono narium respirare conspexeris, penna prolixiore interiora faucium attingendo, si fieri potest, cibos, aut phlegmata per uomitum reijcere compelles. Sternutamētis actionibus eorum capita commouenda sunt. Unguentis, uel fricamentis acciōibus & calidis, omnes eorum articulos, mixto nitro, & pipere, infundere suadeo. Extremitatem uero intestini, taurino felle tangendam, aut puluere staphysagrie, quam syluaticam uiam appellant. Balanos supponimus acres, & theriomaticos. Consueuerunt enim his adiutorijs coacti, uel urinas, uel phlegmata frequenter extrudere. Cognoscentibus uero, & respondentibus intrepidè phlebotomum adhibeo: si tamen nimium senes non fuerint, succis eos prifanz, uel alicæ, cum oxymelle gubernabo. Aquā calidam potui dabo. Cum uero transacto periculo præſenti, ad paralyſin, ut frequenter contingit, causa fuerit deriuata, suo tempore cum de paralyſi tractaturi sumus, etiam eorum ordinabo remedia.

De hydrophobicis. Cap. VIII.

HYDROPHOBICORVM causam, aliqui ex morſu canis rabiosi, aliqui ex serpentium uenire asseuerant. Sed has origines sollicite nos scrutari superfluum est. occupatos etenim hoc morbo moleſto, nil iuuat originem didicisse. Igitur cum initia huius manifesta fuerint passionis, emergit primò ueluti quidam irrationabilis animi respiratio repentina, & frequentes iracundiz. Item pigrescunt ad omnia, inſomnietates, uel certē somnos terribiles patiuntur. His & stomachi grauedo, cum corruptela ciborum emergit lauacrorum inconſueta uitatio. Aerem serenum, ueluti phumofum perhorrescunt. Vitare etiam bibendi consuetudinem tentant. At uero, cum passio eos plena possederit, quātum in desideranda potione hinc accesserit desiderij, tantum timoris in accipiendo generatur. Ad hæc phlebotomo prius occurrendum est, si nos nulla prohibuerint cætera præiudicia, ut superius dictum est, quando necessitas coegerit tempore. Vbi enim febrium timor defuerit, etiam post tertium diem detractio sanguinis non negatur. Itē dabo gentianæ radices puluerem, in mellicrato cochlear unum. diatheriacon dabo, coagulum leporis trini, similiter cum mellicrato. Dabo etiam canum catulorum coagulum. Dabo etiam cæcrotum stigmatilum puluerem combustorum. Vulnere autem eorum à plena sanatione, ut possumus, differemus, ad mouendo medicamenta quæ debent mitti, & sordida eadem uulnera faciam permanere. Ad moueo interea etiam sanguifugas, ad moueo caustica. Patientium enim locorum uenenati humores minime poterunt prohibere digestionem. Pectus eorum, uel stomachum, seminum chalafctis cataplasmatibus adiuuabo. Iuuabo etiam cerotario, ex aloe & mastiche, & nardino oleo temperato. Caput eorum oleo anethino, uel chame milino tepido infundo. Vomitus & clysteribus releuandi erunt. Stomacho uentosas impono frequenter cucurbitas, & unguentis ex samſuco herba, uel absinthio confectis, præcordia perfricabo. Cogo interea & suadeo per interualla, ut ad balneas accedant, & solo fomento calido eos posse iuuari asseuerabo. Procurabo cibos cum saporiferis speciebus: sed si in tempore non deerit, etiam sagapennum, aut laler, admiscebo.

Curatio.

Phlebotomia in eorum uenis
si nulla puerit, si uero
quodammodo puerit, si uero
vel post 3 diem, uel post 4 diem
faciatur.

Puluis comp. & iuuat.

Intine uelut, ad uicinas, in uicinis
distantes, coque lapides uel alios.

Altera à plena sanatione differre.

redu.

Ad mouendo sanguifugas, nauſia.

Intine eorum, eorum uicinas, uel
uicinas uicinas, uel uicinas uicinas.

Cataplasma, & iuuat.

Cataplasma comp.

Cucurbitas, & iuuat.

Uelut, & iuuat.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

Intine, ad pectoris uicinas, uel
ad pectoris uicinas, uel ad pectoris uicinas.

De spasms. Cap. X.

De satyriasis, uel impedimento usus Veneri. Cap. XI.

SATYRIASIS, gonorrhoea, uel priapismus, similis est sub immoderata patratione molestia, quae his accidentibus determinatur. Gonorrhoea, sine ueretri extensione, uel ulus, desiderio, spermatis affluentiissima sub effusione, corpora debilitat, & per chronica tempora producitur. Satyriasis uero ex certa corporis incommoditate, quae etiam mulieribus aliquando contingit, desiderium insatiabile, & tensionem particulae cum assidua patratione auarissima facit: & licet sine febribus, attamen inter acutas & temporales

Concrevis sub immo-lescen-
tationibus molesta-
ta, sub his acutius. distem-
perata, sine veneti exstingui-
tus deficiente, spermatis afflu-
entia sub effluvio, corpora debi-
ta: h. per spermia generantur.

Subtingit, ex certa corporis inco-
nitate, quæ etiam multum aliq-
uot, deficiente infatigabile, &
longa potestate, cum affluo paba-
re, acutius maneat.

Concrevis sub feb. acutis acris
temporales exstinguitur remanent,
in eisdem diutius generantur.

& temporales ægitudines numeratur. Hanc passionem priapismò aliqui appellauerunt. Sic itaque curandi erunt, qui de utriusque cognomentis egrotant. Frequentatione palestre, per initia omne eorum corpus exerceo. Post identidem penitus quiescendum est. Vapores stypticos, ubi iam sub tegmine, uel muni mine totius corporis bene fuerint dispositi, supponimus, uaporem calefactum ex acacia, uel hypocysside, uel cicuta herbæ succo, contrito, & resoluto. Tunc ipsi partibus superaddimus frictionem unam fabanorum paulò asperiorum. Cibos stypticos omnes cum aceto ministrabo, uitans calidos, & qui inflatio- nem poterunt concitare corporibus. Hi etenim frequenter usum erigere uenereum consueuerunt. Sic etiam potus subministrandus erit. Sed tamen omnia hæc mediocriter, & rariùs exhibenda sunt, ut ex hoc ueluti famem, uel sitim procurare possimus. Si uero passionis huius molestia diutius perseverauerit, ut tensio & desiderium impatientissime protendantur, laminam plumbi renibus & partibus uicinis appo- no. Nam & uentosis cucurbitis affruiis, eadem loca fatiganda sunt. Dropaces quoque imponendi erunt. Ab omnibus carnosis cibis, & multum nutrienribus abstinendi sunt. Ab odoribus bonis, uel thymiamati- bus: ab aspectu, uel communione pulchrarum penitus figurarum, ut neque tangendi, neque uisendi eis copia præbeatur. Quibus uero aut ætatis uergentis defectio, aut morbus locis residens, ueluti iam frigē- ribus, usus ueneri officium pernegarint, ijs contrarijs adiutorijs famulabor. Conuenit exercitio uti me- diocri frictionibus quammaximè locorum inferiorum, & inguinū, ex pipere, uel euforbio, uel similibus speciebus, quæ erigendo rigorem, desiderium, uel usum ualeant ministrare uenereum. Etiam horum dro- paces adhibeo renibus, uel inguinibus, & ex eodem balanos. Cibis calidioribus utar, infantibus, uel erigen- tibus membra frigentia. ut est unum boni odoris, uel hydromel, alica, amyllum, pinei nucleis, porri, eru- ce, bulbi etiam, & similia, quæ per porciones accepta, uirile semper officium reparauerunt. Et piper, saty- rion, & hinchus, & erui semina, & cætera adiutoria, par beneficium ministrantia, quæ in libro Physicorum commodius disponimus. Interea eos quiescere conuenit, non solum noctis spatijs, uerum etiam diei: uti plumis, & mollioribus opertorijs, uel straminibus conuenit. Interea puellarū speciosarum, uel puerorum similiter seruitium procurandum est. Vti sanè lectionibus animum ad delicias pertrahentibus. ut sunt Amphipolitæ, Philippi, & Herodiani, aut certe Syrii, Amblij, uel cæteris suauiter amatorias fabulas descri- bentibus.

De cardiacis, qui etiam diaphoretici.

Cap. XII.

LICET quamplurimorum sententiæ ita definierint, sicuti hæc eadem professio nominis attestatur cordis initio hanc ægitudinem fieri, ijs ego tamen non facile accomodabo sensum. Nunquam etenim cla- ruit indicium manifestum, quo tentari in aliquo naturam cordis intelligerem. Est autem totius corporis, & unum plena resolutio, quam uaporem stypticum appellamus. Hanc sudor uiscosus & frigidus perseveras, interemptis uiribus manifestat, præeuntibus atramæ acutis febribus, & flammæ interiorum ardoribus. Quem morbum aliqui Caufon appellauerunt. Hæc igitur passio frequentius iuuenibus, quam cæteris ætatibus euenire consuevit, in augmento ægitudinis, hoc est circa diem sextum, & quammaximè eo tem- pore, quo ætas calidior incanduerit. Licet ergo in omnibus generaliter malarum ægitudinum necessi- tatibus, ualde promouerit, si gubernantibus temporibus seruiamus: attamen magna ui, & periculo inter- posito, dum sudoris illius emerferit iniquitas, cum uirium defectu, & ex eo præsens uitæ periculum, tunc confusus & prætermisissis temporum rationibus, adiutorijs competentibus imminemus: & nunc cubiculū frigidum, nunc lectum stramentis ueteribus lineis dispositum, nunc flabella, nunc quoque pannos nardo & uino infusos, præcordijs eorum ordine imponimus. Cataplasmata quoque frigida, & styptica imponē- da sunt eorum præcordijs, strichnon, aut aizoo, aut rubus, aut thebaicus dactylus, aut caduca mali granati, uel oenantes grana. Certissimum est etenim, singularum specierum merita, quæque medicum bene co- gnoscens, uel etiam temperamenta, siue commixtionem adiutoriorum, facile posse disponere. Faciē ergo eorum ex posca frigida, uel uino styptico fomentabo. Pulueribus aspergo membra sudantia, mēthe, uel rosarum folijs siccis, contusis, & cribellatis, gyphi, maxii, mannæ thuris, gallarum, singulis tunis, & com- mixtis, cum uino styptico, uel eius fecibus: simul mixtis odoribus bonis, uel thymiamatibus, uires laben- tes, & membra defidentia reparabo. Articulos eorum oleo cucumeracio, uel nimis uetusto, mixto puluere nitri, uel piperis, pyrethri, uel adarces, uel urticæ seminibus defricabo, uel infundo, quo calorem ingenitū emorientem reparare aliquatenus ualeamus. Nutriam succis modicis, sed frequentioribus, frigidis tamē, quibus sudoris feratilis abundantia uires emorientes exulcitem. Nutrio potando, ut potero: nutrio simili- ter per dytiterem, aut alicę, aut prisanę succis, ut supra dixi, in quibus ungulas porcorum, usque in plenam earum decoctionem concoqui suadeo. Aquam frigidam per interualla similiter subministrabo: & si æta- tis adhuc uapor calidior cōegerit, nitratas non aspernabor.

De cholera.

Cap. XIII.

CHOLERA, passio molesta, sub angusto tēpore sollicita, omnibus acutis ægitudinibus uelocior. Nam hæc sub uno die desperata, ut frequenter experti sumus, uitæ terminum fecit, dum subitanei uomitus, uentris quoque immixtæ effusiones, sub dolore nimio præcordiorum, uel totius corporis, interiorem omnem sepe substantiam effuderunt. Est etiam hoc simile in diarrhoea periculum. Sed eo distat, quod diarrhoea sola uentris molestia, & sub longo tractu temporum, aliquoties fatigantur. Cholera uero, ex

Compositio.

Corpus pulvis, ex

quis media

Vapores styptici

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

falso ad sabano

Cicuta, stypticum

nisi muniend.

utrisque effusionibus sæpe, & sub angusto tempore homines pericucit. Ergo cum interiora præcor-
diorum, humorum minacium prius occupauerit conglobatio, ut æthiopes, uel angustias, nimios quoque
dolores efficiat, tunc nos aquam calidam in tempore porrigimus, & per uomitus, procurabimus digestio-
nem. At cum per uias expulsionis, eorum impetus torrens & repentinus erupit, ita ut ex utrique ter-
ribilis effundatur, sic, si possumus, præsens periculum remouemus. Oleo calido omne eorum corpus in-
fundimus, articulos fasciis astringimus: neruos omnes, & loca contrahentia, lanis infusis eodem oleo ca-
lidissimis munimus. Vtimur quoque etiam cerotario, & nardino oleo, & cyprino, & glaucino, aut irino re-
perato. Si uero interceptis uiribus, plena fuerit desperatio, odores, uel thymiamata his propter repara-
tionem adhibebimus. Cibos dabimus competentes, succos lentis cum aceto, oua hapala, m fabriciam,
buccellas, mero infusas, ungulas porcorum, uel iuscellum gallinarum, concoques strichn, uel aizoñ, aut
rubum. Dabo potum frigidum, dabo miratam, columbos matri subductos. His etiam per dices eodem mo-
do conuenit ministrare. Cataplasmata uero omnia adhibenda sunt, quæ diaphoreticis ordinata sunt. Fe-
bribus uero interpositis, consideratis temporibus seruiendum est. Intensius tamen effusionum sollicitu-
dini militabo. In quibus sæpe etiam sanguinis superuenientis effusio, uitz periculum procurauit.

Libri II. Pars secunda. De passionibus Chronicis.

OMISSIS acutis passionibus, quæ certa lege regularitudo propriarum, febribus aliquando loci-
tur, eisque iam partim publicatis, ad Chronicas descendemus, quibus aliquando febres superuenientes, sub
longo tractu passionum, ueluti temporales commotiones assimulant. Etiam in ipsis ordinem dispositum
custodientes, initium de capitis querelis accidentibus ordiemur.

De querelis capitis. Cap. I.



VERELAE capitis, varijs frequenter accidentibus superueniunt. Aliquando de uapore,
uel de frigore, uel cæteris rationibus accidere uidentur. Igitur quando de uapore dolor
infederit capiti, tunc accipiens ille dolor, cum uapore quodam, & uenarum inflatione con-
cutitur: Tunc oculi sanguinei, tunc etiam insomnietates nimiz procurantur. His gre-
mialis olei infusio adhibenda erit. Quæ si forte dolorem non compescuerit, oleum roseum
adhibemus. Cuius si copia defuerit, gremialis supradicti quatuor partibus, ro-

sea uua erit aceto miscenda. Si uero maior uis uaporis frigidiora exegerit adiutoria, superaddimus auxilio
aut polygonij succum, aut arnoglossæ, aut portulacæ, aut uuarum immaturarum. Quiescere autem debe-
bunt locis frigidis, quorum pauimentis spargenda erunt folia uiridia, aut rubi, aut hedere, quæ graueolen-
tia non sint, & competenter infrigidare sufficiant. Si uero de frigore caput fuerit inquietatum, tunc
grauedo quædam cum furboe uenarum, & interceptione contingit, tunc effusio lacrymarum, tunc falsi
somni graues existunt. Hos anethino oleo, uel rutaceo calido, conueniet fomentari. Et si superaddi aliquid
adiutorio debere caloribus aduerteris, aut agrestis cucumeris radix, aut euforbium, uel certe castoreu super-
addendum est. Nam & laurinum oleum, uel irinum, uel glaucinum similiter adhibendum est. Quando
autem ab exhalatione inferiorum, quam ævapouria appellamus, caput fuerit sollicitatum, tunc ille dolor
per interualla subcutiens, cum saltu quodam uenarum, caput sollicitat: tunc quammaximè uertigines,
tunc oculorum obscuritates emergunt, querelis attamen aliquibus pulsantibus etiam præcordiorum lo-
ca. His ergo primò uentris solutio procuranda est, & cubiculi temperies providenda, & ad releuationem
eius, post cibos uomitus procurandus, sternutamenta frequentia: si tamen nullum febrium indicium in-
teruenerit. Caput uero oleo dulci calido adiuuandum est, cui aceti quippiam commisceri debet: unde su-
peruolantis ad superiora uaporis inquietudo, aliquatenus reprimatur. Somni arcendi sunt, diurni quam-
maximè: & ciborum prohibenda præsumptio. Frequenter hæc uitia indigestionis causa emergente co-
tingunt. Nam & doloris tunc uehementia atque subita uocis interclusio periclitantur. Quibus hoc pa-
cto subueniemus, si eo tempore uomentibus, post continuò eorum auribus, oleum myrrinum, uel anethi-
num, uel nardinum infundatur. Capiti etiam, ex his fomenta calidiora adhibeantur. Si uero ex uini po-
tione caput fuerit dolore pulsatum, quod ex natura huic frequenter euenire consuevit, ea conueniet ad-
hibere, quæ his adhibentur, quibus ex anathymia caput fuerit inquietatum. Olei etiam rosei fomentum
est applicandum. His lauacra ferotina permittenda sunt, somni uel quiescedi patientia procuranda. Tunc
cibi competentes, ut ptisanæ succus, & oua recetia, panes ex aqua calida, caules decocti, aquæ calidæ potio,
& lactucarum beneficium frigidarum. His etiam adiutorijs adhibitis, uaporis ad caput ascendentis depri-
mi importunitas consuevit. Sed quoniam his causis, aquæ calidæ potionem diximus posse beneficium mi-
nistrare, frequentius intendendum est, ne ex ea resolutio stomachi procuretur. Quæ si euenit, tunc capio-
rum, uel citoniorum decoctioni uinum est immittendum, quod stomachum ualeat reparare. Omni modo,
omnes uitandi sunt dactyli. Specialiter etenim ex natura sua contrariatur, quæcunque ex suauibus fuerint
confectæ potiones. Tunc ad lauacrum calidum protinus festinandum est, in quibus ore aquam calidam, in
cellis calidioribus sustinentes, uaporem omnem transigant lauacrorum. Si ad ciborum ergo continen-
tiam, frequentiamque lauacrorum, & cætera supradicta adiutoria, minus fuerint releuati, olei tunc rosei ul-
terius adiutorium uitandum est, atque chamemilini, uel anethini beneficium est apponendum. Si uero
causis

Si uero ex uini potione, frequenter
euenit, ad anethinum
L. anethi, ferotina conueniunt.
Sunt, uel quædam potiones per-
uacua.
Cibi competentes, qui
ad uisum fomentum, selongum
reponit ad caput, & conuenit
depriui ostendit importunitatem.
Iuscellum, quod est, uel
labi, iunioris, propter
uaporis seu ptya & ptya, pro
uaporis, uel, iunioris, uel
omni modo uitandi sunt dactyli.
Si uero, contrariatur, quæcunque
confectæ potiones.
uaporis ad caput, uel, aqua calida
conueniunt.
Cibi, chamemilini.

causis ueluti incertis, caput doluerit, fronti linimenta hæc superadhiberi suadeo, omnibus superioribus obseruatis. Cornu ceruinum cum oleo roseo fronti contritum adhibetur. Nam & lapathij folia uiridia, cum gallarum puluere trita, ex aqua, similiter illita iuuabunt. Sic iris illyrica puluis, cum aceto illitus præstat. Et hellebori albi puluis, mixtus cerotario olei rosei, & fronti ipositus, & acaciæ puluis mixtus, similiter catarrhosis medetur. Item etiam hemigranicis hæc sunt adiutoria. *Abbedæ*. Sinapi tritum, & urticae semen excoctum cum aceto, frequentissime profuerunt. Et decoctio *thri*, cuius uapor naribus si hauriatur, continuò medetur. Et fumigia eodem modo hos iuuare cognouimus, si melanthium cum fimo bouis, uel alini, carbonibus impositum, uaporibus hauriatur. Nam & unguenta hæc, ut experti sumus, capitis dolorem sedat. Oniscos, quos porcellæ nes appellamus, si in oleo decoqui facias, & ex eo tepido caput infundas. Sic peristerion herba oleo infusa, medetur. Et si thoracæ oleo resoluas tepido, & ex eo caput infundas, multum iuuabit. Sunt & cætera adiutoria *πολυπλοκα*, quæ multarum specierum congregatione compacta sunt: ut troscisci diuersi, emplastra, uel antidota, uel cætera, quæ ex uarijs simplicibus componuntur: sed hæc magis facilia adiutoria adhiberi suadeo, quæ sufficere arbitror causis supradictis capitis & querelis. In *διαλέματι* uero, hoc est, eo intervallo temporis, quo causæ uel passionēs chronicæ publicantur, dū quiescente dolore causa latet, dum commotionibus ueluti transactis, æger sollicitus alias iterum reuersuras artonitus formidat, tunc his catholicis adiutorijs imminendum est, quibus secundum naturam, sanitatem reformatando, futuras confidit commotiones minimè nocituras. Ergo omnibus querelis, uel causis capitis, indifferenter hoc temporis intervallo, uno eodemque modo, hoc est, cura & diligentia ministranda. Omnibus modis est indicenda uini continentia, quæ supradictis omnibus querelis capitis prodest: lactis æquè, si militer dactylorū omnium, multò magis uentris purgatio frequentissima procuranda est: frictio totius corporis: quammaximè emplastrum capitis longa doloris ualitudine laborantis. In *διαλέματι* sic pin-gues in uino infundes unc. VI. iasaris drachmam I. sagapeni I. thoracis II. galbani II. omnia trita sic com-misce, & uteris pro cataplasmate, præcalescto capite post rasuram nouacula, inferioribus partibus fe-morum, uel surarum, æquè exercitio calefactis, ut ex superioribus causam omnem deuocare ualeamus. Apophlegmatismos, quibus caput purgandum erit, conuenit adhibere. Conuenit de naribus uel ex fron-te sanguinis eos detractione releuari. Nam & post rasuram capitis, cucurbitas cum scarific: *ie* sepe ad-hibuius. Conuenit & emplastrum infrascriptum. Et frequentius etiam sanguifugas app: *ari* conueniet. At ego in hoc ordine curæ, etiam cycli beneficia non aspernabor, omnia penè uetusta uitia percurantes: si tamen recto ordine peragatur, ut ieiunia in tempore uomitus, ex radicibus falsis, aliquando perceptio *περ-ιστορ*, dropacæ, synapismi, secundum usum & auctoritatem ueterum adhibeantur omnibus. Attamen proprijs temporibus custoditis, ciborum quoque qualitatibus & ponderibus moderatis, utilia tamen esse censeo etiam aquarum calidarum naturalium beneficia. Peracto igitur cyclo, aliqui hieram adhibuerunt, quam alij picram appellauerunt, aliqui *ἀγριοτομίαν*, aliqui etiam cauteriam. Ex his omnibus adhibitis, con-stat supradictarum causarum sanitatem fuisse plenam capiti reformatam, ne uariarum curarum, uel benefi-ciorum merita confunderentur. Sed quoniam aliquando aut ægotantium impatientia, aut imperitia medicorum, aut certè dum causarum magnitudini, adiutoria non sufficiunt competentia, minimè percurā-tur, & ex eo ad *ἐπιληψίαν* capitis uitia deuoluuntur, his etiam, quibus nunc possumus, remedia uel adiutoria componimus.

De epileptici. Cap. II.

VARIIS nominibus hæc passio, pro sua magnitudine nuncupata est. Nam cum sit sola capitis cau-sa Epilepsis, ideo sic appellatur, quod statum sensus penitus alienet, & quod mens à propria sede extermi-nata grauius attentetur. Vnde antiquiores sub cuiusdam religionis imagine sacram passionem nuncu-pauerunt. Hos ante commotionem aliquando certa signa præueniunt: aliquoties casus occupat repè-titus. Quos ergo in hac passione uiolentiùs exagitari cognouimus, ij commotionibus imminuentibus nūc sua membra grauari præsentunt, nunc crebris oscitationibus resoluuntur, & ad omnes motus pigriores fiunt. Tunc etiam oculos terribiles habere incipiunt. Tunc stridor prosequitur dentium, cum præcordio-rum tensione: distenti uel contorti cadescunt citius, atque colliduntur. Tunc omnium musculorum uel neruorum spasmi, & saltibus confringuntur: & uocis articulata quadam confusione, sonos magis & ulu-latus excluduntur. Ore & naribus, & sacrabiliter spumant, & ueluti dormientes, cum sonitu pectoris graui-us comprimuntur. Desistentibus uero commotionibus, præteritorum omnium immemores fiunt. His li-cet difficile succurri possit, & tamen pro causæ magnitudine, & pro ipsius professionis compatiencia, adiu-toria quæ competentia didicimus, aut exercuimus, non negabuntur. In inijs ergo huiusce passionis, frequenter eos uomere compellam: sternutamentis etiam prouocatis, eorum capita commouebo, uentre acri elytere procuro: frequenter adhibeo phlebotomum, semper huius causæ competens adiutorium. Temporibus uero commotionum, ora spumantia uili spongia detergo: membra sollicitè continebo, spasmi commota uel saltibus, quæ frequenter in ipsis commotionibus contorquentur: & lanis infusis o-leo ficyonio calido, sousebo correctæ. Pennas admoueo nitro & oleo ifusas, ex quibus faciles uomitus pro-curo. Poterunt etenim ex hoc, aut cibos, aut pinguia phlegmata digerentes, uelocius releuari. Exactis tribus diebus his, est in principio ieiunium indicendum. Succis tantummodo nutriendi sunt. Aquam fon-tanam calidam bibent, in hydromelle uel apiata si fuerit, non negetur. In hac enim sollicitudine, uini peni-tus præsumptio inhibenda est. Quiescentibus itaque commotionibus, ciborum humanior ordinatio,

Curatio.

Soluit difficile suum, respice, tunc
in casto magnitudine, & pro ipsius
passione compatiencia, sic adhibere
releuiant expecta.Istius passionis frequent vomitus.
Sternutamentis, uel elytere continebo.
Venter acri si forte & uomitus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.
Complures huius uel adhibere,
phlebotomus.

simplex attramen & digestibilis ordinanda erit. Iam fricari, uel exerceri debebunt. Cursus tamen uehementis penitus inhibendus. Solis calidioris, & balnearum calidarum uapor arcendus est. Cucurbitarum beneficia cum sanguinis detractione, capiti adhibenda ordinamus. Ordinabo dropaces, ordinabo etiam sinapismum, & omne cyclicum adhibendum esse suadeo: sed locis imponenda sunt unctiones: arteriorum facienda, quibus forte, si possumus, funestæ huius passionis perferantiam remoueamus. Huius etenim causæ magnitudini maiora sunt & frequentia adiutoria prouidenda. Nam quamplurimi sapientiores, etiam physicorum, adiutoria prouidere, in quibus (ut etiam nostro libello physicorum comprehendimus) magna, & ueluti religiosa remedia procurauere.

De scotomaticis. Cap. III.

SCOTOMATICORVM, & epilepticorum penè similis est in iisdem casibus sollicitudo: simili enim mentis confusione alienantur: Quantitate causæ, & magnitudine accidentium solum terminantur. Iuuenibus hæc quammaximè & otiosis euenire consueuerunt. Contingit etiam quibusdam, qui hemor-rhoidarum solennes euitauerunt digestiones. His licet cura epilepticorum sola sufficiat, attamen hoc ordine uisitandi sunt. Cum ergo commoueri coeperint, manibus continebo, auribus eorum indamabo, eadem fortius defricabo, capillos euello ex temporibus, odores naribus admouebo. Ex pulegio tunso, uel origano, aur sinapi cum aceto comixto, procurabo sternutamenta. Cibos in tempore competenti leuiiores dabo, & ad cetera quæ epilepticis adhibenda erunt. Vnum superaddo, quod hos frequenter hellebori acceptio liberauit.

De menomenis. Cap. IIII.

SUNT certa insignia, quæ menomenis produnt. Primò, ut cum sit sine febribus, caput sibi grauius dolere asseuerent, sonos aurium suarum exaudiant. Cum autem commoueri coeperint, aliquando cum hilaritate commouentur, aliquoties irascuntur. Hos sollicite custodire conueniet, & eis phlebotomos adhibere. Item post totius corporis uarias purgationes fomentandum est caput eorum oleo nardino: & ordinandum est, ut frequentius uomant. Ex cibis leuioribus, & aqua calida nutriantur. Ab alienationibus uerò eorum, quæ cum risu fuerint, terroribus coercendi erunt. Furorem uerò mollioribus blandimentis lenire conueniet. Interea eos ligaturis comodius custodiemus. Cubiculum eis in inferioribus procurandum est, ne per commotiones precipitentur. Caput eis post fomenta olei nardini, uel chamæmilini, radendum est. Item etiam scarificandum. Conuenit interea etiam sanguiugas admouere. Transactis uerò commotionibus, etiam quietis passionis temporibus, hordei facili ecori ordinandi sunt, ut ex eo magnum beneficium consequantur. Et si post hæc adiutoria, causæ uel commotiones adhuc in suo statu permanferint, in illo nil asperius attentetur: sed quæ sunt prius adhibita, identidem repetantur. Sin uerò plura augmenta causæ concreuerint, incilio uenarum in capite, & uestigio celebranda est. Danda liera, dandum helleborum, & cetera quæ epilepticorum curis ordinata sunt. Hanc curam etiam in epileptiis adhibere debemus.

De melancholicis. Cap. V.

ACCIDENTIA Melancholicorum manifesta sunt. In principio huius causæ, salutis suæ desperatione, primò proponentes mortis desiderium, frequenter coguntur in lacrymas: & deserta loca potius appetentes, hominum incipiunt uitare consortia. Aliquando rursus suam sententiam redamantes, uitæ solatio delectantur. Circa præcordia uerò de assidua inflatione queruntur: & cum sudore totius corporis importuno, frigidos articulos sepius pariuntur. Priuari se ob hoc etiam uiribus naturalibus asseuerant. Indigestione frequentiori stomachi fatigantur: ructus suos uarios & insuauis perhorrescunt. Calor illis intrinsecus fiet, & interiorum uiscerum doloribus frequentius attentantur. Vnde omnem curam quammaximè stomacho delegabo, fomentis, uel cataplasmatibus calasticis imminendo. Ventris officium prius inoffense procurabo, quo facilius etiam catartici depurgentur. Palæstra, uel gestationibus solidius exerceantur. Vini ueteris, & bene olentis, accipiendi copiam præbimus. Cibos aptos stomacho, maturiores, & largiores conuenit ministrare. Declinantibus uerò doloribus, absinthij pontici decoctione uindicti sunt. Et aloës iubeo puluerem ieiunos in Maio unius cochlearis in mellecrato accipere. Similiter etiam hieram quam picram ueteres appellant. Si his adhibitis causa diminuta non fuerit, phlebotomum sub gemitina detractione adhibeo. Vomitus eis cum radicibus frequentius procurabo. Etiam inter cibos helleborum aliquando dabo. Iuxta uerò, & adhuc hominum fugientibus societatem, longas indiciis peregrinationes, & aut marina, aut naturalia lauacra calidiora exhibebo frequentius.

De paralyticis. Cap. VI.

PARALYTICI multis ex causis fiunt. Etenim aut ex se hæc passio nascitur, aut præcedentibus ægitudinibus comparatur. Quæ grauior & difficilior fuerit, ea in præfatis corporibus consequitur. Igitur si paralyticus passus fuerit, caput prius est detondendum. Dehinc oleo scyonio fomentandum, præcedentibus interea fricationibus calentium sabanorum. His cucurbitæ uentrosæ sunt imponendæ, & apoplegmatis

De paralyticis aut ex se nascitur, aut præcedentibus ægitudinibus comparatur. Quæ grauior & difficilior fuerit, ea in præfatis corporibus consequitur. Igitur si paralyticus passus fuerit, caput prius est detondendum. Dehinc oleo scyonio fomentandum, præcedentibus interea fricationibus calentium sabanorum. His cucurbitæ uentrosæ sunt imponendæ, & apoplegmatis

ris competentibus medendi frequentius. Sternutamenta assidue procuranda sunt ex odoribus acrioribus quibus facilius possit pressa altitudo cerebri suscitari. Nam & alia naribus eorum supponenda sunt, ex uno sulphure, uel laetere, uel castoreo temperata. *Kuapaz qus* præterea, cui ex uicinitatis molestia, linguae uel uocis officium frequenter intercipitur, proprijs curis corrigendus erit specialiter: gargarismatis hyssopithymi, sinapi, cum oxymelite: salioribus nutriendi sunt, & catartics assidue releuandi. Si sub hac sanè diligentia parum medicina profecerit, uenam eis sub lingua secabo: nec non etiam tardas confusque eoru locutiones, sub disposita prouocatione compello, timorem incutiendo uel ignis, uel serpentis, ut correctiorem uocem tandem cogantur expromere. Caput eorum liquido cerotario frequenter infundo, ex castoreo præcedano, & oleo laurino, uel irimo temperato. Potionem temperatam ieiuno dabo ex castorei puluere ad mensuram cochlearis unius cum mellicrato. Dabo hieram ex more: dabo theriacam tempore competenti. Si autem ex frigoris causa, paralytis obuenerit, ut lepra aliquando corpus attentatur, fricatione calida, cubili tepelfacto, & acopis bene olentibus imminebo. Conficio è rursus mendi, uel marthubio, aut artemisia oleum non solum ad unguendum, uerum etiam & lanarum infusionem, quibus mēbra post curam semper calidis muniēda sunt. Cucurbitas interea locis pinguioribus admouebo: aquis chalcidicis fomentabo, pulegio, nepita, iri, Illyrica, hybisco, uel seminum decoctionibus. Acopa uero adhibeo ex pice, oleo laurino, resinaque, pipere, uel euforbio & adarce, coniectura medici temperata. Exercitijs competentibus membra recolligo. Frequenter hieram his dare conuenit. Quibus uero sensuum partes attentatae perierunt, ijs hiemis tempore, senili ætate laborantibus, unguenta hæc adhibenda erunt. Ex lolla, euforbio, thapsia, pyrethro, adarce, & oleo glaucino. Si loca emarcuerunt, diu hoc morbo uexata, cucurbitas, dropaces, lauacra, & cætera adiutoria similia, post cibos adhibebo quammaximè. Significo præterea aliquando paralyfin per solutionem obueneri membrorum: aliquoties per contractionem. Et quomodo hæc accidentia sibi inuicem contraria, sic non una diligentia uisitanda sunt: eorum itaque nunc curas determinabo. Collecta ergo membra, & ex causæ ui, repentina contractione diminuta, omnibus chalcidicis adiutorijs resoluenda sunt, mollibus manuum fricationibus, & unguentis ex diuersis adipibus, & medullis, quæ possint loca contracta relaxare. Vt fomentis similiter aquarum chalcidicarum, ex seminu decoctionibus, & altheæ radicibus. Indico interea, solam aquam calidam esse bibendam. Sanè concedendū est, aut apitum, aut hydromelite. Resoluta uero membra, omnibus stypticis adiutorijs, & frigidioribus colligenda sunt, sicis fricationibus, unguentis quoque mordentibus, ex oleo cyprino, uel calce uina, euforbio, castoreo, adarce, & similibus cæteris temperatis. Nam & ligna iacentia, subinde eos suadebo transcedere debere. Sanè si pes ex hac resolutione dimissus, usum penitus denegauerit, laminam plumbi prius unciarum trium, articulis eius pedis admouebo, in tertium diem uncias singulas superaddens. Hoc diebus XL. seruabo: ut illam ponderationem, quæ eo tempore creuerit, usum nonerint sustinere. Post uero, simili modo quæ superaddita fuere plumbi, detractus sum: quo pes, qui cum colligaretur, pondera sustinebat, eadem subductione releuetur. Interea quotidie horis matutinis lamina detracta, unguentis, & cæteris adiutorijs imminebo. Hoc uitium plerumque etiam in oculis euenisse uidimus. Nam phthisis & mediæ certissima paralytis oculorum est. Quæ phthisis ex contractione uel diminutione pupillæ contingit: ex resolutione uero uel dissolutione pupillæ, mediæ, quam medici platocoriam appellauerunt. Diuersis ergo eorum accidentibus, diuersæ curæ disponendæ erunt: ut altera fomentis, & inunctionibus stypticis, & constringentibus colligatur: altera chalcidicis omnibus & nutritibus relaxetur. Sed de utrisque difficilior est mediæ. Etenim generaliter in omnibus causis facilius restricta resoluimus, quam resoluta constringamus. De aquis uero naturalibus certissimum est, quomodo dulcia semper & calida lauacra corpora relaxant. natura uero salsa uel bitumineæ, uel sulphureæ, relaxata corpora collegerunt.

De catarrho.

Cap. V I I.

OMNIS *κατάρρο* sollicite uisitandus est: cui origo & principium de capite nascitur. Deriuatio enim ex eo defluens, per varias arterias, continuo quæ attigerit loca perfundit, & sic perseverantia neglecta debilitat. Nam sub tribus differentiis ex hoc causæ fiunt. Fit in naribus, cui nomen est Coriza. Fit in faucibus, quod dicitur Bronchos. Fit in thorace, qui si diu permanserit, & pulmones inuaserit, phthisin penitus insanabilem facit. Præterea cum ad inferiora se præceps demerserit, secum trahens ui & pondere materiam uitiorum, levis frequenter præcordiorum uitalibus locis, aquas passionis transitu infigit, & tandem desperata pedum loca occupat, difficile remouendus. Sed primum cum omne corpus inquietat, & ueluti quoddam pondus cum dolore, omnes particulas corporis sine febribus apprehendit, descensu eiusdem rheumatis è capite similiter etiam antea, quammaximè sollicitabo: cui cum cæteris uicinis & proximis membris, hanc diligentiam interim ordinamus: insequenti etiam specialem, pulsatis, uel occupatis partibus designabo. Omne igitur corpus calidis & siccantibus unctionibus perungimus, cubiculo munito & calefacto. Operimentis in super lanarum mollium infusionum, caput morborum omnium causam, calido oleo cyprino, uel laurino, siue glaucino frequentius curo. Conueniet interim per initia rheumatizati diu quietem interdici. Conueniet similiter etiam portiois detractio, sub qua fitis procurata multum profuit. Sed magis obest falsus cibus, siccas autem sub utriusque coactione ebrietas protinus arceatur. Ventrem præ omnibus purgandum moneo. Sanè cum his adiutorijs humanius causa profecerit, unguitis tunc supradictis, cum tali fricatione imminebo. Vt palestræ exercitio inuenitur quammaximè opus est;

Timotheus dicitur sollicitus uisitare omnes catarrhos, quod est principium de capite nascitur. Deriuatio enim ex eo defluens, per varias arterias, continuo quæ attigerit loca perfundit, & sic perseverantia neglecta debilitat. Nam sub tribus differentiis ex hoc causæ fiunt. Fit in naribus, cui nomen est Coriza. Fit in faucibus, quod dicitur Bronchos. Fit in thorace, qui si diu permanserit, & pulmones inuaserit, phthisin penitus insanabilem facit. Præterea cum ad inferiora se præceps demerserit, secum trahens ui & pondere materiam uitiorum, levis frequenter præcordiorum uitalibus locis, aquas passionis transitu infigit, & tandem desperata pedum loca occupat, difficile remouendus. Sed primum cum omne corpus inquietat, & ueluti quoddam pondus cum dolore, omnes particulas corporis sine febribus apprehendit, descensu eiusdem rheumatis è capite similiter etiam antea, quammaximè sollicitabo: cui cum cæteris uicinis & proximis membris, hanc diligentiam interim ordinamus: insequenti etiam specialem, pulsatis, uel occupatis partibus designabo. Omne igitur corpus calidis & siccantibus unctionibus perungimus, cubiculo munito & calefacto. Operimentis in super lanarum mollium infusionum, caput morborum omnium causam, calido oleo cyprino, uel laurino, siue glaucino frequentius curo. Conueniet interim per initia rheumatizati diu quietem interdici. Conueniet similiter etiam portiois detractio, sub qua fitis procurata multum profuit. Sed magis obest falsus cibus, siccas autem sub utriusque coactione ebrietas protinus arceatur. Ventrem præ omnibus purgandum moneo. Sanè cum his adiutorijs humanius causa profecerit, unguitis tunc supradictis, cum tali fricatione imminebo. Vt palestræ exercitio inuenitur quammaximè opus est;

THEODORI PRISCIANI AD

ut inferiora fortius deficiantur. Euocatus etenim de superioribus rheumatismus, sollicite superiora loca, que cum periculo attentare poterat, derelinquit: & sic civili medicine iam beneficio, & agnitione repugnamus. Unguenta supradicta cum balsamo temperata dabo: potionem uini, & mellis ex aquo, ubi rursus uiridem coxi dabo. Ibi et pyretici dabo: ibi piperis puluerem aspergam. Interea cum nares occupauerit, ad motus odoribus ex melanthio, mirigabo, & uiridem frequenter cum unctionibus superioribus ungenti sunt. Si fauces iniquitauerit, gargarismatis stypticis imminebo, quæ in primo Phænomeno ordinata transegiimus, perseverantibus sanæ adiutorijs, capiti totoque corpori unguentis superioribus. Si thoracem occupauerit, loci naturam, uel uicini pulmonis intuentis sollicitius uisitato, instans & ceteris supradictis unguentis confectis cum opobalsamo: quod de altitudine ad thoracis superficiem reuocare possumus rheumatismum. Si tussicula superuenerit, quæ mala uicinitate, quasi quadam contagione sollicitat: habita consideratione, si humor ille in thorace diu refideat, deponendus est: perseverantibus attamen prioribus adiutorijs, superaddo, plantas eorum pice liquida tangi debere, & fricari unguentis supradictis eam partem pectoris: ad motus proxime carbonibus, quo plus aut euocare in superficiem, aut loco siccare rheumata ualeamus. Interea licet etiam contritionis molestia sæpe præualeat, ita ut phlegmata difficiliter egerantur, quorum digestio tussientes releuare consuevit, his decoctionibus, uel potionibus dari faciam, ex origano, thymo, ruta uiridi cum mellificato, aut melle despumato confectas, & pinguium flicorum decoctionem cum oxymelle. Et si identidem, humoribus multum solutis, fluxus sputorum inquietudine, & uigiliis procurabit, tunc ad eorum coagulationem, uel digestionem, succum pituitæ, uel alicui dabo, aut lentem cum melle coctam. Dabo omnes pulres cum pipere. Dabo fassamenta quæ uolet. Dabo in nocte antidota, piper & myrrham, storacem, galbanum, apium, cum melle attico temperata: quæ & coagulare ualeant phlegmata, & somnos inuitent: quæque sui natura & soluta constringant, & beneficio præstanti tussire minus faciât dormientes. Igitur cum diu pertinax rheumatismus, adiutorijs medicine desistentibus, quod aut locorum aut substantiarum aut certe medicorum inopia contingere solet, pulmonibus unctionem fixent, pthysin incurabilem facit. Huic nunc pro causæ magnitudine, uel præiudicio temporis, curam ut possumus, & diligenter ordinamus.

De pthysicis. Cap. V. I. I. I.

PTHYSICVS & apoplecticus una sub sorte, uel conditione medicine desperat, quod & ueterum sententia sic fuit diffinitum. Unde per initia eos ut possumus medicine remedio iuuamus. Chronicos uero plena sub desperatione, non iam ut medicorum medelis, sed magis amicorum solatio uisitamus. Ergo per initia spe, sub qua futuros nos omnes labores impendimus, hoc ordine pthysicos curabo. Febrium ergo frequenter his, & necessitate accidentium tempora considerans, cibos & adiutoria ministrabo. Consequenter etiam sub quodam ueluti typico caractere, uel pertinis magis febribus commoueri, ut aliquando cotidie, aliquoties circa diem tertium moueantur. Cibos itaque sobiles dabo: & si uirium alia nos cura constrinxerit, concedo etiam solidiores pulres, quas uolent agnorum cerebra uel hocedorum, ungues caprarum siue porcorum, uel succum, ubi supradicta decoxerint: aut certe apozyma, ex salibus, oleo, & anetho, & aqua, ubi eadem ungula supradicta maduerint. Dabo caponum maiorum testes: dabo columbos materibus: dabo pisces aspratiles: dabo conchyliæ in ipso uapore, ex anetho, libistico, pipere, & similibus ceteris, melle, & aceto commixtis. Desistentibus aliquando iam febribus, etiam fassamenta ministro: tunc totius corporis exercitamentis, ut prius in palestra, pro uirium consideratione uti cõueniet: quam maxime autem capitis gutturis, uel thoracis adiutorijs immineo: sicubi, natura consentiente, corpus omne iam rheumatismo plenè possessum, aliquatenus ualeam desiccare. Dabo antidota ex pipere, dabo theriacam cum mellificato: dabo diaprason: adhibeo epithemata simili sub uirtute operantia, quæ calefaciendo loca desiccare contendant. Caueant uerni & autumnii tempestates: caueant æstus & frigora. Et si sub summa desperatione iam eos obsiderit nature fragilitas, & cauteria partibus thoracis infigo: si forte patefactis uulnerum meatibus, eorum digestionibus releuentur.

De sanguinis effusione interiorum. Cap. I. X.

SANGVINIS effusio, licet pro locorum qualitate aliquando salubris existat, attamen generaliter omnes cum horrenda & terribili inspectione uisitantur. Fit itaque locis diuersis sanguinem emittentibus subtrina uulneratione causatio. Fit primò crepatio. Fit deinde putredo. Fit ex utriusque superioribus, eiusdem loci uel uenæ paruum orificium incurabile. Locorum itaque emittentium nomina, curis interpositis designabo. Cum ergo ex minigæ partibus sanguis eruperit, qui uapore quodam, cum salu uenarum, cum sudore, & dolore totius capitis publicatur, hoc pacto constringendus, uel robandus. Thuris, uel manne thuris, aut naxi, aut amyli, aut puluere terre tenui aspergendus est: aut cum aceto mixto illiniendus. Huic fatus ex oleo roseo infrigidato adhibendus est, aut de succis herbarum, & specialiter stypticarum: ut est arnoglissa, & nigra portulaca, rubus, rosa sicca, uel cetera. Cibi uero calefacientes minigam prohibendi sunt. Cum de oculis hemorrhagia emerferit: aqua frigida, uel posca defricandi erunt: consequenter uero moris pinguibus iniungendi sunt, & ceteris quæ in subiectis uenis crepantibus adhibuimus. Cum de auribus sanguis eruperit, aqua his, uel posca frigida infundenda erit, & cetera quæ oculis facienda esse ordinauimus. Cum de naribus eruperit, Phænomenus libellus superior, omnem eorum curam.

curam edocebit, & instructionem. Cum de faucibus, uel gutture, uel de palato eruperit, succis frigidis, uel stypticis insistemus. Cum de uua, postea primo frigida imminendum erit. Quæ si minimè ualuerit prohibere, uirgulâ auri, uel argenti igne calefactâ, loco sanguinanti suppono: ut ex hoc cautere protinus coëscatur. Cum uero de stomacho obutenerit, dabo ad masticandam glycyrrinæ furculum, dabo lymphiti radicem, dabo gummi, dabo dragatum: dabo postea frigida, ubi naxi puluerem aspergo: dabo similiter amylin tritum, dabo rhaponticum, dabo etiam cum succis herbarum stypticarum, quas superius memorauimus, cibos stypticos, aut ex oryza, aut ex lente, uel succis eorum, in quibus illa styptica coquenda erunt. Dabo interea mala citionia: dabo pira, corna, sorbaque, & castaneas, uel horum decoctiones. His etiam diacodio conuenit in nocte accipere. Nam & eclegmatia styptica conueniunt: ut est aut diatheon, aut diatheaco, aut certe barbara, quæ debitumine iudaico conficitur. Cum de thorace emerferit, quod sollicite uisitandum est, primum phlebotomus adhibendus, & cibi ordinandi sunt. Eorum uero articulos, uel extrema membra, fasciculis comperenter attingo: spongiam uero postea frigida infusam, thoracis partibus adhuc calentibus superimpono. Imminebo huic adiutorio, diebus continuis, quandoque frequentius immutandum. Post uero emplastris uti nos conueniet, superius ordinatis de stomacho accidentibus: quibus commodius lanas succidas superimponimus, oleum quoque myrreum, uel lentiscinum mixtum cum aceto. Si his adhibitis, sanguinis adhuc perseverauerit insolentia, detracto aceto, uinum est commiscendum. Accidentibus uero febribus, si etiam tussicula coeperit inquirere, cataplasmandi sunt de subiectis: ut sunt dasyli, sorba, rosa ficca, flos maligranati, acacia, hypocistis, alumē. Omnia hæc simul, aut quæ inueniri poterint, in succis rois lyriaci coquantur. Horis uero quibus sanguinem detraho, ex decoctionibus supradictarum specierum, aut immaturarum uuarum, aut uitium acerbarum, aut polygoni, aut castanearum ingero potiones. Cum autem de pulmonibus hoc emerferit, quod ualde periculosum est, sub gemina, uel terna sanguinis detractione, phlebotomum adhibere conueniet. Et his omnibus imminebo, quæ de thoracis partibus eminentibus ordinata sunt, tam in cibis, quàm in cæteris adiutoriis. Hos interea, cum aliquid proficere cognouerimus, unctionibus, quibus membra inania nutriantur, mediocriter perungimus. Cum de partibus sanè muliebribus sanguis eruperit, his in inguina injici quid expediat, libelli sequentis lectione disposui. Vnum interea hoc generaliter edico, omnibus ex locis interioribus, ex quibus sanguis poterit eructare, per initia cuncta adiutoria, uel præcepta frigida, quæ constringere, & glutinare poterunt, adhibenda esse: in sequenti uero, cum humanior præuentus causarum ariserit, calidis & nutrientibus imminendum est.

De empyicis. Cap. X.

EMPYICI frequenter sunt, ulcere in interioribus, uel apostemate præunte. Quibus cum febres superueniant, temporibus consideratis, & adiutoria, & cibi parciore, sunt ordinandi. Tunc cum maxime hora eos accipiendi coegerit, cataplasmandi sunt. Interea ex hyssopi puluere, uel abrotoni, mixtis seminibus, in decoctione pinguium caricarum. Dabo frequenter mellicratum simplex: Dabo etiam in quo pulegium, aut hyssopum, aut thymum, aut ruta uiridis, aut marthubium decoctum fuerit. Aspergo sanè in mellicrato, ad uulnera interiora purganda, puluerē irios Illyricæ: & eclegmate utor, quod ex lini semine fixo, cum nucleis, & melle despumato conficitur. Hippocrates uero, nucleos cum galbano, & melle atico, in his similibus causis, ad depurganda uulnera dari præcepit. Similiter etiam terebinthinam mundam in mensura unius cochlearis, ieiunis quammaximè, & uiribus iam reparatis, atque his adiutoriis releuatis. Etiam hieram dari conueniet. Iam tum etiam exercitia, & fricationes, ad reparanda corpora, adhibenda sunt, quibus reliquæ causarum possint mundari facilius. Hos etiam aeris mutatio multum iuuat. Cibus uero, siue pulles frequentius accipiant, quibus piper admiscendum est. Hoc etiam in cæteris dari conuenit. Nam & antidota, quæ forte de experimentis empyicis danda sunt, mixto pipere conficiuntur.

De syntexi, uel atrophia. Cap. XI.

MULTIS præcedentibus causis, nascitur syntexis, uel atrophia. Fit ex uentris solutione proluxa. Fit ex febribus similiter chronicis. Fit ex uestione thoracis. Fit ex capite rheumatizante frequenter: quæ licet difficile, attamen curari potest. Fit etiam per sanguinis emissionem, pulmonibus uulneratis, in quibus frequenter phthisis illa insanabilis generatur. Aliqui uero iactantiores habiti, ueluti suam peritiam uel dilectam diffamantes, σωτηρικῶς curauerunt, quos phthisicos mentiebantur. Nā & præter sanguinis emissionem hi syntectici, uel ἀτροφοί, ex proprijs accidentibus sunt, quos tussicula exagitat perseverans. Hos indeficiens sollicitat sudor, hos certè macies, & tenuitas corporis, circa dies singulos, uires simul eliminando consumit. Quibus curam maiorem impendo in illorum reparandis uiribus. Sicut illis uinum leue, & album, balneæ, deambulatorio, uel gestatio, unctio, uel fricatio, cibi aneleptici mediocriter administrentur. Frequenter enim membris & uiribus reparatis, phthisis imminens, uel hæc eadem perseverans ægrotudo, depulsa est. Iuuantur locorum uel aeris mutationibus: & his utilius longas peregrinationes indicimus. Dro paces, & cætera quæ cyclo cōsueuta sunt, adhiberi partibus præcordiorum, & capitis uiribus reparatis adhibeo. Aquis naturalibus uti plus conueniet. Et si aliquod adhuc ex superioribus accidentibus perseverauerit, syntoma superiorum ægrotudinum remedijs adiuuabo.

Sanguinis effusio pro locis
inter, alijs salubris.
Cum in uis uentris & terræ
potiones uisibiles.
Sanguinis sub trina uulnera
causatio fit. Cerebrum, p
et strag, loci uel uis patet
incurabile.
Cum uis uentris pro uarijs
si ex meningis partibus, sanguis
uapores cum se uis uentris, &
do loci capitis publicatur.
Folius & affusio m
Cau. a ubi cal.
Cum de oculis, hemorrhagia et
in aduocanda.
Cum de oculis, uis uentris, &
guttur, palato, uis uentris, &
Vigila uis uentris argenti cal
Sanguinis, supponenda, &
causatio protinus compescit
Si de uentris, & uis uentris
Gestatio. & ubi typ
Eclegmatia styptica.
Si de thorace, sollicitudo
phlebotomia, ad
Arteriæ & ex thorace, fumer
compotens, affusio
Spongia, uis uentris, &
frequenter immutanda
Cum aduocanda. Cum
Cum uis uentris, &
Aciditudo, febribus, &
expositio inuicem, causat
potionem m.
Si de pulmonibus, durescit, &
ulcerum est.
Cum phlebotomus sub gemina
Sanguinis detractione
communia ad thoracem
Cum uis uentris, uis uentris
uirus.
Si de uentris, muliebribus.
Cum hoc uis uentris, &
ex locis interioribus, ex quibus
potest eructare, per uis uentris,
ulcerum frigida, & constringere
nare possunt, adhibenda.
In sequenti uero, cum uis uentris
causatio ariserit, calidis
fit. immutandum.
Empyici ab ulcere in interioribus
apostemate protinus.
Si fit suppuratio, cibi
& uaria pro temporibus, adhibenda.
Cataplasma, uis uentris, &
Kivis uis uentris, ad purgandum
Eclegmatia, comp.
piper terebinthinæ
excretionis, fricatio
reparatio
Kivis uis uentris, causatio
fit uis uentris.
Cibi & piper, piper
fit adhibendum.
Si uis uentris uel ad
fit ex uentris fluxio
ex febribus, a uis uentris
ex uisione thoracis
ex cap. & uis uentris
ex pulmonibus uulneribus
Nota. Hic illa in
Nam qui iactantiores habiti
sunt peritiam uel dilectam
ter, & uis uentris, &
quos per uis uentris mentis

Curam edocebit, uel instructionem.
Cum de faucibus, uel gutture, uel de palato eruperit, succis frigidis, uel stypticis insistemus.
Cum de uua, postea primo frigida imminendum erit.
Quæ si minimè ualuerit prohibere, uirgulâ auri, uel argenti igne calefactâ, loco sanguinanti suppono: ut ex hoc cautere protinus coëscatur.
Cum uero de stomacho obutenerit, dabo ad masticandam glycyrrinæ furculum, dabo lymphiti radicem, dabo gummi, dabo dragatum: dabo postea frigida, ubi naxi puluerem aspergo: dabo similiter amylin tritum, dabo rhaponticum, dabo etiam cum succis herbarum stypticarum, quas superius memorauimus, cibos stypticos, aut ex oryza, aut ex lente, uel succis eorum, in quibus illa styptica coquenda erunt.
Dabo interea mala citionia: dabo pira, corna, sorbaque, & castaneas, uel horum decoctiones.
His etiam diacodio conuenit in nocte accipere. Nam & eclegmatia styptica conueniunt: ut est aut diatheon, aut diatheaco, aut certe barbara, quæ debitumine iudaico conficitur.
Cum de thorace emerferit, quod sollicite uisitandum est, primum phlebotomus adhibendus, & cibi ordinandi sunt.
Eorum uero articulos, uel extrema membra, fasciculis comperenter attingo: spongiam uero postea frigida infusam, thoracis partibus adhuc calentibus superimpono.
Imminebo huic adiutorio, diebus continuis, quandoque frequentius immutandum.
Post uero emplastris uti nos conueniet, superius ordinatis de stomacho accidentibus: quibus commodius lanas succidas superimponimus, oleum quoque myrreum, uel lentiscinum mixtum cum aceto.
Si his adhibitis, sanguinis adhuc perseverauerit insolentia, detracto aceto, uinum est commiscendum.
Accidentibus uero febribus, si etiam tussicula coeperit inquirere, cataplasmandi sunt de subiectis: ut sunt dasyli, sorba, rosa ficca, flos maligranati, acacia, hypocistis, alumē.
Omnia hæc simul, aut quæ inueniri poterint, in succis rois lyriaci coquantur.
Horis uero quibus sanguinem detraho, ex decoctionibus supradictarum specierum, aut immaturarum uuarum, aut uitium acerbarum, aut polygoni, aut castanearum ingero potiones.
Cum autem de pulmonibus hoc emerferit, quod ualde periculosum est, sub gemina, uel terna sanguinis detractione, phlebotomum adhibere conueniet.
Et his omnibus imminebo, quæ de thoracis partibus eminentibus ordinata sunt, tam in cibis, quàm in cæteris adiutoriis.
Hos interea, cum aliquid proficere cognouerimus, unctionibus, quibus membra inania nutriantur, mediocriter perungimus.
Cum de partibus sanè muliebribus sanguis eruperit, his in inguina injici quid expediat, libelli sequentis lectione disposui.
Vnum interea hoc generaliter edico, omnibus ex locis interioribus, ex quibus sanguis poterit eructare, per initia cuncta adiutoria, uel præcepta frigida, quæ constringere, & glutinare poterunt, adhibenda esse: in sequenti uero, cum humanior præuentus causarum ariserit, calidis & nutrientibus imminendum est.

ASTHMATICIS, uel suspiriosis querela pulmonum est. Pingui etenim & frigido phlegmate pulmonibus adhærente, cauernæ, uel meatus, quibus naturaliter spiritus redditur & accipitur, concluduntur: & ex hoc impedimento, suspirium, uel anhelitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis quam iacendo respirent. Hieme senibus quammaximè hoc uitium familiare est. Contingit aliquando etiam medijs ætatibus, adhuc calidis: quos phlebotomo liberari necesse est. Attramen si etiam & à phlebotomo cetera ratione prohibemur, tunc ieiunijs frequentibus, in uicem detractionis sanguinis, uti conuenient. Proderit etiam potandi continentia: proderunt cibi cum oxymelle, & pipere temperati. Dabo interea hyssopi, aut oryzae, aut rutæ, aut absinthij, aut irios Illyricæ, aut caulis decoctionem, ex melleificato calidam. Item conficio ex his etiam eclegmata commoda suspiriosis. Conuenit etiam guttam ammoniaci dari, tritam cum melleificato, uel oxymelle. Abrotomi puluis similiter datur, & castorei puluis commodius operatur. Et illa decoctio, in qua foenogrecum cum uina emulcata, & rutam uiridem coquimus, frequenter danda erit. Sunt etiam troscisci magna approbatione diffamati, & conficiuntur sic. Anellum, sulphur uinum, guttam ammoniacam, castoreum, & melanthium, ex æquo omnia trita, cum aqua miscentur, & fiunt troscisci: quos postea tritos cum oxymelle dare conuenient. Cubiculum his calidum, in superioribus procurandum est: relaxandis enim corporibus semper sunt inferiora contraria. Lectus accersendus est, & pectus eorum calidis unguentis, & uaporibus defricandum. Cucurbitas continuo cum detractione sanguinis admovebo. Proderunt per intervalla amyctica: etiam dropaces adhiberi proderunt. Sinapismus proderit. Asthmaticis iuuat peregrinatio longior: iuuat uomitus radice cum oxymelle acceptæ. Conuenit exercitium: proderit currere cum uestibus laneis quammaximè, si hoc in procliuitate procuratur. Utatur emplastris circa pectus amyctici, confectis ex nitro, pipere, abrotano, & castoreo, & cyprino uel laurino cerotario. Ex quibus supradictis etiam potiones & unguenta conficio. Conuenit acetum scylliticum forbere in nocte: Ex eodem confectum oxymel, potui dare plus conuenit.

EPATIS indignātis molesta querimonia est. Cuius ad curam adiutoria magis etiam styptica conueniunt. Sepe enim nonnulli methodici calidis tantummodo uel chalafticis adiutorijs imminentes ipsam epatis substantiam dissoluerunt. Oportet itaque in fomentis, uel cataplasmatibus, cerotarijs & emplastris aliqua styptica chalafticis admiscere: ueluti oenanthinum, nardinum oleum, uel melinum, mala citrina costia, uel thebaicos dactylos, & cetera similia. Fit interea hoc cerotarium competens cerebrum. Nardini olei uncia I. mastiches perficæ unc. I. aloës semuncia I. Hoc epaticis non modo conuenit, sed stomachi etiam solutione laborantibus: ita ut aliquando & uentris solutione, & uomitu, & frequenti nauſea commoueantur. Quibus si hæc adhuc perseuerent, admisceo cerotario supradicto aut licium indicum, aut oenanthinon facio in singulis semuncijs admisceri. Articuli eorum tunc fasciis constringendi sunt, & stomachus aliphitis cum uino cataplasmandus. Si illa indignatio epatis ex constrictione magis obuerit, ut cum tensione, uel cum duritia loci, dolor nimius partes inquietet, qui & iugulo, & omni parti dexteræ molestiam ferat, febres acutas commoueat, uentris quoque procuret constrictionem, digestionis licet ex leuibus cibis non exhibeat officium naturale, interea ructus frequentes inſuauis habeant, cum uirium fatigatione, pallore quoque corporis deformentur: hos primo conuenit inuari phlebotomo. Item oleo, ubi ruta, scilicet oenanthon, papauer, lini semen coctum fuerit, calido fomentari. Cataplasmandi sunt etiam pectus competenti commotionis de hordei pollinibus, ubi diuretica aliqua commixta fuerint: ut asarum, ut petroselinum, aut pulegium, aut daucus, aut foeniculi semen, & cetera similia in mellificato, in quo hybiscus, uel ficus pingues prius coqui debent. Vtuntur centaurea post cataplasmata, ex oleo samſuci, habente quippiam salis, uel nitri, uel nasturtij, aut sinapis: semper attamen samſuci necessarij omnibus epaticis fuere. Vti tunc conueniet etiam diachylon chalaftico, cui adipēs commiscendi sunt: aut certe diaspermation. Declinantibus uero accidentibus, tunc etiam malagmate imminebo tali. Guttæ ammoniacæ libra I. nigellæ unc. III. orobi unc. I. myrti semuncia I. cere libra I. olei cyprini siue nini unc. VIII. aceti quod sufficiat: in quo gutta ammoniaci & soluenda est, & terenda etiam. Tunc fricamentis, & exercitijs competentibus opus est: tunc potionibus, & decoctionibus absynthij, centaureæ, rutæ agrestis, siue petroselini, cyperi, uel hyssopi, thymi, & ceterarum diureticarum, æquis ponderibus. Quæ potionēs etiam uitiosis uescis ordinatur. Sed etiam aloën solam tritam frequenter in mellificato dedi. Declinante penitus uitio, hanc instanter potionem dabo. Castoreum, petroselinum, piper album, cyperum, omnia æquis ponderibus tunduntur, cribellantur, & in mellificato unius cochlearis pleni, dantur. Omni probatione firmatum, frequenter etiam lupini tectoris combusti puluerem dedi. Aliqui uero amygdala amara, cum cymino & apij semine, æqua mensura omnia cum uino iunxis dederunt, ad mensuram unius cochlearis: & semen intyborum cum aqua calida, uel mellificato similiter adhibuerunt. Sic & anethi succum cum mellificato, & cetera, quæ huic passioni alij collegæ proba esse fuerunt attestari. Nam & intyba frequenter comesta, semper, epaticos iuuere. Si duxerit longum tractum morbi neglectus, omnia adhibeo, quæ difficultatem callositatis resoluerē ualeant: omni tempore passionis, exercitijs omnibus superioribus imminebo,

Si luxuriet longae terrae humi
vires nequebit, omnia adhibenda
et significante colligebat, ut col-
lecto valent.

¶ mi fempore vylioni, exercitij
foponit, ^{immittit} ^{con-}
suet affensa laucera,
Celi fup-^{er} aces.
Plorum delectus, pifcium,
f de cornium.
fius columbulis, fiffamena,
cappans, vium meitura.
¶ mifalogen vigne, vapores,
de fofe, et aere mifalene,
autem pifga.
¶ fup aquas mifura, et mif
laucera.

nebo, omnia superiora lauacra concedo, saluos cibos & acres ministrabo. De oleribus autem accipiant cau-
saules, lapathum, radices quas raphanos appellamus. De piscibus, aspratiles sumant. De carnibus, quæ in-
ueniri poterunt pinguiore. Oliuas colymbades, omnia salsamenta, capparon, uinum quod mare transie-
rit. Et omnibus supradictis adiutorijs, emplastris, uel malagmatibus, unguentis, uaporibus, & cæteris uti
conueniet. His etiam ardor solis, cum aeris mutationibus multum prodest. Aquarum uero omnium natu-
ralium, uel maris lauacris, eos frequenter iuuari assero.

De ictericis. Cap. XIII.

Eugenia

I A M multis in locis itericorum descripsimus passionem. Fit enim ex hepatis indignatione frequenter quorum nonnulla similia sunt accidentia, sed coloris deformatione sola determinantur. Fiunt etiam ex stomachi uitio: fiunt plerumque etiam ex uentre inferiore. Ergo cum febribus si de hepate est itericus, plethoromandus est: & mox omnia hepaticorum adhibenda sunt adiutoria. Si autem a felle fuerint, iterici, purgationibus cholagogis releuandi sunt, euforbio, epithimo, aloë, petroselino, pipere. Hæc omnia ex æquo miscēda sunt: & ex eorum puluere unum cochleare in mellicrato, uel oxymelle dari debet. Purgat eos etiam cicris albi decoctio: utilius, si etiam ipsum cicer coctum accipiant. Iuuantur absinthij potius decoctionibus. Iuuantur etiam, si aphonitra alba in uino soluta accipiant: & sulphuris puluerem in uino ego frequenter etiam dedi. Sed fortè aliqua ratio dare cathartica prohibuerit, quæ semper his nouimus non leuiter profuisse, saltem uel uomitibus releuandi sunt. Sollicitius interea præcordiorum cura gerenda est, fouendo, hepatis tumens & incitatum, oleo nardino, melisso, cenanthino. Ex lanis succidis fomentans, in balneis cataplasma: interea admiscens seminibus, aut absinthium, aut rutam, aut centauriam, aut cardamum, uel cætera, quæ hepaticis ordinata sunt: quibus urinas prouocantis, tumorem hepatis possumus remouere. Vt specialiter etiam cyprino cerotario, admiscēs terebinthinam, melilotam, irin illyricam, & reliqua similia, quibus aut diameliloron, aut polyarchion confici consuevit. Cibis nutriendi sunt ut hepatici, exerceri, similiter & fricari. Vitio adhuc perseverante doloris, omnibus amycticis imminere, reperiuntur, & solis radii beneficia sustinere suadeo. Aquis naturalibus æquè uti conueniet. Si vomitus accidentibus, adhuc ille nimis labor perseverauerit, naribus infundo claterum, infundo claterij succum: utrinque muliebri lacte commixtum. Iuuantur interea utilius, si hæc digestiones uel purgationes in balneis procurentur: in balneis inquam, ubi quammaximè potiones, & cætera semper adiutoria profuerunt. Nam & illicerum præcordiorum fortis continuò profuit adhibitus, & cortex colocynthidos in uino calefacto datus profuit. Et struthij patris in cenomelle similiter, & anchusæ puluis ad mensuram unius cochlearis cum aqua calida, & lapathij succus in mellicrato, & decoctio radicis forniculi, & cæterorum, quorum est præsidium diureticum. Hanc autem peculiariùs potionem in balneis dare consueui. Euforbium, baccas lauri, nitrum, piper, ex æquo contusum, pro causa, uel iuniorum qualitate in mellicrato: & cum profuisset, in plenam sanitatem imminui.

De spleneticks. Cap. x v.

IN PLERISQVE passionibus, catholici, siue generalibus curis, prius adhibitis, specialia uel parti-
cularia adiutoria melius adhibentur: unde spleni nunc adiutoria prius ex catholici ordinamus. Opor-
tet initium curæ ex ieiunijs & patientiâ inchoare. Item cathartico, uel phlebotomo. Post uerò his specia-
libus adiutorijs splenem sic curare conueniet. Aceto, & oleo æqua mensura, cōmixto calido, infusis lanis
succidis fomentandus est. Et spongijs posca calida infusis similiter locus uaporandus, cui cinis ex foco te-
nuis aspergendus erit: & lapides molares ignificati aceto extinguuntur, & operi panis loco imponun-
tur. Et faccelli de salibus ignitis impositi profunt, & cataplasmata de hordei pollinibus in oxymelle, cui
admiscendus est radix capparum tunc puluis. Et emplastra hæc utilia superaddimus. Guttam amonia-
cum, nitrum, mirabolanum, myrrham, sinapi, æqua ponderatione omnia miscenda, & temperanda sunt,
cum pinguibus ficibus, prius aceto coctis & contritis. Aliud emplastrum. Hordei firinæ unc. I I I. fœ-
nogreci unc. I I I. cartami unc. I. herbæ paritaræ unc. I. ficos pingues unc. VI. cum aceto temperandum,
sicuti superius ordinatum est. Aliud de expertis. Cardami unc. I. iris Illyricæ unc. I. gutta ammoniaci
unc. I. quod mirabolanum appellamus, resinæ pituinæ fixæ ana uncia semis, sulphuris uiui, auripigmen-
ti ana unc. I. olei scyonij unc. I I I. aceti unc. I I I. Datum aliud simile. Resinæ pituinæ, picis briciæ
ana libras I I. auripigmenti, aluminis scissi ana lib. I I. aceti unc. I I I. olei lib. I. tantum conficies, & utē-
ris. Est consuetum aliud, & spleni, & epati cōueniens in febre utrorumque tum etiam precordiorū.
Crocomagmatis unc. I. ceræ lib. I. olei rosei unc. VIII. gutta ammoniaci lib. I. aceti quātū sufficit ad gut-
tam ammoniacam dissoluendam. Hæc omnia emplastra, uel malagmata conueniunt splenibus indignan-
tibus. Quibus expedit ab omnibus dulcibus abstinere. Sanè si splen duritiā adduxerit, quæ de hydro-
pe superuentura plus terreat, etiam his portionibus imminendum est. Acetum scylliticum sub noctē
ad mesuram unius cochlearis sorbei debet. Garum calidum bibant, ubi ferrum calidum igneum extingui-
tur. Aut de utrisque poscam temperatam accipiant, & utatur decoctionibus capparum, aut lapathij, aut ta-
marici: aut ubi forte myrrhā infuderis. Ad modū palestre fricari eos conuenit. Cōmodius tamē, si sapone
libentius fustinetes, suis quāmaximè manibus defricetur. Gestationes, cursus, & cæteros labores appetere

oportet. Dropaces impono tempore competentis, & cetera quæ cyclo conueniunt. Vti lauacris salis, vel bitumineis naturalibus expedit. naturæ etenim frequenter mare plus placet. Ieiunos acceptis radicibus cum oxymelle uomere cogo. Prouidebo omnes diureticos cibos. Vinum stypticum sumant. Dabo anti-dota diuretica, quibus & splen, & repar frequentius procuratum est: ut sunt apium, cicer, gramen, fornaculum, aut semen eius, alarum, daucus, mei, petroselinum, pulegiū, & reliqua, quibus antidota uel decoctiones conficiuntur. Febricitantibus splenicis, uinum, uel acetum parcius ingerendum est. Apyretos uero his subiectis portionibus iuno Lupini amari tribus diebus in aceto infundantur, & post ex eorum decoctione unum cochlear, uel duo in nocte accipiant. Hoc etiam ieiunis proderit. Purgati uirides lupini cocti, atque combusti satis iuuant. Aliud. Cortex fatidis, arboris semper infructuosæ, in aqua coctus, & datus ut supra, continuo medetur. Thuris masculi puluis, cauliculorum succo comixtus, loco appositus, perseverando satis proderit.

De stomachi uariis accidentibus.

Cap. X V I.

STOMACHO, de quo nunc mihi tractatus interponitur, origo est, & occasio facilius uiriorum: quod omnium sortitus sit reliquorum membrorum sibi met famulantium potestatem, quibus aut deficiat, aut recte ualeat. Hic de subiectis accidentibus primo quantam molestiam sustineat, aduertendū erit. Patitur defectum causis aliquando incognitis: Patitur etiam post ægitudinem. Sustinet constrictionem, dolorem cum indignatione, uel febribus duris, uentositatem, fastidium, solutionem, bulisum, uomitus. Ex corruptela autem, & ex continua uentris effusione fatigatur. Item ex calore immenso, uel ardore, ut est caustion, unde sitim sustinet molestissimam. Frigore quoque, & singultu. Aliquando eum etiam cholera cum inflatione sollicitant. Ex eo lumbricorum origo frequenter fuit procurata. Quibus omnibus, ex ordine adiutoria sic ordinare curauimus. Ergo stomachicos, quos post ægitudinem prolixam, stomachi defectus tenet, & quod leue est, adhuc febriculæ infestæ, oleo absinthiacō calido somētamus, aut nardino, aut licyonio, aut ænathino, aut lenisilino, cum uino mixto. Item epithyma impono unicum ex dialtheis, & mastiche, & nardino cerotario. Sic cataplasma de dactylis, uel citoniis coctis in uino, cum stypticis speciebus, sicut in hepaticorum ordinauimus solutione. Sed considerandum est præcipue, nec ubi ciborum sit præsumptio, quorum & qualitate & quantitate laedantur, & ex quibus cibis uires nihil proficiant: intendendum itaque, ut & congruos, & moderatos temporibus competentibus sumant. Sin uero nihil sub hac ciborum moderatione proficiant, purgatione opus est, qua humor quidem ille superius enarratos defectus efficiens, omni modo depurgetur. Hos etiam ex attico melle, uel oxymelle curo. His & foenogrecū in uino coctum, & tritum cum adipibus asferinis impono. Moneo interea, odores insuauēs uitādos, stomachum semper peruerentes. Attestatione enim manifesta cognouimus, hos semper bonis odoribus uari. Cum ergo sine febribus plena sanitas esse ceperint, uiribus consulentes, gestationes competentes indicimus, uina, lauacra, & cetera quæ post ægitudinem possint corpora reparare. Quos uero repentinus dolor stomachi comprehenderit, qui cum grauedine etiam scapulis, & dorso imminet, faucium quoque inclusionem, & nictus difficiles faciat, interpositis etiam febribus, his phlebotomo conueniet subuenire. Item quietem & patientiam suademus, cibos uti febrientibus leues, proprijs temporibus subministrare. Fouemus calidis & mediocribus stalticis, non tamen frigidis. Cataplasmandi sunt hordei farina, in melle citoniis coctis, uel dactylis immixtis: aliquando etiam meliloto. Item cerotario cyprino, habente mastichē, & castoreum. Vt et polyarchio, quammaxime in dorso, uel scapulis, quibus partibus commodius adhibere conueniet. Frequenter etiam cucurbitas uentosas imponimus. Declinantibus febribus, etiam portiones iam paragonicas dabo: ut cyminum fruxum, cum apii semine ex æquo runsum, uel cribellatum, cochleare unum cum aqua calida. Sic abrotonum cum uino dabo. Ipsius uero stomacho, pingues dactylos in ænomelle coctos, & tritos impono. Si adhuc dolor remanserit, lac bubulum, & asinæ, uel idem secundum consuetudinem confectum adhibeo. Si nulla sanè præeunte querimonia, repentinus occupauerit dolor, eisdem crebro post cibos uomere conueniet. Tunc etiam uentosas accipere, & supradictis potionibus propensius imminere. Declinantibus uero doloribus, gestationes, exercitia, uel palestras, balneas, & uinum cū moderatione concedimus, quibus uexatum corpus, ad plenam ualitudinem ualeat peruenire. Si duritia immata fuerit stomacho ex prioribus languoribus, sicut pingues in mellicrato coctas, & tritas, semibibus misceo, & ex his cataplasma. Cerotario post cū nitro, & salibus uis naturalibus. Vti conuenit holeribus, cū cibis cæteris, nec nō & uinū parcius dabo. Si uentositatis molestia senserint, sicca fricatione iuuandi sunt. Ieiunos uomere conuenit, cibos pinguiore & calidiores accipere: portiones quoque ex anise, daucus, & castoreo absinthio pontico sine pipere, baccis lauri, ruta, cymino; contusis, aut singulis amminibus sibi inuicē aliquibus in aqua calida in modū cochlearis unius adhibeo. Etiam epithymata coacta de seminibus potionū supradictarū mixtis, cerotario impono; dropaces adhibeo præpositis in utroque. Tamē & cetera adiutoria cyclo in dorso uel scapulis applicabo. Fastidio incidente, locis conuenientibus habitare ac salubritate temperatis. Ab exercitijs uel fricationibus commodis non quiescant. Absinthij decoctionem, uel uinum absinthiites frequenter accipiant. Sallamentis omnibus nutrantur, acrimonijs, sinapi, & aceto squilluico, & similibus cæteris, quæ stomacho hanc ciborum recitationem ualeant extergere. Preter consuetudinem uero edacibus, hoc est, bonis uis naturalibus, ieiunantibus, somni procurandis sunt, largiores cibi, insuauēs & inflationem procurantes: & uini meri portiones dabo. Si nauſcendo frequenter phlegmata & cibos incoctos

[illegible]

Cap. XVIII.

[illegible][illegible]

baron, & cetera verantica. Hæc omnia dysentericorum, etiam coeliacis conuenire manifestum est. Si commotiones, uel pondera perseverauerint, quæ tenasmodeis appellamus, hæc frequenter procurant uel tris exponendi suauitatem. sæpissime mitigata sunt iis, quæ aut in fœnograci decoctionibus, aut altheæ radicibus conficiuntur. Nam & cerotario hoc frequenter curati sunt: Ex adipibus asferinis, cera, & butyro & pice briciæ, sepe sedentibus post uaporum fumigia, profuerunt. Inijciendi sunt aliquando oleo roseo, uel myrteo, & in continenti lemnisci supponendi sunt, in basilicon infusi cerotatio ex oleo plumbeo confecto. Lanam interea succidam superimpono: quam anadelfinos ex more continere debet. Iuuabunt sanè iam saccelli, uel cataplasmata, eodem anadelfino perseverantia, de dactylis in passo tritis, aut hordei pollinibus cum oxymelle. Lac bubulum potius datum, et neolo umbilico impositum, sine mora medebitur. Lienteria si obuenerit, quæ ueluti quendam l. in intestinis obducit, transitu rheumatismi, ex quo nulla penitus ciborum solennis ualeat digestio celebrari, sub alio nobis ordine curanda erit. Vtor acerbo clystere ex succis ptisanæ, ubi aut colocynthides, aut beræ coquenda sunt, aut scammonia soluenda. Vtor cum his cathartici. Dabo cibos acerbos, & cetera quæ fuerint acria: ut allium, & raphani, & cepæ, napæ, sinapi, piper, & omnia fassamenta. Imminebo interea exercitijs, quibus uoluerò. Impono uentri cerotaria ex oleo laurino, cyprino, uel sicyonio, habentia rutamuridem, cuminum, bacca lauri, nitrum, uel certè castoreum. Impono polyarchion, aut diaspermaton, quæ tunc iam conueniant: aut naturale sulphur, uel bitumen, & dropaces, & sinapismi, & cetera staltica adhibenda sunt. Ex dysentericis etenim lienterici facti, & uirium fatigatarum intuitu, & temporis prolixo præiudicio, difficile sanabuntur. Nam ex his hydropes frequentius emerferunt.

De hydropicis. Cap. XIX.

HYDROPICI, uel cachectici simili sub diligentia uisitantur. Qui enim propè ex similibus accidentibus sunt æquali sub indignatione tumescunt. Hydropicorum ergo difficile, & periculosum negotium est: eoque difficilior, si indigestio totis corporibus superueniat. Labore attamen nimio, & cōtinuis quassationibus exercitiorum, forsitan curabuntur. Hos frequenter febres pertinaces comitantur: quarum opportune temporibus seruientes, nos etiam adiutoria ordinare conueniet. Febribus itaque sub hac obseruatione desinentibus, iam exercitijs ex paruo labore crescentibus, iminendū est: subinde fricationibus, solaribus quammaximè, & ceteris uaporibus sudorem prouocantibus: sub quibus, omnibus tumeribus locis nitrum, aut sales tritos aspergo. Post exercitia, uel labores continuo oxymelitem dabo, aut raphanū eodem infusum. Quibus acceptis, ex parte uomere cogendi sunt. Lauacris tunc uti conueniet, sed marinis, quibus ueluti membra laborantia foueantur. Interea acria omnia, & salsos cibos conuenit accipere, caules elixos cum salibus. Parcitas cibi, & potus quammaximè continentia instet: Etenim his procuratis, si animosius sustineatur, grande remedium est. Vinum, licet per interualla, austerum tamē, & quod sit diu reticum, dandum est. Si uerò multus humor ex putrefactis eorum carnibus aggregatus, uentrem, satis adimpleuerit, membris ceteris minutatis, saccellos ex tostis salibus, uel milio similiter sub umbilico locis admoceo. Et de arena calida in litore hæc loca detergere, maximum interdum est beneficium. Aliqui etiam tritico sic recti iuuati sunt. Interea acetum scylliticon frequenter dedi, & siccis fricationibus immiui. Imposui emplastra reuocatoria, amyrica maxime autem infantibus competentia adhibenda: cataplasma deficcatoria, ex flore malogranati, & ceteris stypticis, cum tenticulæ pollinibus, passo, & aceto temperata. Aliqui uerò scarificauerunt furas eorum, & altiores plagas fixerunt, de superioribus humorem deuiuare cupientes, & sub umbilico paracenteses frequentius adhibuerunt: per quæ conueniet, exinanire paulatim ac per interualla dierum, ne subitanea effusio, secundum Hippocratem, continuo periculum faciat. Sanè portiones, uel emplastra probata sæpissime profuerunt, ex quibus aliquod compediofius designabo, emplastrum quod etiam spleneticis sæpe profuit, hoc est. Fœnograci pollinis unc. I I I I. hordei unc. I I I I. stercoris columborum unc. I I I I. resinæ fixæ libram I. ceræ unc. V I I I. acetum quod sufficiat terendo pulueri, qui postea solutis admiscendus erit. Aliud, Semen mirycæ, & galbanum ex æquo tansa miscentur, superaddito quippiam olei, ut emplastri temperies fiat: quod perseverantius adhibendum est. Aliud. Pilæ cypressi in uino coctæ, & tritæ, axungia ueteri solatæ ex æquo miscentur, & imponuntur. Quod si permanferit, satis iuuat. Aliud. Ficus pingues tulas libra unam, & nitri, & abynthij unc. I I I. hyssopi ceroto admisce, ut emplastrum temperetur, & uteris. Nam & stercoris bubuli puluere, hordei pollinibus mixtis, & cum oxymelle coctis cataplasmas. Similiter de caprarum stercore frequenter adhibui. Et unguenta sunt utilia hæc, quæ tumetibus partibus, sub sole adhibita profuerunt. Cimolia in aceto contrita, bouum stercora cum nitro, & oleo sicyonio mixta, & quippiam uini. Nam etiam has portiones accipientes, sæpe iuuati sunt. Sambuci radices succus, cum oxymelle datus est, & continuo purgando profuit competenter. Et euphorbij granum, in ouo datum cum pane, corpora hydropicorum, aliquoties similiter depurgauit. Aliud maius purgatorium. Stercus columborum drachma una, rutæ semen drachmis duabus, in oxymelle similiter datur. Inter hæc omnia adhibenda erunt, perseverantibus exercitijs & laboribus, catholice salutem procurantibus, sub quorum perseuerantia hydropum poterit abigi periculum.

THEODORI PRISCIANI AD

De renum uitis, & uelica. Cap. X X.

RENIBVS longo tempore dolentibus semper uapores, fomenta, & cataplasmata paragorica conuenerunt. Diuretica uero sub initijs obfuerunt. Indignantibus etenim & rheumatizantibus renibus, potionum transitus aduersatur. Declinantibus uero doloribus, beneficijs primò catholicis adiuuandi sunt, fricationibus, & unguentis paragoricis, & siccantibus: etiam cyclicus ordo percurrendus est. Adiutorium emplastrum polyarchion, aut dialpermaton sæpe conuenit. Cataplasma tunsa cum axungia, & imposita, multum profuit. Dabo etiam potiones ex storace, galbano: uuam passam, pinguem, purgatam: mixtis diureticis aliquibus. Utr petroselinum, ameos, alatum, cyperum, daucum, amygdala amara, cum mellificato. De di ego frequenter etiam hyofcyamon. Interea oportet aquis utriducibus, & naturalibus, & cibis nutriti omnibus digestibilibus. Dabitur etiam hæc portio omnibus uelice, uel renum causis, & pectinis. Semen lini, papaueris dulcis, draganti, in uncis singulis, amyli in duabus tunsis, & cum aqua diuretica temperatis, ut troisci fiant in drachmis singulis. Sit autem aqua diuretica omnibus probata, in qua coqui oportet radices fœniculorum, apiorum, graminis, & cicer uenereum. Sæpe etiam mastiget de superioribus speciebus, quas ad tempus, aut locum habuerit. Aliud, quod & uulnera curet, & urinz difficultatem aperiat. Ocimi, & agrestis matris semina, in drachmis semis, & apij seminis unc. I. amygdalarum, uel auellandarum semunciz singulæ. Omnia trita, melle temperentur. Sunt & ceteræ portiones sub renum & uelice occasione, etiam splenis, uel, epatis, aut hydropsis molestiam refrenantes, quarum in his omnibus experti sumus efficaciam. Phi. unc. I. celticæ unc. I. dauci unc. I. cinnamomi unc. I. piperis drach. VI. meu drach. VI. asari unc. I. petroselini drach. VI. opobalsami drach. VI. croci unc. I. liquiriæ drach. VI. picis idicæ dr. VI. cassiæ drach. IIII. amyli drach. VI. uuæ passæ unc. I. draganti drac. IIII. uino & melle portio reperatur, & dabitur. Interea licet ex oibus diureticis speciebus superius cõprehensis, oēs uelice uel renu causas posse curari significati sit: attamen cum speciale sit & hoc uitium, uidelicet urinz conductionem sustinere, huic etiam adiutoria specialia ordinanda sunt. Herba parietaria aqua cocta teritur cum paucis oleo, & renibus inligatur. Hoc etiam de gramine semper factum est, & samisco in aqua cocto similiter. Nam ex his omnibus etiam sedentibus uaporem pati conueniet. Cotyledon herba in uino cocta, potui datur, & continuo dysuriam sanabit. Nam etiam mulieribus butyrum uetustissimum per pessum adhibitum, dysuriam curauit: & mellificatum in quo immaduerint ireos & fœniculorum radices, & cardus coquitur, & datur ad urinarum impedimentum.

De arthriticis, podagricis, & ischiadicis. Cap. X X I.

EX VNO fonte uitiorum hæc passionis deriuatz sunt, sed locorum uarietate, & nominibus determinatur. Nam arthriticis omnibus ex articulorum commutationibus, subito initium passionis emergit. Podagricis uero ex uno prius articulo est principium: paulatim uero serpendo, grauius omnes postea neruos, & articulos possidens dominabitur. Ischiadicis autem, ex uno coxæ articulo tormenta suppeditantur. Fit itaque rheumatismus, licet de phlegmate speciali, natura frigida quammaximè fiat, attamen alijs ex humoribus calidioribus aliquando efficitur: & sic effectus, calefacientes aliquando cõmotiones exulscitat. Frequenter autem hoc phlegma licet natura subpingue sit, uelut est uuluerum sanies: attamen cum se inter articulorum commotiones usu commotionum intulerit, tunc tardus gressus, tunc dolores uinadi, tunc tormenta grauiora succedunt. Curantur autem hæc omnia contrarijs suis: ut quod forte & sensu, & tactu calidum commotum fuerit, frigidis interim adiutorijs ab augmentis prohibeatur. Postea uero celsantibus commotionum temporibus, calidis, chalcisticis, & amycticis recuperentur ij, quibus ille humor uiscosus, & pinguis interiora iam possidet calefactus, uel tenuatus ab articulis per commotiones frigitur: quibus uero tumor est semper inflatus, & pallidus color, calidis supradictis adiutorijs, & amycticis imminendum nobis erit. Monitum te interea uolo, amice charissime, quod quando generaliter interioribus membris dolor inuatus, nexu quodam, ex collisione humoris uentositatisque colligatur, tum in frigidis plerumque difficulter deprimi poterit, uel depurgari: ergo cum uariè emergunt species motionum, quæcunque expediunt, medicorum coniecturis, uel iudicio, indulgenda erunt. Licet iam ex consuetudine sibi adhibita, melius is qui patitur, possit iudicare, quem frequentes commotiones, & adiutoria famulantia, medicum effecerunt. Quanquam autem rationabiliter omnia adiutoria, quæ ueluti calide commotionibus adhibetur, uirtute chalcistica & paragorica esse debeant, quò neruorum & articulorum nutrire, & foueri ualeant: loca: concedo tamen, ut ea frigida interim adhibeantur, quæ turborem magis in tempore, quam mitigationem præstare possint. Quibus quidam, ut ille ait, primò releuari uidentur, postea grauius uehementiusque afficiuntur. Hoc etenim etiam nostri Hippocratis nos instruxit auctoritas, quod neruos omnes, semper frigida nocuerunt. Ergo quoniam & causas, & origines compendiose digesti, curæ nunc rationabiles, & adiutoria ordinanda nobis erunt. Est namque in professio, quod omnes zgritudines particulares, sub corporibus, membra nexu quodam familiari amplectuntur:ysterio naturali ut in singulis, totius corporis substantia constet, & altera alterius auxilio gubernetur. Ideoque nisi præceptis & adiutorijs catholicis primò iuuentur, aliter particulares causæ curari nõ poterunt. Quæ de re erit nobis nunc curari, præceptorumque exordium in sequenti, etiã particulis disponere.

Conuenit

Nota.
 Hic etiam notandum est de
 spali natura frigida quoniam
 affluunt aq. et ex succis. et
 alijs effluvijs: & sic effluvijs
 ceteris alijs commotionibus causis
 frequentius accidit hoc phlegma
 & suppuratur sic, velut et
 est, atq. in se habet virtutem
 etiam in commotionibus
 tardis grossis, tunc laboribus
 vitandis, tunc formantibus grauioribus.
 Cura curatioque sua
 sic q. sensu & tactu catulorum
 frigidi, frigidi adulescentis ab a
 prohibetur: postea ex cathart
 icis, calidis et alia viis et a
 recuperantur q. quibus illis tunc
 de purius moribus et possit
 vel tunc ab actibus vel co
 frigitur, vel amentis.
 Sic quibus tunc est semper
 de gelidus color, calidus & a
 immo in eadem.
 Ac si quando geliditas immo
 dolat sedatur, neque quodam
 ore immo verborum sit, et
 tum a frigidi difficultas de
 terit, vel loquuntur.
 In quo cum vixit, curatur et spec
 onis, quae cumque epulandis me
 comestibus vel iudicio, in di
 iet iam ex cathartica, si
 melius, et qui potius, possit in
 quod frequentius commotionibus, &
 famulatur, q. ubi cum efflu
 Cuiusmodi rationabilis est omni
 que veluti calidus commotionibus
 sed, virtute thalassica et per
 esse debet, qui nonnulli et a
 ubi & fovei qualitate loca
 Tamen frigida in eadem
 turbore magis et tunc quam
 onem praestare possit.
 Cubus quibus primo velut
 & postea grauius et immo
 sic n. frig. nos in frigus ab
 & vixis frigida semper ab
 Cura rationalis
 In corpore q. et omnes ex
 particularis, ubi corporibus
 neque quodam familiaris amplior
 ita et in iudicio, in
 corporis subtrahit, consti
 aliterius auxilio gubernatur.
 & deo, nisi praecipit & ali
 & huius primo inuentus, ab
 fore, ubi

A. Consuetudine in principio artificialis, pedagoga,
 vel spiritualis, quibus de capite triuina resolu-
 tura determinatur, earum passionum fuerit, quibus caput
 propriis formatum continetur, et solentur.
 De his inferioribus tractabitur in libro de humis, vel de virtutibus
 vegetabilibus, de his reliquis resoluatur vel de vegetabilibus.
 Item de virtutibus, vel fortitudinem, vel personarum.
 Vegetabilibus sumendo, uno punctum vel plene animo
 vegetabilis est.
 A. caribus non est, sic ab eis in unum
 continetur, sicut et, propter omnia bona vegetabilis
 vegetabilis est, quo accepti ubi facilius tractantur.
 Uonitur (et non multa per interuallum multum
 alius per electos cibos, aliquoties etiam inuenerunt, et
 sic alium per se, aqua et accepti, vniuersi fuerit.
 De vegetabilibus autem in principio per se conueniunt.
 Quae uales et, nec vapores tam similes.
 Vegetabilia, labores, fructuosa totius corp. et
 perueniunt sunt, et appetenda virtutibus.
 Vegetabilia uenerunt perueniunt effecti, vegetabilia domi-
 nantur.

B. *Frax alutona* qui cantibus ab initio cuspidentur,
podagrae occurrunt, seu potius iam pfectis violentiam
vitae morunt. —
Sed iam manifestis podagrae, Cataplas. sanguinis,
empl. & optis adhibitis curesis, vel acribus phisicis
uti rectius est. —
Atque de cataplasis, sequuntur particularia —
Schindius conueniunt pro omnibus, uisum. —
Coxe dolentis fofes & cataplasma. cal. m.
Cneuribris pfectis frequenter locus redhibendus est.
Cijusd acris, sanguinis pro aris, Schindius
liberat. —
P[ro]phobonae in talo ad libondu. — Nota
Vapori vel facellis immundum. & m.
Sistere vel ambulare potuerint, accipis calidioribus
sals sub ardentis fricantur sunt. & m.
T[ra]nscit libondu coacti uanati sunt. —
Expedit etiam equi uetustis. —
Si vigilis interueniunt, dolentur perfruerantibus,
soponitur potiones ingratas. —

Cum vero minorati dolores, causa malit
 fuerit, tunc velut per diaphyrea,
 dyspnoia, syncope, & extensis angustis immine
 rebus, iure, elliceri.
 sed talibus preceptis rebus servandum.
 * Eadem per alia, quibus, quibus lumbi
 dolore resuscitant.
 Cum sit talis talis, per alia obvenit,
 Cataplas. comp., sed hoc per alia
 * immutanda sunt. ^{vis.}
 Haec ad menses nuperos, =
 Ad refrigerantes, comotiones, vapores, cataplas.
 requirunt, & alia per alia.

IN THEODORI PRISCIANI LIB. III. AD
VICTORIAM, DE PASSIONIBVS MVLI-
RVM, ET CVRIS EARVND-
EM, PRAEFATIO.

Transilio, et
summa libri quinq.

medendi indiget
libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

INTELLEXISSE te non minus nobis arbitror Victoria, artis meae dulce ministerium, omnem
mei operis efficaciam; in quo immemor non sum praefationis meae, quando duobus libris pares causas pro-
posui euporiston, officium uidelicet meum in logica disputatione: sed non longe abest ab utroque gyn-
ecionum uisitatione. Et quoniam haec ratio tota medendi indiget diligentia, solitaneum libellum confeci de
mulierum curis: solitaneum inquam, & remotum a publico spectaculo. Et ego quidem te scientia tua
bo. Tu uero, cui communis arridet sexus, & secretum facile inuenit tua conscientia, cum fiducia exercere
sedulo gynaeceam propositam meo tractatu, & tua diligentia adhibeto medicinam.

THEODORI PRISCIANI GYNAECIA, SEV
LIB. III. DE MVLIERVVM PASSIONIBVS.

De mammillis post partum dolentibus: Cap. I.

MAMILLAS cum tensione tumentes, uel dolentes, quod post partum quammaximè mu-
lieribus euenire consuevit, quas ex eo etiam grauis dolor inquierat, hoc ordine curare de-
bemus. Per initia mediocriter constringentibus uti conueniet: ut est sponsia molli, in-
fusa in posca, quae leui anadefmo continenda erit. Sic etiam dactyli, cum pane in posca in-
fusi, & contriti, saepe par beneficium praestiterunt. Si uero certa ratione lac prohibendum
erit, cataplasmati superiori admiscendum est aut alumen scissum, aut herbae pulicaris semen, aut corian-
dum, aut portulaca. Nam & unguenta ex solis earum succis frequenter adhibuimus, cum penna mollio-
re loca tangentes. Si indignatio illa his minimè potuerit prohiberi, & lactis aggregatio maximum fer-
uorem locis incusserit, tunc cataplasmatibus chalasticis conueniet imminere, ut est panis in mellicrato in-
fusus, & cum olea dulci contritus. Similiter etiam de seminibus ram lini, quam foenograeci, uel hordei fari-
na, aliquando singulis, aliquando commixtis, & cum adipibus saepe porcinis recentibus, in mellicrato tem-
peratis. Sanè si pondus cataplasmatum tolerare non potuerit, spongiis mollioribus infusis in aquis cha-
lasticis, dulcibus, & paragoricis, quae ex hybisco, & seminibus sentis, & foenograeci conficiuntur, loca tantum
modo raporanda sunt: & impolitis continuo lanis, oleo dulci calido infusis, fouenda erunt. Si sanem
forte collegerint, iam suis temporibus, & proprijs adiutorijs maturata, aperienda erunt, ut sub una ege-
stione possint penitus percurari. Si uero minimè percurari possint, transacto impetu, uel indignatione
mammarum, simplex cerotarium adhibendum est, usque in plenam sanitatem. Sanè si eadem infantem
nutrire minimè decreuerit, tunc cerotario supradicto puluerem confusi lapidis molaris admiscebo, ana-
desmum quoque mediocriter stringo, lactis impetum prohibiturus. Quod si lactandi arripuerit uolun-
tatem, tunc anadefmus laxior, tunc fomenta chalastica adhibenda erunt, quae lactis non prohibeant copia
ministrari, sed magis praecurantibus fomentis, & uaporibus supradictis, cypero, otto, & croco in unum con-
tritis, mammillas unguendo adiuuabo. Alij pumicem cum oleo cyprino tritum imposuerunt. Alij cymi-
num cum aqua contritum. Alij uero fabae pollinibus uram passam purgatam, & contusam miscuerunt, &
ex his cataplasmando, lactis auxerunt fecunditatem. Sic selamo trito cum oxymelle, sic cantabro cocto
similiter in oxymelle, sic de hederæ folijs contritis, sic de ficis pinguibus tunsis, sic de caseis recentibus, tri-
tis cum oxymelle, cataplasmata confecerunt. Quibus omnibus lactis secundum officium procuratum est.
Si lactis interea nimium pondus etiam duritiam procurarit, folijs apiorum, uel menthae, uel caulium cum
pane tritis, & mellicrato, istam duritiam resoluimus. Ergo per initia generatim omnibus mediocriter sty-
pticis obuiandum est: per augmenta, uel impetus, chalasticis uel paragoricis: & licet hac lege medendi, o-
mnibus seruiendum sit, attamen mammillarum mollium intuitu, omnia moderatius foeminis adhibenda
sunt.

De praefactione matricis. Cap. II.

SVNT uariae & diuersae causae matricem frequentius attentantes, quae licet sub duabus prae-
cipue passionibus constrictionis uel laxationis comprehendantur, tamen etiam partim sub cer-
tis accidentibus alias causas efficiunt. Huic ergo sub definita lege professionis, quae costricta sunt, soluo,
resoluta uero (quibus quammaximè & lassitudo lociatur) stypticis potissimum, atque mediocriter frigi-
dis stringo. Quibus autem repentina commotio matricis innascitur, hae musculorum omnium contra-
ctione, & totius corporis dolore nimio quatiuntur: & hac uis saepe interceptum uocis officium, sub hor-
rore calus, ueluti paralyseos mentitur imaginem: quam passionem in graeco opere *ὑσπερ νῆαν* appella-
mus. Quo tempore ad illa duo praefidia principalia, omnibus conclusionis necessitatibus subuenientia, re-
currentes, phlebotomi praefens beneficium, & uentris purgationem. Specialia uero fomenta olei dulcis ca-
plasma, ut diachylon, cerotaria simplicia ex adipibus temperata, & medullis. Pessaria ex melle & butyro.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

libri
piscior.

Item
libri
piscior.

Item liuium, & cera, quorum confectioes subiectis adiungo. Ex encolpismis, succis aut ptisanz, aut fenogreci, aut olei dulcis. His articuli & calefaciendi sunt, & mollius constringendi. Ventolis quoque ad motus inguinibus, uel femoribus, recurui, uel inclinationi matricis occuremus. Fumigijs bene olentibus ad inferiora matricem prouocabo; odoribus enim grauibz repercutitur. Minoratis uero supradictis accidentibus, plena quoque declinatione, manifeste conuenit iam exercitijs apris sexui commoueri, & aeris, uel locorum mutatione iuari. His cibi humaniores, his iam lauacra concedenda: unum attamen sub moderatione.

De inflatione, uel tensione matricis.

Cap. I I I.

INFLATIONEM, uel tensionem si longo tempore matrix agra conceperit, omnibus superio-
ribz chalafticis & aptis constrictionibus imminebo. Superaddens cataplasmatibus ficus tuntas, absinthij
puluerem, uel eius decoctionem, epithimata amyctica ex puluere lami, baccarum pyrethri, castorei, nitri, &
ceterorum similium, cerotario commixtorum. Expedi frequenter polyarchion uti. Encathismata uero,
uel uapores ex decoctionibus staphyli, dauci, pulegij, uel ceteris similiter diureticis procurabo. Inflationi-
bus diu permanentibus, artemisia admiscenda, aut marribz, hyssopus, aut bacca lauri: aliquando ca-
sa, & celica: ex quibus etiam pessaria conficienda erunt. Nam ex ruta uiridi, trita cum melle, pessario sem-
per uitor temperato: Superaddo nitrum, uel aphonitrum, pulegium, ficus pingues purgas, & contusas,
cyminum: sed ad eorum sensum mordacem, & calidum temperandum, lactis temperabo commixtione.
Si uero duritia contraxerit, quam alibi mylen appellamus, hanc primo sicuti contra inflationem ordina-
do conteximus, adiutorijs chalafticis imminens soluere laborabo. Omnibus supradictis constrictione-
num accidentibus minoratis, iam conuenit ex paruo leues attentare gestationes, & sub certa declinatione
passionis, appetere lauacra, cibos humaniores praeferre; & post resumptionem corporis, anechicis tem-
poribus, omnes ex ordine cyclicas disponere curationes inguinibus adhibendas. Has semper perfolidabit
etiam lauacrorum frigidorum consuetudo disposita.

apud Galen.
conferat cap. 28. lib. 7.
apud Celsum.

De arthriticis.

Cap. I I I I.

arthritis, imperforata.

femoris

CONTINGIT interea frequenter certa, & specialis passio foeminarum, ut aut naturaliter aliqua
do clausa nascantur, aut uulneribus praeuentibus, ac cicatrice interueniente clausa fiant, aut praesenti in-
dignationis interuentu penitus concludantur. Si ergo ex causa praesentis indignationis obducta fue-
rint, omnibus chalafticis adiutorijs, ex lege resoluenda erunt. Sed si ex uulneribus obducta cicatrices,
aut nescio qua illa lege nascendi clausa fuerint, quod tamen aut digitis, aut oculorum possit fide probari,
tunc a chirurgicis considerata mensura, referande erunt: ea tamen intentione, ut haec patefactio linteo-
lis aut alijs adiutorijs patefacientibus diutius determinetur, ne obducta in se identidem scissurae recentio-
res, occasionem claudendi protinus sortiantur.

De conceptione. Cap. V.

ALIQVAE mulieres, quae uoto posteritatis, longo tempore desideratae afficiuntur, medicos accer-
sent, quas effectus elaboratae conceptionis felices & peritas exhibuit. Nosti itaque o Victoria, professio-
nis communis hoc magis esse necessarium ministerium, quae ex officijs sedulis in his magis rebus experime-
tum habes, quantum aut gratiae, aut gloriae accrescat medicae promittenti si suscepta conceperit. Vnde fi-
cet inscia non sis huius curae, conceptionem procurantis attamen disposita tibi, consideratis omnibus, or-
dinari per quae curandum erit. Prius inquirendum est, necubi officium matricis, aut inclinatum sit, aut
conclusum: unde aut modicis purgationibus aperientibus impeditur, aut tempore purgationis, interno
dolo nimio conuulsatur. Quod si forte ita res habet, phlebotomanda erit, de talo quammaxime:
quo ad inferiora uicinior materia prouocetur. Sic deinde ad ordinationem curae aduertendum nobis erit,
quae conclusum prius moderate officium patefaciat, ut purgatione solenni citra offensam disposita, &
deficari, & calefieri matrix possit. His etenim rebus ita dispositis, conceptionis uota facilius subsequen-
tur. Si phlebotomo adhibito, necdum tempus intra fecerit cognouerit, tunc oleo dulci, uel anethino, uel
rutaceo inguina fouenda erunt: & post lana, in eodem oleo calido infusa, contegenda. Tunc cataplasma-
tibus chalafticis calefacienda: quibus admiscebo aut artemisia puluerem, aut dictamni: quatum etiam in
aqua coctarum frequenter uapores exhibeo. Nam & fumigia uaporatis partibus supponi conuenit ex su-
pradictis herbis, lapide gagate adiuncto. Si his omnibus rite adhibitis, naturalis circa purgationem ordo
permanferit, matricis officio mediocriter relaxato, iam adiutorijs conceptionem procurantibus imminen-
dum est. Continuo igitur cum se purgatio citra offensam transegerit, ex diachylon, uel liuiano/pello cum
nardino, uel roseo prius resoluta, encolpismo uti conueniet. Et post matricis delauationem, ex eodem me-
dicamento, & pello priore pessarium adhibere continuis diebus triginta conueniet, usque in diem uentu-
ram alterius purgationis. Quibus transactis, liuiano nitrum conuenit commiscere, quod adhibendum erit,
post encolpismum, ex subiectis speciebus disponendum, cardamomum, dictamnium, artemisiam, irim, rute-
semen, omnia contusa & cribellata, oleo dulci & plurimo miscenda sunt: ut ex his ante pessarium, fomen-
tum adhiberi possit. Commodius interea fiet, si huic fomento recentes porcinos adipos, aut anserinos ad-

Inflatione uel tensione si
Nota: matris agra conceperit, et
ex aptis chalafticis imminens
cataplasma.

epithimata amyctica
composita.
Encathismata seu u
apud Galen.
inflationibus diu permanentibus
alia uel melle
pessaria, &c.

seu uis mordax & calida,
imminens temperandus.
Si duritia contraxerit, quam
alibi mylen appellant, hanc primo
sicuti contra inflationem ordinan-
do conteximus, adiutorijs
chalafticis imminens soluere laborabo.

Omnibus supradictis constrictione-
num accidentibus minoratis, iam
conuenit ex paruo leues attentare
gestationes, & sub certa declina-
tione passionis, appetere lauacra,
cibos humaniores praeferre; & post
resumptionem corporis, anechicis
temporibus, omnes ex ordine cyclicas
disponere curationes inguinibus
adhibendas.

Has semper perfolidabit
etiam lauacrorum frigidorum
consuetudo disposita.

Contingit frequenter certa,
et specialis passio foeminarum,
ut aut naturaliter aliqua
do clausa nascantur, aut uulneribus
praeuentibus, ac cicatrice interueniente
clausa fiant, aut praesenti in-
dignationis interuentu penitus
concludantur.

Si ergo ex causa praesentis indignationis
obducta fuerint, omnibus
chalafticis adiutorijs, ex lege
resoluenda erunt.

Sed si ex uulneribus obducta cicatrices,
aut nescio qua illa lege nascendi
clausa fuerint, quod tamen aut
digitis, aut oculorum possit fide
probari, tunc a chirurgicis
considerata mensura, referande
erunt: ea tamen intentione, ut
haec patefactio linteolis aut
alijs adiutorijs patefacientibus
diutius determinetur, ne obducta
in se identidem scissurae recentiores,
occasionem claudendi protinus
sortiantur.

Mulieres, quae uoto posteritatis,
longo tempore desideratae afficiuntur,
medicos accersunt, quas effectus
elaboratae conceptionis felices
et peritas exhibuit.

Uxor mea ministerium
cuius sedulis experimen-
tum habes, quantum aut gratiae,
aut gloriae accrescat medicae
promittenti si suscepta conceperit.

Prius inquirendum est, necubi
officium matricis, aut inclinatum
sit, aut conclusum: unde aut
modicis purgationibus aperientibus
impeditur, aut tempore purgationis,
interno dolore nimio conuulsatur.

Quod si forte ita res habet,
phlebotomanda erit, de talo
quammaxime: quo ad inferiora
uicinior materia prouocetur.

Sic deinde ad ordinationem
curae aduertendum nobis erit,
quae conclusum prius moderate
officium patefaciat, ut purgatione
solenni citra offensam disposita,
deficari, & calefieri matrix
possit.

His etenim rebus ita dispositis,
conceptionis uota facilius
sequuntur.

Si phlebotomo adhibito,
necdum tempus intra fecerit
cognouerit, tunc oleo dulci,
uel anethino, uel rutaceo
inguina fouenda erunt: & post
lana, in eodem oleo calido
infusa, contegenda.

Tunc cataplasmatibus
chalafticis calefacienda: quibus
admiscebo aut artemisia
puluerem, aut dictamni: quatum
etiam in aqua coctarum
frequenter uapores exhibeo.

Nam & fumigia uaporatis
partibus supponi conuenit
ex supradictis herbis, lapide
gagate adiuncto.

Si his omnibus rite adhibitis,
naturalis circa purgationem
ordo permanferit, matricis
officio mediocriter relaxato,
iam adiutorijs conceptionem
procurantibus imminendum
est.

Continuo igitur cum se
purgatio citra offensam
transegerit, ex diachylon,
uel liuiano/pello cum nardino,
uel roseo prius resoluta,
encolpismo uti conueniet.

Si phlebotomo adhibito, necdum
tempus intra fecerit cognouerit,
tunc oleo dulci, uel anethino, uel
rutaceo inguina fouenda erunt: &
post lana, in eodem oleo calido
infusa, contegenda. Tunc cataplasma-
tibus chalafticis calefacienda: quibus
admiscebo aut artemisia puluerem,
aut dictamni: quatum etiam in aqua
coctarum frequenter uapores exhibeo.
Nam & fumigia uaporatis partibus
supponi conuenit ex supradictis
herbis, lapide gagate adiuncto.
Si his omnibus rite adhibitis,
naturalis circa purgationem ordo
permanferit, matricis officio
mediocriter relaxato, iam adiutorijs
conceptionem procurantibus imminen-
dum est. Continuo igitur cum se
purgatio citra offensam transegerit,
ex diachylon, uel liuiano/pello cum
nardino, uel roseo prius resoluta,
encolpismo uti conueniet. Et post
matricis delauationem, ex eodem
medicamento, & pello priore
pessarium adhibere continuis diebus
triginta conueniet, usque in diem
uenturam alterius purgationis.
Quibus transactis, liuiano nitrum
conuenit commiscere, quod adhiben-
dum erit, post encolpismum, ex
subiectis speciebus disponendum,
cardamomum, dictamnium, artemisiam,
irim, rute semen, omnia contusa
& cribellata, oleo dulci & plurimo
miscenda sunt: ut ex his ante
pessarium, fomentum adhiberi
possit.

miscemus. Post quod, continuo pessario tali uti expediet. Ficus pingues in aqua decoctas, & tritas, melli miscemus: & ex hoc pessario iniiciamus. Desuper uero liuium superimponi conueniet. Deinde interfecti nitri glebam accipimus, & in modum balani collyrium factum, mollitana conregimus, quod superillitum liuiano iniiciemus. Nullo etenim remedio meliore & magis innoxio, aut corrigi matrix poterit, aut purgari, quam usus nitri suppositione. Postquam uero his adhibitis, quæ sufficere arbitror ad omnia corrigenda, quæ impedimento conceptui esse possunt, iam uti conueniet his duobus sequentibus pessariis aromaticis, conceptionem maturantibus. Fit autem prius hoc modo: Cera alba, adipe gallinarum, terebinthina, & nardino oleo. His omnibus ex æquo solutis, coagulum leporis admiscemus, & hoc post encolpismum supponemus. Aliud uero omnibus experimentatum usibus, sequens hoc est. Cassiam fistulam, folium spicam indicam, amomum, in uncis singulis, omnia cribellata cum siaphylino, aut nardino oleo, accepto coagulo leporis admiscemus: & hoc pessario, ordine adhibito, ritè est maturata conceptio. Iam nunc & superiorum pessariorum conuenit subiungere compositionem. Pessarium diachylon contra omnes conclusiones utilissimum & probatum. Lini semen, altheam, fenogrecum, omnia æquis ponderibus in uas nouum mittimus, ubi oleum dulce, & aquam equa mensura adijciemus, ut semina pertegantur. Quæ cum molli uapore coqui & bullire cœperint, undatio, uel spuma quæ supernatauerit colligitur. Cui anserinos, uel gallinaceos adipēs, & cetera iungimus, ut pessario moderamentum faciamus. Sic nos diachylon pessarium cōficimus: quod, sollicitius si fuerit temperatum, unguentum magnum chalasticum, uel paragoricum faciet. Liuium uero sic facimus. Cera ponticæ unc. III. masticiæ unc. I. storacis unc. I. adipis anserini unc. III. butyri unc. III. medullæ ceruinæ unc. III. nardini olei unc. III. Hæc omnia secundum consuetudinem tunsa, soluta autem miscibimus, ut pessarij temperies procuretur. Hæc est ordinatio curæ, omnibus mulieribus adhibenda concipere cupientibus, quam breuiter contexamus. Sunt etiam alia quamplurima, ab alijs uarijs coniecturis composita, quæ magis causticis adhibitis, forsitan possint purgationem sanguinis extorquere. Commodius est autem, sic impendere officium medicinæ, ut cum suspectam causam curare cœperis, alia non creetur. Sunt alia duo genera pessariorum: at ego magis blandis, quam causticis, conceptionis causa procurandæ, purgationem sedare uolo, quam extorquere: quibus etiam magister meus, & purgationem absque offensa se procurasse frequentius testabatur, & conceptionis officia perfecisse. Ea sic conficiebat. Opobalsami un. I. peucedani unc. I. aristolochiæ unc. I. myrrhæ et croci semuncias singulas, medullæ ceruinæ, & adipis anserini semuncias singulas: semina seorsum quæ addenda sunt, cribellantur, & solutis ex more miscentur, & sic tusis pessarium fiat. Hoc primo pessario exempto, mox tempore secretorum post balnea supponendum est: quod duabus horis continendum erit. Aliud pessarium, cuius sequens ista confectio est. Opobalsami uncia I. opopanis unc. I. thuris masculi unc. II. cinnamomi unc. II. myrrhæ unc. I. costi semuncia I. croci, cassiæ ana semuncia I. hæc similiter contrita, oleo uino commiscuntur, ut paulū pingue fiat: cum uero utendi tempus aduenerit, post purgationē & balnea, & pessarij prioris usum, uteris necessario linimento. Peregisse me arbitror quamplurimas sub constrictione mulierum egrotudines, e quibus si quas fortè minime comprehendimus, sub uno & simili relaxandi beneficio uisitandæ erunt. Variæ etenim pro causarum temporibus, adiutoriorum species poterunt adhiberi, eadem attamen medendi omnibus uirtus.

De abortiuis. Cap. V. I.

ABORTIVVM dare nulli unquam fas est. Vt enim Hippocratis attestatur oratio, tam duri reatus conscientia, medicorum innocens officium non decet maculari. Sed quoniam aut matricis uitio, aut æ-

tatis impotentia, sub qua præpropere frequenter partus euenit, foemina periclitantur: expedit prægnatibus in uitæ discrimine constitutis, sub unius partus sæpe iacturâ, salutem mercari certissimam. Sicut arboribus arcescentium ramorum accommodatur salutaris abscessio: & naues pressæ onere, cum graui tempestate, iactantur solum hñt ex dāno remediū. Vnde breuiter huic loco adnectenda, continuo designabo. Si ergo necessitatibus, aut ætatis immaturitate, aut uitij superius comprehendis, pecus molliter subtrahendum erit, his quammaximè consensio faciendum, ut cataplasmatibus chalasticis artemisiæ succos, aut trux puluerem miscemus: dictamni quoque similiter. Sic aristolochiæ, sic rutæ feminibus: sic & fomentis, & supradictarum specierum decoctionibus factis uti conueniet, quæ scripta sunt in cura conceptionis, ac sanguinem innoxie promouantibus. His uero sequentibus aliqui uis remedijs, duris forsan, corporibus minus obfuisse uidentur, qui sanguinem extorquentes, simul etiam uenientia pecora pertraxerunt. Succum rutæ uiridis potui dederunt, ad neophyta excludenda. Hanc eandem rutam uiridem, cum rancidis nucibus, & cum melle tritam dederunt, asseuerantes pro pessario apponendum. Interea etiam myrrham, & artemisiā, & leucosemen, ex æquo cum succo menthæ, potui similiter post balnea dari debere asseuerauerunt. Item lupinorum amarorum puluerem, myrrhæ, & leucosemen: quæ omnia ex æquo cum menthæ succo temperauerunt, ut trociscus cōficerent: quos cum decoctione artemisiæ, aut dictamni dari constituerunt. Alij radicem panacis myrrhæ, aloes ex æquo, similiter succum menthæ uiridis temperauerunt. Alij collyrium suppositorium faciētes, sic hæc innoxie extorsisse testati sunt. Myrrhæ, & absinthij, irios Illyricæ, radices panacis uncias singulas, gummi unc. II. quas in succo fenogreci infuderunt. Ex quo mixto cum pulvere supradictarum specierum collyria, uel balanos confecerunt, quos post balnea supponebant. Nam dictamnum cum uino tritum post balnea potui dabam, & continuo penè immaturas animas excludebant.

De hemorrh^oia matricis. Cap. V. I. I.

De vulneribus matricis. Cap. V. I. I. I.

De fluxu rheumatis, quem *gout* appellamus. Cap. I. X.

De gonorrhoea, id est spermatis effusione. Cap. X.

EFFUSIONE aliquando etiam spermatis spontanea, & importuna formine fatigantur, quod in grecis ^{ῥινοσπέρμη} ~~nostris~~ ^{ῥινοσπέρμη} ~~verez~~ ^{ῥινοσπέρμη} appellamus. Hæc quæ in viris hoc vitio laborantibus, superius ordinata sunt, etiam feminis conuenit adhibere. Ordinata gyneciarum dispositione, sufficere arbitror principalium passio-
num constrictionis, & relaxationis causis, ex paruis omnibus adiutoriis, competenter adiunctis. Cætera ue-
rò quæ artis officio, parturientibus aut disponenda sunt, aut facienda, usu magis, quàm lectione debes ad-
uertere: ut intelligas quæ pertineant ad salutem mulierum.

A. H. J. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572.

THEODORI PRISCIANI LIB. III. AD EUSEBIUM FILIUM DE PHYSICA SCIENTIA.



SCRIBENTI mihi de Physica scientia, qua te maxime delectari intelligo, sufficere arbitror Menandri comici insigne argumentum. Apud ciues suos cum studiorum annis, magne scientie laboraret inuidia, produxisse in theatrum fertur suum, partu plenam (hoc enim in loco celeberrimum Atheniensis eloquentie auditorium erat) produxisse inquam, expectantibus auditoribus, plenam suam, ibique eius exitum uerum, in Euripo fuisse prosectum. Cumque interfecti penè, ductu tamen naturæ agerentur, Athenienses, inquit, uiri, si in paruis annis scientiam meam miramini, istos narrare quis docuit? Hinc aduertere datur, Eusebii dulcissime filiorum meorum gratum mihi testimonium. Valde enim in te amo laboris mei operis precium, & quod tu mihi nunc scribendi conrigeris auditor. Dixi, datur aduertere quantum naturæ uis pateat in omnibus elementis, eorumque semina, pastæ oues periclitantur: mox radice eius assumpta, liberantur. Mulorum sanguis potus, uenenum est: carnes eorum cibo datæ, sunt remedio. Medentur uentris tormento canes, pastæ gramine. Et horrida sus nebulam discuit, campo pabulata: & iacta per dictamnium, excluduntur tela. Et cerui longæui uita, adesus mutatur cornibus. Et communes echidoniæ, communibus herbis, pullorum suorū declarant oculos. Ad postremum, natura omniparens, ueluti adiuncta charitate, cuncta animalia prosequuta est. Quæ enim nascendi sortem tribuit, uiuendi ac ualendi substantiam non negauit. Est enim in omni mundo natura, quæ operetur grande secretum. Sed illud mirari non desino, cur irrationabilia, & uagæ aues, & agrestes se res, ad beneficia naturæ propriis accedant. Supra cõtexti dabis mihi ueniam operis, patres, priores. Disputationum enim uestrarum rationes, morbidorum animalium genus, & his similis ætas mundi rudis igno-
stas uendicasse. Vnde fit, ut aut contrarijs, quibus uincuntur, aut proprijs, quibus placantur, conemur. Hinc est, quod & Romani, Febri ædè statuerunt, & quod Quartanas Saturni filias affirmauit antiquitas. In quam curatione, Democritus inquit, pollutione opus esse: ut sunt cædes, & cuspis, & menstrua muliens, & sacrarum auium, uel uetitorum animalium carnes cibo datæ, & sanguinis potus. Nam & epilepsin, quæ hieran noson appellauere, sic curare præcipit: efficacie potentiam præferens, & uitans inquiri rationem. Sed hæc non nos primi prodimus: fateri non poenitet: communia sunt, quæ cum ueteribus sentio. At qui mea quæ scripsero in ijs duntaxat, & nos magis posteris placebimus. Nec mirum, si nulla circa uiuos fama est. Sua tempora lector non amar. Hinc est illud clarissimum satyrici distichon.

Parua coronato plausere theatra Menandro.
Riseruntque suum secula Meoniden.

Nam & magister meus, quo me usum esse præceptore premiseram, dum uiueret, bellus habebatur, qui nunc orbo toto Vindicianus celebratur. Et profectio nullius unquam uirtus, dignè suo seculo honorata est: uel quod inuidie, fortunæque locus inter uiuos maneat, uel quod à miserie orto desiderio celebretur post fata probatio. Herba polygono coronatus, quam quis luna decrefcente sustulerit, dolore capitis caret. Similiter etiam herba illa, quæ fortè inuenta fuerit in capite enearum statuarum. Nam & reliquis bonis potantis si quis biberit, molestia capitis releuabitur. Spuma uero eius fronti illita lege secretiore naturæ, graues inquietudines capitis sedat. Et cornicis cerebrum, quolibet genere acceptum, paria facit. Similiter etiam muris cerebro comesto, natura omniparens, magnum remedium caput dolentibus præstitit. Ferulæ quoque combustæ, cinis, oleo mixtus, fronti uel capiti illitus, inquietudines capitis sepe sedat. Tantum etiam de uulturis cerebro, mixto oleo perunctum caput, frequentius liberatum est. O quantum naturæ uenerationis debetur! Nam magnes lapis admotus capiti, ex altitudine latentis morbos eripuit, & nidis hirundinum mox expositus, atque cum aceto contritus, frontique illitus, par beneficium procurauit. Hæc Physica remedia sufficere arbitror caput dolentibus, & hinc etiam de epilepticijs quædam ordinamus. Remediorum rectè adhibitorum efficacia, semper causarum bonos exitus confirmauit. Latentes epilepticos, gagatis lapidis admotum fumigium, semper repentinis casibus publicauit. Hoc de araneis parietum, hoc de stercore canum fumigium similiter facere constat. Nam & opertos caprarum pelibus, si in aquam ingredi facias litoris, insulis plantis, & tectis, epilepsia passio commouebitur. Similiter etiam si narex eorum opobalsamo tangas, sollicitius epilepticos publicabis. Et acaciæ pulueres si cum aqua calida acceperint, & si continuò correpti fuerint, insanabiles erunt. Sin uero febrerint, facilius liberantur. Hoc de prodendis, cognoscendis epilepticijs scripsimus, remediorum nunc opus est ordinatione. Peoniarum prædix magnum præsidium præstat, si continue potata, frequentius odoretur. Sic alicacabi, sic nycteridis radices medentur. Ex corio frontis asini, facta ueluti fasciola, eorum articuli constringendi sunt, & dextræ eius pedis ungulæ portatus circulus, pari conditione medebitur. Interea caprimas tunc tantummodo carnes comedentibus, camelorum medulla, oleo roseo resoluta, tempora capitis, stomachus, & totum pectus matutinis horis perungendum est. Ex sanguine mustelarum unguentum commodè adhibetur, par præstitit beneficium. In ipsis uero commotionibus, si sanguinem de eius pedum digitis elicias, quoquo pacto, & eius frontem ex eo tangas, & labia, continuò exurgit. Tunc etiam asini lotio aspergi conueniet. Adde interea, quod ille ait, si mihi fas audita loqui, quod necessitas procurandæ sanitatis extorquet, eodem lotio asini potaræos debere; & hirundinum sanguinem, cum thuris masculi puluere, sub æqua ponderatione,

cum

cum oxymelle similiter fumere. Sic alij ueteriores sub certo secreto naturæ, excepto capite ac pedibus, ceteras mustelæ reliquias, atque partes corporis obtulerunt; ex cuius cibi beneficio, molestiam passionis frequentissime declinauerunt. Aliud. Vna multum acris, horis matutinis data diebus triginta continuis profuerunt. Pari forma, etiam ex testa cerebri asini combusta cinis datus profuit. Sic althææ succis, si coagulum leporis, in modum grani erui per dies XXX. ministratum horis matutinis, epilepticos liberauit. Nam & mulieribus menstruatibus, hoc uitio laborantibus conuenient. Hæc epilepticorum præcepta, & probata remedij cura disposita, deinde reliqua, ut potero, uaga, & disseminata remedia collecta designabo. Hybiscum, & caricæ discostas, & tritas diligenter, ubi admiscueris, admisces passi calicellum plenum, modicum axungie porcine, quasi unciam, & pollinem de hordeo, ita ut hybiscitriti uncias II. caricarum unc. II. non febricitanti admisceas, cum quantum merum est: Febricitanti autem, aquam de hybisco, & caricis ubi bullierit hoc cataplasma impones, & usque in alterum diem manere habeat. Et item alia similiter facias, per dies quinque. Postea diameliton solues cum ceroto, & pones: deinde iunges in ipsa diameliton, etiam aliquantulum diaspermaton: & cum melius habere coeperint, das potionem athanasiam in aqua calida, & cochlear unum mellis, & cochlear unum aceti. Hoc per triduum facis: & si usus exegerit, iterum repetis cataplasma. Ad uescicæ autem dolorem, coquis aquam de fœnogræco cum hybisco, & fomentabis super pedinem, de aqua calida, ita ut ante oleo calido omnia loca quæ patiuntur, perungas. Quæ cum facis, sedebis super peluum maiorem, & leuiter fomentabis, ne loca contendantur. Postea detergis diligenter, & facis cataplasma de fœnogræco, & lini semine, & polline hordeaceo, in aqua & oleo ac modico melle cocta, cataplasma inducis, & ponis. Omnia loca cum ipsis quoque testibus percooperis. Hoc tandiu facis donec dolor recedat. Deinde decoquis adarcem, organum, & petroselinum, & sic dabis potionem cum modico melle. Medicamen autem diameliton solides cum ceroto molissimo, & cum adipibus pollinis, uel porcellinis, & medicamen basilicon, ita ut ante clysterizes eum qui patitur, examinando sterens totum, & sic curabis eum. Confectio medicamenti ad matricem curandam, uel menstrua prouocanda. Primo diffumigatur mulier sedens, de thorace, ante quinque dies quam menstrua ei solent uenire, & encolpizatur pigmentis, quæ inferius scripta sunt. Diachylon unc. I. basilicon semuncia una, ceræ puniceæ unc. I. adipis asinerini unc. I. oleo libyaco quantum necessarium fuerit. Species autem solues cum oleo liliaco, ita ut medietas cum aqua supra focum bulliat, & alteram medietatem cum supradictis medicamentis, & olei uapores facias calefcere, ut sic soluantur. Et cum coeperis uelle encolpizare, antea uentrem eius cura de fucis dispense, fortiter discoste, immixto clysteri oleo anethino. Et post istam iniectionem, si purgatio menstruum plena non fuerit subsequuta, dabis ei puluerem picæ cum uino, & melle, & calide permixtum. Sed ante, quantum diem consuevit purgationis, ita cura, ut antequam encolpizes, primo de succo prisanæ decoctæ cum anethino oleo, uentrem cures, & sic encolpizes: & hoc usque in diem purgationis, si necesse fuerit, bis in die facies, & nunquam anhelitum uel dolorem stomachi patietur. Hygna dicitur soluturum collyrium: Et dicitur panchriston. Facit autem ad multas passiones, & est approbatum. Ad synanchem, penna illita faucibus, cam soluit. Viceribus uero aurium prodest cum melle attico, & uino, equali pondere solutum, calefactumque, ad aures immisum, & non effusum. Vlcera totorum omnium emendat, præcipue tamen oculorum, foris illitum: duritijs etiam palpebrarum sic confectum, quoquo modo se habeant, si penna molliter inungatur, uel asigatur. Asperitates uero dentium ueteres palpebrarum sanat: albedines suffusionem membranarum, de oculis expurgat omnes. Morfus omnium serpentum curat: siue intrinsecus potui datum in uino, & oleo bono, pari mensura, quantum sufficit calefactum, seu de foris penna illitum, bene sanat. Cuius compositio talis est. Aeraminis combusti unc. II. myri affati semunciam, myrrhæ trogloditis unc. I. croci semuncia, passi cretici heminam, piperis communis semunciam, uini aminei cadi quod sufficit. Vniuersa cum dimidio uini in mortario teris, per dies numero XXII. Proinde reliquum uinum permiscens, cum passo cretico coque. Agitatum transcolas in trullionem, sed immittis simul supra memorata de mortario, in ipsum trullionem: tunc uero leuioribus carbonibus impositum trullionem, omni hora agitas, ne illa, quæ grauiora esse uidentur, in fundo remaneant, & comburantur: ergo mouenda sunt sine intermissione. Et cum feruende in modum mellis deuenierit, infrigidatum, uase uitreo seruare debebis. Ad conceptionem. Lepor tam affatam teris, & dabis in uino mero, in balneo sabanis infusa fuerit a uiro, concipiet. Ad conceptionem, experimentum. Nardum asianum, uiam uero passam cremam purgabis, ut tollas grana quæ habet, & myrrhæ trogloditis modicum, teris diligenter more collyrij: Sic enim probabis. Ad rostrum applicas, & labia inde fricas, si dulce est: sic mulier utatur. Si uero amarum, adauges uiam passam, & cum lana pectus factum suppones per dies XXX. Etiam si sapere est, concipit. Et pariter præparamus uiro. Rutam agrestem tere, & inde ueretrum ligne, statim excalefcit. Postea si non paufuerit ueretri tensura, idem ueretrum oleo unges. In ungula si a caballo indoluerint, oleo rosaceo tanguntur in balneo, & extra balneum. Si autem cum rubore nimio, aut uisura fuerint, cum cerussa permixta liniantur. Ad perniones. Alumen scissum in aceto acris infundis, & post diem agitabis, & pedem perunges. Ad lumbricos. In ollam fictilem mittis metham usque ad medias, & desuper myricas, usque ad summum, & implebis ipsam ollam aqua, & decoques omnia. Bibere dabis habenti lumbricos ieiuno, omnes per inferiora egerit. Ad menstrua mulieri prouocanda. Rutæ succi cyathum unum calefactum ieiuna bibat. Fortius autem prouocat, si ieiuna lauetur, & sic biberit, antequam balneum intret. Sanguis si hinc currere coeperit, surculus ipsius rutæ, de cuius folijs succus expressus est, in ignem mittatur, & sanguis se stringit. Potio ad luem. Cucumeris syluatici radicem quan-

Proxima pars epistolæ

Sancti Marci.

De reliquis, uagis
disseminata

mirum.

+ e. n. g. r. u. l. a. b. i. s.
an. ad. d. o. s. t. e. m. x.

u. l. i. o. n. e.

calicellus.

percooperis.

percooperis.

+ cum ipso diamelitono,

ad uiscera

focu

Cat

Pot

e. g.

ad matricem

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

u. l. i. o. n. e.

tum habueris, mittis in mortarium, & teris cum folijs tenerioribus semperniuz apij, & coriandri. Cum bene triveris, adijcies mel, & grana piperis imparia, quot uolueris: & uniuersa temperabis, & stanno seruabis, & ieiunus ueris. Et si quis apprehensus fuerit, hanc potionem cum acceperit, statim foris exit omnis lues ab illo, & sanus erit. Sed & qui reputacione usus fuerit, aut qui feruerit ei, qui lue tenetur, nunquam noceri poterit. Chalaisticum quod ostendit Titianus uir clarissimus, imponendum in aluta pedibus dolentibus, & ligandum fasciola, & desuper udones induendos. Ceræ punice unc. I. resinæ fixæ, pon. I. resinæ terebinthinæ unc. I. axungie porcine sine sale, de porcella uirgine, uel etiam de pluribus pond. I. hæc omnia in cacabo soluis: mittis postea ceram, & desuper nitri alexandrini bene nitri unc. I. & agitando bene commiscens, seruabis in fictili. Ad hæmorrhoidum, unde fiunt cardiaci, & phrenetici. Mala cysonia sicca trita lauato, & mittes in ollam nouam cum aqua fontana, & decoques, & ipsam aquam bibere dabis. Antidotum diarobum facit ad pectoris dolorem, & stomachi, & iocinoris, splenis, uelicæ, ad hæmoptoicos qui sanguinem uomunt, uel expuunt, ad indigestionem, inflationem stomachi, tussim siccam: & ad tussim spiriosam, id est, qui fortiter suspirant: nauseæ prodest, & saluiis abundantibus. In his necessitatum uniuersis doloribus, cochleare plenum ieiunus manducet: per triduum senties beneficium. Cuius compositio talis est. Mastiches, petroselini macedonici, oxypiperis, quod in usu est, unc. singulæ. Item hyssopi cretici, irios Illyricæ, rutæ uiridis unc. binæ, nuclei pinei unc. III. Quæ sicca sunt, tundi & cerni debent: tu tam autem cum nucleis pineis, & mastichem, in mortario fictili aspero detere. Hæc, cum bene fuerint malaxata, postea quæ sicca sunt iugantur, & terantur simul. Desuper autem mitti oportet mellis summi, quantum sufficit: in uniuersa confecta in uas uitreum missa, signataque seruari debent. Decoma antidotos Terentij Eutychni diateffarō. Facit ad digestionem, & ad urinam prouocandā, & colicū. Cuius confectio talis est. Petroselini macedonici, piperis, inulæ, foeniculi semina equis ponderibus tusa, & cribellata, melle bono sufficienti despumato, terendo iunguntur, & dolio uitreo signata seruantur: cum necesse fuerit, dabitur ita. Ad digestionem, cochleare plenum comedendum. Si autem manē stomachum indigestū habet, similiter cochleare plenum comedat. Ad urinam uerō prouocandam, in balneo, uel in sole stanti, cochleare plenum soluis, in duobus cyathis aquæ calidæ, & bibendum dabis. Colicis quoque in aqua calida, ubi apium fuerit decoctum, solutum, plenum cochleare bibere dabis: triduum tribus post cyathis aquæ calidæ. Antidotos faciens ad omnes dolores interaneorum. Hyssopi cretici unc. II. calaminthes creticæ, pulegij, sine fumo, petroselini macedonici, felleos uncias ternas, apij seminis unciam I. libystici semenciam, thymij hispani florū unc. I. piperis semenciam, gingiberis semenciam, tusa & cernita commiscens cum melle bono despumato, & confectum, uitreo signatum seruabis. Ex hoc ieiuno dabis cochleare plenum. Diamorōn ἀκρόν. i. simplex. Mora syluatica triduo in cacabo mundo habentur: Postea exprimuntur ex his sextarij sex: quibus iunguntur mellis sextarij tres commixti: simul colantur, & in cacabo stanno coquantur ad tertias. Seruatur in dolio uitreo. Datur ex hoc ad uulnera faucium, dentium dolori. In acerrimis febribus constitutis, temperatur ex aqua calida, uel ex frigida. Sed in aures fulceratas ad cochleare fundetur, & obturabitur lana. Diamorōn febrastī, id est, succus de moris syluaticis, quæ collecta, in cacabo triduo sint, quarta die experimendi: ex his sextarij sex, croci unc. II. aluminis scissi unc. II. corticis malogranati unc. II. succus de moris, & mel, & succus labruscæ bene commiscuntur, & colantur, & desuper imponunt trita & cribellata, & iungunt. Crocus ante triduum infunditur in succo labruscæ, ut facile teri possit. Decocta simul usque ad tertias, uitreo seruanda sunt. Facit ad faucium uulnera, & totius oris: sed & ad carnes, quæ supra dentes nascuntur. Acopum diacissum. Baccas lauri numero c. pilas cypressi numero XX. herbæ saluæ foliorum libram I. resinæ pituinæ lib. I. germinis hederæ unc. III. olei fabinenis lib. III. feno-græci sextarium I. ceræ rubræ lib. I. præter hæc gummi, resinam, & ceram, in cacabo infundis in aquæ fontanæ sextarij II. & olei libris III. per triduum: quarta die decoques, quæ infusa sunt, leui foco, quando aqua absumatur. Gummi uerō teres cum oleo modico iam cocto, usque ad leuitatem resinam autem, & cetera cum reliquo oleo resoluta leui foco, colabis, & reperfactum supra gummi immixtum, agitabis de ferula. Quod medicamen, dolio uitreo seruabis. Facit autem ad totius corporis frigorem, & ad ischiam, & podagram utilissimè prodest. Ad sanguinem uomentes. Semen falicis unc. I. tritum cum uino austero permixtum ieiunus accipiat. Sanguinem restringit, & uitium emendat. Confectio faccomellis. Vix acerbæ succum sextarios II. quem succum cacabo stanno per triduum seruabis, supra missis grassis salis manni tribus, ita omnes fæces in fundo resideant. Exinde mittis succi limpidi sextarios II. mellis despumati sextarios III. Coques leui foco usque ad tertias: Quod de ferula agitabis, frigidum factum, uitreo seruabis. Facit ad nauseam restringendam, & uentris fluxum, & initia eorum qui sanguinem uomunt. Sed & dysentericæ incipienti, cum aquæ puræ mensura dabis: febrientibus tepidum, ceteris frigidum. Ad sanguinem de ano fluentem. Malogranati corticem tustum, & bene cribellatum, in aquæ calidæ cyathis II. totidemque uini, & cochlearia singula pulueris per triduum da bibere, & restringit. Ad dysentericos. Ouum gallinæ cum aceto friges, & dās manducare ei, qui patitur, per dies septem. Ad dysenteriam. Fragmenta de mola ignifera facies: cum bene incaluerint, lapides ipsos in lacte caprino extingues: & illud lac bibere dabis. Ad eos qui cum tormento, urinam faciunt. Sisymbrium ex aqua coque, & tere limpidè, & da. Bibat cum careno ieiunus, ex aqua supra memorata. Ad lumbricos. Herbam centauream decoques ex aqua, in olla noua, & dabis per triduum: bibat cyathos ternos, uel quinos. Ad omnia etiam interanea facit. Ad capillos in capite ramos, ut spissi renascantur, qui ex infirmitate graui ceciderunt. Caput nouacula eradendum, & liniendum ex hac unctione, cuius compositio talis est. Thus daciū, gallas, inulam, myrti uirginis

seminis uncias singulas; omnia tundis, cribellas. Post ladanum in uino uetere infusum, unc II. per triduum desuper in mortario missum adijcis, & simul coteris usque ad limpiditatem. Cumque spissare coeperit, tantum nardi boni campani desuper mittis, ut in modum ceræ strictionis deueniat. Perfectum plumbeo reponitur uasculo. Vt eris post rasuram quousque capilli densentur. Ad denigrandos capillos. Gallas acerbas numero X. spicam celticam, muscum gallicum, myrti nigri semuncias singulas: oua coruina tria; gallas, spicam, semen myrti, tundis, cribellas, & postea in mortario medicinali teris, cum uini ueteris quarta no uno, per triduum: quarta die, desuper adijcis oua, & in uino commiscebis. Confecta plumbo seruabis. Quando uti opus est, oleo liscifino, & uino ueteri resoluta in sectione uteris, ita ut solutior sit, & possit omnibus adherere capillis. Sanè sub hora infectionis, oleum intra os habendum est, ne dentes nigrentur. Medicamentum Phisophiani, quod dicitur cytopharmacum, unice faciens ad passiones has. Ad ulcera chironia, ad ulcera recentia, ad luxatum, ad præcisuram, ad scabiem in capite, ad parotidas, seu glandulas, ad ulceram naturæ, ad contusionem & tumorem, ad deiectionem, & fracturam, ad carbunculum, & furunculum. Etiam si in mammillis mulierum ulcera, uel durities nate fuerint: Ad faucium tumores aforis, ad scabiem, ad rhagadum, ad exochadium. Cuius medicaminis compositio talis est. Cera rubra, & cera punice, libras singulas, opopanax uncias II. Oleum aut secundarium, pinguisimum tantum mittere debes, ut pigmenta tequantur: resoluta in cacabo mundo colabis, & ad supra memorata uteris. Diaherpillum acopum. Serpillum, scenogreum, iunci radices, rorismarini libras singulas. Hæc omnia in uini ueteris sextariis quinque infusa sint diebus quinque; die sexto, olei sabini mittis sextarios quinque, leui foco impositum / eo usque coquitur, ut uinum absumatur. Postea mittis cera punice, uncias XIII. Facit autem podagricis, arthriticis, spine dolori, ischiadicis omnibus mirifice prodest. Et diacitriū acopum, cuius confectio talis est. In cacabo aquæ feruentis deponitur alia ollicula ærea, ita ne aqua illic intret olliculæ: cui hæc mittenda sunt. Citreum uiride acerbum, peucedani uiridis pond. I. olei sabini sextarii II. sub ipsa die simul coquantur ad feruorem aquæ bullientis: ollicula habeatur, ubi citreum est cum ceteris. Postquæ hæc decocta fuerint, oleum colatur in cacabo, & desuper mittitur ceræ punice libra I. agitur, quousque soluitur cera. Confectum, in uas uitreum reponatur. Facit ad ea, ad quæ & diaherpillon, id est, podagricis, arthriticis, spine dolori, & ischiadicis. In aure uultus si fuerit, excuas malugranatum, & mittis illic myrrham, pedialis mos, mel, & acerum, & ad dimidium coquis, & eo mittis tepidum, per folium lauri, oreniten sanat. Alij pro myrrha aphronitrum mittunt. Ad hydropem. Vituli masculi stercore cum aceto acri permixto, spisse uenter liniendus est: ita tamen, ut ante ipse hydropicus toto corpore dropacetur. Ad hydropem. Squilla, id est, bulbus sub prunis furno assatur. Deinde circumpurgatur, & medietas eiusdem bulbi in aqua coquitur: posteaquam coquendo colorem mutauerit, tollitur. Ex quo bulbo scrupulus unus, & dimidius tenitur cum oxymelle: tribus cyathis calefactum, bibendum datur. Omnem calamitatem per urinam euacuat. Ad hydropem. Lomentum fabacium bene cernitum, & cineres de fornacibus optime cernitros, & quis ponderibus adunatos, in aqua calidissima conspergis, & facis cerotum in modum cataplasmatidis: inducis pannis duobus, ita ut unum habeat in ante, & alterum retrò: omnem calamitatem humoris, aut per anum digerit, aut per urinam. Ad hydropem, quod monstrauit teoparda. De lupo, si uiro, de masculo; si mulieri, de lupa, remedium faciendo, cor seca totum, & pulmones. Omnia simul comburis, ita ut carbonες fiant: quæ teri, cerni, id est, cribellari, & in puluerem redigi debent, & uitreo seruari signata. Cum necesse fuerit, uinum bonum, sed non uetus, mittis in ollam fictilem nouam, & de pulegio quod fumo tactum non est, facies fasciculum, & ex eo facis agitari ipsum uinum. Posteaquam perbullierunt, facies potionem, & tepesfacta potionem, cochleare plenum pulueris das bibere ei qui patitur, per triduum. Ad hydropem. Quod monstrauit uxor nomenclatoris. In ollam fictilem nouam mittis unam radicem de costo, & de folio malo bathro tres furculos crassos, & fasciculum qui de publico emi debet fœniculi: bulliant hæc omnia in olla cooperta. Ex eo manè unam potionem bibat, & serò qua hora se collocat, unam. Ad hydropem, potio experimentata Cornelio. Scyllæ purgatæ, id est, bulbi crudi minutatim cõcisi pond. I. uini aminei uetustissimi sextarios III. in fictili per triduum infundis, & uas die quarto foco leui imponis, & coquis, quousque uinum ad tertias ueniat. Sublato uase de foco, partes scyllæ proijcis expressas, succum uero uitro seruabis. Ex hoc quando opus fuerit, quartarium hydropico ieiuno calefactum dabis. Locis autem externis tumen- tibus, aut inflatis, aut humore plenis, stercus bubulum cum parte aceti resolutum, spisse imponis tandiu, quousque ad limpidam sanitatem patientia loca perducas. Sanè de succo priore ter singulos quartarios dabis, id est, triduo, intermissis singulis diebus. Ad hydropem, quam frequenter experimentauit Eugamius, Confectio. Columbi agrestis, uiui, integri, cum pennis suis exusti, in olla fictili in cineres conuersi: & ex ijs quantum tribus digitis leuare potueris, & herbe sabine, tulsæ, cribellatæ tantundem, & myrrhæ troglodyticæ quantum tibi uidebitur, in uini meri aphri calefacti cyathis duobus, ieiuno digesto bibendum dabis. Primo tamen die sentier beneficium potionis, ita ut per urinam satis mittat. Alij incipiunt subito, & per nares mittere humorem. Ad dolorem uentris, & ad tortionem, experimentatum à Cornelio. Calaminthæ, nam sic est herbe nomen, pulegii fisci sine fumo, petroselini, libystici, unciæ singulæ: fiseleos, apij semen, gingiber, iuniperi, thymi hispani, piperis, quod in usu est, unciæ binæ, mellis optimi despumati quantum tibi uidetur, omnia hæc tunduntur, cribellantur, & in melle despumato coniunguntur. Reponuntur in uitro. Quando uero opus est, in aquæ calidæ cyathis tribus, ubi apium fuerit decoctum, dandum antidotum modo nucis auellane. To ladanum, si sub hirco scabies exierit, aut durities facit, & ad loca dolentia uniuersa, præcipue tamen ad humores, & durities, & apostemata prodest: quæ carbunculis, claudis, & furun-

THEODORI PRISCIANI AD

culis. Cuius compositio talis est. Spumæ argenti, olei communis, libras singulas, galbani unc. III. ceræ ru-
bez, resinæ terebinthinæ libras singulas, lilybisci radicis fasciculos III. Spumam argenti cum oleo in mor-
tarium mittis, & teris usque ad summam lumpiditatem. Resinam, ceram, cum galbano, foco leui impo-
soluis in cacabo: deinde colas, & iungis cum spuma argenti & oleo detritis. Hybisci autem radices deter-
gis, & postea lotas, in pila tundis, & in mortario fictili, pistillo ligneo teris, quousque bene fit detritum.
Paulatim iungitur cum supra memoratis, & terendo adiuvantur: confecta, in fictili seruantur. Musæ
trochisci uirtus prodest his passionibus: capitis dolori, & oculis sæpe rheumatizantibus, si ex aceto resolu-
to, tota frons liniatur: Auribus humore plenis, aut uulnera habentibus, ex uino austero, & melle resolu-
tum, auribus infunditur. Gingiuis putridis, aut sanguine plenis, uel dentibus luxatis, in puluerem detritus-
aut digito, aut melle intra os mittitur. Narium ulcera inueterata diuturno humore, ex uino austero reso-
lutum, & intermissum sanat. Vlceribus omnibus forislibus, cum linteolis linitum, & impositum prodest.
Fluxui uentris ex sanguine assellantibus, seu asuram cum putredine facientibus, ex uino austero cocto in
myrto, quantum esthmaueris, uel ceræ quasi merum, per pessarium inijcis, mirifice prodest. Ad ulcera chi-
ronia, linteola infusa imponuntur: & ad carcinomata, & ad omnia uulnera uetera. Ad naturam dolen-
tem, in aqua tritus spissus liniatur, & linteolum infusum ponitur. Paronychijs ex aqua tritum sæpe inun-
ges. Cuius trochisci compositio talis est. Aluminis scissi unc. III. aloës indicæ unc. III. myrrhæ unc. II. cro-
ci unc. II. crocomaginos unc. III. cactanthi II. malogranati caliculos, qui primi nascuntur, antequam
poma fiant unc. III. zris floris unc. II. Cortices tundis & teris: crocum aut uino amineo, aut phalerno
infundis. Quod alio die tollis de uino, & in mortario teris. Cum tritum fuerit adijcis & ceteras species de-
super, & ad mensuram cochlearis conteris, cum melle sufficite, & uino bene subactum. Ex eo trochiscos
facis siccatos, & in aluta molli seruabis, & loco sicco reponis in uitro: ad supradicta de experimentis.
Ad lumbricos. Cornu ceruinum secas, & scobem ipsius cum mellis modico, in aqua calidæ cyathis tribus
dabis bibere. Ad profluuium à me tertio hæc duo remedia sunt experimentata. De capillis ipsius mu-
lieris, qui excidunt, quando se ornat cum mataxa, facit in medio nodum, & in arbore quacunque pomise-
ra liget de ipsis capillis unum nodum, quos capillos illic relinquit in arbore aliena. Mulier manifeste sana-
tur, arbor autem arida fit. Ad uescicam. Carbones de arbore perfecti unc. I. picæ pond. I. resinæ pond. I.
oleo unc. II. ceræ unc. II. aceti portionem, laminam cyprinam unc. II. quæ terenda sunt cum aceto in mor-
tario medicinali per triduum: Quarto autem die decoques. His in cacabum missis, ac resolutis, & cum oleo
transcolatis, misceri illud oportet: quod in mortario fuerit tritum; adunatum exagitur, quousque in
modum emplastri deueniat: linteolo inductum ponitur. Ad hepatis & ad splenem. Eupatorium, costum,
gentianam, aristolochiam longam, aristolochiam rotundam, baccas lauri mundas sine cortice, piper, omnia
æquis ponderibus tundis, cernis: uitro seruabis. Cum necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini, ue-
teris, chalcidii, cochleare plenum. Si autem febriunt, in aqua calidæ cyathis tribus. Ad colicæ dolorem. Thy-
mum hispanum tundis, & molliter cernis, & das die primo cochleare I. die secundo II. die tertio III. Si fe-
briunt, in aqua calida: sin minus, in uini ueteris cyathis tribus. Ad dysentericos. Cōchylium anchusam,
amylum alexandrinum æquis ponderibus tusa, & cribellata, in ouo sorbilito chleare plenū ieiuno, & post
cœnā dabis. Aliud Eusebij, ad dysentericos. Vux syluaticæ adhuc acerbe, folliculos cum granis suis, pro-
iectis uerò succis, sicca utraque tundis, cernis, & in uitreo dolo seruabis: ex hoc in tribus cyathis uini ue-
teris meri, cochleare plenum. Febrientibus uerò cum omphaco & melle. Ad idem. Membranam exterio-
ris uentris gallinæ, quam coci semper proijciunt, ad solem siccabis, ita ut sint XXV. tundis, cernis, cum
gallis asianis II. ex quibus puluerem factum, pariter miscebis cum amylo alexandrino: cochleare plenum
semel. Ad colicæ. In balneo posteaquam te lotus per sabana uestiueris, & sederis, dicitur intra te, per te
diacholon, diacholon, diacholon. Ad calculum, Porphyrij. Brassicam bene siccata teris & piperis pon-
dus duplum: itaque cribratis, & in se mixtis, cochleare plenum dabis in potione. Ad fluxum sanguinis
de naribus, experimentatum. De ipso sanguine nomen eius cui fluit, literis latinis in fronte scribis ad tibi-
nam, & statuis. Ad idem, experimentatum. Calcitide trita si linteolum in cortice extremitate tetigeris,
& intra nares miseris, statuis. Hoc & si de diacharto feceris, idem ualeat. Si autem nimius sanguis currit,
hominis pedes in aquam frigidissimam depones, & statuis. Ad idem, experimentatum. De cacabo, siue
ereo, siue fictili, fuliginem tritam, per cannam infusam, si intra nares miseris, statuis sanguinem. De com-
ma, ad hordysium qui in oculo ab se nascitur. Galbanum, thus, & manna in se, ex equo pondere comini-
sces, in linteolo inductum pone. Ad hepatis. Codum eupatorium, lupinum caudum, æquo pondere tun-
duntur, cernuntur. Mellis autem attici fibræ II. semotim bulliant, & sic desuper supramemorata mittun-
tur. Ex eo, ieiuno danda sunt II. cochlearia. Intermissis duobus diebus, accipiunt usque quater. Ad la-
teris dolorem, ad perfrictionem, sed tamen recenter bibendo. Hyssopum, origanum coquis pultatio nouo.
Bulliat ter, aut quater. Et mittis acetum in mortarium cum melle, & manæ cochlearia duo, uel tria sumat.
Ad calculos expellendos, etiam infantibus. Vnum calculum porcinum, semen cauliculi, cyminum, bacce
lauri sicce mundæ, piperis unc. binæ: hæc separatim tunduntur, & bene cribellata, in unum rediguntur, in
dolo. Interea dabis cochleare plenum in codera mixto cyathis tribus. Ad cordis dolorem, etiam si spi-
na doluerit. Laferis cyrenaici grana tria, detrita mellis, & aceti, æquo pondere, ut faciat cyathos tres, bibat.
Ad auriginosum. Herbam aristolochiam muscum de tecto, quem fumus non tetigit, in se teris, & spargis
in corpore

o. a. d. x. or.
R. u. ac. u. or.

Troch. Musæ.
resusciuit.

resoluit & intermissus.

ajellard.
adum. d. i. m. p.
m. o. p. a. m.
f. e. m. o. n. i. a.
p. u. l. t. u. r. i. s. o. r.

malogranati caliculos, qui
primi nascuntur, antequam
poma fiant, sunt bina.

in uino ad supra-
de experimentis.

de ambrosio.
de profluuium mu-
lieris.
de uescicam.
Ad hepatis & splenem.

de colicæ dolore.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

Ad calculum.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

de ad uescicam.

in corpore: uel puluerem ipsum dabis cum uino ueteri bibat. Ad auriculæ dolorem. Malū granatum sic cum exinanis, & mittis mellis cochlearia duo, & aceti glutum unum: Bulliat in se ipsum malū granatum: de argilla deforis linis, ut bene bulliat: etiam tepidum per folium lauri mittis in auriculam. Ad intestinum dolorem. Brassicam britannicam conteris, & succum eius in aquæ calidæ cyathis tribus dabis bibere; aut cyminum hispanum dabis. Corpus igitur hominis diuidimus in quatuor partes, caput, pectus, uentrem, atque uesicam. Si autem incipit circa caput causa consurgere, necesse est, ut tenebræ malæ, & dolor capitis consequantur: Supercilia sunt grauiā, & cerebri, & temporum pulsus: Oculi manē lacrymant, hos caligo complectitur, auriumque pulsus. Quando igitur aliquid horum indiciorum ostenditur, conuenit adhibere capitis purgationem sine ullo medicamine cathartico. Nanque aut hyssopi comam & origani, & pulegium in melle, uel in mulso datam, ad mensuram heminæ dimidiæ gargarizare expedit. Hac enim nulla circa caput lenior potest esse medicina. Tantum ergo mensuræ colatum in multis tepidum gargarizari expedit ab homine ieiuno. Negligentibus autem hæc indicia, consueuerunt ista contingere. Imbecillitates luminum, aures rumpuntur extrinsecus, strumæ in cōfinio collis, in cerebro pulsus, per trichio suffocatio in guttur descendens, uua distillat, glandula inflatur, capilli desunt, caput ulceribus impletur, consequitur etiam dentium dolor. Quando autem circa pectus causa obdurata est, constat ex plurimis, & hæc permonstrari solent. Primum superius in pectore, & lingua erathor solito, & spura fellita. In lateribus autem, & in scapulis, dolores sine ullis præcedentibus causis, oscitationes assidue, sed & aliās suffocatio & sitis. A somno autem anima non læta, pulsus pectoris, in brachijs & in manibus tremor, & sicca tussis. Quisque aduersum hæc sapienter instans, hanc consuetudinem seruet, ut a coena uomat sine ullo medicamine. Conuenientes sunt etiam uomitus, quos & ieiuni facere solent, quibus noxius insidens pectori humor extrahitur. Conuenit igitur maiore uomitu tenues radices manducare, carthamum, semen ericæ, confusam semper & tepentem aquam superbibere. Indicia autem negligentes harum causarum, hæc ægitudines consequuntur: pulmonum labor, phtisis, & nigri fellis, acutæ febres, & semper pestilis somnus. Cum autem circa uentrem ualetudo consurgit, quæ multifariam constat, ista prænuntiāt. Torquetur uenter, & turbatur, cui se importune febris infundit. Potus autem in uisceribus amarefcunt, & ex ipsis dolor in omni corpore, nulla necessitate, torpedit in uiribus, & quædam subtilitas febrium. Quando igitur hæc indicia præcellerint, conuenit uentrem sine ullis medicamentis procurare molliorem. Est autem curatio uera tibi præscripta, nihil derelinquas, aut lapathum ueteri, aut mercuriali herba, quæ uirginalis uocatur: Est enim indignationi uentris accommoda. Si autem superior causa protraxerit, quodcumque sit illorum indiciorum, oportet decoctum ueritæ haurire succum. Est enim cæteris sanior & periculosa res. Illa quoque utilis ratio curandi est, ut caules in mulsa aqua decocti penitus exuder, horum aqua melle dulcetur, asperso sale, usque ad heminas IIII. Modicum utile est bibere. Hæc autem negligentes causæ ualetudinum consequuntur. Fiunt coctacis, sine fine profluit dysenteria, sequitur iliaca, apoplexia, & in inferioribus defluens sanguis, & hærens morbus articulis. Quando autem per uesicam uentura est causa, æque & ipsa multifariam constat, & prænosci solet. Ab escis plurimus uetus emittitur. Crebra eructio, foedus corporis color, grauis somnus, collectum decoloratum, quod tamen difficulter effunditur: circa uentrem tumor excitatur. Quando ergo horum indiciorum aliquid fuerit deprehensum, futuram causam conuenit præuenire. Maxime autem ante dies decem. Quibus curam oportet adhibere, foeniculi & apij radices, maceratas in uino candido, & bene olenti da ieiuno. Duobus cyathis conuenit bibi: debet tamen aqua permixta esse mensuræ. Quos modicè urina persequitur, ex hoc indicio causæ ingrauescunt, hydrops, icteris dolor, phlegmæ, stranguria sicca. Scripseram autem tibi de temporum circulis, quæ cum recurrunt, per maxime certa indicia ualetudinem in hominum corporibus ostendunt: unde illis adhibere obseruantiam oportet, ut scias quibus rebus utaris, & quibus rebus abstineas. Faciamus igitur exordium ab hyberno tempore. Solstitium est VIII. Calen. Ianua. ex qua die corporibus humor increfcit. Quam causam hybernū æquinoctium præstat. Vere igitur calidissimis, & optimis, & indulge uino: ne peperceris ueneri. Sunt autem ex supra scripta die in æquinoctium uernum, dies nonaginta duo. A sexto autem Calen. April. die, usque ad memoratum, incrementa gignuntur. Vere igitur bene olentibus, & acerrimis cibis, ut impleatur humor. Tuncque a supra scripto æquinoctij die, quo sol orietur, dies quadraginta octo demonstrat. Ortus enim pleiadum pridie idus Maias habentur. Inde sanguis increfcit, febres humoresque gignuntur, in æstiu tempore permutationem. Vere dulcibus, & minime consueta uenere exercere, & ieiuna. Sunt autem usque ad permutationem æstiu tempore, ab exordio pleiadum, dies quadraginta tres. Incipit tempus æstiuum VIII. Calen. Iulij. Ipsa hora incrementum fellis admittitur: quod crescit in æquinoctium autumnij. Frigidis utere, & dulcibus, & cunctis bene olentibus, & minime ieiuna: & consuetis ueneris in totum abstinere, in dies nonaginta unum. Aequinoctium autem autumnij: a sexto Calen. Octob. intenditur. Ipsa hora uis nigri fellis augetur, humorum crassitudo consequitur, in occasum usque pleiadum. Vere calidis, & acerrimis omnibus, & abstine a uenere, minimumque ieiuna. Sunt autem in occasu supra scripto dies XII. Occasus pleiadum quarto idus Nouemb. Eadem hora rursus hominibus sanguis increfcit. Conuenit igitur & te reliquis uti, & indulgere uino, consuetis ueneris insistere. Dies sunt in tempore hyberni XI. Illis si uteris, ut missa scriptura demonstrat, integra salute reliquum tempus facile transiges, sine uariatione medicorum. Ad capitis dolorem, ut in sole non doleat, radicem pulegij post aurem sinistram baiulabis. Item quando te lauaueris antequam solium descendas, de manu sinistra haurito aquam, & supra cerebrum ter mittito. Item aliud. Papyrus tenes in manibus tuis, & nomias septem uiduas, quas nosti, &

THEODORI PRISCIANI AD

facis septem nodos in eo, & in fronte figabis. Item uitis alba corticem comburito, & miscens cum uide-
lo omni iunctas in fronte. Ad morsum serpentium. Gentianam, aristolochiam rotundam, lauri baccas pur-
gatas, myrrham, & quis ponderibus tuncas admisces melli optimo. Ad hemicranion. Canis mortui capul-
los de capite tollis, de duobus digitis, & pulli mortui, & die sequenti nimum in linteolo de licio in collo
suspendis. Item radices falsas raphani tere, quæ adhæserint tolle, & tere cum aceto acri, & lini hemicra-
niam. Ad grauedinem aurium. Fel caprinum, mel atticum quatum & fel fuerit, myrrham, oleum rosaceum
simul in carbonibus calefacis, & in aurem mittis. Ad uermiculos qui in auribus nati fuerint. Amurcam
calefacis, & mittis in aurem. Ad auriculæ dolorem. Porri succum intybi succum cum nardo calefacies
& intus mittes. Ad aurium dolorem, & uulnera. Herbe sanguinariz succorum cochlearia duo, mellis
cochlearia II. olei cochlearia II. siccæ porri uirginis cochlearia II. hæc omnia simul comisces, coquens igni
leui, & intus mittis. Ad infirmum, ut dormiat. Semen sesami cum aqua teris, & facies grana minuta, in
modum ciceris, & ad causas supradictas, ut dormiat, grana bina uel terna glutiat. Ad tussim. Semen ca-
nabis, fabam combustam, pulegium, irio illyricam, piper, hyssopum, semen de urtica, & anethi radicem, o-
mnia hæc ad scrupulum semis mittis, & teris in aqua calida. Ad tussim. Herbam marubium deco-
ques ex aqua ad tertias, & cum melle despumato dabis bibere. Ad tussim, electuarium. Petroselinum un-
ciam unam, gingiberis unc. I. piperis unc. citoniorum costorum pondo duo, mellis I. pariter omnia co-
misces, & coquis, dabis ieiuno cochleare. Ad tussim. Nuces grandes sine nucleo coques in olla noua,
& aquam quantam uolueris, dummodo sextarium bibat ex uino, sanabitur. Item sinapi alexandrini
unc. fruges, & piperis unc. atque in unum conteris, & contritum in pultarium mittis, adiciens mellis pon-
do I. & coques usque dum spissum sit, & refrigerat: ex hoc ieiunus sub lingua teneat, & dum se coeperit
soluere, transglutiat. Hoc & noctu, cum dormire coeperit, faciat. Ad idem facit, & maximum remedium
est. Equi saluam ex aqua calida bibat per triduum: si qui tussierit, uiuet, equus morietur. Ad idem. Ane-
thi seminis cyathi tres, piperis scrupulos XII. mellis sextarium I. tundis, & cribras, in melle comisces,
& sic uteris; mane cochlearia tria, & alia die similiter. Ad idem. irio illyricam drachmam I. mellis quod
sufficiat, quousque sit eliquata spissitudo. Ad coli dolorem. Azyum panis rundis, & per cribellum cer-
nis, & das die primo in uino cochleare unum, die secundo duo, tertio tria; febricitanti in calida: sano, ut di-
ctum est, in uino ueteri. Ad colum. Siliquas aphras tres, piperis albi grana XXI. costi scrup. III. post
omnia hæc trita, & cribellata, in uino ignito potionem facis, & dabis ei cochleare unum. Hoc per triduum
si dolet, ignitum ferrum sic in uino extingues. Item Canabis radicem combures, grana L. XIX. in
mortario teris, in uino, & dabis potionem diebus IX. Item lignum nodosum sambucinum mittis in fo-
cum, & dum coeperit exuri, paulatim fuillam de eodem extinguis: colligis in uasculo mundo: & rursus
apposito ligno ad ignem, iterum & frequentius hoc faciendo colligis, usque ad cochleare plenum: cuique
pulueri adiciens canabis grana XIII. cimini grana XIX. Contrita simul cum puluere adiciens, in cali-
da potione facta, da ieiuno, ut bibat plurimis diebus. Item testas ouorum gallinæ, cū primum oua fue-
rint supposita, post exclusionem collecta: omnia uris, & teris diligenter in mortario: adiciens piperis gra-
na XXI. simul diligenter conteris: & dabis in aqua calida cochleare plenum. hoc facis per triduum. Item
caput sardi decoques diligenter in aqua nymphali, quam colatam calidam dabis ei bibere. Item sangui-
nem anguillæ, cum rubello uino, & quis mensuris cum aqua tepida mittis. Item ad colum. Aphronitra ma-
tronalia duo in aqua dabis. Ad mammillarum dolorem. Terræ tubera uiridia, & axungia ueterem sine
sale tunde, & panem: facies cataplasma, & impones. Quibus ungues dolent, siue ad paronychia. Mel co-
quens despuma, spumam argenti, & zris florem tritum simul comiscens, & unguibus in linteolo impos-
nes. Ad eructationem, uel stomachi inflationem. Myrrhæ nigre baccam contritam dabis cum uino uet-
teri. Ad stomachum confirmandum diateffaron. Ciminum, rutam, baccam lauri & quis pōderibus trita, mel
le mixto, cochleare plenum ieiunum bibat. Ad formidinem cordis, & spasum. Folia persici trita ponan-
tur ad cor, & succus horum. Item rutam ex aceto & melle, cum fanna hordeacea pectori impones. Ad cor-
dis dolorem etiam si spina doluerit. Lasris cyrenaici grana tria, detrita in melle, & aceto, & quo pondere,
quod faciat cyathos III. bibat. Ad formidinem cordis & spasum. Rutæ fasciculos in rosaceo oleo, & ace-
to decoquito, & unge eum, ut sudor desinat: quia cordis, uel animi angustia sudorem frigidum generant.
In uino mero spongiam macera, & sinistræ mammillæ imposito. Ad fluxum uentris. Gallam, & testam
de locusta teris, & mittis in ouum sorbile, & dabis ad uentrem. Betam ex aqua mulsa decoques, sparso ni-
tro. Cum manducauerit, aquam ipsam bibat. Ad lumbricos. Coniandi semen cum melle dabis manduca-
re. Ad fluxum uentris. Lenticulæ agreßis semen teris, & dabis in aqua calida, & mox restringit.
Etiam si infans lateris patitur dolorem, bibat nutritrix ex hoc, & lactet infantem, & statim infans sen-
tiet. Ad uentrem Eiciendum. Rubricam mittis in aquam calidam, iuxta modum potionis: da-
bis potum, etiam si lumbrici sint, subsistent. Ad eos quibus uenter iuxta consuetudinem non facit.
Blitum, uirginem herbam, siue mercurialem, apium, damascena quinque in aqua nymphali discoques:
quam diligentissime colas, & facies ex ipsa aqua potum, in quo modicum olei adijcis, darur ei. Ad
duritiam uentris. In tribus caricis pinguisimis exprimis lac, & dimittis in ollam, ita ut penè sit plena,
dabis hoc manducare. Qui sunt pinguisimi corpore, ut extenuentur, Tisragia uentriculum siccū
ad uentrem alligabis, ita ut corpus contingat, & cum homine maneat: a extenuationem quantum uo-
luerit, ueniet. Ad uentris strictionem. Callanæ coria tria, & mali, ac piri, & rosæ flores, in aqua calida dabis
bibere. Ad solutionem uentris. Ouum, & butyrum in se coques, & in linteolo indudum, ad præ-
cordia imponis. Ad suspirium. Lapidem modicum de fluuio qui teri potest, de manu sinistra tollito,
& in

& in uino dabis : aut certe tria grana allij ad tertias decoquito, & bibat. Ad suspirium. Aquam quæ in arbore inuenitur in lacunis, cuiusque corticibus consistens, suspirioso potum dabis. Item betonicam cernis, cernitam repones: cum opus fuerit, drachmas tres cum lacte caprino ieiunus accipiat. Item centaureæ herbæ succum, nucis auellanae magnitudine, in oxymellis cyathis tribus dabis: bibat, sanus erit. Ad lateris dolorem, & ad perfrictionem, attamen arcentem nimium. Hyssopum, organum coques in pultario nouo, bulliat ter uel quater: acerum mittis in pultarium, & mel, & mane cochlearia duo uel tria sumat. Ad lateris dolorem. Petroselinum fasciculos sex semis, piper tritum dabis in uino, & in ipso latere recumbat. Item semen absinthij tundis, & facis puluerem, & commisces cum axungia ueteri, inducis in pannum, & imponis. Ad lateris dextri dolorem, & ad epar. Piper, costum, apij semen, æquis poderibus tundis, & cribellas: in aqua calida potionem dabis, mittis autem cochleare unum. Ad lateris dolorem, & si quis pondus leuauerit. Sulphur uiuum, picem, resinam maculosam, bitumen tritum, in charta per se imponis in balneo in loco, ubi dolet, siquidem multum dolet, & postmodum triduo à balneo se absteineat. Ad lateris dolorem. Herbam chelidoniam tritam cum axungia imposito. Item tritam cum uino, da ieiuno, bibat, sanus fit. Ad Epar. Linum, eupatorium, costum, gentianam, aristolochiam longam, aristolochiam rotundam, baccas lauri mundas sine cortice, piper, hæc omnia æquis ponderibus tundis, cernis, seruis. Cum necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini ueteris calefacti cochleare plenum. Si autem febricitet, in aqua calida, trium cyathorum mensura. Ad epar. Costum, eupatorium, lupinum crudum, æquis ponderibus tunc sum, cernitum, commixtum, ex hoc dabis in tribus cyathis mellificati calidi cochleare plenum, per triduum. Hæc portio danda est ieiuno. Item gutta ammoniacæ unc. I I I. costi unc. I. petroselini macedonici unc. I. feniculi unc. I I. Hæc species tunduntur; mellis autem attici. libra I. seminum bulliat, & sic desuper memorata species tunduntur. Ex hoc ieiuno dantur cochlearia duo: intermissiterum duobus diebus, accipiant, usque quater. Item piperis grana xxx. baccas lauri mundi sine cortice, grana x. simul in mortario teris, & dabis in uino ueteri cyathos tres, & in eo latere recumbat. Hoc per triduum, si febricitauerit, in aqua calida dabis. Item corticem rasum auellanae, in uino terito, & dabis. Item uulpis splenem ficas, & dabis tritum ieiuno incondito. Aut certe costum, fenogrecum, oryzam, piper, æquis ponderibus tundis, & condita dabis. Ad spleneticos. Ficus, & pilulas cypressinas decoque cum aceto, & facis cataplasma, & imponis. Item pulegium, quæ prius nascitur, teritur, & in uino dabis. Item radicem ebuli siccam, aut certe radicem salicis in aqua coques, & dabis ieiuno uinum uetus. Stryptem nouissime purgatum bene combures, & puluerem facies, & dabis. Si infanti, uel maiori ad affellandum intestinum descenderit, facies hoc. Stercus asini comburis: inde facto puluere in olla ipso puluere in testinum aspergis: de aqua non lauas. Posteaquam puluerem asperferis, uidebis ipse, ne intestinum detergas. Hoc assidue facis, usque dum cesset descendere. Ad intestinorum dolorem. Brassicam britannicam conteris, & succum eius in aqua calida cyathos tres dabis bibere. Si infanti, uel maiori ad affellandum intestinum descenderit, siue sanguine puro, siue cum stercore, affellatus, sublauiet se de aqua suprascripta cum acacia. Postquam delorum fuerit, mittis seni hircini calefacti, in aqua calida, cochlearia duo; uel succo oryzae cochlearia duo, & acaciae cochleare dimidium, in clystere commixta mittis. Ad iocinoris dolorem. Lupi cor siccum teris cum pipere, costo, petroselino, ieiunus ex mero bibat. Item betonicæ fasciculum, & mellis sextarium decoques ad medias, & dabis per triduum. Ad nauseas, & uomitum. Oleum costum tritum ex melle, & cochleare manducet: uel anethum ex aqua mulla dabis. Ad sanguinis uomitum. Glutinis libram, ex aqua potionem dabis, bibat, & curatur sine periculo. Qui escam non continet. Stercus passeris parietarij teris, dabis in uino ueteri, ad potionem cochlearis unius, mox escam tenet. Ad renum dolorem. Picem, bitumen iudaicum, sulphur uiuum, nitrum, trita omnia mixta in se imponis. Item herbam artemisiā à pridie ubi nascitur, inquires, & alia die ante solis ortum, inclinatus, de sinistra manu euelle, sine nodo concingis te. Ad hircosos. Thus masculum, & alumē tere, & ascellas hircosas line: aut myrta sicca. Ad renum dolorem. Ieiunus poscam tepidam bibat, & inambulet: aut certe seuum bubulum manducet; aut certe suinum uirginem, ad renem ligabis. Ad dysentericos. Conchylum anchusam, amyllum alexandrinum, hæc omnia æquis ponderibus tuncsa, cribellata seruabis. In necessitate, dabis in uino forbili cochleare plenum, mane ieiuno: in ouis tribus singula cochlearia, hoc est, per diem unum, ouum unum. Item coagulum leporis ex uino uetere delotum, tepefactum, dabis ieiuno bibere, & continuo sanatur, etiam si carnes mittat. Item uue syluaticæ adhuc recentis folliculos cum granis suis, protatis succis ficas, utraque tundis, cernis, in dolio uitreo seruabis: in necessitate, dabis ex hoc tria cochlearia in uino ueteri mero, frigido, uel tepido. Febricitanti, cum omphacino melle modico, ut supra memoratur. Item membranas exterioris uentris gallinacij, quas coci semper proiciunt, maxime de plurimis pulvis has sole siccabis, ita ut sint XXV. tundis, cernis, cum pilulis quas dicimus anagallidos numero V. ex quibus puluerem factum pariter miscebis in uino, & æquē amyli alexandrini cochleare unum. Permista omnia in uase uitreo seruabis. Cum necesse fuerit, in ouo forbili dabis cochleare unum in die semel. Si autem ita fuerit solutio uentris, ut cum stercore soluto, sputa remaneant, & generet conatus & libidinē, tunc oleum, siue uermiculū ad hæc dirimenda datur. Et huius clysteris compositio talis est. Malignanari corticem, rubi cymas, myrtasque leues, rorem syriacum: omnia hæc mittis in ollam, & excoquis, in uino supra memorato; cochleare mittis cum puluere. Cuius pulueris compositio talis est. Acaciae nigre puluerem factum conteris unc. I. struthij I. seminis asparagi unc. I. ligamen hederæ unc. I. rheuporicum unc. I. rheopontici cum pulegio unc. I. oia tundis, & cribellas subtilissime, dabis cochleare unū cum melle calido. Ad ge-

Ad del. gericulorum.
Ad passionem intercanon.
rosae succum colligito,
Ad vulnera sing. mole,
gemculi.
Ad Stropium. (cat. pro
Ad rursu fomeram. p. 11
Ad plantis. *

ner infirmis.
 ib. dissectione.
 feb. medull.
 laren.
 omnium.
 sanguinem.
 panniculum.
 sticulus of.
 tines of.
 Ut scabon digorer in
 letorgas.
 ulcera sana.
 lignum sacrum.
 {quor' oclat}
 ulcera antiqua {umore
 malicia.
 ul furunculum.
 ulcera palum.
 ulcera tibiari.
 ul ulstone metrorum.
 an dy topi amide,
 orum.
 asperperis Lugador.
 trisiculus canos
 oculor' yras.
 trena dolorem.
 caligiem.
 {leat' dolore'.

Ad caliginem. Fel testudinis melli mixtum, caliginem tollit. Ad dentium dolorem.
Iuncus appositus, dentium dolori subuenit. Ad stomachum. Vrsi natura,
stomachi

stomachi dolorem curat: & digestionem præstat, si concavitate, qua gracilius est, caput lupi ex auro accipiat, & uasione circa stomachum suspensa collo, lino portetur: ita, ut nec aqua contingat, nec terra ipsam naturam urfi. Ad conceptum. Gramen corio canis curato, ut oportet, illigatum, steriles concipere facit. Idem efficiunt mercurialis, & uerbena, herbae quæ tam masculinæ sunt, quam foemininæ. Ad dysentericos, qui nimium fluxum ventris patiuntur. Semen de lapatho agresti teris, & mundas, & in uino uetere nigro dabis. Quotiesque assellatus fuerit, totiens postea ex ista confectione dabis. Item cochleam cum testa, & carne comburis, & teris, & lentem nostratensem & ipsam comburis, & teris, piper simul tritum mittis, & dabis portionem in aqua calida. Ad dysentericos, uel quibus nimium uenter fluit, ita ut fatigati ad periculum perueniunt, facies admiraberis. Mora syluatica tempore suo colligis cum suis folijs, & reponis. Quo tempore aliquis necessitate retinetur, in cacabum rudem mittis, coques illud diligenter usque ad tertias, & das ei potum, & continuo stringit fluxum sanguinis qui in uentre est. Ad dysentericos, & qui sanguinem uel musculaginem assellant. Gallam rubeam, & gummi album alexandrinum, æquis ponderibus tundis, & cernis, & dabis cochleare unum in ovo sorbili. Idem ex herba argemonia facies, ut eius succum uino mixto accipiat. Etiam si aliquis ferro fuerit percussus, cum axungia rursus curabis. Idem plantago facit, ut aceto coquatur, si modicum exinde bibit. Ad calculum. Brassicam succam, & piperis pondus duplum, utrisque cribatis, & simul mixtis, cochleare plenum das in portione, careni cochleare pariter. Ad calculos expellendos, etiam infantibus. Vnum calculum porcinum, seminis cauliculi, unc. I. I. piperis unc. I. hæc separatim tunduntur, cernuntur: & posteaquam in unum rediguntur, seruantur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, tribus cyathis mixtis calidis, careni plenum cochleare dabis. Item calculum quem primum miserit, tolle, & tere, & nescienti in aqua calida dabis bibere. Item semen de herba personaria tere, & dato siue oxymelle, siue in aqua. Ad calculum, & colum. Semen pastinacæ sicce uentilatum diligenter purga, deinde uiginti partem piperis optimi in mortario teris, & in dolio uitreo conde, & signa. Ex hoc, si dolorem febrilem habet, in aqua calida quantum tres digiti capiunt, ieiuno dabis. Sin uero sine febre fuerit lauet, & ea die in piscinam non descendat, & in sabano in condito sedeat. In diebus triginta ter hoc accipiat, omnino nunquam dolebit. Item semen de omæ: nascitur autem in locis humidis, & similis est sinapi. Cuius semen, quantum digitis tribus poteris comprehendere, cum triginta granis piperis immittas in calida aqua, & da: bibat ieiunus per plurimos dies. Item semen cauliculi, cyminum, piper, baccas lauri sicca, munda sine cortice, æquis ponderibus singula tunduntur, & in uinum miscuntur: desuper adjicitur lapis, qui in uesica porcina inuenitur, & ipse teritur cum supradictis speciebus. Confectum seruetur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, dabis in tribus cyathis careni, mixta calida per triduum cochlearia singula. Item herbam quæ appellatur græcè petrocorys: nascitur in petrosis locis: hanc tundis, & ipsam dabis cum aqua bibere ei, qui necessitatem sustinet, & expellit lapidem. Huius autem experimenti gratia, ipsam herbam in uesica porcina cum lapide, quouis modo liga: maneat illic tri duo: & post triduum aspice, & inuenies uirtute ipsius dissolutum lapidem. Item ad calculum, uel qui cum tormento urinam facit. Lorium capræ montanæ bibat, & sanabitur. Ad calculum & colum. Petroselinum unc. I. saxifragæ unc. I. iuniperi unc. I. asari unc. I. cassiæ unc. I. pyrethri unc. I. ammoniaci unc. I. squinanti unc. I. prassij unc. I. torismarini unc. I. rutæ unc. I. betonicæ unc. I. I. zinziberis unc. I. I. simluci unc. I. costi unc. I. piperis unc. I. III. inulæ unc. II. opij unc. I. spicæ nardi unc. I. ameos unc. I. rheu pontici unc. I. baccae lauri unc. I. tritis, & in unum redactis nudum perfricabis. In loco in quo erit, tepidum facies, & illic quod primum imposueris, spongia detergis, & iterum fricabis, similiter & tertio facies: Post hæc oleo rosæ perunges. Fæbz foeminae si in coitu mulieris præstantur ad sexum, cui appositæ fuerint, in uesica uirides bonæ sunt. Nam sponza foeminalis uis magna est, siquidem ex paucis inscriptis noscitur. Fæbz florentis summitates lectæ, ac tritæ, & uasi terreo mandatæ, & post nonaginta dies extractæ, caput infantis penè cruenti ostendunt. Quod si per suprascriptos dies retexeris, corpus muliebre formatum deprehendis. De eruca. Erucæ uiti inclusæ, cum feceris uirides farinas, si diu maneant intactæ, sicurcū cum uite formatum ostendunt. De lotio. Lorium humectam aqua pluuiali, & madefactum, ita custoditum, ut non siccetur, firmatur in muros. De ocymo. Ocymum luna prima tritum, & missum in ollam nouam, florebit, permanens usque ad plenilunium. Quod si duplato tempore supradicto, condatur in nigra terra, generat spiphiones. Ad coli dolorem. Coli dolorem auertis, si caudæ lacertæ summitatem ipsam, auro clausam, ligaueris circa umbilicum: & si restem intuleris, in qua suspensio quis finierit uitæ. Ad morbum regium. Regio morbo tentus, asinum diu & frequenter intuens, medicabitur. Mustelas à pullis auertit, or de armo asini casu inuentum, & in domo, uel in uilla collocatum. Ad scabiē equorum. Equo scabiem tollit, si uirtuli marini adipe, contra pilum unxeris, aut anethum cum picula pari mensura, æreo coquas uase, & eodem inducas modo. Ad rigorem. Antacotis lapis omnem rigorem ligatus auertit. Ad oculorum equi dolorem. Suffusionem oculorum equi tollis, si succo hedere, & melle attico inungas. Ut equo paurem tollas. Equo paurem tolles, si in dexterae auri summitate, caudam caponi uiuo sublatā, suspenderis. Ut uinum bonum fiat. Vinum infusare bonum facies, si decimā dulcis aquæ addideris, & coquas fortius ad focum, donec ad tertias coquatur. Oleum bonum & clarum fit, si in fundo anethum, & sale colloces. Oleum nigrum & sordidum, clarum reddis, si nitri libram coctam, carbonibus, rursus, & acetam in uas miseris. Si autem uis idem iam bonum reddere, oleastri folia comode tunde, & massam libralem in uas mitte. Si autem suauissimum uis facere, folia uiridia oleastri tunde, & in linteolum mitte, et per idem linteolum oleum colato. Eodem modo iterum oleastrum rursus macer, & patere dies aliquos

permanere, & trahere. Vt putorem oleo tollas. Si oleastrum sine semine tunsum, diligenter uasi submittas, & in sole colloques, ut caleat, & post in aliud uas transferas. Pili ne nascantur. Corpus pueri, uel puellae, priusquam pilos emittant, ouis ortigarum linito, in perpetuum nitidum praestas, si saepius in locis consuetis perfrices. Confectio liquaminis. Mororum partem unam, duabus uini dulcissimi permisce, liquamini bonum saporem facies. Confectio passi. Hyslopi fasciculum, mala orbiculata decem in melle coque per triduum igni lento, ita ut tribus horis diurnis ferueat. Ad hemicranium. Hemicranium pausat, si uermes pari numero sinistra manu lecti, & in aceto optimo permixti, eadem manu linantur loco dolenti. Ad alopecias. Muscarum capita caluis locis capitis illita, uestiunt capillis. Item muscarum capita combusta cum melle, alopecias tollunt. Murium etiam sterco aceto tritum auxiliatur. Si autem uolueris auxilium fortius dare, canis uenam ceruicis solve, & accepto sanguine inducis. Item de muscis supra scriptis indutum caluo, etiam capillos restituet. Ad dentitionem infantium. Catuli dens, si casu decider, dentientibus infantibus auxilium praestat. Et equinus dens, seu canis, uel uiculi auxiliatur. Et si muri uiuolium per acum in ore trahias, & per intestini postremam partem adicias, & filum collo sustendas.

Semen quid sit, et unde nascitur.

ALEXANDER amator ueri appellatus, discipulus Asclepiades, libro primo de semine, spumam sanguinis, eius essentiam dixit, Diogenis placitis consentiens. Item Erasistratus, & Herophilus, essentiam seminis dicunt sanguinem. Hoc idem Stoici philosophi de materiali semine senserunt, & demonstrationes alij alias deferentes, quasi in unum comprehensas enarrant. Primo igitur ut Herophilus ait, abruptione corporum hoc testatur, quam Graeci anotomy uocant. Etenim seminalium uasculorum interiora atque secretius remota, sanguinolenta uidentur. Sequentia uero, siue secunda, plurimum a praescriptis demutata sunt, inferiora ac proxima, seminis colorem habetia: quo probatur, in seminales uias sanguinem uenire, sed earum uirtutem albescere, atque mutatam in se ministrans ire qualitatem: sicut etiam in foemina post partum, si quid sanguinis nondum fuerit uteri nutrimento consumptum, naturali meatu suo, in mammas, & earum uirtute albescent, lactis accipit qualitatem. Secundo, cum illi, qui frequentius usu uenerico depurgantur, sanguinis sustineant per seminales uias emissionem: Siquidem celeritatis causa essentia sanguinis in seminales uenire non sinitur uias. Tertio, Summum quidquam ex summo fieri necessesse est. Summum est autem semen ex omnibus in nobis liquoribus: summus est sanguis. Semen igitur ex sanguine generatur. Quartum. Quicumque plebotomati, sustinet post sanguinis detractionem, pallorem, tenuitatem, debilitatem. Haec etiam peracta uenere, corpora comitantur: siquidem semen ex sanguine fieri uidetur. Quintum. Semen matrici appositum congelatur, ut dedarat temporis abruptiones: quod est signum seminis, atque essentiae de sanguine uenientis, & ad suam originem redeuntis; quippe praeter sua uascula constituti. Sed his omnibus, Diodes, sectator Hippocratis, quem Athenienses iuniorum Hippocratem uocauerunt, assertionibus respondens, contra primam dixit: quo modo una atque eadem materies descendens per quosdam uiarum meatus, uspiam plegma fiet, uspiam fel, id est, cholera rubra, uspiam melancholia, uspiam sanguis. Fit etiam sanguis, semen ex nutrimento, id est, ex cibo & potu, ex quibus & ipsi quatuor humores nutriuntur, & non specialiter sanguinis eius mutatur initium. Alioquin debuit etiam in pueris, seminis substantia feruari, cum materia sanguinis non desit. Item contra secundam, hoc est, quod frequenti uenere uexati, sanguinem quidam excludant, dicendum: quod iugi adfricatione aliqua interioris coli uiz, sanguinem uideantur. Denique illis maxime urinam facientibus, partium mordicatio sequitur. Contra tertiam, quod in nobis magis summus uideatur spiritus, non ut illi putant, sanguis, qui neque per se moueri potest. Contra quartam dicendum, quia plebotomati non solum sanguis egeritur, uerum etiam spiritus: & eisdem non pallor, siue fatigatio, uel cetera sequi uidentur. Hanc igitur essentiam seminis dixerit fel, aut sterco. Contra quintam, dicendum, quod sepius conceptione declinante, purgationes fiant: & propterea, si quid sanguinis in matrice remaneret, semine congeleretur. Ipsum denique foras effusum, & non in matricem ueniens, nunquam in sanguinis reducitur qualitatem, aut cogelari potuit in similitudinem sanguinis. Diogenes autem Apollonij, essentiam seminis, similiter spumam sanguinis dixit libro physico. Etenim spiratione adductus spiritus, sanguinem suspendit: cuius alia pars carne uiuit, alia superans in seminales cadit uias, & semen facit, quod non est aliud, quam spuma sanguinis spiritu collisi. Aristoteles autem, semen inquit aliud principaliter uocari, aliud participio. Cuius primum semine feruens quidam in liquido spiritus, atque in complexum uenericum proficiens, sit cum liquore, qui sit similis igni terreno: est enim corruptius. Ille autem, qui diurnus atque aethereus est, si quidem sit nutritibilis, germinum atque animalium, clauso feruore seminis in liquido coparabitur. Participio autem dicunt appellari semen, spumam ultimae digestionis nutrimenti. Primum etenim consensus cibos in ore accipit: secundum in albo: tertium, cum in sanguine mutatur est. Igitur superantia supradicta non inutilia, ut urina, uel sterco, sed ut illud quod in panificio separant panifices, fermento relicto, alterius panis confectioni profuturo. Quae etiam, qua causa coferuens atque crassum, post digestionem aquatum atque frigidum fiat, cum necesse sit. Attendant esse ex duobus, hoc est, aut terrenum, aut aquosum. Diodes his assertionibus respondens, ait in libro trigelimo octauo: Hippocrates, quem primum medicorum appellamus, suo testimonio affirmavit de seminis natura: eo quod ex nutrimento, quod graece trophion appellamus, sicuti & omnes humores, ut muscoli, nerui, uena,

& arteria,

THEODORI PRISCIANI AD

partus secundum Hippocratem, uteri perfectio, ex qua fiet nutrimenti inopia, & eruptio membranarum. Quamdiu enim paruus fuerit foetus, sufficiens caput ex matre nutrimentum. Cum autem ad perfectam uenerit magnitudinem, plurimo necessario indigebit, quam ualet grauida subrogare. Tunc incommodis affectus est nutrimenti. Ad quod acius commotus, rumpit membranas: & celeritate eruptionis prominet. Fit etiam umbilici marcor, cum iam non poterit ualere nutrimenta ministrare. Tempore autem instante, concipit, atque collocari manifestum est, septidomum uero septem spatii contineri; septimo mense detes nasci aliquibus nono: septimo anno infanti dentes cadere: his septenis pubescere & nucleantibus mammillis semen generare: ter septenis & uno anno barbam maturare, septidomis zgnos periclitare. Quid mirum? Septem stellis omnia ministrantur: sic infantem in utero ferri atque componi, cursum solis & lune duo decadion terminare. Est autem numerus septies multiplicatus: Ita partum consummari. Sed figuram hominis infans accipit primo quadagesimo aliquando: aliquando & trigesimo die, sicut ait Hippocrates in libro quadagesimo nono de infantis natura. Et uidi quendam mulierem in partibus Gazæ, triginta dierum abortum fecisse masculum, cuius omnia membra ex integro confirmata conspexi. Nam & cor ipsius quasi gramum papaueris magnitudine existimaui. Hos autem numeros, ut partus edatur, septies multiplicare oportet: ita ut quicumque die trigesimo in utero materno figuram hominis accipit, septimo mense nascatur: hos dies septies multiplicabis, & efficiuntur dies CCX, qui sunt menses septem. Qui autem quadagesimo die figuram hominis acceperit, nono mense intrate, decimo die nascitur. Septies multiplicabis dies efficiuntur CCLXXX, qui sunt menses nouem. Itaque die decimo, ut diximus, septimo, aut decimo mense, qui nascuntur, uitaes erunt. Manifestum est, infantem in utero temporibus firmari. Quomodo? Intendite. Primo mense iactus seminis nostri in utero materno congregatur in umbilicum, in hoc est congregatio. Secundo mense expressio est corporis. Tercio mense, quia priore formatum est corpus, ei tribuitur anima. Quarto mense, ungues accipit, & capillos ducit, & motum facit infans in utero materno. Ideo, quarto mense prægnantes nascuntur. Quinto mense facit characterem patris eius, aut matris, aut adultentum demonstrat. Sexto mense, adicit nervorum confirmationem. Septimo mense medulla consolidatur. Octauo mense ossa durantur. Nono mense, maturatum mouet infantem effectus nature rerum beneficijs. Decimo mense, de tenebris ad lucem exit, tardæ ætatis ingressu maturatus, & proficiens. Igitur cor aliquando cum ex pulmone impletur, si quid per superficiem cutis uenerit, recusat, atque recludit: aliquando cum pulmo deficiens, cordi non dederit, si quidem eo tempore, cum accipiendum officium uisitur su perioribus haustibus, tunc rursus corpus ex toto corde sumit aerem sibi consuetum, atque ita respirationis perficit officium, differenti tempore inducens frigus, semper corpori necessarium. Sic enim supradicto exemplo ignei splendoris, seu radij, ex partibus loci in corde constituti, in quo anima consistit, usque ad omnes fines corporis illis superuenerit, & consensus in illis partibus fiet, in quibus etiam, irruentia perficiuntur. Sed speciales quoque, uel quæ in ipsis geruntur, expones, aut unam esse ex corde ad quam eandem uirtutem sensificant, quæ ad animam transmittet, sed pro uiarum diuersitate fieri differentem. Cum enim inquit, uisus suis uisibus fuerit constitutus, uisus perficitur: cum in audibilibus, auditus: cum in odorantibus, odor: cum in linguæ partibus, sapor: cum in toto corpore, tactus. Sicut enim una atque eadem cibi materia, prouidentia uiarum nutrimenta ministrans, nunc neruos, uel arterias, nunc uenas, aut ossa, uel musculos transit, non aliter sensificat uirtus animæ, secundum accipientium uiarum differentiam. Si per omne inquam, corpus mundæ essent uia, ut in oculis sunt constitutæ, per totum corpus forsitan uideremus. Nunc autem, qui secundum uiarum differentiam, hoc fieri non potest, recte uisum inquit, hoc genere celebrari: cum ex corde sensifica uirtus limpida, atque splens, ad oculos prouenit, infusa per humore uitreum, quem Græci hyaloiden uocant: Exinde rursus redit ad sphaeram, hoc est, oculi ultimam interiorius tunicam, quam Græci crystalloidem uocant, seu phacoidem, aut discaidem: tunc tenuans atque splensificans sphaeram, ad eius centrum ac mediam partem, quam appellamus phacoidem, confugit. Exinde ad pupillam omnis concidens, celerrimo lapsu per eius raritates accipit calum, tanquam ex suffecto secundum sphaeram, uertice, ad tenuem pupillæ uiam, conductum: atque ita irruens uisibilibus rebus hoc est, quas uidemus, earum facit apprehensionem. Sicut inquit, ignis uicina corpora exurit, distantia calefacit, remota illuminat: longius autem constituta, neque urit, neque calefacit, neque illuminat, dissoluta omnino seu perdita uirtute: sic etiam anima in cordis altitudine habens rationabilem uirtutem, quam tendit usque ad corporis fines, omnes sensus perficit: sed ab his decidens, in aerem eundem euanescens, in alios sensus scinditur: neque iam seruans sensificam uirtutem, dehinc quod in uisu sensifica uirtus, per multa uenit corporis membra, ex angustijs ad mundas uias, & propterea pura atque illibata peruenit, & splens, proprio uigore seruato: Accedit etiam, quod secum plurimum luminis ex anima trahat ex corde perfecto, in similitudinem radij, per uisificas uias irruat, & ab hoc corpore in aerem cadens, longo itinere non intereat. Ad alios uero sensus uirtutes uenientes, per apertiores feruntur uias, ad plurimum spiritali ac ualida materia circumseptas, quorum admixtione obscurantur: ob hoc mox corpore in aerem uenire, intereunt, plurimo sibi aere permixto.

De lingue natura.

ET ENIM linguam sine suo naturali esse constituit: dehinc mollem, atque laxiorem: siquidem grandis capacem. sed sine suo fabricatam: ne traducta ab aliquo, qui in se esset succo, & rareficeret, & iudicium eorum qui extrinsecus irruerint, subuerteret. Mollem autem factam, quo facilius, seu celerius per ea sensifica

THEODORI PRISCIANI AD

fieri, uel lenteriam, nimietate frigoris, ac liquidorum humorum, quam græce dacchodes uocamus: quæ descendendo & exurendo intestina, dysenterias uel lenterias facit, ex defluenti carne uenientium atque uentre ruentium; quæ nutrimentis admixta, seu cibis sumptis, corruptione sua neque sursum carnis uias accipere linat nutrimentum, aut corpori propriare. Cõdapsion autem & ileon fieri humore generato dixit in ore coli, argilloforum liquidorum humorum obstruione: sed cõdapsion inferiore osculo fieri dixit, quod est oppositum, uel spectans intestinum, cui nomen est arcon. siquidem neque stercorea in ipsum, neque uentus irruat, neque clysteris iniectione accipiatur, omnibus concidentibus & obstantibus iniectionali. Aut si cõdapsion in superiori osculo fieri, quo liquor tenue denique expectat intestinum, & inflationem seu uentos, & stercorea aliquando irruentia accipiat, & clysterem quoque: siquidem inferius osculum non fit obstruendum, sed non liberum transitum ad ileon fieri, concepto seu retento spiritus iaculo, & prohibente nutrimenti naturalem meatum. Hoc sæpius continget incipientibus, & qui causas non intelligunt, aut per uerecundiam, seu potentem personam, sicut in clepsydriis, cum acceptus spiritus prohibet transitum liquidorum humorum, seu sursum exultio atque conglutinato nutrimento, transitus intestini atque eius fieri recessus non linatur: uel duratis intestinis, nimia uel spiritus, ita ut prohibeatur irruere nutrimentum.

Quo modo esca, uel potus per omne corpus distribuuntur.

T R I A inquit officia, atque discretionis in corpore nutrimentum sustinere. Quorum primum in uentre mixtum constituit, calefacto atque decocto, secundum in uenis; tertium in particulis: quia pro membrorum dispositione, supradicta accipiunt. Sed ex primo officio atque discretionis, si quid inutile fuerit, in stercorea per intestina deuenire. Ex secundo autem, quod uenis perficitur, superfluum in urinam transire, atque in uescicam decurrere: quæ sub uentosa artiifice posita, ad se humorem attrahit, uel ex omni parte ad officium eius decurrit, sicut humor tenuatus à lacte discernitur. Item ex tertio officio, quod in partibus posuimus, quæ in se supradicta suscipiunt nutrimenta, si qua superflua fuerint, tanquam aliena per sudorem egerint. Tribus ergo, ut supra diximus, officiis ac discretionibus, non recte constitutis, non digeribus, & in alvorem inquit uerti, putredinem, seu fermentosam fumere qualitatē: quam zymosin appellauit: quod & ante ipsum ceteri probauerunt: & in exaltationem transire, seu mutari, ut neque adduci spiritus, neque humoris esse uideatur, sed inter utranque naturam, neutrum probetur. Horum igitur utrumque custodiens anima, externum frigus inducit, hoc est, aëre partitum est. Huncque adduci non solum per nares, uerum etiam per totum corpus, officio commutato. Quando enim per nares inferius adducitur, per fauces ad pulmonem fertur: exinde pars cordi, pars thoraci transmittitur: tunc impletis locis, inductus aër, per uias totius corporis denuò totus regeitur. Quando autem ex pulmone, atque corde, & uentre redditur, rursum per fauces reciprocus fertur ad narium atque oris uias: tunc uia seruata, rursum per totam corporis superficiem inducitur per eiusmodi, quæ per supradictas uias exierit. Sic etiam per podicem atque intestina, ac uentrem, quod etiam per totam corporis superficiem, seu cutem respiratio fiat, manifestum est ex eo: quod cum medicaminum atque unguentorum uirtutes usque ad altiora uiscera penetriant, necessario materiam tenduntur, & opprellione uentris perurguntur. Etenim per superficiem, seu cutem corporis, & rationabiles uias, id est, digestorias, inuisibili dispendio insumptione facta, sequitur ut inanas non valeat substantiam retinere, id est, cibum, uel potum: cum semper irruenti materiam cedit: atque ita opprimente uentre, nutrimenta partis uniuerso corpori traduntur. Sic itaque compresso stomacho, idem domino corpori escas quas suscepit, crudas atque acidas seu limosas ad superiora reiacat, atque euomit, impellente feruore. Anedum inquit fieri, quem nos redhibitionem uocamus, cum per inane in obstruione uenæ, quæ ex corde sumit initium, seu pulmonem, cum cogitur transgredi per eam à corde, reciprocus ad materiam quæ spiritum spargit, per omnem corporis regionem: & ob hoc non sine spiritum recto ac solito cursu moueri, usque ad corporis finem; sequitur ut turbatus mentem commoueat, & calum corporis faciat, atque adductiones & raptus diuersos. Aut si forte omnia quæ in nobis liquida, seu argillofa, & crassiora, & feruentia sunt, hæc fuerint obstrusa, secundum eos meatus, quibus & respiratio credita sequeretur. Certante autem inquit, interiore spiritu, seu feruore cum festinatione exeundi, & obuiante frigore festinationi intrandi, turbati mentem, & spiratione retentatos artus fieri, seu calum, seu malefactionem, uel dyplim animæ, usque dum calor ex altioribus locis mutatus, seu abductus, obduratus, uel clausa uias subtilitate caloris interrumpendo, per uias faciat, qua sanguis uel spiritus consuetudinarius fibi iter consequatur. Hinc fit epilepsia, compatiens sibi bulini passione, quæ fit ex ariditate & siccitate totius corporis ab anno trigesimo usque ad quinquagesimum. His frequenter ego carpiſſion epithymo permixto, seu samſuco, uel abrotono, seu carui semen cum asaro, in hyſopi aqua decocto, ieiuno bibendum dedi, & ad meliora prouocaui. Opium cyrenaicum ad odoratum naribus opposuimus. In locis refrigeratis, bene olentibus repaſandi locum accipiant, seu ubi flores herbarum dispersi fuerint. Ab inquietudine uociferantium custodiendi erunt. Sternutatione reflationem inquit fieri limoris in cerebro constituti, cadentis per nares. Simili modo etiam aurium tinnitum, superantibus liquidis in capite ac reſſatis, decedente spiritu. Hinc sæpe etiam aurium dolorem nasci, uel ex concepto spiritu & assumptione, atque erumpente & extendente partes. Item fluētis humoris acioris causa per auditorias cauernas, exulceratis finibus, trahente humore in loca uulnerato. Oscitationes item fieri, coacernati spiritus atque erumpentis causa, & illari, per solitas uias decurrentis, mouente spiritu à parte, siue extra cordis pulsum. Ob hoc cum lacrymarum fluore

In omnia sua transiit a cura et alio dno.

Cape septam e pagina sequenti. #

*Nonne in hoc seculo est desolatio
peccatorum et iniquitas hominum
et iniquitas, aut iniquitas quae
multitudine sunt, et iniquitas hominum
quod in hoc seculo est desolatio
et iniquitas hominum, et iniquitas
peccatorum et iniquitas hominum.*

